

LIN

LINNÉ

CENTURIA INSECTORUM  
RARIORUM

SMITHSONIAN  
LIBRARY







D. D.

# C E N T U R I A I N S E C T O R U M R A R I O R U M

Q U A M

C O N S E N T . E X P E R I M E N T I S S . F A C . M E D .

I n R E G I A A C A D E M I A U P S A L I E N S I ,

P R Ä S I D E

N O B I L I S S I M O A T Q U E C E L E B E R R I M O

## D:o D O C T . C A R O L O

## V O N L I N N É ,

E Q U I T E A U R AT . D E S T E L L A P O L A R I .

S : A E R : A E M : T I S S V E C I A E A R C H I A T R O .

M E D I C I N . E T B O T A N . P R O F E S S O R E R E G . E T O R D .

A C A D . S C I E N T . U P S A L . H O L . P A R I S . P E T R O P O L . B E R O L .

B E R N E N S . L O N D I N . A N G L . I M P E R . E D I N B .

M O N S P E L . T O L O S . E T F L O R E N T .

M E M B R O .

P U B L I C O E X A M I N I S U B M I T T I T

## B O A S J O H A N S S O N ,

C A L M A R I E N S I S .

I N A U D I T . C A R O L . M A J . D . XXIII . J U N I I .

A N N I M D C C L X I I I .

H . A . M . S . 1763

U P S A L I A E .

Amoenitatis Academicae Vol VI No 121

b/392-415



REGERINGS · RÅDET  
Uti Surinam  
Samt  
ÖFVERST · LIEUTENANTEN,  
VÅLBORNE

HERR C A R L  
GUSTAF  
DAHLBERG,  
*HÖGGUNSTIGE HERRE.*

Charles Richmond

Jag har trott, att ej tydligare kunna å daga lågga den vördnad, med hvilken jag flere gånger, i närvarande afhandling tecknat Vålborne Herr Öfverste-Lieutenantens Namn, än om jag fatte

LC Card; 30-16765

QL  
463  
L75  
1763 SONHRB

satte Det til en prydnad för detta lilla arbetet.  
Såsom okänd af Vålbörne Herr Öfverste-Lieute-  
nanten, vågar jag mycket, men hoppas likväl att  
denna min driftighet, ej omildt antes, hvaremot  
det Åreminne, som Vålbörne Herr Öfverste-Lieuten-  
anten, genom sina förtiänster, åfven förvärfvat  
sig af Natural Historiens idkare, skal hos mig  
blifva så beständigt, som den förbindelse, med  
hvilken jag i diup vördnad framhårdar, att vara

VÅLBORNE  
HERR ÖFVERSTE-LIEUTENANTENS

*ödmjukafte tjänare*

BOAS JOHANSSON.

Lands CAMMERERAREN  
I Calmare Län,  
ÅDEL och HÖGAKTAD,

# HERR J O H A N JOHANSSON, MIN KÅRE FADER.

Så öfverflödande, som min kåre Faders hierta,  
altid varit af kärlek och omsorg för mitt väl,  
så uppfylt är ock mitt sinne, med vördnad och år-  
kiänsla. Min kåre Fader har i sielfva vårcket å da-  
ga lagt sitt öma sinnelag för min välfärd, men  
jag måste stanna i blotta önskan, att framdeles kun-  
na visa mig en så vårdande Faders sinnelag och  
hylest vårdig. Då jag upoffrar Eder, Min kåre  
Fader detta Academiska arbete, som på Eder bekost-  
nad utgifves, kan således aldrig vara min tanka,  
at härigenom afbörda någon del af min förbindelse  
emot Eder godbet; tvertom den fördubblas snarare,  
men gifver mig tillika angenämaste tilfälle, att göra  
Min kåra Faders godhet allmän, och at försäkra,  
det jag i ren nit, och ifriga böner, anropar Ållmagten,  
för en huld Faders, och om Moders långvariga och  
fälla lefnad, under det jag stådje lefver

MIN KÅRE FADERS

lydigste son  
BOAS JOHANSSON.  
OSI

LANDT-RÄNTEMÄSTAREN  
ÅDEL ocb HÖGAKTAD,

# HERR J O N A S WIDEMAN,

MIN HULDASTE MORBRODER.

Skulle årkånslan altid vara jämkad efter förtjästen,  
då vågade jag intet, med en så ringa veder-  
gålning bemöta all Eder mig visade godhet och  
ynnest. Några flycktiga diurs beskrifningar, fin-  
ner jag sielt, intet vara svarande, emot Eder be-  
ståndiga huldhet emot mig, och dock har jag in-  
tet bättre offer att frambåra. Uptag derföre Min  
Huldaste Morbroder denna min menlösa vördnad,  
såsom ett vedermåle af den tacksamhet, som inta-  
ger mitt hela sinne. Gör Himmelens min kårafa-  
ster Morbroders dagar många och fälla, då upfylles  
min önskan och min största fågnad; som intill mitt  
ytersta framhärdar, at vara

MIN HULDASTE MORBRODERS

*ödmjuka tjneare*  
BOAS JOHANSSON.

# САМОВІ ГАНІЧІУ

ЛІТОРАЛІЯ АРХІВУ НМІ

*Naturæ soleritatem, nulla ars, nulla manus,  
nemo Artifex consequi potest imitando. Cicero.*

МІНІСТРАЛІЯ МОДЕЛЮВАННЯ



## D. D.



cientiæ quævis, æque ac imperia, suas habent vicissitudines, quibus adolescunt, florent, decrescent, & deprimuntur. Illa scientiæ naturalis pars, quam, inde ab *Aristotele* ævo, liberalitati Alexandri Magni acceptam referimus, densis tenebris occultata fuit, & quamvis inclarescere diu magnoque moli-  
mine tentaverit, tantis tamen præpedita est obstaculis, quanta Astronomi dudum superarunt. Hi scilicet, stu-  
dio & arte, cœli contemplantes cursum, notitiam siderum, ut ut remotissimorum, sibi adquisiverunt solidam,  
& adquisitam optime disposuerunt; *Zoologi* vero con-  
queri de eo fatorum turbine coacti sunt, quod, anima-  
lium ante oculos, ne dicam pedes, quotidie sibi obver-  
santium cognitione omni ferme sint destituti.

Regnum, quod dicunt Animale, in sex commode  
satis dividitur provincias, quarum unam incolunt IN-  
SECTA, quibus in describendis, nostra nunc versabitur  
opera. Incolæ hujus provinciæ, mira quidem sunt ani-

A

malia,

imalia, Pedum numero, animalibus ceteris, quibus perfectiora sunt corpora, longe præstant; cuique enim sex saltēm, variis autem plures competunt peduscūli. Communi quidem fruuntur aura, quam tamen non ore, non capite, sed laterum quibusdam hauriunt spiraculis. Sensu, quem dicunt *Antennas*, organico gaudent, perspicaciam nostram prorsus eludente, quippe quo ipsi caremus. Sunt quidem instructa *Capite*, quod vero, si unquam, certe hoc singulare est, & mirandum, cerebro enim destituitur omni; etenim fibra medullaris, quamvis non prius, quam in ipso capite definat, ibi tamen in molem organizatam vix glomeratur. Hæcce denique, ad unum omnia, animalia, suis vestita offibus cataphracta & quasi loricata, mirifice incedunt. Proprietates hæc cuivis admirationem moverent maximam, nisi majori miraculo triplex esset forma, qua trinam quasi metamorphosin pleraque subeant; Hæcce varium habent statum, quo non observato, alter ab altero, dignosci vix potest. Hæc animantium turba, numerum, in arido sibi vindicat maximum, molem vero minimam constituit; at vero, ut multitudine, ita opere, ceteris longe antecellit.

Ab antiquissimis inde temporibus, hæcce volatilia fuere parvi aestimata; quin immo, noxia eadem, & nescio quid abdominandum, nemo non habuerit. In primo rerum initio, infesta non extitisse, atque sic non ordine naturæ solemini, sed generatione æquivoca produci, credula statuerat antiquitas, donec felix posteritas eos genuit viros, qui naturæ penetralia jugi studio petentes, cimelia eiusdem paulo sibi familiariora reddere occiperent. De infectis, nihil certi, perspicui saltēm nihil, nobis improvida & negligens reliquit vetustas; Licet fateamur, communi litterarum palingenesiæ initio, radios quosdam luminis affulgere scientiæ entomologicæ incepisse,

per

per paucos tamen justoque langvidiores, ita ut nostris  
deum temporibus in aprico posita videatur. Historia  
insectorum literaria, in tres adposite omnino distribui-  
tur EPOCHAS, quarum prima, agmen dicit seculi  
sui jubar *Conradus Gesnerus*, qui indefessa, quæ ejus  
erat naturam rimandi aviditas, omnes historiæ naturalis  
partes versavit. Dein *Moufettas* natione Anglus, in sce-  
nam prodiens artem insecta tractandi, profiteri paravit.  
Tum *Aldrevandus Italus*, in hac re, multum quidem su-  
davit, at nomine magis, quam omne. His denique  
*Zonstenius* successit, sed ea tantum, quæ priorum dili-  
gentia fuerat elucubrata, expilatum ivit.

Qui secunda Epocha res naturæ perscrutati sunt,  
felicius distinguisque in horum animalium cognitione  
procedere cœpti sunt; namque historiam illorum, ab  
ovo ipso ad ultimam senectutem perlustrarunt, vitam  
eorum, viatum, immo ipsam, quam mireris, metamor-  
phosin contuentes. Quid, quod exquisitus insecta ef-  
ficta & expista in ære imprimenda curarunt, & ea qui-  
dem arte, ut imagines agnoscere quivis facile posset.  
Huic peragendæ rei, omnium primi, summo inserviere  
opere *Hoeffnagelius* & *Goedartus*, viri pingendi arte cla-  
ri, quos *Lister* ingenio acutissimus, unacum *Blancar-  
do*, fecutus est, donec *Swammerdamius*, quo laboris pa-  
tientior non fuit alter, hanc rem publice tradendam sibi  
sumeret, in qua laboris multum, plurimum virium  
consumsit, ita quidem, ut sibi haud satis duxerit, for-  
mam Insectorum considerasse externam, sed anatomen  
eorum, ad miraculum usque subtilissimum fecutus fit.  
*Merianam* matronam, belle & festive omnino, curio-  
sam, ea tantum, quæ alit Europa, insecta pervestigasse  
haud contentam, tantus ejusmodi deliciarum permulxit  
atque allexit amor, ut, trans mare infestissimum, Surinamum  
usque Americæ, se insectis delectandi gratia

iter iniverit. *Rajus* mire sedulus in descriptiones infectorum componendas, ultimum lenocinatis tempus impedit. Quæ habitent in Anglia, infectorum examina, *Albinus* affabre delineavit. *Frischius* denique, quam Gerinania habeat infectorum copiam, enodatus expofuit.

EPOCHA tertia hanc scientiam, longe abundantiori aurit luce, Nob. Dom. PRÆSES entomologicam diciplinam, in formam systematis redegit, insectis in ordinis naturales dispositis, eorumdemque generibus rite constitutis, quæ, pro sua perspicacia, dilucidis & determinatis, adumbravit characteribus; adeo ut, e tenebris quasi evocata, in lucem pleniori processerint gradu. Eadem vero tempore, in hujus disciplinae laudem & dignitatem, nova effulxit lux, insigne puta Galliæ Decus *Pleumur*, qui hanc doctrinam, a primis principiis & statutis repetens, quodvis infectorum, ab ovo inde, ad sepulcrum usque sequendo, intentiorique oculorum acie, formam, anatomiam, vitam, viatum, & mores eorum perlustrando, immortalitati dudum commendavit nomen. Hunc, Aulæ Mareschallus Dom. *De Geer*, ténore uno, eademque perspicacia, continuavit laborem. Paulo aliquanto post, *Roesel* Germanus, & laboris & honoris, se præbuit æmulum, æmulis vero palmarum præripuit figuris vivido prorsus colore efformatis, id effecit, ut hæc, cuivis grata acceptaque, fuerit scientia. In hoc deinceps opere, *Wilkes* Anglus, suum consumsit laborem, multa vero a *Roesel* mutuatus. *L'Amiral Hollandus*, infectorum figuræ egregiæ & miræ pulchritudinis, omni diligentia nunc edendas perulgandasque curat. Præter Araneas Ivecicas Phalænas novas formosissimis figuris ornatas, in lucem edidit Nostras *Clerk*, cujus vero opere novissimo, de Papilionibus Indicis, a Museo Ser. Reginæ mutuatis, vivido colore illustra-

Iustratis, quidquam pretiosius, vel sp<sup>l</sup>endidius, an quisquam viderit, merito ambigitur. Scilicet ibi quasi coram intuearis Papiliones, & qua formam, & qua numerum, insignes, ea abundantes venustate, qua le<sup>ll</sup>issimis longe antecellant flosculis. Quare nihil esset optabilius, quam ut hoc typis divulgaretur opus, cuius quidem pauca admodum exemplaria sunt impressa. Physici, postquam moram, quam objectorum naturalium fecerat multitudo, beneficio disciplinæ systematicæ, concinne & perite constitutæ, tollere incepissent; si interius mox penetrarent & pressius inquirerent in naturæ œconomiam & politiam, operæ pretium se facturos judicarunt; sic enim uberrimam nobis dari occasionem, singularem Summi Artificis, considerandi admirandique œconomiam, & quod ad præsentem usque diem fere fuisse umbratile, luce palam, intuendi, quomodo infecta animalium minima, quorum officiis remotis, naturæ œconomia torperet, maxima onera laboris sustineant. Fa veritas, qua asseritur, Deum nihil frustra produxisse, sed, quæcunque creaverit, valde fuisse bona, tam oculos, quam animos naturam intuentium abunde satis pavit. Quamvis enim infecta nostræ œconomiae s<sup>p</sup>epius officere putemus, eam tamen posthabendam esse œconomiae totius universæ, nulli dubitamus. Quemadmodum præterea, medicinam facturos, constitutionem hominis valentis, & naturam corporis, prius cognovisse, haud mediocriter juvabit, ita, si œconomia privatæ ab universali quodammodo turbatae & afflita<sup>e</sup> succurrere velimus, e re certe nobis erit, prius intellexisse, unde & a quo fonte incomoda exudent; quem ad recludendum, perferam admittimus, nisi hanc disciplinam diligentius colamus, ea notantes infecta, quæ œconomiae nostræ maxime noceant. Quod dum agitur, eveniet simul, ut stupenda naturæ miracula, ad debitam venerationem

tionem piamque admirationem Summi Conditoris, totos nos convertant & rapiant.

Nostra, quæ jam agitur, ætas, tantum in cognoscendis insectis profecit, ut töt sibi habeat insectorum millia perspecta, quot orbis litteratus, ante dimidium circiter seculum, pernosceret centurias. Hæc animalcula adeo ordinate sunt disposita, nominibus genericis, characteribus, differentiis specificis, synonymis denique, in systemate, Naturæ Nob. Dom. Præsidis, editione decima, adeo distincta atque ornata, ut, haud multo post plantis ipsis, nihil, parum certe, cedant, & multitudine, & ordine, quem Botanici haud pauci diu multum & multo labore quæsiverunt. Ante dimidium, & quod excurrit, seculi spatium, viri scientia Botanica, alioquin clarissimi, alto, quod ajunt, supercilio, minimos despicerunt muscos, qui tanto dudum pretio invaluerunt, & aestimatione, ut celeberrimus quisque Botanicus, novum detegere potuisse, insigni sibi honori ducat. Greges insectorum veteribus tanto fuerunt fastidio, quantæ emulationi recentioribus, nova quævis indagandi insecta. Nostris temporibus, quodlibet Europæ regnum, multis, magnique nominis Physicis gloriatur & superbit, qui omnem operam, studium omne, novis copiis scribendis, & insectorum exercitui jungendis, navant. *Scopoli Fauna Carniolica*, una cum *Göiani Fauna Monspeliensi*, quarum utraque quodvis novi & inauditæ nobis promittit, communiter & avide exspectatur. Acta Eruditorum, rebus in hac disciplina, nuper inuentis, passim nitent.

Ad hanc Academiam, in litterarum studiis dum versor, duas, præ ceteris addiscendis, cura & attentione, qua possim, disciplinas proponi exaudio, medicinam scilicet, & Historiam Naturalem. Hujus particula, de Insectis, illis juxta, quæ nondum fuere divulgata, accuratius

ratus notatis, oblectamentum mihi attulit maxime insigne, quod Nob. Dom. Præses, mirifice adauxit, miseret multas, & eas quidem rarissimas, demonstrando insectorum species, quas, Domino Doctori *Garden*, in provincia CAROLINA, habitanti, nec non Domino Protribuno militum *Dahlberg*, SURINAMO, reduci, Domino *Noordgren*, in insula JAVA habitanti, ceteris, acceptas refert; ut taceam rarissima plurima insecta e PENNSYLVANIA Americes septentrionalis missa ad Museum Nobil. *de Geer*. His naturæ deliciis blandius invitatus, petivi, mihi ut concedetur optio, unicam eligendi centuriam, quam ad obrusam determinatam, perattento litterarum orbi, proponerem, ut, Tirocinium Academicum editurus, hanc simul disciplinam, aliquantulum augerem atque ornarem. Cujus voti spes me eo melior tenet, quo certius constat, centuriam insectorum riariorum, quam Dominus *Jac Uddman*, eleganter elaboratam, Åboæ, sub Præsidio D. D. *Leche*, edidit, omnibus in amore atque in deliciis fuisse habitem. Verum enimvero, haec dum molior, fatendum est, me, & temporis & chartæ angustiis, adeo fuisse præpeditum, ut descriptionem tam prolixam, tam ornatam, tam denique perspicuam, quam optasse, confidere haud potuerim. Mihi vero, quod habet verbum, prora & pupis ea fuit, ut haecce nova a notioribus, rite distinguerem, & distincta ab oblivione atque a silentio hominum vindicarem. Itaque Tibi, Benevole Lector, centum species Insectorum, Indorum & exoticorum, oftero, quarum complures dignissimæ sunt, quæ ante oculos argutiores ponantur. Evidem vix credo, quod absque admiratione maxima quisquam visurus sit Cassidam spinificem, Cassidam bicornem, Crysomelam gibbosam, Gryllem brachypterum, Gryllem perispicillatum, Cimicem ciliatam, Tripliem paradoxam, & Papilio nem ecclipsin.

COLOE-

## COLEOPTERA

1. SCARABÆUS *Tityus* thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo.

*Habitat in Pennsylvania. De Geer.*

*Similis Scarab. Herculi, totus levius, glaucus, magnitudine Scarab. nasicornis. Thoracis cornu maximum, absque dentibus lateralibus, simplicissimum, sed subitus pubescens. Capitis cornu ascendens, et jam simplicissimum.*

2. SCARABÆUS *Molosus* thorace bicorni, capitis clypeo integerissimo: cornu erecto, elytris levibus.

*Habitat in China.*

*Femina: magnitudo Scarab. Rhinocerotis, ater. Clypeus capitis lunatus, integerissimus, margine elevato & stria elevata laterali utrinque. Cornu in medio clypei erecto. Thorax levius, retusus, antice glaber: cornu sive dens versus latera antrorsum ascendens, paulo brevior cornu capitis. Elytra non striata.*

*Similis Scarab. Lunari, sed major; nec clypeus emarginatus; nec thorax supra linea exaratus; nec elytra striata.*

3. SCARABÆUS *surinamus* muticus niger, thoracis incisurarumque marginibus flavis, sterno porrecto.

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo Scarab. Stercorarii; totus levius, niger. Caput ovatum, linea longitudinali flava. Thorax levius marginibus lateralibus flavis. Scutellum mediocre. Sternum antrorsum prominens, flavidum. Elytra levia. Abdominis segmenta nigra, margine flava; ultimum supra maculis IV, subtus vero tribus flavis. Pedes nigri. Femora lutea, nigro varia. Digihi incurvati.*

4. SCARABÆUS *capreolus* maxillolas: maxillis exsertis apice tantum furcatis.

*Habitat in America septentrionali.*

*Simillimus Scarab. Cervo capite depresso truncato, sed maxillæ absque dente lateral. Pedes rufi sunt.*

5.DER-

5. DERMESTES *Gleditsiae* subtomentosus piceus, antennis filiformibus, elytris striatis, femoribus posticis gibbosis.

*Habitat in seminibus Gleditsiae Americes.*

Facies Derm. *Pisorum*, sed duplo maior. Femora postica valde crassa, non tamen vidi saltantem; sunt haec mutica, nec dentata ut *Der. Pisorum*.

6. DERMESTES *batrvis*, obsolete tomentosus subincanus, antennis filiformibus, elytris laeviusculis, femoribus posticis gibbosis. *Jacq. hist. t. 170.*

*Habitat in semine Batrvis Americes.*

*Simillimus Derm. Gleditsiae*, sed Elytra vix manifesta striata. Color totus glauco subincamus. Thorax absque punctis excavatis; ceterum simillimus. Femora colore corporis, nec ferruginea.

7. CASSIDA *spinifex* ferruginea, elytris angulo antico spina porrecta.

*Habitat Surinami Dahlberg.*

Corpus fere triangulare, ferrugineum. Thorax longitudine capitis, antice attenuatus, angulis, posticis in spinam transversam produetis. Elytra levia, antice ad suturam angulata: angulis lateralibusque exseritis in spinum antrosum porrectam, longitudine thoracis. Latera elytrorum utrinque foramine ovato pervia in femina; in mare vero elytra nec spina, nec foramine gaudent.

8. CASSIDA *bipustulata* viridis, elytris maculis lateribus duabus sanguineis.

*Habitat Surinami Dahlberg.*

*Corpus supra viride, subtus nigrum.*

Thorax parum emarginatus. Elytrorum margo lateralis maculis duabus sanguineis, et jam in pagina inferiori cærulea conspicuis.

9. CASSIDA *bicornis* cyanea, elytris angulo antico spina truncata.

*Habitat Surinami Dabberg.*

*Major; tota cyanea. Elytra excavato-punctata angulo exteriore sive antico in spinam linearem truncatam producto. Thorax antice emarginatus.*

10. *CASSIDA leucophaea testacea margine punctis-que flavis.*

*Habitat Surinami.*

*Minuta & reliquis nostratis minor. Margo clypeum thoracem & elytra cingens, totus flavus. Discus elytrorum thoracisque testaceus sive staphyleus: punctis majusculis plurimis, luteis, elevatis. Elytra etiam punctis excavatis, vix conspicuis striata.*

11. *COCCINELLA sangvinea elytris sangvineis im-  
maculatis, thorace maculis nigris.*

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo ut minoribus nostratis. Thorax niger, marginibus pallidis. Punctum pallidum utrinque versus latera thoracis. Elytra verissime sangvinea. Pectus, abdomen, pedes atri.*

12. *COCCINELLA Surinamensis coleoptris rubris  
immaculatis, thorace capiteque nigris.*

*Habitat Surinami.*

*Magnitudo Coccii: 7 punctata. Caput, Thorax Scutellum, pectus, Pedes nigra. Elytra & Abdomen rubra. Caput minus quam in Europaeis.*

13. *CHRYSOMELA gibbosa ovata nigra, elytris  
testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigra.*

*Habitat Surinami.*

*Corpus magnum. Coleoptra medio versus futuram valde gibbosa.*

14. *CHRYSOMELA undulata ovata rufa, elytris  
fasciis tribus atro cæruleis undulatis.*

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Chr. Tanaceti: Thorax rufus, medio a-  
tro-*

*tro-cæruleus.* Elytra rufa: fascia prima latiori undata ad futuram antrosum porrecta; secunda angustior, magis undulata; tertia in apice ad futuram coiens cum secunda. Antennæ, Pedes & antica Abdominis atro-cærulea.

15. CHRYSOMELA castanea ovalis castanea, elytris margine exteriore testaceo.

*Habitat* Surinami.

*Media Thorax linea longitudinali & margine exteriore, uti etiam elytra, testacea.*

16. CHRYSOMELA Gorteræ subcylindrica atra glaberrima, thorace elytrisque punctis IV flavescentibus.

*Habitat ad Cap. Bo. spei in Krameria.*

Magnitudo & statura Chrys. tota atra, glabra. Thorax vero nitidus. Elytra vix manifesta striato-punctata, puncta flavescentia IV in singulis majuscula. Quorum II remota versus futuram interiorem: altero ad basin, altero remoto ab apice; Tertio ad marginem exteriorem versus basin, reniformi, quarto ad apicem elytri.

Thorax glaberrimus, nitidus: punctum ovatum ad singulum latus; tertium ad basin, rotundum quartum ad scutellum, oblongum minus, magis fulvum. Capitis frons puncto rotundo. Omnes maculæ luteæ; Pedes nigri & Antennæ corpore breviores.

17. CHRYSOMELA ostopunctata oblongiuscula nigra, thorace testaceo, elytris punctis quatuor flavis.

*Habitat* Surinami Dablberg.

*Media.* Elytrorum maculæ quatuor, quorum I. parva; II. III. parvæ, pares; IV major, ad apicem. Abdomen testaceum.

18. CHRYSOMELA punctatissima oblongiuscula viridi ænea punctatissima, pedibus ferrugineis.

*Habitat* Surinami.

*Magnitudo Cimicis, sericea, viride-ænea, punctis quasi atomis minimis confertis adspersa.*

19. CURCULIO *Oryzae* longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.

*Habitat in Oryzae seminibus ab exteris regionibus allatis.*

Magnitudo grani oryzæ, totus niger sive piceo-niger, punctis cavis scaber, oblongus subtus picous est. Elytra striata, in singulis macule due ferrugineæ, quarum prior ad basin clytri, posterior ante apicem elytri.

20. CURCULIO *surinamensis* longirostris cyaneus, elytrorum lateribus antice gibbis.

*Habitat Surinami.*

Magnitudo Pisi. Elytra postica contractiora.

21. CANTHARIS bicolor rubra, elytris postice violaceis.

*Habitat in Senegal.*

Statura omnino *Cantharidis rubræ*, sed dimidia Elytrorum pars postica violacea nitidissima. Antennæ nigrae sunt.

22. CICINDELA æquinoctialis flava elytris fasciis duabus nigris latis.

*Habitat Surinami.*

Media. Totum corpus flavum. Oculi nigri, minus prominuli. Thorax longitudinali linea excavata. Elytra obtusissima, singula striis decem elevatis acutis; Fasciæ duæ totam fere alam tegentes, undatæ.

23. CICINDELA *carolina* cyanea nitida, elytrorum apicibus antennis pedibusque flavis.

*Habitat in Carolina Garden.*

Corpus magnitudini Cicind. campestris, viridi-cæruleum, æneo-nitens; at os, oculi, antennæ, palpi, pedes toti & elytrorum apices flava. Elytrorum apices flavi macula sublunata laterali.

24. ELATER ligneus ferrugineus, elytris mucronatis.

*Habi-*

P. 13

*Habitat Surinami Dablberg.*

*Corpus fere majus nostratis, colore subferrugineo & fere ligneo. Antennæ vix thorace longiores, nigrae, excepto primo articulo. Thorax oblongus admodum, medio longitudinaliter glabro. Elytra substriata, quasi costa distincta longitudinali pallidiore, & margine laterali simili; apices elytrorum pallidiores valde mucronati.*

25. *MELOE Chrysomeloides.**Habitat Surinami.*

*Corpus chrysomelæ, totum viridi-cæruleuscens, subtus nigro-subviolaceum. Antennæ nigrae. Palmæ nigrae.*

26. *TENEBRIÖ Gigas* alatus ater elytris striatis thorace lævi.*Habitat Surinami.*

*Magnitudo Scar. Cervi. Thorax marginatus, non nitens. Elytra obtusa, striata satis profunde. Antennæ clavatae, longitudine thoracis.*

## HEMIPTERA.

27. *GRYLLUS unicornis* M. thorace lævi, elytris viridibus alis apice striatis, vertice subulato, antennis pectinatis.*Habitat in China.*

*Magnitudo & statura G. M. Religiosi vertex capitis in spinam antice capite longiorem præminens, Antennæ longitudine thoracis, utrinque pectinate. Thorax linearis, lævis, fere triqueter. Elytra viridia, oblique venis striata. Alæ, versuscentes, elytris paulo longiores apice fusco striato. Abdomen plicatum. Tibiæ antice dilatatae, spinulis ciliatae, majoribus spinis interstinctæ. Palmæ bis ciliato spinulosa. Tibiæ 2:di 3:ii paris sub apice lacinulæ habent.*

28. *GRYL LUS* M. *carolinus* thorace subciliato subcarinato, elytris albidis fusco-nebulosis.*Habitat in Carolina.*

*Statura G. M. religiosi. Thorax oblongus, fere tri-*

queter lateribus scabris. Elytra alaque abbreviatæ, albido fuscoque nebulosa. Pedes antice subtus dupliciter spinoso-ciliati.

1311  
29. GRYLLUS M. irroratus thorace lævi subcarinato, elytris viridibus punctis ferrugineis vagis.

*Habitat in Carolina.*

Similis *G. M. religiosi*, sed elytra ♂ Alæ abdomine breviora, 3. s. 4. punctis ferrugineis absque ordine digestis, apicibus flavescens. Femora & Tibiæ antice a latere postico dupliciter spinoso-ciliata.

30. GRYLLUS Lunus T. thoracis segmento posteriore crista semiorbiculata elytris nigris fasciis albis.

*Habitat Surinami Dablberg.*

Major. Caput ferrugineum. Thorax ferrugineus segmento postico carinato Christa compressa, valde elevata, semiorbiculari. Antennæ flavæ. Pedes lutescentes, læves. Elytra nigra, albo obscure reticulata fasciis plurimis albis inæqualibus. Alæ nigræ.

31. GRYLLUS Cinerarius T. antennis longissimis, elytris deflexis.

*Habitat in Brasilia De Geer.*

Antennæ longissimæ. Thorax cinerascens postice lobo rotundato. Elytra lateralia, deflexa paginis verticalibus: Costa recta venis marginalibus; margine superiore dimidiato ovato: inferiore lanceolato. Pedes cinerascentes.

32. GRYLLUS brachypterus M. elytris ovatis angulatis brevissimis, alis longitudine abdominis.

*Habitat Surinami.*

Corpus fuso fuliginosum. Caput supra obscure ferrugineum. Thorax subelongatus, supra scaber, brevior quam in reliquis *Mantis* speciebus. Elytra brevissima omnium, ovata, obtusa, angulo humerali exstantia, supra cinerea, sub angulo ad latera nigra. Alæ obscure nebulosæ, convolutæ & plicatæ, longæ. Notabilis elytris brevissimis.

33. GRYLLUS *javanus* T. *cinerea*, Elytris fuscō maculatis.

*Habitat in Java.*

Antennæ corpore paulo breviores. Thorax compressus, dorso planus, postice rotundatus, lateribus fuscescens. Abdomen ovatum. Alæ cinereæ ut totum corpus, superiores maculis aliquot lunatis, longitudinaliter digestis, aliisque paucis fuscis. Ensis abdomine fere brevior.

34. GRYLLUS *perspicillatus* Alarum rudimentis ocello atro oculis aureis.

*Habitat in Indiis De Ger.*

Antennæ filiformes, corpore breviores. Corpus subtestaceum. Alarum elytrorumque loco laminula ovata; minima ocello orbiculari atro. Utrum alas acquirit ac larva sit ignoro; & facie perfecta esse videtur.

35. GRYLLUS *spinulosus* L. thorace spinis munito cincto, corpore aptero.

Edw. av. 2. p. 161. t. 285. f. 3, 4, 5. *Habitat in Indiis.* Gryllos inter maximos numerandus. Antennæ filiformes, longitudine fere corporis. Thorax testaceus, spinis numerosis muricatus & postice margine spinoso cinctus. Abdomen supra nigrum maculis testaceis tessellatum. Alæ nullæ.

36. GRYLLUS *succinctus* L. *cinereus*, thoracis carina marginaque postico elytrorumque margine dorsali flavis.

*Habitat in Java.*

*An Gryllus Elephas bujus larva?*

Carina Thoracis partim elevata tribus incisuris notabilis linea sulphurea a vertice ab caudam & transversa per marginem posticum thoracis.

37. GRYLLUS *brevicornis* A. *viridis*, capite prominuto, antennis compressis longitudine thoracis.

*Habitat in America septentrionali De Geer.*

*Similis Europæis, sed antennæ longitudine tantum thora-*

*thoracis, compressæ. Caput antice subconicum, sed vix manifeste.*

38. *GRYLLUS convolutus* A. thorace rotundato, corpore nigro nebuloso, elytris convolutis albidis.

*Habitat Surinami.*

*Simillimus Grylio campestris, sed triplo minor. Elytra convoluta simul, ut tere subulata. Cauda setis duabus.*

39. *CICADA flammæa* fronte rostrata adscendente tereti truncata.

*Habitat - - - De Geer.*

*Minor Ci. Candelaria, tota superius ferdide ferrugineo cineroscens. Elytra ad apices a pagina superiore punctis obsecurioribus: tota vero striæ oblique secant, ut in serpentum cule.*

40. *CICADA truncata* iridi-albicans, alis deflexis compressis, postice truncatis.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Perlæ. Tota viridi albicans, alis deflexis valle compressis, reticulato striatis, postice transverse truncatis.*

41. *CIMEX ictericus* ovatus, supra incarnatus subitus flavus, thorace acute spinoso.

*Habitat in Carolina.*

*Medius. Caput, thorax Elytra incarnata. Caput prominens. Thorax argute utrinque spinosus. Oculi nigri, minutissimi.*

*Elytra subtus sanguinea. Alæ hyalinæ, totus subtus & Pedes flavi.*

42. *CIMEX cristatus*, rostro arcuato, antennis setaceis fusco ferrugineis, scutello cristato.

*Habitat in Carolina Garden.*

*Major ullo Europæo. Antennæ rubræ, setæceæ, longitudinalis corporis. Caput minimum, collo angusto; Rostrum incurvato. Thorax rotundatus utrinque ante spinula prominens. Scutellum thorace triplo magis, nigrum, carinatum Crista elevata, obo-dentata; apice bidentatum; lateribus angula-*

*gulatum.* Elytra ferruginea. Tibiae rufæ. Abdomen dilatatum; sub aro puncta aliquot coccineæ, forte sexus nota.

43. CIMEX scaber oblongiasculus testaceus, thorace anguato spinoso, femoribus denticulatis, alis nigris.

*Habitat in Java.*

*Corpus tunc testaceum, scabrum. Alæ membranaceæ, nigrae. Antennæ corpore paulo breviores, IV articulis. Thorax utrinque angulo recto subspinosis, & spinis bis elevatus. Femora omnia apice spinis instruta vix manifestis. Femora 1, 1, & 3, 3, subtus denticulata tribus denticulis.*

44. CIMEX luccinetus oblongus thoracis e'ytrorumque margine exteriore femorumque basi sanguineis.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

45. CIMEX haemorrhous oblongus niger, thorace spinoso, abdome rufo, elytris testaceis punctis linearibus quinque nigris.

*Habitat in America. De Geer.*

*Totus niger excepto abdome rufo. Elytra testacea punctis sive lineolis duabus & tribus nigris.*

46. CIMEX nobilis leutatus viridi-auratus nigromaculatus.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo Aris Bombylii; ovatus. Caput viridiæneum. Thorax viridi-æneus maculis 7 fusco-cærulescentibus. Scutellum viridi-æneum, tegens totum dorsum maculis trium parium cæruleis. Corpus subtus rufo-æneum. Abdominis segmenta singula subtus utrinque maculis duabus cæruleis. Antennæ fusco-æneum, corpore breviores. Femora omnia sanguinea. Tibiae cæruleæ. Alæ fuscescentes: superiores costa marginali viridi-ænea.*

47. COCCUS cupensis. ovalis subtomentosus conico-gibbus apice operculato.

*Habitat ad Cap. B. spei in ramis Gnaphalii muricati.*

*Similius Cocco Aonidum, a quo differt quod non minus*

*nus orbiculatus*, sed magis ovalis. 2:0 dorso magis gibbo & fere conico. 3:0 superficie non glabra nitida, sed subtomentosa. Apex abdominis operculo nudo tectus; dum, operculum discedit foramen tomento repletur.

48. TRIPS paradoxa fusca, elytris abbreviatis, antennis pectinatis fissilibus aiformibus.

*Habitat in China Osbeck.*

*Magnitudo minoris Culicis. Tota fusca. Alæ fuscæ, latiusculæ, Elytra lanceolata dimidio breviora. Antennæ longitudine thoracis, obtusissime, fuscæ, basi albide, fuisse in 8 vel 9 partes membranaceas. Dubius generis & singulare insectum.*

#### LEPIDOPTERA.

49. PAPILIO *Aegisthus* E. T. alis fuscis viridescente maculatus; subtus subincarnatus maculis virescentibus rarioribus.

*Habitat in China.*

*Magnitudo Pap. Apollinis. Alæ omnes supra nigricantes maculis numerosis luteo-virescentibus, quarum propiores magis longitudinales ad ductum corporis. Subtas omnes subincarnatae, maculis rarioribus, minoribus, virescentibus, quarum una alterave in alis posticis subocellata centro nigro. Similis Agamemnoni.*

50. PAPILIO *Polydorus* E. T. alis subcaudatis nigris concoloribus; posticis macula alba suturis sexfida lunulisque septem rubris.

*Clerk: t. 33. f. 2.*

*Habitat in India.*

*Media. Alæ omnes nigrae. Posticæ concolores, vix caudatae, sed potius angulatae, margine lunulis septem nigris, subtus saturatioribus; in media macula alba suturis nigris distincta in maculas sex, quarum anterior major bifida. Thoracis latera & abdominis incisuræ ferru inæ. Differt a P. Polyte, quod margo alarum careat interstitiis albis; quod macu-*

*macula alba anterior reliquis major; quod corpus sanguinolentum; quod lunulae posticæ fere reniformes, nec angusto lunares.*

51. PAPILIO *Orontes* E. G. alis caudatis nigris albido-virescente fasciatis, caudis albis.

Clerk t. 26-f. 1.

*Melius in bac genere. Alæ superiores integerrimæ: supra nigre fasciis duabus, virescentibus, interiore dilutiore latior. Subtas nigrae fasciis tribus, albido-virescentibus, latioribus, bascos maxima. Posticæ valde dentatæ & breviores, caultate: supra fascia lata dilute virescente maculaque inter singulum dentem dilute virescente. Subtus dilute virescentes fasciis duabus saturate virescentibus præter puncta aliqua virescentia ante fascias; caudæ albide, obtusa, valde distantes. Abdomen subtus luteum.*

52. PAPILIO *Phidippus* E. G. alis subcaudatis fuscis, subtus fasciis albidis, ocellis duabus caudaque ocellis geminis.

*Habitat in Java.*

*Magnitudo 2. Antennæ filiformes, ferrugineæ. Alæ omnes supra fusce, immaculatæ, versus marginem exteriorem obsoletiores; subtus omnes grisecentes, fasciis transversis, albidis grisecentes, postice fasciis transversis albidis. Posticæ subtus ocellis duobus: uno ad angulum exteriorem: altero versus anulum posticum. angulus posticus apice fere in caudam obtusam definit, in qua ocelli duo, parvi, approximati, cærulei.*

53. PAPILIO *Medon* E. G. alis supra nigris: primoribus fascia lutea apiceque albo, posticis disco cærulecentibus. M. R.

Clerk t. 28. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

*Magnitudo 2. f. 3. Alæ primores supra atræ, apice alba: fascia lutea. Posticæ nigre, supra disco cærulecentes. Subtus omnes alæ cinerascentes, punctis tribus nigris ad ba-*

*fm.* Primores fascia dividata alba, apiceque allæ. Posticæ fascia dividata e lunulis 5 albis & alia posteriore e maculis 6 subfuscis.

54. PAPILIO *Muerre* H. alis oblongis integerimis nigris basi fulvis: primoribus fascia maculisque tribus flavis.  
*Habitat in China.*

Alæ primores nigrae, cencolores basi fulva maculis nigris; in Medio fascia flava; ante epicem funda 3 f. v.; Margo tenuior niger est. Inferiores alæ supra nigra linea fulva a basi fere ad apicem excurrente. Subtus nigra, entice flava nigro maculata, margine postico tenuissime albo punctata.

55. PAPILIO *Aëdea*, H. alis oblongis integerimis albo maculatis: superioribus virescentibus; inferioribus fascia flava.

*Clerk t. 4. f. 2.*

*Habitat in India. M. R.*

Thorax cærulescens. Abdomen flavescentes. Alæ superiores supra virescentes fasciis trilobis ex maculis albis stratis inæqualibus. Subtus medio cærulescentes, albo maculata, fascia flava. Inferiores cencolores nigro-cærulescentes maculis circiter 5 albis & lata fascia flava in medio.

56. PAPILIO *Melite* H. aliis flavis: superioribus supra nigris, lineis duabus fasciaque flavis.

*Clerk t. 44. f. 5.*

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo fere P. Urticæ. Alæ primores supra nigræ: Maculae due, oblongæ ad basin, quarum anterior lanceolata; posterior marginis interioris; fascia in medio alæ flava, que marginem interiorem non tangit. Subtus alæ marginæ antico flavo. Posticæ supra flavae margine postico nigro.. Subtus flavae strigis duabus, fusca, obsoletis.

57. PAPILIO *Schla* D. aliis flavis: primoribus supra albis margine nigris, posticis margine nigro-punctatis.

*India.*

*Habitat in Java.*

*Media: Alæ primores supra albo, margine exteriore nigro; subtus flavæ, fusco irroratæ & postice fusco ocellariæ in medio. Posticæ supra flavæ, margine postice punctis 5 nigris. Subtus flavæ fusco irroratæ margine postico punctis 7 nigris, scilicet in alterna costa unico. Pedes flavæ, Oculi brunei.*

58. PAPILIO *Polybe* D. alis integerrimis: posticis dentatis: supra fusco virentibus, subtus viridi sericeis venis atris.

*Habitat.*

*Alæ primores supra fusco-virescentes, sericeæ; in medio anteriore macula gemina urata nigra. Subtus parte demidata viridi-sericeæ venis nigricantibus; occultata vero cœruleo sericeæ: Posticæ supra disco virescentes, sericeæ; subtus virides sericeæ venis atris ramosis; margo interior carneus & postice lobatus dentibusque cœruleis; maculis nigris. Abdomen subtus luteum. Antennæ nigre, elevate.*

59. PAPILIO *Philea* D. alis integerrimis angulatis flavis; primoribus macula; posticis limbo luteis.

Roes. in: 4. t. 3. f. 5.

*Habitat in Indiis.*

60. PAPILIO *Philemela* D. F. alis integerrimis fuscis; primoribus ocello unico, posticis ter duabus.

*Habitat in Java.*

*Similimus Pap. Hyperanto, sed triplo minor, s. Argi magnitudine. Alæ integerrimæ, concolores: supra fusceæ; subtus nebulosæ, strigis transversis vix mirabiliter. Primores utrinque oceæ majore ad angulum exterrim. Posticæ vero ocellis sex sive potius ter duabus et us marginem posticæ, quærum duo ultimi minutissimi; sed bi omnes in pagina superiore minus evidentes.*

61. PAPILIO *Eletto* D. alis integerrimis rotundatis luteis margini nigri; posticis subtus ocello sesqui-altero albo. Post. 72.

Pet. gaz. t. 9. f. u.

*Habitat.*

*Habitat ad Cap. B. spei.*

*Magnitudo media.* Alæ primores supra saturate luteæ puncto nigro in disco, & margine postico latissime nigro. Subtus flavæ puncto nigro; limbo postico virescenti-luteo, cum maculis tribus nigris trigonis: secundariae supra luteæ, limbo postico nigro. Subtus luteæ puncto in medio albo & adjecto minore, margine ferrugineo cinctis. Limbus posticus virescens. Anteanae & Pedes sanguinei.

62. PAPILIO *Helcita* D. alis integerrimis concoloribus luteis limbo nigro punctis septem albis.

Clerk t. 39. f. 4.

*Habitat in Indiis M. R. V.*

*Magnitudo Pap. Cardamines.* Alæ luteæ, sed extiore ambitu nigrificantes, que nigredo undulatim distinguuntur suo margine a disco luteo, in singulæ alæ limbo nigro puncta majora circiter septem albæ sunt: sed in primoribus fere confluant. Corpus supra nigrum dorso punctis albis; subtus luteum thorace punctis albis.

63. PAPILIO *Idea* D. alis integerrimis rotundatis albis venis maculisque nigris: primoribus margine nigro albo punctato.

Clerk t. 38. f. 1.

*Habitat in Indiis: M. R.*

*Major reliquis omnibus Danais.* Alæ albæ venis lati nigris anastomosantibus. Anteriores alæ exterius late margine nigro, in quo series ex punctis albis; ad anum 2. quasi palpi flavi.

64. PAPILIO *Strilidore* D. alis integerrimis nigris: primoribus albo maculatis; posticiis basis subtusque albis.

*Habitat in Philadelphia. De Geer.*

*Magnitudo media.* Alæ primores macula alba transversa in medio versus apicem. Alia ad marginem tenuiora. Puncta alba 2. ad apicem; 2. fere in medio; non nulla

nullæ ad marginem tenuiorem. Posticæ macula alba magna versus basin; at omnes subtus albæ venis nigris. Thorax albo punctatus.

65. PAPILIO *Eurydice* D. alis fuscis; subtus primoribus ocellis quatuor, posticis sex.

*Habitat in Philadelphia. De Geer.*

Similis *Pap. Hyperante*. Alæ integrimæ, supra fuscæ; posticæ obsoletius ocelatæ. Primores subtus ad marginem posteriorem ocellis quatuor nigris pupilla alba. Posticæ ocellis quinque intra marginem posticum & sexto remotori.

66. PAPILIO *Demophile* D. alis albidis fasciis duabus margineque fuscis; posticis subtus subincarnatis.

*Clerk t. 28. f. 4.*

*Habitat in Indiis.*

Statura *Pap. Brassicæ*. Alæ integræ vel parum repandæ. Superiores supra fasciis duabus albis, utroque apice attenuatis. Subtus pallidiores, fuscæ faciis duabus albo virulentibus, interiore lata. Posticæ supra fuscæ disco albo inæquali. Subtus subincarnatæ angulo antico croceo.

67. PAPILIO *ecclipsis* D. alis integrimis angulatis flavis primoribus punctis duobus maculaque nigris, posticis ocello cœruleo.

*Pet. gazi. 16. t. 10. f. 6. bona.*

*Habitat in America Septentrionali De Geer.*

Facies exactissime *Papil Rhamni*. Sed alæ primores in medio macula oblonga fuscæ, intra quam 2. puncta nigra. Posticæ puncto nigro & ad marginem exteriorem ocellus cœruleus.

68. PAPILIO *Canace* N. alis angulatis supra cœruleis fascia dilutiori; subtus luteo virideque marmoratis.

Statura *Pap. Atalantæ*. Alæ supra fuscocœruleæ, dentatae, angulatae fascia communi cyanea, sive dilute cœrulea: primo-

primores fasciæ bac interrupti & pone apicem purum albo; subtus marmoratae luteo viridescente nebuloso. In medio omissum subtus purum angulatum luteum.

69. PAPILIO *Hypermenstra* N. alis nigrantibus; subtus ferrugineo nebulosissimis; Posticæ postice ferrugineis puncto albo.

*Habitat in Java.*

M dia. Alæ obsolete dentatae, supra nigrae. Sed postice limbo postico ferrugineo. Subtas omnes ferrugineo nebulosæ; postice in medio puncto niveo.

70. PAPILIO *Talans* D. alis rotundatis fasciæ primoribus maculis albis basique sanguineis; posticis area alba M. R.

*Clerk t. 45. f. t.*

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo & facies P. Nelei 187. Alæ subconcolorres: macula baseos alarum anticarum tartum a latere superiore conspicua; area alba posticarum supra, in medio, ovata; subtus, magis ad basin, angulata.

*An sexus tantum Nelei?*

71. PAPILIO *Ariadne* N. alis supra subferrugineis strigis nigris undulatis; primoribus antice puncto niveo.

*Habitat in Java.*

Statura Pap. C. albi. Antennæ nigrae vix clavatae. Alæ angulato-lenticulatae: supra testaceo-luteæ s. s. 6. strigis nigris, undulatis. Primores utrinque puncto albo ad marginem anticum, fere in medio. Ocellæ margine postico albæ, subtus concaviores quidem, sed fasciæ ferrugineis cinerascentibusque nebulosæ.

72. PAPILIO *Atlites* N. alis cinerascentibus; supra primoribus ocellis senis, posticis quinque: quibusdam cæsis.

*Habitat in Asia Clerk.*

Cordus cinereum. Antennæ fuscae. Pedes pallidi anticus muticis. Alæ primores; supra cinerascentes ad mar-

*marginem anticum lineolæ transversæ, fuscæ, undatæ; intra marginem exteriorem ocellis 6, quorum 4 ♂ 6 cæci. Posticæ supra cinerascentes, intra marginem exteriorem ocelli 5, quorum 3 ♂ 4 cæci; Intra ocellos ♂ marginem linei 2 fuscæ, repanda. Subtus omnes pallide Linea fuscæ, transversa, repanda; intra priorem lineolæ fuscæ subundulatæ: extra lineam in singula ali ocelli 2 ♂ puncta aliquot in eadem linea.*

73. PAPILIO *Fatrophæ* N. alis angulatis pallidis lineis undatis maculisque: primoribus puncto unico: posticisque duobus nigricantibus. M. R. 33.

Merian. Surin. 4. t. 4.

*Habitat in Fatropha Americes.*

74. PAPILIO *Dido* N. alis oblongis dentatis subconcoloribus nigris viridi maculatis; posticis fascia maculisque septem transversis.

Merian. Surin. 3. t. 3.

Clerk t. 30. f. 2.

*Habitat in America Meridionali.*

*Statura alarum Pap. Heliconiorum, sed posticæ subdentatae. Primores basi macula longitudinali; Posticæ fascia lata bases & fascia e maculis omnibus cœrulecentibus.*

75. PAPILIO *Hyperbius* N. alis dentatis luteis; primoribus extimo nigris: fascia alba; posticis subtus argentatis quinque ocellatis.

*Habitat in China. Clerk.*

*Structura. Pap. Paphiæ, sed duplo major. Alæ primores concolores, versus basin luteæ, versus apicem nigræ: nigra area versus apicem subtus pallidior maculata argentata. Fascia alba in area nigra utrinque, cum puncto albo. Area lutea utrinque, lituris 4 transversis ad costam & postice punctis 4 nigris. Alæ posticæ supra luteæ punctis 15 s. 18 nigris; margo posticus ater lunulis duplicatis cœruleis. Subtus alæ pallidiores five virescenti griseæ, nigro argenteoque obsoleto nebulose, cum ocellis 5. pupilla argentea: in disco postico intra marginem posticum linea repanda nigra.*

76. PAPILIO *Cydippe* N. alis dentatis supra nigro-cærulescentibus albo maculatis; area communis rubra; subitus marmoratis.

Clerk t. 36. f. 1.

*Habitat in India.*

Magnitudo Pap. Populi: Alæ supra omnes nigræ, cæruleo resplendentes; ad marginem exteriorem lunulæ linearæ, albæ, dupliæ serie. In anticis plaga transversa ex maculis albis. Area communis alarum omnium in medio ad basin rubra. Subitus omnes marmoratae e testaceo maculis cærulescentibus & albis. In posticis series duplex e maculis nigris albo margine.

77. PAPILIO *Peleus* P. alis integerrimis utrinque atris primoribus fascia linearis rubra, exteriusque luteo maculatis.

Clerk t. 45. f. 5.

*Habitat in Indiis.*

Habitus & omnia Pap. Pherecli 155. sed extra fasciam rubram maculæ confluentes lutescentes.

*An femina Pherecli?*

78. PAPILIO *Aetorion* P. alis subcaudatis fuscis superioribus fascia lutescente exteriore maculaque cœrulea postica; subitus ocello.

Clerk t. 36. f. 2.

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo media vix P. Urticæ. Alæ margine repandæ: supra fuscae. Primores fascia, versus apicem, testacea cum punctis duobus obsoletis in apice; margo posticus macula ovata cyanea. Posticæ fuscae subcaudatæ. Subitus omnes testacea griseo-undulatae. Primores ocello ad apicem. Posticæ macula rotunda, parva, pallida, intra marginem anticam.

79. PAPILIO *Arcius* alis caudatis nigris: fasciis duabus hyalinis, caudis cœruleis.

Clerk. t. 46. f. 6.

*Habi-*

*Habitat* = = M. R.

Magnitudo *Sphing: Statices*. Alæ primores concolores, atræ, ovatae, integerrimæ fasciis duabus hyalinis; altera in medio; altera basin versus. Alæ posticæ atræ, desinentes in caudam ipsa ala longiore, azuream, medio fascia hyalina transverse longitudinali. Macula minima coccinea ad basin anteriorem ale primoris & alia paulo major ad angulum ani. Antennæ clavatae, atræ. Sub abdomine et jam rubedo appareat.

80. PAPILIO Augias P. alis integerrimis divaricatis fulvis; fascia obliqua margineque postico nigris.

*Habitat* in Java, China.

Simillimus *Pap. Commati*; sed paulo major. Antennæ capitatae terminatae spina curva. Alæ subconcolores; Primores luteæ, in medio fascia nigra, obliqua, quæ marginem exteriorem non tangit, & margine postico latius nigro ex maculis constructo. Posticæ nigricantes maculis duabus magis fulvis: anteriore minore. Subtus omnes flavæ nigro irroratae, nec subtus albis quadratis maculis adspersæ ut *Comma*.

81. SPHINX sexta alis integris omnibus margine postico albo punctis, abdomine ocellis duodecim fulvis.

Brown. Jam: 438. t. 43. f. 17.

*Habitat* in Carolina, Jamaica.

Statura *Sphin. convolvuli*. Corpus cinereum. Alæ cinereæ margine postico septem punctis albis. In alis superioribus punctum album versus latus exterius. Abdomen cinereum ocellis 6 parium, fulvis, annulo nigro.

82. PHALÆNA gangis, alis superioribus subincarnatis litura longitudinali nigra postice abrupta, ab domine supra sangvineo.

*Habitat* in Java.

Magnitudo *Phal. Plantaginis*, antennas non vidi. Caput rubrum. Alæ superiores supra pallide incarnatae. Sutura longitudinalis nigra a vertice ad scutellum ducta. Litura in singula ala superiore nigra longitudinalis, sed versus

*posteriora oblique interrupta. Alæ & corpus subtus fuscum. Abdominis dorsum sanguineum distinctum a fuso punctis nigris.*

83. PHALÆNA *Pbalonia* N. spirilinguis, alis flavis: posticis concoloribus disco flavis lunula ambitaque nigro.

Clerk t. 48.

*Habitat in Indiis.*

*Media. Alæ patulæ flavæ. Superiores supra colore vario modo in diversis variegato. Subtus medietate exteriore nigricantes fascia alba. Inferiores concolores flavæ limbo lato nigro margine quasi albo dentato & in medio lunula nigra.*

84. PHALÆNA *heteroclita* N.? spirilingvis, alis superioribus angustioribus fuscis maculis 3 flavis, posticis flavis extimo fuscis.

*Habitat in Indiis M. R.*

*Magnitudo media. Antennæ desunt. Alæ superiores lanceolatae, obtuse, fuscæ: fascia in medio flava, quæ non tangit marginem posticum; alia a basi versus transversalem lanceolata. Tertia a basi ad medium marginis postici. Subtus albæ excepto margine antico flavo. Inferiores latissimæ flavæ margine postico fusco. Subtus flavæ. Thorax dorso nigricans.*

#### NEUROPTERA.

85. LIBELLULA *carolina*, alis hyalinis: posticis tota basi fuscis.

*Habitat in Carolina Garden.*

*Media. Alæ superiores lanceolatae: inferiores versus basin dilatatae; omnes hyalinæ, reticulatae vasis. Ante marginem anticum omnes macula fusca. Posticæ alæ tota basi, ab anteriore ad posteriorem marginem & quidem ad  $\frac{1}{3}$  totius fere alæ, sunt fuscae rufo reticulatae. Thorax griseus, immaculatus. Abdomen ferrugineum segmento ultimo nigro.*

86 LIBELLULA *variegata* alis patentibus fuscocærulecenti flavoque variegatis apice hyalinis. M. R. I.. W.

*Habi-*

*Habitat in Indiis.*

Magnitudo *Likell. vulgaris*. Oculi brunni; Thorax viridis. Abdomen supra nigricans linea viridi. Alæ variegatae ex cæruleo & luteo; sed cæruleus color antice magis fuscus; apices hyalini magis in anticis, quam posticis. Alæ posticæ multo latiores sunt. In primoribus versus apicem antice litura illa libellulis communis.

87. *HEMEROBIUS pectinicornis* antennis pectinatis, alis albidis signaturis nervisque fuscis albo articulatis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

Magnitudo inter maximos. Antennæ nigrae uno tantum latere pectinatae.

## HYMENOPTERA.

88. *SIREX columba* abdomine mucronato nigro fasciis testaceis.

*Habitat in America. De Geer.*

Affinis *Sir. Gigantes*. Abdomen in apicem et jam excante. Caput & antennæ testacea. Thorax subvillosus, testaceus & nigro varius. Pedes flavi.

89. *SPHÈX pensylvanica* abdomine plicato atro, alis subviolaceis.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

Magnitudo *Crabronis*, totus niger. Thorax villosus. Abdomen thorace minus.

90. *SPHÈX cærulea* cærulea, alis fuscis.

*Catesb. Car. p. 5. t. 5.*

*Habitat in Philadelphia De Geer.*

Pedes atro cærulei sunt. Simillimus figuræ *Catesbæi*, sed absque puncto nigro in apice alarum.

91. *VESPA maculata* nigra, thorace albo maculato, scutelloque quadrimaculata, abdomine postice albo maculato.

*Habitat in Pensylvania De Geer.*

Statura & magnitudo *Crabronis*. Frons maculis tribus albis, maximorum latera alba. Thorax ante alas macula

*curva; sub alis puncto albo. Ad scutellum 2 paria macularum albarum remota. Abdomen atrum, postice albo maculatum.*

92. VESPA quadridens atra, thorace quadridentato, scutello primoque segmento abdominis niveo.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Tota nigra. Thorax utrinque basi supra macula alba. Scutelli loco alba macula. Thorax postice truncatus, utrinque 2. dentibus notatus. Abdominis segmentum primum maxima ex parte album. Alæ atro-subviolaceæ.*

93. VESPA annularis fusca, genubus antennarum apicibus margineque primi segmenti abdominis flavis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Media. Alæ planæ. Thorax maculatus, ante alas magis ferrugineus. Tibiarum bases flavescentes.*

94. FORMICA binodis nigra, abdomine glaberrimo segmentis duobus primis subglobosis.

*Habitat in Jamaica.*

*Magnitudo formicæ nigræ nostratis. Alæ hyalinæ. Cotpus totum nigrum. Abdomen atrum, nitidum: Segmentis 2 primis angustioribus gibbosis. Antennæ apice fuscæ & crassiores.*

#### DIPTERA.

95. ASILUS æstuans cinereus, abdominis tribus ultimis segmentis albis.

*Habitat in Pensylvania. De Geer.*

*Genitale sigulare, compressum, atrum caudæ adhæret ut nostratis.*

#### APTERA.

96. CANCER *Dormia* brachyurus hirsutus, thorace utrinque dentato, pedibus posticis ungvibus geminis. Ruph. Mus. t. 11. f. 1. Cancer Lanosus. Seb. Mus. 3. t. 18. f. 1.

*Habitat in Indiis.*

97. CANCER *Vocaus* brachyurus, thorace subquadrate inermi, chela alter magna.

*Syst. nat. 10. p. 626. n. 6.*

*Marogr.*

*Marcgr. bras.* 184. *Maracoani.*

*Pis. bras.* 77. t. 78.

*Rumph. Mus.* 14. t. 10. f. 3.

*Catesb. car.* 2. t. 25. *Carenarius.*

*Seb. Mus.* 3. t. 18. f. 8.

*Habitat in utraque India.*

*Testa lœvis inermis, ex quadrato antice lateralibus dilatata. Discus quasi H. impresso; latera quasi 2 striis obliquis; inter oculos integra. Anguli anteriores prominuli.*

*Chela dextra, interdum sinistra, semper altera, maxima, oblonga, albida, lœvis. Pollex mobilis, compressus, arcuatus, introrsum granulatus. Digitus compressus, rectus, apice subtridentatus, introrsum granulatus, medio denticulo notatus. Chela minor minuta digitis rectis ciliatis. Pedes variis pilis; ungvibus acutis omnes.*

98. CANCER cordatus brachyurus, thorace lœvi cordato integerrimo, chelis subtus muricatis.

*Habitat Surinami.*

*Majusculus. Testa cordata apice posteriora respiciente. lœvis, margine subcarinato; disco lateribus gibbo; in medio quasi H. depresso. Inter oculos vix emarginata. Oculi cylindrici. Palpebra inferior crenulata. Chela lœvis, sed subtus valde muricatae verrucis conicis nigris. Brachia triangula angulis muricatis. Pedes reliqui omnes subtus maxime barbati.*

99. CANCER epheliticus brachyurus, thorace lœvi mutico maculato: margine crenulato, manibus cristatis. *Rumph. Mus.* t. 8. f. 5.

*Habitat in Carolina Garden.*

*Testa latior quam longa, convexa, subequalis, postice angustata, flava maculis varis fulvis rubro margine picta. Margo crenulatus. Rostrum obtusum, integrum. Chelæ intus planæ; extus convexæ muricatae, margine superiore cristatae.*

100. CANCER parasiticus brachyurus, thorace in-aqua-

*æquali orbiculato ciliato, pedibus dorsalibus quatuor.*

*Habitat in America intra Camam lazaram D. D. Jaquin.  
Testa magnitudine dimidii imperalis. Thorax orbicula-  
tus, integerrimus, convexus, cinereus, lœvis, subinæqua-  
lis tuberculis paucis minutissimis. In Dorso pedes 4 minores;  
unguis duobus aduncis. Pedes subtus 4 præter manus  
Cauda inflexa brevis.*

101. *CANCER filiformis linearis medio chelatus,  
pedibus quatuor.*

*Habitat in Malacca And. Grönberg.*

*Corpus lineare teretiusculum, magnitudine culicis. An-  
tennæ longæ articulis 3: ultimo ex innumeris minutissimis  
articulis fere setaceo. Palpi 2, in urvi 3 articulis. Tho-  
rax linearis 2 articulis, corpore  $\frac{1}{2}$  brevius. Brachia setis  
2, breviora. Manus ovatæ magnæ Carina uno altero ve-  
dente denticulo. Corpus posterius articulis 2, longitudine thoracis,  
sub his 2. parvia ovariorum. Cauda corpus 2 parvis articulis,  
ad singulos hos articulos par pedum breviorum articulis 3. s.  
4. brevissimis & digito incurvo subhamoso; hi 4. pedes viden-  
tur quasi in cauda hævere. Cauda obtusissima.*

102. *ONISCUS linearis cauda quadridentata.*

*Habitat in Oceano Surinami.*

*Linearis longitudine pollicari utrinque quasi dentatus.  
Antennæ longitudine corporis articulis 1, 2, 3. crassioribus;  
reliquis in setam attenuatis. Cauda longior, emarginata  
dentibus duobus, cui foliola lateralia adnata,  
unde quadridentata fit.*









