

BOTANICON GALLICUM.

PARS II.

RIJKSHERBARIUM
LEIDEN

On trouve dans la même Librairie :

MONOGRAPHIE DES CAMPANULÉES, par **ALPHONSE DE CAN-**
DOLLE, membre de la Société Helvétique des Sciences naturelles,
et de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève;
avec 20 planches gravées en taille-douce; 1 vol. in-4° de 400 pages,
broché. **25 fr.**

L'ENTOMOLOGIE, ou Histoire naturelle des Insectes coléoptères;
par M. *Olivier*, de l'Académie des Sciences. *Cet ouvrage, maintenant complet, est orné de 363 planches, coloriées d'après nature;*
8 vol. petit in-fol., dont 6 de texte et 2 de planches, br. en
carton. **750 fr.**

LES PAPILLONS D'EUROPE, peints d'après nature par *Ernst*, et
décris par *Engramelle*, contenant 361 planches coloriées; 6 vol.
très grand in-4., cart. **600 f.**

Il reste peu d'exemplaires complets de cet ouvrage; nous les avons augmentés
de 9 planches nouvelles, qui ne se trouvent que dans nos exemplaires.

HISTOIRE NATURELLE DES SINGES, DES MAKIS ET DES
GALEOPITHÈQUES, par *J. B. Audebert*; 1 vol. grand in-fol.
jésus, vélin superfin satiné, figures imprimées en couleur, ouvrage
complet, cart. **300 fr.**

Il y en a 1 exemplaire unique avec les dessins originaux.

HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DORÉS OU A REFLETS
MÉTALLIQUES, ou Histoire naturelle et générale des Colibris,
Oiseaux-Mouches, Jacamars, Promérops, Grimpereaux, et des
oiseaux de Paradis, par *J. B. Audebert* et *L. P. Vieillot*; figures
imprimées en couleur, et imitant les reflets métalliques qui distinguent le plumage riche et varié de ces diverses familles; 2 vol.
format très grand in-fol. jésus vélin superfin; le texte de l'imprimerie de *Crapelet*, la lettre en or au bas des planches, etc.,
cart. **900 fr.**

HISTOIRE NATURELLE DES OISEAUX DE L'AMÉRIQUE SEP-
TENTRIONALE, par M. *Vieillot*; 2 vol. grand in-fol., papier
vélin, avec 132 planches imprimées en couleur, cartonnés à la
Bradel. **600 fr.**

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET
RUE DE VAUGIRARD, n° 9.

AUG. PYRAMI DE CANDOLLE

BOTANICON GALLICUM

SEU

SYNOPSIS

PLANTARUM IN FLORA GALlica,

DESCRIPTARUM.

EDITIO SECUNDA.

EX HERBARIIS ET SCHÉDIS CANDOLLIANIS PROPRIISQUE DIGESTUM

A

J. E. DUBY v. d. M.

PARS SECUNDA

Plantas Cellularares continens.

A. HU

PARIS.

V^e DESRAY, RUE HAUTEFEUILLE, N^o 4.

1830.

RIJKSHERBARIUM
LEIDEN



LECTORI.

ALTERAM tandem Botanicon Gallici, jamdudum prelo subjectam et à multis variisque casibus dilatam, partem quæ Cryptogamiam sistit, Botanicis offero. Evidem non tantam molem complexum esse et illustravisse puto, sed tentamen exhibere mancum et imperfectum, primus ipse confiteor. Quocircà Botanicos omnes etiam atque etiam rogo ut me de erroribus hallucinationibusque admonere, observationes; plantas seu Cryptogamas seu Phanerogamas à se repertas, mihi communicare velint, ut has in supplemento addenda et emendanda continente, quod edere mihi propono, complecti possim.

Quantum auxilium à viris celeberrimis quos in primæ partis præfatione nominavi et insuper ab illustissimis *Mougeot*, *Guépin* aliisque perceperim, unusquisque Lector etiam non monitus dijudicaret. His omnibus utens divitiis quas à viris honoratissimis aut

ex meis investigationibus collegi, quasve in herbario
Candolliano reperi, numerum specierum novarum
peraugere facile fuisset; sed quotiescumquè mihi scrupulus
vel tenuissimus residere visus est, speciem tacere
malui, cum illustrissimo Fries (Syst. orb. veg. 1. p. 293.)
melius esse (præsertim in Cryptogamicis) censens,
plantam incertam omittere, quàm dubia dubiis accu-
mulare.

Die ultimà novembris 1829.

J. DUBY.

BOTANICON

GALLICUM.

II. PLANTÆ CELLULARES SEU ACO-TYLEDONEÆ.

CAR. Plantæ contextu celluloso variis módis configurato constantes, poris corticalibus vasis lymphaticis spiralibus et propriis carentes. Organa sexualia in plerisque ignota. Semina aut gongyli absque cotyledonibus germinantia.

Ordo CXVII. MUSCI L. ord. nat. n. 56. Juss. gen. p. 10.

Flores hermaphroditæ dioici aut monoici, terminales aut laterales, discoidei gemmiformes aut capitati, semper minimi, foliis floralibus (*perichaetio*) cincti. *Masc.* Utriculi pedicellati, filiis articulatis sterilibus intermixti. *Fem.* Ovaria cylindracea, iisdem filiis intermixta. Fructus *theca* seu capsula unilocularis 1-aut-4-valvis; axi centrali (*columellā*) sæpius cylindrico, interdùm longitudinaliter plicato, quandoquè apice dilatato et os subclaudente instructa; apice *operculo* adnato aut caduco dehiscente clausa; juvenis membranā omnino involuta, demum hujus membranæ transversâ dilaceratione, *setā* aut pedicello basi *vaginulā* permanente cincto elevata; *apophysī* id est protuberantiae carnosæ sporulis vacuæ interdùm insidens; apice *calyptrā* extintoriiformâ caducâ superata; ore nunc nudo nunc cincto *peristomate* ciliato aut dentato, ciliis simplici aut duplii ordine dispositis. Sporulæ numerosissimæ pulveraceæ. — Herbæ parvulæ virescentes frondosæ, foliis indivisis sæpius nervosis integris dentatis serratisve.

546 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Sect. I. PERISTOMA DUPLEX (excepto Conostomo).

† SETA TERMINALIS.

I. POLYTRICHUM L. gen. 1192. Hedw. fund. 2. t. 7. f. 37. — Polytrichum et Oligotrichum DC. fl. fr.

Seta terminalis; peristoma duplex, exterius dentibus 32 aut 64 brevibus incurvis aequidistantibus; interius membrana horizontalis densa thecam claudens cum peristomatis externi dentibus connexa; calyptra parva dimidiata, simplex aut duplex indusio magno pilis numerosis ab apice ad basin directis constante.

Sect. I. POLYTRIX. — Polytrichum DC. fl. fr. 2. p. 485.

Calyptra duplex, exterior pilosa.

* Foliorum marginibus membranā reductā instructis.

1. P. JUNIPERINUM (Hedw. sp. 89. t. 18.) foliis lanceolato-subulatis margine involutis integris apice acuminiatis coloratis subserratis, thecā ovatā obtusè quadrangulari, apophysi depressā, operculo conico. 2 in ericetis et sylvis aridis. — Fl. fr. 5. p. 224. eng. bot. t. 1200. Hook. et Tayl. muse. brit. t. 10. P. strictum Menz. trans. linn. 4. t. 7. f. 1. Fl. fr. 2. p. 439. Calyptra basi pallida, apice aurantiaca. (v. v.)

2. P. PILIFERUM (Schreb. Lips. p. 74.) foliis lanceolato-subulatis margine involutis integris apice piliferis, thecā ovatā obtusè quadrangulari, apophysi depressā, operculo conico. 2 in apricis aridis. — Fl. fr. 2. p. 489. eng. bot. t. 1199. Musc. brit. t. 10. — Dill. musc. t. 54. f. 3. — Vaill. bot. t. 23. f. 7. Caules infernē nudi. (v. v.)

*** Foliorum marginibus planis vel involutis.

3. P. COMMUNE (L. sp. 1573. excl. var.) caulis elongatis, foliis patentibus linearis-subulatis, margine planis serratis, thecā erectā ovatā quadrangulari apophysi instructā. 2 in ericetis sylvisque. — Musc. brit. t. 10.

a. yuccae-folium (Hook. et Tayl.) caulis palmaribus, foliis margine concoloribus, thecā acutē quadrangulari, apophysi subrotundā. — P. commune Fl. fr. 2. p. 487. Hedw. fund. 2. t. 7. f. 37. — Vaill. bot. t. 23. f. 8. — Dill. musc. t. 54. f. 1. (v. v.)

b. attenuatum (H. et T.) caulis 3-pollicaribus, foliis margine pellucidis, thecā obtusè quadrangulari, apophysi minimā. — P. attenuatum Menz. in Linn. trans. v. 4. t. 6. f. 2. eng. bot. t. 1198. P. formosum Hedw. sp. t. 19. f. 1. Fl. fr. 2. p. 489. P. longisetum Sw. suec. t. 8. f. 16. Fl. fr. 2. p. 489. P. nigrescens Fl. fr. 2. p. 490. Theca erecta aut subincurva, calyptra aurantiaca pilosissima. (v. v.)

4. P. ALPINUM (L. sp. 1593.) caulis elongatis ramosis, foliis patentibus subulato-lanceolatis margine planis serratis, thecā subovatā, apophysi obscurā. 2 in Alpibus. — Hedw. sp. t. 19. Fl. fr. 2. p. 490. Musc. brit. t. 11. eng. bot. t. 1905. P. arcticum Sw. suec. t. 8. f. 17. Fl. fr. 2. p. 490. — Hall. helv. t. 46. f. 6. Calyptra brevis, pilis abbreviatis. (v. v.)

5. P. URNIGERUM (L. sp. 1573.) caulis elongatis ramosis, foliis erecto-patentibus lanceolatis acutis margine planis serratis, thecā erectā cylindrica, apophysi nullā. 2 in ericetis et sylvis montanis. — Fl. fr. 2. p. 491. eng. bot. t. 1218. musc. brit. t. 11. — Vaill. bot. t. 28. f. 13. — Dill. musc. t. 55. f. 5. Operculum conico-subulatum. (v. v.)

6. P. ALBOIDES (Hedw. st. cr. 1. t. 14.) caulis brevibus, foliis linearis-lanceolatis obtusis margine planis apice serratis, capsula suberectā cylindrica apophysi destituta. 2 in ericetis et abietinis. — Fl. fr. 2. p. 487. musc.

brit. t. 11. eng. bot. t. 1649. — Vaill. bot. t. 29. f. 11. — Dill. musc. t. 55. f. 7. (v. v.)

7. *P. SUBROTUNDUM* (Huds. ang. 1. p. 400.) caulis brevibus, foliis linearilanceolatis obtusis margine serratis, capsula suberecta subglobosa apophysi destituta. $\frac{1}{2}$ in sylvis aridis. — Fl. fr. 2. p. 486. eng. bot. t. 1624. *P. nanum* Hedw. st. crypt. 1. t. 13. Fl. fr. 2. p. 486; musc. brit. t. 10. *P. pumilum* Sw. sicc. t. 9. f. 19. Hedw. sp. t. 21. — Dill. musc. t. 55. f. 6. — Vaill. bot. t. 26. f. 15. (v. v.)

Sect. II. *OLIGOTRICHUM DC. fl. fr. 2. p. 493.*

Calyptra simplex hinc indè hirta pilis sursum directis.

8. *P. UNDULATUM* (Hedw. st. crypt. 1. t. 16-17.) foliis lanceolatis undulatis margine planis denticulatis, nervo alato, theca cylindrica incurva, operculo subulato. (1) (2) in sylvis et umbrosis. — Musc. brit. t. 10. eng. bot. t. 1220. *Oligotrichum undulatum* Fl. fr. 2. p. 492. *Catharinea undulata* Brid. — Dill. musc. t. 46. f. 18. — Vaill. bot. t. 26. f. 17. Folia siccitate crispa. (v. v.)
9. *P. HERCYNICUM* (Hedw. st. cr. 1. t. 15.) foliis lanceolatis rigidis integris margine involutis, nervo lato sulcato, capsula oblonga suberecta, operculo conico. $\frac{1}{2}$ in turfosis circa Dax, in præruptis herbidis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — eng. bot. t. 1209, musc. brit. t. 10. *Oligotrichum Hercynicum* Fl. fr. 2. p. 492. *Catharinea Hercynica* Brid. (v. s.)

II. *CONOSTOMUM* Swartz in Schrad. journ. 1. p. 24. t. 5. *Musc. brit. t. 1.*

Seta terminalis; peristomatis simplicis dentes 16 apice subulati, in conum persistentem conniventes, calyptra dimidiata.

1. *C. BOREALE* (Sw. l. c.) foliis imbricatis lanceolatis acuminatis carinatis leviter dentatis. $\frac{1}{2}$ in editioribus Alpibus Delphinatûs ex Villars. — Wahl. lapp. t. 21. *Musc. brit. t. 10. Bryum tetragonum* Dicks. crypt. fasc. 2. t. 4. f. 9. Cespites densi, summâ aestate fructiferi. (v. s. ex Helv.)

III. *BARTRAMIA* Hedw. muse. frond. 2: p. 111. *Brid. musc. 4. p. 128.*

Seta terminalis; capsula subglobosa; peristoma duplex, exterius dentibus 16, interius membranaceum in 16 segmenta bifida cum dentibus peristomatis exterioris alterna divisum; calyptra dimidiata.

* *Folius crispis vel flexuosis.*

1. *B. HALLERIANA* (Hedw. st. crypt. 2. t. 40.) caulis elongatis proliferis, foliis longis subulatis flexuosis superne serratis, seta caulis elongatione laterali brevissimâ arcuatâ. $\frac{1}{2}$ in montanis inter lapides et saxa. — Fl. fr. 3. p. 511. musc. brit. t. 23. eng. bot. t. 997. — Hall. helv. t. 45. f. 8. Nimiun var. α sequentis affinis ex Arnott. mss. (v. v.)
2. *B. POMIFORMIS* (Turn. in ann. of bot. 1. p. 1526.) foliis patentibus subulatis serratis siccitate contortis, nervo apicem attingente, seta elongata erecta. $\frac{1}{2}$ ad terram saxaque humida. — Musc. brit. t. 23.
- a. *major* (H. et T.) caulis elongatis ramosis, foliis crispis. — *B. crista* Brid. musc. 4. t. 1. f. 4. eng. bot. t. 1526. Fl. fr. 2. p. 510. (v. v.)
- b. *minor* (H. et T.) caulis abbreviatis, foliis flexuosis. — *B. pomiformis* Brid. musc. 4. t. 1. f. 3. *B. vulgaris* Fl. fr. 2. p. 509. — Dill. musc. t. 44. f. 1.
3. *B. OEDERI* (Sw. in Schrad. journ. II. band. 1800. p. 181.) caulis elongatis, foliis recurvo-patentibus lanceolatis canaliculatis serratis, seta caulis elongatione laterali longa erecta. $\frac{1}{2}$ in rupibus humidis montium. — Fl. fr. 2. p. 510. *Brid. musc. 4. t. 2. f. 9. B. gracilis* Flörke. musc. brit. t. 23. (v. v.)

548 ACOTYL. SEU CELLULARES.

** *Foliis strictiusculis adpresso.*

4. *B. ITHYPHYLLA* (Brid. musc. 4. t. 1. f. 6.) caulis brevibus, foliis rigidis erecto-patentibus subulato-setaceis subintegris siccitate minime tortilibus, nervo in medio folio evanescente, seta elongata erecta. $\frac{1}{2}$ in montanis. — Fl. fr. 2. p. 510. eng. bot. t. 1710. musc. brit. t. 23. — Hall. helv. t. 46. f. 7. (v. v.)
5. *B. FONTANA* (Sw. in journ. Schrad. 2. t. 3. f. B. x.) caulis fastigiatis, foliis dense imbricatis rigidis erectis late ovatis lanceolatis acuminatis planiusculis serratis, seta caulis elongatione laterali elongata erecta. $\frac{1}{2}$ in paludibus ad fontes. — Hook et Tayl. musc. brit. t. 23.
- a. *major* (H. et T.) caulis 3-5 pollicaribus, foliis late ovatis acuminatis. — *B. fontana* Fl. fr. 2. p. 511. — Dill. musc. t. 44. f. 2. — Vaill. t. 24. f. 10. (v. v.)
- β . *Marchica* (H. et T.) caulis semipollicaribus pollicaribusve, foliis lanceolatis acuminatis. — In pratis uidis circà Quimper. — *B. Marchica* Sw. l. c. eng. bot. t. 2074. — Hedw. st. cr. 2. t. 39. (v. s.)

IV. FUNARIA Schreb. gen. p. 1650. Hedw. sp. musc. p. 127. musc. brit. t. 22.

Capsula terminalis pyriformis senescens sulcata; peristoma duplex obliquum, exterius 16 dentibus, interius dentibus 16 exterioris dentibus oppositis horizontalibus membranaceis, calyptre magna mitriformis, basi ventricoso-tetragona.

1. *F. HYGROMETRICA* (Hedw. sp. 172.) foliis concavis ovatis apiculatis integris, nervo excurrenti, seta incurvâ flexuosa. $\frac{1}{2}$ ad rupes terrâ tenui tectas, in hortis et ambulacris neglectis frequens. — Fl. fr. 2. p. 496. eng. bot. t. 342. musc. brit. t. 20. — Dill. musc. t. 52. f. 75. — Vaill. bot. t. 26. f. 16. (v. v.)
2. *F. MUHLENBERGII* (Turn. in ann. of. bot. 2. p. 198.) caulis abbreviatis, foliis concavis ovatis abruptè acuminatis serratis nervo infrâ apicem evanido, seta stricta. ① in rupibus Vogesorum (cl. M. et N.), Galloprovinciæ (cl. Deleuze), propè Mimatem (cl. Prost), ad pontem urbis Cahors (Cloquet), circà Falaise (cl. de Brébisson). — Fl. fr. 2. p. 497. eng. bot. t. 1498. Schw. supp. t. 66. (v. s.)
3. *F. FONTANESII* (Schw. supp. t. p. 2. t. 66.) foliis stellatis oblongis evanidi-nervibus subserratis, theca elongato-pyriformi subcernuâ lœvinuscula, seta erecta, ② in Corsicâ reperiit Ph. Thomas. (v. s.)

V. ZYGODON Hook. et Tayl. musc. brit. p. 70. t. 3.

Seta terminalis; peristoma duplex, exterius dentibus 16 per paria approximatis, interius ciliis 8 horizontalibus; capsula ovata longitudinaliter striata, calyptre dimidiata lœvis.

1. *Z. CONOIDEUM* (Hook. et Tayl. l. c. t. 21.) foliis erecto-patentibus ovato-lanceolatis acutis integris. — Moug. et Nestl. vog. n. 721.
 - a. *minus* (Hook. et Grev.) caulis brevibus, foliis minoribus flavo-viridibus oblongis pellucidis punctatis, nervo ante apicem evanescente. — In truncis vetustis Ulmi propè Argentoratum (cl. Moug. et Nestl.), in Galliâ meridionali ex Hook. — Bryum conoideum Dicks. fasc. 4. t. 11. f. 2. (v. s.)
 - β . *succulentum* (Hook. et Grev.) caulis brevibus, foliis nigro-viridibus majoribus obovato-oblongis opacis impunctatis inferne reticulatis, nervo valido excurrente. — In truncis arborum propè Argentoratum et propè Andegavum (cl. Guepin ex Moug. et Nestl.). — Amphidium pulvinatum Nees. (v. s.)

VI. PTYCHOSTOMUM Hornsch. bot. zeit. 1824. syll. p. 62.

Peristoma duplex, exterius dentibus 16 erectis, interius membrana hyalina plicata peristomati externo adhaerens et dentes ejusdem inter se conjungens.

1. P. COMPACTUM (Hornsch. l. c.) foliis ovatis cuspidatis arctè imbricatis, capsula inclinata obovatâ, operculo mammillato obtuso. \mathcal{U} in muris vetustis circa Argentoratum (Moug. et Nestl. vog. n. 828.). (v. s.)

VII. BRYUM Hook. et Tayl. musc. brit. p. 115. Arn. disp. meth. p. 42. — Mnium et Bryum L. — Meesia, Rohlia et Bryum DC.

Peristoma duplex; exterius dentibus 16; interius dentibus 16 carinatis integris aut carinâ pertusis, aut etiam apice bifidis directione rectis, membranâ reticulatâ (plerumque latâ) ad basin connexis, ex quâ ut plurimum cilia inter dentes internos egradiuntur; calyptra dimidiata.

Sect. I. MEESIA Hedw. st. cr. 1. p. 56.

Dentes externi obtusiusculi, dentibus internis multò breviore; membrana peristomatis interni fugacissima.

1. B. TRICHODES (L. sp. 1585.) caulinibus subramosis, foliis linearibus obtusis integris reticulatis, capsula obovatâ recurvâ subcernuâ lævi, setâ longissimâ. \mathcal{U} in paludibus turfosis. — Musc. brit. t. 28. eng. bot. t. 1517. Meesia uliginosa Hedw. st. cr. 1. t. 1. f. 2. Fl. fr. 2. p. 500. M. minor Br. (v. v.)
2. B. TRIQUETRUM (Turn. musc. hib. p. 115.) caulinibus elongatis ramosis, foliis lanceolatis carinatis acutis serratis reticulatis, capsula lævi pyriformi erectocernuâ, setâ longissimâ. \mathcal{U} in paludibus turfosis rariùs. — musc. brit. t. 28. eng. bot. t. 2394. Meesia longiseta Hedw. st. cr. 1. t. 21. 22. Fl. fr. 2. p. 499. Diplocamium longisetum Web. et Mohr. (v. s.)
3. B. DEALBATUM (Dicks. crypt. fasc. 2. t. 5. f. 3.) caulinibus abbreviatis, foliis lanceolatis acutis planis apice serratis reticulatis, capsula lævi pyriformi suberectâ, dentibus externis internas subæquantibus. — In udis subalpinis raro. — Musc. brit. t. 28. eng. bot. t. 1571. Meesia dealbata Sw. Hedw. sp. musc. t. 41. f. 6-9. (v. s. ex Helv.)

Sect. II. STREPTOTHECA Arn. disp. meth. p. 43.

Dentes externi acuti, internis subæquales; theca sulcata inæqualis sive cernua.

4. B. ANDROGYNUM (Hedw. sp. 178., th. t. 14.) caule subsimplici, foliis lanceolatis serratis margine recurvis, theca suberectâ cylindricâ sulcatâ, operculo conico. \mathcal{U} in sylvis umbrosis humidis frequens. — Fl. fr. 2. p. 503. musc. brit. t. 28. Mnium androgynum eng. bot. t. 1238. — Dill. musc. t. 31. f. 1. (v. v.)
5. B. PALUSTRE (Sw. musc. suec. 46.) caule ramoso, foliis lanceolatis obtusis integris margine revolutis, theca ovatâ obliquâ sulcatâ, operculo conico. \mathcal{U} in nemoribus humidis et paludibus frequens. — Fl. fr. 2. p. 504. musc. brit. t. 28. eng. bot. t. 391. — Dill. musc. t. 31. f. 3. — Vaill. bot. t. 24. f. 1. (v. v.)

Sect. III. MNIUM L. gen. 1193. Hedw. fund. musc. 2. p. 94. Arn. disp. meth. p. 44.

Dentes externi acuti internis subæquales; theca lavis; flores masculi discoidei. — Caulis semper simplex erectus, inferne subdenudatus.

* Foliis immarginatis.

6. B. STELLARE (Roth. germ. 3. p. 240. non Sm.) caule subsimplici, foliis ovato-lanceolatis acutis nervo abrupte desinente, superioribus serrulatis, theca

550. ACOTYL. SEU CELLULARES.

BRYUM.

oblonga cernua, operculo convexo obtuso. ♀ inter rupes umbrosas Alpium. — Fl. fr. 5. p. 226. excl. syn. Sm. Mnium stellare Hedw. sp. t. 45. — Dill. musc. t. 52. f. 78. (v. s. ex Helv.)

7. B. ROSEUM (Schreb. lips. p. 84.) foliis obovato-spathulatis acutis serratis undulatis, nervo apicem attingente, capsula oblongo-ovata pendula. ♀ in sylvis et ericetis humidis, rarissime fructificans. — Fl. fr. 2. p. 508. musc. brit. t. 29. eng. bot. t. 2395. — Dill. musc. t. 52. f. 77. Folia superiora stellatim patentia. (v. s.)

* * *Foliis marginatis.*

8. B. LIGULATUM (Schreb. lips. p. 84.) caulis elongatis, foliis undulatis ligulatis reticulatis denticulatis, nervo ultra apicem producto, capsula ovata pendula, operculo conico. ♀ in umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 509. musc. brit. t. 30. — Dill. musc. t. 52. f. 76. Setae saepe aggregatae. (v. v.)

9. B. HORNUM (Schreb. lips. 83.) caulis elongatis, foliis lanceolatis acutis reticulatis denticulatis, nervo infra apicem evanido, capsula oblongo-ovata pendula, operculo hemisphaerico mucronulato. ♀ in sylvis paludosis. — eng. bot. t. 2271. musc. brit. t. 31. B. stellatum Fl. fr. 2. p. 507. — Dill. musc. t. 51. f. 71. — Vaill. bot. t. 24. f. 5. Caules dense cespitosi. (v. v.)

10. B. MARGINATUM (Dicks. fasc. 2. t. 5. f. 1.) caulis elongatis, foliis acutis reticulatis serratis nervo ultra apicem producto, inferioribus ovato-lanceolatis, superioribus sublinearibus, capsula ovata pendula, operculo breviter rostrato. ♀ in udis umbrosis Alpium. — Fl. fr. 5. p. 226. musc. brit. t. 31. Mnium serratulum Brid. musc. 4. t. 1. f. 2. Schw. s. 1. p. 2. t. 78. (v. s. ex Helv.)

11. B. ROSTRATUM (Schrad. spic. p. 72.) caulis elongatis, foliis late ovatis reticulatis obtusis denticulatis, nervo ultra apicem producto, capsula ovata pendula, operculo rostrato. ♀ in montosis rariis. — Fl. fr. 2. p. 508. Musc. brit. t. 30. B. longirostrum Brid. Mnium rostratum Schw. supp. 1. p. 2. t. 79. Setae 1-5. (v. v.)

12. B. SPINOSUM (Voit in Sturm crypt. germ. 11. t. 16.) caule erecto simplicissimo, foliis confertis ovatis acutis geminato-spinulosis carinata scabris, pedunculis aggregatis, capsula pendula cylindrica, operculo subconico obliquo. ♀ in Delphinatu propè Pont-Beauvoisin reperiit cl. Dejean ex Brid. — Mnium spinosum Schw. supp. t. 77. Præcedenti nimium affinem existimat cl. Arnott. (v. s. ex Helv.)

13. B. CUSPIDATUM (Schreb. lips. p. 34.) caulis elongatis, foliis obovatis acutis reticulatis in parte superiori denticulatis, nervo ultra apicem producto, capsula ovata pendula, operculo conico hemisphaerico obtuso. ♀ in umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 508. musc. brit. t. 31. Mnium cuspidatum Hedw. sp. t. 45. f. 5-8. — Dill. musc. t. 53. f. 79. A-L. Seta simplex, folio nervo excurrente cuspidata. (v. v.)

14. B. PUNCTATUM (Schreb. lips. p. 85.) caulis elongatis, foliis obovato-rotrundis obtusissimis reticulatis integris, nervo infra apicem evanido, capsula ovata pendula, operculo breviter rostrato. ♀ in pratis humidis umbrosis. — Fl. fr. 2. p. 507. musc. brit. t. 30. eng. bot. t. 1183. Mnium serpillifolium a. L. — Dill. musc. t. 53. f. 81. (v. v.)

Sect. IV. BRYASTRUM.

Dentes externi acuti internis subæquales; theca levigata; flores masculi gemmiformes. — Caulis foliosus cespitosus; plerumque erectus, surculis reptantibus nullis Arn. disp. p. 45.

* *Foliis subulatis.*

15. B. PYRIFORME (Sw. musc. suec. 45.) caule subsimplici, foliis subulato-setaceis flexuosis serratis, nervo latissimo, capsula pyriformi pendula. (I) in arenosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 510. musc. brit. t. 28. B. aureum eng. bot. t. 389. Webera pyriformis Hedw. st. cr. 1. t. 3. — Dill. musc. t. 50. f. 60. (v. v.)

* * *Foliis minime subulatis.*

16. *B. ARGENTEUM* (L. sp. 1586.) caulis ramosis, foliis dense imbricatis latè ovatis abruptè acuminatis subserrulatis concavis, nervo antè apicem evanido, capsula ovato-pyriformi pendulâ. ♀ in muris, tectis, terrâ sabulosâ frequens. — Fl. fr. 2. p. 502. muse. brit. t. 29. — Dill. muse. t. 50. f. 62. — Vaill. bot. t. 26. f. 3. Caules cespitosi, foliis apice scariosis et albis argenteis. (v. v.)
17. *B. JULACEUM* (Schrad. spic. p. 70) caulis ramosis, foliis densè imbricatis latè ovatis concavis integris obtusis, nervo apicem subattigente, capsula obovato-cylindraceâ pendulâ. ♀ in montibus raro. — Muse. brit. t. 28. eng. bot. t. 2270. *B. argenteum* & L. — Dill. muse. t. 50. f. 63. (v. s.)
18. *B. CAPILLARE* (L. sp. 1586.) caulis abbreviatis, foliis obovatis siccitate contortis integris nervo in pilum producto submarginatis, capsula oblongâ pendulâ. ♀ in sylvis humidis, fossis. — Fl. fr. 2. p. 505. muse. brit. t. 29. Schw. supp. t. 74. — Dill. muse. t. 50. f. 67. — Vaill. bot. t. 24. f. 6. Caules cespitosi ramosi, operculum brevissimè convexum. (v. v.)
19. *B. DEMISSUM* (Hook. musc. ex. t. 99.) caule perbrevi ramoso, foliis ovatis cuspidato-acuminatis reticulatis, nervo excurrente, setâ arcuatâ, capsula curvato-pyriformi pendulâ. ♀ propè Mimatem (cl. Prost). (v. s. D.)
20. *B. CESPITITIUM* (L. sp. 1586.) caule brevi, foliis ovatis acuminatis integris aut apice obscure serratis margine subrecurvis, nervo apicem attingente aut ultrà apicem producto, capsula ovato-pyriformi pendulâ. ♀ ad muros, tecta, aggeres. — Fl. fr. 2. p. 504. muse. brit. t. 29. *Pohlia imbricata* Schw. t. 64. *B. Funckii* Schw. t. 79. *Mnium lacustre* Schw. t. 79. — Dill. muse. t. 50. f. 66. — Vaill. bot. t. 29. f. 7. Caules densè cespitosi ramosi, operculum conicum. *Polymorpha* species. (v. v.)
21. *B. TURBINATUM* (Sw. musc. suec. 49.) caule brevi ramoso, foliis ovatis acuminatis subintegris margine subrecurvis, nervo ultrà apicem excurrente, capsula elongato-pyriformi pendulâ. ♀ in arenosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 506. muse. brit. t. 29. *Mnium turbinatum* Hedw. st. cr. 3. t. 8. *B. boreale* Schw. t. 69. *B. pallescens* Schw. t. 75. *B. longisetum* Schw. t. 75. *B. pallens* Schw. t. 72. *Webera intermedia* Schw. t. 65. *Pohlia inclinata* Schw. t. 64. — Dill. muse. t. 51. f. 74. Operculum convexum. (v. v.)
22. *B. LUDWIGII* (Schw. supp. 1. p. 2. t. 68.) caule subsimplici foliis concavis, ovatis oblongis obtusis integerrimis, nervo sub apicem evanido, setâ flexuosa, capsula pendulâ subpyriformis operculo mammillari. ♀ ad terram in præruptis montis Hohneck Vogesorum. — Moug. et Nestl. vog. n. 331. (v. s.)
23. *B. VENTRICOSUM* (Dicks. crypt. fasc. 1. p. 4.) caulis elongatis ramosis, foliis oblongis acuminatis vix serrulatis margine recurvis, nervo apicem excedente, capsula oblongo-ovatâ pendulâ. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 2. p. 506. muse. brit. t. 30. *B. bimum* Schreb. Fl. fr. 2. p. 505. *B. Schleicheri* Schw. t. 73. Fl. fr. 5. p. 226. *B. pseudotriquetrum* Schw. *B. cubitale* Dicks. fasc. 2. t. 5. — Dill. muse. t. 51. f. 72. 73. Operculum breviter conicum. (v. v.)
24. *B. ALPINUM* (L. mant. 2. p. 309.) caulis rigidis elongatis ramosis, foliis densè imbricatis erectis lanceolatis obtusiusculis apice subserrulatis margine revolutis, nervo apicem attingente, capsula oblongo-ovatâ pendulâ. ♀ in fissuris rupium Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), Alpium, Montis-Aurei, Pyrenæorum. — Fl. fr. 2. p. 501. Vill. dauph. 4. t. 54. muse. brit. t. 28. Schw. t. 73. — Dill. muse. t. 50. f. 64. (v. s.)
25. *B. CUCULLATUM* (Schw. supp. 1. p. 2. t. 68.) caule sub apicem innovante, foliis lanceolato-oblongis obtusiusculis integerrimis concavis nervo evanido apice cucullatis, capsula pendulâ oblongâ, operculo planiusculo obtuse mammillato. ♀ in Jurasso propè lacum des Rousses observavit cl. Dejean ex Brid. sp. musc. 3. p. 15.
26. *B. ANNOTINUM* (Hedw. sp. t. 43.) caule erecto brevissimo, foliis lanceolato-acuminatis apice subserrulatis, capsula pendulâ oblongo-pyriformi, operculo

552 ACOTYL. SEU CELLULARES.

mammillari. ♀ in locis humidis ad fossas. — eng. bot. t. 1862. B. decipiens Fl. fr. 2. p. 503. Trentepohlia erecta Hoffm. germ. 2. t. 14. Surculi in foliorum axillis sèpè bulbiferi. (v. v.)

27. B. VOGESIACUM (Dub. mss.) caule brevi simplici, foliis linearilanceolatis acuminatis integris concavis aretè imbricatis, nervo apicem attingente aut ultrà apicem producto, capsulâ obovato-globosâ pendulâ. ♀ in præruptis montis Hohneck Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.). — Pohlia cucullata Bruch in Moug. et Nestl. vog. n. 830. (v. s.)

28. B. CARNEUM (L. sp. 1587.) caule simplici, foliis lanceolatis reticulatis apice subserrulatis, nervo evanido, capsulâ obovatâ pendulâ, operculo convexo. ♀ in umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 502. musc. brit. t. 29. B. delicatulum Hedw. st. crypt. 1. t. 30. B. pulchellum Hedw. st. cr. 3. t. 38. B. — Dill. musc. t. 50. f. 69. — Hall. helv. t. 45. f. 6. (v. v.)

β. atropurpureum (Wahlemb.) foliis ovato-lanceolatis, capsulâ sanguineo-rubrâ, operculo miniato. — B. erythrocarpon Brid. Moug. et Nestl. vog. n. 832. (v. s.)

29. B. NUTANS (Schreb. lips. p. 81.) caule brevi, foliis erectis lanceolatis acuminatis apice serratis, nervo apicem attingente, capsulâ oblongo-pyriformi pendulâ, operculo brevissimè conico. ♀ in sterilibus et uliginosis. — Fl. fr. 2. p. 500. musc. brit. t. 29. eng. bot. t. 1240. Webera nutans Hedw. st. cr. 1. t. 4. — Dill. musc. t. 50. f. 61. Folia in surculis sterilibus sublinearia (v. v.)

30. B. ELONGATUM (Dicks. cr. fasc. 2. p. 8.) caule brevi, foliis erectis elongato-lanceolatis acuminatis serratis, nervo apicem attingente, capsulâ elongato-clavatâ cernuâ, operculo subconico. ♀ ad rupes et vias eavas Vogesorum, Jurassi ex Brid., Alpium, Pyrenæorum. — Musc. brit. t. 30. B. longicollum Sw. sicc. t. 6. f. 13. Fl. fr. 5. p. 225. B. cylindricum Dicks. cr. 4. t. 11. f. 4. Pohlia elongata Hedw. st. cr. 1. t. 36. Fl. fr. 2. p. 498. P. minor Schw. supp. t. 64. (v. s.)

31. B. CRUDUM (Huds. ang. p. 491.) caule simplici, foliis rigidis lanceolatis planis serrulatis, nervo infrâ apicem evanido, superioribus angustioribus longioribusque, capsulâ oblongo-subpyriformi cernnâ, operculo conico-convexo. ♀ in udis montanis. — Fl. fr. 2. p. 506. musc. brit. t. 28. eng. bot. t. 1604. Mnium crudum L. Hedw. st. cr. 1. t. 37. — Dill. musc. t. 51. f. 70. (v. v.)

VIII. TIMMIA Hedw. musc. frond. 1. t. 31. Arn. disp. meth. p. 48.

Capsula terminalis ovata; peristoma duplex; exterius dentibus 16; interius è ciliis 64 infernè in membranam planam coadunatis supernè liberis, apicibus 2 vel 4 connexis, dentes exterioribus oppositos efformantibus; calyptra dimidiata.

1. T. POLYTRICHOIDES (Brid. sp. musc. 3. p. 99.) caule erecto subramoso, foliis basi vaginantibus linearilanceolatis serratis siccitate circinnatis humiditate patulo-reflexis, capsulæ nutantis subapophysatæ ovatae operculò mammillari tandem centro depresso. ♀ in rupibus umbrosis et sylvis.

α. viridis (Brid.) foliis saturate viridibus longioribus patulo-reflexis, pedunculis brevioribus, peristomate interno lutescente. — In montibus Galloprovinciae. — T. Megapolitana Hedw. st. cr. 1. t. 31. Fl. fr. 2. p. 497. (v. s.)

β. lutescens (Brid.) foliis è viridi-lutescentibus è basi latiore brevioribus patulis, pedunculis elongatis, peristomate interno albido. — In montibus Sedenensibus (cl. Clarion), Jurassi valle de Joux (cl. Dejean ex Brid.). — T. Austriaca Hedw. sp. musc. t. 42. f. 1-7. Fl. fr. 2. p. 498. (v. s.)

++ SETA LATERALIS.

IX. DALTONIA *Hook. et Tayl. musc. brit. p. 80. t. 3.* — *Neckeræ sp.*
Hedw. DC.

Peristoma duplex, exterius dentibus 16, interius ciliis 16 ex latere dentium nascentibus; calyptora mitriformis.

1. *D. PENNATA* (Arn. disp. meth. p. 54.) caule decumbente ramoso, surculis planis, foliis bifariis ovato-lanceolatis transversè rugosis, setâ perichætio immersâ, operculo obliquo, calyptrâ basi integrâ seu lacerâ. \mathcal{U} ad truncos quercinos vetustos. — *Neckera pennata* Hedw. musc. frond. 3. t. 19. Fl. fr. 2. p. 543. — Dill. musc. t. 32. f. 9. — Hall. helv. t. 3. f. 2. (v. v.)
2. *D. HETEROMALLA* (Hook et Tayl. muse. brit. t. 22.) caule ramoso diffuso, surculis teretiusculis, foliis imbricatis latè ovatis acutis, setâ perichætio immersâ, operculo conico-acuminato, calyptrâ subintegrâ. \mathcal{U} ad truncos arborum. — *Neckera heteromalla* Hedw. st. cr. 3. t. 15. Fl. fr. 2. p. 544. — Dill. musc. t. 32. f. 6. — Vaill. bot. t. 27. f. 17. (v. v.)

X. NECKERÆ *Arn. disp. meth. p. 51.* — *Neckeræ sp.* *Hedw. DC.* — *Neckera* et *Anomodon* *Hook et Tayl. musc. brit. t. 3.*

Theca oblonga; peristoma duplex, exterius 16 dentibus erectis internis alternantibus, interius ciliis 16; calyptora dimidiata.

* *Surculis planis.*

1. *N. RUMILA* (Hedw. st. cr. 3. t. 20.) ramis pinnatis, foliis ovato-acuminatis subconcavis margine recurvis, setâ perichætium subsuperante, thecâ oblongo-ovatâ, operculo conico. \mathcal{U} ad truncos arborum in *Vogesorum sylvis*, in *Armoricâ* (cl. *Lapylaie* ex Brid.), in *Neustriâ* propè *Falaise* ex cl. de Bréb. — Fl. fr. 5. p. 236. musc. brit. t. 22. Mong. et Nestl. vog. n. 429. *Hypnum pennatum* Dicks. cr. 1. t. 6. f. 8. Folia disticha subundulata; cilia perist. interni membranâ unita ex cl. Arn. (v. s.)
2. *N. CRISPÆ* (Hedw. fund. t. 8. f. 47. 48.) ramis pinnatis, foliis oblongis acuminulatis transversè rugosis, setâ perichætio triplò longiore, thecâ ovatâ, operculo oblique subulatè-rostrato. \mathcal{U} ad saxa terramque in *sylvis* et *montosis*. — Fl. fr. 2. p. 543. musc. brit. t. 22. — Dill. musc. t. 36. f. 12. — Hall. enum. t. 3. f. 5. Folia disticha collucentia, cilia præcedentis. (v. v.)

** *Surculis teretiusculis vel subcompressis.*

3. *N. VITICULOSA* (Hedw. fund. 1. t. 3. f. 11. II. t. 8. f. 49-50.) caule procumbente, ramis erectis cylindraceis, foliis ovato-lanceolatis obtusis integris, nervo apicem attingente, setâ longissimâ, thecâ cylindricâ, operculo rostrato. \mathcal{U} ad truncos arborum et lapides. — Fl. fr. 2. p. 542. *Anomodon viticulosum* musc. brit. t. 22. — Dill. musc. t. 39. f. 43. Folia imbricata, erecto-patentia; cilia libera dentibus lateraliter inserta. (v. v.)
4. *N. CURTIPENDULA* (Hedw. fund. 2. p. 93.) caule ramoso diffuso, foliis ovatis acuminatis serrulatis, nervo evanido, setâ perichætio duplò longiore, thecâ ovatâ, operculo conico. \mathcal{U} in *sylvis* ad saxa et radices arborum. — Fl. fr. 2. p. 341. eng. bot. t. 1444. *Anomodon curtipedulum* musc. brit. t. 22. Folia imbricata; cilia prioris. (v. v.)

XI. FONTINALIS *Hedw. fund. 2. t. 9. f. 53-55. Schw. supp. 1. p. 2. f. 307.*

Capsula lateralis oblonga subsessilis perichætio subocculta; peristoma duplex, exterius dentibus 16; interius ciliis 16 chlathris transversis connexis conum reticulatum efformantibus; calyptora mitriformis.

1. *F. ANTIPIRETICA* (L. sp. 1571.) foliis trifariis ovato-lanceolatis enerviis complicato-carinatis acutis, perichætialibus rotundis obtusis. \mathcal{U} in aquis

554 ACOTYL. seu CELLULARES.

stagnantibus fluentibusque; raro fructificans. — Fl. fr. 2. p. 545. musc. brit. t. 22. eng. bot. t. 359. — Dill. musc. t. 33. f. 1. — Vaill. bot. t. 33. f. 5. (v. v. sine fr. et s. fructif.)

2. *F. SQUAMMOSA* (L. sp. 1571.) foliis imbricatis lanceolato-subulatis enerviis planis aut subconcavis, perichaetialibus rotundis obtusis. $\frac{1}{2}$ in rivulis et torrentibus rariis et rarissime fructificans. — Fl. fr. 2. p. 545. Hedw. st. cr. 3. t. 12. musc. brit. t. 22. Aspectus plantae sericeus, theca minor. (v. s. sine fr.)

3. *F. JULIANA* (Savi pis. 2. p. 414.) foliis alternis bifariis patentibus laxis remotis lanceolato-linearibus acutis, nervo sub apicem evanido. — In fossis, fontibus, puteis Galliae occidentalis. — Fl. fr. 5. p. 236. Skitophyllum fontanum Lapyl. journ. bot. 1814. t. 34. f. 2. Dicranum? semicompletum? Arn. disp. meth. p. 28. (v. s. sine fructu.)

XII. HOOKERIA Smith. in Linn. trans. vol. 9. p. 276. non Schwæg. — Pterigophyllum Brid. meth. p. 149.

Peristoma duplex, exterius dentibus 16; interius membranaceum in 16 segmenta integra divisum; calyptra mitriformis integra glabra.

1. *H. LUCENS* (Sm. 1. c.) caule compresso vase ramoso, foliis late ovatis integris obtusis enerviis imbricato-distichis, theca ovata nutante, operculo conico cuspidato. $\frac{1}{2}$ in sylvis humidis rariis. — Musc. brit. t. 27. eng. bot. t. 1902. Leskea lucens Fl. fr. 2. p. 513. Schw. t. 84. Hypnum luceum L. Hedw. fund. 1. t. 1. f. 4. 5. 6. — Dill. musc. t. 34. f. 10. Folia reticulata. (v. s.)

XIII. HYPNUM L. gen 1195. Hook. et Tayl. musc. brit. p. 91. t. 3.

Capsula lateralis oblonga; peristoma duplex, exterius dentibus 16; interius membrana in 16 segmenta aequalia divisa, processibus filiformibus frequenter intermixtis; calyptra dimidiata.

I. Surculi plani, folia recta.

1. *Surculis repentebus vel decumbentibus foliosis.* (Complanata Arn.)

1. *H. COMPLANATUM* (L. sp. 1588.) caule procumbente pinnato, foliis bifariis oblongis apiculatis integris enerviis, capsula ovata erecta, operculo rostrato. $\frac{1}{2}$ ad rupes, muros, truncos arborum; rarius fructificans. — Musc. brit. t. 24. Leskea complanata Brid. musc. 3. t. 1. f. 2. Fl. fr. 2. p. 514. — Dill. musc. t. 34. f. 7. Seta perichaetii duplo longior. (v. v.)

2. *H. TRICHOMANOIDES* (Schreb. lips. 88.) caule procumbente ramoso, foliis late acinaciformibus distichis obtusis matricis nervo medium tenus instructis, capsula ovata erecta, operculo rostrato. $\frac{1}{2}$ in sylvis ad corticem arborum. — Musc. brit. t. 24. eng. bot. t. 1493. Leskea trichomanoides Brid. Fl. fr. 2. p. 514. — Dill. musc. t. 34. f. 8. (v. v.)

3. *H. DENTICULATUM* (L. sp. 1588.) foliis ovatis ovato-lanceolatisve plus minusve acuminatis basi a brevibus nervis instructis, capsula oblongo-cylindrica inclinata, operculo conico. $\frac{1}{2}$ in sylvis ad terram et truncos arborum. — Fl. fr. 2. p. 541. musc. brit. t. 24. Hedw. st. crypt. 4. t. 31. *H. sylvaticum* L. syst. veg. p. 950. Fl. fr. 2. p. 540. Schw. supp. t. 82. — Dill. musc. t. 34. f. 5. 6. (v. v.)

4. *H. RIPARIUM* (L. sp. 1595.) caule ramoso patulo, foliis laxis ovato-acuminatis integris, nervo apicem subattigente, capsula oblonga cernua, operculo conico. $\frac{1}{2}$ in aquis fluentibus ad lapides trabesque. — Fl. fr. 2. p. 539. Hedw. st. cr. 4. t. 3. muse. brit. t. 24. *H. longifolium* Br. meth. p. 158. — Dill. musc. t. 40. f. 44. B. C. D. Plantæ inundatæ folia lanceolato-subulata, in humidis lanceolato-acuminata. (v. v.)

5. *H. UNDULATUM* (L. sp. 1589.) caule procumbente, foliis imbricatis ovatis

acutis transversè undulatis basi 2 nervis brevibus instructis, capsulâ oblongâ sulcatâ arcuato-cernuâ, operculo rostrato. \mathcal{U} in sylvis umbrosis, ad radices arborum Neustriæ propè Vire (cl. de Bréb.), Vogesorum, Alpium, Montis-Aurei ex Brid. — Fl. fr. 2. p. 540. musc. brit. t. 24. eng. bot. t. 1181. de Bréb. musc. exsicc. n. 3. — Dill. musc. t. 36. f. 11. Folia albo-viridia, operculum acuminatum. (v. s.)

II. Surculi teretiusculi: folia recta.

2. *Surculis erectis infernè denudatis, supernè ramosis.* (Dendroidea Arn.)
6. H. DENDROIDES (L. sp. 1593.) caule erecto infernè simplici et nudo, ramis fastigiatis terminalibus, foliis ovatis lanceolatisve striatis apice serratis nervo apicem subattingente, capsulâ erectâ ovato-cylindricâ, operculo rostrato. \mathcal{U} in sylvis et pascuis uidis. — Musc. brit. t. 26. eng. bot. t. 1565. Leskea dendroides Hedw. Fl. fr. 2. p. 517. Climacium dendroides Schw. supp. t. 81. — Dill. musc. t. 40. f. 48. Rarius fructificat. (v. v.)
7. H. ALOPECURUM (L. sp. 1594.) caule erecto infernè simplici et denudato supernè fastigato, foliis concavis ovatis ellipticis acutis serratis margine reflexis, nervo apicem subattingente, capsulâ ovatâ cernuâ, operculo rostrato. \mathcal{U} in sylvis humidis. — Fl. fr. 2. p. 535. eng. bot. t. 1182. musc. brit. t. 25. H. arbuscula Brid. non Hook. — Dill. musc. t. 41. f. 49. — Vaill. bot. t. 23. f. 5. (v. v.)
3. *Surculis inordinatè ramosis atque foliosis, foliis imbricatis ellipticis ovatisve valde concavis obtusis vel apiculatis.* (Illecebra Arn.)
8. H. MOLLE (Dicks. cr. 2. t. 5. f. 8.) ramis fasciculatis pendulisve, foliis laxè imbricatis rotundato-ovatis obtusis concavis integris basi breviter 1-aut-2-nervibus, capsulâ ovatâ cernuâ, operculo conico. \mathcal{U} ad rupes madidas secns rivulos Vogesorum, Alpium, agri Mimattensis (cl. Prost). — Fl. 5. p. 235. Hedw. sp. musc. t. 70. f. 7-10. musc. brit. t. 24. (v. s.)
9. H. STRAMINUM (Dicks. cr. 1. t. 1. f. 9.) caule subsimili erecto gracili, foliis laxè imbricatis erecto-patentibus oblongo-ovatis obtusis integris, nervo ad medium evanido, capsulâ oblongo-ovatâ incurvâ cernuâ, operculo conico. \mathcal{U} in ericetis humidis; rarissimè fructificans. — Fl. fr. 2. p. 533. eng. bot. t. 205. Color plantæ pallidus. (v. s.)
10. H. TRIFARIUM (Web. et Mohr. suec. p. 277. t. 2. f. 2. a. d.) caule erecto supernè ramoso, ramis paucis subteretibus, foliis imbricatis arctè adpressis obscurè trifariis ovatis concavis, nervo vix usque ad medium producto, capsulâ lageniformi obliquâ, operculo conico. \mathcal{U} in paludibus Jurassi (cl. Moug. et Nestl.). — H. stramineum f. Schw. supp. t. 89. Rarissimè fructificat. (v. s.)
11. H. PURUM (L. sp. 1594.) caule ramoso pinnato, foliis densè imbricatis ovalibus concavissimis breviter mucronatis, nervo medium vix attingente, capsulâ ovatâ cernuâ, operculo conico. \mathcal{U} in sylvis et pratis. — Fl. fr. 2. p. 521. Hedw. sp. t. 66. f. 3-6. musc. brit. t. 24. — Dill. musc. t. 40. f. 45. — Vaill. bot. t. 28. f. 3. Caules 2-9 poll. longi. (v. v.)
12. H. ILLECEBRUM (Lam. dict. 3. p. 174. an L?) caule procumbente diviso vagè subpinnatimque ramoso, foliis arctè imbricatis adpressis ovatis concavis apiculatis serrulatis, nervo ultrà medium producto, capsulâ oblongo-ventricosâ cernuâ, operculo conico acuminato. \mathcal{U} in sylvis pratisque. — Fl. fr. 2. p. 522. eng. bot. t. 2189. H. Tonretii Brid. Raro fructificat. An à priore diversum? ex Arn. disp. meth. p. 60. (v. v.)
13. H. SCHREBERI (Willd. fl. ber. p. 325.) caule ramoso pinnato compressiusculo, foliis densè imbricatis suberectis ellipticis apiculatis concavis integris breviter basi binerviis, capsulâ ovatâ cernuâ, operculo conico elongato. \mathcal{U} ad margines sylvarum in pratis humidis montium. — Eng. bot. t. 1621. musc. brit. t. 24. H. muticum Fl. fr. 2. p. 521. — Dill. musc. t. 40. f. 47. (v. v.)

556 ACOTYL. SEU CELLULARES. HYMEN.

14. *H. MURALE* (Hedw. st. cr. 4. t. 30.) caule repente, foliis suberectis imbricatis ovalibus mucronulatis concavis integris, nervo medium subattigente, capsula ovata cernua, operculo rostrato rostro arcuato. ♀ ad muros, lapides, aggeres. — Fl. fr. 2. p. 538. musc. brit. t. 24. *H. abbreviatum* Hedw. sp. musc. t. 65. f. 1-4. — Dill. musc. t. 41. f. 52. (v. v.)
4. *Surculis vagè ramosis, foliis ovato-acuminatis integerrimis striatis, theca recta.*
(Leskeia Arn.)
15. *H. SUBTILE* (Hoffm. germ. 2. p. 70. non auct.) caule repente ramoso, ramulis confertis simplicibus filiformibus, foliis laxis remotis linear-lanceolatis acutis, theca recta cylindrica, operculo acutè conico. ♀ ad radices arborum in montanis rarius. — Leskeia subtilis Hedw. st. cr. 4. t. 9. Fl. fr. 2. p. 515. (v. s.)
5. *Surculis vagè ramosis, foliis ovato-acuminatis subintegerrimis exstriatis, theca cernua.* (Serpentia Arn.)
16. *H. TENUBUM* (Dicks. cr. 4. t. 11. f. 12.) caule repente ramoso, ramis fasciculatis erectiusculis, foliis fasciculatis erectis lanceolato-subulatis integris, nervo apicem attingente, capsula ovata cernua, operculo rostrato capsulae longitudine. ♀ ad terram, muros et pedes arborum in Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 234. musc. brit. t. 24. *H. Algerianum* Desf. atl. 2. t. 258. f. 2. Schw. supp. 2. p. 2. t. 144. Folia parva. (v. v.)
17. *H. SERPENS* (L. sp. 1596.) caule repente, foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis patentibus integris, nervo plerumque apicem attingente, capsula cylindrica incurva cernua, operculo conico brevi. ♀ in umbrosis frequens. — Fl. fr. 2. p. 536. Hedw. st. cr. 4. t. 18. musc. brit. t. 24. *H. subtile* Dicks. eng. bot. t. 2496 et auct. plurim. non Hoffm. *H. fluviatile* Funck non Sw. — Dill. musc. t. 42. f. 64. — Vaill. bot. t. 28. f. 6. Planta tenuissima, foliis minutissimis, nervi longitudine admodum variabili. (v. v.)
18. *H. PLUMOSUM* (L. sp. 1592 non Hedw.) caule repente irregulariter ramoso, foliis erecto-patentibus ovato-lanceolatis acuminatis subserratis nervo supra medium evanido, superioribus aliquando secundis, capsula ovata cernua, operculo conico. ♀ Ad saxa arborumque radices. — Fl. fr. 2. p. 533. musc. brit. 25. *H. alpinum* Turn. Fl. fr. 5. p. 230. eng. bot. t. 1496. *H. pseudoplumosum* Brid. *H. flagellare* Hedw. sp. t. 73. f. 1-3 non Dicks. — Dill. musc. t. 35. f. 16. (v. v.)
19. *H. CATENULATUM* (Brid. sp. musc. 2. p. 154.) caule ascendente diviso, foliis subpatentibus ovatis subacuminatis dorso et margine papillosum nervo brevissimo instructis, capsula ovata inclinata, operculo conico acuminato. ♀ in montibus. — Musc. brit. t. 24. *Pterigynandrum catenulatum* Brid. musc. p. 64. t. 5. f. 4. Fl. fr. 2. p. 461. Caules dense cespitosi. (v. v.)
6. *Surculis vagè ramosis, foliis lanceolatis integerrimis striatis.* (Ptychophylla Arn.)
20. *H. RUFESCENS* (Dicks. crypt. 3. t. 8. f. 4.) caule erecto ramoso subpinnato, foliis imbricatis erecto-patentibus lanceolatis acuminatis integris basi sub 2-nerviis, capsula ovata suberecta, operculo conico. ♀ in rupibus et limosis Jurassi, Alpium, Pyrenaeorum. — Fl. fr. 5. p. 228. musc. brit. t. 25. Brid. musc. 3. t. 3. f. 1. *Leskeia rufescens* Schw. supp. t. 88. Raro fructif. (v. v.)
21. *H. SERICUM* (L. sp. 1595.) caule repente, ramis numerosis ascendentibus confertis, foliis erecto-patentibus lanceolatis acuminatis integris striatis, nervo ultra medium producto, capsula ovato-cylindrica erecta. ♀ ad truncos arborum muros lapidesque frequens. — Musc. brit. t. 25. eng. bot. t. 1445. *Leskeia sericea* Hedw. st. cr. 4. t. 17. Fl. fr. 2. p. 516. — Dill. musc. t. 42. f. 59. — Vaill. bot. t. 27. f. 3. Folia dense imbricata. (v. v.)
22. *H. LUTESCENS* (Huds. ang. 421.) caule procumbente ramosissimo, foliis erecto-patentibus lanceolatis acuminatis integris striatis, nervo infra apicem

evanido, capsula ovata cernua, seta scabriuscula, operculo conico-acuminato.
H. ad terram aridam muros et saxa frequens. — Fl. fr. 2. p. 532. Hedw. st. cr. 4. t. 16. musc. brit. t. 25. — Dill. musc. t. 42. f. 50. — Vaill. bot. t. 27. f. 1. (v. v.)

23. *H. SALEBROSUM* (Hoffm. germ. 2. p. 74.) caule repente subpinnato, foliis imbricatis subadpressis lanceolatis longe acuminatis striatis margine reflexis serrulatis, nervo ultra medium producto, seta laevi, capsula ovata cernua, operculo conico. *H.* ad lapides secus rivoles Vogesorum et Galliae borealis. — Fl. fr. 5. p. 232. Moug. et Nestl. veg. n. 834. non 428. *H. plumosum* Hedw. st. cr. 4. t. 15. non L. *H. albicans* C. fasciculatum Fl. fr. 5. p. 232. *H. Thomasii* Brid. (v. s.)

24. *H. ALBICANS* (Neck. meth. musc. p. 180.) caule ascendeante ramoso aut subsimplici, foliis erecto-patentibus ovato-lanceolatis acuminatis striatis integris, nervo ultra medium producto, capsula ovata cernua, seta laevi, operculo conico subapiculato. *H.* in arenosis aridis. — Fl. fr. 2. p. 532. Hedw. st. cr. 4. t. 5. musc. brit. t. 25. — Dill. musc. t. 42. f. 63. — Vaill. bot. t. 26. f. 9. Planta albescens; folia imbricata. (v. v.)

25. *H. NITENS* (Schreb. lips. p. 92.) caule erecto, ramis subcompressis simplicibus, foliis erecto-patentibus angustis lanceolatis acuminatis subintegris striatis, nervo apicem subattigente, capsula oblongo-ovata incurva cernua, seta laevi, operculo conico mucronulato. *H.* in humidis turfosis Cænomani, Parisiorum, Delphinatus propè Pont-Beaupoisin (cl. Dejean ex Brid.). — Fl. fr. 2. p. 522. musc. brit. t. 25. eng. bot. t. 1646. *H. trichodes* Poll. non Arn. — Dill. musc. t. 39. f. 37. — Vaill. bot. t. 27. f. 11. Folia nitentia aurea. Raro fructificat. (v. s.)

7. *Surculis 2-3 pinnatim ramosis, foliis cordatis ovato-lanceolatis; theca saepius cernua.* (Tamariscina Arn. not. mss.)

26. *H. OMBRATUM* (Hedw. sp. t. 67. f. 10-12.) caule procumbente irregulariter bipinnato, foliis imbricatis cordato-acuminatis binerviis plicato-striatis argute serrulatis, setis subaggregatis, capsula nutante, operculo conico brevi. *H.* in umbris Alpium, Vogesorum. — Fl. fr. 5. p. 227. Moug. et Nestl. veg. n. 329. Truncus croceus. (v. s.)

27. *H. SPLENDENS* (Hedw. sp. t. 67. f. 7-9.) caule tripinnato, foliis ovatis abrupte acuminatis apice serrulatis concavis basi 2 nervis brevibus instructis margine subtus recurvis, capsula ovata cernua, operculo rostrato capsulae longitudine. *H.* in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 519. musc. brit. t. 25. *H. parietinum* Sw. — Dill. musc. t. 35. f. 13. — Vaill. bot. t. 29. f. 1. (v. v.)

28. *H. PROLIFERUM* (L. sp. 1500.) caule tripinnato, foliis serratis dorso papilosis, caulinis cordato-acuminatis striatis nervo apicem subattigente, ramis ovatis basi 1-2-nerviis, capsula ovata cernua, operculo rostrato. *H.* in sylvis et pomariis frequens. — Musc. brit. t. 26. eng. bot. t. 1494. *H. tamariscinum* Hedw. st. cr. 4. t. 3. Fl. fr. 3. p. 518. *H. recognitum* Hedw. sp. t. 67. f. 1-5. *H. delicatulum* Hedw. st. 4. t. 35. — Dill. musc. t. 35. f. 14. — Vaill. bot. t. 25. f. 1. Caules rubelli, folia opaco-viridia imbricata. (v. v.)

8. *Surculis vagè ramosis rariter pinnatis, foliis subovato-lanceolatis serratis, theca erecta.* (Myura Arn.)

29. *H. MYDRUM* (Poll. pal. n. 1054. f. 3.) caule repente, ramis ascendibus subfusciformibus arcuatis fasciculatis, foliis ovato-ellipticis concavis apice serratis, nervo ultra medium evanido, capsula ovata erecta, operculo rostrato. *H.* ad truncos arborum. — Fl. fr. 2. p. 584. *H. curvatum* Sw. Musc. brit. t. 25. *H. myosuroides* Hedw. st. cr. 4. t. 8. non L. — Dill. musc. t. 41. f. 50. — Vaill. bot. t. 23. f. 4. Folia imbricata tumidiacula, nervo interdum surcato. (v. v.)

30. *H. MYOSUROIDES* (L. sp. 1506 non Hedw.) caule repente, ramis ascendibus teretibus fasciculatis incurvis, foliis lanceolato-acuminatis serratis,

558 ACOTYL. SEU CELLULARES. HYPNUM.

nervo ad medium evanido, marginibus basi reflexis, capsula ovato-cylindrica erecta, operculo rostrato. \mathcal{U} ad trunco in Vogesis et subalpinis, ad rupes in agro Mimatensi (cl. Frost). — Fl. fr. 2. p. 534. eng. bot. t. 1567. muse. brit. t. 25. — Dill. musc. t. 41. f. 51. (v. v.)

9. Surculis vagè ramosis rariter pinnatis; foliis subovato-lanceolatis serratis, theca cernua. (Rutabula Arn.)

31. *H. ABETINUM* (L. sp. 1591.) caule pinnato, foliis serratis dorso papilloso marginie reflexis, nervo apicem subattingente, caulinis cordato-acuminatis, rameis cordato-acutis, capsula cylindrica inclinata, operculo conico. \mathcal{U} in locis aridis, sylvis abietinis, rarissime fructificans. — Fl. fr. 2. p. 519. Hedw. st. cr. 4. t. 32. muse. brit. t. 25. — Dill. musc. t. 35. f. 17. — Vaill. bot. t. 29. f. 12. (v. v. sine fructu.)

32. *H. PRÆLONGUM* (L. sp. 1591.) caule repente subhippinnato, foliis laxis patentibus ovatis coquati ve acuminatis serratis nervo infra apicem evanido, capsula ovata cernua, operculo rostrato. \mathcal{U} in sylvis ad trunco putridos. — Fl. fr. 2. p. 519. Hedw. st. cr. 4. t. 29. muse. brit. t. 25. *H. speciosum* Brid. *H. Clarioni* Fl. fr. 2. p. 520. — Dill. musc. t. 35. f. 15. — Vaill. bot. t. 23. f. 9. (v. v.)

33. *H. STRIGOSUM* (Hoffm. germ. 2. p. 76.) caule ascendentē fasciculatim ramoso basi subnudo, foliis dense imbricatis ovato-triquetris acutitisculis concavis serrulatis, nervo apicem subattingente, capsula nutante ovato-arcuata, operculo e basi conica curvirostro. \mathcal{U} ad terram et trunco annosos in sylvis Avenionis (cl. Guerin ex Brid.), Viennæ (cl. Dejean ex Brid.). — Fl. fr. 2. p. 535. *H. Thuringicum* Brid. musc. rec. 3. t. 3. f. 2. Nitium priori affinis ex Arn. (v. s. ex Helv.)

34. *H. PILIFERUM* (Schreb. lips. p. 91.) caule procumbente subpinnato, foliis ovatis longe et angustè acuminatis serratis, nervo infra medium evanido, capsula ovata cernua, operculo conico macronulato. \mathcal{U} in sylvis ad radices arborum rarius. — Fl. fr. 5. p. 234. Hedw. st. cr. 4. t. 14. muse. brit. t. 25. *H. Lamarckii* Fl. fr. 2. p. 535. non Brid. Folia abrupte acuminata apparent præsertim sicca pilo terminata. (v. s.)

35. *H. RUTABULUM* (L. sp. 1590.) caule procumbente ramoso, ramis erectis, foliis patentibus ovatis acuminatis apice serratis striatis, nervo ad medium evanido, capsula ovata cernua, seta scabra, operculo conico. \mathcal{U} ad terram et trunco arborum frequens. — Fl. fr. 2. p. 581. Hedw. st. cr. 4. t. 27. muse. brit. t. 26. — Dill. musc. t. 38. f. 39. — Vaill. bot. t. 27. f. 8. Folia imbricata, operculo acuto. (v. v.)

36. *H. VELUTINUM* (L. sp. 1595.) caule variè ramoso, foliis erecto-patentibus ovatis ovato-lanceolatis acuminatis serratis striatis, nervo ad medium evanido, capsula ovata cernua, seta scabra, operculo conico obtusiusculo. \mathcal{U} in sylvis et pratis. — Fl. fr. 2. p. 537. Hedw. st. cr. 4. t. 27. muse. brit. t. 26. *H. intricatum* Hedw. st. cr. 4. t. 28. Fl. fr. 2. p. 537. — Dill. musc. t. 42. f. 61. Folia laxa. (v. v.)

37. *H. POPULEUM* (Hedw. sp. t. 70.) caule repente subpinnato, foliis imbricatis lanceolatis acuminatis serratis margine subreflexis, nervo apicem attingente, capsula ovata suberecta, seta scabra, operculo conico acuto. \mathcal{U} ad rupes et trunco populeos in Alpibus Delphinatus ex Brid., Vogesis (cl. Mong. et Nestl.), circà Parisios ex Thuil., Abbavillam ex Bouch. — Fl. fr. 5. p. 232. muse. brit. t. 24. *H. implexum* Sw. eng. bot. t. 1584. *H. viride* Lam. DC. fl. fr. 2. p. 537. (v. s.)

38. *H. REFLEXUM* (Starcke in Web. et Mohr. bot. tasch. p. 306.) caule procumbente diviso, ramis subconfertis incurvis, foliis laxè imbricatis cordato-acuminatis subserrulatis, nervo ad apicem usque producto, seta muriculata, capsula ovata inclinata, operculo conico obtusiusculo. \mathcal{U} ad ramos in summis Vogesis (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 5. p. 233. muse. brit. t. 24. Mong. et Nestl. vog. n. 424. (v. s.)

39. *H. RUSCIFORME* (Weiss. crypt. 225.) caule repente varie ramoso basi saepè denudato, foliis laxè imbricatis subpatentibus latè ovatis acutis serrulatis integris concavis, nervo apicem subattinente, capsula ovatâ cernuâ, operculo obliquè et acutè rostrato. ♀ in sylvis humidis, ad margines rivulorum. — Fl. fr. 2. p. 539. *H. rusciforme* Neck. eng. bot. 1275. musc. brit. t. 26. *H. riparioides* Hedw. st. cr. 4. t. 4. *H. inundatum* Brid. musc. 2. p. 2. t. 5. f. 3. *H. tumidiusculum* Lam. dict. 3. p. 179. excl. syn. Fl. fr. 2. p. 533. (v. v.).
40. *H. STRIATUM* (Schreb. lips. p. 91.) caule repente, ramis sparsis erectis, foliis patentibus cordato-acuminatis serratis striatis, nervo ultra medium producto, capsula oblongo-ovatâ cernuâ, setâ lœvi, operculo obliquè rostrato capsulae longitudine. ♀ in sylvis et pomariis frequens. — Fl. fr. 2. p. 531. Hedw. st. cr. 4. t. 13. musc. brit. t. 26. *H. longirostrum* Ehr. — Dill. musc. t. 38, f. 30. (v. v.).
41. *H. CONFERTUM* (Dicks. crypt. 4: t. 11. f. 4.) caule repente ramoso, foliis confertis subdistichis erecto-patentibus ovatis acuminatis concavis serratis, nervo ad medium producto, capsula ovatâ cernuâ, setâ lœvi, operculo rostrato subulato. ♀ ad troncos putridos in Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 228. eng. bot. t. 2407. musc. brit. t. 26. *H. serrulatum* Hedw. sp. t. 60. *H. Schleicheri* Hedw. in Web. et Mohr. beyt. 1. t. 7. *H. intertextum* Voit. (v. s.).

III. Folia squarrosa (Squarrosa Arn.).

42. *H. CUSPIDATUM* (L. sp. 1595.) caule pinnato suberecto, ramis cuspidatis, foliis laxis ovatis concavis enerviis integris, inferioribus squarrosis, superioribus densè imbricatis, capsula oblongâ incurvâ cernuâ, operculo conico. ♀ in fossis, rivulis frequens. — Fl. fr. 2. p. 520. eng. bot. t. 2407. musc. brit. t. 26. — Dill. musc. t. 39. f. 34. (v. v.).
43. *H. CORDIFOLIUM* (Hedw. st. cr. 4. t. 37.) caule erecto, ramis cuspidatis, foliis laxis squarrosis cordato-ovatis obtusis concavis integris, nervo ad apicem serè producto, capsula oblongâ incurvâ cernuâ, operculo conico. ♀ in fossis et paludibus propè Parisios (DC.), Delphinatûs et Avenionis ex Brid. — Fl. fr. 2. p. 521. eng. bot. t. 1447. musc. brit. t. 26. Rarò fructificat. (v. v. DC.).
44. *H. LOREUM* (L. sp. 1593.) caule repente elongato, foliis recurvis lanceolatis squarrosis valde acuminatis concavis serratis striatis basi breviter binerviis, capsula globoso-ovatâ cernuâ, operculo conico apiculato. ♀ in locis umbrosis siccioribus. — Fl. fr. 2. p. 559. eng. bot. t. 2072. musc. brit. t. 26. — Dill. musc. t. 39. f. 40. — Vaill. bot. t. 25. f. 2. Folia saepè subsecunda. (v. v.).
45. *H. STELLATUM* (Schreb. lips. p. 92.) caule ramoso saepius procumbente, foliis laxis squarrosis cordatis acuminatissimis integris nervis 2 brevibus instructis, capsula oblongo-ovatâ incurvâ cernuâ, operculo conico apiculato. ♀ in montanis. — Musc. brit. t. 26.
- a. *majus* (Hook. et Tayl.) caulibus elongatis laxis, foliis lucidis luteo-brunneis. — In paludibus et pratis turfosis. — *H. stellatum* Fl. fr. 2. p. 532. eng. bot. t. 1302. — Dill. musc. t. 39. f. 35. — Vaill. bot. t. 28. f. 10.
- b. *minus* (H. et T.) caulibus minoribus ramosis et cespitosis, foliis viridiibus recurvis. — In rupibus et muris, rarò fructificans. — *H. squarrosum* eng. bot. t. 1709. non Brid. *H. protensum* Brid. musc. II. p. 2. t. 2. f. 3. (v. s.).
46. *H. SQUARROSULUM* (Brid. musc. v. 2. p. 2. t. 4. f. 2.) caule repente procumbente vagè ramoso, foliis laxis squarresis cordatis acuminatissimis integris, nervo ultra medium producto, capsula oblongo-ovatâ incurvâ cernuâ, operculo conico. ♀ in sylvis montanis. — Fl. fr. 2. p. 529. *H. polymorphum* musc. brit. p. 26. non Hedw. *H. chrysophyllum* Brid. musc. 2. t. 2. f. 2. A priori non diversum suspicatur cl. Arnott. in not. mss. — Rarò fructificat. (v. v.).
47. *H. HALLERI* (L. syst. 952.) caule repente, ramulis conferto-approximatis

560 ACOTYL. SEU CELLULARES. UTRUM.

erectisensulis, foliis imbricatis undique recurvis ovato-acuminatis serrulatis subnerviis, capsula cernua, operculo conico. ♀ ad muros et rupes Alpinum, Jurassi ex Brid., agri Sytici (cl. L. Dufour). — Fl. fr. 2. p. 530. Hedw. sp. cr. 4. t. 21. (v. s.)

48. *H. DIMORPHUM* (Brid. sp. musc. 2. p. 149.) caule ascendentem diviso, ramis fasciculatis, foliis primariis cordato-acuminatis reflexusculis, rameis dense imbricatis subrotundis integerrimis subnerviis obtusiusculis concavis, capsula oblonga cernua, operculo obtuse conico subapiculato. ♀ ad terram in montanis Alpium, Jurassi. — Fl. fr. 5. n. 233. (v. v.)

49. *H. SQUARROSUM* (L. sp. 1593.) caule ascendentem ramoso subpinnato, foliis squarrosis late cordatis apice acuminatis recurvis serratis integrusculisve basi breviter binerviis, capsula ovato-globosa cernua, operculo conico brevi. ♀ in sylvis et pratis humidis. — Fl. fr. 2. p. 529. eng. bot. t. 1953. musc. brit. t. 26. — Dill. musc. t. 39. f. 28. et 39. — Vaill. bot. t. 27. f. 5. (v. v.)

50. *H. BREVIROSTRUM* (Ehr. exsicc. 85.) caule vagè ramoso, ramis gracilescientibus incurvis, foliis patentissimis cordato-ovatove-concavis in acumen subflexuosum coarctatis-serrulatis, nervis duobus divergentibus brevissimis instrutis, capsula ovata ventricosa cernua, operculo conico-incurvo apiculato. ♀ in sylvis siccioribus. — Fl. fr. 5. p. 231. *H. triquetrum* ♂ minus Hook. et Tayl. musc. brit. p. 108. (v. v. DC.)

51. *H. TRIQUETRUM* (L. sp. 1589.) caule vagè pinnatumque ramoso, ramis gracilescientibus incurviusculis, foliis imbricato-patulis triquetris lanceolatis planis striatis serrulatis basi binerviis, capsula oblonga arcuatà nutante, operculo conico recto. ♀ in sylvis pratis pomariisque frequens. — Fl. fr. 2. p. 531. eng. bot. t. 1622. musc. brit. t. 26. — Dill. musc. t. 38. f. 28. Vaill. bot. t. 28. f. 9. (v. v.)

IV. Folia secunda (Adunca Arn.).

52. *H. MEDIUM* (Dicks. cr. fasc. 2. p. 12.) caule gracili repente, foliis ovatis obtusis concavis integris margine recurvis, nervo apicem attingente, capsula cylindrica subiecta, operculo conico. ♀ in sylvis ad radices et truncos arborum. — Eng. bot. t. 1274. musc. brit. t. 24. *H. inundatum* Dicks. *Leskea polycarpa* Ehr. Brid. musc. 3. t. 6. f. 4. Fl. fr. 2. p. 516. *Pterigynandrum medium* Brid. in DC. fl. fr. 2. p. 462. — Dill. musc. t. 47. f. 65. *Folia opaca*. (v. v.)

53. *H. ATTENUATUM* (Arn. disp. meth. p. 67. non Dicks. nec Sm.) caule repente vagè ramoso, ramis incurvis apice attenuatis incrassatisque, foliis secundis ovato-lanceolatis, nervo apicem subattingente, capsula erecta oblongo-cylindracea, operculo conico acuminato. ♀ ad radices arborum, rarissime fructificans. — *Leskea attenuata*. Fl. fr. 2. p. 517. excl. syn. Dicks. (v. s.)

54. *H. PALUDOSUM* (Arn. disp. meth. p. 67.) caule repente ramoso, ramis subsimplicibus erectis, foliis subsecundis ovato-lanceolatis concavis, nervo infra apicem evanido, capsula subcylindrica subnntante, operculo conico obtusiusculo. ♀ ad arborum radices in inundatis Galliae orientalis agro Genevensi finitinis. — *Leskea paludosa*. Hedw. musc. frond. 4. t. 1. Brid. sp. musc. 2. p. 75. excl. syn. Dicks. Sm. etc. (v. s.)

55. *H. ATRO-VIRENS* (Dicks. crypt. 2. p. 10.) caule procumbente vagè ramoso, foliis secundis late ovatis obtuse acuminatis, nervo apicem subattingente, capsula ovata cernua, operculo conico. ♀ ad saxa humida et arborum radices in prænptis Vogesorum præsertim in montibus Ballon de Servance et Rotabac (cl. Mong. et Nestl.). — Eng. bot. t. 2422. musc. brit. t. 26. *H. attenuatum* Dicks. (non *Leskea attenuata* Hedw.). *Leskea incurvata* Hedw. sp. musc. t. 53. (v. s.)

56. *H. FILICINUM* (L. sp. 1590.) caule subpinnato, foliis imbricatis late ovatis acuminatis serratis nervo apicem attingente (præsertim superioribus) falcato-secundis, capsula oblongo-ovata incurva cernua, operculo conico brevi. ♀ in pratis et sylvis humidis. — Fl. fr. 2. p. 523. Hedw. sp. t. 76. f. 5-10.

- musc. brit. t. 26. *H. dubium* Sw. Fl. fr. 5. p. 229. *H. fallax* Brid. musc. 3. t. 2. f. 1. *H. Vallis-clausæ* Brid. Fl. fr. 5. p. 229. *H. Seligeri* Brid. *H. compressum* Fl. fr. 2. p. 523. non L. — Dill. musc. t. 36. f. 19. — Vaill. bot. t. 29. f. 9. (v. v.)
57. *H. commutatum* (Hedw. st. cr. 4. t. 26.) caule pinnato, foliis falcato-secundis cordatis acuminatissimis serratis margine reflexis, nervo infra apicem evanido, capsula oblongo-ovata incurvâ cernuâ, operculo conico subacuto. ♀ in paludibus et rivulis. — Eng. bot. t. 1589. Musc. brit. t. 27. *H. glaucum* Lam. dict. 3. p. 170. Fl. fr. 2. p. 522. — Dill. musc. t. 36. f. 19. Præcedenti majus et minus rigidum; folia siccitate contorta. (v. v.)
58. *H. palustre* (L. sp. 1693. non Hoffm.) caule repente, ramis erectis simplicibus, foliis secundis ovatis subacuminatis concavis integris marginibus supernè incurvis, nervo brevi saepius furcato interdùm obsoleto, capsula oblongo-ovata cernuâ, operculo conico acuto. ♀ in paludibus et ad margines rivorum. — Fl. fr. 2. p. 526. musc. brit. t. 26. *H. luridum* Hedw. st. cr. 4. t. 38. *H. molendinarium* Fl. fr. 2. p. 538. *H. subsphaerocarpon* Brid. Fl. fr. 5. p. 230. *H. adnatum* eng. bot. t. 2406 non Hedw. — Dill. musc. t. 37. f. 27. Folia flaccida plerumque lurida interdùm lutescentia. Polymorpha species. (v. v.)
59. *H. aduncum* (L. sp. 1592.) foliis falcato-secundis lanceolato-subulatis concavis aut subsemicylindricis integris, nervo infra apicem evanido, capsula oblongo-ovata incurvâ cernuâ, operculo conico. ♀ in paludibus, fossis et sylvis humidis. — Musc. brit. t. 26.
- a. revolvens* (Hook. et Tayl.) foliis angustis admodum falcatis. — *H. aduncum* Hedw. st. cr. 4. t. 24. Fl. fr. 2. p. 527. *H. revolvens* Sw. musc. 101. t. 7. f. 14. Fl. fr. 2. p. 527. — Dill. musc. t. 37. f. 26. (v. v. sine fr.)
β. lycopodioides, foliis latioribus minus falcatis rugosiusculis. — *H. lycopodioides* Brid. supp. 2. p. 227. Fl. fr. 5. p. 231. *H. diastrophylum* Fl. fr. 2. p. 528. non Sw. *H. rugosum* L. mant. 131. eng. bot. t. 2250. non Hedw. nec Schw. — Dill. musc. t. 37. f. 24. Rarissime fructificat. (v. v. sine fr.)
60. *H. fluitans* (L. sive ed. 2. p. 399.) caule gracili ramoso, foliis laxè imbricatis lanceolato-subulatis apice subserrulatis superioribus falcato-secundis, nervo ultra medium producto, capsula ovato-oblonga incurvâ cernuâ, operculo conico acuto. ♀ in aquis limpidis stagnantibus, rarissime et tantum in locis interdùm inundatis fructificans. — Fl. fr. 2. p. 527. Hedw. st. cr. 4. t. 36. — Dill. musc. t. 38. f. 33. — Vaill. bot. t. 33. f. 6. (v. v. sine fr.)
61. *H. falcatum* (Brid. musc. rec. v. 2. p. 2. t. 1. f. 6.) caule repente, ramis erectis elongatis inordinate pinnatis, foliis oblongo-lanceolatis carinatis acuminatis falcato-secundis, nervo apicem subattigente, capsula cylindrica inaequali, operculo conico. ♀ in uliginosis Alpium, rarissime fructificans. — Fl. fr. 2. p. 525. Schw. supp. 2. t. 145. (v. s. ex Helv.)
62. *H. uncinatum* (Hedw. st. cr. 4. t. 5.) caule procumbente subpinnato, foliis falcato-secundis lanceolato-subulatis serratis striatis, nervo infra apicem evanido, capsula cylindrica incurvâ cernuâ, operculo conico mucronolato. ♀ in sylvis montosis ad radices arborum. — Fl. fr. 2. p. 525. eng. bot. t. 1600. musc. brit. t. 26. (v. v.)
63. *H. rugosum* (Hedw. st. cr. 4. t. 33. f. A. non L.) caule ramisque erectis, foliis imbricatis secundis ovato-lanceolatis serratis planiusculis siccitate transversè rugosis margine recurvis, nervo medium attingente. ♀ in sylvis et montanis. — Fl. fr. 2. p. 528. *H. rugulosum* Web. et Mohr. musc. brit. t. 26. Fructificatio nondum visa fuit. (v. v. s. fr.)
64. *H. scorpioides* (L. sp. 1592.) caule ascendentе subpinnato, ramis ad apicem incurvis, foliis secundis latè ovatis ventricosis obtusis integris enerviis, capsula oblongo-ovata incurvâ cernuâ, operculo conico. ♀ in paludibus. — Fl. fr. 2. p. 528. eng. bot. t. 1039. musc. brit. t. 27. Rarissime fructificat. (v. v. s. fr.)

562 ACOTYL. SEU CELLULARES.

65. *H. REPENS* (Poll. pal. n. 1051. ic.) caule repente, foliis laxè imbricatis secundis angustè lanceolatis acuminatis serratis enerviis aut obscure 2-nerviis, capsulâ subcylindricâ erecto-cernuâ, operculo conico obtuso. \mathcal{U} in truncis putridis sylvarum Alsatiæ, Vogesorum. — Fl. fr. 2. p. 537. et 5. p. 234. *H. Silesianum* Pal. de Beauv. Schw. supp. t. 94. eng. bot. t. 2016. musc. brit. t. 27. *Leskea Seligeri* Brid. Fl. fr. 2. p. 515. (v. s.)
66. *H. PULCHELLUM* (Dicke. crypt. 2. t. 5. f. 6.) caule erecto subconfertim ramoso compressiusculo, foliis adpressè imbricatis lanceolato-acuminatis integris enerviis, superioribus subsecundis, capsulâ ovato-cylindricâ suberectâ, operculo conico. \mathcal{U} propè Burdigalam ex Brid. — Eng. bot. t. 2006. musc. brit. t. 25. *Leskea pulchella* Hedw. sp. t. 55. f. 7-12. (v. s. ex Helv.)
67. *H. CUPRESSIFORME* (L. sp. 1592.) caule procumbente ramoso, foliis dense imbricatis plus minus falcato-secundis lanceolatis integris aut apice serratis obsoletè basi 2-nerviis, capsulâ cylindricâ erecto-cernuâ, operculo conico mucronulato. \mathcal{U} ad terram saxa truncosque frequens. — Musc. brit. t. 27.
- a. vulgare* (Hook. et Tayl.) caulibus latioribus semicylindricis, foliis falcato-secundis. — *H. cupressiforme* Hedw. st. er. 4. t. 23. Fl. fr. 2. p. 525. eng. bot. t. 1860. — Dill. musc. t. 37. f. 23 et t. 41. f. 53. — Vail. bot. t. 27. f. 13. (v. v.)
- b. compressum* (Hook. et Tayl.) caule tenui compresso, foliis falcato-secundis. — *H. compressum* L. mant. 310. non Fl. fr. — Dill. musc. t. 36. f. 22. (v. v.)
- c. tenue* (Hook. et Tayl.) caulibus tenuissimis, foliis subincurvis angustè lanceolatis integris. — *H. polyanthos* eng. bot. t. 1664. non Schreb. (v. v.)
68. *H. INCURVATUM* (Schrad. crypt. n. 80.) caule repente, ramulis confertis erectis apice incurvis, foliis laxè imbricatis lanceolato-subulatis integerrimis basi obsoletè binerviis, capsulâ ovatâ cernuâ, operculo conico brevi. \mathcal{U} ad terram in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 526. *H. amoenum* Hedw. sp. t. 77. f. 6-9. An *H. cupressiformis* var? (v. s.)
69. *H. POLYANTHOS* (Schreb. spic. 97.) caule repente ramoso, ramis confertis, foliis imbricatis lanceolato-subulatis acuminatis enervibus, capsulâ erectâ ovatâ, operculo conico incurvo. \mathcal{U} in sylvis ad radices arborum. — *Leskea polyantha* Hedw. st. er. 4. t. 2. Brid. sp. musc. 2. p. 74. excl. syn. angl. Fl. fr. 2. p. 515. — Dill. musc. t. 42. f. 62. (v. v.)
70. *H. MOLLUSCUM* (Hedw. st. cr. 4. t. 22.) caulibus ramosis suspectinatis, foliis falcato-secundis cordatis acuminatissimis serratis extriatis obsoletè basi binerviis, capsulâ oblongo-ovatâ incurvâ cernuâ, operculo conico acento. \mathcal{U} in sylvis humidis et turfosis. — eng. bot. t. 1327. musc. brit. t. 27. *H. cristacastrensis* Fl. fr. 2. p. 524. non L. — Dill. musc. t. 36. f. 60. (v. v.)
71. *H. CRISTA-CASTRENSIS* (L. sp. 1591.) caule dense pectinato, foliis falcato-secundis ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis striatis obsoletè basi binerviis, capsulâ oblongo-ovatâ incurvâ cernuâ, operculo conico mucronulato. \mathcal{U} in sylvis humidis. — Hedw. sp. musc. t. 76. f. 1-4. eng. bot. t. 2108. musc. brit. t. 27. *H. Hedwigii* Fl. fr. 2. p. 524. (v. v.)

Sect. II. *PERISTOMA SIMPLEX* (exceptis Orthothricis nonnullis et Buxbaumia).

+ CALYPTRA DIMIDIATA.

XIV. *LEUCODON* Schw. supp. p. 2. p. 1. Hook. et Tayl. musc. brit. t. 2. — *Dicranis sp. DC.*

Seta lateralis, peristoma simplex, dentibus 32 angustis, per paria basi coalitis; calyptra dimidiata.

1. *L. SCRUBOIDES* (Schw. I. c.) caule repente, ramis ascendentibus, foliis dense

imbricatis concavis ovato-cordatis acuminatis striatis enervis, capsula oblonga,
operculo rostrato. \mathcal{U} ad truncos vetustos frequens. — Muse. brit. t. 20. L.
morensis Schw. supp. t. 125. Dicranum sciuroides Sw. Fl. fr. 2. p. 479. D.
myosuroides Fl. fr. 5. p. 222. Fissidens sciuroides Hedw. fund. 2. t. 8. f. 45.
46. — Dill. musc. t. 41. f. 54. — Vaill. bot. t. 27. f. 12. (v. v.)

XV. PTERIGYNANDRUM *Hedw.* *musc. frond.* 4. p. 16. — *Pterogonium Sw.*
Schw. Hook. et Tayl. musc. brit. t. 2. — *Hypni sp. L.*

Seta lateralis; peristoma simplex dentibus 16 integris æqualiter dis-
tantibus acutis erectiusculis; calyptora dimidiata.

1. *P. GRACILE* (*Hedw. musc. frond.* 4. t. 6.) rāmis fasciculatis incurvis, foliis
latè ovatis acutis concavis margine planis apice serratis basi obsoletè biner-
viis, capsula oblonga, operculo conico. \mathcal{U} ad truncos et rupes in montanis.
— Fl. fr. 2. p. 461. *Pterogonium gracile Sw.* eng. bot. t. 1085. musc. brit.
t. 14. — Dill. musc. t. 41. f. 55. (v. v.)
2. *P. FILIFORME* (*Hedw. musc. frond.* 4. t. 7.) caule vagè ramoso incurvo, foliis
ovatis subacuminatis concavis margine recurvis serratis, nervo brevi obsoleto
simplici aut furcato, capsula cylindracea, operculo conico. \mathcal{U} in sylvis mon-
tanis. — Fl. fr. 2. p. 461. *P. heteropterum Moug. et Nest.* cr. n. 714? *Pterog.*
filiforme eng. bot. t. 2297. musc. brit. t. 14. (v. v.)
3. *P. REPENS* (*Brid. sp. musc. t. p. 131.*) caule repente ramoso, ramis confer-
tis erectis, foliis dense imbricatis ovato-lanceolatis acuminatis nervis 2 bré-
vissimis obsoletis basi instructis, capsula erecta ovata, operculo conico obli-
quo. \mathcal{U} in Delphinatū (cl. Dejean ex Brid.), ad truncos Pini sylvestris circà
Argentoratum (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 816.). — Arn. disp. meth. p. 49.
(v. s.)
4. *P. STRIATUM* (*Schw. supp. t. 27.*) caule repente subpinnato, foliis imbrica-
tis adpressis lanceolatis longè acuminatis bistratiis integris, nervo apicem
subattigente, capsula erecta cylindrica, operculo conico apice obtusiusculo.
 \mathcal{U} ad truncos arborum in Vogesis, Jurasso, Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 214.
P. mutabile Brid. meth. p. 129. (v. s.)
5. *P. SMITHII* (*Sw. in Schrad. journ. 2. p. 173.*) caule ramosissimo, ramis
pinnatis, foliis lingulatis obtusis integris siccitate crispis margine recurvis,
nervo ferè ad medium producto, seta brevissimā subincurvā, operculo ro-
strato. \mathcal{U} ad arborum truncos in provinciis australibus et austro-occidentalib-
us. — Fl. fr. 2. p. 462, et 5. p. 214. eng. bot. t. 326. musc. brit. t. 14.
Leptodon Smithii Mohr. Hypnum Smithii Dicks. cr. 2. t. 5. f. 4. Calyptra
hispida. (v. v.)

XVI. FABRONIA *Raddi act. flor. Schw. supp. 1. p. 337. Brid. meth. t. 1. f. 7.*

Theca erecta ovato-urceolata; peristoma simplex, dentibus 16 co-
riaceis per paria approximatis introrsum flexis; calyptora dimidiata.

1. *F. RUSILLA* (*Schw. supp. 1. c. t. 99.*) caule repente vagè ramoso, foliis sparsis
patulis lato-lanceolatis serrato-ciliatis enervibus, operculo convexo rostrato.
— In cavitatibus rupium circà Rodez (cl. Requier), Mimatem (cl. Prost). —
Dense cespitosa. (v. s.)

XVII. TORTULA *Schreb. gen. pl. n. 1647. Hook. et Tayl. musc. brit. t. 11. Hook.*
et Grev. in Edinb. journ. sc. 1. p. 287. non Roxb. — *Tortula et Barbula Hedw.*
Barbula et Syntrichia Brid. meth.

Seta terminalis; peristoma simplex dentibus 32 spiraliter fortis ad
basin magis minusve in membranam tubiformem unitis vel liberis;
calyptora dimidiata.

I. Foliis enervibus.

1. *T. ENERVIS* (*Hook. et Grev. 1. c. p. 288.*) caule brevissimo; foliis paucis lin-

gulatis obtusissimis concavis enervibus rigidis marginibus involutis, operculo conico-acuminato capsula oblonga subbreviore. (I) ? ad muros limosos et in collibus apicis. — T. rigida eng. bot. t. 180. Fl. fr. 2. p. 183. non Sm. et excl. syn. Dill. Barbula rigida Hedw. st. cr. 1. t. 25. (v. v.)

II. Foliis crassinervibus.

1. T. RIGIDA (Turn. musc. hib. p. 43. non DC. nec Sw.) caule brevissimo, foliis paucis linearibus incurvis submucoconulatis canaliculatis nervosis rigidis marginibus involutis, capsula oblonga operculo rostrato subdimidio longiore. (I) ? in argillosis. — musc. brit. t. 12. Trichostomum aloides Moug. et Nestl. vog. n. 717. Bryum rigidum Huds. ang. p. 477. — Dill. musc. t. 49. f. 55. Peristomatis dentes breves distantes parum contorti. (v. s.)

III. Foliis tenuinervibus.

* *Foliis perichaetialibus arctè convolutis.*

3. T. CONVOLUTA (Sw. musc. suec. 41.) caule breviusculo, foliis oblongo-lanceolatis acutis marginibus planis, perichaetialibus insigniter convolutis, capsula oblonga, operculo rostrato. ♀ ad fossas viasque. — eng. bot. t. 2382. musc. brit. t. 12. Fl. fr. 2. p. 485. Barbula convoluta Hedw. st. cr. 1. t. 32. Trichostomum flavidum DC. fl. fr. 5. p. 215. Canes ramosi, setæ longæ pallide flavæ. (v. v.)
4. T. REVOLUTA (Web. et Mohr. cr. 210.) caule brevi, foliis lanceolatis acutis marginibus insigniter revolutis, perichaetialibus vaginantibus involutis, capsula oblonga, operculo rostrato capsula breviore. ♀ ad rupes Alpium et montis Donnersberg. — Fl. fr. 5. p. 224. musc. brit. t. 12. T. nervosa eng. bot. t. 2383. Barbula revoluta Schw. supp. t. 32. Moug. et Nestl. vog. n. 218. B. obtusifolia Schw. supp. t. 31. B. Hornschuchiana Schultz. (v. s.)

* * *Foliis perichaetialibus basi vaginantibus subulatis.*

5. T. TORTUOSA (Schrad. spic. 54.) caule elongato ramoso, foliis patentibus linearis-subulatis carinatis undulatis siccitate crispatis, capsula cylindracea, operculo longirostrato. ♀ ad radices vetustarum arborum in montanis. — Fl. fr. 2. p. 482. musc. brit. t. 12. Barbula tortuosa Schw. supp. t. 33. Bryum tortuosum L. — Dill. musc. t. 48. f. 40. — Hall. helv. t. 45. f. 2. Caulis ramosus. (v. v.)
6. T. NERVOSA (Brid. sp. musc. 1. p. 262.) caule breviusculo ramoso, foliis erectiusculis carinatis subundulatis siccitate crispatis linearibus basi latioribus, capsula oblongo-cylindracea subcurvatâ, operculo longirostrato. ♀ in glareosis ad muros et terram humidam passim. — Fl. fr. 2. p. 483. T. inclinata Hedw. f. in Web. et Mohr. beytr. 1. t. 5. Fl. fr. 5. p. 223. Barbula inclinata Schw. supp. t. 33. Funck. deutsch. moos. t. 15. f. 10. (v. s.)

* * * *Foliis uniformibus piliferis.*

7. T. CHLORONOTOS (Brid. sp. musc. 1. p. 253.) caule brevi, foliis latè ovatis albo membranaceis in pilum longum acuminatis, nervo viridi supernè valde incrassato, capsula suberecta oblonga, operculo rostrato. ♀ in terra ochracea in Pyrenæis orientalibus ex cl. Bridel, in muris et rupibus Mimatis (cl. Prost), Parisiorum ex P. de Beauv. — T. membranifolia Hook. musc. exot. t. 26. B. chloronotos et B. membranifolia Schultz in nov. act. acad. 11. t. 34. f. 3. et 30. (v. s.)
8. T. MURALIS (Hedw. sp. musc. p. 123.) caule breviusculo, foliis patentibus anguste oblongis marginibus recurvatis, nervo valido in pilum incanum longiusculum producto, capsula oblongo-cylindracea, operculo conico acuminato. ♀ ad muros saxaque frequens. — Fl. fr. 3. p. 482.
 - a. *vernalis*, foliis carinatis pilo longo albo. — T. muralis eng. bot. t. 2033. musc. brit. t. 12. T. pilosa Schrad. Fl. fr. 2. p. 418. B. Vahliana Schultz. in nov. act. acad. cæs. 11. t. 31. (v. v.)

f. aestiva (Brid.) foliis planiusculis inferioribus apiculatis, superioribus pilo brevi. — *B. mutica* Brid. (v. s.)

9. *T. RURALIS* (Sw. musc. 39.) caule elongato, foliis ovato-oblongis carinatis patent-recurvatis margine recurvo, nervo in pilum longum desinente, capsula cylindrica erecto-curvatâ, operculo subulato, peristomate usque ad medium tubiformi. ♀ ad muros, agros, tecta straminea. — Fl. fr. 2. p. 483. et 5. p. 223. *Bryum rurale* L.

a. vulgaris (Hook. et Grev.) foliis acutiusculis, pilo plerumqñē hispidulo. — *T. ruralis* eng. bot. t. 2070. musc. brit. t. 12. — Dill. musc. t. 45. f. 12. — Vaill. bot. t. 25. f. 3. (v. v.)

f. lævipila (Hook. et Grev.) foliis obtusioribus medium versus contractis, pilo plerumqñē lævi. — *T. lævipila* Schw. supp. t. 120. (v. s.)

* * * * *Foliis uniformibus mucronatis, perigonio ultrâ medium tubiformi.*

10. *T. MUCRONIFOLIA* (Schw. supp. 1. t. 34.) caule longiusculo subramoso, foliis oblongis acutiusculis mucronatis suberectis carinatis pellucidis margine paululum recurvatis, capsula cylindraceâ, operculo conico rostrato, peristomate ultrâ medium tubiformi. ♀ in Pyrenæis orientalibus ex Brid. — *Syntrichia mucronifolia* Brid. Schultz. I. c. 11. t. 34. f. 2. Funck. deutsch. moos. t. 16. f. 2. (v. s. ex Helv.)

11. *T. ALPINA* (Arn. disp. meth. p. 38.) caule erecto ramoso fastigiato, foliis oblongo-lanceolatis acutis strictis, supremis siccitate apice incurvis, capsula cylindrica erecto-cernuâ, operculo conico subulato. ♀ in Pyrenæis ex Brid. — *Syntrichia Alpina* Brid. meth. p. 97. Setæ semi-uncia vix longiores nigricantes. (v. s. ex Helv.)

12. *T. SUBULATA* (Hedw. sp. musc. t. 27.) caule brevissimo subsimplici, foliis erecto-patentibus oblongo-lanceolatis apiculatis margine plano, capsula cylindrica erecto-curvatâ, operculo subulato, peristomate ad apicem ferè tubiformi. ♀ in aggeribus, viis cavis, fissuris rupium frequens. — Fl. fr. 2. p. 481. eng. bot. t. 1101. musc. brit. t. 12. (v. v.)

* * * * * *Foliis uniformibus mucronatis, peristomatis dentibus ferè omnino liberis.*

13. *T. UNGUICULATA* (Hedw. st. cr. 1. t. 23.) caule elongato ramoso, foliis oblongo-lanceolatis subcarinatis obtusis nervo producto apiculatis, margine subrecurvo, capsula oblongo-ovatâ, operculo longe rostrato capsulam subæquante. ♀ in muris et collibus aridis. — Fl. fr. 2. p. 484. musc. brit. t. 12. *T. aristata* et *T. barbata* eng. bot. t. 2393. et 2391. *T. apiculata* Hedw. sp. musc. t. 26. *Barb. lanceolata* et *B. stricta* Hedw. sp. t. 26. Dill. musc. t. 48. f. 48. 49. (v. v.)

14. *T. CUNEIFOLIA* (Roth. germ. 3. p. 213.) caule subnullo, foliis latissimè obovatis concaviusculis pellucidis, nervo in mucronem longiusculum excurrente, capsula oblongâ, operculo brevi rostrato, peristomatis ciliis basi paulisper unitis. ♀ in Pyrenæis (DC. ex Hook. et Grev.) — Eng. bot. t. 1510. musc. brit. t. 12. *Barb. Dicksoniana* Schultz. — Dill. musc. t. 45. f. 15. (v. s. ex Angl.)

* * * * * *Foliis uniformibus muticis.*

15. *T. FALLAX* (Sw. musc. suec. p. 40.) caule elongato ramoso, foliis lanceolatis acuminatis carinatis patentibus vel recurvis, marginibus reflexis, capsula oblongâ, operculo longe rostrato capsulam subæquante. ♀ ad muros et ambulacra. — Fl. fr. 2. p. 484. musc. brit. t. 12. *Barb. fallax* Hedw. st. cr. 1. t. 24. *B. brevicaulis* Schw. supp. 1. t. 32. *B. Saussuriana* Brid. *Didymodon rigidulum* DC. fl. fr. 2. p. 465. non Hedw. *Bryum linoides* Dicks. cr. 3. t. 8. f. 3. — Dill. musc. t. 46. f. 48-47. Valde polymorpha species, caulis ex uicia ad semipollucem et ultrâ varians. (v. v.)

16. *T. GRACILIS* (Hook. et Grev. in edinb. journ. sc. p. 300.) caule elongato subramoso, foliis lanceolato-acuminatis erectis rigidis siccitate strictissimis, margine recurvato, capsula oblongo-ovatâ, operculo rostrato breviusculo. ♀ —

566 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Ad saxa et terram arenosam in Gallia boreali (cl. Mong. et Nestl. vog. n. 819.). — Barb. gracilis Schw. supp. t. 34. T. brevifolia eng. bot. t. 2453. (v. s.)

17. *T. PALUDOSA* (DC. fl. fr. 5. p. 223.) caule elongato ramoso dense cespitoso, foliis subpatentibus lanceolatis acutis planiusculis marginibus planis, capsula cylindracea, operculo longe subulato. \mathcal{U} in uidis Jurassi. — Barb. paludosa Schw. supp. 1. t. 30. Schultz. in nov. act. ac. cæs. 11. t. 33. f. 19. (v. s.)

XVIII. DIDYMODON Sw. musc. suec. 28. Hook. musc. brit. t. 2.

Seta terminalis; peristoma simplex dentibus 16 aut 32 per paria approximatis aut basi subcoalitis; calyptra dimidiata.

I. Foliis latis ovatis vel lingulatis.

1. *D. APICULATUM* (Arn. disp. meth. p. 36.) caule humili subramoso, foliis ovato-oblongis concavis integris nervo ultrâ apicem excurrente apiculatis aut piliferis, capsula erecta ovato-oblonga, operculo rostrato. \mathcal{U} ad saxa Alpium. — Trichostomum latifolium Hedw. st. cr. 1. t. 35. Fl. fr. 5. p. 217. Dicranum latifolium musc. brit. t. 16. (v. s. ex Helv.)

II. Foliis lanceolatis vel subulatis.

* *Caule subelongato ramoso.*

2. *D. PURPUREUM* (Hook. et Tayl. musc. brit. p. 63. t. 20.) caule subramoso, foliis lanceolatis acuminatis carinatis margine recurvis integris, capsula ovato-cylindracea obliqua substrumosa siccâ sulcatâ, operculo conico. \mathcal{U} ad terram, muros saxaque frequens. — Dicranum purpureum Hedw. fund. 2. t. 4. f. 17. sp. t. 36. Fl. fr. 2. p. 476. D. erythropum DC. fl. fr. 2. p. 477. D. viridissimum DC. fl. fr. 5. p. 221. non Sm. D. Celsii eng. bot. t. 2418. Seta theca foliorumque nervi purpurascentes. (v. v.)
3. *D. LURIDUM* (Hornsch. in Spreng. syst. 4. p. 173.) caule erecto simpliciculo, foliis ovatis acutis integrerrimis ad marginem utramque plicatis siccitate tortilibus, nervo apicem attingente, capsulae oblongae operculo subulato. \mathcal{U} ad mænio Argentorati et in ripibus siliceis ad ripam dextram Mosellæ infra Spinalium (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 818.). — D. trifario Brid. valde affine (Moug. in litt. (v. s.)
4. *D. RIGIDULUM* (Hedw. st. cr. 3. t. 4. non DC. fl. fr.) foliis dense imbricatis lanceolatis acuminatissimis carinatis, nervo rigido ultrâ apicem producto, capsula oblongo-ovata erecta, operculo rostrato. \mathcal{U} ad terram et muros in Gallia orientali. — Musc. brit. t. 20. Trichostomum rigidulum eng. bot. t. 2178. Habitus omnino Tortulæ fallacis. (v. s.)
5. *D. GLAUCESCENS* (Web. et Mohr. tasch. p. 158.) caule humili subramoso erecto, foliis glaucescentibus anguste lanceolatis longe acuminatis patulis, nervo usque ad apicem producto, capsula oblonga, operculo oblique conico. \mathcal{U} ad terram in sylvis Alpium Delphinatus ex Vill., Mimatis (cl. Prost). — Trichostomum glaucescens Hedw. musc. frond. 3. t. 37. f. B. Fl. fr. 5. p. 216. (v. s.)
6. *D. OSCURUM* (Schw. supp. 2. p. 1. t. 124.) caule erecto ramoso, foliis patulis lanceolatis acuminatis serratis siccitate tortilibus, nervo valido apicem attingente, capsulae oblongae operculo oblique rostrato. \mathcal{U} in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.). — Dicranum Bruntoni eng. bot. t. 2509. Dicr. polycarpon Hook. musc. brit. t. 18. Weissia cirrhata Moug. et Nestl. vog. n. 406. non Hedw. ex ipso cl. Mongeot. (v. s.)
7. *D. CAPILLACEUM* (Sw. musc. suec. 28.) caule ramoso elongato dense cespitoso, foliis subdistichis setaceo-subulatis, capsula erecta ovato-cylindracea, operculo conico. \mathcal{U} in locis uidis et turfosis Alpium. — Fl. fr. 2. p. 463. musc. brit. t. 20. Swartzia capillacea Hedw. st. cr. 2. t. 26. Cynodontium capillaceum Schw. (v. v.)

8. *D. FLEXICAULE* (DC. fl. fr. 5. p. 215.) caule longissimo flexuoso erecto subramoso, foliis lanceolato-subulatis subsecundis, nervo continuo obsoleto, capsula erecta obovato-cylindrica, operculo conico obliquo acutissimo. $\frac{1}{2}$ ad rupes umbrosas agri Mimatensis (cl. Prost), propè Falaise ex cl. de Bréb. — *Cynodontium flexicaule* Schw. supp. t. 29. (v. s.)
9. *D. LONGIROSTRAUM* (Web. et Mohr. tasch. p. 136.) caule longiusculo, foliis è latiore basi subulatis falcatis secundis, nervo lato obsoletissimo, seta flexuosa, capsula ovato-cylindrica, operculo conico elongato acuto. $\frac{1}{2}$ ad ligna putrida sylvarum in Vogesis et Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 215. *Cynodontium longirostrum* Schw. supp. t. 29. *Dicranum denudatum* Brid. (v. s.)
- * * *Caule brevi subsimplici.*
10. *D. HOMOMAELUM* (Hedw. sp. muse. t. 23. f. 1-7.) caule abbreviato subcespitoso, foliis subsecundis subulatis, theca erecta ovato-cylindracea, operculo conico. $\frac{1}{2}$ ad terram arenosam Vogesorum, agri Mimatensis, Pyrenzorum orientalium ex Brid., agri Syrtici propè Dax (cl. Grateloup). — Fl. fr. 2. p. 462. *D. heteromallum* musc. brit. t. 20. *Weissia heteromalla* Hedw. st. cr. 1. t. 8. Fl. fr. 5. p. 212. *Grimnia heteromalla* eng. bot. t. 1899. (v. v.)
11. *D. PUSILLUM* (Brid. musc. 2. t. 2. f. 4.) caule erecto simplici, foliis subulatis basi ovato-concavâ, capsula erecta oblonga, operculo obliquè rostrato. (I) in arenosis apricis Galloprovinciae (cl. Deleuze). — Fl. fr. 2. p. 464. excl. syn. Dicks. *Trichostomum pusillum* Hedw. st. cr. 1. t. 28. (v. s.)
12. *D. TORTILE* (Arn. disp. meth. p. 36.) caule humili subsimplici, foliis reflexis linear-eapillaceis tortilibus nervo instructis, basi latinœcula, capsula elongata recta, operculo conico subulato. (I) ad saxa Palatinatâ et probabiliter in Galliâ finitimâ. — *Trichostomum tortile* Schw. supp. t. 35. Fl. fr. 5. p. 216. *Dicranum tortile* Web. et Mohr. cr. t. 7. f. 12. 13. (v. s. è Palatinatû.)
13. *D. PALLIDUM* (Arn. disp. meth. p. 36.) caule erecto simplici, foliis subulato-capillaribus, capsula erecta subcylindracea, operculo obtusè conico. (I)? in lutosis nemorosis Galliæ occidentalis. — *Trichostomum pallidum* Hedw. st. cr. 1. t. 27. Schw. supp. 2. t. 123. (v. s.)

XIX. *DICRANUM* Schreb. gen. pl. n. 1544. Hook. musc. brit. p. 48. t. 2. — *Dicranum* et *Fissidens* Hedw.

Seta terminalis (aut in paucis lateralis?) ; capsula oblonga, apophysi interdùm donata; peristoma simplex dentibus 16 bifidis equidistantibus; calyptra dimidiata.

Sect. 1. *FISSIDENS* Hedw. musc. frond. 2. p. 91.

Folia seniora bifarie inserta, demùm carinâ alata apicemque versus conduplicata.

1. *D. VIRIDULUM* (Sw. musc. suec. p. 32. t. 2. f. 3.) foliis inferioribus obovatis, superioribus oblongo-lanceolatis, perichaetialibus conformibus, nervo ad apicem aut ultra apicem producto, seta terminali, capsula cernua. (I) in umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 479. *D. bryoides* musc. brit. t. 16. *D. palmatum* Sw. Arn.
- a. *exile* (Arn.) caule breviusculo simplici. — *Fissidens bryoides* Hedw. st. cr. 3. t. 29. *F. exilis* Hedw. sp. muse. t. 38. *Bryum viridulum* L. Dicks. crypt. 1. t. 1. f. 5. — Dill. muse. t. 34. f. 1. (v. v.)
- b. *osmundioides* (Arn.) caule elongato subramoso. — *Fissidens osmundioides* Hedw. sp. t. 40. *F. asplenoides* Hedw. musc. frond. t. 28. *Hypnum asplenoides* Dicks. cr. 2. t. 5. f. 5. (v. v.)
2. *D. ADIANTHOIDES* (Sw. musc. suec. 31.) caule elongato subramoso, foliis sublanceolatis spice plus minus serrulatis, perichaetialibus ovatis subconvolutis acuminatis, seta laterali flexuosa, capsula subcernua, operculo subulato. $\frac{1}{2}$ in pratis sylvisque uliginosis. — Fl. fr. 2. p. 480. musc. brit. t. 16. *Fis-*

568 ACOTYL. SEU CELLULARES. DICRANUM.

sidens adianthoides Hedw. st. cr. 3. t. 26. — Dill. musc. t. 34. f. 3. — Vaill. bot. t. 28. f. 5. (v. v.)

3. **D. TAXIFOLIUM** (Sw. musc. snc. 31.) caule brevi simplici, foliis ovato-lanceolatis apiculatis, perichaetialibus ovatis vaginantibus involutis acuminatis, seta radicali, capsula suberecta, operculo rostellato. \mathcal{U} in umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 480. musc. brit. t. 16. Fissidens taxifolius Hedw. sp. t. 39. — Dill. musc. t. 34. f. 2. — Vaill. bot. t. 24. f. 11. (v. v.)

Sect. II. EUDICRANUM. — Dicranum Hedw. fund. musc. 2. p. 91.

Folia undique inserta planiuscula.

* *Foliis enervibus laxè reticulatis.*

4. **D. GLAUCUM** (Hedw. fund. 2. p. 92.) caule elongato ramoso fastigiato, foliis erecto-patentibus imbricatis ovato-lanceolatis angustis enervis integris, capsula ovata cernua, operculo rostrato. \mathcal{U} in sylvis et ericetis, in prov. australibus tantum fructificans. — Fl. fr. 2. p. 475. musc. brit. t. 16. Schw. supp. t. 28. — Dill. musc. t. 46. f. 20. — Vaill. bot. t. 26. f. 13. Caules cespitosi densos albido-glaucos efformantes. (v. v. s. fr.)

* * *Foliis latè nervosis compactis.*

5. **D. CERVICULATUM** (Hedw. st. cr. 3. t. 37.) caule brevi, foliis lanceolato-subulatis integris subsecundis, nervo latissimo, theca ovata subcernua strumiferà, operculo oblique rostrato thecam subæquante. \mathcal{U} in turfosis Jurassi, et Vogesorum inferiorum (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 2. p. 476. musc. brit. t. 16. eng. bot. t. 1661. D. pusillum Hedw. st. cr. 2. t. 39. Densè cespitosum. (v. s.)

6. **D. LONGIFOLIUM** (Hedw. st. cr. 3. t. 9.) caule elongato, foliis longissimis subulato-setaceis falcato-secundis serrulatis, nervo latissimo, capsula oblongo-ovata suberecta, operculo rostrato capsulae longitudine. \mathcal{U} in rupestribus humidis umbrosis Alpium, montis Pilati et Jurassi ex Brid., Vogesorum. — Fl. fr. 5. p. 220. musc. brit. t. 16. (v. s.)

* * * *Foliis angustè nervosis.*

7. **D. VIXENS** (Hedw. st. cr. 3. t. 32.) caule elongato, foliis basi latis vaginatis subulatis margine recurvis siccitate crispis, capsula lævi oblongo-cylindrica subcernua strumiferà, operculo rostrato. \mathcal{U} in Alpibus Delphiniatùs? — Musc. brit. t. 17. eng. bot. t. 1642. (v. s. ex Helv.)

8. **D. STRUMIFERUM** (Ehr. exsicc. 74.) caule elongato, foliis basi latis vaginatis subulatis integris margine planis siccitate crispis, capsula sulcatà oblongo-ovata subcernua apophysi hinc gibbosâ, operculo rostrato. \mathcal{U} in pratis humidis et axis umbrosis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), Alpium, montium Mimatis (cl. Prost). — Fl. fr. 2. p. 477. musc. brit. t. 17. Fissidens strumifer Hedw. st. cr. 2. t. 32. Weissia inclinans Br. (v. s.)

9. **D. POLYCARPUM** (Sw. musc. snc. 32.) caule ramoso, foliis patentibus lanceolato-subulatis margine recurvis flexuosis subserrulatis siccitate crispis, capsula obovatâ subcernua, apophysi nullâ, operculo rostrato subulato capsula subduplicata breviore. \mathcal{U} ad saxa Alpium et Vogesorum. — Fl. fr. 2. p. 478. musc. brit. t. 17. eng. bot. t. 2269. Fissidens polycarpus Hedw. st. cr. 2. t. 31. An satis à priori diversum? ex Arn. (v. v.)

10. **D. SQUARROSUM** (Schrad. journ. 5. p. 68.) caule subramoso, foliis basi latis vaginatis lanceolatis obtusis recurvis patentibusque siccitate crispis, capsula ovata subcernua, operculo rostrato. \mathcal{U} in pratis spongiosis montanis Vogesorum, Arverniæ. — Fl. fr. 5. p. 222. musc. brit. t. 17. Schw. supp. t. 47. D. stygium Brid. — Dill. musc. t. 46. f. 24. (v. s.)

11. **D. PELLUCIDUM** (Sw. musc. snc. 35.) caule ramoso, foliis lanceolatis margine subundulatis serratis obtusiusculis, capsula ovata subcernua, operculo rostrato. \mathcal{U} in ipsis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 2. p. 475.

- et 5. p. 221. musc. brit. t. 17. eng. bot. t. 1346. — D. aquaticum Ehr. Brid. D. virens Brid. — Dill. musc. t. 46. f. 23. (v. s.)
12. D. SEUARIUM (Hedw. st. cr. 2. t. 30.) caule elongato ramoso fastigiato, foliis fasciculatis concavis erecto-patentibus ovatis, superioribus lanceolatis serrulatis, capsula oblonga incurva sulcatâ, operculo conico acuminato. \mathcal{U} in turfosis Vogesorum, Jurassi, Alpium. — Fl. fr. 2. p. 473. musc. brit. t. 17. eng. bot. t. 2167. (v. v.)
13. D. SCHRADERI (Schw. supp. 1. t. 41.) caule erecto ramoso, foliis confertis linearie-lanceolatis obtusiusculis undulatis suberectis vix serrulatis, nervo infra apicem evanido, setis solitariis, capsula ovato-oblonga cernua, operculo rostrato. \mathcal{U} in pratis paludosis Alpium, Vogesorum, prope Falaise ex de Bréb. — Fl. fr. 5. p. 219. D. undulatum Schrad. Brid. non Sm. (v. v.)
14. D. UNDULATUM (Turn. musc. hib. p. 59. non Schrad.) caule elongato ramoso, foliis planiusculis lanceolatis attenuatis apice serrulatis transversè undulatis, capsula cylindrica cernua, operculo longè rostrato. \mathcal{U} in sylvis siccis Vogesorum. — Musc. brit. t. 18. eng. bot. t. 2260. D. undulatum Fl. fr. 2. p. 471. D. polysetum Sw. musc. suec. t. 11. f. 5. Schw. supp. t. 42. Fl. fr. 5. p. 219. D. rugosum Brid. Perichaetium setas 2-4 includens. (v. s.)
15. D. SCOPARIUM (Hedw. fund. 2. t. 8. f. 41, 42.) caule elongato, foliis angustis subulatis canaliculatis secundis, capsula cylindracea arcuata cernua, operculo longè rostrato thecam aequante. \mathcal{U} in sylvis et ericetis. — Fl. fr. 2. p. 470. musc. brit. t. 18. Arn. not. mss.
- a. vulgare (Arn.) caulinibus sub-2-pollicaribus cespitosis, foliis subfalcatis, setis rarissime geminis. — D. scoparium Schw. supp. t. 42. Bryum scoparium L. eng. bot. t. 354. — Dill. musc. t. 46. f. 16. A. B. C. — Vaill. bot. t. 28. f. 12. (v. v.)
 - b. majus (Hook. et Tayl.) caule elongato robusto, foliis longis falcatis secundis, setis aggregatis. — D. majus Schw. 1. t. 40. Fl. fr. 5. p. 219. D. polysetum Brid. non Schw. — Dill. musc. t. 46. f. 16. D. (v. v.)
 - c. fuscescens (Hook. et Tayl.) caulinibus dimidio brevioribus, foliis angustissimis vix subsecundis siccitate crispis, seta solitaria, theca ovata. — D. fuscescens Turn. eng. bot. t. 1597. D. congestum Schw. supp. t. 42. D. longirostre Schw. supp. 1. t. 44. Fl. fr. 5. p. 220. D. elongatum Schw. 1. t. 43 ex Arn. not. mss. (v. s.)
16. D. STARCKII (Web. et Mohr. cr. 189.) caule subramoso, foliis lanceolato-subulatis falcato-secundis integris, capsula oblongo-ovata suberecta strumifera, operculo conico gracili capsula subdimidio breviore. \mathcal{U} ad terram inter rupes Alpium et Vogesorum. — Fl. fr. 5. p. 221. eng. bot. t. 2227. Schw. supp. t. 46. musc. brit. t. 17. D. curvifolium Schleich. in fl. fr. 5. p. 221. (v. s.)
17. D. MONTANUM (Hedw. sp. musc. t. 35. f. 8-13.) caule erecto ramoso, foliis lineari-lanceolatis acuminatis suberectis tortilibus, capsula cylindrica erecto-cernua, operculo conico rostellato. \mathcal{U} ad trancos putridos sylvarum Alpium, Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 2. p. 474. D. Hostianum Schw. 1. t. 46. (v. s.)
18. D. FLAGELLARE (Hedw. st. cr. 1. t. 1.) caule flexuoso erecto ramoso saepe flagellifero, foliis lineari-subulatis secundis subcrispescientibus, capsula erecta cylindrica, operculo longirostro. \mathcal{U} ad rupes in montanis Galliae orientalis, et propè Falaise (cl. de Bréb.). — Fl. fr. 2. p. 471. Planta polymorpha. (v. s.)
19. D. HETEROMALLUM (Hedw. st. cr. 1. t. 26.) caule brevi ramoso, foliis longè subulatis falcato-secundis subintegris, capsula ovata subcernua, operculo longè rostrato capsula longitudine. \mathcal{U} in sylvis frequens. — Fl. fr. 2. p. 471. musc. brit. t. 18. eng. bot. t. 1272. D. curvatum Hedw. musc. t. 31. — Dill. musc. t. 47. f. 37 et 38. — Vaill. bot. t. 27. f. 7. (v. v.)

570 ACOTYL. seu CELLULARES.

20. *D. VARIUM* (Hedw. et cr. 2. t. 34.) caule brevissimo plerumque simplici, foliis angustis hastato-lanceolatis integris aut subserrulatis, capsula ovata erecta aut cernua, operculo rostrato-subulato capsula subdimidio breviore. \mathcal{U} in sylvis, collibus, ad vias. — Musc. brit. t. 17. Fl. fr. 2. p. 472.
 a. *viride* (Hook. et Tayl.) foliis sparsis lanceolatis viridibus, capsula subcernua. — *D. rigidulum* Sw. musc. suec. t. 3. f. 7. Hedw. sp. t. 32. *Skitophyllum gracile* Delapylaie. (v. v.)
 b. *rufescens* (Hook et Tayl.) foliis subsecundis lanceolato-subulatis rufescens, capsula erecta. — *D. rufescens* Turn. eng. bot. t. 1216. — Dill. musc. t. 50. f. 59. (v. v.)
 21. *D. SCHNEIDERI* (Sw. musc. suec. p. 37. t. 2. f. 3.) caule erecto simplici, foliis basi dilatatis in subalam longam siccatate varie flexam productis, capsula ovata cernua, operculo subconico laevissime cuspidato. \mathcal{U} in udis argillaceis Galliae orientalis, circa Falaise (cl. de Brébisson). — Fl. fr. 2. p. 475. Hedw. sp. t. 33. f. 6-10. (v. s.)

XX. TREMATODON Rich. in Mich. fl. bor. am. 2. p. 289. Brid. meth. t. 1. f. 4. Arn. disp. 26.

Seta terminalis; theca cernua apophysi linearis longa basi corniculata; peristoma simplex dentibus 16 aequidistantibus perforatis apice liberis, quandoque senio diffractis; calyptra dimidiata.

1. *T. AMBIGUUM* (Schw. s. 1. p. 2. p. 343. et s. 1. p. 1. p. 69.) caule erecto simplici, foliis e basi latiore lanceolatis acuminatis strictis, perichaetialibus maximis brevius aristatis, operculo rostellato. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatus ex Vill., pratis paludosis Galliae borealis. — *Dicranum ambiguum* Hedw. musc. frond. 3. t. 36. Fl. fr. 5. p. 222. (v. s.)

XXI. WEISSIA Hedw. fund. musc. 2. p. 90. Brid. sp. musc. 1. p. 103. Musc. brit. t. 2.

Seta terminalis; peristoma simplex, dentibus 16 erectiusculis angustis integris equidistantibus imperforatis, calyptra dimidiata.

I. Foliis subovatis.

1. *W. TEMPLETONII* (Hook. et Tayl. musc. brit. t. 14.) caule erecto simplici, foliis ovato-lanceolatis acutis, capsula elongato-pyriformi apophysata, operculo subplano. — In Corsicæ montibus detexit Ph. Thomas. — *Funaria Templetonii* eng. bot. t. 2524. *Entosthodon Templetonii* Schw. supp. t. 113. Peristomatis dentes horizontaliter ori capsulae jacentes. (v. s. D.)
 2. *W. LANCEOLATA* (Brid. meth. p. 47.) caule erecto subelongato simplici, foliis imbricatis ovato-lanceolatis nervo excurrenti piliferis, capsula ovata, operculo oblique et obtuse rostrato. \mathcal{U} ad muros argillaceos lapidesque. — *Musc. brit. t. 14. Grimmia lanceolata* Fl. fr. 2. p. 457. *Leersia lanceolata* Hedw. st. cr. 2. t. 23. *Coscinodon aciphyllus* et *C. connatus* Brid. meth. (v. v.)
 3. *W. STARCKEANA* (Hedw. st. cr. 3. t. 23.) caule brevissimo simplici, foliis ovatis imbricatis, nervo excurrente in apiculam producto, capsula ovata erecta, operculo conico, peristomatis dentibus subulatis acutis. \mathcal{U} in agris limosis propè Rhenum ex Brid., *Monspelium* (herb. DC.), *Mimatem* (cl. Prost), Falaise ex de Bréb. — Fl. fr. 5. p. 210. *Grimmia Starckiana* eng. bot. t. 1490. Schk. deut. moos. t. 24. (v. s.)

II. Foliis angustis.

- * *Caule brevi simplici, foliis strictis, theca laevi.*
 4. *W. TRISTICHA* (Brid. sp. musc. 1. p. 116.) subcaulis, foliis imbricato-tristichis minimis linearibus obtusis, perichaetialibus longioribus oblongo-

lanceolatis, *capsula pyriformi*, *operculo convexo-rostrato*. (I) in *rupibus humidis* circà *Mimatem* detexit cl. Prost. — *Grimmia tristicha* Schw. supp. t. 26. Schk. deut. moos. t. 25. (v. s. D.)

5. W. RECURVATA (Hook. et Tayl. musc. brit. t. 15.) caule subnullo, foliis imbricatis minimis subulatis, seta arcuatà recurvata, capsula ovata, operculo rostrato. ♀ in rupibus umbrosis Alpium et montium Mimatis (cl. Prost). — *Grimmia recurvata* Hedw. st. cr. 1. t. 38. eng. brit. t. 1489. Fl. fr. 2. p. 457. (v. s.)
6. W. PUSILLA (Hedw. st. cr. 2. t. 29.) caule subnullo, foliis imbricatis minimis subulatis, seta erecta, capsula ovata, operculo rostrato. (I) in rupibus cretaceis umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 455. musc. brit. t. 15. Gr. pusilla eng. bot. t. 2551. (v. v.)

* * *Foliis siccitate tortilibus, theca lœvi.*

7. W. CONTROVERSA (Hedw. st. cr. 3. t. 5.) caule brevi subsimplici erecto, foliis linearis-subulatis siccitate crispis margine incurvis, capsula ovato-elliptica, operculo rostrato. ♀ in arenosis udis. — Fl. fr. 2. p. 455. musc. brit. t. 15. Gr. controversa eng. bot. t. 1367. — Dill. musc. t. 48. f. 43. — Vaill. bot. t. 29. f. 5. Dense cespitosa sequente multò minor. (v. v.)
8. W. CIRRHATA (Hedw. sp. t. 12.) caule erecto innovationibus diviso, foliis lanceolato-subulatis carinatis siccitate crispis margine recurvis, capsula ovata erecta, operculo tenuiter subulato-recto. ♀ in sylvis, aggeribus, tectis stramineis. — Fl. fr. 2. p. 455. musc. brit. t. 15. Gr. cirrhata eng. bot. t. 2356. — Dill. musc. t. 48. f. 42. — Vaill. bot. t. 24. f. 8. (v. v.)
9. W. CRISPULA (Hedw. sp. musc. t. 12.) caule erecto ramoso, foliis è basi latiore longè lanceolato-subulatis siccitate crispis margine incurvis, capsula ovato-elliptica erecta, operculo tenuiter subulato obliquo. (I) in *saxis* Alpium et montis Hohneck Vogesorum (M. et N.). — Fl. fr. 5. p. 211. musc. brit. t. 15. Gr. crispula eng. bot. t. 2203. W. atra Schl. in DC. fl. fr. 5. p. 211? Praecedenti nimium affinis. (v. v.)
10. W. CURVIROSTRA (Sw. musc. suec. 25.) caule erecto simplici, foliis imbricato-patulis linearis-subulatis rigidis siccitate crispis, capsula ovato-cylindrica incurva, operculo rostrato, rostello incurvo. ♀ in sabulosis passim. — Fl. fr. 2. p. 456. musc. brit. t. 14. W. recurvirostra Hedw. st. cr. 1. t. 7. (v. v.)

* * * *Theca sulcatâ vel striatâ.*

11. W. STRIATA (Hook. et Tayl. musc. brit. t. 15.) caule erecto ramoso, foliis linearibus imbricato-patulis apice denticulatis siccitate crispis, capsula ovato-turbinata sulcatâ erecta, operculo subplanò obliquè subulato. ♀ in montanis. — *Grimmia striata* Schrad.
- a. *minor* (Hook. et Tayl.) foliis linearis-subulatis subserrulatis. — In fissuris rupium. — W. fugax Hedw. sp. musc. t. 13. Fl. fr. 5. p. 209. W. schisti Schw. supp. t. 20. (v. v.)
- β. *major* (Hook. et Tayl.) foliis lato-linearibus denticulatis. — In uliginosis. — W. denticulata Schw. supp. t. 19. W. crispatula Brid. Fl. fr. 2. p. 454. Bryum crispatum Dicks. fasc. 3. t. 7. f. 4. (v. v.)

12. W. NIGRITA (Hedw. st. cr. 3. t. 39.) caule elongato ramoso fastigato, foliis erectis linearis-lanceolatis acuminatis, capsula obovatâ gibba sulcatâ, operculo hemisphaerico obtuse mucronato. ♀ in udis turfosis montium Galliae orientalis. — Fl. fr. 2. p. 457 et 5. p. 211. musc. brit. t. 14. Capsulae nigrescentes. (v. s.)

* * * *Caule elongato ramoso, foliis strictiusculis, theca lœvi.*

13. W. ACUTA (Hedw. st. cr. 3. t. 35.) caule elongato erecto ramoso, foliis subulato-setaceis subsecundis rigidis canaliculatis, capsula turbinata, operculo oblique rostrato. ♀ in rupestribus Alpium Delphin. ex Vill., Vallis-clausæ ex Guerin, agri Ligericini (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 210. musc. brit. t. 15.

572 ACOTYL. SEU CELLULARES.

W. rupestris Hedw. sp. t. 14. *Brynum folvellum* Dicks. crypt. 4. t. 11. f. 1. (v. s.)

14. *W. VERTICILLATA* (Schw. supp. t. 20.) caule ramoso subfastigiato, foliis linearisubulatis planis erectis subadpresso crassinervibus, capsula ovata, operculo oblique rostrato. $\frac{1}{2}$ in rupibus gypsaceis calcareisve stillicidio irroratis. — Fl. fr. 5. p. 211. musc. brit. t. 15. Gr. verticillata eng. bot. t. 1258. — Dill. muse. t. 47. f. 35. (v. v.)

15. *W. MIRLICOVERI* (Hornsch. in botan. zeit. n. 6. p. 86.) caule dense cespitoso elongato ramoso, foliis angustè lanceolatis subserrulatis rigidis crassinervibus, seta elongata, capsula erecta pyriformi, operculo conico. $\frac{1}{2}$ in valle Lio Pyrenæorum orientalium detexit Ph. Thomas. — Hook. musc. exot. t. 101. Schw. supp. 2. p. 1. t. 114. (v. s.)

† + CALYPTRA MITRÆFORMIS.

XXII. THESANOMITRION Schw. supp. 2. p. 1. p. 61. Arn. disp. meth. p. 32.

Seta terminalis flexuosa; theca plerumque basi rugis acutis prominentisque scabra; persistoma simplex dentibus 16 bifidis; calyptra mitræformis basi pectinato-ciliata.

1. *T. FLEXUOSUM* (Arn. l. c.) caule subsimplici rigido, foliis angustis lanceolato-subulatis acuminatis, nervo latissimo, capsula ovata striata, operculo rostrato. $\frac{1}{2}$ ad terram, saxa et truncos putrefactos. — D. flexuosum Hedw. sp. muse. t. 38. musc. brit. t. 16. Fl. fr. 2. p. 474. Weissia immersa Brid. — Dill. muse. t. 47. f. 33. et t. 32. f. 3. (v. v.)

β . *nigroviride* (Arn.) foliis canaliculatis piliferis, pedunculis incurvatis. — Campylopus pilifer et C. penicillatus Brid. meth. p. 72 et 73. (v. s.)

XXIII. ENCALYPTA Schreb. gen. n. 1643. Hedw. sp. musc. p. 60. — Leersia Hedw. fund. musc. 2. p. 88.

Seta terminalis; peristoma simplex, dentibus 16 angustis erectiusculis integris æquidistantibus; calyptra magna laevis extintoriiformis capsulam maturam involvens.

1. *E. STREPTOCARPA* (Hedw. sp. musc. t. 10.) caule elongato, foliis dense imbricatis elliptico-lanceolatis obtusiusculis, nervo usque ad apicem producto, capsula cylindrica spiraliter striata, peristomatis dentibus longissimis capillaribus, calyptre basi dentata. $\frac{1}{2}$ ad rupes Alpium et Pyren. orientalium ex Brid. — Fl. fr. 2. p. 454. musc. brit. t. 13. et 2. f. 2. n. 3. eng. bot. t. 2163. — Dill. muse. t. 43. f. 71. (v. s.)

2. *E. AFFinis* (Hedw. f. in Web. et Mohr. arch. syst. naturges. 1. t. IV.) caule erecto ramoso, foliis imbricatis erectis lanceolato-subulatis undulatis nervo excurrente piliferis, calyptre basi subintegrâ, theca subcylindrica laevi, operculo rostrato obtuso. $\frac{1}{2}$ in muris et rupibus Galliæ orientalis. — Schw. supp. 1. t. 16. E. Alpina eng. bot. 1419. E. ciliata β alpina musc. brit. (v. v.)

3. *E. CILIATA* (Hedw. sp. 61.) caule erecto subramoso brevi, foliis oblongis acuminatis, nervo ultrâ apicem valde producto, capsula laevi cylindrica? operculo longe acuminato recto, calyptre æquali campaniformi basi fimbriata. $\frac{1}{2}$ in montibus. — Musc. brit. t. 13. E. fimbriata Fl. fr. 2. p. 453. Leersia ciliata Hedw. st. cr. 1. t. 19. — Dill. muse. t. 45. f. 9. (v. v.)

4. *E. VULGARIS* (Hedw. sp. p. 60.) caule erecto brevi subsimplici, foliis oblongo-ellipticis obtusis, nervo paululum ultrâ apicem producto, capsula laevi cylindrica, operculo longe acuminato recto, calyptre æquali campaniformi basi integrâ. $\frac{1}{2}$ ad muros et saxa frequens. — Fl. fr. 2. p. 453. musc. brit. t. 13. Leersia vulgaris Hedw. st. cr. 1. t. 18. — Dill. muse. t. 45. f. 8. — Vaill. bot. t. 26. f. 1. (v. v.)

XXIV. CINCLIDOTUS *Pal. de Beauv. prod. oeth. p. 28 et 51. Hook. et Tayl. musc. brit. t. 1.*

— Seta terminalis ; peristoma simplex, dentibus 32 filiformibus contortis basi anomostosantibus ; calyptora mitriformis.

1. *C. FONTINALOIDES* (P. de Beauv. l. c.) caule ramoso elongato, foliis imbricatis elliptico-lanceolatis acuminatis, perichaetialibus capsulam brevissime penduculatam subobtegentibus, operculo conico-acuminato. ♀ in aquis fluentibus ad lapides et ligna. — Musc. brit. t. 11. *Trichostomum fontinaloides* Hedw. st. cr. 3. t. 14. Fl. fr. 2. p. 469. *Fontinalis minor* L. eng. bot. t. 557. *Pont. amphibia* Laterr. fl. bord. ed. 2. p. 445. — Dill. musc. t. 33. f. 2. (v. v.)

XXV. TRICHOSTOMUM *Hook. musc. brit. p. 59. t. 2. Arn. disp. meth. p. 22.*
— *Trichostomi sp.* *Hedw. DC.*

Seta terminalis ; peristoma simplex dentibus subulatis 16 aequalibus basi divisis, aut 32 per paria approximatis ; calyptora mitriformis.

Sect. 1. *RACOMITRIUM* *Brid. meth. p. 78.*

Seta erecta elongata ; dentes saepius ad basin fissi.

1. *T. POLYPHYLLUM* (Schw. supp. t. 39.) caule erecto ramoso, foliis lanceolato-subulatis margine recurvis superne serratis siccitate crispatisimis, capsula erecta oblonga, operculo rostrato-subulato capsulam subaequante. ♀ in Vogenesis, Alpibus, montibus Arverniae (DC.), Pyrenaeis. — Musc. brit. t. 19. *T. serratum* Fl. fr. 2. p. 468. *Brynum polyphyllum* Dicks. — Dill. musc. t. 48. f. 41. Caules dense cespitosi. Peristomatis dentes filiformes per paria approximati. (v. v.)
2. *T. ACICULARE* (P. de Beauv. prod. p. 90.) caule elongato erecto ramoso, foliis lanceolatis obtusis apice serrulatis, nervo infra apicem evanido, capsula erecta oblonga, operculo rostrato-subulato capsula breviore. ♀ in lapidibus ad aquas fluentes. — Musc. brit. t. 19. *Dicranum aciculare* Hedw. st. cr. 3. t. 33. eng. bot. t. 1978. Fl. fr. 2. p. 472. — Dill. musc. t. 46. f. 25 et 26 B. (v. v.)
3. *T. PROTENSUM* (Braun ex Moug. in litt.) caule elongato erecto ramoso, foliis lanceolatis obtusis concavis apice integris, nervo apicem attingente, capsula erecta ovato-oblonga, operculo rostrato-subulato capsula breviore. ♀ in rupibus humidis sylvarum Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.). — *T. fasciculare* Moug. et Nestl. vog. n. 215 non Schrad. (v. s.)
4. *T. FASCICULARE* (Schrad. spic. p. 51.) caule procumbente elongato ramoso, foliis lanceolatis acuminatis integris margine recurvis, capsula erecta ovato-oblonga, operculo rostrato-subulato thecam subaequante. ♀ ad saxa in provinciis australibus. — Fl. fr. 2. p. 468. Musc. brit. t. 19. Schw. supp. 1. t. 38. — Dill. musc. t. 47. f. 28. et t. 46. f. 26. G. (v. v.)
5. *T. MICROCARPON* (Hedw. sp. musc. t. 23.) caule erecto elongato ramoso, foliis linear-lanceolatis acuminatis apice subdiaphanis subserratis, capsula ovato-oblonga, peristomatis dentibus breviusculis, operculo rostrato-subulato capsula minore. ♀ ad saxa Alpium et Vogesorum, agri Mimatis (cl. Prost), propè Falaise (cl. de Bréb.). — Fl. fr. 2. p. 469. musc. brit. t. 19. Moug. et Nestl. vog. n. 315. *T. Sudeticum* Funck. — Dill. musc. t. 47. f. 29. (v. v.)
6. *T. HETEROSTICHUM* (Hedw. st. cr. 2. t. 25.) caule elongato diffuso ramoso, foliis ovato-lanceolatis acuminatis apice diaphanis subserratis, capsula erecta subdimidio breviore. ♀ ad lapides et saxa Alpium, Vogesorum, Mimatis, Cenomani. — Fl. fr. 2. p. 467. et 5. p. 217. musc. brit. t. 19. — Dill. musc. t. 47. t. 27. A. F. et G. (v. v.)

7. *T. CANESCENS* (Hedw. st. cr. 3. t. 5.) caule erecto elongato irregulariter ramoso, foliis consertis lanceolatis acuminatis apice diaphanis subserrulatis, capsula ovata erecta, peristomatis dentibus longissimis filiformibus, operculo subulato capsulam subsequante. ♂ ad saxa et in arenosis apicis. — Fl. fr. 2. p. 466, musc. brit. t. 19. *T. ericoides* Schw. supp. 1. t. 38. Fl. fr. 5. p. 217. — Dill. musc. t. 47. f. 27. B. et 31. (v. v.)
8. *T. LANUGINOSUM* (Hedw. st. cr. 3. t. 2.) caule procumbente elongata subpinnato, foliis lanceolato-subulatis longe acuminatis apice diaphanis serratis in margine recurvis, capsula ovata, setis brevibus ex apice ramorum lateralium haec dentibus, operculo rostrato-subulato capsulam subsequante. ♀ in arenosis montanis. — Fl. fr. 2. p. 467. musc. brit. t. 19. — Dill. musc. t. 47. f. 32. (v. v.)

Sect. III. *CAMPYLOPUS* Arn. disp. meth. p. 22. — *Campylopi* sp. Brid.

Seta arcuata tortilis, peristomatis dentes infra medium fissi.

9. *T. PATENS* (Schw. supp. t. 37.) caule elongato ascendente ramoso, foliis lanceolatis acuminatis carinatis integris margine recurvis, seta flexuosa incurva, capsula subovata, operculo rostrato. ♂ ad saxa in Alpibus, Vogesis, Pyrenæis. — Fl. fr. 5. p. 218. musc. brit. t. 19. *Bryum patens* Dicks. 8. t. 4. f. 8. *Pterigynandrum Ramondii* DC. fl. fr. 2. p. 462. — Dill. musc. t. 17. f. 30. (v. v.)
- ♂. *arcuatum*, foliis apice membranaceis diaphanis. — in Alpibus et Cebennis (cl. Gratieloup). — *T. arcuatm* Fl. fr. 5. p. 218. (v. s.)
10. *T. FUNALE* (Schw. supp. 1. t. 37.) caule elongato procumbente, ramis fasciculatis, foliis erecto-patulis lanceolatis acuminatis apice diaphanis serrato-dentatis, seta brevi contorta, capsula ovata, operculo conico obtuso. ♂ ad saxa in agro Mimatensi (cl. Prost), ad Vogesorum rupes (cl. Mong. et Nestl. vog. n. 8r5.), propè Falaise (cl. de Bréb.). — *Campylopus funalis* Brid. (v. s.)

XXVI. GRIMMIA Schreb. gen. n. 1642. Hedw. fund. musc. 2. p. 89.

Seta terminalis; peristoma simplex dentibus 16 equidistantibus integris aut perforatis pyramidatis reflexilibus; calyptra mitræformis.

I. Seta arcuata tortilis.

1. *G. TRICHOphyLLA* (Grev. fl. edin. p. 235. et cr. fl. t. 100.) caule elongato ramoso, foliis lanceolato-subulatis carinatis margine recurvis nervo excurrente piliferis, seta incurva flexuosa, capsula ovato-elliptica sulcata, operculo rostrato capsula subdimidio breviore. — In rupibus circa Mimatem (cl. Prost), in Vogesorum monte Schueberg (cl. Mong. et Nestl. vog. n. 814.) (v. s. D.)
2. *G. AFRICANA* (Arn. disp. meth. p. 21.) caule erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis carinatis nervo excurrente diaphano piliferis, seta arcuata, capsula pendula subrotundata, operculo planiusculo brevissime mucronato. ♂ in apicis Galliae australis. — *Fissidens pulvinatus* ♂ *Africanus* Hedw. sp. t. 40. f. 4-6. *Campylopus cribrosus* Brid. meth. p. 76. A. sequenti differt præterea, foliis minus elongatis, colore non pallido sed saturate viridi in fuscum vergente. (v. v.)
3. *G. PULVINATA* (eng. bot. t. 1728.) caule brevi pulvinato, foliis angustè ellipticis margine incurvis nervo excurrente diaphano piliferis, seta incurva, capsula ovata striata, operculo conico acuminato. ♂ ad muros lapidesque frequens. — Musc. brit. t. 13. *G. nigricans* Fl. fr. 2. p. 459. *Dicranum pulvinatum* Sw. Fl. fr. 2. p. 478. *Fissidens pulvinatus* Hedw. sp. t. 40. f. 1-3. — Dill. musc. t. 50. f. 65. — Vaill. bot. t. 29. f. 2. Peristomatis dentes frequenter fissi aut perforati. (v. v.)

II. Seta recta breviuscula.

* *Seta exserta, dentibus peristomatis rarius fissis.*

4. *G. LEUCOPHAEA* (Grev. in Wern. trans. 4. t. 6.) *affuso-cespitosa*, caule brevi subsimplici, foliis patentibus ovatis in pilum longissimum diaphanum subserrulatum productis, seta recta vix exserta, capsula ovata, operculo breviter rostrato. $\frac{1}{2}$ in cautibus siliceis retro Mutzig et propè Cusel in Alsatiâ inferiori (Moug. et Nestl. vog. n. 813.). — Grev. in fl. t. 284. (v. s.)
5. *G. OVATA* (Web. et Mohr. suec. t. 2. f. 4.) *caule ramoso erecto*, foliis lanceolato-subulatis margine incurvis in pilum longum diaphanum subserrulatum productis, capsula ovata, operculo breviter rostrato. $\frac{1}{2}$ ad saxa Alpium. Fl. fr. 5. p. 214. — Schw. supp. t. 24. musc. brit. t. 13. Dicranum ovatum Hedv. st. cr. 3. t. 34. D. ovale Hedw. Fl. fr. 2. p. 473. Peristomatis dentes saepius perforati. (v. v.)
6. *G. OBTUSA* (Schw. supp. 1. t. 25.) *caule erecto vagè ramoso*, foliis lanceolatis in pilum longum diaphanum productis, capsula subexserta ovato-oblonga, operculo brevissimo depresso conico obtuso. $\frac{1}{2}$ ad rupes graniticas summorum Pyrenaeorum et Vogesorum. — Fl. fr. 5. p. 213. Non diversam à priori ait cl. Hooker. (v. s.)
7. *G. DONNIANA* (eng. bot. t. 1259.) *caule brevi erecto subsimplici*, foliis lanceolato-subulatis margine incurvis in pilum longum diaphanum productis, capsula ovata, peristomatis dentibus integris, operculo brevissimo depresso conico obtuso. $\frac{1}{2}$ ad rupes graniticas Alpium, Mimatis (cl. Prost). — Musc. brit. t. 13. *G. alpestris* Fl. fr. 5. p. 213. Nimirum *G. ovata* affinis. (v. s.)

* * *Seta foliis immersa.*

8. *G. PLAGIOPODIA* (Hedw. sp. musc. t. 15. f. 6-13 non fl. fr.) *caule erecto brevi subsimplici*, foliis imbricatis ovatis concavis obtusiusculis, perichaetialibus apice diaphanis, seta minimâ curvula, capsula ovata, operculo convexo-papillato. $\frac{1}{2}$ circa Lutetiam ex cl. Mérat. — Schk. deut. moos. t. 22. Peristomatis dentes varie pertusi ut in sequente. (v. s. ex Helv.)
9. *G. CRINITA* (Web. et Mohr. er. 456.) *caule erecto brevi subsimplici*, foliis imbricatis ovatis concavis obtusis apice diaphanis, perichaetialibus ovato-lanceolatis longissime piliferis, seta minimâ curvula, capsula ovata profundè striata, operculo obtuse acuminato breve. $\frac{1}{2}$ ad saxa murosque. — Schw. supp. t. 26. Fl. fr. 5. p. 214. *G. plagiopodia* Fl. fr. 2. p. 460. non Hedw. An satis à priori distincta? (v. v.)
10. *G. MARITIMA* (Turn. musc. hib. t. 3. f. 2.) *caule erecto breviusculo subramoso*, foliis imbricatis erectis acutis apice concoloribus, perichaetialium elongatorum nervo excurrente fusco, capsula turbinata, operculo oblique rostrato. $\frac{1}{2}$ in fissuris rupium prope Cherbourg ex cl. de Bréb. et Lenormand. — Schw. s. 1. p. 1. t. 22. (v. s. ex Angliâ.)
11. *G. CRIBROSA* (Hedw. st. cr. 3. t. 31. A.) *caule erecto simpliciusculo*, foliis imbricatis lanceolatis supremis piliferis, capsula erecta ovata, operculo conico acuminato, peristomatis dentibus pertusis. $\frac{1}{2}$ ad lapides et tecta passim. — Fl. fr. 2. p. 459. (v. s.)
12. *G. APOCARPA* (Hedw. st. cr. 1. t. 39.) *caule ramoso plus minus elongato*, foliis ovato-lanceolatis recurvo-patentibus margine reflexis, nervo ad apicem aut ultra apicem producto, perichaetialibus nervo infra apicem evanido, capsula ovata aut turbinata sessili, operculo breviter rostrato. $\frac{1}{2}$ ad muros lapides et truncos arborum. — Fl. fr. 2. p. 458. musc. brit. t. 13. *G. alpicola* Sw. suec. t. 1. Hedw. sp. t. 15. Fl. fr. 2. p. 459. *G. apocaula* Fl. fr. 2. p. 458. *G. rivularis* Brid. in Schrad. journ. 5. t. 3. Fl. fr. 5. p. 212. *G. gracilis* Schw. supp. t. 23. Fl. fr. 5. p. 212. — Dill. musc. t. 32. f. 4. — Vail. bot. t. 27. f. 15. (v. v.)

XXVII. ORTHOTRICHUM Hedw. musc. frond. 2. p. 96. Hooker et Grev. in journ. sc. edin. 1. p. 111.

Seta terminalis; peristoma simplex vel duplex, dentibus vel 8 trilineatis vel 16 unilineatis per paria approximatis; ciliis 0, 8 aut 16; columella acuta; calyptra mitriformis.

I. Peristoma simplex.

1. *O. CUPULATUM* (Hoffm. germ. 2. p. 26.) caule erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis erecto-patentibus siccitate strictis rigidis, capsula subsessili per totam longitudinem sulcatâ, peristomate simplici dentibus 16 longitudinaliter lineatis, calyptrâ pilosiusculâ demum omnino glabrâ. ♀ ad saxa et arborum truncos. — Fl. fr. 2. p. 494. Schw. supp. t. 55. musc. brit. t. 21. *O. nudum* Dicks. cr. 4. t. 10. *O. Flörkei* Hornsch. *Planta nigrescens*. (v. v.)
2. *O. ANOMALUM* (Hedw. st. cr. 2. t. 37. et fund. 2. t. 7. f. 35.) caule erecto ramoso, foliis ovato-lanceolatis erecto-patentibus siccitate strictis, setâ exsertâ, capsula sulcatâ, peristomate simplici dentibus 8 geminatis, calyptrâ pilosiusculâ? ♀ ad muros saxa et tecta. — Fl. fr. 2. p. 493. musc. brit. t. 21. *O. saxatile* Brid. (v. v.)

II. Peristoma duplex.

* *Thecâ immersâ, ciliis 8.*

3. *O. AFFINE* (Schrad. spic. p. 67.) caulinis erectis, foliis recurvo-patentibus flaccidis latè lanceolatis, capsula sessili profunde sulcatâ, peristomate duplo dentibus 8 geminatis, ciliis 8 filiformibus, calyptrâ subpilosâ. ♀ ad muros et truncos. — Musc. brit. t. 21.

a majus (Hook. et Tayl.) caule elongato, calyptrâ superne præcipue pilosâ. — *O. affine* Fl. fr. 2. p. 494. eng. bot. t. 1323. — Dill. musc. t. 55. f. 10. (v. v.)

β pumilum (Hook. et Tayl.) caule brevissimo, calyptrâ glabrâ. — Ad truncos Populi in provinciis Germaniæ conterminis. — *O. pumilum* Sw. suec. t. 4. f. 9. Fl. fr. 5. p. 225. Schw. supp. t. 50. (v. s.)

4. *O. RUFINCOLA* (Funck. deuts. moos. t. 23.) caule erecto vel procumbente ramoso, foliis suberectis strictis rigidis acuminatis latè lanceolatis, capsula superne sulcatâ, dentibus 16 erectis, ciliis 8 valde caducis, calyptrâ valde pilosâ. ♀ ad rupes circa Bruyères et in Vogesis inferioribus (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 825.) — Grev. cr. fl. t. 105. (v. s.)

5. *O. OBTUSIFOLIUM* (Sw. suec. t. 4. f. 8.) caule subramoso erecto, foliis oblongo-ovatis obtusis concavis, nervo antè apicem evanido, capsula subsessili oblongâ sulcatâ, dentibus 16 recurvis, ciliis 8, calyptrâ glabriuscûla. ♀ ad truncos Salicum in agro Mimatiensi (cl. Prost) et provinciis Germaniæ conterminis. — Fl. fr. 5. p. 225. Schw. supp. 1. t. 50. *Cilia dupli cellularum serie composita*. (v. s.)

* * *Thecâ immersâ, ciliis 16.*

6. *O. DIAPHANUM* (Schrad. spic. p. 69.) caule brevissimo erecto ramoso, foliis lanceolatis apice acuminatis diaphanis, capsula subsessili subsulcatâ, dentibus 16 linearibus patulis, ciliis totidem minutissimis, calyptrâ subpilosâ. ♀ ad truncos et muros. — Fl. fr. 2. p. 495. musc. brit. t. 21. Schw. supp. 1. t. 55. (v. v.)

7. *O. RIVULARE* (Sm. brit. p. 1266.) caule elongato ramoso procumbente, foliis latè lanceolatis obtusis, capsula subsessili oblongo-pyriformi sulcatâ, dentibus 16 per paria approximatis, ciliis 16 angustissimis, calyptrâ glabrâ aut pilosiusculâ. ♀ ad rupes secùs rivulos propè Mimatem (cl. Prost), in Vogesis inferioribus et Galliâ occidentali (Moug. et Nestl.). — Musc. brit. t. 21. Turn. musc. hib. t. 8. eng. bot. t. 2188. (v. s.)

8. *C. STRIATUM* (Hedw. st. cr. 2. t. 36.) caule erecto elongato ramoso, foliis

lanceolatis patentibus siccitate subcontortis, capsula sessili ovata laevi, dentibus 16 æquidistantibus lineolatè notatis, ciliis 16 tornlosis, calyprà subpilosâ. ♀ ad truncos murosque. — Fl. fr. 2. p. 495. musc. brit. t. 21. eng. bot. t. 2187. (v. v.)

9. O. LYELLII (Musc. brit. t. 22.) caule erecto elongato ramoso, foliis longis linear-lanceolatis recurvo-patentibus subundulatis carinatis acuminatissimis siccitate crispatis, capsula subsessili oblongâ supernè sulcatâ, dentibus 16 linearibus oblongis recurvis, ciliis 16 filiformibus, calyprà valde pilosa. ♀ ad truncos arborum in Vogesis (cl. Mong. et Nestl.), propè Falaise (cl. de Bréb.), rarius fructificans. (v. s.)

* * * Thecâ exsertâ, ciliis 8.

10. O. SPECIOSUM (Nees ab Esenb. in Sturm. deut. fl. fasc. 17.) caule erecto, foliis ovato-lanceolatis acuminatis patentibus, marginibusque ad apicem sere recurvatis, capsula leviter sulcatâ, dentibus octo demùm sedecim reflexis, calyprà pilosa. ♀ ad arborum truncos in Vogesis (cl. Mong. et Nestl.). — Funck deut. moos. t. 23. O. striatum Hedw. st. cr. 2. t. 36. f. 1-3. (v. s.)

11. O. HUTCHINSONÆ (eng. bot. t. 2523.) caule brevi erecto ramoso, foliis lanceolatis acuminatis planis erectis rigidis, capsula oblongâ elevata sulcatâ, dentibus 16 per paria approximatis longitudinaliter lineolatis basi sèpè coadunatis, calyprà valde pilosa. ♀ ad rupes montis Hohneck Vogesorum (cl. Nestl.), ad arbores propè Mimatem (cl. Prost), propè Falaise ex de Bréb. — Musc. brit. t. 21. (v. s.)

12. O. LUDWIGII (Brid. sp. 2. p. 6.) caule erecto ramoso repente, foliis erecto-patentibus angustè lanceolatis siccitate crispatis, capsula pyriformi laevi ad apicem solummodo plicata, ore contractissimo, ciliis 8 tenuissimis fugacissimis, calyprà valde pilosa. ♀ ad arborum truncos in sylvis editioribus Vogesorum (cl. Nestler). — Schw. supp. 1. p. 2. t. 51. Ulota Ludwigii Brid. meth. p. 112. Splachnum Wulsenianum Schw. supp. t. 14. (v. s.)

13. O. CRISPUM (Hedw. st. cr. 2. t. 35.) caule erecto ramoso, foliis lanceolato-subulatis siccitate valde crispatis, setâ valde exsertâ, capsula oblongo-clavata sulcatâ, dentibus 8 patentibus reflexis subbifidis, lobis longitudinaliter lineolatis, ciliis 8 filiformibus, calyprà valde pilosa. ♀ in truncis arborum. — Fl. fr. 2. p. 495. musc. brit. t. 21. O. Bruchii et O. crispulum Mong. et Nestl. vog. n. 826 et 827. Ulota crispa Brid. — Dill. musc. t. 55. f. 11. — Vaill. bot. t. 27. f. 9. (v. v.)

* * * Thecâ exsertâ, ciliis 16.

14. O. PULCHELLUM (Sm. eng. bot. t. 1787.) caule humili subramoso, foliis patulis linear-lanceolatis acutis siccitate crispatis, nervo infrâ apicem evanido, capsula oblongâ costatâ, dentibus 16 per paria approximatis patentibus, calyprà glabriusculâ. ♀ ad ramulos arborum propè Vire ex cl. Lenormand. — Musc. brit. t. 21. (v. s. ex Angliâ.)

XXVIII. TETRAPHIS Schreb. gen. n. 1639. Hedw. fund. t. 7. f. 32. Brown in Linn. trans. 12. p. 579.

Seta terminalis; peristoma simplex dentibus 4 erectis equidistantibus lineolis 7 longitudinaliter striatis; calypræ mitræformis.

1. T. PELLUCIDA (Hedw. sp. musc. t. 7. f. 1.) caule elongato, foliis imbricatis ovato-acuminatis, perichaetialibus lanceolatis, capsula cylindrica. ♀ in umbris tidis. — Fl. fr. 2. p. 449. musc. brit. t. 8. — Dill. musc. t. 31. f. 2. — Hall. helv. t. 45. f. 8. (v. v.)
2. T. BROWNIANA (Grev. crypt. fl. t. 169.) caule subnallo, foliis linearibus obtusis rigidis, perichaetialibus ovatis mucronatis integrerrimis enerviis, capsula ovato-oblongâ. ♀ ad rupes siliceas circâ Bipontem (cl. Bruch in Mong. et Nestl. vog. n. 811.) et probabiliter in Gallia finitima. — Tetradontium Brownianum Schw. 2. p. 2. t. 128. — Dicks. crypt. 4. t. 10. f. 16. (v. s.)

578 ACOTYL. SEU CELLULARES.

XXIX. DISSODON Grev. et Arn. tent. meth. musc. p. 115. t. 13. f. 34-50.

Seta terminalis; theca apophysata; dentibus 16 bifidis aut transversè lineolatis siccitate erectis strictis; columella apice dilatata; calyptora laevis basi integra fugax.

1. D. FROELICHIANUM (Arn. et Grev. 1. c. f. 45-47.) foliis erexitis adpressis ovato-lingulatis obtusis concavis, peristomatis dentibus 16 geminatis et per paria geminantibus. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatus? — *Splachnum Froelichianum* Hedw. st. cr. 3. t. 40. Fl. fr. 2. p. 451. musc. brit. t. 9. (v. s. ex Helv.)

XXX. SPLACHNUM L. gen. 1191. Hedw. fund. musc. 2. p. 88. Arn. et Grev. tent. meth. musc. p. 101. t. 13. f. 1-13. t. 14. f. 10-33.

Seta terminalis; theca apophysata; peristoma simplex è dentibus siccitate arctè reflexis 32, 1-2-aut 4-geminantibus; columella apice dilatata; calyptora laevis basi integra fugax.

1. S. MNIOIDES (L. f. meth. musc. p. 6.) foliis ovato-lanceolatis acuminatissimis concavis integris, apophysi obovatâ capsulæ latitudine. (I) in editoribus Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 209. Hedw. st. cr. 2. t. 11. musc. brit. t. 9. S. Breverianum Hedw. st. cr. 2. t. 38. Fl. fr. 5. p. 209. — Dill. musc. t. 44. f. 5. Dentes 16 lineolâ transversâ notati. (v. s. ex Helv.)

2. S. TENUЕ (Dicks. cr. 2. t. 4. f. 2.) foliis obovato-acuminatis serratis, apophysi obconicâ capsulâ angustiore, columellâ exsertâ. \mathcal{U} in Alpibus. — Fl. fr. 2. p. 452. eng. bot. t. 1133. musc. brit. t. 9. Arn. et Grev. tent. t. 13. f. 21-24. S. serratum Hedw. sp. musc. t. 8. Fl. fr. 2. p. 452. Dentes mox 8 equidistantes bigeminati, mox 16 per paria approximati 1-geminati, id-est lineolâ longitudinaliter notati. (v. s.)

3. S. SPHÆRICUM (L. f. meth. musc. t. 1. f. 1.) foliis obovato-rotundatis acuminatis subserratis, apophysi obovato-globosâ capsulâ latiore. \mathcal{U} in depressis subalpinis Delphinatus ex Vill. — Fl. fr. 2. p. 451. Hedw. st. cr. 2. t. 16. musc. brit. t. 9. Grev. et Arn. tent. t. 14. f. 10-15. S. gracile Dicks. cr. 4. t. 10. f. 5. S. ovatum Hedw. sp. musc. t. 8. eng. bot. t. 1590. Dentes mox 4 æquidistantes 8-fidi, mox 8 æquidistantes integri aut bifidi, mox 16 per paria approximati unigeminati. (v. v. in Helv.)

4. S. AMPULLACEUM (L. sp. 1572.) foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis, apophysi inverse ampullæformi capsulâ duplò latiore. \mathcal{U} in paludibus turfos. — Fl. fr. 2. p. 450. Hedw. st. cr. 2. t. 14. musc. brit. t. 9. Arn. et Grev. tent. t. 13. f. 1-3. Apodanthus aphyllus De la Pyl. — Dill. musc. t. 44. f. 3. — Vaill. bot. t. 26. f. 4. Dentes 8 equidistantes bigeminati, aut 16 per paria approximati unigeminati. (v. v.)

XXXI. BUXBAUMIA Hall. enum. p. 10. Brid. sp. musc. 3. p. 114. Arn. et Grev. tent. meth. musc. p. 82. t. 3. f. 13-23.

Seta terminalis; theca magna ovata obliqua, margine elevato crenulato; peristoma duplex, exterius ciliis numerosis subæqualibus inarticulatis subconnexis, interius membrana conica plicata truncata; calyptora mitræformis.

1. B. APHYLLA (L. sp. 1570.) \mathcal{U} in ericetis, locis sterilibus, rupibus rariis. — Fl. fr. 2. p. 513. et 5. p. 227. musc. brit. t. 22. — Dill. musc. t. 68. f. 5. — Buxb. cent. 2. t. 4. f. 2. Folia radicalia minutissima lanceolata, perichætialia in segmenta capillaria divisa. (v. v.)

XXXII. DIPHYSCIUM Mohr. obs. p. 34. Brid. sp. 3. p. 112. Arn. et Grev. tent. meth. musc. p. 76. t. 3. f. 1-12.

Seta terminalis brevissima; theca ovata obliqua, ore contracto ad

marginem subcrenulato; peristoma simplex; membrana conoidea truncata plicata; calyptora mitriformis.

1. *D. foliosum* (Mohr. l. c.) ad vias umbras sylvarum passim. — Musc. brit. t. 8. *Buxbaumia foliosa* L. Hedw. fund. t. 9. f. 51. Fl. fr. 2. p. 512. — Dill. musc. t. 32. f. 13. — Hall. helv. t. 46. f. 3. Folia perichaetalia numerosa thecam superantia oblongo-lanceolata acuminata. (v. v.)

Sect. III. PERISTOMA NULLUM.

+ OPERCULUM DECIDUUM.

XXXIII. HEDWIGIA Ehr. beytr. 1. p. 176. Hedw. fund. musc. 2. p. 86. Arn. et Grev. tent. meth. musc. p. 70. t. 2. f. 39-45.

Seta lateralis; theca globosa vel cylindracea ore nudo, operculo deciduo integro; calyptora dimidiata.

1. *H. AQUATICA* (Hedw. musc. frond. 3. p. 29. f. 11.) caule declinato ramoso, foliis imbricatis falcatis secundis, capsulis oblongis ovatis, operculo oblique rostellato. $\frac{2}{3}$ ad lapides in aquis fluentibus. — *Gymnostomum aquaticum* Fl. fr. 2. p. 444. *Anictangium aquaticum* Brid. — Dill. musc. t. 43. f. 70. (v. v.)

XXXIV. ANICTANGIUM Turn. musc. hib. p. 11. Hook. et Tayl. musc. brit. t. 1. Arn. et Grev. tent. meth. musc. t. 2. f. 29-46.

Seta terminalis; theca subcylindracea aut turbinata ore nudo; operculum deciduum integrum; calyptora mitriformis basi irregulariter fissa.

1. *A. CILIATUM* (Hedw. sp. musc. p. 40.) caule erecto ramosissimo, foliis imbricatis ovato lanceolatis apice attenuatis diaphanis, perichaetialibus longe ciliatis, capsula subsessili ovata, operculo planiusculo. $\frac{2}{3}$ in rupibus montium. — Musc. brit. t. 6. *Hedwigia ciliata* Hedw. st. cr. 1. t. 40. *Gymnostomum ciliatum* Fl. fr. 2. p. 445. *Schistidium ciliatum* Brid. — Dill. musc. t. 32. f. 5. — Vail. bot. t. 27. f. 18. (v. v.)
2. *A. PULVINATUM* (Röhl. ann. der. wett. gesellch. II. p. 200.) caule erecto ramoso, foliis imbricatis ovatis superioribus in pilum longum productis, capsula subsessili ovato-rotundata, operculo convexiusculo minimo. $\frac{2}{3}$ ad saxa in monte Dolaz Jurassi ex Brid., circā Mimatem (cl. Prost). — *Gymnostomum pulvinatum* Hedw. sp. t. 3. Fl. fr. 5. p. 208. *Schistidium pulvinatum* Brid. (v. s.)

XXXV. GYMNSTOMUM Schreb. gen. n. 1638. Hedw. fund. musc. 2. p. 87. Arn. et Grev. p. 46. t. 2. f. 1-21.

Seta terminalis; theca ore nudo; operculum deciduum obliquum integrum, calyptora dimidiata.

* *Caule breviusculo simplici.*

1. *G. TENUIS* (Hedw. sp. musc. t. 4. f. 1-4.) caule subnullo, foliis exterioribus brevissimis ovato-lanceolatis, interioribus linear-lanceolatis, omnibus erectis obtusis, nervo valido infra apicem evanido, capsula oblongo-cylindrica, operculo breviter rostrato. (1) in arenosis Galliae orientalis?, in rupibus siliceis Bruscae vallis propè Mutzig (Moug. et Nestl. vog. n. 810.). — Fl. fr. 5. p. 207. musc. brit. t. 7. *Bryum paucifolium* Dicks. crypt. 4. t. 11. f. 3. (v. s.)
2. *G. TRICHODES* (Web. et Mohr. tasch. p. 85.) caule brevissimo erecto, foliis lanceolato-subulatis strictis crassinerviis, capsula erecta oblongo-ovata, operculo conico-rostrato obliquo. (1) in Arvernia undis ex Brid., in granite irrorato praeerupt. montis Hohneck Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.). — Anic-

580 ACOTYL. SEU CELLULARES. GYMNSTOMUM.

tangium trichodes Schwægr. supp. 1. t. 12. Planta ut prior exilissima. (v. s.)

3. *G. MICAOSTOMUM* (Hedw. st. cr. 3. t. 30.) caule brevi dense cespitoso, foliis latè subulatis margine involutis flexuosis siccitate crispis, capsulâ ellipticâ ore contracto, operculo subulato incurvo. (I) ad vias circà Avenionem, Massiliam, Monspelium, Mimatem. — Fl. fr. 2. p. 448. eng. bot. t. 2215. musc. brit. t. 7. (v. s.)
4. *G. TORTILE* (Schw. supp. 1. t. 10.) caule erecto ramoso, foliis erecto-patulis lanceolato-subulatis carinatis siccitate tortilibus, capsulâ ovalâ ore constrictâ, operculo longo curvirostro. ♀ in Galloprovinciæ rupibus et muris dense cespitosum ex Brid. meth. p. 17. Schkuhr. deut. moos. t. 11. c. Theca aurea.
5. *G. MINUTULUM* (Schw. supp. 1. p. 25. t. 9.) caule erecto simplici subnullo, foliis patentibus oblongis nervo producto mucronatis integerrimis, capsulâ ovato-truncatâ, operculo convexo brevirostro. (I) in hortis argillosis Argentorati (cl. Mong. et Nestl.), Galliæ orientalis, Mimatis (cl. Prost). — Brid. meth. p. 12. Caulis brevissimus. (v. s.)
6. *G. SPHÆRICUM* (Schw. in Schrad. nen. bot. journ. 11. t. 2. B. et supp. 1. t. 8.) caule erecto subsimplici subelongato, foliis oblongo-ovatis subintegerrimis acuminulatis, nervo sub apicem evanido, capsulâ erectâ sphærica, operculo convexo mamillato. (I) in solo lato solo circà Luneville (cl. Mong. et Nestl.). — Brid. meth. p. 14. (v. s.)
7. *G. HÉMI* (Hedw. st. cr. 1. t. 30.) caule erecto simplici brevisculo, foliis lanceolatis subpatentibus nervo valido producto mucronulatis apice serratis, capsulâ erectâ ovato-oblongâ, operculo subulato obliquo. (I) circà S.-Valery-sur-Somme ex cl. Boucher, Parisios ex Beauv., Dax (cl. Grateloup). — Fl. fr. 2. p. 447. musc. brit. t. 7. *G. obtusum* Hedw. sp. t. 2. DC. fl. fr. 2. p. 447? *G. intermedium* Schw. 1. t. 7. DC. fl. fr. 5. p. 207. non herb. nec Brid. (v. s.)
8. *G. TRUNCATULUM* (Hoffm. germ. 2. p. 27.) caule simplici brevi erecto, foliis obovatis patulis planiusculis nervo ultrâ apicem producto apiculatis, capsulâ ovato-turbinatâ, operculo oblique rostrato. ♀ in arvis et muris frequens. — Fl. fr. 2. p. 446. musc. brit. t. 7. *G. truncatum* Hedw. st. cr. 1. t. 5. *G. intermedium* Turn. musc. hib. t. 1. f. a. Brid. meth. p. 15. DC. herb. non Fl. nec Schw. — Dill. musc. t. 45. f. 7. — Vaill. bot. t. 26. f. 2. (v. v.)
9. *G. OVATUM* (Hedw. st. cr. 1. t. 6.) caule erecto brevi simplici, foliis erectis ovatis concavis piliferis, nervo ad medium folii dilatato, capsulâ ovatâ aut oblongâ?, operculo longè rostrato. (I) ad muros saxaque. — Fl. fr. 2. p. 448. musc. brit. t. 7. eng. bot. t. 1889. (v. v.)
10. *G. PYRIFORME* (Hedw. sp. musc. p. 38.) caule brevi erecto simplici, foliis ovato-acuminatis concavis serratis immarginatis patentibus, nervo apicem attingente, capsulâ rotundo-ovatâ, operculo convexo brevissime rostrato, calyptra inflatâ. ♀ in pratis madidis et fossis. — Fl. fr. 2. p. 446. musc. brit. t. 7. eng. bot. t. 413. — Dill. musc. t. 44. f. 6. — Vaill. bot. t. 29. f. 3. (v. v.)
11. *G. FASCICULARE* (Hedw. sp. t. 4.) caule brevi simplici erecto, foliis oblongo-acuminatis planiusculis subserratis marginatis patentibus, nervo apicem attingente, capsulâ pyriformi, ore subcontracto, operculo planiusculo submammillato. (I) in terrâ argilloso circà Béfond, Parisios, Falaise, Nannetos, Mimatem. — Fl. fr. 5. p. 207. eng. bot. t. 1245. musc. brit. t. 7. *G. Rottleri* Schw. supp. t. 3. *Bryum attenuatum* Brid. meth. p. 117. (v. s.)

* * *Caulc elongato ramoso cespitoso, foliis integerrimis.*

12. *G. CURVIROSTRUM* (Hedw. st. cr. 2. t. 24.) caule elongato erecto ramoso, foliis lanceolato-subulatis erectis rigidis siccitate strictis, nervo erasso apicem attingente, capsulâ ovatâ, operculo oblique rostrato saepius incurvo capsulâ

- longiore. \mathcal{U} in Alpibus. — Fl. fr. 2. p. 447. musc. brit. t. 6. G. stelligerum Brid. Fl. fr. 5. p. 207. Bryum stelligerum Dicks. 2. t. 4. f. 4. (v. v.)
13. G. RUPESTRE (Schw. supp. 1. t. 1. p. 31. t. 10.) caulis densè cespitosis elongatis ramosis, foliis linearis-subulatis patentibus flexuosis siccitate tortilibus, capsula ovata, operculo conico-rostrato capsula breviore. \mathcal{U} in argillosis circa fontes Delphinatus propè Pont-Beauvoisin detexit cl. Dejean ex Brid. meth. p. 18. G. aeruginosum eng. bot. t. 2200. (v. s. ex Helv.)
14. G. ESTIVUM (Hedw. sp. t. 2.) caulis elongatis densè cespitosis, foliis lanceolatis brevibus rigidis siccitate contortis, perichaetialibus latè ovatis margine involutis, capsula oblonga laevi, operculo conico longè subulato capsulae longitudine. \mathcal{U} ad rupes madidas Jurassi. — Musc. brit. t. 6. G. compactum Fl. fr. 5. p. 206. Anictangium compactum Schw. supp. 1. t. 11. (v. s.)
15. G. VIRIDISSIMUM (Smith. eng. bot. t. 1583.) caulis densè cespitosis, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis patentibus, nervo apicem attingente, capsula ovato-oblonga erecta, operculo oblique rostrato capsula dimidiò breviore. \mathcal{U} ad arborum truncos in Neustriâ (cl. de Brébisson). — D. viridissimum Sm. brit. 1224. non DC. Weissia Forsteri Brid. (v. s.)
16. G. LAPONICUM (Hedw. st. cr. 3. t. 5. A.) caulis cespitosis, foliis linearis-lanceolatis patentibus siccitate crispis, perichaetialibus latè ovatis margine involutis, capsula turbinata striata, operculo oblique rostrato capsula dimidiò breviore. \mathcal{U} in umbrosis Alpium et Vogesorum monte Rotabae (cl. Moug. et Nestl.). — Fl. fr. 2. p. 445. musc. brit. t. 6. eng. bot. t. 2216. Anictangium lapponicum Schw. Schistidium striatum Brid. (v. s.)

XXXVI. SPHAGNUM Schreb. gen. n. 1637. Hedw. fund. musc. 2. p. 85. Arn. et Grev. p. 22. t. 1. f. 5-12.

Capsula integra, ore nudo, operculo deciduo in receptaculo lenticulari pedicellato sessili; calyptra irregulariter fissa nunc capsulae basi adnata nunc transversim dehiscens.

1. S. OBTUSIFOLIUM (Ehr. crypt. n. 241.) ramis tumidis, foliis ovatis obtusis concavis apice conniventibus, capsulis sphæricis. \mathcal{U} in paludibus. — Musc. brit. t. 4.
- a. vulgare* (Hook et Taylor.) caulis laxè cespitosis 7-8-pollicaribus, foliis dense imbricatis. — S. latifolium Hedw. Fl. fr. 2. p. 442. S. cymbifolium Hedw. fund. 2. t. 3. f. 1. — Dill. musc. t. 32. f. 1. (v. v.)
 - b. minus* (Hook et Tayl.) caulis densè cespitosis 2-3-pollicaribus, foliis dense imbricatis. — S. compactum Fl. fr. 2. p. 443. Schw. supp. t. 3. (v. s.)
2. S. SQUARROSUM (Web. et Mohr. it. suec. t. 2. f. 1. a. b.) ramis apice attenuatis, foliis ovato-acuminatis squarrosis recurvis, capsulis latè sphæricis. \mathcal{U} in paludosis sylvaticis rariis. — Fl. fr. 2. p. 443 et 5. p. 206. musc. brit. t. 4. eng. bot. t. 1498. (v. s.)
3. S. ACUTIFOLIUM (Ehr. crypt. n. 72.) ramis attenuatis, foliis ovato-lanceolatis imbricatis acutis apice conniventibus, capsula ovata. \mathcal{U} in paludibus montanis et sylvaticis. — Schw. supp. t. 5. musc. brit. t. 4. S. capillifolium Hedw. fund. 1. t. 3. f. 13, 14, 15. Fl. fr. 2. p. 442. — Dill. musc. t. 32. f. 2. A. (v. v.)
4. S. CUSPIDATUM (Ehr. er. n. 25.) ramis attenuatis, foliis laxis linearis-lanceolatis marginibus involutis truncato-erosis ob convolutionem cuspidatis, capsulis ovatis. \mathcal{U} in paludibus subnatans. — Fl. fr. 5. p. 205. Schw. supp. t. 6. musc. brit. t. 4. — Dill. musc. t. 32. f. 2. B. (v. v.)

†† OPERCULUM PERSISTENS.

XXXVII. VOITIA Hornsch. diss. p. 9. Arn. et Grev. tent. meth. p. 37. t. 1.
f. 17-22.

Seta terminalis sub capsula in discum infundibuliformem solidum dilatata; capsula ovata peristomate nullo cum seta decidua; operculum semper adnatum; calyptora magna persistens.

1. **V. VOGESIACA** (Hornsch. in Moug. et Nestl. st. crypt. 706.) foliis subulatis, calyptora mitriformi capsula longa rostrata duplo breviore. — Ad terram in præruptis montis Hohneck Vogesorum, autumno. — Bruchia Vogesiaca Schw. supp. 2. p. 2. t. 127. (v. s.)

XXXVIII. PHASCUM L. gen. 1189. Hedw. fund. musc. 2. p. 85.

Seta terminalis; capsula ovata aut subglobosa peristomate nullo à seta decidua; operculum semper adnatum; calyptora brevis fugax.

I. Surculis reptantibus aphyllis ramosis confervoideis.

1. **P. SERRATUM** (Schreb. phasc. t. 2.) caerule, foliis perichætialibus erectis lanceolatis serratis enerviis. (1) in arenosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 440. Dicks. crypt. fasc. 1. t. 1. f. 1. musc. brit. t. 5. P. stoloniferum Dicks. crypt. 3. t. 7. f. 2. Plantæ minimæ. (v. v.)

II. Surculis reptantibus nullis.

* Foliis magis minusve subulatis.

2. **P. ALTERNIFOLIUM** (Dicks. crypt. 1. t. 1. f. 2.) caulescens, surculis tenuibus elongatis foliosis, foliis remotiusculis alternis lanceolato - subulatis integris, nervo apicem subattigente, perichætialibus latioribus longioribusque capsulam involventibus. (1) in agris collibusque aridis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), circa Vire ex cl. de Brébisson. — eng. bot. t. 2107. musc. brit. t. 5. Pleuridium alternifolium Brid. (v. s.)

3. **P. CRISPUM** (Hedw. st. cr. 1. t. 9.) caulescens ramosum, surculis nullis, foliis patulis lanceolato - subulatis flexuosis siecitate crispis, superioribus capsulam involventibus superantibusque. (2) in terra humidâ passim. — Fl. fr. 2. p. 441. eng. bot. t. 1680. musc. brit. t. 5. (v. v.)

4. **P. SUBULATUM** (L. sp. 1570.) caulescens simplex erectum, foliis subulato-setaceis rigidis strictis, nervo infra apicem evanido, superioribus capsulam involventibus superantibusque. (2) ad vias frequens. — Fl. fr. 2. p. 441. Hedw. st. cr. 1. t. 35. musc. brit. t. 5. — Dill. musc. t. 32. f. 10. — Vaill. bot. t. 29. f. 4. (v. v.)

5. **P. AXILLARE** (Dicks. crypt. 1. t. 1. f. 3.) caulescens subsimplex erectum, foliis lanceolato - subulatis strictis patulis carinatis, nervo infra apicem evanido, capsula breviter pedicellata elliptica terminali mox axillari erectâ demum curvâ. (2) ad terram circa Parisios et in Vogesis inferioribus (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 5. p. 204. musc. brit. t. 5. P. nitidum Hedw. st. cr. 1. t. 34. Bach. in journ. bot. 1813. t. t. 19. f. 13. (v. s.)

* * Foliis magis minusve ovatis.

6. **P. PATENS** (Hedw. st. cr. 1. t. 10.) caulescens erectum simplex, foliis patentibus angustè ovatis serratis nervo apicem subattigente, seta immersâ, capsula foliis breviore. (2) in pratis humidis propè Bipontem ex Moug. et Nestl. vog. n. 704 et probabiliter in Gallia finitima. — eng. bot. t. 1279. musc. brit. t. 5. (v. s. ex Biponte.)

7. **P. PACHYCARPON** (Schw. supp. 1. p. 1. p. 6. t. 2. f. 1-7.) subacaule, foliis linearibus serratis patulis, nervo infra apicem evanido, seta immersâ, capsula

- deoperita. (I) propè Marly ex Bach. in journ. bot. 3. p. 268. — P. recuevifolium Brid. meth. p. 6. non Dicks. Schk. dent. moos. t. 4.
8. P. MUTICUM (Schreb. phasc. t. 1. f. 11-14.) subacaule erectum minimum, foliis ovatis acuminatis concavis apice serratis conniventibus, nervo apicem attingente, superioribus capsulam sessilem omnino involventibus. (I) ad sepes et aggeres. — Fl. fr. 2. p. 439. eng. bot. t. 2027. musc. brit. t. 5. — Dill. musc. t. 32. f. 12. (v. v.)
9. P. CUSPIDATUM (Schreb. phasc. t. 1. f. 1-5.) caulescens simplex erectum, foliis ovato-acuminatis nervo producto cuspidatis, inferioribus patulis, superioribus erectis conniventibus capsula subsessili longioribus. (I) in horitorum areis, muris. — Fl. fr. 2. p. 439. musc. brit. t. 5. P. curvisetum Dicks. cr. 4. t. 10. f. 4. Fl. fr. 5. p. 205. P. elatum Schw. supp. t. 1. — Vaill. bot. t. 27. f. 2. — Dill. musc. t. 32. f. 11. (v. v.)
10. P. BRYOIDES (Dicks. crypt. 4. t. 10. f. 3.) caulescens subsimplex erectum, foliis erectis ovatis nervo producto apiculatis, seta exserta stricta, capsula elliptica, operculo conico. (I) ad terram propè Aureliam, Parisios, Falaise ex cl. de Bréb. — Fl. fr. 5. p. 205. Schw. supp. 1. t. 1. f. 1. musc. brit. t. 5. P. gymnostomoides Brid. (v. s.)
11. P. RECTUM (With. arr. p. 787. t. 18. f. 1.) acaule erectum simplex, foliis latoovatis breviter acuminatis, seta exserta suberecta, capsula subelliptica. (I) in arvis ad terram lutesam Vogesorum et Andegavi (Moug. et Nestl. vog. n. 804.) — Musc. brit. t. 5. (v. s.)
12. P. CURVICOLLUM (Hedw. st. cr. 1. t. 11.) subacaule erectum simplex, foliis angustè ovatis acuminatis, nervo apicem subattingente, seta exserta incurva, capsula globosa. (I) in sabulosis aridis. — Fl. fr. 2. p. 440. eng. bot. t. 905. musc. brit. t. 5. (v. v.)

XXXIX. ANDRÆA Ehr. beyt. 1. p. 15 et 180. Hedw. sp. p. 47.

Seta terminalis; capsula 4-valvis valvis operculo persistente apice cohærentibus; calyptra irregulariter fissa.

1. A. ALPINA (Hedw. sp. musc. p. 49.) caule ramoso, foliis oblongo-spathulatis apiculatis enerviis concavis undique imbricatis, perichaetialibus oblongis acutis, interioribus circa pedicellum circumvolutis. (I) in Alpibus. — Fl. fr. 2. p. 450. Hook. in Linn. trans. 10. t. 31. f. 1. musc. brit. t. 8. Jungermannia alpina L. — Dill. musc. t. 83. f. 39. (v. v.)
2. A. RUPESTRIS (Hedw. sp. musc. t. 7. f. 2.) caule ramoso, foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis apice falcatis enerviis subsecundis, perichaetialibus erectis oblongis margine involutis. (I) in Alpibus, Vogesis et montibus agri Ligericini (el. Prost). — Fl. fr. 2. p. 449. musc. brit. t. 8. Jungermannia rupestris. L. (v. s.)
3. A. ROTII (Mohr. cr. germ. t. 11. f. 7-9.) caule simpliciculo, foliis lanceolato - subulatis falcato - secundis uninerviis fragilibus, perichaetialibus oblongis enerviis margine involuto. (I) in rupibus siliceis Vogesorum, Pilati, montium Mimatis (el. Prost). Nenstria ex cl. de Bréb. et Lenormand. — Fl. fr. 5. p. 208. musc. brit. t. 8. — Dill. musc. t. 83. f. 40. (v. v. DC.)

Ordo CXVIII. HEPATICÆ *Adans. fam. t. 2. p. 14. Juss.*
gen. 7.

Frondes virescentes, nunc expansæ membranaceæ aut folia-
ceæ sinuatæ aut lobatæ sæpiùs ramosæ dichotomæ repentes
infernè radicantes, lichenibus foliaceis subanalogæ ; nunc
caule radiculis ramis et foliis (sicut in *Muscis*) distinctis
gaudentes. Organa sexualia sede distincta, monoica aut inter-
dùm dioica. Flores axillares rarò epiphylli, sæpiùs pedicellati.
Masc? Globuli liquore fecundante pleni, nudi aut aggregati
in calyce sæpiùs sessili. *Fem.* Ovaria nuda aut perichætio
cincta ; capsulæ 1-loculares sæpiùs pedunculatæ, mox clausæ,
mox apice perforatæ, mox 2-8-valves, semper operculo desti-
tutæ. Semina tenuissima (in plurimis) filamentis spiraliter
tortis (elateriis) adhærentia.

Trib. I. JUNGERMANNIEÆ. — Hepaticæ muscosæ Fl.
fr. 2. p. 420.

Capsulæ in valvulas dehiscentes.

† CAPSULÆ 4-SEU-8-VALVES.

I. Capsulæ solitariæ.

I. JUNGERMANNIA L. gen. 1196. Hook. jung. introd.

Receptaculum commune nullum ; vagina univalvis tubulosa, capsula
globulosa solitaria pedicello vaginâ longiori insidens quadrivalvis, ma-
tura apice dehiscens.

Sect. I. JUNGERMANNIE FOLIOSÆ EXSTIPULATÆ.

* Foliis multifariam insertis.

1. J. TRICHOHYLLA (L. sp. 1601.) caule repente vage ramoso, foliis undique
imbricatis hinc illinc fasciculatis setaceis articulatis patentibus rectis, capsulâ
terminali, vaginis oblongis, ore contracto ciliato. — In Alpibus et Vogesis
(cl. Moug. et Nestl.), aprili. — Fl. fr. 2. p. 437. Hook. jung. t. 7. — Dill.
musc. t. 73. f. 37. Sureuli capillares pollicares aut semipollicares. (v. s.)

2. J. JULacea (L. sp. 1601.) caule erectiusculo vage ramoso filiformi, foliis
arctè imbricatis quadrisariis ovatis erectis acutè bifidis segmentis lanceolatis
acuminatis subserratis, perichætialibus quadripartitis, capsulâ terminali, va-
ginis oblongis superne plicatis, ore aperto dentato. — In Alpibus. — Fl. fr.
5. p. 204. Hook. jung. t. 2. non Fl. fr. 2. p. 437. eng. bot. t. 1024. — Dill.
musc. t. 73. f. 38. Caules capillares pollicares aut semipollicares. (v. s. ex
Helv.)

** Foliis bifariis indivisis.

3. J. ASPLENIoidES (L. sp. 1597.) caule ascendentे ramoso, foliis obovato-ro-
tundis ciliato-dentatis subrecurvis, capsulâ terminali aut laterali, vaginis
oblongis compressis obliquis ore truncato subciliato. — In umbrosis humidis,
maio. — Fl. fr. 2. p. 431. Hedw. th. t. 16 et 17. Hook. jung. t. 13. — Dill.
musc. t. 69. f. 5 et 6. Caules funiculi latitudine 2-5-pollicares, folia 1-2-lineas
longa. (v. v.)

4. *J. LANGEOLATA* (L. sp. 1597.) caule procumbente subsimplici, foliis patentibus ovato-subrotundis, capsula terminali, vaginis oblongis cylindraceis apice depresso planis ore contracto inciso-dentato. — Ad rupes muscosas madidas Vogesorum (cl. Moug.). — Fl. fr. 5. p. 201. Hook. jung. t. 18. non fl. fr. 2. p. 431. — Michel. nov. gen. t. 5. f. 6 et 7. Caules 3-6 lineas longi; folia vix quartam lineæ partem æquantia. Primo vere capsules profert. (v. s.)
5. *J. AUTUMNALIS* (DC. fl. fr. 5. p. 202.) caule procumbente subsimplici, foliis patentibus rotundatis integris, capsula terminali, vaginis cylindraceis longis rectis ore dentato, dentibus rectis elongatis acentis. — In sylvis abietinis Vogesorum (cl. Moug. et Nestler.) (v. s.)
6. *J. CORDIFOLIA* (Hook. jung. t. 32.) caule erecto flexuoso dichotomo, foliis erectis concavis cordatis circumvolutis, capsula terminali aut axillari, vaginis oblongo-ovatis subuplicatis ore minuto denticulato. — In umbrosis Gallo-provinciæ (cl. Deleuze). — Fl. fr. 5. p. 200. Caules 1-3-pollicares, folia ex semilineâ ad lineam longa. (v. s.)
7. *J. SPHAGNI* (Dicks. crypt. 1. t. 1. f. 10.) caule procumbente simpliciusculo, elongationibus gemmiferis solummodo stipulatis, foliis orbicularibus, capsula in ramis propriis terminali, vaginis oblongis utrinque attenuatis, ore contracto denticulato. — In paludibus elatioribus Jurassi (cl. Chaillet), Vogesorum inter sphagna (cl. Mong. et Nestl.). — Hook. jung. t. 33. et supp. t. 2. eng. bot. t. 2470. Caules 2-4 pollices alti; folia semilineam longa perichætalia superiora emarginata aut laciniata. (v. s. sine fructu.)
8. *J. CRENULATA* (eng. bot. t. 1463.) caule procumbente ramoso, foliis rotundatis marginatis, capsula terminali, vaginis obovatis compressis longitudinaliter quadrangularibus ore contracto dentato. — In paludosis circa Nannetes, Falaise ex cl. de Bréb., et in Vogesis, aprilie et maio. — eng. bot. t. 1463. Hook. jung. t. 37. et supp. t. 1. Caules subpollicares filiformes; folia semilineam longam. (v. s.)
9. *J. SPHEROCARPA* (Hook. jung. t. 74.) caule ascendente simplici, foliis orbiculatis, capsula terminali sphæricâ, vaginis oblongo-ovatis cylindraceis quadrisfidis. — Ad terram et saxa madida montis Bresoir Vogesorum, junio (cl. Moug. et Nestl.). — Caules filiformes subsemipollicares; folia remotiuscula. (v. s.)

* * * *Foliis bifariis emarginatis vel bifidis, segmentis æqualibus.*

10. *J. EMARGINATA* (Ehr. beytr. 3. p. 80.) caule erecto ramoso, foliis laxè imbricatis patentibus obcordatis emarginatis, capsula terminali, vaginis ovatis dentatis in foliis immersis. — Ad terram et lapides Vogesorum, Alpium, Lugduni (cl. Gilibert), agri Syrtici (cl. Grataloup), vere. — Hook. t. 27. Fl. fr. 5. p. 197. *J. macrorhiza* Dicks. crypt. 2. t. 5. f. 10. Caules 1-4-pollicares, folia quartam aut dimidiam lineæ partem æquantia. (v. s.)
11. *J. GRAVEOLENS* (Schrad. samml. 106.) caule prostrato basi ramoso, foliis ovatis subquadratis apice acute bidentatis, stipulis minimis inter fibrillas radicales latentibus. — Ad rupes madidas circa Bruyeres (cl. Moug. et Nestl.), aestate. — Fl. fr. 5. p. 197. (v. s.)
12. *J. CONCINNATA* (Lightf. scot. 2. p. 786.) caule erecto ramoso, foliis arcuatis imbricatis erectis concavis ovatis obtusis emarginatis, capsula terminali, vaginis nullis. — In spongiosis montanis Vogesorum, Alpium, junio. — Fl. fr. 5. p. 203. eng. bot. t. 2220. Hook. jung. t. 3. *J. julacea* Fl. dan. t. 1002. Fl. fr. 2. p. 437 non L. Caules capillares ex semipollice ad pollicem alti. (v. s.)
13. *J. INFLATA* (Huds. ang. 511.) caule procumbente simplici aut ramoso, foliis subrotundis concavis acutè bifidis, segmentis rectis obtusis, capsula terminali, vaginis pyriformibus ore contracto dentato. — In paludosis Alpium. — Hook. jung. t. 38. Fl. fr. 5. p. 196. *J. bicrenata* Schmied. ic. t. 64. f. 1. excl. Dill. syn. Caules tenues quartam aut dimidiam pollicis partem alti; folia plus minus laxa. (v. s. ex Helv.)

586 ACOTYL. SEU CELLULARES. JONGBEMANNIA.

14. *J. excisa* (Dicks. crypt. 3, t. 8, f. 7.) caule prostrato simplicisculo, foliis patentibus subquadratis profunde emarginatis, capsula terminali, vaginis oblongis ore plicato dentato. — Ad terram in Vogesis, Jurasso, Alpibus et agro Syrtico propè Dax (cl. Grateloup), maio. — Hook. jung. t. 9 et supp. t. 2, eng. bot. t. 2496. Fl. fr. 5, p. 200. J. Funckii Web. et Mohr. crypt. 422. Fl. fr. 5, p. 199. Planta minuta ex semilinea ad tres lineas alta, folia quartam lineae partem aequantia. (v. v.)
 15. *J. ventricosa* (Dicks. crypt. 2, p. 14.) caule prostrato subramoso, foliis patentibus subquadratis obtuse emarginatis lateribus incurvis, capsula terminali, vaginis oblongis ore contracto plicato dentato. — In sylvis Alpium et Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), propè Falaise ex cl. de Bréb., vere. — Hook. jung. t. 28, eng. bot. t. 2568. Fl. fr. 5, p. 198. — Micheli gen. t. 5, f. 13 et 15. — Dill. muse. t. 70, f. 14. Caules 6-9 lineas alti, folia quartam lineae partem vix aequantia. Rarissime fructificat. (v. s.)
 16. *J. bicuspidata* (L. sp. 1589.) caule procumbente stellatum ramoso, foliis subquadratis acutè bifidis, segmentis acutis rectis integerrimis, capsula terminali, vaginis oblongis plicatis ore dentato. — In umbrosis humidis Galliae occidentalis borealisque, aprilii. — Fl. fr. 2, p. 429. Hook. jung. t. 11, et supp. t. 4, eng. bot. t. 2239. — Mich. gen. t. 6, f. 17. — Dill. muse. t. 70, f. 13. Sureculi filiformes 12-18 lineas longi, folia laxa vix quartam lineae partem alta; perichætialia dense imbricata. (v. v.)
 17. *J. byssacea* (Roth. cat. 2, p. 158.) caule procumbente stellatum ramoso, foliis subquadratis obtuse bifidis segmentis acutis, capsula terminali, vaginis oblongis plicatis ore dentato. — In Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), circa Falaise ex cl. de Bréb. martio. — Hook. t. 12. Fl. fr. 5, p. 199. *J. divaricata* eng. bot. t. 719. Planta minutissima; sureculi vix capillares 2-3-lineas alti; folia laxa minima vix oculo armato discernenda. (v. s.)
 18. *J. connivens* (Dicks. crypt. 4, t. 11, f. 15.) caule procumbente stellatum ramoso, foliis orbicularibus concavis apice lunulari-emarginatis, capsula in ramis propriis brevissimis centralibus terminali, vaginis oblongo-ovatis ore ciliato. — In fissuris rupium Vogesorum, aprilii et maio. — Fl. fr. 5, p. 196. Hook. jung. t. 15. Sureculi filiformes 6-12 lineas longi; folia minutissima quindecimam-decimam lineae partem longa. (v. s.)
 19. *J. curvifolia* (Dicks. crypt. 2, t. 5, f. 7.) caule procumbente stellatum ramoso, foliis subrotundis valde concavis bifidis, segmentis acuminate incurvatis, capsula in ramis propriis brevissimis centralibus terminali, vaginis oblongis subuplicatis ore dentato. — In sylvaticis Vogesorum ad truncos arborum (cl. Moug. et Nestl.). — Fl. fr. 5, p. 198. Hook. jung. t. 16, et supp. t. 1. *J. birostrata* Schleich. in fl. fr. 2, p. 430. Caules 6-9 pollices alti, folia plurimum dense imbricata octavam-quartam lineae partem aequantia.
- * * * * *Foliis bifariis 3-4-fidis, segmentis aequalibus.*
20. *J. incisa* (Schrad. samml. 2, p. 5.) caule prostrato depresso simplicisculo, foliis subquadratis undulatis subtrifidis segmentis inaequalibus hinc illinc denticulatis, capsula terminali, vaginis obovatis. — In Vogesis, Alpibus, agro Syrtico (cl. Gratel.), maio. — Fl. fr. 5, p. 195. Hook. t. 10. Canes tres circa lineas alti. (v. v.)
 21. *J. fusilla* (L. sp. 1602.) caule procumbente subsimplici, foliis horizontalibus quadratis undulatis obtuse 2-3-crenatis, capsula terminali, vaginis campanulatis. — Ad terram humidam, autumno. — Fl. fr. 2, p. 429. eng. bot. t. 1175. Hook. t. 69. *J. Michelii* Mér. par. II. t. 1, p. 219. — Mich. nov. gen. t. 5, f. 10. — Dill. muse. t. 74, f. 46. Caules 1-4-lineas longi vaginæ ore varie crenato et undulato, capsulae irregulariter dehiscentes. (v. v.)
 22. *J. setiformis* (Ehr. beytr. 3, p. 40.) caule erecto subsimplici, foliis bifariis arete imbricatis erectis quadratis 4-fidis, angulis inferioribus margine hinc illinc spinuloso-dentatis, capsulis terminalibus lateralibusque, vaginis oblongis plicatis ore aperto dentato. — In Gallia australi, rariissime fructificans. — Fl. fr.

2. p. 457. Hook. t. 20. Caules tenues filiformes 2-3-pollices alti, folia quartam lineæ partem longa. (v. s.)
 * * * * * Foliis bifariis bifidis, segmentis inæqualibus conduplicatis.
23. J. NEMOROSA (L. sp. 1598.) caule erecto subdichotomo, foliis inæqualiter bilobis semibifidis dentato-ciliatis lobis conduplicatis, inferioribus majoribus obovatis, superioribus subcordatis obtusis, capsula terminali, vaginis oblongis incurvatis compressis ore truncato dentato-ciliato. — In nemoribus humidis, vere. — Fl. fr. 2. p. 435. Hook. t. 21. — Micheli nov. gen. t. 5. f. 8. — Dill. musc. t. 71. f. 18, 19 et 21. Caules 1-4-pollices alti, folia ex semi-linea ad lineam longa. (v. v.)
24. J. UMBROSA (Schrad. samml. 2. p. 5.) caule erectissimo subramoso, foliis inæqualiter bilobis, lobis conduplicatis apice serratis acutis, inferioribus majoribus ovatis, superioribus rotundato-ovatis, capsula terminali, vaginis oblongis incurvatis compressis ore truncato integerrimo. — In sylvis Alpium et Vosgesorum (cl. Moug. et Nestl.), maio. — Fl. fr. 5. p. 203. Hook. jung. t. 24. et supp. t. 3. Caules 3-6-lineas alti, folia arcte imbricata semi-lineam longa. (v. s.)
25. J. UNDULATA (L. sp. 1598.) caule erecto subdichotomo, foliis inæqualiter bilobis undulatis integrerimis, lobis subrotundatis conduplicatis, inferioribus majoribus, capsula terminali, vaginis oblongis incurvatis compressis, ore truncato integerrimo. — In uliginosis montosis, maio. — Fl. fr. 2. p. 435. Hook. t. 22. — Dill. musc. t. 71. f. 17. Caules 1-4 pollices alti, folia inferiora laxiuscula. (v. v.)
26. J. RESUPINATA (L. sp. 1598.) caule procumbente simpliciculo, foliis rotundatis subæqualiter bilobis integrerimis lobis conduplicatis, capsula terminali. vaginis oblongis incurvatis compressis ore truncato edenticulato. — Ad fissuras saxorum Alpium, ad terram in viis cavis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), circa Falaise ex cl. de Bréb., junio. — Fl. fr. 2. p. 435. Hook. t. 23. Caules 7-9-lineas alti. (v. s.)
27. J. ALBICANS (L. sp. 1599.) caule erecto subdiviso, foliis inæqualiter bilobis lobis conduplicatis medio pellucidis apice serratis, inferioribus majoribus subacuminatiformibus, superioribus oblongo-ovatis acutis, capsula terminali, vaginis obovatis cylindraceis, ore contracto dentato. — In locis umbrosis, vere. — Fl. fr. 2. p. 436. eng. bot. t. 2240. Hook. t. 25. J. varia L. — Michel. gen. t. 5. f. 9. — Vaill. bot. t. 19. f. 5. Caules 1-2 pollices alti, folia ex semi-linea ad lineam longa. (v. v.)
28. J. OBTUSIFOLIA (Hook. jung. t. 26.) caule ascendentे simplici, foliis inæqualiter bilobis lobis conduplicatis obtusis integrerimis; inferioribus majoribus subacuminatiformibus, superioribus ovatis, capsula terminali, vaginis obovatis ore contracto dentato. — Ad terram viarum cavarn in sylvis montosis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), maio. — Caules vix 3-4 lineas alti, folia arcte imbricata quartam-secundam lineæ partem æquantia. (v. s.)
29. J. MINUTA (Dicks. crypt. 2. p. 13.) caule erecto subdichotomo, foliis horizontaliter patentibus acutiusculis subconduplicatis superioribus æqualiter inferioribus inæqualiter bilobis, capsula terminali, vaginis obovatis apice parum plicatis, ore contracto denticulato. — Ad rapes inter muscos in Alpibus et Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.), vere. — Hook. jung. t. 44. Fl. fr. 5. p. 194. — Dill. musc. t. 69. f. 2. Caules filiformes 6-18 lineas alti, folia vix quartam lineæ partem æquantia remotiuscula. (v. s.)
30. J. EXSECTA (Schmid. ic. t. 62. f. 2.) caule prostrato simpliciculo, foliis inæqualiter bilobis lobis subconduplicatis, inferioribus majoribus ovatis acutis concavis apice sèpè bidentatis; superioribus minutis dentiformibus, vaginis obovatis, ore dentato. — In paludosis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.). — Hook. t. 19. et supp. t. 1. Fl. fr. 5. p. 195. Caules 4-5 lineas alti, folia imbricata tertiam lineæ partem æquantia. (v. s.)
31. J. COMPLANATA (L. sp. 1599.) caule repente vage ramoso, foliis distichis superne imbricatis inæqualiter bilobis, lobis superioribus majoribus orbicu-

588 ACOTYL. SEU CELLULARES. JUNGERMANNIA.

latia, inferioribus ovatis adpressis planis, capsula terminali, vaginis oblongis compressis truncatis. — In truncis arborum frequens, hyeme capsulifera. — Fl. fr. 2. p. 434. eng. bot. t. 2499. Hook. t. 81. — Mich. gen. t. 5. f. 21. — Vaill. bot. t. 19. f. 9. Caules 1-3 pollices longi. (v. v.)

Sect. II. JUNGERMANNIAE FOLIOSÆ STIPULATÆ,

* *Foliis integris vel rariis hinc illinc emarginatis.*

32. *J. SCALARIS* (Schrad. samml. 2. f. 4.) caule repente simplici, foliis rotundatis concavis integris emarginatisque, stipulis late subulatis, capsula terminali, vaginâ foliis immersâ ovatâ, ore 4-dentato. — In nemorosis, martio. — Fl. fr. 2. p. 428 et 5. p. 195. Hook. jung. t. 61. J. lanceolata Fl. fr. 2. p. 431. eng. bot. t. 605. Caules 3-7 lineas alti, folia imbricata quartam-secundam lineæ partem æquantia. (v. v.)

33. *J. POLYANTHOS* (L. sp. 1597.) caule procumbente subramoso, foliis horizontalibus rotundato-quadratis planis integris emarginatisque, stipulis oblongis bifidis, capsula in ramis propriis ex parte caulis inferiori egredientibus laterali, vaginis calyptâ dimidio brevioribus bilabiatis laciniatis. — In nemoribus, aprilii. — Fl. fr. 2. p. 431. eng. bot. t. 2479. Hook. jung. t. 62. — Vaill. bot. t. 19. f. 7. — Dill. musc. t. 69. f. 7 et 8. Caules 1-2-pollicares, folia imbricata semi-lineam longa. (v. v.)

34. *J. VITICULOSA* (L. sp. 1597.) caule procumbente ramoso, foliis horizontalibus planis ovatis integris, stipulis latè ovatis dentato-laciniatis, capsula lateralî, vaginis subterraneis oblongis carnosis, ore squamis foliaceis fibrato. — In sylvis humidis, vere. — Fl. fr. 2. p. 430. eng. bot. t. 2513. Hook. t. 60. — Mich. gen. t. 5. f. 4. Caules 1-3-pollicares, folia conferta bifaria semi-lineam longa. (v. v.)

35. *J. FISSA* (Scop. carn. 2. p. 348.) caule repente subsimplici, foliis horizontalibus convexis ovatis integris emarginatisque, stipulis rotundatis lanulari-emarginatis, capsulis lateralibus, vaginis subterraneis oblongis carnosis hirsutis, ore crenato. — Ad terram humidam. — Fl. fr. 2. p. 429. J. Trichomanis Dicks. crypt. 3. t. 8. f. 5. Hook. t. 79. Mnium fissum L. — Dill. musc. t. 31. f. 5. et 6. — Mich. t. 5. f. 14. Caules 1-2-pollicares, folia imbricata usque ad semi-lineam longa. (v. s.)

** *Foliis 2-3-fidis, segmentis æqualibus.*

36. *J. BIDENTATA* (L. sp. 1598.) caule procumbente ramoso, foliis latè ovatis decurrentibus apice bifidis segmentis valde acutis integerrimis, stipulis 2-3-fidis laciniatisque, capsula terminali, vaginis oblongis subtriangularibus, ore laciniato. — In sylvaticis ad terram et truncos putridos, maio. — Fl. fr. 2. p. 450. eng. bot. t. 606. Hook. t. 30. — Vaill. par. t. 19. f. 8. — Dill. musc. t. 70. f. 11. Caules 12-18 lineas alti, folia bifaria conferta lineam subæquantia. (v. v.)

37. *J. HETEROPHYLLA* (Schrad. journ. 5. p. 66.) caule repente ramoso, foliis rotundato-ovatis decurrentibus apice emarginatis integris, stipulis 2-3-fidis hinc illinc sublaciniatis, capsula terminali, vaginis ovatis obtusè triangularibus, ore laciniato. — Ad truncos putridos Alpium et Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), vere. — Fl. fr. 5. p. 198. Hook. jung. t. 31. — Dill. musc. t. 79. f. 12. Caules 6-9-pollicares, foliabisaria conferta vix sesquilineam excedentia. (v. s.)

38. *J. STIPULATÆ* (Hook. jung. t. 41.) caule procumbente simplici, foliis rotundatis apice acute emarginatis, stipulis magnis ovatis acuminatis propè basin margine utrinque unidentato, capsula laterali, vaginis obovatis apice subplatis ore contracto obtusè dentato. — Ad lapides in sylva Beauremont et circa Retournemer Vogesorum (cl. Mong. et Nest.), maio. — Caules filiformes vix 3 lineas excedentes, folia minuta bifaria conferta. (v. v.)

39. *J. FRANCISCI* (Hook. jung. t. 49.) caule erectiusculo simplici vel ramoso, foliis ovatis concavis acute emarginatis, stipulis minutis ovatis bifidis, capsula in ramis propriis terminali, vaginis oblongo-cylindraceis parum plicatis, ore dentato. — Ad ligna putrida Alpium. — Fl. fr. 5. p. 199. Caules filiformes

mes vix 5-6 lineas excedentes, folia bifaria sextam lineæ partem subæquantia.
(v. s. ex Helv.)

40. *J. BARBATA* (Schreb. spic. p. 107.) caule procumbente simpliciscono, foliis rotundato-quadratis tri-quadrifidis, stipulis lanceolatis acutè bifidis margine laciniatis, capsula terminali, vaginis ovatis ore contracto dentato. — In Alpium, Vogesorum et Pyrenæorum locis umbrosis humidis, maio. — Fl. fr. 2. p. 429. et 5. p. 196. Hook. t. 70. J. 5-dentata Huds. eng. bot. t. 2517. — Mich. gen. t. 5. f. 11. — Dill. muse. t. 71. f. 22. et 23. Caules 1-3 pollicares, folia semi-lineam longa disticha alterna. (v. v.)

41. *J. REPTANS* (L. sp. 1599.) caule repente stellatim ramoso, foliis superne imbricatis subquadratis incurvis acutè 4-dentatis, stipulis lato-quadratis 4-dentatis, capsula radicali, vaginis oblongis plicatis ore dentato. — In ligno putrido Alpium et Vogesorum, circè Falaise ex cl. de Bréb., april. — Fl. fr. 2. p. 433. Hook. t. 75. — Mich. gen. t. 6. f. 2. — Dill. musc. t. 71. f. 24. Caules 6-18 lineas longi filiformes, folia perichætialia albescentia. (v. s.)

42. *J. TRILOBATA* (L. sp. 1599.) caule repente flexuoso ramoso, foliis superne imbricatis ovatis convexis obtuse tridentatis, stipulis lato-subquadratis crenatis, capsula è parte caulis inferiore egrediente, vaginis oblongis subacuminatis ore lateraliter fissio. — In sylvis montosis Alpium, Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), circè Falaise (cl. de Bréb.), augusto. — Fl. fr. 2. p. 432. Hook. t. 76. J. radicans eng. bot. t. 2232. — Mich. gen. t. 6. f. 2. Caules 3-5 pollices alti, folia disticha. (v. s.)

* * * *Foliis bifidis, segmentis inæqualibus conduplicatis.*

43. *J. PLATYPHYLLA* (L. sp. 1600.) caule procumbente pinnatum ramoso, foliis inæqualiter bilobis, lobis superioribus rotundato-ovatis subintegerrimis, inferioribus stipulisque ligulatis integerrimis, capsula laterali, vaginis ovatis compressis ore truncato inciso-serrato hinc longitudinaliter fissis. — Ad truncos arborum et saxa. — Fl. fr. 2. p. 433. eng. bot. t. 798. Hook. t. 40, et supp. t. 3. — Vaill. bot. t. 19. f. 9. Dill. musc. t. 72. f. 32. Caules 1-5 pollices alti; folia dense imbricata disticha, pedunculus vix vaginam æquans. (v. v.)

44. *J. LÆVIGATA* (Schrad. samml. 2. p. 6.) caule procumbente vagè bipinnatum ramoso, foliis inæqualiter bilobis spinuloso-dentatis, lobis superioribus rotundato-ovatis, inferioribus ligulatis, stipulis oblongo-quadratis spinuloso-dentatis. — In Alpibus et Vogesis (cl. Moug. et Nestl.); propè Falaise ex cl. de Bréb., hucusque sine fructu. — Fl. fr. 2. p. 432. Hook. t. 35. J. vernicosa Cass. in Mer. paris. II. t. 1. p. 221. Caules 2-4 pollices longi, folia $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -lineæ longa bifaria dense imbricata. (v. s. sine fr.)

45. *J. CILIARIS* (L. sp. 1601.) caule procumbente pinnatum ramoso, foliis valde convexis inæqualiter bilobis, lobis lobulisque ovatis bipartitis longè tenuiterque ciliatis, stipulis subquadratis apice 4-5-lobis longissimè ciliatis, capsula laterali, vaginis obovatis ore contracto dentato. — Ad truncos putridos, april. — Fl. fr. 5. p. 203. Hook. t. 65. J. pulcherrima Web. — Dill. musc. t. 69. f. 3. Caules 1-3 pollices longi, folia imbricata bifaria semi-lineam alta. (v. v.)

46. *J. TOMENTELLA* (Ehr. beytr. 2. p. 150.) caule erectiusculo bipinnato, foliis planiusculis inæqualiter bilobis capillari-multifidis, lobis superioribus bipartitis, inferioribus minutis, stipulis subquadratis laciniatis, capsula axillari, vaginis oblongis cylindraceis hirsutis ore aperto. — In umbrosis humidis. — Fl. fr. 2. p. 436. Hook. t. 36. eng. bot. t. 2242. J. ciliaris Weiss. non L. — Vaill. bot. t. 26. f. 11. Dill. musc. t. 73. f. 35. Caules 2-4 pollices longi, folia imbricata semi-lineam longa. Rarissimè fructificat. (v. s. sine fructu.)

47. *J. SERPYLLIFOLIA* (Dicks. crypt. 4. p. 19.) caule repente vagè pinnatum ramoso, foliis inæqualiter bilobis lobis superioribus rotundatis, inferioribus minutis involutis, stipulis rotundatis acutè bifidis, capsula laterali, vaginis latè obovatis pentagonis ore contracto elevato subdentato. — In Alpibus, Vogesis, propè Falaise, Cænomanum, in agro Syrtico (cl. Gratieloup), hyeme et

590 ACOTYL. SEU CELLULARES. JUNGERMANNIA.

primo vere. — Fl. fr. 5. p. 202. Hook. t. 42. — Mich. gen. t. 6. f. 19. — Dill. musc. t. 72. f. 30. Caules 6-9 lineas longi flexuosi, folia disticha imbricata, capsula alba pellucida. (v. s.)

48. *J. DILATATA* (L. sp. 1600.) caule repente vagè ramoso, foliis inæqualiter bilobis, lobis superioribus subrotundis, inferioribus rotundatis saccatis, stipulis rotundatis planis emarginatis, capsula terminali, vaginis obovatis tuberculatis triangularibus. — Ad truncos arborum et saxa, hyeme. — Fl. fr. 2. p. 434. Hook. jung. t. 5. *J. tamariscifolia* eng. bot. t. 1086. — Vaill. bot. t. 19. f. 10. — Dill. musc. t. 72. f. 27. Caules 9-12 lineas longi, folia disticha imbricata alterna. (v. v.)

49. *J. TAMARISCI* (L. sp. 1600.) caule repente pinnatim ramoso, foliis inæqualiter bilobis, lobis superioribus ovato-rotundatis, inferioribus minutis obovatis saccatis; stipulis subquadratis emarginatis marginibus revolutis, capsula in ramis brevibus terminali, vaginis obovatis lævibus triangularibus. — In truncis arborum et saxis, vere. — Fl. fr. 2. p. 433. Hook. jung. t. 6. — Vaill. bot. t. 23. f. 10. — Dill. musc. t. 72. f. 31. Caules 2-4 pollices longi, folia disticha alterna imbricata tertiam lineæ partem æquantia. (v. v.)

Sect. III. JUNGERMANNIE FRONDOSE.

* Enerves.

50. *J. PINGUIS* (L. sp. 1602.) fronde oblongâ decumbente enervi carnosâ suprà planiusculâ subtus tumidâ vagè ramosâ margine sinuatâ, capsula ex inferiore parte propè marginem egrediente, vaginis brevissimis, ore dilatato fimbriato, calyptrâ exsertâ oblongo-cylindracea lævi. — Ad terram humidam et propè aquas, maio. — Fl. fr. 2. p. 426. Hook. jung. t. 46. — Michel. gen. t. 4. f. 2. — Dill. musc. t. 74. f. 42. (excl. fig. K. R. S.) Frondes 1-3 pollices longæ. (v. v.)

51. *J. MULTIFIDA* (L. sp. 1602.) fronde linearis enervi carnosâ compressâ pinnatum ramosâ, capsula marginali, vaginis brevissimis ore dilatato fimbriato, calyptrâ exsertâ oblongo-cylindracea tuberculata. — Ad terram humidam, in truncis putridis, ad marginem rivorum, aprilii. — Fl. fr. 2. p. 426. Hook. t. 45. *J. sinuata* eng. bot. t. 1476. *J. palmata* Hedw. th. ret. t. 20. f. 7. Fl. fr. 2. p. 427. — Michel. gen. t. 4. f. 3. — Dill. musc. t. 74. f. 43 et 44. Frondes 6-18 lineas longæ. (v. v.)

* * Frondes nervosæ.

52. *J. BLASIA* (Hook. jung. t. 82. 83. et 84.) fronde oblongâ submembranacea dichotomâ costatâ infra sparsim squamosâ, squamis dentatis, capsula è costæ parte superiori egrediente, vaginâ calyptrâque intrâ frondem. — Ad terram in umbrosis. — Fl. fr. 5. p. 194. *Blasia pusilla* L. sp. 1605. Fl. fr. 2. p. 418. — Mich. gen. t. 7. — Dill. musc. t. 31. Frondes 3-12 lineas longæ. (v. s.)

53. *J. EPIPHYLLA* (L. sp. 1602.) fronde oblongâ submembranacea variè divisâ obsoletè costatâ, margine integerrimo vel subulato sinuatoque, capsula è superiore parte frondis propè apicem egrediente, vaginis subcylindraceis plicatis ore parum dilatato inciso-dentato, calyptrâ exsertâ lævi. — Ad terram in sylvaticis humidis et ad marginem fossarum. — Fl. fr. 2. p. 425. Hook. t. 47. *J. Vaillantii* Mer. paris. II. 1. p. 218. *Marchantia angustifolia* Fl. fr. 2. p. 424. — Mich. gen. t. 4. f. 1. — Vaill. bot. t. 19. f. 4. — Dill. musc. t. 74. f. 41. Frondes 1-4 pollices longæ. (v. v.)

54. *J. FURCATA* (L. sp. 1602.) fronde linearis dichotomâ membranacea costata suprà lævi subtus margine plus minusve pilosâ, capsula ex inferiore parte costæ egrediente, vaginis bilobis conduplicatis margine ciliato, calyptrâ obovata hispidâ. — In truncis arborum, vere. — Fl. fr. 2. p. 427. eng. bot. t. 1632, Hook. jung. t. 55. 56. — Vaill. bot. t. 23. f. 11. — Dill. musc. t. 74. f. 45. Frondes 6-12-lineas longæ. (v. v.)

55. *J. PUBESCENS* (Schrad. spic. 76.) fronde linearis dichotomâ membranacea

costata undique pubescente. — Inter museos, ad saxa et truncos arborum, hucusque sine capsulis. — Fl. fr. 2. p. 427. Hook. t. 73. J. tomentosa Hoffm. Frondes 12-18 lineas longæ. (v. v.)

2. *Capsulæ aggregatæ.*

II. MARCHANTIA Mich. gen. 1. L. gen. 1198.

Receptaculum commune pedicellatum lobatum radiatum discoideum aut campanulatum, subtus gerens capsulas globosas dependentes quadrivalves.

1. *M. POLYMORPHA* (L. sp. 1603.) receptaculis planisculis, femineo profunde 10-partito lobis linearibus, masculo 8-lobato dentibus latis rotundatis. — In locis humidis umbrosis, ad terram et lapides. — Fl. fr. 2. p. 421. eng. bot. t. 210. Hedw. theor. retr. t. 26 et 27, f. 1 et 2. — Dill. musc. t. 76 et 77 f. 7. ♀ *M. stellata* Scop. — Lob. ic. 2. t. 246, f. 2. ♂ *M. umbellata* Scop. — Lob. ic. 2. t. 246, f. 3. (v. v.)
2. *M. HEMISPHERICA* (L. sp. 1604.) receptaculo femineo hemisphaerico obtuse 5-6-lobo, perichaetio nullo. — Ad radices mænium Argentinæ (cl. Moug. et Nestl.), in locis umbrosis Alpinum, Galloprovinciæ ex Ger., Monspelii ex Gouan., propè Falaise ex cl. de Brébisson. — Fl. fr. 2. p. 422. — Dill. musc. t. 75. f. 2. — Mich. gen. 3. t. 2. f. 2. (v. s.)
3. *M. TRIANDRA* (Scop. carn. 2. p. 354.) receptaculo femineo hemisphaerico subintegro tricapsulari, perichaetio nullo. — Ad rupes circa Fremilli prope Parisios ex cl. Merat. — DC. syn. 91. Balb. diss. p. 4. f. 1. Mér. paris. II. t. 1. p. 217. (v. s. ex Pedem.)
4. *M. QUADRATA* (Balb. diss. p. 5. f. 2.) receptaculo femineo hemisphaerico 4-costato 4-capsulari, perichaetio nullo. — In locis humidis et umbrosis Alpium Galloprovinciæ, ad pontem Vardonis (DC.). — DC. syn. 91. (v. v. DC.)
5. *M. FRAGRANS* (Balb. diss. p. 6. t. 2.) receptaculo femineo hemisphaerico obtuse 5-6-lobo tricapsulari, perichaetio fimbriato. — In locis humidis circa Aquas-Tarbellicas, Nannetem (cl. Hectot). — Fl. fr. 2. p. 423. (v. s.)
6. *M. CONICA* (L. sp. 1604.) receptaculo femineo conico subovato 5-7-lobo 5-7-capsulari. — In locis humidis umbrosis. — Fl. fr. 2. p. 423. Hedw. th. ret. t. 28. eng. bot. t. 514. — Dill. musc. t. 75. f. 1. — Vaill. bot. t. 33. f. 8. (v. v.)
7. *M. CRUCIATA* (L. sp. 1604.) receptaculo femineo profundè 4-5-partito lobis subtubulosis. — In locis humidis umbrosis. — Fl. fr. 2. p. 424. — Dill. musc. t. 75. f. 5. Mich. gen. t. 4. (v. v.)

++ CAPSULA BIVALVIS.

III. ANTHOCEROS Dill. musc. 475. L. gen. 1201.

Capsula longissima subulata bivalvis, placentam linearem intus fovea.

1. *A. LEVIS* (L. sp. 1606.) frondibus indivisis planis margine vix subundulatis. — Ad terram in locis humidis aut umbrosis rarius. — Fl. fr. 2. p. 421. Hedw. th. retr. t. 29. Lam. ill. t. 876. f. 1. — Dill. musc. t. 68. f. 2. (v. s.)
2. *A. PUNCTATUS* (L. sp. 1606.) frondibus indivisis sinuatis marginis crispis. — Ad terram, in locis humidis umbrosis Corsicæ, Galloprovinciæ ex Ger., Delphiniatûs ex Vill., Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), Abbavillæ ex Bouch. — Fl. fr. 2. p. 420. Lam. ill. t. 876. f. 2. — Dill. musc. t. 68. f. 1. (v. s.)

IV. TARGIONIA Mich. gen. p. 3. L. gen. 1197.

Capsula globosa, calyce bivalvi dein clauso demum aperto cincta.

1. *T. HYPOPHYLLA* (L. sp. 1604.) fronde oblongo-spathulata, subtus purpurea fructiferă. — Ad terram et in rapibus subhumidis umbrosis. — Fl. fr. 2, p. 419. Lam. ill. t. 377. Spreng. bull. philom. n. 52. t. 2. f. 2. — Dill. musc. t. 78. f. 9. — Mich. gen. t. 3. (v. v.)

Trib. II. *HOMALOPHYLLÆ* Spreng. — Hepaticæ lichenoideæ DC. fl. fr. 2. p. 415.

Capsulæ clausæ aut perforatæ indehiscentes.

V. SPHÆROCARPUS Michel. gen. p. 4. Bell. act. taur. 5. p. 258.

Capsula globosa intrà calycem univalvem apice perforatum cylindrico-turbinatum inclusa.

1. *S. MICELII* (Bell. l. c.) frondibus suborbiculatis apice truncatis pellueidis supernè glomeratim fructiferis. — Ad terram rarissimè, oculos parvitate su- giens. — *S. terrestris* eng. bot. t. 299. Mich. gen. t. 3. f. 2. Targonia Sphærocarpus Dicks. Fl. fr. 2. p. 419. — Dill. musc. t. 78. f. 17. (v. s.)

VI. RICCIA Mich. gen. 57. L. gen. 1200.

Capsula subglobosa, intrà frondem nidulans, tubo brevi vix prominulo apice perforato instructa.

1. *R. NIGRELLA* (DC. fl. fr. 5. p. 193.) frondibus dichotomis subradiantibus linearibus margine integris canaliculatis subtus nigro-piceis. — Ad terram humidam propè Monspelium. (v. s.)
2. *R. CILIATA* (Hoffm. germ. 2. p. 95.) frondibus è centro radiantibus dichotomis margine ciliatis. — Ad terram in agro Syrtico propè Daix (cl. Grate-loup). — Fl. fr. 5. p. 193. — Mich. gen. t. 57. f. 5. (v. s.)
3. *R. PYRAMIDATA* (Raddi in herb. DC.) fronde ovato-oblonga sinnatà longitudinaliter plicatà canaliculata, squamis membranaceis triquetris acuminatis imbricatis cincta. — In Corsicâ propè Calvi (cl. Soleirol). (v. s.)
4. *R. BIFURCA* (Hoffm. germ. 2. p. 95.) frondibus è centro radiantibus dichotomis supernè canaliculato-concavis, reticulo inconspicuo. — Ad terram madidam, imò inundatam propè Cænomanum et Fontembleaudi. — Fl. fr. 2. p. 417. — Mich. gen. t. 57. f. 4. (v. v. DC.)
5. *R. GLAUCA* (Hedw. th. retr. t. 31.) frondibus è centro radiantibus dichotomis planis (oculo armato) reticulatis. — Humo madido adhærens rariùs. — Fl. fr. 2. p. 417. (v. s.)
6. *R. CANALICULATA* (Hoffm. germ. 2. p. 96.) frondibus dichotomis linearibus supernè canaliculatis opacis. — Ad terram humidam propè Nannetes et in Corsicâ circà Bonifacio (cl. Requien). — Fl. fr. 5. p. 193. (v. v. D. propè Genevam.)
7. *R. NODOSA* (Bouch. abbev. p. 88.) frondibus diehoto-mis linearibus hinc indè nodosis. — In aquis circà Abbatisvillam. — Fl. fr. 2. p. 417 et 5. p. 193. (v. s.)
8. *R. CAVERNOSA* (Hoffm. germ. 2. p. 195.) frondibus è centro radiantibus dichotomis poris irregularibus cribrosis. — Humo madido adhærens propè Parisios, in solo pingui ad piscinas Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.) — Fl. fr. 2. p. 417. *R. cristallina* Schmied. ic. t. 45. f. 5. L. sp. 1605. — Dill. musc. t. 78. f. 12. (v. s.)
9. *R. FLUITANS* (L. sp. 1606.) frondibus dichotomis planis linearibus. — In

stagnis puris et vivis quietis fluitans. — Fl. fr. 2. p. 416. — Dill. musc. t. 74. f. 47. (v. v.)

10. R. NATANS (L. syst. 781.) frondibus obcordatis subtus ciliato-fibrillosis. — In aquis stagnantibus Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), propè Parisios, Caen ex cl. de Bréb., et in Galloprovinciâ natans. — Fl. fr. 2. p. 416. Schmied. ic. t. 74. — Dill. musc. t. 78. f. 18. (v. s.)

VII. CORSINIA Raddi opusc. scelt. 1818. p. 354. Ad. Brongn. in dict. class. 4. p. 512. — Guentheria Trev. in ann. regn. veg. 1. fasc. 3. p. 1. ic.

Frondes reticulatæ; capsulæ 2-5 calyprâ membranaceâ indehiscenti obvolutæ, calyce 1-3-valvi obtectæ.

1. C. MARCHANTIOIDES (Raddi l. c. t. 1. f. 1.) fronde 2-3-lobâ centro radiciferâ, calyce 1-valvi. — Propè Calvi in Corsicâ detexit cl. Soleiroli, in humidis sylvæ Montmorency ex cl. Ad. Brongn. — Mich. t. 67. f. 1. — Dill. musc. t. 78. f. 15-16. (v. s.)

Ordo CXIX. LICHENES Hoffm. Achar. lichen. univ. 1. Fries in Stock. vet. ac. act. 1821. A. Fée in dict. class. 9. p. 360. G. F. W. Meyer nebenst. pars 1. p. 311. — Lichenes et Hypoxylorum trib. II^a (excl. Hysterio) DC. fl. fr. 2. p. 521 et 507. — Algarum gen. Juss.

Plantæ imperfectè cellulosæ vasis tam spiralibus quam propriis parentes, cellulæ in strata duo congestis, *stratum corticale* externè variè coloratum sed nunquam viride, et *medullare* infrâ stratum corticale materiâ saturate viridi repletum, in medio verò album aut rarò coloratum. *Thallus*, sive corpus quo pullulando Lichen crescit, pulveraceus, crustaceus vel frondosus, et hicce foliaceus, fruticulosus vel filamentosus. Fructificationes seu *apothecia* è parte internâ productivâ et parte externâ illam recipiente compositæ; pars interna gonylos sive sporas gerens, nunc liberas nudas, nunc in *ascis* vel nucieum vel laminam apertam constituentibus inclusas; externa conceptaculum exhibens, nunc plus minusve clausum, nunc apertum plus minusve dilatatum. — Plantæ liquidum ambientem per totam corporis superficiem absorbentes et in totam substantiam spontaneæ transvehentes.

+ *Apothecia aut receptacula tuberculata aut scutellata plus minus rotunda thallo foliaceo inserta.*

I. ENDOCARPON Hedw. musc. frond. p. 2. stirp. 2. p. 56. tab. 20. DC. fl. fr. 2. p. 413. Ach. lich. univ. p. 55. tab. IV.

Receptacula sphæroidea thallo immersa, matura eminentia, ostiolo punctiformi protuberante, nucleus globosum includentia. — Thallus

594 ACOTYL. seu CELLULARES. ENDOCARPON.

crustaceus vel cartilagineus plano-adnatus subeffiguratus vel foliaceus peltatus.

1. *E. EBURNEUM* (DC. fl. fr. 5. p. 192.) thallo crustaceo-cartilagineo subfoliaceo suborbiculato plano albissimo subtus nigro nudo. — Ad muros vetustos Monspelii. (v. v. DC.)
2. *E. MINIATUM* (Ach. meth. 127.) thallo crasso crustaceo-cartilagineo foliaceo orbiculari umbilicato simpliciuseculo cinerascente, ambitu repando flexuoso, plicato, subtus laevi demum rugoso fulvescente, ostiolis minutis raris sub-prominentibus fuscouscentibus. — Ad saxa. — Fl. fr. 2. p. 414. *E. miniatum* & *umbilicatum* Schær. exsicc. 112. Lichen miniatus L. Jacq. misc. 2. t. 10. f. 3. eng. bot. 9. t. 593. (v. v.)
3. *E. GUEPINII* (Delise in litt.) thallo crassiusculo crustaceo-cartilagineo minuto foliaceo orbiculari umbilicato simplicissimo griseo-fusco ambitu revoluto-reflexo, subtus laevi fulvescente. — Ad rupes schistaceos humidos ad meridiem versos in agro Andegavensi (cl. Guepin). — Receptacula non vidi; species ceterum priori valde affinis. (v. s. D. sine ap.)
4. *E. COMPLICATUM* (Ach. meth. 128.) thallo coriaceo-cartilagineo cespitoso polyphyllo cinereo subtus fusco-nigricante, lobis imbricatis erectis rotundatis plicato-convolutis, ostiolis confertis convexis nigris. — In rupibus et saxis propè aquas. — Fl. fr. 2. p. 413. *E. miniatum* & *complicatum* Schær. exsicc. n. 113. — Fl. dan. t. 532. f. 2. — eng. bot. t. 593. f. 2. (v. v.)
5. *E. FLUVIATILE* (DC. fl. fr. 2. p. 413.) thallo cartilagineo-subcoriaceo foliaceo cespitoso polyphyllo cinereo-fusco olivaceo subtus cervino-fusco nigroque utrinque laevigato, lobis laciniatis flexuosis, mediis congestis convolutis, exterioribus explanatis laciniatis, ostiolis convexitusculis nigris. — In rivulis ad lapides aquâ suffusos. — *E. Weberi* Ach. meth. 128. *E. miniatum* & *aquaticum* Schær. exsicc. n. 114. Lichen fluvatile Web. gott. t. 4. — Hoffm. lich. t. 45. f. 1-5. — Dill. musc. t. 30. f. 128. Merito forsitan cl. Schærer, Meyer, Spreng. etc. hanc speciem et præcedentem ut varietates aut formas *E. miniati* habent. (v. v.)
6. *E. EUPLOCUM* (Ach. meth. 127. t. 3. f. 4.) thallo cartilagineo foliaceo subpellato profundè lobato æneo-virescente, lobis rotundatis flexuosis incisis, subtus nudo pallide flavo, ostiolis minutis subprominulis nigris. — Ad muros Argentorati (cl. Nestler), Mimatis (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 192. Non diversum ab *E. miniato* affirmat cl. Meyer nebenst. t. 1. p. 50. (v. s.)
7. *E. HEDWIGII* (Ach. meth. 125.) thallo depresso subrotundo angulato-lobulato coriaceo-squamuloso brunneo aut virescente subtus ad ambitum pallido dein nigricante fibrillosoque, apotheciorum ostiolis protuberantibus atris. — Ad terram et saxa arenaria et calcaria. — Fl. fr. 2. p. 414. excl. var. & *E. pusillum* Hedw. st. cr. t. 20. f. A. *E. hepaticum* Ach. lich. 298. Fl. fr. 5. p. 191. *E. pallidum* Ach. syn. 100. — eng. bot. t. 595. (v. v.)
E. lachneum (Ach. syn. 99.) thalli lobis subimbricatis margine elevato repando-lobato undulato subtus atro-lanuginoso. (v. s.)
E. squamulosum (Ach. 1. c.) thalli lobis aggregatis subimbricatis lobato-crenatis subtus pallidis fibrillosis lanuginosis. — *E. squamulosum* Ach. lich. DC. fl. fr. 5. p. 191. (v. s.)
8. *E. PALLESCENS* (DC. fl. fr. 5. p. 192.) thallo crustaceo-cartilagineo subfoliaceo suborbiculato plano pallide alutaceo subtus subcinereo, margine subtumido. — Ad terram in Galloprovinciâ propè Massiliam ex cl. DC.
9. *E. TEPHROIDES* (Ach. meth. 129.) thallo crustaceo-membranaceo effuso subfoliaceo adnato immerso subinde imbricato rimoso glanco-cinereo pruinoso ambitu irregulari sublobulato crenato, subtus nigro-spongioso, ostiolis atris prominulis. — Ad terram et supra museos destructos Mimatis (cl. Prost), ad muros Lugduni secùs Ararem (D. Montagne), propè Vire rarissimum ex cl. Delise. — *E. cinereum* Pers. — eng. bot. t. 2013. *Verrucariae* spéc. ex cl. Schær. spic. 63. (v. s.)

10. *E. RUFESCENS* (Ach. lich. 304.) thallo ascidente subcoriaceo foliaceo lobato rufescente subtus nigricante, lobis rotundatis incisis undulato-flexuosis subimbricatis complicatisque, ostiolis atris papillæ-formibus demum marginatis. — Ad terram, muros et rupes propè Mimatem (cl. Prost). (v. s. D.)

11? *E. PARASITICUM* (Ach. syn. 100.) thallo crustaceo-coriaceo cupreо subtus atro fibrilloso, lobis subrotundis lobatis planis laevibus demum convexis undulato-complicatis rimoso-diffractis, ostiolis depressis submarginatis demum convexis. — In thallo Parmeliæ omphalodis propè Falaise reperiit cl. A. de Brebisson, Mimatem cl. Prost. — Lecidea Parmeliarum A. de Breb. in litt. Fructus abortientes Parmeliæ omphalodis secundum cl. Meyer. (v. s. D.)

II. *UMBILICARIA* Hoffm. lich. t. fasc. 1. p. 9. DC. fl. fr. 2. p. 408. Schær. spic. 80. — Gyrophora Ach. lich. t. 2. fig. 8-11. 13. — Lecideæ sp. Mey. Spreng.

Receptacula orbicularia sessili-adnata marginata atra, parenchyma solidum includentia, disco juniore papillato, adultiore plicato plicis concentricis aut spiralibus. — Thallus foliaceus coriaceo-cartilagineus peltatus, junior monophyllus, adultior lobatus.

1. *U. PUSTULATA* (Hoffm. lich. t. 28. f. 1. 2. et t. 29. f. 4.) thallo supra papulo cinereo-virescente vel olivaceo, subtus lacunoso laevi nudo fuscescente, apotheciis rarissimis planis marginatis. — In saxis. — Fl. fr. 2. p. 411. Gyroph. pustulata Ach. — eng. bot. t. 1283. — Vaill. bot. t. 20. f. 9. (v. v.)

2. *U. PROBOSCIDEA* (DC. fl. fr. 2. p. 410. var. γ excl. syn.) thallo reticulato plurimque 1-phyllo vix lobato marginibus nudiusculis, sicco supra fuliginoso rugoso subtus pallide fusco subfibrilloso hirsuto aut glabro, apotheciis sessilibus gyroso-plicatis margine tenui, junioribus concavis demum convexis. — Ad saxa Vogesorum, Alpium, montium Mimatis, Pyrenæorum. — U. polymorpha & deusta Schær. exs. — U. corrugata Hoffm. lich. 2. t. 43. f. 4-7. Gyrophora proboscidea Ach. eng. bot. t. 2484. — Moug. et Nestl. vog. n. 249. Lichen deustus L. L. proboscideus Ach. prod. non L. nec Wulf. (v. v.)

3. *U. CYLINDRICA* (Delise ined.) thallo reticulato polyphyllo plicato lobatoque marginibus plerumque simbriatis, sicco supra cinereo-pruinoso subæquabilis subtus pallide fusco subfibrilloso hirsuto aut glabro, apotheciis pedicellatis gyroso-plicatis margine tenui, junioribus planiusculis tandem subglobosis. — Ad saxa Vogesorum, Alpium, montium Mimatis, Pyrenæorum. — U. polymorpha & cylindrica Schær. exs. n. 143-147. Gyroph. cylindrica Ach. Lichen cylindricus Linn. L. proboscideus L. eng. bot. t. 522. Wulf. in Jacq. misc. 2. t. 9. f. 2. a. f. L. mesenteriformis Wulf. I. c. t. 9. f. 5. — Hall. helv. t. 47. f. 4. (v. v.)

4. *U. EROSA* (Hoffm. germ. 2. p. 111.) thallo olivaceo-fusco in ambitu pertuso reticulato-cribroso eroso-laciniato, subtus cinerascente glabro papilloso rarius piloso, apotheciis sessilibus convexiusculis confluentibus irregulariter plicatis. — Ad saxa in Vogesis, Alpibus, montibus Mimatis (cl. Prost). — Fl. fr. 2. p. 411. Gyr. erosa Ach. Sm. eng. bot. t. 2066. Moug. et Nestl. st. n. 250. — Jacq. misc. 2. t. 9. f. 3. (v. s.)

5. *U. FLOCCULOSA* (Hoffm. lich. 3. t. 68. f. 1-4.) thallo scabriusculo olivaceo-fusco furfuraceo-flocculoso, subtus concolore laevi glabro impresso-punctato vel reticulato-lacunoso, apotheciis planis circinato-plicatis demum convexis gyrosissimis. — In saxis et rupibus Vogesorum (cl. Le Prevost), Jurassi, Mimatis (cl. Prost), Pyrenæorum. — Fl. fr. 2. p. 412. U. zinea γ flocculosa Schær. exs. 152. Lichen flocculosus Wulf. in Jacq. coll. 3. p. 99. t. 1. f. 2. Gyr. deusta Ach. excl. syn. Linn. (v. s.)

γ. *leiocarpa*, thallo utrinque laevi griseo-nigricante, apotheciis laevibus infundibuliformibus margine prominulo, — U. leiocarpa DC. fl. fr. 2. p. 410. (v. s.)

6. *U. TESSELLATA* (Dub. mss.) thallo foliaceo umbilicato glabro anthracino supra tenuiter rimoso-areolato ad centrum rugoso, subtus concolore atro-

596 ACOTYL. SEU CELLULARES.

pulverulento, apotheciis periphericis sparsis parvis atris disco simpliei papillatoque margine elevato integro. — Ad summam Alpes Delphihatūs. — *Gyr. tessellata* Ach. syn. 64. *Lecidea atro-prainosa* & *tessellata* Schær. spic. 3. p. 104. excl. plur. syn. (v. s. ex Helv.)

β. antrachna (Schær. l. c. var. a.) thallo suprà subæquabili. — Wolf. in Jacq. misc. 2. t. 9. f. 4. (v. s. ex Helv.)

γ. reticulata (Schær. l. c.) thallo atro-cinereo suprà reticulato-rugoso. — Schær. in Ser. mus. t. 14. f. 5-9. — An species distincta?

7. *U. POLYPHYLLA* (Hoffm. lich. t. 59. f. 2.) thallo coriaceo polyphylio fuso-olivaceo demum atro glabro utrinque æquabili ambitu lobato-plicato subtus glabro polline atro tenuissimo adperso, apotheciis sessilibus rarissimis subnitidis plerumque longitudinaliter plicatis. — Ad saxa. — *U. glabra* DC. fl. fr. 2. p. 412. *U. ænea* & *glabra* Schær. exs. p. 149. *Gyr. glabra* Ach. Lich. *polyphyllus* L. eng. bot. t. 1282. — Dill. musc. t. 30. f. 129. (v. v.)

8. *U. HYPERBOREA* (Hoffm. lich. 3. t. 71. f. 1-5.) thallo tenui fusco-olivaceo demum atro monophyllo glabro ambitu lobato-plicato suprà rugoso-papuloso, subtus reticulato-lacunoso atro aut rufo-fusco interdum pulverulento, apotheciis sessilibus frequentissimis subnitidis plerumque longitudinaliter plicatis. — In summis Vogesis, Alpibus, montibus Mimatis, Pyrenæis. — *U. ænea* & *hyperborea* Schær. exs. 150-151. *U. papillosa* DC. fl. fr. 2. p. 411. *Gyr. hyperborea* Ach. (v. s.)

9. *U. DEPRESSA* (Schær. in Ser. mus. 1. p. 93. t. 10. 11.) thallo coriaceo rigidiusculo glauco-cinerascente suprà glabriusculo, subtus fibrilloso hirsuto ochrolenco fusco aut nigrescente, apotheciis depresso-gyroso-plicatis margine crasso prominulo. — Ad saxa.

α. hirsuta (Schær. exs. n. 137-138.) thallo subtus ochrolenco vel rufo-fusco papilloso plus minus hirsuto. — In Vogesis, Jurasso, Monte Pilato, rapestribus Galliæ australis, Pyrenæorum. — *U. hirsuta* fl. fr. 2. p. 409. *U. saccata* fl. fr. 2. p. 408. Gyroph. *hirsuta* et *velleiformis* Ach. (v. v.)

β. murina (Flörke) thallo supra marino, subtus aterrimo glabro vel pallulis minimis exasperato. — *U. murina* DC. fl. fr. 2. p. 412. *Gyr. marina* Ach. Sm. eng. bot. t. 2486. Cheval. fl. par. 1. t. 14. f. 11. — Vaill. bot. t. 21. f. 14. (v. v.)

γ. cirrhosa, thallo sicco suprà albo-glaucescente æquabili, subtus aterrimo hirsuto vel scaberrimo. — Ad rupes Vogesorum, Pyrenæorum. — *U. cirrhosa* Hoffm. lich. 1. t. 2. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 409. *Gyr. vellea* & *spadochroa* Ach. syn. 68. (v. v.)

δ. pellita, thallo sicco suprà ex glauco æneo aut cinereo-rufescente, subtus aterrimo fibrilloso-pannoso. — *U. pellita* et *spadochroa* DC. fl. fr. 2. p. 409. Gyroph. *pellita* et *vellea* Ach. — Dill. musc. t. 30. f. 130 et t. 82. f. 5. (v. v.)

III. PELTIGERA Willd. prod. fl. ber. p. 347. DC. fl. fr. 2. p. 405. Schær. spic. 12. — *Peltidea* Fries sched. crit. n. 175 et 180. — *Solorina*, *Peltidea* et *Nephroma* Ach. lich. univ.

Receptacula deppressa aut appianata peltiformia; lamina proligera libera suborbicularis thallo omnino adnata, membranâ tenuissimâ mox rumpente obducta. — Thallus membranaceus depresso vel erectus lobatus laciniatus subtus venosus vel tomentosus.

Sect. 1. *SOLORINA* Ach. lich. univ. 27. t. 1. f. 5 et 6.

Apothecia antica medio thallo adnata.

1. *P. SACCATA* (DC. fl. fr. 2. p. 408.) thallo coriaceo adpresso lobato suprà cinereo-virescente, subtus albidiore fusco-fibrilloso, apothecia subrotundis tandem depresso-saccatis nigro-fuscis. — Suprà terram ad radices arborum et rupium in montibus. — *Solorina saccata* Ach. syn. 8. — eng. bot. t. 288. — Dill. musc. t. 36. f. 121. (v. v.)

2. *P. crocea* (Hoffm. lich. t. 41. f. 2-4. t. 42. et t. 45.) thallo subcoriaceo lobato cinnamomeo, subtus croceo-villoso-venoso, apotheciis tumidulis spadiceis. — Ad rupium latera terræ tecta, in Alpibus, Pyrenæis, et monte Aureo ex cl. Delise. — Fl. fr. 2. p. 407. *Solorina crocea* Ach. lich. — Wulf. in Jacq. coll. 4. t. 11. f. 23; eng. bot. t. 498. (v. v.)

Sect. II. *NEPHROMA* Ach. lich. p. 101. t. 11. f. 1.

Apothecia postica margini thalli adnata.

3. *P. PARILIS* (Spreng. syst. 4. p. 305.) thallo coriaceo lobato livide fusco lobis ascendentibus sinuato-crenatis marginibus verrucoso-pulverulentis, subtus rugosiusculo glabro ambitu pallidiore centro nigricante, apotheciis subfuscis parvis subreniformibus. — Suprà muscos Neustriæ, Mimatis (cl. Prost). — *Nephroma parilis* Ach. — eng. bot. t. 2360. (v. s.)
4. *P. LAVIGATA* (Dub. mss.) thallo subcartilagineo lobato fusco-castaneo, lobis ascendentibus sinuatis marginibus glabris, subtus lacunoso ruguloso in ambitu pallido in centro nigricante, utrinque glabro subnitente, apotheciis badiis. — Ad terram inter muscos propè Mimatem (cl. Prost). — *Nephroma lavigata* Ach. syn. 242. Cum sequente conjungit cl. Sprengel, sed habitus valde diversus, statura multò minor, etc. (v. s. D.)
5. *P. RESUPINATA* (DC. fl. fr. 2. p. 467.) thallo coriaceo lobato plumbeo-virescente lobis rotundatis repando-crenatis, subtus pallido scabro, apotheciis rufis orbicularibus margine thallode lacero. — Suprà terram, saxa et arbores. — *Nephroma resupinata* Ach. — Jacq. coll. 4. t. 12. f. 1. — Dill. musc. t. 28. f. 105. (v. v.)
- P. papyracea* (Ach.) thallo tenui pallidiore subtus lœvi marginibus demum crispis subpulverulentis. — In subsylvaticis Alpinis. (v. s.)

Sect. III. *PELTIDEA* Ach. lich. p. 98. t. 10. f. 8-7.

Apothecia antica submarginalia.

6. *P. VENOSA* (Hoffm. lich. t. 6. f. 2.) thallo flabelliformi cinereo-virescente humectato lœte-virente lobis rotundatis incisis subintegerrimis, subtus albo venis fuscis exarato, apotheciis marginalibus planis rotundis obscurè fuscis margine crenulato. — Suprà terram ad margines viarum et fossarum, locis umbrosis humidis glareosis. — Fl. fr. 2. p. 405. *Peltidea venosa* Ach. — Mich. gen. t. 44. f. 3 et 5. (v. v.)
7. *P. HORIZONTALIS* (Hoffm. germ. 2. p. 107.) thallo laciniato-lobato glauco-rufescente glabro humectato fusco-viridi lobis rotundatis crenulatis, fertilibus abbreviatis, subtus albido venis spongiosis fuscis nigricantibusve reticulato, apotheciis terminalibus solitariis planis horizontalibus transversè oblongo-ovatis rufis aut atro-rufis margine integriusculo. — Suprà saxa inter muscos, in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 406. *Peltidea horizontalis* Ach. excl. var. β . — eng. bot. t. 886. — Dill. musc. t. 28. f. 104. (v. v.)
8. *P. HYMENINA* (Delise ined.) thallo tenui membranaceo laciniato-lobato cervino-virescente lobis rotundatis marginibus elevatis flexuoso-crispis, fertilibus abbreviatis, subtus albido subavenio fusco-fibrilloso, apotheciis terminalibus geminatis planis verticaliter oblongo-ovatis rufis margine integriusculis plurimque apice inflexis. — Inter muscos Neustriæ ex cl. Delise. — *Peltidea hymenina* Ach. meth. 284. *P. horizontalis* β *hymenina* Ach. lich. et syn. — Species à me non visa et ex auctoritate et descriptione cl. Delisei ut à priori distincta hic collocata.
9. *P. APTOSA* (Hoffm. lich. t. 6. f. 1.) thallo sinuato-lobato livide virescente humectato lœte è flavo-viride supra verrucis concoloribus obscurioribusve adsperso lobis amplis rotundatis fertilibus medio angustatis margine reflexis, subtus venis nigris reticulato, apotheciis terminalibus amplis verticalibus oblongis rubris margine inflexo sublacero. — Suprà terram et muscos in pinetis montium. — Fl. fr. 2. p. 406. *Peltidea aptosa* Ach. — eng. bot. t. 1119. — Dill. musc. t. 28. f. 106. (v. v.)

598 ACOTYL. SRU CELLULARES.

PELTIGERA.

10. *P. CANINA* (Hoffm. germ. 2. p. 106.) thallo sinuato-lobato cinereo-rufescente humectato glauco vel sordide virescente tomento tenuissimo evanido adsperso lobis rotundis fertilibus longiusculis erectis margine reflexis, subtus albicante venis fibrillisque ambitus concoloribus centri fusco-cinereis, apothecis verticalibus subrotundis rufis rufo-fuscis primum planis demum convexis margine subcrenulatis. — Suprà terram in sylvaticis freqvns. — Fl. fr. 2. p. 406. *Peltidea canina* Ach. syn. 239. excl. var. γ . *Lichen caninus* Linn. Jacq. coll. 4. t. 14. f. 1. eng. bot. t. 2299. — Dill. muse. t. 27. f. 102. — Interdum pulvinulis papillæformibus adspersa marginibusque pruinoso-pulverulentis occurrit.
- a. vulgaris*, thallo crasso cartilagineo sicco rufescente lobis fertilibus erectis, subtus albicante venis fibrillisque subconcoloribus reticulato, apothecis amplis subrotundis rufo-fuscis. (v. v.)
- E. carnea* (Delise) thallo crasso membranaceo-cartilagineo sicco carneo-rufescente lobis fertilibus erectis humidis subtus roseis, subtus albicaute venis dilute carneis reticulato, apothecis amplis rotundis brunneo-rufis. — In Neustriâ (cl. Delise). (v. s. D.)
- γ. inflexa* (Delise) thallo crasso cartilagineo sicco rufescente lobis fertilibus erectis, subtus in centro venis cinereo-rufis reticulato, apothecis parvis numerosis fusco-brunneis. — In Nenstriâ (cl. Delise). (v. s. D.)
- S. palmata* (Delise) thallo crasso membranaceo-cartilagineo sicco rufescente lobis fertilibus radiatis palmato-digitatis, subtus venis concoloribus reticulato, apothecis parvis numerosis rotundis fascis. — In Neustriâ (Delise). (v. s. D.)
- e. membranacea* (Ach.) thallo tenui membranaceo sicco cinereo, subtus albicante venis fibrillisque concoloribus reticulato, lobis fertilibus abbreviatis, apothecis minutis paucis ovato-rotundis rufis. (v. v.)
- ζ. tectorum* (Delise) thallo tenui membranaceo orbiculari sicco cinereo-rufescente lobis margine erectis lacero-crispis. — In tectis Neustriæ (cl. Delise). (v. s. D.)
11. *P. MOLESTA* (Delise ined.) thallo sinuato-lobato cinereo-virescente humectato glauco vel sordide virescente glaberrimo lobis crenatis, fertilibus abbreviatis planis subhorizontalibus, subtus albido venis spongiosis rufo-carneis densis reticulato, apothecis amplis rotundis brunneo-nigris nigrisve planis demum convexis margine tenui integerrimo. — In Neustriâ propè Caen (cl. Delise). — Species ut videtur distincta, sed ex unico specimine descripta et ideo ulteriori observationi subjicienda. (v. s. D. in herb. Delise.)
12. *P. MALACEA* (Dub. mss.) thallo cinereo-virescente humectato viridi supra subtomentoso lobis rotundatis margine flexuosis incurvis, fertilibus abbreviatis, subtus spongioso-tomentoso incano avenio foveolato fibrillis nullis centro nigricante, apothecis suprà-marginalibus amplis rotundis fusco-atris margine subintegris. — Suprà muscos propè Falaise (cl. de Brébisson), Poitiers (cl. Delise). — *Peltidea malacea* Ach. syn. 240. Fries lich. exs. n. 177. — Hanc speciem cum *P. canina* conjungit cl. Sprengel. (v. s. D.)
13. *P. RUFESCENS* (Hoffm. germ. p. 167.) thallo lobato-laciniato rufescente nitido subtomentoso laciniis inciso-crenatis crispis, fertilibus rarissimis brevibus, subtus ad oras incano centro venis spongiosis nigro-fuscis reticulato densèque fibrilloso, apothecis verticalibus subrotundis marginatis fusco-nigricantibus convexo-revolutis. — Ad terram. — *P. spuria* Fl. fr. 2. p. 406. *Peltidea rufescens* Fries lich. exs. n. 110. *P. spuria* Ach. meth. t. 5. f. 2. *P. canina* β et ϵ Ach. lich. 518 et 519. — eng. bot. t. 2300. (v. s.)
14. *P. POLYDACTyla* (Hoffm. lich. 1. t. 4. f. 1.) thallo sinuato-lobato cinereo-virescente glabro nitido humectato fusco-viridi lobis erectis rotundatis, fertilibus digitatis, subtus ad oras albo spongioso-tomentoso centro venis fuscis reticulato, apothecis terminalibus verticalibus obscure fuscis oblongo-rotundis orbicularibusve convexis. — Ad terram in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 407. *Peltidea polydactyla* Ach. — Jacq. coll. 4. t. 14. f. 2. a. b. — Dill. muse. t. 28. f. 107-108. (v. v.)

P. fibrillosa (Delise) thallo rufescente subtus undique dense fibrilloso.
(v. s. D.)

P. Delisei, thallo crasso rufescente, subtus venis tomentosis crassis ambitu subroseis centro obscure fuscis longitudinaliter anastomosantibus reticulato, apotheciis fusco-nigricantibus numerosissimis. — In Neustriâ (cl. Delise). — Peltidea Delisei Bory ex Del. in litt. (v. s. D.)

15. *P. scutata* (Dub. mss.) thallo coriaceo lobato plumbeo-griseo tomentoso humectato cinereo-virescente lobis rotundatis sinnato-incisis crenato-crispis, fertilibus brevibus, subtus albidiiori tomentoso venis crassis latis dilatatis reticulato, apotheciis rotundis ascendentibus planiusculis fuscis margine subintegro. — In truncis arborum muscosis sylvarum Neustriæ (cl. Delise et Despréaux). — Peltidea scutata Ach. — eng. bot. t. 1834. (v. s. D.)

P. collina (Ach.) thalli lobis erectis undulatis oblongis lobatim crispis, apotheciis oblongo-rotundis fusco-brunneis convexis. — *P. collina* Schrad. (v. s. D.)

P. squalida, thallo cinereo subtus albido centro venis angustis obscuris reticulato, apothecia parvis fusco-nigricantibus convexis. — In Neustriâ propè Vire (cl. Despréaux). — Peltidea squalida Delise ined. (v. s. D.)

IV. STICTA Schreb. gen. 2. p. 768. Ach. lich. univ. p. 86. t. 8. f. 1-8. Delise stict. monog. p. 35. — Sticta et Lobaria sp. DC. fl. fr. 2. p. 404 et 402.

Receptacula disciformia submarginalia, subtus a thallo formata puncto centrali eidem adfixa; lamina proligera subcornea margine thallode eam excedente cincta. — Thallus foliaceus coriaceo-cartilagineus lobatus, subtus cyphellis (fossulis) sorediisve intrà tomentum instructus.

1. *S. SYLVATICA* (Ach. meth. 281.) thallo ampio foliaceo membranaceo profundè lobato supra olivaceo-fusco scabro subscrobiculato lobis diffusis ascendentibus difformibus repando-crenatis, subtus fusco-villoso cyphellis excavatis albidis instructo, apotheciis marginalibus ovalibus fuscis. — Ad montes et inter muscos ad radices arborum. — Delise st. mon. t. 7. f. 27. DC. fl. fr. 2. p. 405. Pulmonaria sylvatica Hoffm. lich. t. 4. f. 2. — Jacq. coll. 4. t. 12. f. 2. — Dill. musc. t. 27. f. 101. In Europâ nunquam apothecia profert. (v. v. sine apoth.)

2. *S. DUFOURII* (Delise st. mon. 78. t. 6. f. 22.) thallo cartilagineo lobato substituto repando livide-citrino granulis fuliginosis vel caeruleis adsperso lobis irregularibus rotundatis erosio, subtus tomentoso brunneo-citrino, cyphellis irregularibus immersis limbatis pallidis. — In Corsicâ et Armoraciâ ex cl. Delise. — Apothecia ignota. (v. s. D.)

3. *S. FULGINOSA* (Ach. meth. 281.) thallo orbiculato membranaceo glanco lurido verruculis nigris scabro laciniato laciniis rotundato-lobatis subintergerrimis, subtus cinereo-fuscescente villoso cyphellis albis instructo, apotheciis submarginalibus sparsis ferrugineis fuscisque margine elevato integro. — Ad truncos arborum passim. — Fl. fr. 2. p. 404. Delise st. mon. t. 6. f. 20. — eng. bot. t. 1103. — Apothecia rarissima. (v. v. sine apoth.)

4. *S. SCROBICULATA* (Ach. lich. univ. 453.) thallo latissimo profundè lobato scrobiculato suborbiculato plumbeo-griseo lobis amplis rotundatis margine crispis griseo-pulverulentis hinc indè sorediis parvis adpersis, subtus fusco-cinereo villoso, cyphellis nullis?, apotheciis sparsis planis orbicularibus rufo-fuscis margine subcrenulato. — Ad terram inter muscos in saxis et arborum truncis. — Delise stict. t. 18. f. 69. Lobaria scrobiculata DC. fl. fr. 2. p. 402. Pulmonaria verrucosa Hoffm. lich. t. 1. f. 1. — eng. bot. t. 497. — Jacq. coll. 4. t. 18. f. 2. Apothecia rarissima. (v. v. sine apoth.)

5. *S. PULMONACEA* (Ach. lich. p. 449.) thallo cartilagineo-coriaceo repando profundè sinuato-laciniato lacunoso-reticulato olivaceo humectato viridi verrucis plumbeis scabridis confluentibus obsito laciniis elongatis retuso-truncatis, subtus pallido bullato insterstitiis tomentosis brunneis, cyphellis

600 ACOTYL. SEU CELLULARES.

nullis ?, apothecia submarginalibus planis rufo-fuscis margine integro demum subevanescente. — Ad arborum trunco in sylvis. — Delise mon. st. t. 17. f. 60. *Lobaria pulmonaria* DC. fl. fr. 2. p. 402. — eng. bot. t. 572. — Dill. musc. t. 29. f. 113. — Interdum ocurrat thallo pulvinulis papilliformibas dense obsito, ut delineavit cl. Delise l. c. t. 17. f. 63. (v. v.)

B. pleurocarpa (DC.) apotheciis numerosis subtus dilatatis disco demum convexo fusco-nigro margine evanescente. — Hæcce apothecia cl. Flörke pro Lecideâ parasiticâ, cl. Fries pro Pezizâ habent. (v. v.)

C. hypomela (Delise) thallo subtus pallido bullato interstitiis anastomosantibus tomentosis nigris. (v. s. D.)

6. *S. LIMBATA* (Ach. meth. 280.) thallo orbiculari cartilagineo lobato lobis rotundatis plicato-flexuosis, supra lævi glauco-fuscescente verrucis submarginalibus farinosis glauco-virentibus obsito, subtus tomentoso cinereo-fusco centro nigricante cyphellis concavis albanticibus instrueto, apotheciis parvulis sparsis convexis fuscis immarginatis thallo immersis. — Ad radices arborum agri Syrtici ex cl. Delise, Armoraciæ, Neustriæ. — Delise st. mon. t. 7. f. 24. — eng. bot. t. 1104. — Dill. musc. t. 26. f. 100. Apothecia rarissimè profert. (v. s. sine apoth.)

7. *S. GLOMULIFERA* (Delise st. mon. 129. t. 15. f. 54.) thallo cartilagineo rigido orbiculari lævigate cinereo-glaucescente pulvinulis filamentosis intertextis subglobosis atro-viridibus obsito lobis rotundatis sinuato-laciniatis laciniulis angulatis emarginatisque, subtus tomentoso ad centrum brunneo in ambitu pallido, cyphellis nullis ?, apotheciis magnis rufo fuscis margine rugoso. — Ad caudices annosarum arborum sylvarum Armoraciæ, Neustriæ et montium. — *Lobaria glomulifera* Hoffm. DC. fl. fr. 2. p. 404. *Parmelia glomulifera* Ach. — Dill. musc. t. 26. f. 99. — Mich. gen. t. 46. (v. v.)

8. *S. HERBACEA* (Ach. syn. 341.) thallo suborbiculari cartilagineo lævi brunneo olivaceo humectato viridescente laciniato laciniis sinuato-incisis rotundatis repando-suberens, subtus pallidiore fulvo medio tomentoso, cyphellis rarissimis maculaformibus albidis, apotheciis numerosis sparsis concavis rufis margine rugoso-crenulato. — In truncis arborum saxisque inter muscos. — Delise st. mon. t. 16. f. 56. *Lobaria herbacea* Fl. fr. 2. p. 403. *Pulmonaria herbacea* Hoffm. lich. t. 10. f. 2. — Fl. dan. 7. t. 1124. (v. v.)

9. *S. CROCATA* (Ach. meth. 277.) thallo ampio cartilagineo scrobiculato helvolo-fuscescente lobato-lacunoso, verrucis farinosis citrinis ad margines lacunarum, laciniis ascendentibus rotundatis lacero-lobatis marginibus pulverulentis-flavidis, subtus tomentoso in ambitu hepatico ad centrum nigricante, cyphellis minutis flavo-pallidis, apotheciis sparsis fusco-nigris margine integerrimis. — Ad arbores Armoraciæ vidi cl. DC. sed ex cl. Delise species *Caudolliana* à Linnæanâ diversa sequenti referenda est. — Fl. fr. 5. p. 190. Delise t. 4. f. 10. *Lichen crocatus* L. (v. v. DC.)

10. *S. AURATA* (Ach. meth. 277.) thallo ampio cartilagineo coriaceo rufo-viridi aut helvolo-glaucoscente lævi glabro sinuato-lobato laciniis rotundatis sinuato-incisis undulatis margine crispis flavo-pulverulentis, subtus tomentoso in ambitu rufo-aureatis centro nigricantibus, cyphellis citrinis lucidis irregularibus, apotheciis marginalibus planis fusco-rubris margine inflexo subnullo. — Inter muscos in Corsicâ propè Calvi (cl. Soleirol), in Armoraciâ (cl. Delise), in sylva Neustriæ Briuebec (cl. Le Prév. et Despréaux). — Delise mon. st. t. 2. f. 5 et 6. *Platism crocatum* Hoffm. lich. 2. t. 38. f. 1, 2, 3. — eng. bot. t. 2359. — Dill. musc. t. 84. f. 12. Apothecia rarissima. (v. s. sine apoth.)

V. *PARMELIA* Delise ined. — *Parmeliæ* sp. Ach. lich. unio. 89. t. 8. f. 9-16. syn. 195. Mey. Spreng. — *Imbricariæ* sp. Ach. prod. DC. fl. fr. 2. p. 386. non Juss.

Receptacula magna urceolato-concava demum planiuscula sparsa submembranacea, subtus à thallo formata libera puncto centrali eidem

adfixa; lamina proligera colorata membranacea tenuissima margine thallode persistenti cincta. — Thallus foliaceus coriaceo-submembranaceus lobatus vel multifido-laciniatus plano-expansus subtus glaber aut fibrillosus.

* *Apotheciis rubro-fuscis badiis fuscis nigro-fuscisve.*

1. *P. PERLATA* (Ach. lich. univ. 458.) thallo orbiculari albo-glaucō-virescente lobis rotundatis incisis planis margine suberispis, subtus fusco-nigricante undiusculo villosoque, apotheciis cyathiformibus rubro-fuscis margine tenui integerrimo. — In arboribus. — *Lobaria perlata* DC. fl. fr. 2. p. 403. — Jacq. coll. 4. t. 10. — Vaill. bot. t. 21. f. 22. Apothecia raro profert. (v. v.)
β. cetrarioides, thallo subcoriaceo glauco-albescente aut cinereo-olivaceo loborum marginibus elevatis crispis frequenter verrucosis albo-pulverulentis. — *P. cetrarioides* Delise ined. (v. s. D. sine apoth.)
γ. ciliata (DC.) thallo subcoriaceo cinereo-virescente lobis margine aut in paginā superiore fibrillas nigras confertas emitentibus. — Ad rupes Mimatis (cl. Prost), propè Falaise (cl. A. de Bréb.), Vire (cl. Delise). (v. s. sine apoth.)
2. *P. ACETABULUM* (Dub. mss.) thallo orbiculari membranaceo tenuissimē rugoso glauco-virescente demūn fusco-virescente lobis incisis rotundatis laxis plicato-flexuosis imbricatis subintegris, apotheciis amplis flexuosis concavis rufis margine rugoso aut crenulato. — In cortice ad trancos vetustarum arborum. — *P. corrugata* Ach. *Imbricaria Acetabulum* DC. fl. fr. 2. p. 392. — Jacq. coll. 3. t. 9. f. 1. — Vaill. bot. t. 21. f. 13. (v. v.)
3. *P. CAPERATA* (Ach. meth. 216.) thallo orbiculari subcoriaceo pallide flavo-virescente rugoso demūn granulato lobis rotundatis plicatis sinuatī integrusculis, subtus atro hispido, apotheciis concavis fusco-rufescensibus margine incurvo crenulato tandem pulverulento. — Ad arbores et saxa. — *Imbricaria caperata* Fl. fr. 2. p. 392. — Hoffm. lich. t. 38. f. 1; t. 39. f. 1; t. 42. f. 1. — eng. bot. t. 654. — Vaill. bot. t. 21. f. 12. (v. v.)
4. *P. TILIACEA* (Ach. meth. 215.) thallo orbiculari membranaceo sordidē glauco - virescente subpruinoso lobis sinuato-laciniatis ultimis rotundatis crenatis, subtus fusco-nigricante fibrillis nigris, apotheciis sparsis concavis subfuscis margine integerrimo. — Suprà corticem ad trancos arborum. — *Imbricaria quercina* DC. fl. fr. 2. p. 390. — Hoffm. en. lich. t. 16. f. 2. eng. bot. t. 700. — Mich. gen. t. 45. Occurrit etiam paginā superiori corpusculis nigris aggregatis adspersā ex Ach. (v. v.)
β. scorteae, thallo albo-virescente suprà punctis elevatis nigris interdūm confertissimis adsperso. — In saxis et arborum truncis. — *Parmelia scoraea* Ach. (v. v.)
5. *P. BORREI* (Ach. lich. 461.) thallo cartilagineo duro orbiculari cinereo sorediis griseis pulvaceis marginatis adsperso in disco plicato-rugoso inæquabili versus ambitū subimbriato rotundato - lobato, subtus fuscescente spongioso-fibrilloso, apotheciis rubris concavis margine tumido incurvo. — Ad corticem arborum Aginni ex St.-Amans, Neustriæ, Vogesorum circa Bruyères rarius (cl. Mong. et Nestl.). — Turn. in act. linn. 9. t. 13. f. 2. Apothecia rarissima. (v. s.)
β. stricta, thallo cartilagineo duro fusco sorediis pulvulentis albo-griseis fuscis obsito, subtus nigro. — Ad rupes propè Vire (cl. Delise). (v. s. D. sine apoth.)
6. *P. SAXATILIS* (Ach. meth. 204.) thallo orbiculari cinereo-glancescente scabriusculo lacunoso - reticulato laciniis imbricatis sinuato-lobatis lacinnulis linearibus latioribusve subretusis, subtus atro-fibrilloso, apotheciis badiis per etatem magnis flexniosis margine tenni inflexo dilutiore crenulato. — In saxis et truncis arborum. — *Imbricaria retruga* Fl. fr. 2. p. 389. *Lichen sextilis*

Linn. eng. bot. t. 603. Jacq. coll. 4. t. 20 f. 2. — Mich. gen. t. 49. f. 1. Color in vetustis nigricans. (v. v.)

P. aizoni (Delise) thallo papillulis lobatis granuliformibus densissime pulvinatis obtecto. — Propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

7. *P. OMPHALODA* (Ach. meth. 204.) thallo orbiculari æruginoso fusco-nigricante nitido nigro-punctato lacinis imbricatis sinuato-multifidis linearibus planis truncatis in ambitu rotundatis crenatis, subtus atro-fibrilloso, apothecis badiis margine tenui inflexo dilutiore suberenato. — In saxis et rupibus. — Imbricaria adusta DC. fl. fr. 2. p. 389. Lichen omphalodes L. eng. bot. t. 604. — Dill. musc. t. 24. f. 80. (v. v.)

P. panniformis (Ach.) thallo irregulariter expanso lacinis brevibus squamatim imbricatis erecti-scalulis stipatissimis cinerascentibus. — Ad rupes graniticas Mimatis (cl. Prost). — Lich. omphalodes Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 15. f. 2. a-b. Hanc varietatem ad priorem speciem referendam censem cl. Delise. (v. v.)

8. *P. OLIVACEA* (Ach. lich. 462.) thallo orbiculari umbrino-olivaceo ruguloso elevato-punctato lobis radiantibus adpressis planis dilatatis rotundatis crenatis, subtus pallidiori fuscescente scabro subfibrilloso, apotheciis subconcoloribus margine inflexo subcrenulato. — Ad truncos arborum et saxa. — Imbricaria olivacea DC. fl. fr. 2. p. 392. — Hoffm. en. lich. t. 13. f. 3-4. — Dill. musc. t. 24. f. 77. — Vaill. bot. t. 20. f. 8. Variat colore pallide olivaceo, apothecis per ætatem confertis amplis flexuosis rufescens. (v. v.)

P. Delisei, thalli lobis intertextis elevatis angustis. — Propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

P. fuliginosa (Fries) thallo punctis elevatis fuliginosis confertissimis adsperso. — Ad rupes prope Bernay (cl. Le Prévost), Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

9. *P. CONSPERSA* (Ach. meth. 205.) thallo orbiculari glanco-virescente levigato sèpè apophysibus pulviniformibus fuscis consperso lacinis rotundatis sinuato-lobatis crenatis planiusculis, subtus fuscescente fibrilloso, apotheciis centralibus spadiceis margine integerrimo. — Ad lapides et saxa. — Imbricaria conspersa DC. fl. fr. 2. p. 393. Squammaria centrifuga Hoffm. lich. t. 16. f. 2. — Dill. musc. t. 24. f. 75. (v. v.)

10. *P. CENTRIFUGA* (Ach. meth. 206.) thallo orbiculari zonatim centrifugo albo-virescente lacinis concretis convexis rugosis dichotomis obtusis convexi-scalulis, subtus albo-fibrillis fuscescens, apotheciis periphericis rufo-fuscis margine subintegro. — Ad rupes agri Lezurensis (Prost), Neustrie (Le Prévost), Fontisbleaudi (Dr. E. Mercier). — Imbricaria centrifuga DC. fl. fr. 5. p. 188. (v. v.)

11. *P. RECURVA* (Ach. meth. 201.) thallo stellato virescente pulverulento verucoso lacinis periphericis multifidis linearibus convexis, subtus nigro-fibrilloso spongioso, apotheciis centralibus rufo-fuscis margine prominulo cinereo integro. — In rupibus calcareis rarius. — Imbricaria incurva DC. fl. fr. 2. p. 394. — Dicks. crypt. 3. t. 9. f. 7. (v. s.)

12. *P. DESPREAUXII* (Delise ined.) thallo suborbiculari albo-virescente levigato lacinis patentibus sinuato-pinnatifidis linearibus angustis apice rotundis obtusis interdum inflatis flavo-pulverulentis, subtus atro marginibus dense atro-fibrillosis. — In sylvis propè Vire et Briquebec (cl. Despreaux et Delise). — Apothecia ignota. (v. s. D.)

13. *P. SINUOSA* (Ach. syn. 207.) thallo orbiculari cinereo-pallido levigato interdum centro nigro-punctato lacinis patentibus sinuato-pinnatifidis extus latioribus rotundatis, subtus atro-fibrilloso, apotheciis brunneis margine tenui integerrimo. — Ad muros, saxa et arborum truncos in Nenstriâ. — *P. levigata* Ach. syn. 212. — eng. bot. t. 2030 et 1852. Laciniae in ambitu passim sorediferæ. (v. s. D.)

14. *P. PARSONES* (Ach. meth. 250.) thallo stellato albo aut flavido-glaucoscente

- laciñis imbricatis sinuato-multifidis convexiusculis glabris interdum nigro-punctatis apice inflatis ascendentibusque interdum pulverulentis, subtus nigris nndis fibrillosisque, apotheciis subrubris margine integro. — In truncis arborum et saxis. — Imbricaria physodes DC. fl. fr. 2. p. 393. — eng. bot. t. 126. Jacq. coll. 3. t. 8. f. 2 et 3. — Dill. musc. t. 20 f. 49. (v. v.)
- f. vittata* (Ach.) thalli laciñis effusis linearibus pinnatifidis planiusculis nigro-marginatis. — Ad saxa Neustriæ propè Falaise (cl. de Bréhison). (v. s. sine apoth.)
- g. diatrypa*, thalli laciñis planiusculis hinc indè perforatis, subtus rugoso-plicatis atris interstitiis albis. — Imb. diatrypa DC. fl. fr. 2. p. 393. Parm. diatrypa Ach. — eng. bot. t. 1248. (v. s. sine apoth.)
15. *P. LANUGINOSA* (Ach. meth. 207. excl. syn.) thallo orbiculari stramineo pulverulento laciñis imbricatis planis rotundatis tenuissimè crenatis, subtus lanugine densa cæruleo-nigricante vestitus, apotheciis minutis obscurè fascis margine pulverulento subintegro. — Ad terram et muscos prope Vire (cl. Delise), Falaise (cl. de Bréb.), Fontainebleau (cl. Persoon), Mimatem (cl. Prost). — Imbricaria lanuginosa DC. fl. fr. 5. p. 188. — Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 1. Apothecia rarissima. (v. s. sine apoth.)
16. *P. CLEMENTIANA* (Ach. lich. 483.) thallo orbiculari albo-viridescente aut cañescente granuloso-pulverulento, in ambitu tantum extremo laciniato-lobato laciñis planis crenatis incisis nudiusculis, subtus concolori fibrillis obsoletis nigricantibus, apotheciis adpressis planis fusco-nigris margine crenulato. — Ad truncos quercuum Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), Bellovacii (cl. Graves), Neustriæ, Aginni ex St.-Am. — Torn. in act. linn. lond. 9. t. 13. f. 1. eng. bot. 1779. Thallus arctè cortici adnatus (v. s. D.)
17. *P. ALEURITES* (Ach. meth. 208.) thallo orbiculari contiguo rugoso-plicato cinerascente albo-pulverulento laciñis in ambitu tantum discretis planis rotundatis undulatis inciso-crenatis, subtus concolori nigro-fibrilloso, apotheciis planis subfuscis margine tandem crenulato subpulverulento. — Ad aseres, trahes et sepimenta lignea. — Imbricaria aleurites DC. syn. gall. p. 84. fl. fr. 5. p. 188. Placodium diffusum Hoffm. lich. t. 65. f. 2. — eng. bot. t. 858. — Dicks. crypt. 3. t. 9. f. 6. (v. s.)
18. *P. AMBIGUA* (Ach. meth. 207.) thallo stellato pallide subvirescente lævigate efflorescentiis pulveraceis et verrucis (sorediis) hemisphæricis concoloribus frequenter adsperso laciñis linearibus adpressis planis dichotomis subtruncatis, subtus fusco-nigro fibrilloso, apotheciis minutis subcentralibus planiusculis fascis margine integrissimo. — Ad ligna semipatrida et truncos arborum prope terram in Alpibus et montibus Mimat. — Imbricaria ambigua DC. fl. fr. 2. p. 394. — Hoffm. lich. t. 40. f. 2-4; t. 42. f. 2-3. — Jacq. coll. 4. t. 4. f. 2. Apothecia rara. (v. s. sine apoth.)
19. *P. ENCAUSTA* (Ach. meth. 202.) thallo stellato sordide æneo aut pallido-griseo nigro-punctato laciñis linearibus angustissimis compaginatis convexo-subteretibus forcato-multifidis undulatis in extremo ambito sublationibus, subtus nudo nigrescente, apotheciis badiis margine pallidiori crenulato. — Ad rupes in Alpibus, monte Aureo ex Delise, montibus Mimat. (cl. Prost), Pyrenæis. — Imbricaria encausta DC. fl. fr. 2. p. 394. — Hoffm. lich. t. 32. f. 2. — eng. bot. t. 2049. (v. v.)
20. *P. SPECIOSA* (Ach. meth. 198.) thallo cartilagineo-membranaceo stellato cinereo-albido laciñis linearibus inciso-ramosis imbricatis crenatis marginibus elevatis demùm pulverulentis et subinde ciliatis crispis, subtus in ambitu albo in centro fibrilloso fusco-nigricante, apotheciis centralibus subfuscis margine inflexo tumido tandem rugoso-crenato. — Ad truncos arborum et muscos Neustriæ, propè Bellovacum ex cl. Graves, in Alpibus ex cl. Delise. — Imbricaria speciosa DC. syn. 83. — Jacq. coll. 3. t. 7. (v. s. sine apoth.)
21. *P. AQUILA* (Ach. meth. 201.) thallo suborbiculari cartilagineo-membranaceo umbrino fusco-olivaceo laciñis multipartitis sublinearibus convexis imbricatis ad ambitum latioribus crenatis, apotheciis glabris concoloribus

604 ACOTYL. SEU CELLULARES. PARMELIA.

fusco-nigriave margine dilutiori crenulato. — Supra saxa et in montibus imprimis maritimis. — Imbricaria aquila DC. fl. fr. 2. p. 388. Collema cristatum fl. fr. 2. p. 383, excl. syn. — eng. bot. t. 982. — Dill. musc. t. 24. f. 69. Apothecia tantum in saxis maritimis profert. (v. s.)

22. *P. FAHLUNENSIS* (Ach. meth. 203.) thallo orbiculari cartilagineo-membranaceo nigro-piceo lœvigate laciniis linearibus angustis digitato-multifidis divergentibus planiusculo-concavis marginibus elevatis lacero-granulatis, subtus atro subfibrilloso, apotheciis olivaceo-fascis margine crenulato. — In saxis et rupibus Vogesorum, Alpium, montium Mimatis (cl. Prost). — Imbricaria Fahlunensis DC. fl. fr. 2. p. 393. — Hoffm. lich. t. 36. f. 2. — Jacq. misc. 2. t. 6. f. 2. eng. bot. t. 653. (v. v.)

f. sciastra (Ach.) thallo stellato fusco-atro, subtus aterrimo fibrilloso, apotheciis subconcoloribus margine integerrimo. — Parm. sciastra Ach. lich. — Ad rupes graniticas Mimatis (cl. Prost). (v. s. sine apoth.)

* * *Apothecius nigris.*

23. *P. STYXIA* (Ach. meth. 203.) thallo stellato cartilagineo membranaceo nigro-piceo aut castaneo-piceo nitido laciniis sublinearibus multifido-subpalmatis convexis marginibus apiceque recurvis, subtus concolori inæquabili subnudo, apotheciis concoloribus demum atris margine crenato. — Ad rupes Vogesrum, montis Pilati, Cebennarum, Mimatis (cl. Prost). — Imbricaria stygia DC. fl. fr. 5. p. 189. — Hoffm. lich. t. 25. f. 2. Status secundarius Corniculæ lanatæ ex cl. Sprengel (v. v. DC.)

f. sorediata (Ach.) thallo irregulariter expanso subopaco nigro laciniis tortuoso-complicatis lacero-laciniatis sorediis albis adsperso. — Propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

24. *P. MUSCIGENA* (Ach. lich. 472.) thallo suborbiculari imbricato subsquareo que membranaceo livide castaneo subpruinoso laciniis multifidis inciso-crenatis margine cæsio-pruinosis, subtus fibrillis cirrhosis atro subpanno, apotheciis fusco-nigris margine subintegro. — Ad terram inter muscos Mimatis (cl. Prost), Bellovacum ex cl. Graves. (v. s. sine apoth.)

25. *P. CYCLOSELIS* (Ach. meth. 199.) thallo orbiculari membranaceo cinereo-livido laciniis connatis imbricatis planiusculis multifidis erosio-crenatis subciliatis margine tandem elevatis crispis subpulverulentis, subtus nigro-fibrilloso subspungioso, apotheciis sparsis fusco-nigris margine cinereo elevato integerrimo. — In truncis arborum. — Imbricaria cycloselis DC. fl. fr. 2. p. 338. *P. adglutinata* Flœrke in Moag. et Nestl. vog. n. 543. Lecanora virella Ach. Parmelia chloantha Ach. ex Meyer. — Hoffm. lich. t. 66. f. 1. a-f. — eng. bot. t. 1942. (v. v.)

f. lithotea (Ach.) thallo orbiculari glauco-fuscescente è laciniis multifidis linearibus angustissimis planis subciliatis confertim imbricato, apotheciis centralibus nigris. — Ad rupes in montibus (v. s.)

26. *P. ULOTHRYX* (Ach. meth. 200.) thallo stellato membranaceo cinereo-glauco sublivido laciniis discretis planis dichotomo-multifidis subciliatis apice latioribus, subtus nigro fibrilloso, apotheciis sparsis nigro-fuscis margine thallo concolori cinereo elevato integerrimo subtus ciliato-fibrillosis. — Ad corticem arborum. — Imbricaria ulothryx DC. fl. fr. 2. p. 338. — Hoffm. lich. t. 14. f. 1. — Dill. musc. t. 24. f. 72. Vix præcedentis varietas ex cl. Meyer. (v. v.)

* * * *Apothecius cæsio-pruinosis.*

27. *P. VENUSTA* (Ach. meth. t. 8. f. 5.) thallo orbiculari griseo-cinerascente aut griseo-olivaceo subglabro laciniis planis flexuosis varie laciniatis in ambitu incisis plicatis radiantibus, subtus atro tomentoso-hispido, apotheciis adpressis cæsio-pruinosis antiquioribus fusco-pruinosis margine fimbriato-folio-oso. — Ad arborum truncos in Galloprovincia (Solier), Cebennis prope Minatem (cl. Prost), Bellovacum (cl. Graves), Fontembleaudi (Dr E. Mer-

- cier). — *Imbricaria venusta* DC. fl. fr. 5. p. 186. — Mich. gen. t. 43. f. 4. *Forinam sequentis vult cl.* Sprengel. (v. s.)
28. *P. PULVERULENTA* (Ach. meth. 210.) thallo stellato albo-cæsio-pruinosa ad centrum demum subrimoso irregulari in ambito laciniato laciniis multifidis discretis planis adpressis undulatis apieibus retusis, subtus atro tomentoso-hispido, apotheciis cæsio-pruinosis margine tumido crasso flexuoso. — Ad corticem arborum. — *Imbricaria pulverulenta* DC. fl. fr. 2. p. 387. — Hoffm. lich. t. 8. f. 2. — Dill. musc. t. 24. f. 71. *Dùm humectatur thallus pruina evanescit et superficies viridi-fusca evadit.* (v. v.)
29. *P. AIPOLIA* (Ach. meth. 209.) thallo stellato albido-cinerascente cæsioque nudo laciniis omnibus subconnatis planiusculis multifidis lobatisque in ambito latioribus crenulatis, subtus albido, fibrillis fusco-nigris hispido, apotheciis confertis planis cæsio-pruinosis antiquioribus atris margine albido tamidiusculo subcrenulato flexuosoque. — Ad truncos arborum. — *Imbricaria aipolia* DC. fl. fr. 2. p. 386. Status adultior *Parmelia stellaris* ex Meyer. (v. v.)
30. *P. STELLARIS* (Ach. meth. 209.) thallo stellato demum rugoso-plicato virescenti-cinereo laciniis sublinearibus convexiusculis incisis multifidis, subtus albido fibrillis cinereis, apotheciis planis nigro-cæsiis demum concavis atris margine cinereo integro demum flexuoso crenatoque. — In cortice arborum frequens. — *Imbricaria stellaris* DC. fl. fr. 2. p. 386. — Hoffm. en. lich. t. 13. f. 1. 2. (v. v.)
31. *P. CÆSIA* (Ach. meth. 197.) thallo stellato subcrustaceo-membranaceo albido-cinerascente cæsioque pulverulento laciniis incisis convexiusculis multifidis subimbricatis connatis in ambitu planis inciso-crenatis, subtus cinereo fibrillis nigris, apotheciis sparsis subconcavis glauco-nigris margine inflexo albo subintegro. — In saxis, lignis, supra muscos et ad corticem arborum. — *Imbricaria cæsia* DC. fl. fr. 2. p. 386. — Hoffm. lich. t. 8. f. 1. — eng. bot. t. 1052. — Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 16. f. 2. *Apothecia raro profert.* (v. s. sine apoth.)
32. *P. FARREA* (Ach. lich. 475.) thallo orbiculari cinereo aut cinereo-virescente farinoso laciniis brevibus incisis crenatis imbricatis marginibus elevatis granulato-pulverulentis, subtus albido fibrillis fusco-nigris, apotheciis sparsis nigris cinereo-pruinosisve margine inflexo tumente subcænatis. — Ad muros vetustos Bellovaci (cl. Graves), Gisors (cl. Le Prév.) — *P. pityrea* var. β Delise. (v. s. sine apoth.)
33. *P. PITYREA* (Ach. lich. 483.) thallo membranaceo orbiculari cinereo laciniis centralibus plicatis eroso-crispis griseo-pulverulentis periphericis planiusculis rotundatis crenatis pruinosis, subtus albo fibrillis nigris, apotheciis concavis cæsio-pruinosis nigro-fuscis margine tumido integro. — In truncis arborum. — *Imbricaria pityrea* Chev. fl. par. 1. p. 623. non DC. fl. fr. 2. p. 391. *Imb. grisea* fl. fr. 2. p. 387. — eng. bot. t. 2064. — Hoffm. en. lich. t. 10. f. 4. *Apothecia raro et tantum in vetustissimis individuis occurunt.* (v. v. sed cum apoth. s.)
34. *P. ALBINEA* (Ach. lich. 941.) thallo stellato albo-canescente lœviusculo laciniis sublinearibus convexis multifidis ultimis digitatis fastigiatis crenato-cristatis, subtus albo fibrillis concoloribus, apotheciis nigris glauco-subpruinosis margine subintegro. — Ad rupes propè Mimatem (cl. Prost), Vire (Delise), Falaise (cl. de Bréb.). — Thallus impressionibus et elevationibus verrucosis pro apotheciis incipientibus habitis notatus. *Apothecia raro occurunt.* (v. s. sine apoth.)

*** *Apothecii flavi.*

35. *P. TRIBACIA* (Delise ined.) thallo orbiculari albo-virescente pulverulento laciniis irregularibus disformibus eroso-crenulatis imbricatis subtus concoloribus subfibrillosis, apotheciis adpressis disco plano flavo, in ambitu demum crenato lobatoque margine thallode elevato persistente. — Ad arborum truncos in Neustriâ ubi rarissime fructificat. — *Lecanora tribacia* Ach. (v. s. sine apoth.)

606 ACOTYL. SEU CELLULARES.

36. *P. PARIETINA* (Ach. meth. 213.) thallo orbiculari flavissimo lobis radiantis adpressis planis apice dilatatis rotundatis crenatis crispis, apotheciis concoloribus margine integerrimo tenui. — Ad parietes, trunco arborum et saxa. — *Imbricaria parietina* DC. fl. fr. 2. p. 391. — Hoffm. en. lich. t. 18. f. 1. eng. bot. t. 194. — Dill. musc. t. 24. f. 76. *Forma Lecanoræ candelaris et luteo-alba ex cl. Meyer.* (v. v.)

β. chlorina, thallo flavicante-albido, apotheciis pallido-aurantiacis minutis. — *Imb. chlorina* Chev. fl. par. 1. p. 621. (v. v.)

37. *P. CANDELARIA* (Delise iued.) thallo effuso imbricato squamuloso-lobato flavo lobis confertissimis lacero-laciniatis interdum suberectis marginibus pulveraceo-granulatis, apotheciis planiusculis concoloribus margine thallode integerrimo. — Ad corticem in arborum traneis, in parietibus ligneis, saxis et muris. — *Lecanora candelaria* Ach. *Placodium candelarium* DC. fl. fr. 2. p. 398. — eng. bot. t. 1794. *Lichen concolor* Dicks. cr. 3. t. 9. f. 8. *Forma Parmeliae parietinæ ex cl. Meyer.* (v. v.)

β. polycarpa (Ach.) thallo e lobis conglomerato-granulatis citrinis composto, apotheciis confertis flexuosis disco demum fulvo margine thallode tandem crenulato. — *Lichen polycarpus* Ehr. (v. v.)

γ. substellata (Ach.) thallo substellato, lobis imbricatis lacero-laciniatis margine palverulentis citrino-fulvis, apotheciis planiusculis marginatis integerrimis concoloribus. (v. v.)

δ. lychnea (Ach.) thallo lobato-granulato pulvinato citrino-fulvo, apotheciorum disco convexo aurantiaco marginem thallodem subcrenulatum tandem excludente. — *Borrera lychnea* Delise. (v. v.)

VI. PANNARIA Delise in dict. class. t. 13. p. 20. — *Parmeliae* sp. Ach. Mey. Spreng.

Receptacula parva plana demum convexa aut globosa sparsa, subtus a thallo formata eidemque tota superficie adnata; lamina proligna rubo-brunnea cornea crassa margine thallode tenui demum evanescente cineta. — Thallus subsuberosus plumbeus linearis-lobatus laciniis imprimis in centro adnato-contiguis plano-expansus, subtus et imprimis in ambitu pannoso-tomentosus.

1. *P. RUBIGINOSA* (Delise l. c.) thallo orbiculari livido-plumbeo membranaceo in centro irregulari squamoso-imbricato granulatoque in ambitu laciniato laciniis adpressis planiusculis ineiso-lobatis marginibus subelevatis crenulatisque, subtus lanagine densa nigro-cærulescente spongiosa obpresso, apotheciis centralibus confertissimis rufo-fuscis planiusculis margine albescente crenulato. — Ad trunco arborum in maritimis provinciarum occidentalium. — *Parmelia rubiginosa* Ach. *Imbricaria cærulescens* DC. fl. fr. 2. p. 390. excl. syn. et 5. p. 187. — Dicks. crypt. 4. t. 12. f. 6. eng. bot. t. 983. Hanc speciem cum sequenti conjugunt cl. Meyer et Sprengel. (v. v.)

2. *P. PLUMBEA* (Delise l. c.) thallo orbiculari livido-plumbeo in centro irregulari plicato rugoso-verrucoso vel etiam squamoso in ambitu laciniato laciniis adpressis planiusculis plicatis rotundatis inciso-crenatis, subtus lanagine densa pallido-plumbea demum cærulescenti aut nigrescente spongiosa obpresso, apotheciis centralibus rufis brunneisve primi planis demum convexis difformibus raro solitariis plerumque in pulvinulos sparsos convexos difformesve confluentibus margine subconcolori integerrimo demum evanescente. — Ad trunco arborum rariisque in ripibus. — *Parmelia plumbea* Ach. syn. 202. — Lightf. scot. t. 26. (v. s.)

β. myriocarpa, apotheciis subcentralibus rubro-fuscis brunneis brunneo-nigricantibusve numerosissimis confertis rarius confluentibus. — *Imbricaria plumbea* DC. fl. fr. 2. p. 391. *Pannaria myriocarpa* Delise. P. Delisei Bory. (v. s.)

3. *P. CONOPLEA* (Delise l. c.) thallo orbiculari glauco-virescente aut subplumbeo passim pulvere granuloso cærplescenti-plumbeo obtecto in ambitu tantum laciniato laciniis imbricatis adpressis planiusculis rotundato-lobatis crenatis marginibus elevatis erosio-crispis pulvorientis, subtus lanugine densâ spongiosa plumbeo-atrâ obpresso, apotheciis subimmersis rubris rufo-ferrugineisve margine dilutiore subflavido integro. — Suprà muscos rarius. — *Parmelia conoplea* Ach. Moug. et Nestl. vog. n. 347. *Imbricaria conoplea* DC. fl. fr. 5. p. 187. *Imb. pityrea* Fl. fr. 2. p. 391. excl. syn. Ach. *Apothecia rarissima*. (v. s. cum apoth. com. a cl. Despréaux.)
4. *P. MUSCORUM* (Delise l. c.) thallo suborbiculari cartilagineo livido-fuscescente squamuloso-lobato lobis irregulariter profundèque lacero-laciniatis marginibus subgranulatis centro erectis adpressae imbricatis in ambitu plano-concavis, apotheciis minutis crassis planis obscure rufo-fuscis aut rufo-nigricantibus margine pallidiori integerrimo demùm evanescente. — Inter et suprà muscos putridos, propè Vire (cl. Delise), *Parisios ex Cheval.* — *Lecanora muscorum* Ach. syn. 193. *Patellaria museorum* Spreng. *Lichen hypnorum* Ach. prod. nou auct. L. carnosus Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 7. eng. bot. t. 1684. (v. s.)

VII. COLLEMA Hoffm. Schreb. gen. pl. Ach. lich. univ. 129. t. 14. f. 8-11. — *Parmeliæ* sp. Mey. Spreng.

Receptacula scutelliformia sessilia (rarò subpodicillata) marginata, tota è thalli substantiâ similari formata, humida subgelatinosa sicca subcartilaginea, disco concolori aliquando colorato. — Thallus foliaceus subgelatinosus exsiccatione plerùmque cartilagineus formâ varius.

I. Thallo foliaceo decumbente.

* Apotheciis fuscis badüs.

1. *C. SATURNINUM* (DC. fl. fr. 2. p. 385.) thallo coriaceo-membranaceo foliaceo atro-virente glabro, subtus glauco subtomentoso, lobis maximis oblongis rotundatis undulatis integerrimis, apotheciis elevatis planiusculis fuscis margine tenui integerrimo. — Ad trunco arborum et saxa in prov. australioribus, rarius in prov. boreali-occidentalibus. — Ach. lich. univ. 644. *Parm. saturnina* Ach. meth. Spreng. — Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 8. eng. bot. t. 1980. (v. v.)
2. *C. NIGRESCENS* (DC. fl. fr. 2. p. 384.) thallo membranaceo semi-pellucido foliaceo submonophyllo orbiculari depresso rugoso atro-viridi radiatim, pliato rotundato-lobato, subtus dilutiore glabro, apotheciis centralibus numerosis confertis demùm convexis rufo-fuscis minutis margine tenui integerrimo. — In truncis arborum, saxis et rupibus ex Ach. — Ach. lich. univ. 646. *C. microcarpum* DC. syn. gall. 82. — Hoffm. lich. t. 37. f. 2. 3. — Jacq. coll. 3. t. 10. f. 3. — Dill. musc. t. 19 f. 20. Cum sequenti conjugunt cl. Meyer et Sprengel. (v. v.)
3. *C. FLACCIDUM* (Ach. lich. univ. 647. excl. var. β .) thallo membranaceo foliaceo subpellucido lœvi atro-viridi, subtus subconcolori glabriusculo, lobis discretis obversè ovatis obtusè lobatis integerrimis laxis undulato-flexuosis plicatis bullosisque, apotheciis sparsis rarissimis planiusculis rufis margine tenui integerrimo. — In rupibus stillicidio aquarum madefactis inter muscos circa Mimatem (cl. Prost), Falaise ex cl. A. de Brébisson, Vire ex cl. Delise. — *Lichen flaccidus* Ach. in nov. act. stockh. 16. t. 1. f. 4. Thallus vetustior granulis seu pulvere fuliginoso sèpè adpersus occurrit. (v. s.)
4. *C. DERMATINUM* (Ach. lich. univ. 648.) thallo foliaceo crasso membranaceo lœvi nudo atro-viridi lobis aggregatis subrotundis integerrimis, apotheciis sparsis sessilibus necolatis disco demùm planiusculo rufo margine elevato tumido integrusculo. — In Jurasso ad lapides et in muris humidis circa Broyères Vogesorum (cl. Mougeot). — Fl. fr. 5. p. 186. (v. s.)
5. *C. PLICATILE* (Ach. lich. univ. 635.) thallo subcarnososo-gelatinoso subglauco-

olivaceo sicco atro-viridi orbiculari imbricato, lobis omnibus crassis erectiusculis rotundatis gyroso-plicatis undulatis integerrimis, apotheciis sparsis sessilibus concavis badio-fuscis margine erasso integerrimo. — Ad saxa maddida et lapides in muris humidis circa Bruyères Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), et propè Versailles ex Cheval., Vire ex Delise. — Lichen plicatilis Ach. in nov. act. holm. 16. t. 1 f. 2. (v. s.)

6. *C. MICROPHYLLUM* (Ach. lich. univ. 630. non DC.) thallo subeffuso atro-viridi lobis crassis minutis consertis imbricatis inciso-crenatis, apotheciis sessilibus consertis urceolato-concavis concoloribus margine integerrimo subcoarctato. — Suprà corticem vetustam ad truncos arborum Mimatis et probabiliter alibi. — Parm. tenax Spreng. syst. veg. IV. p. 287 et idcirco ex eo à C. tenaci non distinctum. — Species pro exilitate loborum magnâ primo adspectu facile cum Lecanorâ microphylla confundenda. (v. s.)
7. *C. FRAGRANS* (Ach. syn. 311.) thallo suborbiculari foliaceo subcarnoso-gelatinoso fusco-olivaceo imbricato lobis brevibus rotundatis nudis margine incrassatis crenatis ascendentibus, apotheciis sparsis fuscis minutis concavis margine crasso inaequabili. — Ad truncos arborum in Gallia ex Ach. — eng. bot. t. 1912. Humeatum spiritum ammoniaci aromaticum leviter redolet. †.
8. *C. CHEILEUM* (Ach. lich. univ. 630.) thallo suborbiculari imbricato humido prasino pellucido sicco contractato lobis crassis omnibus minutis rotundatis crenulatis ascendentibus, apotheciis planiusculis aggregatis concoloribus margine crenulato subevanescente. — Ad muros, saxa et terram Mimatis (cl. Prost), Bellovacis ex cl. Graves. — Lichen marginatus Bern. in Schrad. journ. 1799. I. t. 1. f. 2. a. (v. s. sine apoth.)
β. byssaceum (Ach.) lobis omnibus minutissimis crenulatis, apotheciis minutis demum convexis margine integerrimo. — Schrad. I. c. f. 2. d. (v. s. sine apoth.)
9. *C. TURCIDUM* (Ach. lich. univ. 634.) thallo irregulariter expanso depresso sicco subnigro submonophyllo sublobato subimbricato lobulis elevatis crassis verruciformibus rugosis granulatis adsperso, apotheciis sessilibus urceolatis obscure fuscis margine subinfexo tumido extus rugoso-granulatis. — Ad saxa inter muscos Galliae ex Ach., Bellovacis ex cl. Graves, propè Vire ex cl. Delise. — Apothecia haud parva plerumque ad apices laciniarum affixa.
10. *C. JACOBÆFOLIUM* (DC. fl. fr. 2. p. 384.) thallo orbiculari substellato imbricato fusco-atro virescente lobis lacero-laciniatis aut gyroso-complicatis marginibus elevatis undulatis crispis crenulatis, apothecis marginalibus planiusculis concoloribus aut rufo-fuscis margine crenulato. — Ad terram et rupes humidas. — Collema melænum Ach. — Bern. in Schrad. journ. 1799. I. t. 1. f. 5. a. b. — Fl. dan. t. 463. f. 1 et 2. (v. v.)
β. multifidum, lobis profundè laciniatis laciniis radiantibus strictis angustis elongatis extrorsum latoribus laceroque-pinnatifidis, apotheciorum margine subintegerrimo. — *C. melænum γ jacobæfolum* Ach. — Lichen multifidus Scop. (v. v.)
γ. marginale (Ach.) thalli lobis profundè laciniatis angustis multifidis effasis flexuosis planiusculis crenatis lobatisque, apothecis marginalibus sparsisque nigro-fuseis margine integerrimo. — Lichen marginalis eng. bot. t. 1924. — Dill. muse. t. 19. f. 25. (v. s.)
11. *C. TREMELLOIDES* (Ach. lich. univ. 655.) thallo foliaceo membranaceo-gelatinoso tenerrimo subdiaphano plumbeo-olivaceo sicco pallidiori obsolete rugoso et impresso-punctato lobis oblongis rotundatis incisis integerrimis, apotheciis sparsis subpedicellatis planis rufo-fuscis demum nigris margine pallido. — Ad arborum truncos et inter muscos propè Mimatem (cl. Prost). — Hoffm. lich. 2. t. 35. f. 2. (v. v.)
β. cyanescens (Ach.) lobis flexuoso-crispis complicatis laevigatis glauco-cæsiis marginibus et suprà passim granulis concoloribus adspersis. — Inter muscos propè Mimatem et Falaise (cl. de Bréb.). (v. s.)

12. *C. scotinum* (Ach. lich. univ. 651.) thallo orbiculari imbricato foliaceo membranaceo congregato olivaceo sicco nigrescente lobis parvis rotundatis plicatis crispis erectiunculis incisis sinnato-incisis aut lacero-laciniatis integrunculis aut denticulatis, apotheciis sparsis minutis sessilibus fusco-nigris badiisque margine integerrimo. — Inter muscos in muris et ad terram Vogesorum (cl. Mong.). — eng. bot. t. 772. — Dill. musc. t. 19. f. 33. (v. s.)

13. *C. furvum* (DC. fl. fr. 2. p. 385.) thallo membranaceo foliaceo atro-subvirescente rugoso-plicato utrinque granuloso lobis rotundato-difformibus incisis subinde undulato-crispis integerrimis, apotheciis sparsis planis nigro-fuscis sessilibus margine integerrimo. — In truncis arborum. — Ach. syn. 323. — Jacq. coll. 3. t. 10. f. 2. — Dill. musc. t. 19. f. 24. (v. v.)

* * *Apotheciis rubris.*

14. *C. lacerum* (DC. fl. fr. 2. p. 384.) thallo foliaceo membranaceo subdiaphano tenerimo brunneo glaucescente reticulato-subrugoso, lobis parvis subimbriatis confertis erectiunculis lacero-laciniatis denticulato-ciliatis, apotheciis sparsis concavis rufis, margine tumido integro pallido. — Inter muscos. — Ach. syn. 327. — eng. bot. t. 1982. — Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 11. f. 1. — Dill. musc. t. 19. f. 31. A. B. C. (v. v.)

β. pulvinatum (Ach.) thallo pulvinato è lobis minutis confertissimis lacero-laciniatis denticulato-lacinulatis granulosisque composito. — *C. pulvinatum* Hoffm. — Dill. musc. t. 19. f. 34. (v. s.)

15. *C. corniculatum* (Hoffm. germ. 2. p. 105.) thallo subfoliaceo olivaceo aut pallide fusco-virescente sinnato-lacero lobis membranaceis crassis confertis erectiunculis apice dilatatis palmato-incisis, laciniis sublinearibus teretibus, apotheciis sparsis aut submarginalibus rufo-fulvis. — Ad terram limosam inque truncis arborum. — Fl. fr. 2. p. 184. — *C. palmatum* Ach. — eng. bot. t. 1635. — Dill. musc. t. 19. f. 30. Apothecia rarissima. (v. s. sine apoth.)

16. *C. crispum* (Hoffm. germ. 2. p. 101.) thallo orbiculari pulposo olivaceo aut atro-viridi lobis imbricatis plicatis crassis, periphericis rotundatis crenulatis, centralibus granulatis, apotheciis sparsis confertisque rufis margine subcrenulato. — Ad terram inter muscos. — Fl. fr. 2. p. 383 et 5. p. 185. *C. pulposum* Ach. lich. univ. 632.

α. pulposum, thallo suborbiculari lobis repando-crenatis nudis, apotheciis centralibus confertis planiusculis margine subintegro. — *C. pulposum* Ach. syn. 311. — Bern. in Schrad. journ. 1799. I. t. 1. f. 1. a. (v. v.)

β. crenulatum, thallo suborbiculari lobis centralibus erectiunculis granulatis; periphericis depressis majoribus obtusis, apotheciis sparsis concaviusculis. — *C. crispum* α Ach. syn. 311. *C. crispum*, *C. crenulatum* et *C. glaucescens* Hoffm. — eng. bot. t. 834. — Dill. musc. t. 19. f. 23. (v. v.)

γ. cristatum (Ach.) lobis incisis dentatis, apotheciis depressis planis amplis margine subintegro. — *C. cristatum* Hoffm. — Jacq. coll. 3. t. 10. f. 1. — Dill. musc. t. 19. f. 23. (v. s.)

δ. granulatum (Ach.) lobis centralibus graniformibus, periphericis subintegris, apotheciis in medio thalli confertis amplis depressis urceolatis margine granulato. (v. s.)

ε. prasinum (Ach. lich. 633.) thallo submonophyllo planiusculo nudo, apotheciis subimmersis concavis margine subintegro. — *C. prasinum* Ach. syn. 312. — Bern. in Schrad. journ. I. c. t. 1. f. 6. (v. s.)

II. *Thallo squamuoso-lobato crustæformi.*

17. *C. lutescens* (Ach. syn. 309.) thallo crustæformi diffracto-rimoso areolato-lobato rugoso luteo-virescente sicco atro-viridi, apotheciis innatis amplis planiusculis rubro-fuscis margine crenulato demum evanido. — Ad terram lutescens in umbrosis Mimatis (cl. Prost). — *Patellaria lutescens* Spreng. syst. 4. p. 269. ex quo non diversum à *C. limosa*. (v. s.)

610 ACOTYL. SEU CELLULARES.

COLLEMA.

18. *C. TENUISSIMUM* (Ach. lich. univ. 659.) thallo densè imbricato squamuoso-lobato granulato humectato atro-viridi sieco fusco-nigricante laciniis minutis confertis erectiunculis multifidis, apotheciis sparsis planiusculis margine integro flexuoso pallidiori. — Ad terram arenosam passim. — Fl. fr. 5. p. 185. *C. byssinum* Hoffm. *C. granosum* DC. fl. fr. 2. p. 382. — Dicks. crypt. 1. t. 11. f. 8. (v. s.)
19. *C. VARIABLE* (DC. fl. fr. 2. p. 381.) thallo crustæformi tartareo subgelatinoso rimoso-diffracto centro dilute umbrino ambitu albido-cinereo, apotheciis confertis disco plano fusco-cæsio demùm convexo nigricante margine integro pallidiori. — Ad lapides calcarios non frequens. — *Lecanora varabilis* Ach. lich. — Cum Urceolaria contorta conjugit cl. Sprengel. (v. s.)

III. *Thallo cespitoso ramoso.*

20. *C. SYNALYSSUM* (Ach. lich. univ. 640.) thallo sicco nigro lobis omnibus minutis graniformibus aut cespitulos discretos subpodicillatos formantibus, apotheciis minutis sparsis concoloribus concavis margine integro concolori, demùm aggregatis margine evanido et in capitula subpodicillata conglomeratis. — Ad rupes inter muscos Mimantis, Parisiorum, etc. — *C. fasciculare* γ conglomeratum Ach. syn. 317. — Bern. in Schrad. journ. 1. c. t. 3. f. 1. c. (v. s.)
21. *C. SYMPHOREUM* (DC. fl. fr. 2. p. 382.) thallo gelatinoso suborbiculari cespitoso-pulvinato atro-viridi sicco nigro lobis confertissimis complicatis crispis granulatis, apotheciis minutis turbinato-globosis aggregatis marginalibus sparsisque concoloribus disco punctiformi impresso. — Inter et supra muscos in collibus et rupibus rariū. — *C. myriococcum* Ach. syn. 316. — Ach. in nov. act. stock. v. 22. t. 3. f. 2. (v. s.)
- L. polyanthes* (Ach.) thallo lobato-pleato flavo-lutescente plicis erectis gyrosis anastomosantibus, apotheciis marginalibus concavis concoloribus. — Bern. in Schrad. journ. 1799. 1. t. 1. f. 4. — Jacq. coll. 3. t. 11. f. 2. excl. syn.
22. *C. FASCICULARE* (DC. fl. fr. 2. p. 383.) thallo gelatinoso suborbiculari atro-viridi imbricato lobato-plicato plicis centralibus erectis flexuosis anastomosantibus, lobis periphericis rotundatis inciso-crenatis, apotheciis marginalibus turbinato-pedicellatis fasciculatis convexiusculis obscurè rufis margine prominulo. — Ad terram et in truncis. — Ach. syn. 317. excl. var. γ. — Fl. dan. t. 462. f. 2. — Dill. musc. t. 19. f. 27. A et B. Cum hac specie duas præced. conjung. cl. Sprengel. (v. s.)
23. *C. SCHRADERI* (Ach. lich. univ. 658.) thallo cespitoso erectiunculo carnoso olivaceo laciniis planiusculis implexis furcatis rugosis obtusis marginibus repandis obsoletè crenatis, apotheciis lateralibus rufis margine tumido. — Ad rupes propè Monspelium (cel. DC.). — Bern. in Schrad. journ. 1799. 1. t. 2. f. 5. (v. v. DC.)
24. *C. SUBTILIS* (Hoffm. germ. 2. p. 105.) thallo minuto cespitoso circinnato humectato gelatinoso viridi sieco nigro laciniis angustissimis linearibus adpressis subdivisis integris obtusis radiantibus, apothecis centralibus planiusculis minutulis concoloribus margine tenui integerrimo. — Ad terram limosam et ad lapides calcarios Bellovaci ex cl. Graves et probabiliter alibi. — Ach. syn. 328. — eng. bot. t. 1008. Schrad. journ. 1. c. t. 2. f. 6.
25. *C. VELUTINUM* (Ach. syn. 329.) thallo atro pulvinato aut latius expanso pannoso siccitate rimoso è laciniis teretibus tenerrimis subsimplicibus flexuosis implexis fastigiatis composito, apotheciis minutissimis concaviusculis concoloribus cespiti adpressis marginatis. — In saxis inter muscos propè Mimatem (cl. Prost), Falaise ex cl. de Bréb. — *C. pannosum* Ach. lich. excl. Hoffm. syn. — Ach. in Web. et Mohr. beytr. 2. t. 3. f. a-f. — Apothecia oculis nudis haud observabilia, cæterum rarissima. (v. s. sine apoth.)

VIII. PHYSIA DC. fl. fr. 2. p. 395. — Evernia, Cetraria, Borrera, Ach. lich.
et syn. — Parmelia sp. aut Parmelia transformatæ Mey. Spreng.

Receptacula scutelliformia submembranacea sessilia aut podicillata
subtus libera aut sublibera, a thallo marginata et subtus formata;
lamina proligera tenuis colorata. — Thallus foliaceus cartilagineusve
ramoso-laciatus, laciniis liberis erectis ascendentibusve utrinque
glabris.

Sect. I. EVERNIA Delise ined. — Everniæ et Borreræ sp. Ach. lich.
univ. 84. t. 10. f. 1. 2; et t. 9. f. 3 et 8.

Receptacula sessilia subtus libera circumcircà elevata. — Thallus angulosus
vel compresso-planus intus stuppeus.

1. P. DIVARICATA (Dub. mss.) thallo ramosissimo compressò molli pendulo
ochroleuco, ramis elongatis divaricatis laxis flaccidis lacunoso-rugosis subar-
ticulatis, apotheciis brunneo-rubris marginatis. — Ad Pinorum Abietumque
ramos. — Evernia divaricata Ach. Usnea flaccida Hoffm. lich. 3. t. 67. f. 1. 2.
DC. fl. fr. 2. p. 333. — Dill. musc. t. 12. f. 5. (v. v.)

β. pumila (Delise) thallo 1-2-pollicari tenui albissimo, ramis intertextis.
— Ad rupes in Armoraciâ inferiori ex cl. Delise.

2. P. PRUNASTRI (DC. fl. fr. 2. p. 397.) thallo membranaceo cespitoso molli
rugoso-lacunoso albo-pallescente ramoso, laciniis dichotomo-multifidis
erecto-ascendentibus linearibus attenuatis planis subtus canaliculatis albido-
ribus, apotheciis submarginalibus concavis rufis marginatis. — Evernia pru-
nastri Ach. Ramalina prunastri Cheval. — eng. bot. t. 859 et 1353. — Vaill.
bot. t. 20 f. 7. — Dill. musc. t. 21. f. 54. Laciniæ interdùm pulvere albo
conspersæ reperiuntur; apothecia raro occurunt. (v. v.)

β. linearis (Delise) thalli laciniis elongatis linearibus angustis parum ra-
mosis. — Propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

3. P. FURFURACEA (DC. fl. fr. 2. p. 396.) thallo cespitoso decumbente ramoso
cinereo-furfuraceo subtus canaliculato nigricante, laciniis lineari-attenuatis
dichotomo-ramosis, apotheciis submarginalibus concavis rufis margine tenui
subintegro. — Ad terram in montibus, ad rupes et arbores. — Borrera fur-
furacea Ach. Evernia furfuracea Delise ined. — Hoffm. lich. t. 9. f. 2. — eng.
bot. t. 984. — Dill. musc. t. 21. f. 52. Apothecia rariora. (v. v.)

4. P. VILLOSA (Dub. mss.) thallo cespitoso cinereo-virescente villoso, laciniis
linearibus attenuatis ramosis subtus canaliculatis albicantibus, apotheciis
sparsis junioribus podicillatis concavis demùm planis cerino-rubellis mar-
gine subinfexo pubescenti-ciliato. — In Corsicâ ad ramos Juniperorum de-
texit cl. Soleiro. — Borrera villosa Ach. Evernia villosa Delise ined. (v. s.)

Sect. II. BORRERA Ach. lich. univ. 93. t. 9. f. 4-7 etf. 9.

Receptacula podicillata. — Thallus cartilagineus intus stuppeus, laciniis fre-
quenter subtus canaliculatis margineque ciliatis.

5. P. CHRYSOPHTHALMA (DC. fl. fr. 2. p. 401.) thallo cartilagineo cespitoso decum-
bente flavo-aurantiaco utrinque nudo concolori, laciniis linearibus planius-
culis piunatido-ramosis apice fibrillosis, apotheciis subterminalibus pla-
niusculis aurantiacis margine fibrilloso-ciliatis. — In truncis arborum. —
Borrera chrysophtalma Ach. — Hoffm. lich. 2. t. 36. f. 4. — eng. bot.
t. 1088. (v. v.)

β. denudata (Ach.) thalli laciniis lacero-laciniatis compressis fulvis, apo-
theciorum margine integerrimo nudo. — Ad rupes editiores Vogesorum
(cl. Mougeot), agri Mimatensis (cl. Prost), propè Vire (cl. Delise). —
Hoffm. lich. 6. t. 31. f. 1. (v. s.)

6. P. EXILIS (Mich. bér.-amer. 2. p. 327.) thallo minuto imbricatim cespitoso

flavo demùm albescente, lacinia ramosissimis divaricatis intricatis compres-
sinsculis capillaceo-attenuatis, apotheciis sparsis disco planiusculo croceo
marginè thallode tenui integerrimo. — Ad ramos arborum in Armoraciâ
ubi rarissima detexit cel. Delise. — Borrera exilis Ach. (v. s. D.)

7. *P. FLAVICANS* (DC. rapp. 1. p. 16.) thallo cespitoso erecto ramosissimo aureo
glabro, lacinia diffuso-complicatis lineariter insculnis divaricato-flexuosis
dichotomis attenuatis fibrilloso-cirrhosis interdùm pulverulentis, apotheciis
sparsis planis concoloribus margine integro nudo. — Ad trancos arborum
in provinciis occidentalibus usque ad inferiorem Neustriam. — Fl. fr. 5. p. 189.
Borrera flavicans Ach. (v. v. sine apoth.)

8. *P. SOLENARIA* (Dub. mss.) thallo cespitoso rigido albo ramosissimo glabro,
lacinia angustissimis linearibus dichotomis diffuso-complicatis ciliatis fibril-
losi-cirrhosis subtus canaliculatis, apotheciis sparsis flavescentibus margi-
natis. — Ad trancos et ramos Abietis in montibus Lezurensibus (cl. Prost). —
Borrera solenaria Ach. — Dill. musc. t. 21. f. 53. Mich. gen. t. 38. f. 2. (v.
s. sine apoth.)

9. *P. CILIARIS* (DC. fl. fr. 2. p. 396.) thallo cespitoso ramoso virescente glauco
subtus albo, lacinia linearibus ramosis attenuatis apice cilia elongata nigres-
centia gerentibus subtus canaliculatis, apotheciis subterminalibus subpod-
cillatis concavis demùm planis nigro-fuscis cæsiisque margine crenato sim-
briatoque. — In cortice arborum frequens. — *Borrera ciliaris* Ach. — Hoffm-
lich. t. 3. f. 4. — eng. bot. t. 1352. — Vaill. bot. t. 20. f. 4. Transformatio
Parmelia cyclospora et *ulothrix* ex Meyer nebenst. 1. p. 229. (v. v.)

10. *P. TENELLA* (DC. fl. fr. 2. p. 396.) thallo diffuso-cespitoso albo-cinerascente
utrinque nudo concolori substellato, lacinia linearibus pinnatisidis apicibus
ascendentibus dilatatis fornicatis ciliatis, apotheciis sparsis planis nigro-cæsiis
margine albido prominulo integro subinfexo. — Ad cortices arborum. —
Borrera tenella Ach. — Hoffm. lich. t. 3. f. 23. — eng. bot. t. 1351. — Vaill.
bot. t. 20. f. 5. Transformatio *Parmelia stellaris* ex Meyer.

P. leptalea (Ach.) thalli ciliis fuscescentibus, apotheciis atris margine sub-
granulato. — In arboribus et saxis. — *P. leptalea* DC. fl. fr. 2. p. 895. —
Jacq. coll. 4. t. 6. — Dill. musc. t. 20. f. 46. A. B. (v. v.)

11. *P. LEUCOMELA* (Dub. mss.) thallo diffuso cespitoso pallescente, lacinia eret-
cis linearibus multifidis attenuatis ciliatis subtus albissimis subpulverulentis
subcanaliculatis, apotheciis podicillatis planis nigro-cæsiis margine ciliato.
— In trancis arborum Neustriæ propè Vire (cl. Delise), Pinè Piceæ in valle
Rhenanâ (cl. Mongeot). — *Borrera leucomela* Ach. — Swartz obs. bot. t. 11.
f. 3. (v. s. sine apoth. D.)

Sect. III. CETRARIA Ach. lich. univ. 96. t. 10. f. 4 et 5; syn. 226.

Receptacula thalli margini obliquè adnata, segmento inferiori ab eo soluto
libero, superiori sessili. — Thallus foliaceus irregulariter laciuiatus.

12. *P. NIVALIS* (DC. fl. fr. 2. p. 400.) thallo cespitoso erecto submembranaceo
laconoso-reticulato sulfureo basi flavicante, lacinia planiusculis dilatatis mul-
tifido-laeeris crispis crenato-dentatis, apotheciis marginalibus pallescenti-car-
neis margine crenulato. — In sterilibus siccis arenosisque Alpium et Pyre-
næorum, propè Parisios circa Senlis et Compiegne ex Cheval. — *Cetraria ni-
valis* Ach. — Linn. lapp. t. 11. f. 1. Vill. dauph. 3. t. 55. (v. v.)

13. *P. CUCULLATA* (DC. fl. fr. 2. p. 399.) thallo cartilagineo cespitoso erecto pal-
lescente basi rufa, lacinia tubuloso-canaliculatis subdichotome laciuiatis
marginibus undulato-crispis sublaceris, fertilibus dilatatis subcucullatis,
apotheciis submarginalibus adpressis carneo-pallescentibus margine integer-
rimo. — Ad terram in collibus aridis. — *Cetraria cucullata* Ach. — Hoffm.
lich. t. 66. f. 2. — Sm. in trans. linn. 1. t. 4. f. 7. (v. v.)

14. *P. ISLANDICA* (DC. fl. fr. 2. p. 399.) thallo cespitoso erecto subcartilagineo
olivaceo-castaneo subtus albidiiori lacinia multifidis canaliculatis dentato-ci-

liatis, fertilibus dilatatis, apothecis adpressis planis concoloribus margine elevato integerrimo. — Ad terram in campis apricis et sylvis montosis. — *Cetraria islandica* Ach. — Hoffm. lich. t. 9. f. 1. — eng. bot. t. 1330. — Dill. musc. t. 28. f. 111. Variat thalli laciniis latoribus et perangustis, marginibus dentato-ciliatis et omnino nudis inermibus. (v. v.)

15. *P. JUNIPERINA* (DC. fl. fr. 2. p. 400.) thallo cespitoso lobato ascendente pallidè flavo subtus flavissimo, laciniis complicatis eroso-crenatis crispis marginibus sèpè pulvulentis, apotheciis elevatis planis crispis margine crenulato. — Ad ramos et truncos Coniferarum imprimis Juniperorum in Pyrenæis, Monte-Aureo, Alpibus. — *Cetraria juniperina* & Ach. — Hoffm. lich. t. 7. f. 2. — Buxb. cent. t. 7. f. 3. (v. v.)

2. *pinastri* (Ach.) thalli laciniis depresso-rotundato-lobatis crenatis marginibus crispis pulvulentis flavissimis. — Ad radices Pini in Jurassi valle Jovis ex cl. Schær., Alpibus meridionalibus, montibus Mimatis (cl. Prost), Pyrenæis. — *Ph. pinastri* DC. l. c. — Hoffm. lich. t. 7. f. 1. Apothecia rassima (v. s. sine apoth.)

16. *P. SEPINCOLA* (DC. fl. fr. 2. p. 401.) thallo membranaceo ascendente castaneo subtus dilutiori lacuoso vase lobato, laciniis planis lobatis undulatis subcrenatis, apotheciis submarginalibus elevatis concoloribus planiusculis margine rugoso-crenulato. — Ad fruticum caules et ramos in Pyrenæis. — *Cetraria sepincola* Ach. — Hoffm. lich. t. 14. f. 1. (v. s.)

f. ulophylla (Ach.) thalli lobis lacero-laciniatis marginibus crispis albido-pulvulentis. — Jacq. coll. 4. t. 18. f. 1. — Ad antiquos truncos in Neustriâ et Armoraciâ (el. Delise et Despréaux). (v. s. D.)

17. *P. GLAUCA* (DC. fl. fr. 2. p. 401.) thallo membranaceo latè expanso glauco nitido subtus fusco-nigrescente lèvi sinuato-lobato lobis ascendentibus inciso-laceris complicatis, apotheciis elevatis spadiceis margine ruguloso. — Ad truncos arborum et saxa. — *Cetraria glauca* & Ach. — Hoffm. en. lich. t. 20. f. 1. — Vaill. bot. t. 21. f. 12. — Dill. musc. t. 25. f. 96. (v. v.)

f. fallax (Ach.) thallo utrinque albo subtus passim nigro-maculato. — *P. fallax* DC. fl. fr. 2. p. 402. — Hoffm. lich. t. 46. f. 1-3. — Mich. gen. pl. 75. f. 37. (v. v.)

IX. RAMALINA Ach. lich. 122. t. 13. f. 5-11; syn. 293. — *Physciæ* sp. DC. — *Parmeliæ* sp. Mey. Spreng.

Receptacula scutelliformia crassiuscula podicillato-subpeltata subtus libera plana marginata, tota a thallo formata ejusque substantiâ corticali concolori obducta. — Thallus cartilagineus ramoso-laciniatus subfruticosus laciniis liberis erectis.

1. *R. FRAXINEA* (Ach. lich. univ. 602.) thallo cartilagineo cespitoso ramoso cinereo-virescente utrinque glabro, ramis planis reticulato-lacunosis laciniato-sinuatis, laciniis ultimis lanceolato-attenuatis, apotheciis marginalibus lateralibusque planiusculis pallido-carneis. — In truncis arborum. — *Physcia fraxinea* Fl. fr. 2. p. 398. — Hoffm. lich. t. 18. f. 12. — Dill. musc. t. 22. f. 59. Variat laciniis longissimis sublinearis subsimplicibus latiusculis dependentibus atque laciniis extrorsum dilatatis amplissimis margine sibiatis. Apothecia demùm maxima. (v. v.)

2. *R. POLYMORENA* (Ach. lich. univ. 600.) thallo cespitoso plano-compresso vel teretiusculo cinereo-pallido laciniato-ramoso longitudinaliter laeunoso, lobis linearibus linear-lanceolatisve apice lateraliterque verrucosis pulvulentis, apotheciis amplis concaviusculis submarginalibus subterminalibusve carneis pruinosis. — In Alpibus Delphinatus (el. DC.), montibus Mimatis (el. Prost), monte Aureo (el. Delise). — *Physcia polymorpha* Fl. fr. 5. p. 190. — Ach. in nov. act. stockb. t. 11. f. 3. — Dill. musc. t. 21. f. 57. (v. v. DC.)

3. *R. POLLINARIA* (Ach. lich. univ. 608.) thallo cartilagineo cespitoso ramoso subcanescente sublacunoso, ramis planis laciniatis multifido-dentatis hinc

614 ACOTYL. SEU CELLULARES.

inde verrucis dilatatis planis pulverulentis obsitis, apotheciis subterminalibus demum dilatatis maximis carneis subtus glaucescentibus margine elevato subinfexo. — Ad rupes et trunco arborum. — *Physcia squarrosa* DC. fl. fr. 2. p. 398. — Vaill. bot. t. 20. f. 15. — Dill. musc. t. 21. f. 55. A. G. H. f. 56. *A.* Variat colore albo et glaucescente, laciinis angustioribus dilatatis atque laceris, staturā humiliori ac proceriori. (v. v.)

4. *R. pusilla* (Dub. mss.) thallo cartilagineo pusillo dense cespitoso simpliciuseculo viridi-lutescente sublaeunoso, ramis fistuloso-canaliculatis extus glabris intus pulverulentis apice saccato-dilatatis, apotheciis terminalibus lateribusque subelevatis disco carneo glaucescente concavo margine elevato integrissimo. — Ad ramulos arborum in insulis Stæchadum (cl. Le Prévost). (v. s.)

5. *R. fastigiata* (Ach. lich. univ. 603.) thallo subcartilagineo cespitoso ramoso albo-glaucō, ramis compressis lacunosis glabris levigatis sursum incrassatis fastigiatis, apotheciis terminalibus peltato-sessilibus albido-carneis margine demum tenuissimo reflexo. — In truncis arborum. — *Physcia fastigiata* DC. fl. fr. 2. p. 398. — eng. bot. t. 890. — Vaill. bot. t. 20. f. 2. (v. v.)

β. exasperata (Delise) thalli ramis compressis valde dilatatis, apotheciis concavis urceolatisve. — Propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

γ. calicaris (Ach.) thallo ramisque elongatis ramulosis cylindraceis attenuatis lacunoso-canaliculatis, apotheciis subtus appendiculatis. — *R. fraxinea calicaris* Delise. — Lich. calicaris auct. non Linn. — Dill. musc. t. 23. f. 62. (v. v.)

6. *R. farinacea* (Ach. lich. 606.) thallo cartilagineo cespitoso ramoso albo-subcinerascente, ramis compressis sublinearibus lacunosis verrucis pulverulentis marginalibus convexis albis obsitis, apotheciis sparsis podicillatis planiusculis subimmarginatis ochroleuco-carneis. — In truncis arbórum. — *Physcia farinacea* DC. fl. fr. 2. p. 397. — eng. bot. t. 889. — Vaill. bot. t. 20. f. 13-15. Variat ramis simplicioribus vel ramosissimis, thallo graciliori brevi vel validiori et longo. Apothecia rarissime occurunt. (v. v. sine apoth.)

7. *R. scopulorum* (Ach. lich. univ. 604.) thallo cartilagineo cespitoso dichotome-ramoso cinerascente-pallido-lacunoso, ramis linearibus compressis elongatis, apotheciis sparsis podicillatis planis concoloribus. — Ad seculos maritimos Neustriae, Armoraciæ, Pictaviæ, Corsicæ (cl. Soleiro). — *Physcia scopulorum* Fl. fr. 5. p. 190. *Lichen calicaris* Linn. eng. bot. t. 688. — Moris. hist. tab. 7. f. 5. — Dill. musc. t. 17. f. 38. Variat thallo lœvi et verruculoso. (v. v.)

β. divaricata (Delise) thallo stricto rigido dichotome-ramoso ramis divaricatis junioribus apice nigris, apotheciis convexis globosive. (v. s. D.)

γ. rigidula (Delise) thalli ramis strictis rigidis compresso-planis subsimplicibus aut apice ramulis 1-2 instructis, apotheciis demum convexus subglobosique. (v. s. D.)

δ. cornuta (Ach.) thalli ramis subteretibus subsimplicibus curvatis nodulosis subfistulosis implexis basi nigricantibus. — *Lichen siliquosus* Huds. — Dill. musc. t. 17. f. 38. (v. s.)

†. *Apothecia aut receptacula thallo fruticuloso aut filamentoso inserta.*

X. *ROCELLA* DC. fl. fr. 2. p. 334. Ach. lich. univ. 81. t. 7. f. 8-9. — *Parmelia* sp. Mey. Spreng.

Receptacula putelliformia crassa thallo innata ab eo formata et marginata, laminâ prolierâ discum efformante plano-convexâ coloratâ cartilagineâ intus hyalinâ similari. — Thallus coriaceo-cartilagineus solidus ramoso-laciiniatus undique subpulverulentus, intus stuppeus.

1. *R. ruciformis* (DC. fl. fr. 2. p. 335.) thallo compresso cespitoso cinereo-albo

dichotomo, laciniis elongatis attenuatis, apothecis marginalibus pruinosis demum glabris atris margine persistente cinctis. — Ad rupes maritimas Gallo-provinciae, Armoraciæ. — eng. bot. t. 728. — Dill. musc. t. 23, f. 61. Apothecia rarissima. (v. s. sine apoth.)

2. R. PHYCOPSIS (Ach. lich. univ. t. 440.) thallo cespitoso teretiusculo albido-cinerascente ramosissimo, ramulis extimis abbreviatis fastigiatis, apotheciis sparsis disco pruinoso piano demum denudato atro margine subirregulari demum evanescente. — Ad rupes maritimas. — Fl. fr. 5. p. 179. — Dill. musc. t. 22, f. 60. (v. v.)

XI. USNEA Ach. lich. univ. 127. t. 14, f. 5. syn. 303. — Usnea sp. Hoffm. DC.

Receptacula scutelliformia orbiculata peltata tota a thallo formata ejusque substantia corticali similari undique obducta, ambitu immarginato plerumque ciliato. — Thallus fruticulosus solidus teretiusculus ramosissimus cortice crustaceo indutus.

1. U. CERATINA (Ach. lich. univ. 619.) thallo prostrato pendulo elongato rigido aspero pallido subcespitoso ramoso, ramis patentibus diffusis fibrillosis fibrillis ramulisque terminalibus plerumque axi inclinatis, apotheciis concavis concoloribus subiùs passim proliferis, radiis in ambitu longis validis curvatis. — Ad rupes in sylvis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), circa Fontainebleau ex cl. Persoon, Beauvais ex Graves, Falaise (cl. de Bréb.), Vire (cl. Delise). Apothecia raro occurunt. Thalli color à cinereo-virescente ad cinnabarinum variat. (v. s. sine apoth.)

β . inflata, thalli ramis inflatis antiquioribus lèvibus junioribus ramulisque nodoso-articulatis scaberrimis. — In sylvis Neustriæ (cl. Delise). — U. inflata Delise. (v. s. D.)

2. U. BARBATA (DC. fl. fr. 2. p. 333.) thallo pendulo ramosissimo pallide virescente lèvigate tereti crassuscule glabro, ramis divergentibus passim fibrillosis apice capillaceis fibrillis ramulisque axi pèpendicularibus, apotheciis sparsis convexis subcarneis margine integris. — Ad arbores vetostas in sylvis Alpium et Pyrenæorum. — eng. bot. t. 258. f. 2. Parmelia articulata Spreng. — Dill. musc. t. 12, f. 6. Apothecia rarissima. (v. v. sine apoth.)

β . rustica (Delise) thallo ramosissimo scaberrimo crasso complicato. — In sylvis provincie occident. (cl. Delise). (v. s. D. sine apoth.)

γ . articulata (Ach.) thallo glabro cinereo, ramis elongatis dichotomo-ramosis articulatis articulis ventricosis discretis. — Ad arbores passim. — Usnea articulata fl. fr. 2, p. 334. — eng. bot. t. 258. f. 1. — Dill. musc. t. 11, f. 4. (v. s.)

3. U. LONGISSIMA (Ach. lich. 628.) thallo pendulo filiformi subpulveraceo scabro tereti-compresso albissimo simplicuscule longissimo fibrilloso fibrillis axi inclinatis approximatis tortuosis simplicibus cinerascentibus. — In sylvis Montis-Aurei (cl. Delise). — Thallus gracilis ramique pauci 2-3-pedales. Apothecia ignota. (v. s. D.)

4. U. PLICATA (Hoffm. germ. 2. p. 132.) thallo pendulo lèvigate albo-pallescente, ramis laxis ramosissimis fibrillosis ultimis capillaceis fibrillisque plerumque axi inclinatis, apotheciis orbiculatis planis concoloribus radiociliatis ciliis tenuissimis longissimis. — In arborum imprimis Abietum ramis. — Fl. fr. 2. p. 333. — Fl. dan. t. 1357. — Dill. musc. t. 11, f. 1. Apothecia rara. (v. v.)

β . comosa (Ach.) thallo erectiusculo subfruticuloso, ramis lateralibus patentissimis approximatis, ultimis scabriusculis, verrucis carneo-pallidis demum fuscis. — Ach. in nov. act. stock. v. 16, t. 8, f. 1. Apothecia rarissima. (v. s.)

γ . hirta (Ach.) thallo erectiusculo subfruticuloso cinereo-lutescente subpulverulento scabriuscule, ramis flexuosis intricatis subsibrillosis. — U.

616 ACOTYL. S^EU CELLULARES.

hirta Hoffm. lich. t. 30. f. 1. — eng. bot. t. 1354. — Dill. musc. t. 13. f. 2. *Apothecia rarissima*, (v. v. sine apotheciis.)

5. *U. FLORIDA* (Hoffm. germ. p. 133.) thallo erecto penduloque scabro cinereo-virescente fibrilloso, ramis patentissimis expansis subsimplicibus, fibrillis ramulisque terminalibus plerumque axi perpendicularibus, apotheciis orbiculatis planiusculis latissimis carneo-pallidis ciliatis ciliis radiantibus elongatis. — In corticibus parietibus et saxis. — Fl. fr. 2. p. 232. excl. var. β . Hoffm. lich. t. 30. f. 2. — eng. bot. t. 872. — Dill. musc. t. 13. f. 13. Color thalli variat à pallide viridi ad rubro-brunneum. (v. v.)

β . *rigida* (Ach.) thallo elongato stricto rigido graciliori subdependentemente aspero, ramis longiusculis flexuosis ramulosis fibrillosis. (v. s.)

γ . *villosa* (Ach.) thallo ramisque diffusis complicatisque brevissime conformatissimèque fibrilloso-villosis. (v. s.)

XII. CORNICULARIA DC. fl. fr. 2. p. 328. — *Alectoria* et *Cornicularia* Ach. — *Parmeliae transformatæ* aut *Parmeliae* sp. Mey. Spreng.

Receptacula scutelliformia membranacea sessilia aut oblique peltata, tota è thallo formata substantiâque ejus corticali intus similari obducta eique subconcolora. — Thallus cartilagineus fruticulosus solidus ramosus filiformis teretiusculus.

Sect. I. *ALECTORIA* Ach. lich. univ. 120. t. 13. f. 1-4; syn. 291.

Receptacula crassa sessilia marginata. — Thallus pendulus vel prostratus.

1. *C. SARMENTOSA* (DC. fl. fr. 5. p. 179.) thallo teretiusculo anguloso dichotome ramoso intus subtubuloso flavido-albicante, ramis sublaevisiosis curvato-implexis, apicibus ramosissimis laxis tenerrimis, apotheciis concaviusculis lividis pruinosis demùm explanatis. — Ad arbores et rüpes Vogesorum, Alpium, Mimatis, Corsieæ propè Bonifacio (cl. Requien). — *Alectoria sarmentosa* Ach. *Usnea dichotoma* Hoffm. lich. t. 72. — Schrad. journ. 1799. t. 3. f. 3. — Dill. musc. t. 11. f. 2-3. *Apothecia raro occurunt*. (v. s.)

2. *C. CRINALIS* (Dub. mss.) thallo subcompresso ramosissimo cinerascente fragillimæ, ramis filiformibus supernè teretiusculis, apotheciis convexis fuscis. — Ad arborum truncos in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), in sylvis Nenstriæ (cl. Delise, Despréaux et de Bréb.). — *Alectoria crinalis* Ach. lich. univ. 594. *Apothecia ratissima*. (v. s. sine apoth.)

3. *C. JUBATA* (DC. fl. fr. 2. p. 332.) thallo tereti nitido ramosissimo decumbente aut pendulo lividi-fusco seu nigrescente, ramis filiformibus flexuosis ad axillas compressis hinc indè verrucoso-pruinosis, apotheciis fuscis planis demùm convexis margine integerrimo. — In arborum imprimis Coniferarum ramis. — *Alectoria jubata* Ach. — eng. bot. t. 1880. Schrad. journ. 1799. t. 3. f. 4. — Dill. musc. t. 12. f. 7. *Apothecia rariora*. (v. v.)

β . *chalybeiformis* (Ach.) thallo ramisque simpliciusculis flexuosis tortuosis complicatis rigidiusculis plumbeo-nigris decumbentibus. — Ad asperes, sepiamenta liquea, arborum truncos et saxa. — Dill. musc. t. 10. f. 13. (v. v.)

γ . *capillaris* (Ach.) thallo ramisque pallide luteo-fuscescentibus, ramulis tenerrimis flexuosis, apotheciis concoloribus.

δ . *lanestris* (Ach.) thallo ramisque prostratis tenerrimis mollissimis implicatis atris opacis. — In Alpibus (cl. Delise). (v. s. sine apoth.)

4. *C. VULPINA* (DC. fl. fr. 2. p. 329.) thallo ramosissimo cartilagineo subscrobiculato flavo-virescente, ramis attenuatis anguloso-compressiusculis lacunosis flexuosis, apotheciis fusco-rufis planis margine integris. — In Alpibus ad truncos et parietes. — *Evernia vulpina* Ach. *Usnea vulpina* Hoffm. — Fl. dan. t. 226. Jacq. misc. 2. t. 10. f. 4. *Apothecia rarissima*. (v. v. sine apoth.)

Sect. 2. CORNICULA. — *Cornicularia Ach. lich. univ. p. 124. t. 14.*
f. 1-2; syn. p. 299.

Receptacula terminalia oblique peltata subdiscolora, ambitu subimmarginato tandem reflexo. — Thallus durus rigidus subfragilis.

5. *C. OCHROLEUCA* (DC. fl. fr. 2. p. 330.) thallo cespitoso teretiusculo glabro suberecto albo-pallescidente ramoso subfibrilloso, ramis divaricatis attenuatis apice furcatis nigricantibus, apotheciis fuscis margine flexuoso ochroleuco. — Ad terram siccam et arborum truncos in Alpibus, Cebennis, Pyrenæis. — Ach. lich. 614. Usnea ochroleuca Hoffm. lich. 2. t. 26. f. 2. et t. 68. f. 5.
6. *7. Apothecia rara.* (v. v.)
6. *C. BICOLOR* (Ach. meth. 304.) thallo cespitoso suberecto scabriusculo tereti cartilagineo atro ramoso subfibrillosoque, ramis breviusculis sparsis patentibus apicibus nutantibus cinereo-fuscescentibus. — Suprà saxa inter muscos Alpium, propè Mimatem (cl. Prost), Vire (cl. Delise), Falaise (cl. de Bréb.). — Fl. fr. 2. p. 330. Ach. lich. 614. — Ach. in nov. act. stock. v. 22. t. 4. f. 6. Apothecia adhucdum ignota. (v. s. sine apoth.)
7. *C. LANATA* (Ach. meth. 304.) thallo cespitoso decumbenti tereti læviusculo dichotomo cinerascenti-nigro, ramis filiformibus implexis flexuosis apice furcatis, apotheciis submarginatis planis ambitu nudo granulatoque. — In saxis et locis sterilibus montium. — Fl. fr. 2. p. 331. Ach. syn. 302. — Lich. lanatus eng. bot. t. 846. L. pubescens auct. Jacq. misc. 2. t. 9. f. 7. — Dill. musc. t. 13. f. 9. Hanc ut transformationem Parmeliæ stygiæ habet cl. Meyer. (v. v.)
 - ε. alpicola* (Ach.) ramis implexis dichotomo-reticulatis nodulosis nigris. In Alpibus. — Jacq. coll. 2. t. 9. f. 6. 7.
8. *C. ACULEATA* (Ach. meth. 302.) thallo cespitoso rigido glabro fusco-castaneo teretiusculo anguloso lacunoso-compresso, ramis ramulisque divaricatis flexuosis apice dentato-spinulosis, apotheciis concoloribus demum convexis margine subdentato reflexo. — In ericetis. — Fl. fr. 2. p. 329. Ach. syn. 299. — Vaill. bot. t. 26. f. 8. — Mich. gen. t. 39. f. 7. Transformatio Physciæ Islandicæ ex Mey. nebenst. 232. (v. v.)
 - β. spadicea* (Ach.) thallo glabro spadiceo plano-compresso, apotheciis spinoso-radiatis rufo-fuscis. — Hoffm. lich. t. 5. f. 2. — eng. bot. t. 452. (v. v.)
 - γ. edentula* (Ach.) thallo plano-compresso dilute spadiceo ramisque margine nudis inermibus vel subfibrillosis apice digitato-fimbriatis. — Propè Parisios ex Ach.
9. *C. TRISTIS* (Hoffm. lich. t. 34. f. 1.) thallo cespitoso rigido tereti-compresso piceo læviusculo dichotomo, ramis ascendentibus fastigiatis superne nigricantibus, apotheciis planis convexisque fusco-atris submarginatis integerrimis dentatisque. — Ad rupes Alpium et Pyrenæorum. — Fl. fr. 2. p. 329. — eng. bot. t. 720. — Jacq. coll. 2. t. 13. f. 5. et 3. t. 12. f. 3. Variat apotheciis in ambitu radiato-dentatis atque ramulis tuberculato-denticulatis. (v. v.)
10. *C. PUBESCENS* (Ach. meth. lich. 305.) thallo cespitoso decumbente tereti scabriusculo atro, ramis implexis capillaceis rugoso-subannulatis ultimis simplicibus, apotheciis subdilatioribus margine integerrimo. — Ad rupes madi das imò inundatas Pyrenæorum, Mimatis, propè Angers (cl. Guépin), Falaise (cl. de Bréb.). — *C. intricata* Fl. fr. 2. p. 331. *Lichen pubescens* L. — Jacq. misc. 2. t. 10. f. 5. *Conservæ atro-virens* Dillw. conf. t. 25. *Bangia atro-virens* Lyngb. *Zigonema atro-virens* Ag. Spreng. — In specimine à cl. Prost missò apprimè scutellæ apparent nec illo modo cum Sphaeriæ confundi possunt. Apothecia rarissima. (v. s.)
11. *C. MUSCICOLA* (DC. fl. fr. 2. p. 331.) thallo cespitoso aut pulvinato atro-fuscescente subgelatinoso sicco nigro, ramis teretibus erectiusculis flexuosis nodulosis subfastigiatis obtusis apice plerumque bifidis, apotheciis subterminalibus planiusculis branneis marginatis. — Ad terram inter muscos Pyre-

618 ACOTYL. SEU CELLULARES.

næorum, Mimatis (cl. Prost), Parisiorum ex Cheval., Bellovaci ex Graves.
— Collema muscicola Ach. Coll. fruticulosum Cheval. — Dicks. crypt. 2. t. 6.
f. 9. — Schrad. journ. 1799. 1. t. 2. f. 8. Apothecia rarissima. (v. s. sine
apoth.)

XIII. SPHÆROPHORUS Pers. in Ust. ann. bot. 7. p. 23. DC. fl. fr. 2. p. 327.
Ach. lich. univ. 116. t. 12. f. 5 et 6.

Receptacula subglobosa sessilia terminalia tota extus a thallo formata,
massam pulveraceam nigram globosam includentia, demum irregulari-
ter rumpentia concava vacua. — Thallus crustaceo-cartilagineus fruti-
culosus solidiusculus ramosus teretiusculus.

1. S. FRAGILIS (Pers. in Ust. ann. bot. 7. p. 23.) thallo densissime cespitoso
cylindrico cinereo-fusco dichotomo-ramoso, ramis abbreviatis obtusiusculis
fragilibus fastigiatis, apotheciis sphæricis magnis subverrucosis. — Ad ter-
ram in montosis. — Ach. meth. t. 3. f. 5. eng. bot. t. 2474. S. cespitosus DC.
fl. fr. 2. p. 327. Lichen fragilis Linn. lapp. II. t. 11. f. 4. (v. v.)
2. S. GLOBIFERUS (DC. fl. fr. 2. p. 327.) thallo cespitoso cylindrico cinereo-fusco
lævi ramoso, ramis lateralibus elongatis laxis divaricatis furcatis acuminatis
fibrillosis, apotheciis globosis lævibus. — Ad terram in præruptis et ad can-
dices Pini. — S. coralloides Pers. Ach. Corallinoides globiferum Hoffm. lich.
6. t. 31. f. 2. Lich. globiferus Linn. eng. bot. t. 115. (v. v.)
3. S. COMPRESSUS (Ach. lich. 586.) thallo cespitoso albicante ramoso, ramis
lateralibus elongatis laxis divaricatis subfibrillosis nudis apice ramulisque
compressis, apotheciis subglobosis lævibus supra depresso. — Ad terram in
Alpibus, in Neustriâ. — Fl. fr. 5. p. 178. Ach. syn. 287. Lich. fragilis Linn. sp.
non lapp. eng. bot. t. 114. Jacq. misc. t. 9. f. 6.b. — Dill. musc. t. 17. f. 34. (v. s.)

XIV. STEREOCAULON Schr. gen. DC. fl. fr. 2. p. 328. Ach. lich. univ. 113.
t. 12. f. 3, 4; syn. 284.

Receptacula hemispherica sessilia solida subtus a thallo formata; la-
mina proligera crassa discum primo constituens margine thalode cincta
et concaviuscula tandem convexa dilatata marginemque obtegens re-
flexa colorata. — Thallus crustaceo-cartilagineus sublignosus solidus ra-
mosus teretiusculus granulatus squamulosus fibrillosusque.

1. S. PASCHALE (Ach. meth. 315.) thallo erecto diffuso ramoso cinereo-caesio fibril-
losa granulosa, ramis ramosissimis confertis glabris ramulis brevibus, apothe-
ciis sparsis terminalibusque numerosissimis demum convexis conglomeratis
fusco-rubris aut nigro-fuscis. — In collibus apricis et supra saxa. — Fl. fr. 2.
p. 328. — eng. bot. t. 282. — Dill. musc. t. 17. f. 33. (v. v.)
2. tomentosum, thalli ramis densis mè tomentosis undique granulatis. —
In sylvis abietinis Mimatis (cl. Prost). — S. tomentosum Fries lich.
exs. n. 90.
3. S. INCRUSTATUM (Flörke ex Spreng. syst. veg. 4. p. 275.) thallo erecto ra-
moso, tomento spongioso denso albo incarnato thallum incrustante granu-
laque globosa incana promente, apotheciis conglomeratis nigro-fuscis. — Ad
terram Galliae ex cl. Delise.
3. S. DACTYLOPHYLUM (Flörke ex Spreng. syst. veg. 4. p. 275.) thallo decum-
bente ramosissimo intricato glabro pallido basi nudo, supra granulis in squa-
mas digitatas cinereo-vires abeuntibus vestito, apotheciis terminalibus ra-
rioribus dilatatis plano-convexis nigro-fuscis. — In Neustriâ circa Vire (cl.
Delise et Despréaux). (v. s. D.)
2. conglomeratum (Delise) granulis conglomeratis ad apicem ramulorum in
pulvinulos densos digestis. — Prope Vire (cl. Delise). — S. paschale &
conglomeratum Fries exs. n. 89. (v. s. D.)

4. *S. POTAYOSUM* (Ach. lich. univ. 581.) thallo erecto albo-flavescente basi subnudo superne densissimè ramoso, ramis ultimis in granula conglomerata abeuntibus et massam densissimè contextam efficientibus, apotheciis minutis congestis obscurè fuscis. — Ad terram in Alpibus Delphin., Galloprov. — Fl. fr. 5. p. 178. Præcedente subduplò humilius. Apothecia non frequentia. (v. s.)
5. *S. DENUDATUM* (Flörke ex Spreng. syst. veg. 4. p. 275.) thallo decumbente cespitoso ramoso glabrinculo pallido basi subnudo, supra granulis subfoliaceis crenulatis albo-marginatis vestito, superne subdenudato, apotheciis lateralibus planiusculis dilute-fuscis. — In Neustriæ (cl. Le Prévost). (v. s. sine apoth.)
6. *S. DELISEI* (Bory ex Delise in litt.) thallo laxè cespitoso erecto basi simplici pallido glabro nudo apice ramoso ramis fastigiatis basi nudis apice granulis cinereo-virescentibus albo-farinosis conglomeratis onustis. — Ad saxa Neustriæ propè Vire (cl. Delise et Despréaux). (v. s. sine apothecis.)
7. *S. PILEATUM* (Ach. lich. 582.) thallo densè cespitoso erecto albido simplici subdivisoque parcè granulato, apothecis solitariis terminalibus dilatatis subpeltatis subsfuscis. — In Armoraciæ (cl. Persoon), propè Fougères (cl. Le Prév.), Vire (cl. Delise), ad saxa Vogesorum (cl. Mougeot). — Præcedenti minus. (v. s.)
8. *S. CONDYLOIDUM* (Ach. meth. lich. supp. 51.) thallo albicante densè cespitoso subnudo, ramis brevibus difformibus noduloso-sublobatis granulatis, apotheciis lateralibus dilatatis planis adpresso-subsessilibus rufo-fuscis. — Ad terram propè Cherbourg (cl. Le Prévost), Fontainebleau ex Chevall. — St. condensatum Hoffm. (v. s. sine apoth.)
9. *S. CEREOLINUM* (Ach. meth. t. 7. f. 1.) thallo cinereo simplicissimo cylindraceo scabriusculo pulverulento, apotheciis terminalibus solitariis minutis demum convexis elongatisque fusco-atris. — Ad saxa rupium in Galliæ ex cl. Delise.
10. *S. NANUM* (Ach. meth. 315.) thallo densè cespitoso albo-cinerascente gracilimo filiformi ramoso, ramis subfastigiatis floccoso-pulverulentis, apotheciis lateralibus confertis convexis atro-fuscis. — Ad terram in rupibus Neustriæ, propè Turones, Mimatem (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 178. *S. quisquiliare* Hoffm. — Mich. gen. t. 53. f. 8. Apothecia rarissima. Status nanns sterilis et ramosior Cenomyces delicata secundum Meyer nebenst. 233. (v. s. sine apoth.)

XV. SIPHULA Fries syst. orb. veg. 1. p. 238. — Dufourea Ach. lich. univ. p. 103.
t. 11. f. 2. non Bory St.-Vincent. — Cladonia sp. DC.

Apothecia disciformia disco aperto æquabili apicibus thalli subinflatæ innato plano-convexo colorato intus similari, margine thallode obliterato. — Thallus membranaceus teretiusculus liber ramosus intus stuppeus subfistulosus.

1. *S. MADREPORIFORMIS* (Fries l. c.) erecta straminea cespitosa e basi breviter dichotomo-ramosa, ramis brevibus turgidis fastigiatis. — In summis Alpibus. — Duf. madreporiformis Ach. l. c. Cladonia madreporiformis. DC. fl. fr. 5. p. 180. — Apothecia ignota. (v. s. ex Helv.)

XVI. CENOMYCE Ach. lichen. univ. p. 105. t. 11. f. 3-6; syn. 248. (1) — Cladonia Hoffm. Schærer, Fries. (2) Cladonia, Scyphophorus et Helopodium DC. fl. fr. 2. p. 335, 337 et 341.

Apothecia orbiculata immarginata demum convexa capituliformia

(1) Hanc hujus præ aliis difficultis generis monographiam debo amicitiae clarissimi Delise.

(2) Cum ill. Delise nomen Cenomyce in sua monographia adhibuerit, hoc in articulo toto ex ejus manuscripto excerpto servandum fluxi, sed monentibus clar. viris De Candolle, Schærer, Fries, nomen Cladonia antiquius et adaptius preferendum existimo.

620 ACOTYL. SEU CELLULARES. CENOMYCE.

terminalia ambitū thallo vel podetii affixa; lamina proligera apothecium supra efformans crassiuscula colorata intus similaris convexa in ambitu reflexa et affixa subtus tegmine flocculoso thalli vestita. — Thallus crustaceus cartilagineo-foliaceus aut subnullus, podetia subfistulosa fertilia steriliaque proferens.

I. VERMICULARES Delise mss.

Thallus nullus; podetia subuliformia flexuosa subfistulosa.

1. *C. VERMICULARIS* (Ach. lich. 566; syn. 278.) thallo nullo, podetii subuliformibus subsimplicibus lœvibus albissimis subfistulosis flexuosis prostratis. — Ad terram inter muscos in locis graminosis. — *Cladonia vermicularis* DC. fl. fr. 2. p. 335. *Clad. subuliformis* Hoffm. lich. t. 29. f. 1-3. *Lichen vermicularis* Linn. Dicks. cr. 2. t. 6. f. 10. *Pycnothelia vermicularis* Leon Daf. revis. — Apothecia ignota.
2. *Taurica* (Ach.) podetii erectiusculis crassis ventricosis ramosis, ramis lateralibus brevibus subulatis. — *Clad. taurica* Hoffm. lich. t. 34. f. 2. *Lichen tauriens* Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 12. f. 2. — Podetia 1-2 poll. longa interdum apice obtusa.

II. RETIPORÆ Delise mss.

Thallus subcrustaceus uniformis; podetia ventricosa.

3. *C. PAPILLARIA* (Ach. lich. 571; syn. 248.) thallo suberustaceo uniformi granulato cinereo-albido, podetii ventricosis glabris albis simplicibus ramulosisque, ramis confluentibus subfastigiatis, apotheciis rufo-fuscis. — Suprà terram limosam et macram. — *Cladonia papillaria* Hoffm. DC. fl. fr. 5. p. 180. *Cl. molariformis* Hoffm. — Dill. hist. musc. t. 16. f. 28. — Podetia 2-10 lin. alta.

III. UNCIALES Delise mss.

Thallus nullus; podetia elongata dichotoma; apothecia terminalia.

4. *C. UNCIALIS* (Ach. lich. 558; syn. 276.) thallo nullo, podetii elongatis glabris pallide-sulfureis dichotomis, axillis perforatis apertis, ramorum apicibus patentibus brevibus rigidis, apotheciis terminalibus fuscis. — Ad terram in campis et montibus. — Flörke deut. lich. n. 155. *Cladonia cerasoides* & DC. fl. fr. p. 337. — Dill. musc. t. 16. f. 22. A. B. C. E. F. — Podetia 1-2-dichotoma, 6 lin. — 2 poll. alta.
5. *obtusata* (Aeh. lich. 559.) podetii aggregatis brevibus turgidulis ramulosis, ramulis brevissimis apice subincrassatis obtusis denticulatis denticulis nigris. — Ad terram in montibus. — *Cen. oxyceras* & *obtusata* Ach. syn. 265. — Circiter pollicem alta.
6. *corymbifera* (Delise mss.) podetii longiusculis fastigiatis gracilibus ramosis sursùm incrassatis, apicibus multipartitis radiato-denticulatis denticulis divergentibus nigris, apotheciis minutis. — Ad terram in sterilibus. — Pollices 1-2 alta.
7. *pseudo-parecha* (Delise mss.) podetii turgidis incrassatis elongatis fastigiatis ramosis ramis truncatis subclausis, sterilibus denticulato-stellatis, fertilibus digitato-ramosis apertis, apotheciis conglomeratis. — Ad terram in sterilibus montosis. — Poll. circiter 2 alta.
8. *aculeata* (Delise mss.) podetii rectiusculis vel recurvis acutis ramulosis, ramulis lateralibus brevibus spinulosis rectangulis. — Ad terram limosam in sterilibus.
9. *leprosa* (Delise mss.) podetii rigidiusculis cespitosis leprâ verruciformi adspersis. — Ad terram in sylvaticis humidis.
10. *turgescens* (Delise mss.) podetii crassis longissimis obtusis parcè ramosis, apicibus spinulosis 2-3-partitis, axillis vix apertis. — In sterilibus montosis. — Poll. 2-4 alta.
11. *cetrariooides* (Delise mss.) podetii elongatis ramosis superne incrassatis

- clavatis obtusis, apotheciis conglomeralis.* — In montibus excelsis. — Cen. *oxyceras* c *cetrariooides* Ach. syn. 264.
cladoniooides. (Delise mss.) podetii erectis longissimis gracilibus stramineo-albidis subdichotomo-ramosis glabris inermibus spinulosisque apicibus subfuscis. — In montosis humidis.
x. dicraea (Ach. lich. 559.) podetii longiusculis gracilibus aggregatis erectis strictis superne ramosis, ramis brevibus fastigiatis furcatis apicibus acutis nigricantibus sterilibus. — C. *oxyceras* d *dicraea* Ach. syn. 265.
x. oxyceras (Delise mss.) podetii elongatis cylindricis curvato-decumbentibus acutis vel scyphiferis, proliferationibus ramosis subulatis apicibus fusco-nigris, scyphis angustis obliquis margine dentato-radiatis prolife risque, apothecis minutis fuscis. — Ad terram in montibus. — Cen. *oxyceras* Ach. syn. 264. *Capitularia amaurocraea* Flörke.

iv. *RANGIFERINÆ* Delise mss.

Thallus nullus aut rarius foliacens; podetia elongato-ramosa; apothecia subglobosa aggregata fusca aut subfusca.

4. *C. SYLVATICA* (Flörke deutsch. lich. 76.) thallo nullo, podetii elongatis cylindricis erectis scabriusculis albissimis ramosis, axillis vix perforatis, ramis sparsis terminalibus suberectis fastigiatis, apotheciis subglobosis subfuscis. — Ad terram in locis aridis et muscosis. — *C. rangiferina* & *sylvatica* Ach. lich. 564. — Dill. musc. t. 16. f. 30. B.
β. alpestris (Flörke) podetii albis mollinusculis ramosissimis ramis ramulique implexis, terminalibus thyrsum densum formantibus. — In montibus alpestribus. — *C. rangifer.* γ *alpestris* Ach. lich. 564. — Dill. musc. t. 16. f. 29. E. F.
γ. laxiuscula (Delise) podetii elongatis erectis ramosis laxiusculis albis, ramis minutis, ramulis extremis ramosis dichotomis obscuris, fertilibus rectis, apotheciis exiguis subfuscis. — Ad terram in locis umbrosis aridis.
δ. lacerata (Delise) podetii elongatis incrassatis ramosis, axillis perforatis laceratis, ramulis brevissimis. — In locis humidis umbrosis.
ε. morbida (Delise) podetii elongatis distortis ramosis leprâ glabrâ conglomeratâ adspersis, ramis terminalibus minutis denticulatis dichotomis. — In sterilibus montosis.
ζ. portentosa (Delise) podetii cespitoso-diffusis crassissimis albidis difforibus turgidis compresso-lacunosis lacerisque ramosis, ramis brevissimis fastigiatis, apotheciis minutis fuscis corymbosis subglobosis. — In collibus apricis. — Cen. *portentosa* Duf. revis. p. 29.
η. pumila (Delise) podetii erectis albis tenerrimis ramosissimis cespitem pulvinatum formantibus, axillis imperforatis, ramis implexis apice curvatis substerilibus. — In locis aridis siccis. — *C. rangiferina* ε. *pumila* Ach. syn. 278.
5. *C. RANGIFERINA* (Ach. lich. 564.) thallo nullo, podetii elongatis cylindricis erectis scabriusculis cinerascentibus ramosis, axillis subinde perforatis, ramis inferioribus distantibus subflexis terminalibus confertioribus suberectis fastigiatis apicibus nutantibus, fertilium apotheciis terminalibus subglobosis aggregatis fuscis. — In sterilibus ericetis montosisque. — *Cladonia rangiferina* Hoffm. DC. fl. fr. 2. p. 336. *Lichen rangiferians* Linn. eng. bot. t. 173. — Dill. musc. t. 16. f. 29. A. B.
β. cymosa (Ach.) podetii erectis cinereo-albis, ramis sparsis subalternis brevibus, apicibus radiato-ramosis radiis subinflatilis cymosis fertilibus, apotheciis subglobosis capitatis fusco-nigris. — In sterilibus alpestribus.
γ. tenuior (Delise) podetii erectis divaricatis cinereo-albis, ramis implexis tenuibus, apicibus farcellato-radiatis nutantibus, apotheciis subaggregatis terminalibus brunneis. — In sterilibus saxosis.
6. *C. PUNGENS* (Delise mss.) podetii cinereo-albis dichotomo-ramosis rigi-

622 ACOTYL. SEU CELLULARES. CENOMYCE.

diansculis cespitem pulvinatum formantibus, axiliis imperforatis, ramulorum apicibus mucronatis divergentibus fuscescētibus, apotheciis terminalibus.

— Ad terram, vetustos muros præcipue calcareos etc. — *C. rangiferina* ♂
puugens Ach. syn. 278. *Cladonia raugiformis* Hoffm.

β. foliosa (Delise) podetiis cinereo-virescentibus dichotomo-ramosis foliolis squamosis adspersis cespitem pulvinatum formantibus, ramis intricatis, apicibus mucronatis divergentibus. — Ad muros vetustos.

γ. nivea (Delise) podetiis tenuibus laeviusculis nudis albescētibus fruticoso-ramosissimis, ramis ultimis furcato-dichotomis divergentibus, fertilibus digitato-radiatis, apotheciis capitatis obscurè fuscis. — Ad terram et muros. — *C. gonorega* I *nivea* Ach. syn. 260.

δ. reptans (Delise) podetiis cinereis dichotomo-ramosis foliolis squamosis adspersis, ramis brevibus intricatis reptantibus, apicibus furcato-dichotomis, apotheciis terminalibus grossis brunneis. — Ad terram in sterilibus aquosis.

7. *C. MURICATA* (Delise mss.) podetiis cinereo-albis implexis rigidis turgidulis suberectis dichotomo-ramosis, ramis obtusis stellatis inferne squamosis superne glabris nudis, axillis imperforatis, apotheciis brunneis. — Ad terram calcariam.

β. lepidota (Delise) podetiis cinereo-glaucēcentibus rigidis rectis squamosis dichotomo-ramosis, ramis turgidulis apicibus furcatis, axillis imperforatis. — Ad terram in sylvis Alpinis.

γ. polypaea (Delise) podetiis cinereo-fuscescentibus rectis dense intricatis irregulariter ramoso-dichotomis repetito-proliferis, ramis digitatis obtusis vix stellatis apicibus subfuscis. — Ad terram in montosis. — *C. gonorega* h *polypaea* Ach. syn. 260. *C. flabellulum* L. Duf. revis. n. 27. — Nullum adest scyphi vestigium.

8. *C. TORTUOSA* (Delise mss.) podetiis glauco-subfuscis erectis turgidis ramoso-divaricatis intricatis, ramis brevibus obtusis vel stellatis axillis perforato-laceratis, apotheciis terminalibus brunneo-fuscis. — Ad terram in rupibus.

9. *C. TURGIDA* (Fries lich. exs. n. 147.) thallo foliaceo majusculo, lacinia elongatis angustis pinnatifidis crenulatis, podetiis levigatis pallide virescentibus obconicis, scyphis vix perspicuis perviis margine proliferis digitato-dentatis, proliferationibus ramosis turgescētibus à scyphis apicibus denticulatis, apotheciis fuscis. — Ad terram in locis apricis sterilimis supra montes, raro. — *C. parecha* Ach. syn. 272. *Lich. parechus* Ach. in nov. act. holm. 22. t. 4. f. 2. *L. turgidus* Ehr. cr. exs. n. 297.

v. *FURCATAE* Delise mss.,

Thallus nullus aut subnullus; podetia elongata dichotoma ramis apice furcatis, apothecia aggregata globosa fusca.

10. *C. FURCATA* (Ach. syn. 276.) podetiis elongatis levibus lividis glauco-virescentibus ramosis dichotomis, axillis imperforatis, ramis acicularibus suberectis apicibus furcatis divergentibus, fertilium apotheciis globosis fuscis. — Ad terram in ericetis sylvaticis. — *Cladonia furcata* Hoffm. *C. subulata* DC. fl. fr. 2. p. 336. — Dill. musc. t. 16. f. 27. B. C.

β. spinulosa (Delise) podetiis elongatis ramosissimis, ramis numerosis intricatis acicularibus patentissimis curvatis spinulosis, apicibus furcatis subdivergentibus, apotheciis globosis subfuscis. — In saxosis. — Dill. musc. t. 16. f. 25.

γ. spadicea (Delise) thallo minuto squamuoso rotundato crenulato glaucescente subtus albicante, podetiis rectis fastigiatis subulatis furcatis spadiceis, apotheciis minutis subfuscis. — In ericetis. — *C. spadicea* L. Duf. revis. *C. furcata spadicea* Ach. lich. 560. — Dill. musc. t. 16. f. 27. A.

δ. hamata (Delise) podetiis crassiusculis ramoso-implexis subfuscis vel virescenti-fuscescentibus nudis passim foliolosis, apicibus rigidis subulatis

- incurvo-hamatis dichotomis, apothecis terminalibus conglomeratis brunneis. — In sterilibus saxosis circa Fontainebleau, Agen, Vire, etc.
 — C. hamata et C. chlorotica L. Duf. rev.
4. *abortiva* (Delise) podetiis cespitosis erectis glabris nudis rigidis albican-tibus vix ramosis, ramis brevibus subulatis terminalibus subfuscis cur-vatis abortivis, apotheciis subadnatis pallidis leprosis. — In sterilibus saxosis circa Vire.
- ζ. *fastuosa* (Delise) podetiis cespitosis erectis longissimis glabris virescen-tibus foliolis minutis adspersis apicibus dichotomis subulatis recurvis, ramis longiusculis intricatis, apotheciis terminalibus minutis subfuscis. — In saxosis Armoraciæ et Neustriæ. — Dill. musc. t. 16 f. 26. A. B. C?
- η. *squamulosa* (Delise) podetiis elongatis ramosissimis glauco-virescentibus squamiferis, ramis numerosis dichotomis acicularris, apicibus furcatis divaricatis attenuatis, apotheciis terminalibus. — In saxosis Neustriæ. — Dill. musc. t. 16. f. 27. D.
- θ. *subulata* (Delise) podetiis dense cespitosis erectis nudis filiformibus ramoso-intricatis albicanibus vel glauco-virescentibus, apicibus furcatis recurvis dichotomis, apotheciis rarissimis terminalibus. — Ad terram in ericetis circa Vire.
11. C. SCABRIUSCULA (Delise mss.) podetiis cespitosis erectis scabridis turgidis pulvlerulento-foliosis ramosis apicibus furcatis recurvis, ramis subalternis intricato-divaricatis, apotheciis terminalibus grossis irregulariter globosis subfuscis. — In saxosis et ericetis. — Dill. musc. t. 16. f. 27. E. C. furcata epermna Ach. lich. 561?
- β. *recurva* (Delise) podetiis cespitosis divaricatis subturgidis pulvlerulento-squamiferis ramosis, apicibus furcato-recurvis, ramis subalternis intri-catis divaricatis, apotheciis terminalibus. — C. furcata recurva Ach. lich. 561.
- γ. *repens* (Delise) podetiis cespitosis patulis repentibus squamifero-scabridis ramosis, ramis divaricatis, apicibus furcatis. — In saxis et humidis.
- δ. *dumosa* (Delise) podetiis erectis cylindricis ramosis pulvlerulento-scabrosis griseo-virescentibus, ramis intricatis furcato-spinalosis, apicibus digitato-fastigiatis, apotheciis terminalibus minutis brunneis. — In saxosis.
12. C. RACEMOSA (Ach. syn. 275.) podetiis rectis elongatis glabris lœvibus albo-virescentibus tandem inflatis curvatis ramosis, ramis laxis subsecundis, apicibus divergentibus spinulosis, apotheciis terminalibus aggregatis pallide-fuscis. — Ad terram et truncos arborum. — Cladonia subulata ζ DC. fl. fr. 2. p. 336.
- β. *microcarpa* (Delise) podetiis elongatis tortuosis lœvibus albo-virescen-tibus tandem inflatis curvatis ramosis, ramis divergentibus, apicibus recurvis furcatis, apotheciis terminalibus aggregatis minutis brunneis.
- γ. *rangifera* (Delise) podetiis tenuibus longissimis rectis ramosissimis glabris nudis albescentibus, apicibus furcatis, ramis laxis sparsis intri-catis, apotheciis axillaris terminalibus subtus subrotundatis pallidis vel subfuscis. — In ericetis.
- δ. *humilis* (Delise) podetiis rectis cespitosis inflatis ramosis nudis vel squa-miferis albo-virescentibus, apicibus attenuatis, ramis subdichotomis fur-cato-stellatis, squamis axillaris virescentibus subtus albicanibus, apotheciis terminalibus pallidis brunneisque minutis aggregatis subabor-tivis. — Ad terram.
- ε. *macropoda* (Delise) podetiis longissimis nudis inflatis ramosis albescen-tibus, ramis subdichotomis apicibus furcatis, apotheciis terminalibus. — Ad terram propè Caen. — Poll. 6 alta.
- ζ. *foliolosa* (Delise) podetiis cespitosis longissimis squamiferis ramosis virescentibus, ramis subdichotomis apicibus sterilibus furcatis fertilibus subcorymbosis, apotheciis minutis aggregatis brunneo-pallidis. — Ad terram in Alpibus, montibus Arvernæ, Pyrenæis.
- η. *allotropa* (Delise) podetiis erectis cespitosis inflatis nudis albido-vires-

624 ACOTYL. SEU CELLULARES. CENOMYCE.

centibus, ramis subdichotomis subtruncatis vix fureato-stellatis, apothecis minutis terminalibus. — Ad terram in montibus.

NI. GRACILES Delise mss.

Thallus nullus; podetia elongata simplicissima scyphifera, apothecia fusca in radiis scyphorum sita.

13. *C. gracilis* (Delise mss.) podetii elongatis subulatis simplicissimis sterilibus scyphiferisque lœvibus livido-fuscescentibus, scyphis cyathiformibus margine inæqualiter denticulatis proliferisque, apothecis in radiis scyphorum fuscis. — Ad terram in sterilibus. — *C. ecmocyna* Ach. syn. 261. *Cladonia gracilis* Hoffm. germ. p. 119. *Lichen gracilis* Linn. eng. bot. t. 1284. Dill. musc. t. 14. f. 13. C D.

β. filiformis (Flörke) podetii longis filiformibus simplicibus vel ramosis subulatis scyphiferisque, scyphis angustis margine subdenticulatis, apothecis minutis sessilibus podicillatisque.

γ. hybrida (Ach. syn. 262?) podetii elongatis cylindricis pallidè fuscoque virescentibus nudis scyphiferis ant rariū subulatis, scyphis dilatatis regularibus vel laceris margine dentatis radiatis proliferis, apothecis sessilibus podicillatisque fuscis.

δ. floripara (Ach.) podetii elongatis cylindricis pallidè virescentibus nudis scyphiferis rariū subulatis, scyphis dilatatis regularibus margine dentatis radiatis proliferis, proliferationibus multiplicatis, apothecis sessilibus podicillatisque fuscis.

ε. conglomerata (Delise) podetii elongatis teretiisculis conglomeratis sursum incrassatis glabris pallidis fuscoque virescentibus ramosis subniformibus scyphiferisque, scyphis dilatatis irregularibus margine radiatis proliferis, apothecis sessilibus vel subpodicillatis.

ζ. elongata (Ach.) podetii longissimis cylindricis subsimplicibus albo-pallidis cinerascentibus vel fuscis subulatis scyphiferisque, scyphis obsoletis denticulatis margine proliferis vel subulatis, apothecis subpodicillatis demum magnis. — *Cladonia elongata* Hoffm. *Lichen elongatus* Jacq. musc. 2. t. 11.

η. macroceras (Ach.) podetii longissimis cylindricis crassis apice attenuatis vel scyphiferis glabris pallidè flavo-virescentibus fuscisque, scyphis irregularibus dilatatis denticulatis vel proliferis, apothecis subpodicillatis magnis. — Ad terram in Alpibus, monte Auro, Pyrenæis.

θ. valida (Ach.) podetii elongatis longissimisque validis supernè incrassatis nudis pallidè flavo-virescentibus scyphiferis, scyphis magnis margine denticulato fertili proliferis, apothecis subpodicillatis solitariis aggregatis conglomeratisque.

ι. exoncera (Ach.) podetii longis tereti-ventricosis nudis vel squamiferis simplicibus ramosisque rectis vel distortis attenuatis truncatis scyphiformibus glabris virescentibus fuscescentibus cinereisque, scyphis obsoletis lacero-subradiatis substerilibus. — Ad terram in montibus alpinis.

κ. pilifera (Delise) podetii longissimis cylindricis nudis subsimplicibus rectis scyphiferis glabris albo-virescentibus maculatis, scyphis plusminus dilatatis proliferis radiato-piliferis, apothecis solitariis magnis brunneo-pallidis. — Ad terram in sterilibus circa Vire.

λ. abortiva (Schær spic. p. 33. exs. p. 69.) podetii longiusculis filiformibus subulatis obtusis vel scyphiferis nudis glabris virescenti-subfuscis, summitatibus recurvis abortivis, scyphis subdilatatis proliferis, apothecis conglomeratis. — Cum priori et in Alpibus.

μ. leucochlora (Ach.) podetii elongatis cylindricis subramosis lœvibus albido-virescentibus subulatis scyphiferisque, scyphis irregularibus laceratis proliferis, sterilibus paucis radiatis, apothecis podicillatis magnis subsolitariis brunneo-pallidis. — In sterilibus umbrosis circa Vire.

ν. lateriflora (Delise) podetii longiusculis cylindricis ramosis obtusis obscure scyphiferis albo-viridi-pallescensibus, scyphis laceratis proliferis,

apotheciis podicillatis minutis axillaribus brunneo-pallidis. — Cum priore.

ξ . *aspera* (Flörke) podetiis elongatis gracilibus ramosis subulatis scyphiferisque squamuoso-foliosis cinereo-viridibus, scyphis minutis denticulatis, apotheciis subpodicillatis fuscis. — In aridis.

σ . *cetrariæformis* (Delise) podetiis subelongatis ventricosis sursum incrassatis, omnibus scyphiferis ramosisque virescenti-pallidis, summitatibus brunneis, scyphis irregulariter dilatatis radiatis proliferis, apotheciis podicillatis minutis conglomeratis fuscis. — In sterilibus circa Vire.

π . *trachyna* (Delise) podetiis cylindricis nudis virescenti-subfuscis ramosis attenuatis vel scyphiferis, scyphis obscuris radiatis denticulatis proliferis proliferationibus subdichotomis, apotheciis minutis obscure fuscis. — In campis sylvaticis et aridis. — *C. gonorega* d. *trachyna* Ach. syn. 259.

ρ . *corymbosa* (Ach. syn. 263.) podetiis longiusculis rigidis glabris viridi-fuscescentibus proliferatione scyphorum regularium deinceps evanescens ramosis, ramis fastigiatis apice digitato-radiosis radiis divergentibus, apotheciis capitatis minutis dilute fuscis.

σ . *virgata* (Delise) podetiis elongatis virgatis gracilibus ramosis læviusculis cinereo-fuscescentibus scyphorum proliferatione repetita ramosissimis ramis filiformibus fasciculatim virgatis, apotheciis terminalibus minutis obscure fuscis. — *C. gonorega* k. *virgata* Ach. syn. 260.

τ . *setiformis* (Delise) podetiis longiusculis virgatis gracillimus ramosis glabris albido-cinerascentibus scyphorum proliferatione repetito-ramosissimis, ramis rigidis subcapillaceis fasciculatis, apicibus attenuatis radiospinosis fuscis, apotheciis minutissimis subfuscis. — Ad terram in sterilibus saxosis circa Vire.

VII. SQUAMOSÆ Delise mss.

Podetia plus minus elongata scyphifera squamis foliaceis aut thallo minuto foliaceo squamuoso-lobulato instructa; apothecia terminalia aggregata.

14. *C. DIVULSA* (Delise mss.) podetiis elongatis glabris cylindrico-compressiusculis glauco-virescentibus squamosis squamis foliosis rotundato-crenulatis subiis albicantibus subscyphiferis, scyphis perviis laceratis ramosis, apotheciis terminalibus minutis aggregatis podicillatis brunneo-pallidis. — Ad terram in Alpibus.

15. *C. SQUAMOSA* (Delise mss.) thallo foliaceo minuto lobato-crenato, podetiis cespitosis elongatis subventricosis granulatis verrucoso-squamosis albicantibus scyphiferis, scyphis subpateriformibus irregularibus perviis dentato-radiatis prolificantibus, apicibus sterilibus breviter ramulosis, apotheciis podicillatis pallide fuscis. — In caudicibus et truncis arborum putrescentium. — *C. Sparassa* Ach. syn. 274. *C. cespitosa* Léon Dufour. *Cladonia squamosa* et *C. coronata* Hoffm. *Lichen cespitosus* Lam. enc. meth.

β . *rigida* (Delise) podetiis erectis rigidis crassis granulatis verrucoso-squamosis griseo-fuscescentibus obtusis vel scyphiformis, scyphis irregularibus perviis dentato-radiatis subproliferis, apotheciis conglomeratis fuscis. — Ad terram et truncos putrescentes.

γ . *flabellata*, podetiis erectis squamoso-foliaceis ramoso-flabellatis, scyphis subnullis, ramis proliferis apicibus cornuto-radiatis subfuscis, apotheciis minutis fuscis. — Cum priore.

δ . *frondosa* (Delise mss.) podetiis erectis squamoso-foliaceis ventricosis, apicibus dilatatis cyathiformibus albo-virescentibus, apotheciis minutis terminalibus inter squamas intermixtis conglomeratis brunneo-pallidis. — Cum prioribus.

ϵ . *Paschalis* (Delise) podetiis intricatis suberectis ramosis subascyphis squamoso-foliaceis, apicibus furcatis evanescentibus, foliolis numerosissimis lobatis crenatis cæullatis cæsio-virescentibus, apotheciis conglomeratis brunneo-pallidis inter squamas intermixtis. — Cum prioribus.

- C. elegans* (Delise) podetii erectis imbricatis ramosis squamoso-foliaeis cespitosis inflatis apicibus digitato-spinulosis subfuscis, foliolis pulverulo-granulatis albicantibus, apotheciis minutis terminalibus.
- n. crassa* (Delise) podetii crassis suberectis ramosis squamoso-exasperatis olivaceis, apotheciis magnis terminalibus subfuscis.
- S. muricella* (Delise) podetii erectis ramosis squamoso-granulatis albescentibus apicibus attenuato-muricatis, apotheciis terminalibus subsolitariis magnis fuscis.
- s. simplex* (Delise) podetii simplicibus squamoso-granulatis rigidis, apicibus dilatatis ramosis vel scyphiferis griseo-albicantibus vel olivaceis, apotheciis terminalibus subfuscis.
- n. scabrosa* (Delise) podetii minutis rigidis intricatis scabridis glancescentibus sursum incrassatis apice irregulariter scyphiferis dilatatis vel ramosis squamulosis, apotheciis terminalibus majusculis dilute fuscis conglomeratis. — *C. gonorega scabrosa* Ach. syn. 260.
- n. anomaea* (Delise) podetii cylindraceis scabridis pulvulentis foliosisque obscurè scyphiferis, scyphis inæqualiter dilatato-radiatis radiis brevibus mucronatis, apotheciis terminalibus sessilibusque aggregato-conglomeratis brunneis. — *C. gonorega anomaea* Ach. ?
- n. tenuiuscula* (Delise) podetii erectis tenuiusculis remotis obscurè scyphiferis pulvulentis foliosisque albo-glancescentibus, scyphis inæqualiter dilatato-radiatis radiis muricatis, apotheciis terminalibus.
16. *C. DELICATA* (Ach. lich. 569.) thallo foliaceo, lobis minutis erosio-lacinulatis granulatis, podetii glabris brevibus pallidis apice subdivisis ramis brevissimis, apotheciis terminalibus conglomeratis subfuscis. — Ad corticem et truncos arborum subputridos. — *Helopodium delicatum* DC. fl. fr. 2. p. 341. Lichen parasiticus Hoffm. en. lich. t. 8. f. 5.
- C. Syrtarum*, podetii turgidulis ramosis foliaceo-granulatis glabris, apotheciis terminalibus conglomeratis planiusculis rufescens-pallidis. — Ad truncos Pinum in agro Syrtico.
17. *C. CUCULLATA* (Delise mss.) thallo minuto foliaceo laciniato-crenulato crenulato discolore supra glauco-virescente subtus albido, podetii elongatis curvatis subramosis irregulariter scyphiferis vel attenuatis pallidis, apotheciis terminalibus subfuscis. — Ad terram et arborum truncos circà Vire, etc. — A multis auctoribus et inter alios à cl. Fries lich. sicc. exs. n. 51. confusa cum *C. delicata*, sed thalli laciniae reflexæ majores, podetia longiora interdùm compressa et a thallo foliaceo nascentia, etc.
18. *C. ANTILOPÆA* (Delise mss.) thallo minuto glabriuscule discolore rotundo crenulato, podetii erectis pallidis granulato-squamulosis subuliformibus simplicibus ramosisque attenuatis vel scyphiferis, scyphis irregularibus radiatis, apotheciis minutis brunneo-pallidis. — Ad terram in saxosis et sylvis Neustriæ.
- C. pulverulenta* (Delise) thallo minuto rotundato-crenulato viridi-glaucente, podetii erectis pulvulentis subuliformibus subsimplicibus, apotheciis terminalibus subfuscis. — Ad terram in sterilibus Neustriæ.
- y. subulina* (Delise) thallo minuto rotundato-crenulato viridi-glaucente, podetii erectis pulvulentis subuliformibus ascypheis simplicibus ramosisque subfiliformibus pallidis, apotheciis minutis terminalibus. — *C. subuliformis* Duf. pro parte.
19. *C. ACUMINATA* (Delise mss.) thallo minuto laciniato rotundato crenulato, podetii albo-cinerascentibus granulato-squamiferis subuliformibus simplicibus ramosisque apice acuminatis vel scyphiferis, scyphis irregularibus radiatis, apotheciis terminalibus magnis brunneo-pallidis. — Ad terram in aridis. — *C. pityrea acuminata* Ach. pro parte. *C. furcata adspersa* Flörke pro parte.
20. *C. spicosa* (Delise mss.) thallo foliaceo minuto subevanescente, podetii erectis longissimis albidis glabris granulatis foliosisque ramosis, ramis

ascyphis fasciulatis terminalibus subulatis vel truncato radiatis, apotheciis conglomeratis terminalibus rufo-pallidis. — Ad terram in sylvis circa Vire. — Podetia 2-3 $\frac{1}{2}$ polices alta.

f. radiata (Delise) podetis erectis brevibus albido-cinerascentibus glabris granulatis foliosisque ramosis, ramis subascyphis fasciulatis subulatis vel truncato-radiatis, apotheciis terminalibus minutis. — Cum priore.

21. *C. CRISPATA* (Ach. syn. 272.) thallo foliaceo minuto crispato laciniato, podetis erectis cylindricis superne incrassatis glabris nudis cinerascentibus scyphiferis, scyphis obscuris axillaribus terminalibusve pervis digitato-radiatis, apotheciis podicillatis terminalibus minutis fuscis. — Ad terram apricam in locis moutosis et alpestribus. — Fries lich. suec. n. 56. pro parte. *C. allotropa* ζ *crispata* Ach. lich. univ. 555.

f. ventricosa (Delise) podetis erectis cylindrico-ventricosis superne dilatatis glabris nudis cinerascentibus scyphiferis, scyphis obscuris axillaribus terminalibusve pervis digitato-radiatis, apotheciis podicillatis terminalibus conglomeratis fuscis pallidisque. — Cum priore. — Var. podetis subnudis et foliolosis.

22. *C. FASCICULARIS* (Delise mss.) thallo foliaceo minuto crenulato, podetis erectis fasciculatis verrucoso-glabriusculis viridi-glaucoscentibus scyphifero-proliferis, scyphis axillaribus terminalibusve obscuris digitato-ramosis apicibus furcato-radiatis, apotheciis terminalibus podicillatis conglomeratis brunneis. — Ad terram in saxosis circa Vire.

f. albicans (Delise) podetis verrucoso-glabriusculis albicantibus foliiferis. — Dill. t. 16. f. 23.

23. *C. DUFOURII* (Delise mss.) thallo minuto foliaceo subevanescente, podetis suberectis cinereis pulverulentis cespitosis ramoso-scyphiferis, axillis dilato-scyphiformibus proliferis, scyphis radiatis denticulatis, apotheciis minutis podicillatis fusco-nigris. — Ad terram in ericetis agri Syrtici circa S. Sever. — *C. axillaris* Duf. rev. n. 14. — Priori valde affinis.

24. *C. PITYREA* (Ach. syn. 254.) thallo foliaceo minuto lobato-crenulato pulvрrulento, podetis gracibus teretibus pulvрruento-furfuraceis cinerascenti-albis subtruncatis scyphiferisque, scyphis vix dilatatis irregularibus fimbriato-radiatis, apotheciis podicillatis subperforatis fuscis. — Inter muscos putridos ad terram et radices arborum vetustas.

f. crassiuscula (Delise) podetis brevibus subtruncatis cylindricis crassiusculis sursum dilatatis scyphiferis, scyphis obscuris, apotheciis terminalibus subbadnatis aggregatis brunneo-pallidis.

f. fastigiata (Delise) podetis erectis minutis tereti-compressiusculis sursum incrassato-scyphiferis, scyphis obscuris radiato-proliferis subramosis, apotheciis terminalibus adnatatis podicillatisque brunneis vel pallidis.

f. scyphifera (Delise) thallo laciniato, podetis erectis brevibus paucis subniformibus ferè omnibus scyphiferis albescientibus, scyphis dilatatis laceris digitatis radiatis proliferisque, apotheciis terminalibus subsolitariis subfuscis.

f. virescens (Delise) thallo lobato-crenulato pulvрrulento, podetis erectis simplicibus subfiliformibus sursum dilatato-scyphiferis viridi-glaucoscentibus, scyphis minutis denticulatis, apotheciis minutis subpodicillatis brunneis.

f. affinis (Delise) thallo lobato-crenulato pulvрrulento, podetis brevibus simplicibus subfiliformibus granulatis sursum dilatatis proliferis albescientibus, scyphis irregulariter denticulato-radiatis subproliferis, apotheciis minutis podicillatis.

25. *C. DECORTICATA* (Flörke deutsch. lich. n. 75.) thalli laciniis squamæformibus discoloribus inciso-crenatis, podetis simplicibus, fructiferis cylindricis sterilibus subulatis decorticatis albissimis fuscisque squamis minutissimis albido-cinereis adspersis, apotheciis terminalibus subpodicillatis conglomeratisque

fuscos. — In saxis inter muscos putridos. — *C. pityrea c. decorticata* Ach.
syn. 254.

β. minuta (Delise) thallo minuto inciso-crenato laciniis squamiformibus, podetis simplicibus ramosisque rectis minutis brevibus cylindricis fastigiatis flavo-virescentibus squamis minutissimis adspersis, apotheciis terminalibus conglomeratis brunneo-pallidis. — Ad trunca arborum putridos inter muscos.

γ. flagellaris (Delise) podetis simplicibus erectis decorticatis ramosis scyphiferisque, ramis fasciculatis attenuato-flagelliformibus, scyphis irregularibus radiatis, apotheciis. . . . Supra trunca arborum putrescentium prope terram circa Vire.

VIII. CORNU τ E Delise mss.

Thallus foliaceus laciniatus crenulatusque, podetia erecta elongata cylindrica scyphifera vel ramoso-prolifera; apothecia conglomerata brunneo-pallida.

26. *C. STEREOCAULINA* (Delise mss.) thallo foliaceo laciniato laciniis paucis elongatis crenulatis, podetis erectis longiusculis cylindricis glabris pulverulentisque albido-cinerascentibus scyphiferis vel ramoso-proliferis, scyphis irregulariter dilatatis denticulatis, apotheciis terminalibus axillaribusque conglomeratis minutis sessilibus brunneo-pallidis. — Ad terram in sylvis circa Vire.

27. *C. CORNUTA* (Ach. lich. 545.) thallo foliaceo minuto rotundato-crenulato discolore, podetis ascyparis elongatis subuliformibus simplicibus pulverulentis albis substerilibus, scyphis cylindricis subintegris, apotheciis minutis fuscis. — Ad terram. — *C. fimbriata h cornuta* Ach syn. 257. *Cladonia cornuta* Hoffm. *Scyphophorus cornutus* a DC. fl. fr. 2. p. 340. — Dill. musc. t. 15. f. 14. D. f. 16. E.

β. radiata, thallo foliaceo minuto rotundato-crenulato, podetis elongatis pulverulentis albis scyphiferis, scyphis margine radiatis, radiis subuliformibus subfertilibus, apotheciis terminalibus fuscis. — *C. fimbriata b radiata* Ach. syn. 255. — Dill. musc. t. 15. f. 16. A. B. D. F. G?

γ. ramosa (Delise) thallo foliaceo minuto rotundato-crenulato discolore, podetis elongatis ascyparis ramosis pulverulentis albis, ramis subuliformibus substerilibus. — Flörke in berl. mag. t. 2. t. 4. f. 9. — Dill. musc. t. 15. f. 14. E.

δ. ornata (Delise) thallo foliaceo conspicuo laciniato discolore, podetis elongatis ramosis pulverulentis albis, ramis subuliformibus substerilibus.

ε. tortuosa (Delise) thallo foliaceo rotundato-crenulato discolore, podetis crassis ramosis tortuosis, ramis subulatis truncatisque, apotheciis terminalibus brunneo-pallidis. — Dill. musc. t. 16. f. 18. B.

ζ. fibula (Ach.) thallo foliaceo minuto, podetis longis subcylindricis pulverulentis albis scyphiferis, scyphis irregularebus, apotheciis in margine scyphorum sessilibus congestis vel podicillatis fuscis. — *C. fimbriata d fibula* Ach. syn. 256. — Dill. musc. t. 15. f. 16. A. B?

η. vermicularis (Delise) thallo foliaceo, podetis longissimis cylindricis pulverulentis albis scyphiferis, scyphis vix dilatatis denticulatis.

θ. nemoxyna (Ach.) thallo minuto, podetis longis ramosis pulverulentis albis, ramis divisis subuliformibus truncatisque, apotheciis terminalibus solitariis vel conglomeratis subfuscis pallidisque. — *C. fimbriata g nemoxyna* Ach. syn. 257. — Dill. musc. t. 15. f. 16. C.

ι. abortiva (Ach.) thallo minuto, podetis crassis pulverulentis albis apice obtusis vel obscurè scyphiferis, scyphis subcrenatis radiato ramosis sterilibus fertilibusve, apotheciis minutis subsessilibus fuscis. — *C. fimbriata e abortiva* Ach. syn. 255. — Dill. musc. t. 15. f. 14. C.

κ. crassa (Delise) thallo minuto, podetis elongatis difformibus crassis amplissimis cornutis vel obscurè scyphiferis pulverulentis albis griseisque.

28. *C. INSIDIOSA* (Delise mss.) thallo minuto foliaceo crenulato, podetis erectis longiusculis pulverulentis griseis obscurè scyphiferis ramosis, scyphis mar-

giibus ramosis ramis elongatis subuliformibus. — Ad terram in saxosis.

β . *cladocarpa* (Delise) scyphis marginibus subdigitatis, apicibus multipartitis subuliformibus, apotheciis terminalibus aggregatis fuscis. — C. *pyxidata* & longipes D. *cladocarpa* Flörke in berl. mag. t. 4. f. 19-20.

γ . *pinguis* (Delise) podetiis longis crassis pulvrenlento-griseis obscurè scyphiferis ramosisque vel attenuatis pulvere aut foliolis conspicuis obiectis.

29. C. CONIOCRAEA (Flörke deutsch. lich.) thallo minuto rotundato-crenulato virescente subtus albicante, podetiis elongatis simpliciusculis subuliformibus scyphiferis que ad basin glabris virescentibus ad medium pulverulentis supra alblicantibus, apotheciis terminalibus subfuscis. — Ad terram et truncos vetustos in sylvis.

α . *ramulosa* (Delise) podetiis ramosis ramis subuliformibus scyphiferis truncatisque, scyphis minutis.

γ . *excelsa* (Flörke l. c. n. 139.) podetiis longis rectis subuliformibus scyphiferis que simplicibus, scyphis angustis. — Lich. cornutus Linn. ex Fries lich. suec. n. 116.

δ . *clavariooides* (Delise) thallo glabro subpalmato, podetiis subventricosis apicibus cornutis truncatis ramosis scyphiferis que, scyphis subdilatatis minutè denticulatis, apotheciis terminalibus solitariis brunneis. — C. *clavariooides* Duf. revis.

ϵ . *proboscidea* (Delise) podetiis elongatis simplicissimis flexuosis apice inflatis scyphiferis, scyphis minutè denticulatis.

ζ . *dilatata* (Delise) podetiis elongatis ramosis scyphiferis, scyphis valde margine denticulatis proliferisve proliferationibus subuliformibus scyphiferisve.

η . *coronata* (Delise) podetiis elongatis simplicibus scyphiferis, scyphis valde dilatatis margine radiatis, radiis aut subuliformibus aut scyphiferis aut incrassatis subfertilibus.

ϑ . *secunda* (Delise) podetiis elongatis ramosissimis scyphiferis, scyphis axillaribus secundis subulato-radiatis, apotheciis terminalibus grossis brunneis.

ix. PYXIDATE Delise mss.

Thallus foliaceus lobato-crenatus; podetia longiuscula ventricoso-subteretta fistulosa superne turbinato-scyphiformia; apothecia fusca aut nigro-fusca rarius carneo-pallida.

30. C. CENOTEA (Ach. syn. 271.) thallo foliaceo minuto lobato-crenato pulverulento, podetiis longiusculis ventricoso-subteretibus tenuissime pulverulentis scabrosisque albis apice apertis sublacero-scyphiferis, scyphis perviis margine denticulato-radiatis repetito-prolificantibus, apotheciis subpodicillatis minutis subperforatis nigro-fuscis. — Ad truncos putridos et ligna demorta. — Bæomyces cenoteus Ach. meth. t. 7. f. 7.

β . *brachiata* (Delise) podetiis teretibus ramosissimis scyphis valde dilatatis repetito-prolificantibus, radiis subuliformibus scyphiferisve.

31. C. PYXIDATA (Ach. lich. 534. excl. var.) thallo foliaceo laciniis crenulatis ascendentibus, podetiis omnibus turbinatis scyphiformibus glabris denum granulato-verrucosis scabridis virenti-griseis, scyphis regularibus margine subinde extenso proliferoque, apothecis fuscis. — Ad terram in ericetis et saxis. — Scyphophorus pyxidatus DC. fl. fr. 2. p. 339. Lichen pyxidatus Linn.

α . *simplex* (Ach.) podetiis brevibus turbinato-scyphiformibus, margine ex apotheciis minutis obscurè fuscis subdenticulato. — Lichen simplex Roth. — Dill. mus. t. 14. f. A. — Vail. bot. f. 21. f. 7.

β . *staphylea* (Ach.) podetiis turbinato-scyphiformibus simplicibus albido-virescentibus, apotheciis in margine scyphorum podicillatis majoribus subfuscis. — Cladonia tuberculosa Hoffm. — Dill. musc. t. 14. f. 6. c.

630. ACOTYL. SEU CELLULARES. CENOMYCE.

- γ . *bottiyosa* (Delise) podetiis turbinato-scyphiformibus undique scyphisque squamulis foliaceis pulverulentisve vestitis.
- δ . *longipes* (Flörke) podetiis elongatis simplicibus vel ramosis sterilibus fructiferisque, scyphis margine integerrimo aut denticulato.
- ϵ . *prolifera* (Delise) podetiis ampliato-dilatatis, scyphis radiatis radiis repetito-prolificantibus. — *C. fimbriata* f. *prolifera* Ach. syn. 256. — Flörke in berl. mag. t. 4. f. 21.-24. — Dill. musc. t. 14. f. 6. M. — Vaill. t. 21. f. 9.
- ζ . *tubæformis* (Hoffm.) podetiis elongatis cylindricis pulverulentis albis scyphiferis, scyphis regularibus margine integerrimis crenulatisque substerilibus. — Flörke in berl. mag. t. 4. f. 1. a, 31-33. — Vaill. bot. t. 21. f. 6. 8.
- η . *syntheta* (Ach.) podetiis ad basin cylindraceis scyphiferis margine simpliciter vel repetito-proliferis, apotheciis demum podicillatis majoribus badiis.
- ϑ . *fimbriata* (Flörke) podetiis elongatis scyphiferis, scyphis margine denticulatis vel serratis, apotheciis perpaucis fuscis. — *C. fimbriata* Ach. syn. 254. — Flörke in berl. mag. t. 4. 28-30. — Dill. musc. t. 14. f. 8.
- ι . *lophyra* (Ach.) podetiis turbinatis, scyphis amplis dilatatis margine foliaceo-crispis prolificantibusque, apotheciis intrà squamas immixtis sessilibus vel podicillatis. — Dill. musc. t. 13. f. 9. A.
- κ . *conistea* (Delise) podetiis subturbinatis pulverulentis viridi-cinereis, scyphis cyathiformibus simplicibus margine subintegris, apotheciis marginalibus subsessilibus minutis fuscis.
- λ . *exilis* (Ach. lich. 535.) thalli lobis minutis crenato-incisis vel subgranuliformibus, podetiis brevibus cinereo-viridibus, scyphis integerrimis crenatisve, apotheciis perpaucis subsessilibus fuscis. — Dill. musc. t. 14. f. 11.
32. *C. pocillum* (Ach. syn. 253.) thallo foliaceo, laciniis crassis latiusculis lobato-crenatis depresso-imbricatis olivaceis nitentibus subtus niveis, podetiis omnibus turbinato-scyphiformibus cum diaphragmate verrucosis albo-cæsioprinosis, scyphis regularibus margine integro demum proliero, apotheciis marginalibus minutis nigro-fuscis. — Ad terram apricam sterilem. — *C. pyxidata* Pocillum Ach. lich. 535. Bæomyces Pocillum Ach. meth. t. 8. f. 6.
- μ . *polyphæma* (Delise) podetiis maximis dilatatis basi et interdum usque ad apicem verrucoso-squamosis, scyphis irregulariter laceris, apotheciis amplis subsessilibus interdum valde dilatatis confluentibus.
33. *C. CARNEO-PALLIDA* (Delise mss.) thallo foliaceo, laciniis latiusculis crenatis imbricatis viridi-pallescensibus subtus niveis, podetiis subelongatis turbinato-scyphiformibus pulverulentis viridi-albis, scyphis regularibus margine crenatis fimbriatis prolificante, apotheciis amplis marginalibus demum confluentibus carneo-pallidis. — In lignis putridis. — *C. fimbriata* γ carneo-pallida Ach. syn. 258.
34. *C. DEGENERANS* (Flörke in Web. beytr. 2. p. 308.) thallo foliaceo, laciniis latiusculis crenulato-incisis, podetiis longiusculis glabris subverrucosis glauco-vel albo-virescentibus basi nigrescentibus albido-punctatis omnibus scyphiferis, scyphis irregularibus sublacero-radiatis margine proliferis prolificantibus foliosis, apotheciis conglomeratis marginalibus fuscis. — Ad terram in campis sylvaticis et montibus. — *C. gonorega* Ach. lich. 551 excl. var. α et γ . — Scyphi initio fere fissi et margine subcristati proliferatione saepius multo repetita; podetia per ætatem scabra et squamulosa; thalli laciniæ subtus semper albae nudæ, vetusta cinereo-fuscescentes.
- β . *firma* (Delise) apotheciis elongatis rectis firmis nigrantibus verrucosis scyphiferis apice dilatatis, apotheciis numerosis conglomeratis marginalibus brunneo-fuscis.
- γ . *aploea* (Ach.) podetiis longiusculis cylindricis omnibus scyphiferis, scyphis simplicibus subregularibus margine crenatis radiatis vel pal-

mato-dilatatis, apothecis sessilibus podicillatisque fuscis. — Apothecia minuta aliquando rufescantia.

35. *C. VERTICILLATA* (Ach. syn. 251.) thallo foliaceo laciinis erectiusculis crispis crenato-incisis, podetis cylindricis glabriusculis livide virescentibus omnibus scyphiferis, scyphis regularibus denticulatis planiusculis e centro demum elevato repetito-aggregatoque prolificantibus, apotheciis marginalibus fuscis. — Supra terram in locis saxosis apricis. — *Cladonia dilatata*, *C. pyxidata* var. *verticillata* *prolifera* et *C. cristata* Hoffm. *Bæomyces verticillatus* Wahlemb. — Dill. musc. t. 14. f. 6. B. D.-H., f. g. B. — Mich. gen. t. 42. f. P. dext. — Margo scyphorum per etatem squamoso-foliaceus.

36. *C. ENDIVIAEOLIA* (Ach. lich. p. 528.) thallo foliaceo insigni amplissimo glanco-virescente subtus niveo laciinis multifidis flexuosis imbricatis, lobis crenatis crispis, podetis turbinato-scyphiformibus simplicibus, apotheciis rufescitibus. — Ad terram in ericetis sterilibus. — *C. alcicornis* Ach. lich. p. 529. excl. syn. *Lichen endiviaefolius* Dicks. crypt. 3. p. 17. — Mich. gen. f. 42. f. 3.

37. *C. ALCICORNIS* (Ach. lich. p. 528.) thallo foliaceo insigni pallido virescente subtus niveo laciinis subpalmatis adscendentibus repando-dentatis obtusis inflexis, fasciculis pilorum marginalibus, podetis elongato-turbinatis omnibus scyphiferis laevibus, scyphis regularibus crenatis margine demum foliosis proliferisque, apotheciis fuscis. — Ad terram in ericetis et locis montosis. — *C. damæcornis* et var. γ *phylophora* Ach. lich. p. 530. excl. syn. Ehr. *Cladonia foliacea*, *phylophora* et *cornueopoides* Hoffm. — Dill. musc. t. 14. f. 12. A. Vaill. bot. t. 21. f. 3.

δ . *gentilis* (Ach. lich.) laciinis confertis erectis tenuissimis linearibus planis denticulato-crenatis nigro-ciliatis. — Inter muscos.

38. *C. CLADOMORPHA* (Delise mas.) thallo foliaceo laciinis angustis crenato-incisis glanco-virescentibus subtus albis, podetis longiusculis glabris subverrucosis glanco-nigricantibus proliferatione scyphorum evanescentium dichotomo-ramosis, ramis expansis teretibus subsquamosis apice radiato-ramulosis, apotheciis marginalibus minutis capitatis fuscis. — Ad terram in campus, sylvaticis et montibus. — *C. alcicornis* β *cladomorpha* Ach. lich. 530. — Dill. musc. t. 14. f. 12. B.

ϵ . *cæsia* (Delise) thallo cæsio-virescente subtus niveo, podetis verrucosis glanco-virescentibus, apotheciis nigro-fusci.

γ . *sulphurea* (Delise) thallo ampio utrinque virescenti-sulphureo, podetis valde dilatatis glabris sulphureis, apotheciis minutissimis. — In agro Syrtico.

δ . *sobolifera* (Delise) podetis breviusculis ramosissimis glanco-virescentibus, scyphulis extremis subcymosis apice subdilatatis subuliformibusve margine integris aut tenuissime denticulatis.

39. *C. CERVICORNIS* (Ach. lich. 531.) thallo foliaceo cæsio-virescente laciinis erectis multifidis angustis subdentato-repandis subtus albicantibus, podetis cylindricis brevibus glabris lividis demum nigris omnibus scyphiferis, scyphis parvis regularibus dilatatis integerrimis planiusculis e centro prolificantibus, apotheciis parvis marginalibus sessilibus fusco-nigris. — Ad terram supra saxa et inter muscos. — *Lichen cervicornis* Ach. in nov. act. holm. 22. t. 4. f. 3. — Var. scyphis simplicibus vel e centro diaphragmatis interdum repetito-proliferis, podetisque per etatem foliosis.

x. *CESPITITIE* Delise mss.

Thallus foliaceus lobato-crenulatus; podetia breviuscula subfistulosa cylindrica simplicia apice subdivisa; apothecia congesta fusca.

40. *C. SYMPHYCARPA* (Ach. lich. 568. excl. syn., syn. 274.) thallo foliaceo lobis rotundatis inciso-crenatis lividis subtus albicantibus, podetis breviusculis laevibus apice subdivisis, apotheciis congestis fuscis. — In terra ad montes et propè Alpes. — *Capitularia symphycarpa* Flörke.

632 ACOTYL. SEU CELLULARES. CENOMYCE.

41. *C. CARIOSA* (Ach. lich. 567, syn. 273.) thallo foliaceo minuto lobis crenulatis ascendentibus, podetiis albidis carioso-caucellatis granulato-verruculosis apice dilatatis aut digitato-subdivisis, apotheciis confertis fuso-atris. — Ad terram in campis sterilibus. — *Lichen cariosus* Ach. in nov. act. holm. v. 22. t. 4. f. 4.
 ♂. *umbellifera* (Delise) thallo lobis erectis densissimè confertis, podetiis a basi ramosissimis ramis fastigiatis.
 ♀. *majuscula* (Delise) podetiis elongatis crassis subcylindricis apice dilatatis subradialis, apotheciis grossis confertia fuscis.
42. *C. STREPSILIS* (Ach. lich. 527, syn. 249.) thallo foliaceo parvo, laciniis multifidis ascendentibus, laciniulis elongatis sublinearibus dentato-repandis apice incurvis, podetiis brevissimis laevigatis, laciniis terminalibus subaggregatis turbinato-scyphuliformibus regularibus, apotheciis marginalibus sessilibus subglobosis fusco-nigris. — Ad terram muscosam.
43. *C. CESPITITIA* (Ach. syn. 249.) thallo foliaceo parvo laciniis pinnatifidis lacero-crispis, podetiis brevissimis laevibus submarginalibus turbinato-scyphuliformibus regularibus, apotheciis demum convexis conglomeratis inque lobalis thalli subsessilibus fuscis. — Ad terram et truncos putridos, inter muscos et supra saxa. — *C. epiphylla* Ach. lich. 527. *Cladonia fusca* Hoffm. en. lich. t. 8. f. 4. *Bæomyces cespititius* Pers.
44. *C. LEPTOPHYLLA* (Ach. lich. 568, syn. 274.) thallo foliaceo lobis minutis subrotundis integrerimis crenatisque imbricatis vel dispersis, podetiis subsimplicibus brevibus glabriusculis pallide virescentibus subcylindricis apice dilatatis, apotheciis terminalibus subsolitariis rufescentibus. — Supra terram in provinciis borealibus.
45. *C. BOTRYTES* (Ach. lich. p. 569, syn. 274.) thallo foliaceo lobis minutis crenulatis crispis, podetiis brevibus albo-pallidis rugoso-granulatis subdivisis, ramis terminalibus fastigiatis, apotheciis subpeltatis simplicibus pallidis. — Supra truncos putridos et in caudicibus arborum decisus. — *Bæomyces abietinus* Pers. *Lichen botrytes* Hag. hist. lich. p. 121. t. 2. f. 9. Jacq. coll. 4. t. 4. f. 3.

XI. COCCIFERÆ Delise mss.

Thallus foliaceus; podetia fistulosa sursùm dilatata scyphifera vel attenuata subulata; apothecia coccinea vel atro-rubentia.

46. *C. caccifera* (Ach. lich. 537, syn. 269.) thallo foliaceo laciniis rotundatis crenatis subtus nudis, podetiis elongato-turbinatis nudis verrucoso-scabridis pallide flavo-cinereoque virescentibus, omnibus scyphiferis, scyphis cyathiformibus margine protenso fertili, apotheciis majusculis convexis demum podicillatis coccineis. — Supra terram in sylvis. — *Cladonia coccinea* Hoffm. *Lichen cocciferus* Linn. eng. bot. t. 2051. — Dill. muse. t. 14. f. 7. A.-J. Vaill. bot. t. 21. f. 4.
 ♂. *humilis* (Delise) thallo minuto, podetiis breviusculis basi angustatis apice scyphiferis, apotheciis magnis convexis subglobosisve.
 ♀. *cornucopioides* (Ach.) podetiis breviusculis scyphiformibus, scyphis dilatatis e diaphragmate et margine foliaceo-crispis apothecis subpodicillatis demum proliferis coronatis.
 ♂. *coronata* (Delise) podetiis elongatis scyphiformibus, scyphis proliferis margine apotheciorum minutorum subcontinua serie coronatis.
 ♀. *regularis* (Delise) podetiis simplicibus elongatis subcylindricis apice in scyphum parvum regularem apotheciis parvis carneo-coccineis margine coronatum dilatatis.
 ♂. *extensa* (Ach.) podetiis elongatis proliferis scyphiferis, scyphis dilatatis margine dilacerato extenso apothecis plerumque podicillatis coronato.
 ♀. *asotea* (Ach.) podetiis obconico-scyphiformibus e cinereo-flavo-virescentibus, scyphis regularibus cyathiformibus e centro diaphragmatis aggregato-proliferis, apotheciis marginum minutis sessilibus demum subpodicillatis majoribus. — Dill. muse. t. 14. f. 7. R. T. M.

47. *C. BELLIDIFLORA* (Ach. syn. 270.) thallo foliaceo laciniis inciso-crenatis subtus nudis, podetiis elongatis cylindricis rigidis glabris foliaceo-squamulosis pallidis omnibus scyphiferis, scyphis angustis margine fertilibus proliferisque, apotheciis confertissimis conglomeratis coccineis. — Ad terram in locis montosis et subalpinis. — Lich. bellidiflorus Ach. in nov. act. holm. 22. t. 4. f. 1. a.
β. polycephala (Ach.) podetiis crassis cylindricis apice subdivisis, apotheciis sessilibus pedicillatisque, scyphis dilatatis demum obsoletis. — *Cladonia polycephala* Hoffm. — Vaill. bot. t. 21. f. 10.
48. *C. PLEUROTA* (Ach. syn. 270.) thallo foliaceo laciniis inciso-crenatis subtus nudis, podetiis obconico-scyphiformibus pulverulentis albo-pallido-virescentibus, scyphis ampliatis demum lacunosis subcostatis margine subintegro demum sinuato radiatoque, apotheciis subpedicillatis coccineis. — In terra apicâ lignisque putridis raro. — *Cladonia incana* Hoffm. — Dill. musc. t. 14. f. 6. B.
49. *C. DEFORMIS* (Ach. lich. 538 excl. var. γ et $\delta.$) thallo foliaceo laciniis latiusculis incisis crenatis subtus nudis, podetiis longis crassis subventricosis sulphureis tenuissimè pulverulentis scyphiferis, scyphis angustis crenato-dentatis demum dilatatis lacerisque, apotheciis sessilibus pedicillatisque coccineis. — Suprà terram in sylvis montosis. — *Lich. deformis* Linn.
β. crenulata (Ach.) podetiis elongatis crassis ventricosis, scyphis regularibus crenatis, apotheciis marginalibus minutis sessilibus.
γ. gonecha (Ach.) podetiis elongatis e basi sursum incrassatis clavatis sterilibus fertilibusque, scyphis irregularibus fissis lacero-radiatis, apotheciis majoribus sessilibusque terminalibusque conglomeratis.
δ. elephantiasica (Delise) podetiis valde incrassatis ventricoso-dilatatis deformibus, scyphis irregularibus dentato-laceris.
50. *C. DIGITATA* (Ach. syn. 267.) thallo foliaceo minuto laciniis expansis rotundatis crenatis subtus podetiisque cylindricis scyphiferis flavo-virescentibus pulverulentis, scyphis angustatis margine subincurvis proliferis demum amplis proliferationibus deformibus ramoso-digitatis, apotheciis coccineis. — In truncis et lignis putrescentibus. — *Cladonia digitata* Hoffm.
β. attenuata (Delise) podetiis erectis subsimplicibus ventricoso-fusiformibus superne attenuatis, scyphis minutis angustatis apotheciis minutis sessilibus pedicillatisque coronatis. — *C. digitata ceracha* Ach.?
γ. denticulata (Ach.) podetiis longinsculis simplicibus omnibus scyphiferis, scyphis subampullaceis margine denticulato-radiatis, apotheciis radiorum terminalibus minutis.
δ. conspicua (Delise) podetiis elongatis simplicibus ramosisve furfuraceo-pulverulentis, scyphis dilatatis margine proliferis aut apotheciis plus minus crassis nitidis instructis.
ε. monstrosa (Ach.) podetiis proliferatione scyphorum difformibus et subevanescentium ramosis digitatis substerilibus. — Dill. musc. t. 15. f. 19. A. B.
ζ. glabrata (Delise) podetiis e basi ampliato-dilatatis glabris, scyphis latissimis difformibus margine proliferis, proliferationibus scyphiferis undique apotheciis atro-coccineis onustis.
η. conglomerata (Delise) podetiis erectis squamuoso-pulverulentis scyphis proliferis, apotheciis crassiusculis numerosis conglomeratis nitidis amæne coccineis. — *C. conglomerata* Dufour.
θ. Dilleniana (Delise) podetiis elongatis ramosissimis furfuraceo-squamulosis ventricosis, scyphis proliferis margine apotheciis minutissimis denticulato-coronatis. — Dill. musc. t. 15. f. 18. A.
ι. cephalotes (Ach.) podetiis crassiusculis, scyphis irregularibus radiato-proliferis proliferationibus subdivisis, apotheciis sessilibus pedicillatisque majoribus coccineis.
κ. macrophylla (Delise) thallo laciniis valde dilatatis incisis crenatis, podetiis erectis cylindricis subsimplicibus.

634 ACOTYL. seu CELLULARES.

λ. seductrix (Delise) thalli laciniis imbricato-confertis crispato-laceris supra virescentibus, podetiis breviusculis angustatis subsimilibus cylindricis incurvis probosciformibus.

μ. albicans (Delise) thallo obsoleto, podetiis elongatis albicantibus pulverulentis subcylindricis apice ramoso-digitatis. — Ad truncos putridos in sylvâ Fougères.

51. *C. pseudocornuta* (Delise mss.) thallo foliaceo minuto laciniis inciso-crenatis, podetiis elongatis cylindricis simplicissimis aut subbifurcatis ad apicem attenuatis sterilibus subacuminatis pulverulentis albicanti-virescentibus, apotheciis raris terminalibus sessilibus solitariis aggregatisve. — Ad truncos putridos in sylvis Nenstriae.

52. *C. bacillaris* (Ach. lich. 542. excl. var. β et ζ) thallo foliaceo minuto laciniis inciso-lobatis crenatis subtus undulatis, podetiis cylindraceis simplicibus apiceque subramosis cinereo-albis granuloso-pulverulentis rassimè scyphiferis, scyphis angustis demum radiatis, apotheciis coccineis. — Ad truncos arborum putridos. — Lichen filiformis Huds. eng. bot. t. 2028. — Dill. musc. t. 14. f. 10. A. c. B. e.

$\beta.$ *styracella* (Ach.) podetiis subuliformibus simplicibus apice scyphulo angusto peregrino integerrimo vel apothecio subsolitario minuto terminalis. — Bæomyces solecinus Ach. meth. t. 7. f. 2.

$\gamma.$ *carcata* (Ach.) podetiis elongatis erectis teretibus simplicibus subdivisisque scyphis obsoletis, apotheciis terminalibus convexis. — *C. careata* Ach. lich. 568.

$\delta.$ *Florkeana* (Delise) podetiis erectis strictis angustis cylindricis ad apicem sensim subampliatis aut subdivisis, scyphis subobsoletis, apotheciis terminalibus convexis.

$\epsilon.$ *clavata* (Ach.) podetiis simplicibus crassis clavato-ventricosis obtusis pallidis substerilibus. — *Cladonia cornuta* Hoffm. lich. t. 25. f. 1. — Dill. musc. t. 15. f. 14. B.

$\zeta.$ *macrocarpa* (Delise) podetiis erectis furfuraceo-squamulosis ad apicem divis, apotheciis crassis conglomeratis terminalibus atro-coccineis.

$\eta.$ *coronata* (Ach.) podetiis cylindricis pulverulentis subsquamulosisque, ramulis digitato-radiatis, apotheciis terminalibus subglobosis. — Dill. musc. t. 15. f. 19. C.

53. *C. BABBISONII* (Delise mss.) exilla, thallo foliaceo minutissimo laciniis rotundatis crenatis, podetiis strictis subuliformibus simplicissimis, apotheciis minutissimis aggregatis terminalibus coccineis. — In ericetis circâ Falaise. — Planta valde singularis vix semi-lineam alta; apothecia minutissima et operentis tantum discernenda.

XVII. ISIDIUM Ach. prod. DC. fl. fr. 2. p. 326. Ach. lich. univ. 110. t. 11. f. 7-9. — Pertusariæ et Lecanoræ transformatæ ex Meyer. — Parmeliæ transf. ex Spreng.

Receptacula orbiculata convexa demum subglobosa solida in thalli podetiis terminalia sessilia, subtus a thallo formata; lamina prolixa primo apice podetiorum inclusa margineque ab his formato cincta, tandem convexa crassa immarginata colorata non reflexa. — Thallus crustaceus plano-expansus adnatus uniformis podetia solida breviuscula proferens.

1. *I. melanochlorum* (DC. fl. fr. 2. p. 326.) crustâ tartareâ rugoso-verrucosâ areolato-rimosa intus albâ extus viridescenti-fumosa glauca, podetiis aggregatis subsimilibus erectis crassis solidis cylindricis obtusis apice e pulvere albo aut obscuro cinereis. — Ad saxa arenaria propè Mortain (cl. Delise), Fontainebleau, Cænonanum, Angers (cl. Guepin), Mimatem (cl. Prost). — *I. stalactitum* Ach. syn. 282. (v. v. DC.)

2. *I. dactylinum* (Ach. meth. t. 3. f. 6.) crustâ tartareâ rugoso-verrucosâ

inæquabili albâ, podetiis longiusculis simplicissimis ventricoso-teretibus, apotheciorum laminâ rubrâ. — Ad terram muscis instratam in monte Aureo ex cl. Delise. — Ach. syn. 282. *Forma Bæomyces rosei* ex cl. Fries, Lecanoræ hæmatommæ ex illis, Lecan. oculata ex aliis.

3. *I. WESTRINGII* (Ach. meth. 138.) crustâ tartareâ areolato-ramosâ inæquabili cinereo-subrubente, podetiis subglobosis primum brevissimis demum elongatis cylindricis simplicibus ramosisque, apotheciorum laminâ fuscâ demum nigricante. — Ad rupes Cebennarum, Alpinum, Vogesorum, Fontisbleaudi, agri Andegavensis (cl. Guépin), Rothomagensis ex Le Prév. — Fl. fr. 5. p. 177. — Ach. prod. 88. t. 2. f. 2. *Evolutio monstruosa crustæ sterilis Lecanoræ Parellæ* ex Meyer. nebenst. 207. (v. v.)
4. *I. COKALLINUM* (Ach. meth. 138. t. 3. f. 7. excl. syn.) crustâ tartareâ diffracto-areolata albo-cinerascente, podetiis confertis brevissimis demum longiusculis teretibus simplicibus aut rariis subramosis, apotheciorum laminâ fuscescenti-cinereâ. — In saxis. — Fl. fr. 2. p. 326. — eng. bot. t. 1541. Jacq. coll. 2. t. 13. *Stereocaulon madreporiforme* Hoffm. *Crusta sterilis et corticali substantiâ orbata Pertusariæ communis* ex cl. Meyer. (v. v.)
5. *I. LÆVIGATUM* (Ach. lich. 577.) crustâ solidâ æquabili lævigata subnitidâ ramosiusculâ cinereo-glaucâ, podetiis sparsis subglobosis basi angustatis, apotheciorum laminâ cinereo-fuscescente. — Ad saxa propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)
6. *I. COCCODES* (Ach. meth. lich. 139.) crustâ ramulosâ subpulverulentâ griseo-ochroleucâ, podetiis globosis cylindricisve papillæformibus simplicibus aut apice ramosis confertissimis, apotheciorum laminâ fuscâ cinereo-pruinosa. — In cortice vetusta arborum. — *Lepra obscura* Ehr. Fl. fr. 2. p. 323. *Status deformatus Pertusariæ communis* ex Meyer. (v. v.)
 - β. leucoteum* (Ach.) crustâ subeffusa, apotheciis subglobosis subsessilibus cæsiis pruinosis. — In sepimentis ligneis. (v. s.)
7. *I. RHYMATODES* (Ach. meth. 139.) crustâ rimoso-areolata verrucosa pulverulentâ inæquabili pallidè sulfureâ, podetiis brevibus confertis demum cylindricis simplicibus aut subramosis, apotheciorum laminâ luteo-fuscescente. — Ad corticem truncorum Fagi, Pini, etc., passim. — *Variolaria flava* DC. fl. fr. 5. p. 177. *Status deformatus Pertusariæ communis* ex Meyer. (v. v.)
 - β. phragmæum* (Ach.) crustâ pulverulentâ sulphureo-virescente, podetiis subglobosis concoloribus, apotheciorum laminâ dilute luteola. — In sepibus ligneis et truncis arborum. — *Lepraria lutescens* Ach. meth. *Lepra lutescens* Hoffm. lich. t. 23. f. 1. 2. (v. s.)

††† *Receptacula pedunculata aut sessilia thallo pulverulento imposita.*

XVIII. *BÆOMYCES* Pers. in *Ust. ann. bot. st. 7.* p. 19. DC. fl. fr. 2. p. 341. Ach. lich. 108. t. 12. f. 1. 2. — *Patellariæ apotheciis pedunculatis* Spreng. syst. c. 4. p. 269.

Receptacula capituliformia fungosa turgida globosa podetiis solidis incidentia; lamina proligera apothecium totum obtegens immarginata convexo-reflexa colorata. — *Thallus crustaceo-pulverulentus plano-expansus adnatus.*

1. *B. ERICETORUM* (DC. fl. fr. 2. p. 342.) crustâ uniformi verrucosa albicante inæquabili, podetiis brevissimis cylindricis, apotheciis subglobosis dilute carneis. — Ad terram macram argillosam. — *B. roseus* Pers. Ach. *Lichen ericetorum* L. eng. bot. t. 374. — Mich. gen. 100. t. 50. — Dill. musc. t. 14. f. 1. (v. v.)
2. *B. RUFUS* (DC. fl. fr. 2. p. 342.) crustâ uniformi tartareâ pulverulentâ rugoso-granulata cinereo-virescente, podetiis brevibus subcompressis, apotheciis con-

636 ACOTYL. SEU CELULLARES.

vexis subglobosis rufis aut obscure fuscis solitariis vel conglomeratis. — Ad terram argillosam et saxa. — *B. rapestris* Pers. Fl. fr. 2. p. 342. *B. byssoides* Schær. spic. 1. p. 17. exsicc. n. 32. — *Jacq. coll. 3. t. 3. f. 1.* — *Dill. musc. t. 14. f. 4.* (v. v. DC.)

B. lignorum (Ach.) crustâ virescenti aut obscure cinereâ, apotheciis subsimplicibus sessilibus podicillatisve difformibus. — Ad trabes et septimenta lignea. (v. s.)

3. *B. CALYCIODES* (Delise ined.) crustâ tenuissimâ effusâ membranaceâ interrumpâ virescente, podetis brevibus subcylindricis rufo-carneis semipellucidis demum rufis, apothecis convexis subglobosis rubro-fuscis solitariis. — Super muscos quos incrustat in sylvâ Briuebec detexit cl. Despréaux. (v. s. D.)

XIX. CALYCIUM Pers. in *Ust. ann. bot. st. 7. t. 3. f. 1. 2. 3. DC. fl. fr. 2. p. 343.*
Ach. lich. 39. t. 3. f. 1-8.

Receptacula scyphuliformia vel pileolata stipitata aut rarius sessilia cartilaginea massam compactam pulveraceam supra planam vel subglobosam discum denudatum formantem excipientia. — Thallus crustaceo-pulverulentus leprosus granulosus plano-expansus adnatus uniformis.

Sect. I. CONYOCYBE Ach. in *act. holm.* 1816. p. 283. *Spreng. syst. 4.*
p. 306.

Receptacula pileolata disco floccoso-pulverulento.

1. *C. CANTHERELLUM* (Ach. lich. univ. 240.) crustâ tenui albicante subpulverulentâ, apotheciis lentiformibus disco incarnato demum rufescens albo-pulverulentis, stipitibus filiformibus nudis pallidis demum fuscescentibus nigrisque. — Ad ligna subputrida et corticem vetustam arborum. — Fl. fr. 5. p. 180. *C. pallidum* Pers. in *Ust. ann. bot. st. 7. t. 3. f. 1. 2.* *Cyphelium cantherellum* Cheval. (v. v.)

2. *C. FURFURACEUM* (Pers. tent. disp. frag. supp. p. 60.) crustâ effusâ leproso-pulverulentâ luteo-virescente, apothecis globosis stipitibusque filiformibus elongatis flexosis flavo-pulverulentis demum fuscis. — Ad terram, radices vegetabilium, corticem arborum et saxa. — *C. sulphureum* Fl. fr. 2. p. 600. *C. capitellatum*. Ach. lich. univ. t. 3. f. 7. *Sclerophora membranacea* Chev. fl. par. 1. p. 315. — eng. bot. t. 1539. (v. s.)

3. *C. PREVOSTII* (Duby mss.) crustâ effusâ leproso-cartilagineâ inæquabili albo-griseâ, apotheciis globosis pruinâ thalli adspersis demum rufo-fuscis stipitibusque concoloribus breviusculis strictis crassiusculis ex apice ad basin inerasatis branneo-pulverulentis. — Ad muros argillaceos Neustriæ detexit cl. Le Prévost. (v. s.)

4. *C. ACICULARE* (Ach. meth. 98.) crustâ leprosa pulvulentâ pallide flavo-virescente, apotheciis hemisphaerico-globosis stipitibusque rectis strictis sursum attenuatis fulvo-pulverulentis. — In cortice ramulorum demortuorum propè Beauvais ex cl. Graves. — Wahl. in nov. act. holm. v. 27. t. 4. f. 7. Cum *C. forsaceo* conjugendum censem cl. Sprengel forsitan non immixtum.

5. *C. GRACILENTUM* (Ach. lich. univ. p. 243. t. 3. f. 6.) crustâ tenui pulvulentâ cinereâ, apotheciis oblongo-globosis carneo-cinerascentibus pulvulentis, stipitibus longissimis capillaribus flexuosis nigris pulvulentis nudisve. — Ad corticem arborum propè Minatem (cl. Prost). — *Conyocybe gracilenta* Ach. in *act. holm.* 1. c. (v. s.)

Sect. II. CALYCIOS. — *Calycium* Spreng. l. c. — *Limboria*, *Cypheum* et *Calycium* Ach. in *act. holm.* 1815, 1816 et 1817.

Receptacula scyphuliformia disco pulveraceo aut nudo.

* *Apothecii stipitatis.*

6. C. CHRYSOCEPHALUM (Ach. meth. lich. supp. p. 15.) crustâ granulato-globulosâ citrinâ, apotheciis subtûbinatis disco convexo umbrino margine flavo-pulverulento, stipitibus filiformibus æruginoso-pulverulentis infernè nudis nigris nitidis. — In cortice Ulmi et Æsculi propè Parisios ex Cheval., Vire ex Delise. — eng. bot. t. 2501. C. citrinum Pers. — Turn. in trans. linn. 7. t. 8. f. 1. (v. s. ex Helv.)
7. C. CHLORELLUM (Ach. meth. 95. t. 2. f. 5.) crustâ tenuissimâ lævi albo-cinereâ, apotheciis obconico-tubinatis extùs flavo-viridibus pulverulentis disco umbrino, stipitibus sursùm incrassatis flavo-viridi-pulverulentis basi attenuatâ cinerascente. — In parietibus ligneis rariùs. (v. s. ex. Helv.)
f. *trabinellum* (Ach. syn.) crustâ tennissimâ albo-cinerascente, apotheciis lentiformibus cupulatis disco cinereo-pruinosis, stipitibus nigris crassiusculis. — Ad truncos annosarum Salicium propè Parisios ex Chev. — eng. bot. t. 1540. — Cyphelium cyathellum Cheval.
8. C. SÆPICULARE (Ach. lich. univ. 240.) crustâ cartilagineâ subsquamulosa pliato-rugosâ pallescenti tandem fuscescente, apotheciis lentiformibus fascis disco piano nigro margine subtûsque flavidantibus, stipitibus brunnneis nitidis cylindricis. — Ad sepimenta lignea abietina propè Parisios ex cl. Cheval. — Cyphelium sæpiculare Cheval. — Turn. in trans. linn. 8. t. 6. f. 1.
9. C. STEMONEUM (Ach. in act. holm. 1816. p. 278. t. 18. f. 15.) crustâ leproso-furfuraceâ incanâ aut æruginosâ, apotheciis frequentissimis subglobosâ demûm cyathiformibus margine incano-pulverulentis disco umbrino, stipitibus elongatis sursùm incrassatis fusco-nigris subpruinosis. — Ad corticem arborum et præcipue Abietis. — Schær. exsicc. n. 13. C. trichiale & stemonum Ach. syn. — Hall. helv. n. 2162. t. 48. f. 4. (v. s.)
10. C. TRACHELINUM (Ach. lich. univ. 237. excl. syn.) crustâ subcartilagineo-membranaceâ lævigatâ albâ, apotheciis turbinatis demûm planiusculis rufo-fuscis, stipitibus teretibus crassiusculis subnitidis basi atris. — Ad corticem annosarum arborum propè Parisios ex Chev., et probabiliter in omni Galliâ passim. — Cyphelium trachelinum Cheval. (v. s. ex. Helv.)
11. C. QUERCINUM (Pers. tent. disp. fung. supp. 59.) crustâ tenuissimâ subpulverulenta cinereâ, apotheciis turbinato-infundibuliformibus cinereo-fuscescentibus disco minuto demûm planiusculo, stipitibus breviusculis filiformibus. — Ad corticem Quercum. — Fl. fr. 2. p. 344. L. trachelinum & quercinum Ach. lich. et syn. Cyphelium quercinum Cheval. C. brevipes DC. fl. fr. 2. p. 345. est observante cl. Schærer C. quercinum cum crustâ Lichenis candelarii L. (v. v.)
12. C. CINEREUM (Pers. ic. et desc. fung. lips. t. 14.) crustâ subcartilagineo-membranaceâ subgranulatâ albo-virescente, apotheciis minutis cinereo-pulverulentis disco convexiusculo nigrescenti-olivaceo, stipitibus longiusculis fuscescentibus. — Ad corticem annosarum Quercum propè Parisios ex Chev. et Graves. — Ach. syn. 58. Cyphelium cinereum Cheval. An, ut vult cl. Sprengel cum & sequentis conjungendum.
13. C. HYPERELLUM (Ach. meth. 93.) crustâ cartilagineâ areolato-rugulosa glabra flavo-virescente, apotheciis lentiformibus ferrugineo-pulverulentis subtûs subtûbinatis, stipitibus validis cylindricis atro-piceis basi crassioribus. — In cortice squamosâ Abietis. — C. abietinum DC. fl. fr. 2. p. 344 non Pers. C. hyperellum Ach. syn. 59. excl. var. b. (v. v.)
f. *baliolum* (Ach. syn.) crustâ granulatâ viridi-flavâ, apotheciis atris nitidis disco airo demûm elabente, stipitibus elongatis flexuosis. — In cortice Betularum. — C. baliolum Ach. meth. t. 2. f. 4. Spreng. (v. s.)
g. *lygodes* (Ach. lich.) crustâ leprosa granulato-pulverulenta, apotheciis turbinato-leatiformibus pulvere cinerascente vel æruginoso-viridi adspersis, stipitibus elongatis filiformibus flexuosis. — In cortice Pini et Quercus. — C. viride Pers. C. lygodes Ach. meth. (v. s.)

638 ACOTYL. seu CELLULARES. CALYCUM.

14. *C. CLAVICULARIS* (Ach. meth. lich. 90.) crustâ effusâ granulato-rugulosa cinereâ, apotheciis turbinatis demum lentiformibus cinereo-nigris, stipitibus cylindricis crassiusculis atris. — Ad trabes, ligna denudata et corticem vetustam arborum. — *C. clavellum* Fl. fr. 2. p. 344. *C. salicinum* Pers. *C. roscidum* Pers. Spreng. *C. hyperellum* b. *roseidum* Ach. syn. 59. *Cyphelium claviculare* excl. var. et *Cyph. piceum* Chev. — eng. bot. t. 1465. (v. v.)

β. subtile (Wahlenb.) crustâ tenuissimâ submembranacea albicante, apotheciis minutis subglobosis stipitibusque gracilibus breviusculis nigris. — Ad ligna vetusta et in cortice Pinorum. — *C. subtile* Pers. Spreng. (v. s.)

15. *C. CORYNELLUM* (Ach. meth. 94.) crustâ leproso-pulverulentâ flavo-virescente, apotheciis lentiformibus atris opacis disco plano, stipitibus brevibus cylindricis atris. — In saxis. (v. s.)

β. paroicum (Ach.) crustâ subnullâ vel ferruginea, apotheciis turbinato-sublentiformibus, stipitibus brevissimis. — Parasiticum in Lecanora hæmatomma circa Mortefontaine propè Beauvais ex cl. Graves. — *C. paroicum* Ach. meth. t. 2. f. 3.

16. *C. SPHÄROCEPHALUM* (Achar. meth. lich. 41.) crustâ tenuissimâ membranacea lævigata cinerascente, apotheciis sublentiformibus disco subumbrino concavo demum intumescente margine pallidiore, stipitibus filiformibus cylindricis nigris. — Ad septimenta lignea prope Mimatem (cl. Prost.), Vire ex cl. Delise. — eng. bot. t. 414. Huic non vero *C. claviculari* refert cl. Sprengel *C. salicinum* Pers. (v. s.)

β. glaucellum (Ach. syn. 58.) crustâ subnullâ glaucâ, apotheciis turbinatis subtus et margine cinerascentibus disco planiusculo atro, stipitibus breviusculis. — In cortice Quercus cum priore. — *C. glaucellum* Ach. meth. (v. s.)

γ. Abietinum (Ach. l. c.) crustâ subnullâ cinereâ, apotheciorum disco prominulo. — In ligno denudato Abietis. — *C. abietinum* Pers. (v. s.)

* * Apothecia sessilibus aut subsessilibus.

17. *C. POPULNEUM* (de Brond. in act. soc. linn. parix.) crustâ tenui effusa lævigata albida, apotheciis atris minutissimis opacis sessilibus aut stipite brevissimo concolori cylindrico apothecii ferè diametro instructis. — Ad corticem Populi in Neustriâ (cl. Le Prévost). — Planta quoad affinitates valde incerta et probabiliter e Lichenibus rejicienda et ad Fungos aut Hypoxyla transferenda. (v. s.)

18. *C. TIGILLARE* (Ach. syn. 55.) crustâ areolato-verrucosa glabrusculâ citrinâ, apotheciis atris sessilibus opacis disco plano margine tumido. — Ad septimenta lignea et cortices Coniferarum. — *Lecidea tigillaris* Ach. meth. t. 2. f. 1. *Patellaria tigillaris* Fl. fr. 5. p. 181. — eng. bot. t. 1530. (v. s.)

19. *C. TYMPANELUM* (Ach. syn. 56.) crustâ tenui cartilaginea verrucosa albido-cinereâ scabré, apotheciis adnato-sessilibus disco plano cinereo-pruinoso nigro marginem tenuissimum subglaucem aequante. — Ad trabes et septimenta lignea Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), propè Parisios ex Cheval. — Ach. lich. univ. t. 3. f. 1. *C. leucomelas* Pers. Moug. et Nestl. crypt. vog. n. 859. *Cyphelium tympanellum* et *leucomelas* Ach. in act. holm. — eng. bot. t. 810. Apothecia pro genere maxima. (v. s.).

20. *C. sessile* (Pers. disp. fung. 59.) crustâ subcontigua inæquabili albicante, apotheciis sessilibus pyriformibus elongatis atris glabris nitidis, disco demum concavo margine crasso inflexo pallidiore. — Ad cortices, sæpe parasiticum in Lichenum crustis. — Fl. fr. 2. p. 345. eng. bot. t. 2520.

α. stigonellum, crustâ tenui aut nullâ, apotheciis superficialibus subglobosis disco minuto furfuraceo demum dilatao piano vel concavo, margine prominulo. — In thallo Pertusariæ communis (Porinæ pertusæ Ach.) parasiticum. — *C. stigonellum* Ach. *C. tympanellum* Moug. et Nestl. crypt. vog. n. 858. non Ach. (v. v.)

2. *turbanatum*, apotheciis substipitatis tubinato-cyathiformibus, disco intra marginem tamidum nudam punctiformi. — Ad cortices ant sepi- simè parasiticum ad thallum Pertusariæ vulgaris et Isidi coccodis. — *C. turbinatum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 345. *Sphaeria sphinctericia* DC. ex cl. Fries. (v. s.)
21. *C. ? sepincolum* (Dub. mss.) crustâ tenuissimâ subnudâ albicante, apotheciis variis immersis concavis demum erumpentibus elevatis planiusculis ei- nereo-pruinosis, limbo marginante tenui integerrimo tandem discreto patente hinc indè fisso. — Ad ligna sepimentorum propè Argentoratum (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 174.), Parisios ex Cheval. — *Schizoxylon sepincola* Pers. in act. weit. 2. t. 10. f. 9. *Limboria sepincola* Ach. in act. holm.; transl. Le Prév. t. 1. f. 4. *Patellaria ? sepincola* DC. fl. fr. 2. p. 181. Ut prioris varia- tem habet cl. Sprengel. (v. s.)
22. *C. ? sticticum* (Dub. mss.) crustâ subleproso-arachnoideâ sordide albo-ci- nerascente, apotheciis innatis minutissimis subglobosis totis atris opacis, disco punctiformi intra marginem tuimentem scabrinuscum subimpresso. — Ad corticem Quercûs, Pini et aliarum arborum. — *Verrucaria byssacea* Ach. syn. 97. Moug. et Nestl. crypt. vog. n. 854. *Cyphelium sticticum* Ach. act. holm. 1815. *Pyrenotea stictica* Fries. (v. s.)

+++ *Receptacula punctiformia aut plus minus elongata thallo crustaceo inserta.*

XX. OPEGRApha Pers. in Ust. ann. st. 7. p. 29. DC. fl. fr. 2. p. 307. — Ar- thonia, Opegrapha et Graphis Ach. lich. et syn. — Arthonia et Opegrapha Léon Duf. in journ. phys. et hist. nat. t. 87. p. 200 et seq. — Graphis, Asterisca et Platymma Meyer. Spreng.

Apothecia atra aut cæsio-pruinosa punctiformia rotundato-oblonga aut linear-elongata immersa innata emergentia aut sessilia longitudinaliter dehiscentia, e substantiâ propriâ formata, plerumque utrinque marginata. — Thallus tenuissimè crustaceus.

* *Apothecia nigra simplicia abbreviata oblonga.*

1. *O. VERRUCARIOIDES* (Ach. lich. univ. p. 244) crustâ albicante rugulosâ tenui, apotheciis minutis confertis subgloboso-ovatis disco punctiformi, interdùm ovatis disco rimæformi. — In træuis demortuis saxisque. — *Verrucaria sali- cina* DC. fl. fr. 2. p. 314. excl. syn. (v. v.)
- ε. hypolepta* (Ach.) crustâ membranaceâ lævigatâ cinerascente vel suboli- vaceâ, apotheciis crustæ subinnatis hemisphaerico - subconicis oblon- gisque. — Ad corticem arborum.
- γ. marmorata* (Ach.) crustâ tenui contiguâ albo-glaucescente, apotheciis minutis subrotundis oblongisque sparsis et confluentibus, disco clauso. — In cortice variarum arborum. (v. v.)
2. *O. HYSTERICOIDES* (Duf. journ. phys. 1818. t. 87. p. 215.) crustâ irregulari membranaceâ cinerascenti-albidâ, apotheciis confertis minutissimis subpa- rallelis interdùm divergentibus, disco rugosiusculo vix rimoso. — In ligno semi-putrido. — *O. verrucarioides* ♂ pepega Ach. lich. 245. *Hysterium ope- graphoides* DC. fl. fr. 2. p. 307. (v. s.)
3. *O. RADIATA* (Pers. in Ust. ann. st. 7. t. 2. f. 3. B.) crustâ membranaceâ de- terminatâ tenuissimâ lævigatâ aut subrimosa albida vel cinerascenti, apo- theciis crustæ adpressis planiusculis substellatis disformibus radiato-stellatis pedatisque rugosis. — Ad cortices arborum. — Fl. fr. 2. p. 308. excl. var. *β.* *Arthonia astroidea* Ach. syn. 6. *A. vulgaris* ♂ *astroidea* Scher. Status pri- marius Op. atræ ex Meyer. (v. v.)
4. *O. OBSCURA* (Pers. in Ust. ann. 7. t. 2. f. 3. B. et t. 3. f. 5. B.) crustâ subbor- biculari membranaceâ lævigatâ albo-fumosa aut subolivacea tenuissimâ, apo-

640 ACOTYL. SEU CELLULARES. OPGRAFHA.

theiciis minutis planis subdepressive ovali-ellipticis reniformibusque rugosiusculis. — In epidermide et cortice arborum. — Arthonia obscura Ach.

A. vulgaris γ obscura Schær. Opeg. radiata 2 Fl. fr. 2. p. 308. — eng. bot. t. 1752. (v. v.)

5. *O. SWARTZIANA* (Dub. mss.) crustā tenui cartilagineo-membranaceā subareolatā albida aut cinerea, apotheciis sessilibus crebris tumidulis subrotundis repandis irregularibus confluentibusque elevato-punctatis. — Ad corticem arborum. — Arthonia Swartziana Ach. in Schrad. u. journ. t. 3. p. 13. t. 4. f. 1. eng. bot. t. 2079. A. vulgaris α et β Schær. Status secundarius Op. atræ ex Meyer. (v. s.)
6. *O. SPHÆRULA* (Dub. mss.) crustā tenui cartilagineo-membranaceā rimosā glabriusculā albā nigro-lineolatā, apotheciis minutis crebris subglobosis semi-immersis a crustā elevatā circumcircā arctè cinctis. — Ad corticem arborum, circā Rothomagum (cl. Le Prév.). — Arthonia sphærula Ach. syn. — Species dubia et ex cl. Schær. et Le Prév. forsitan Lichenis cujnsdam initium. (v. s.)
7. *O. NOTHA* (DC. fl. fr. 2. p. 310.) crustā tenui leprosa albā aut cinerascente, apotheciis sessilibus orbicularibus cymbiformibus ellipticisve interdūm confluentibus, disco concavo marginibus prominentibus et inflexis demūm intumescente marginibus obliteratis. — Ad corticem variarum arborum. — *O. cymbiformis* Schær. spic. 1. p. 50.
 - α. *vulvella*, apotheciis sparsis minutis oblongo-ellipticis orbicularibusve, disco concavo marginibus inflexis. — *O. vulvella* Ach. meth. t. 1. f. 9. Fl. fr. 5. p. 169. *O. diaphora* Fl. fr. 5. p. 170. excl. syn. *O. rimalis* et *nimbosa* Ach. syn. 77 et 71. *O. cymbiformis* α *pulicaris* Schær. exsicc. n. 97. — *Lichen pulicaris* Hoffm. enum. t. 3. f. 2. c. (v. v.)
 - β. *lichenoides* (Schær.) apotheciis inajusculis plerisque orbicularibus, disco plano tandem convexo margines sāpe obliterante. — *O. lichenoides* Pers. in Ust. ann. st. 7. p. 30. t. 2 f. 4. a. b. *O. notha* Ach. syn. 76. eng. bot. t. 1890. (v. v.)
 - γ. *diaphora* (Ach. syn.) crustā sordidè albo-cinerascente, apotheciis majoribus plerisque subelongatis utrinque attenuatis, disco plano vel tumidulo margines tandem obliterante. — *O. diaphora* Ach. lich. eug. bot. t. 2280 non DC. *O. signata* Fl. fr. 2. p. 310. *O. hebraica* Duf. *O. cymbiformis* γ *hebraica* Schær. exsicc. n. 98. — Hoffm. enum. t. 3. f. 2. (v. v.)
8. *O. TESSERATA* (DC. fl. fr. 2. p. 313.) crustā crassā leproso-squamosā areolatā sordidè albā, apotheciis vix prominulis oblongis planiusculis subflexuosis simplicibus aut apice furcatis, disco rimæformi marginibus crassis elevatis persistentibus. — Ad rupes micaceas ferrugineas Alpium. (v. v. DC.)
9. *O. SAXATILIS* (DC. fl. fr. 2. p. 312. excl. syn. Dav. et Ach.) crustā tartareā pulverulentā albā sāpissimè nullā, apotheciis sessilibus prominulis minutis oblongo-rotundis linearibusve brevissimis in maculas parvas subrotundas sāpè confluentibus, disco concavo marginibus flexuosis demūm obliteratis. — Ad rupes et saxa rariū. — Schær. exsicc. n. 94. *O. Persoonii* eng. bot. t. 2345 non Ach. (v. s.)
10. *O. PERSOONII* (Ach. syn. 71 excl. syn. Dav., non eng. bot.) crustā tartareā levinsculā cohærenti inæquabili albicante, apotheciis innatis subrotundis oblongisve deñum rugosis flexuosis plicatis difformibus subconfluentibus, disco rimæformi irregulari subdehiscente. — Ad rupes ad lapidicinas propè Parnes circā Beauvais ex cl. Graves. — *O. rupestris* Pers.
11. *O. SAXICOLA* (Ach. syn. 71.) crustā effusa contiguā cinerea, apotheciis minutis subrotundis immersis planiusculis immarginatis, demūm majoribus prominulis convexis oblongis, disco rimæformi marginibus crassis divaricatis anguloso-carinatis. — Ad saxa Neustriæ ex cl. Le Prévost. — Hanc sp̄ciem præcedentemque cum *O. notha* conj. cl. Spreng.
12. *O. MACULARIS* (Ach. meth. 24.) crustā determinatā inæquabili fusco-atrā aut nullā, apotheciis minutis innatis subrotundo-ellipticis demūm rugosis et

tuberculosis disco rimæformi in maculas subrotundas congestis. — Ad corticem arborum. — *O. rugosa* Schær. *O. epiphega* eng. bot. t. 2882. *Dichæna macularis* Fries. *Heterographa macularis* Fee. — Dill. musc. t. 18. f. 2.

a. Faginea, apotheciis in maculas latae aggregatis indistinctis. — Ad corticem Fagi. — *O. Faginea* Pers. Fl. fr. 2. p. 308. (v. v.)

b. Quercina, apotheciis in maculas minores dispositis distinctis. — Ad corticem lœvem Quercus. — *O. Quercina* Pers. Fl. fr. 2. p. 307. (v. v.)

13. *O. HERPETICA* (Ach. meth. 23. a et b, syn. 72 excl. var. b.) crustâ submembranaceâ tenuissimè rimuloso-rugosâ fusco-olivaceâ nigrâ limitatâ, apotheciis minutis crustæ innatis confertis convexis oblongo-ovatis longiusculisque rectis disco rimæformi. — Ad cortices arborum. — Fl. fr. 2. p. 309. (v. v.)

* * *Apothecia nigra plus minus elongata ramosa.*

14. *O. ATRA* (Pers. in Ust. ann. 7. p. 30. t. 1. f. 2. B b. non Schrad.) crustâ suborbiculari membranaceâ determinatâ effusaâ albâ interdùm cinerascente-sordidâ, apotheciis sessilibus linearibus liberis flexuosis inordinate aut sèpiùs stellatim dispositis, disco canaliculato, marginibus prominulis. — Ad corticem arborum. — Schær. spic. 1. p. 48.

a. denigrata (Schær.) crustâ determinatâ membranaceâ albissimâ vel subolivaceâ, apotheciis confertissimis subnitidis longiusculis reticulatim anastomosantibus et in maculas subrotundas dispositis. — *O. atra* DC. fl. fr. 2. p. 310. *O. reticulata* Fl. fr. 5. p. 170. *O. stenocarpa* b. *denigrata* Ach. syn. 75. — eng. bot. t. 1753.

b. stenocarpa (Schær. exsicc. 93.) crustâ membranaceâ lœvigatâ sublimitatâ albicante aut nullâ, apotheciis sparsis convexis rugulosâ, disco rimæformi clauso. — *O. stenocarpa* Ach. lich. t. 3. f. 11. Fl. fr. 5. p. 170. (v. v.)

c. bullata (Schær.) crustâ subeffusaâ cinereo-albicante rugulosaâ, apotheciis confertiusculis variis sèpè radiatim dispositis abbreviatis. — *O. bullata* et *O. rimosa* Fl. fr. 2. p. 309 et 312. *O. hapalea* Ach. syn. 79. *O. gregaria* Cheval. (v. v.)

15. *O. LITHYRGA* (Ach. lich. 247.) crustâ tenui contignâ albo-cinerascente aut nullâ, apotheciis sessilibus minutis confertis ovalibus longiusculisque rectis et curvatis subteretibus opacis passim confluentibus, disco rimæformi. — Ad muros et saxa propè Parisios ex cl. Cheval., Argentoratum (cl. Moug. et Nestl.), in Alpibus. — Fl. fr. 5. p. 172. Moug. et Nestl. vog. n. 856 excl. syn. — Hanc speciem sequentemque cum *O. atrâ* conjungit cl. Sprengel. (v. s.)

16. *O. CALCARIA* (Ach. lich. 250.) crustâ tartareâ pulverulentâ albissimâ, apotheciis longiusculis rectis tumentibus opacis passim stellatim aggregatis, disco rimæformi. — In muris et saxis calcariis Jurassi (cl. Chaillet), Bellovacis ex cl. Graves, Neustriæ ex cel. Le Prévost. — Ach. syn. 72. eng. bot. 1790. (v. s.)

17. *O. ELEVATA* (DC. fl. fr. 5. p. 169.) crustâ effusaâ tenuissimâ albida subpulverulentâ æquabili, apotheciis elevatis crassis turgidis confertissimis subacervulatis ovali-oblongis demùm convexis rugosis, interdùm stellatim aggregatis difformibusve, disco canaliculato demùm planiusculo interdùm albo-pruinoso. — In ramis exsiccatis Juniperi Phæniceæ in insulis Stachadum (cl. Dufour). — Duf. in journ. phys. 87. l. c. (v. s.)

18. *O. RUFESCENS* (Pers. in Ust. ann. 7. t. 2. f. 3. Aa.) crustâ subeffusaâ tenuissimâ membranaceâ olivaceo-ant viridi-rufescente, apotheciis innatis primò ovatis demùm linearibus elongatisque flexuosis simplicibus ramosis vel stellatis, disco canaliculato planiusculo. — Ad corticem arborum. — Fl. fr. 2. p. 311. *O. siderella* Ach. syn. 79. *O. rubella* et *O. ænea* Fl. fr. 2. p. 309 et 5. p. 169. *O. herpetica* b. *disparata* Ach. syn. 73. (v. v.)

19. *O. ARGILLICOLA* (Dub. miss.) crustâ tenuissimâ effusaâ pulverulentâ virides-

642 ACOTYL. SEU CELLULARES. ORGRAPHA.

eente, apothecis innato-emergentibus turgidis subnitidis linear-lanceolatis simplicibus angulo-soque substellatis subobtusis, disco canaliculato demum planiusculo. — In muris argillosis Neustriæ superioris detexit cl. Le Prévost. (v. s. D.)

20. *O. TRIDENS* (Ach. lich. 263.) crustâ tenui effusa rimulosa sordide albicante nigro-punctatâ, apotheciis innato-emergentibus angustis elongatis confertis flexuosis simplicibus stellatisque ut plurimùm tricuspidatis, disco concavo in medio dilatato plano. — Ad corticem Fraxini et Salicis in Neustriâ. (cl. Le Prév.). (v. s. D.)

21. *O. KERASTA* (Ach. meth. 26. excl. var. 2.) crustâ tenuissimâ subdeterminata laevigata vel nitidula lactea vel cinerea, apotheciis innato-emergentibus minutis convexis rugulosis opacis variis, minoribus punctiformibus, majoribus longissimis exilissimis flexuosis subramosis, disco marginibusque tenuissimis. — Ad corticem laevem Aceris, Æsculi, Coryli, etc. — *O. dispersa* Fl. fr. 2. p. 308. (v. s.)

* * * *Apothecia nigra, disco pruinoso.*

22. *O. PRUINOSA* (Dub. mss.) crustâ crassâ latè effusa subtartareâ inæquabili rimoso-areolatâ albo-cinerascente, apotheciis planis immersis confertis subrotundo-polygonis difformibusve cæsio-pruinosis vix ab crustæ areolis distinctis, denique in vetustioribus obscurè fuscis. — Ad trabes vetustas et annosas cortices. — *Arthonia pruinosa* Ach. lich. 147. *Patellaria detrita* Fl. fr. 2. p. 352 excl. syn. — eng. bot. t. 981. *Spiloma decolorans* eng. bot. t. 2399 est tantum hujusce initium. (v. s.)

23. *O. GRUMULOSA* (Léon Duf. in journ. phys. t. 87. p. 216.) crustâ effusa albâ tartareâ crassissimâ friabili inæquabili pulverulentâ, apotheciis simplicibus depressis atris cæsio pruinosis ovato-rotundis confertis demum difformibus convexis, marginibus saepius flexuosis. — In rupibus calcareis Massiliæ propè Mont-Redon ex cl. Duf., *Aginnum* (cl. Chaubart), *Rothomagum* (cl. Le Prév.). (v. s. D.)

24. *O. CÆSIA* (DC. fl. fr. 2. p. 309.) crustâ effusa crassâ subtartareâ inæquabili laevi albâ, apotheciis innato-emergentibus simplicibus oblongo-ovatis interdum elongatis flexuosis, disco canaliculato aut planiusculo cæsio-pruinoso. — Ad corticem arborum annosarum. — *Arthonia lyncea* Ach. syn. 7. *Graphis cæsia* Spreng. — eng. bot. t. 809. *Forma O. nothæ* ex cl. Meyer et Schær. (v. v.)

25.? *O. LURIDA* (Dub. mss.) crustâ effusa tenui contiguâ cartilagineo-membranaceâ tenuissimè elevato-punctatâ fusco-lurida, apotheciis subrotando-difformibus tumidis laeviusculis. — Ad corticem Pinorum propè Mortfontaine in dictione dictâ Oise ex cl. Graves. — *Arthonia lurida* Ach. lich. 143.

26. *O. SULCATA* (Pers. in Mong. et Nestl. vog. crypt. n. 360.) crustâ tenui latè effusa submembranacea nitidâ granulatâ albida, apotheciis sparsis innato-emergentibus crassis elongatis angustis rectis subflexuosis simplicibus aut rariis ramoso-divaricatis, disco canaliculato interdum prainoso marginibus tumidis canaliculatis. — Ad corticem laevigatam arborum propè Dax (cl. Grateloup), Parisios ex Chev., Vire (cl. Delise), in sylva Briuebec (cl. Le Prév.), Vogesis (Moug. et Nestl.). — Fl. fr. 5. p. 171. *O. elegans* eng. bot. t. 1852. *Graphis elegans* Ach. (v. s.)

27. *O. SCRIPTA* (Ach. meth. 30.) crustâ membranacea laevigata aut inæquabili determinata subnitidâ albâ aut subcinerascente, apotheciis linearibus elongatis immersis emergentibusve confertiusculis flexuosis simplicibus ramosisque thallo corouatis interdum cæsio-pruinosis, disco angustissimo demum dilatato margines obliterante. — Ad cortices laeves arborum. — *Graphis scripta* Ach. syn. 81. — Dill. musc. t. 18. f. 1.

a. *limitata* (Ach.) crustâ tenui cinerascente aut nullâ, apotheciis emergentibus simplicibus flexuosis aut divaricato-ramosis, disco canaliculato

- nudinsculo, margine thallode tenui. — O. limitata Pers. Fl. fr. 2. p. 311.
(v. v.)
- β. Cerasi* (Ach.) crustâ tenui incanâ glaucescenti-nitidâ, apotheciis emergentibus rectis elongatis simpliciusculis parallelis, disco canaliculato subpruinoso, margine thallode tenui. — O. Cerasi Pers. Fl. fr. 2. p. 310. eng. bot. t. 2301. O. macrocarpa Pers. O. Betulæ Fl. fr. 5. p. 171. excl. syn. (v. v.)
- γ. pulverulenta* (Ach.) crustâ tenui effusâ albicante, apotheciis emergentibus flexuosis, disco canaliculato vel plano pruinoso, margine thallode tandem evanescente. — Schær. exsicc. n. 89. O. pulverulenta Pers. in Ust. ann. st. 7. t. 1. f. 2. B b. DC. fl. fr. 2. p. 311. — Fl. dan. 7. t. 1242. f. 1. (v. v.)
- δ. serpentina* (Schær.) crustâ crassiusculâ subpulverulentâ rugosâ, apotheciis immersis flexuosis elongatis confertis, disco pruinoso demum plano, margine thallode crasso tandem evanescente. — O. serpentina Ach. meth. Fl. fr. 2. p. 311. Graphis serpentina Ach. syn. 83. (v. v.)
28. O. BETULIGNA (Pers. in Ust. ann. bot. st. 7. t. 3. f. 5. A a.) crustâ tenuissimâ effusâ leviusculâ subnitidâ albâ, apotheciis immersis linearibus subsimplicibus ellipticis elongatis stellatisque, disco rimæformi subpruinoso, margine thallode elevato submembranaceo. — Ad corticem Fraxini et Betulæ propè Mimatem (el. Prost), Parisios ex cl. Cheval. — Graphis betuligna Ach. Prioris forsan varietas? (v. s.)
29. O. MEDUSULA (Pers. in act. wett. 2. p. 15. t. 10. f. 1.) crustâ tenuissimâ albida aut nullâ, apotheciis subimmersis radiatis ramosis bifurcatis subpruinosis maculas suborbiculatas conficientibus. — In corticibus rariis. — Fl. fr. 5. p. 171. Op. scripta ζ dendritica Schær. Asterisca Medusula Meyer Spreng. (v. s.)
30. O. DENDRITICA (Ach. meth. t. 1. f. 10.) crustâ subcartilagineâ inaequabilis albissimâ, apotheciis immersis ramosis flexuosis interdum pruinosis ramis divergentibus furcatis acutis, disco lato plano, margine proprio subnullo thallode subevanido. — In cortice arborum. — eng. bot. t. 1756. Arthonia dendritica Duf. Graphis dendritica Ach. lich. Platygramma dendriticum Mey. Spreng. Cum priori ut variet. Op. scriptæ conjugit cl. Schær. (v. v.)
31. O. MARGINATA (Dub. mss.) crustâ subdeterminata membranacea levissimâ cinereo-olivacea subnitidâ, apotheciis nigro-cæsiis crassis erumpentibus oblongis longiusculisque simplicibus multifidisve promipulis margine spurio crustaceo incrassato albidissimo obtuso limbatis, disco planiscuto nudo. — Ad corticem Quercùs in Galliâ austro-occidentali ex cl. Léon Duf. — Arthonia marginata Duf. in journ. phys. t. 87. p. 205. Cum O. Lyellii eng. bot. t. 1876 conjugit cl. Sprengel.

XXI. STIGMATIDIUM Meyer nebenst. 1. p. 328. — Opegraphæ sp. DC.

Apothecia punctiformia aggregata subseriata aut singula, immersa, indehiscentia, e substantia propriâ formata, margine destituta. — Thallus crustaceus crassus.

1. S. CRASSUM (Dub. mss.) crustâ crassâ inaequabili undulatâ glabra grisea olivacea aut viridescente rimulosa lineolis nigris decussatâ, apotheciis minutissimis subhemisphæricis solitariis aut in lineolas variè flexuosas stellatimque radiantes confluentibus. — Ad corticem variarum arborum in provinciis occidentalibus. — S. obscurum Spreng. excl. synon. Opegrapha crassa DC. fl. fr. 2. p. 314. Porina aggregata et P. taxicola Ach. syn. 112 et 113. Arthonia crassa Duf. Cum Opegraphâ obscurâ Pers. conj. cl. Spreng. sed ut videtur immerito. (v. s.)

644 ACOTYL. SEU CELLULARES.

†††† *Apothecia tuberculata aut plus minus rotunda thallo crustaceo aut crustaceo-cartilagineo inserta.*

XXII. VERRUCARIA Pers. in Ust. ann. bot. st. 7. p. 22. DC. fl. fr. 2. p. 313.
Schær. spic. 2. p. 53. — Verrucaria et Pyrenula Ach. syn. 87 et 117.

Apothecia a thallo plerūmque discolora hemisphaerica vel spheroidea, immersa innata aut sessilia cornea unilocularia e substantiā propriā formata, apice papillulā vel ostiolo instructa, interdūm thallo velata (Pyrenula Ach.). — Thallus crustaceus.

* *Corticolæ.*

1. *V. GALACTITES* (DC. fl. fr. 2. p. 315.) crustā tenuissimā lèvi subeffusā albā, apotheciis minutis sparsis convexiusculis subrotundis difformibusque, ostiolo minutissimo. — Ad corticem teneram et lèvem in ramis arborum. — Arthonia punctiformis & galactina Ach. (v. v.)
2. *V. EPIDERMIS* (Ach. meth. 118.) crustā tenuissimā effusā lacteā aut cinerascente, apotheciis minutis convexis subrotundo-ellipticis innatis circumcircā plano-depressis papillulā minimā instructis interdūm apice depresso. — In tenerā epidermide Betulæ albæ. — Fl. fr. 2. p. 313. Sphæria epidemidis Fries syst. myc. 2. p. 499. (v. v.)
& Cerasi (Ach.) crustā nitidā argenteo-plumbeā. — In cortice Pruni, Cerasi et Quercūs. — *V. Cerasi* Schrad. Fl. fr. 2. p. 315. (v. v.)
3. *V. PUNCTIFORMIS* (Pers. in Ust. ann. st. 11. p. 19. non DC. fl. fr. 2. p. 314.) crustā tenuissimā subdeterminatā lèvigatā fuscescente aut subnudā, apotheciis minutis hemisphaerico-subglobosis convexiusculis subastomis, nucleo globoso albo. — In cortice lèvi ad ramos arborum. — *V. hyloica* et *microcarpa* Fl. fr. 2. p. 315. (v. v.)
& atomaria (Ach.) crustā cinerascente plumbeā nitidiusculā, apotheciis hemisphaerico-conoideis globosive, ostiolo impresso papillatove. — *V. atomaria* et *hippocastani* Fl. fr. 2. p. 313. et 314. (v. v.)
4. *V. RHYPONTHA* (Ach. lich. univ. 282.) crustā tenuissimā maculari elevato-punctatā scabritusculā fuligineo-atrā, apotheciis minutissimis hemisphaerico-conoideis intus albicantibus. — Ad corticem ramorum Tiliæ, Fraxini, Ulni, Fagi Vogesorum (cl. Le Prévost), Parisiorum (Dr E. Mercier), Jurassi (cl. Chaillet), Mimatis (cl. Prost). — Fl. fr. 5. p. 172. (v. s.)
5. *V. CINEREA* (Pers. in Ust. ann. bot. st. 7. t. 3. f. 6. A.) crustā tenui cartilagineo-membranacea effusā demūm rimulosā albicante, apotheciis minutis hemisphaericis confertis subconfluentibus subastomis, nucleo globoso cinerascente. — Ad corticem lèvem arborum et fruticum. — Schrad. spic. t. 2. f. 2. *V. stigmatella* Ach. syn. 89. (v. s.)
& lactea (Ach.) crustā lèviusculā lacteā, apotheciis minutis sparsis pertusis, majoribus subpapillatis, intus albo-hyalinis. — Ad corticem Juglandis propè Mimatem (cl. Prost). (v. s.)
6. *V. ALBA* (Schrad. spic. 169. t. 2. f. 3.) crustā effusā tenui membranacea lèvigatā albida tandem sordidè cinerascente et evanidā, apotheciis sparsis innatis hemisphaericis papillatis nitidis, nucleo globoso hyalino. — In cortice arborum. — Schær. exsicc. 105. *V. gemmata* Ach. meth. t. 3. f. 1. Fl. fr. 2. p. 315. *V. melaleuca* Ach. meth. 116. (v. v.)
7. *V. GLABRATA* (Ach. syn. 91.) crustā tenuissimā effusā cartilagineo-membranacea lèvigatā albā, apotheciis sparsis aggregatisque hemisphaerico-conoideis papillatis, cavitate internā amplissimā vacuā, nucleo emarcido humectato nigro. — Ad arborum corticem rariū. — Schær. exsicc. 110. *V. lèvigata* Pers. Hanc à priori non diversam volunt cl. Meyer et Sprengel. (v. s.)
8. *V. CAVATA* (Ach. syn. 91.) crustā effusā tenui inæquabili cinereā, apotheciis junioribus subgloboso-hemisphaericis subastomis, reliquis subtruncatis mar-

ginatis, disco depresso, papilla centrali, intus vacuis nucleo emarcido. — Ad corticem arborum propè Ermenonville ex cl. Graves. — Verr. albæ var. ex cl. Sprengel.

9. *V. OLIVACEA* (Pers. in Ust. ann. st. 7. t. 3. f. 6. B. a. b.) crustâ tenui nitidâ sub-olivaceâ sublimitatâ, apotheciis subsessilibus sparsis hemisphærico-conoideis hemisphæricisque papillatis, nucleo albo. — Ad cortices lœves. — Fl. fr. 5. p. 172. *V. punctiformis* Fl. fr. 2. p. 314. excl. syn. *V. analpta et carpinea* Ach. meth. 119 et 120; syn. 80. (v. v.)

10. *V. NITIDA* (Schrad. journ. bot. 1801. st. 1. p. 79.) crustâ cartilagineo-membranaceâ nitidâ ex albido-olivaceâ tenui effusâ lineolis obscurioribus percursâ, apotheciorum verrucis thalloideis conicis apothecii supremam partem prominentem nudam rugulosam demùm ostiolo depresso perforatam arctè cingentibus, nucleo albo vel cinerascente demùm emarcido. — Ad corticem truncorum Fagi, Coryli, Carpini, etc. — Fl. fr. 2. p. 316. *V. maxima* Fl. fr. 2. p. 316. *V. populnea* DC. syn. gall. 67. *Pyrenula nitida* Ach. Moug. et Nestl. vog. n. 365. *Sphaeria nitida* Weig. obs. t. 2. f. 14. (v. v.)

11. *V. LEUCOCEPHALA* (Ach. meth. 116. excl. syn. Ehr. et Hoffm.) crustâ leprosâ submembranaceâ rimulosâ fuscescenti-cinereâ, apotheciorum verrucis thalloideis clavis apothecii maximam partem prominentem subglobosam albo-pulverulentam suprà pertusam arctè cingentibus, nucleo albo. — Ad cortices arborum in sylvis propè Argentoratum (cl. Moug. et Nestl.), Rothomagnum (Le Prév.). — *Pyrenothea fuscella* Fries lich. suec. fasc. 7. n. 194. (v. s.)

β. amphibola (Ach.) crustâ cartilagineo-membranaceâ rimoso-areolatâ inæquabili albâ cæsiâque, ostiolo demùm dilatato marginato. — Ad cortices propè Parisios (DC.), Beauvais (Graves). — *Variolaria leucocephala* DC. fl. fr. 5. p. 176. *Pyrenothea lencocephala* Fries in vet. act. holm. 1821. p. 333. lich. exs. n. 18. *Cyphelium picastrum et leucocephalum* Ach. in vet. act. holm. 1815. p. 265 et 1817. p. 228. *Lecidea abietina* Ach. lichen. 188. (v. s.)

* * *Saxicolæ aut rariū terricolæ.*

12. *V. ERGÆA* (Ach. meth. 123.) thallo tenui effuso inæquabili pallidè lutescenti humectato subgelatinoso sicco pulveraceo, apotheciis globosis immersis atris minutissimis apice sæpè perforatis intùs nigris. — Ad terram limosam propè Mimatem (cl. Prost). — Schær. exsicc. n. 106. — eng. bot. t. 1681. (v. s.)

13. *V. RUPESTRIS* (Schrad. spic. 109. t. 2. f. 7.) crustâ tenui contiguâ effusâ tartareâ albâ vel cinerascente, apotheciis minutis confertis subglobosis intùs sordidè hyalinis, junioribus immersis, adultioribus ex crustæ faveolis emergentibus poro apice notatis. — In rupibus calcareis. — Schær. spic. 2. p. 54.

a. Schraderi (Schær. exsicc. 103.) crustâ albâ vel cinerascente, apotheciis mediae magnitudinis. — *V. rupestris* DC. fl. fr. 2. p. 310. *V. Schraderi* Ach. meth. 114. (v. v.)

β. calciseda (Schær. exs. 104.) crustâ albissimâ, apotheciis numerosis minutissimis. — *V. calciseda* DC. fl. fr. 2. p. 317. Ad hanc speciem ut varietatem oxydo quodam coloratam refert cl. Meyer Lecideam Wulfenii b. pururascentem Ach. lich. univ. 210. (v. v.)

14. *V. HARRIMANNI* (Ach. lich. 284.) crustâ tartareâ contiguâ limitato-determinata tenuissimè impresso-punctatâ murinâ, apotheciis minutis subglobosis immersis papillâ conicâ prominentibus intùs sordidè albis. — Ad lapides calcarios duros propè St.-Malo ex cl. de Brébisson, Beauvais ex cl. Graves.

15. *V. CÆRULEA* (DC. fl. fr. 2. p. 318.) crustâ tartareâ tenuissimè rimulosâ sub-contigua determinata plumbeâ, apotheciis subglobosis suprà demùm depresso scutelliformibus intùs albis, junioribus immersis, adultioribus ad dimidiam ferè partem emergentibus. — In rupibus calcareis Pyrenæorum, Jura, Rothomagi (cl. Le Prév.). — *V. plumbea* Ach. lich. 285. Fl. fr. 5. p. 173. — eng. bot. t. 2540. (v. v.)

16. *V. GLAUCINA* (Ach. syn. 94.) crustâ crassiusculâ subcontigua determinata

646 ACOTYL. SEU CELLULARES. VERUCARIA.

rimoso-areolata griseo-aut viridi-fuscescente, apotheciis confertis immersis demum semi-immersis parte prominente hemisphaericâ demum pertusâ, intus hyalinis. — Ad muros lateritios et saxa circa Rothomagum (cl. Le Prevost). (v. s.)

17. V. MACROSTOMA (DC. fl. fr. 2. p. 309.) crustâ crassinsculâ subcontigua determinatâ nigro-limitatâ rimoso-areolata fusco-olivacea, apotheciis confertis immersis demum semi-immersis parte prominente convexâ, centro prominulo interdum depresso, nucleo albicante. — Ad muros et rupes calcarias passim. (v. s.)
18. V. DUFOURII (DC. fl. fr. 2. p. 318.) crustâ leprosa vel tartarea contignâ nigro-limitatâ albescente aut murinâ, apotheciis truncato-conicis umbilicatis semi-immersis, nucleo demum lenticiformi hyalino. — Ad muros et lapides rarius. — Schær. exs. 101. V. pyrenophora Ach. univ. 285. t. 4. f. 3. (v. s.)
19. V. RUBELLA (Chaub. in St.-Am. agen. 483.) crustâ tenui effusa rubella aut albescente tartarea inæquabili rimulosâ, apotheciis hemisphaericis conicisve amplis papillatis demum ostiolo pertusis, nucleo albo. — In calcareis et muris antiquis propè Aginnum, Rothomagum (cl. Le Prev.). (v. s.)
20. V. ACTINOSTOMA (Ach. lich. 238.) crustâ tartarea rugosa rimoso-areolata albâ, apotheciis subglobosis immersis umbilicatis marginatis, papillula pulvere albo radiata, intus albis. — Ad saxa silacea Galliae ex Ach., Parisiorum ex Cheval, Bellovacis ex Graves. — Thelotrema radiatum Pers.
21. V. EPIPOLÆA (Ach. lich. univ. 285.) crustâ tartaro-pulveraceâ tenui contigua inæquabili cinerascente aut sordidâ, apotheciis hemisphaerico-globosis sessilibus papillatis ostioloque pertusis, nucleo albo hyalino. — Ad saxa Miamitis (Prost), Neustriæ (Le Prev.). (v. s.)
22. V. MURALIS (Ach. meth. 115.) crustâ leproso-tartarea rimosa albâ tenuissimâ aut subnudâ, apotheciis subglobosis immersis papillatis, ostiolo demum dilatato albo pruinoso marginato, intus nigricantibus. — In ruderibus et muris. — V. ruderum et concentrica Fl. fr. 2. p. 318. (v. v.)
23. V. NIGRESCENS (Pers. in Ust. ann. bot. st. 14. p. 36.) crustâ tartarea subrimosa inæquabili cinerascente fusca aut fusco-atrâ, apotheciorum verrucis thalloideis ad basin ampliatis depressis subrugulosis clausis apothecii maximam partem prominentem papillatam arcte cingentibus, nucleo cinereo-nigricante. — In rupibus et lapidibus. — Fl. fr. 2. p. 319. V. umbrina Ach. Pyrenula nigrescens Ach. syn. 126. Crusta occurrit etiam subumbrina et fere atra. (v. v.)
24. V. ÆTHIOBOLA (Ach. lich. 202, excl. var. 2.) crustâ tartarea tenui contigua subrimosa cinerascenti-umbrinâ, verrucis thalloideis clausis apothecii maximam partem prominentem globosam ostiolo marginato nitido terminatam arcte cingentibus, nucleo hyalino. — In Vogesorum rivulis (cl. Le Prev.). — Pyrenula æthiobola Ach. syn. 125. Variat crustâ cinerascente, fuscescente nigricanteque. Hanc et tres sequentes conjungit cl. Sprengel. (v. s.)
25. V. MAURA (Ach. meth. supp. 19.) crustâ tartarea tenui lavigatâ tenuissimâ rimosissimâ aterrimâ, apotheciis minutis subglobosis immersis apice umbilicata prominentibus, nucleo nigricante. — Ad littora Oceani in Neustriâ (cl. Le Prev.). (v. s.)
26. V. MUCOSA (Ach. meth. lich. supp. 23.) crustâ humidâ mucoso-gelatinosa siccâ continuâ lavigatâ nigro-virescente, apotheciis minutis subglobosis immersis papillula vel ostiolo prominentibus, intus sordide albis. — Ad ripas in lapidibus et petris aquâ suffusis propè Mimatem (cl. Prost), Falaise ex de Bréb. (v. s.)
27. V. ACROTELLA (Ach. meth. 123.) crustâ effigurato-dendriticâ limitata fusco-nigricante, areolis discretis dispersis difformibus, apotheciis conoideis subsessilibus primum papillatis demum supra concavis marginatis nucleo punctiformi hyalino. — In saxis quartzosis Neustriæ (cl. Le Prevost). — V. striatula b. acrotella Ach. syn. 95. (v. s.)

28. *V. CLOPIMA* (Ach. meth. supp. 20.) crustâ tartareâ rimoso-areolatâ verrucosâ badiâ, apotheciorum verrucis thalloideis lèvigatis apothecii ostiolum prominens marginatum papillulâ centrali instructum margine crassissimo cingentibus, nucleo sordidè albicante. — Ad rupes balsaticas montis Aubrac (cl. Prost). — *Pyrenula clopima* Ach. syn. 120. (v. s.)
29. *V. TESSELLATA* (Ach. meth. 115.) crustâ tartareâ rimoso-areolatâ inaequabili cinereo-lutescente, verrucis thalloideis ad basin ampliatis depressis subrugulis clausis apothecii subglobosi maximam partem prominentem papillatam arctè cingentibus, nucleo sordidè hyalino. — Ad muros lateritios circa Rothmagum (cl. Le Prév.). — *Pyrenula tessellata* Ach. syn. 126. (v. s.)

**XXIII. PATELLARIA Hoffm. lich. Ach. prod. 36. DC. fl. fr. 2. p. 345.
excl. sect. iv. — Lecideæ sp. Ach. Lecidea et Patellaria Mey. Spreng.**

Apothecia a thallo discolora scutelliformia sessilia membranâ cartilagineâ coloratâ undique vestita, disco æquabili immarginato aut margine concolore demùm evanescente cincto. — Thallus crustaceus expansus adnatus uniformis aut areolatus.

Sect. 1. PATELLASTRUM. — *Patellaria* DC. l. c.

Thallus crustaceus uniformis simplex.

* *Patellis nigris intus concoloribus.*

1. *P. CARPHINA* (Dub. mss.) crustâ subeffusâ tartareâ rimoso-areolatâ albo-pallescente, apotheciis consertis crustæ innatis hemisphaericis demùm concaviusculis subimmarginatis atris intùs concoloribus. — In saxis Mimatis (cl. Prost), Neustriæ propè la Pernelle (cl. Le Prév.). — *Lecidea carphina* Ach. lich. 157. (v. s.)
2. *P. CORACINA* (Dub. mss.) crustâ diffusâ lèvigatâ rimoso-areolatâ cinerascente-nigrâ, apotheciis intrâ areolas immersis planis demùm convexiusculis subangulosis atris intùs concoloribus, antiquioribus pulvrenentis marginatis. — Ad rupes in Vogesis (cl. Mougeot et Nestl.), circa Parisios ex Cheval., Falaise ex de Bréb. — *Lecidea coracina* Ach. syn. 11. Mong. et Nestl. vog. n. 462. *Lecidea morio* & *coracina* Schær. lich. exs. n. 182. (v. s.)
3. *P. PETREA* (DC. fl. fr. 2. p. 348.) crustâ tenui orbiculari subpalvulentâ aut æquabili subrimulosâ albo-aut griseo-cinerascente, apotheciis crustæ innatis crassis protuberantibus sèpè subconcentrice dispositis atris intùs concoloribus, disco plano demùm convexo, margine tumido elevato subcoartato demùm evanescente. — In rupibus. — *Lecidea petræa* Ach. — Hoffm. lich. t. 50. f. 1. 2. et t. 57. f. 1. — Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 6. f. 2 a. (v. v.)
- 4? *P. CRENATA* (DC. fl. fr. 2. p. 349.) crustâ determinatâ subgranulosâ rimulosâ atro-limitatâ cinerascente, apotheciis rotundatis planis atris intùs concoloribus, margine exerto crenato concolore. — In rupibus silaceis propè Parisios. (Abest in herb. DC. et Duby.)
5. *P. ULIGINOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 350.) crustâ effusâ granulatâ subgelatinosâ cinereâ aut fusco-nigrâ, apotheciis adpressis planiusculis marginatis demùm convexis consertis atris intùs concoloribus. — Suprà terram in locis turfosis uliginosis. — *Lecidea uliginosa* et *fuliginea* Ach. syn. 25 et 35. Mong. et Nestl. vog. n. 747. *S. microphylla* & *uliginosa* Schær. spic. 3. p. 112. — eng. bot. t. 1466. (v. s.)
5. *humosa* (Ach.) crustâ leprosâ fusco-atrâ, apotheciis atris immarginatis demùm subglobosis. — *Verrucaria humosa* Hoffm. (v. s.)
6. *P. NIGRA* (Spreng. syst. veg. 4. p. 268.) crustâ suborbiculatâ fuligineo-atrâ subgelatinosâ maxime adhærente diffracto-areolatâ subsquamulosâ, squamulis marginalibus inciso-crenatis centralibus graniformibus, apotheciis adpressis nigris marginatis demùm convexis. — Ad lapides calcarios. — *Collema nigrum* Hoffm. DC. fl. fr. 2. p. 381. Ach. syn. 308. *Lecidea microphylla* & *corallinoides* Schær. — eng. bot. t. 1161. (v. v.)

648 ACOTYL. SEU CELLULARES. PATELLARIA.

7. *P. FUMOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 349.) crustâ subcartilagineâ rimoso-areolatâ determinatâ lavigatâ cinereo-fuliginosâ, apotheciis crustæ innatis planis marginatis demum convexis conglomeratisque immarginatis atris, intus cinereo-nigricantibus. — In lapidibns petrisque apricis siccis. — Lecidea sumosa Ach. syn. 12. *L. cechumena* α et β Ach. lich. excl. syn. *L. athroocarpa* Ach. meth. 41. — Hoffm. lich. t. 49. f. 2. — Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 5. (v. s.)
8. *P. MURINA* (Dub. mss.) crustâ tenui contiguâ effusâ, apotheciis minutis sessilibus crassis glabris nitidis atris intus eoncoloribus, disco depresso demum convexo, margine tumido integro demum evanescente. — Ad saxa silacea Nenstriae (cl. Le Prév.). — Lecidea murina Ach. lich. 171. (v. s.)
9. *P. PANTOSTICTA* (Dub. mss.) crustâ effusâ rimoso-areolatâ albo-cinerascente, areolis planis, apotheciis tenuibus crustæ immersis planis latiusculis margine tenui instructis demum confluenti-diformibus immarginatis atris. — Ad saxa propè Mimatem (Prost), Fontainebleau (Dr. E. Mercier). — Lecidea pantosticta Ach. lich. 154. (v. s.)
10. *P. AMBIGUA* (Dub. mss.) crustâ tenui orbiculari limitatâ rimosâ cinereâ aut albescente, apotheciis minutis, junioribus crustæ immersis margine thallode exiguo demum evanescente cinctis, adultis superficialibus subimmarginatis, omnibus planis atris intus eoncoloribus. — In saxis Mimatis (cl. Prost). — Lecidea ambigua Ach. (v. s.)
11. *P. CEREBRINA* (Dub. mss.) crustâ tartareâ effusâ contiguâ pulverulentâ tenuissimâ plicato-gyrosâ aut subnullâ albissimâ, apotheciis subimmersis sessilibusque concavis atris intus eoncoloribus margine elevato flexuoso-diformibus. — Ad lapides Mimatis (cl. Prost), Pyrenæorum (cl. Ramond), Parisiorum (Dr. E. Mercier). — Lecidea plocina Ach. lich. 155. Opegrapha cerebrina Ram. in DC. fl. fr. 2. p. 312. (v. s.)
12. *P. CLAVUS* (DC. fl. fr. 2. p. 348.) crustâ tenui albissimâ subpulverulentâ, apotheciis primò sessilibus planis margine tenui cinctis, demum proeminentibus subpodicillatis convexis. — In rupibus calcario-arenosis montis Marboré in Pyrenæis. — Hanc Lecideæ amylaceæ Ach. refert. cl. Schærer et cum *P. speireâ* sub nomine Lecideæ calcariæ conjungit. (Abest in herb. Cannoll. et Dub.). †
13. *P. ALBA* (Dub. mss.) crustâ membranaceâ subrimosâ albida pulvere conglomerato albo vel viridi-lacteo demum conspersâ, apotheciis sparsis minutis adpressis planis submarginatis atris. — In muscis, arborum truncis et rariis saxis. — Lecidea alba Ach. lich. Lepra lactea DC. fl. fr. 2. p. 322. Lichen lacteus Hoffm. enum. t. 1. f. 3. eng. bot. t. 1349. Apothecia raro profert. (v. v.)
14. *P. COMMUTATA* (Dub. mss.) crustâ tenui cartilagineo-membranaceâ demum pulvere granuloso conglomerato albido-subvirescente subobtectâ, apotheciis sparsis sessilibus marginatis margine elevato flexuoso crassiusculo integerrimo atris intus eoncoloribus. — Ad corticem truncorum Pini Piceæ in Vogenesis (cl. Mougeot). — Lecidea commutata Schær. in litt. ex cl. Mong. Lecanora commutata Ach. lich. 352; syn. 149. (v. s.)
15. *P. PARASEMA* (DC. fl. fr. 2. p. 347.) crustâ tenui submembranaceâ griseo-albidâ nigro-limitatâ demum effusâ subgranulatâ, apotheciis sparsis planisculis sessilibus marginatis margine demum evanescente atris, intus nigricantibus. — In cortice arbórum frequens. — Lecidea parasema Ach. syn. 17 excl. var. c. rugulosâ. — Lichen sanguinarius Hoffm. enum. t. 5. f. 3. 4. (v. v.)
- B. punctata* (Ach.) crustâ tenui effusâ cinereâ vel glaucescente et subnullâ, apotheciis ut plurimum minantis demum convexusculis integerrimis confertis. — *P. punctiformis* Fl. fr. 2. p. 346. Verrucaria punctiformis Hoffm. germ. 2. p. 193. non Pers. nec DC. (v. v.)
- y. myriocarpa* (Ach.) crustâ effusâ subleprosa inæquabili pulverulentâ cinerascente aut nullâ, apotheciis minutis confertissimis convexis immarginatis. — *P. myriocarpa* Fl. fr. 2. p. 346. (v. v.)

16. *P. GLOMERULOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 347.) crustâ crassâ pulvaceo-granulosâ cinerascente nunquam nigro-limitata, apotheciis sparsis planiusculis demum convexis immarginatis. — In cortice arborum. — An satis à priore distincta? (v. s.)

17. ? *P. MACROCARPA* (DC. fl. fr. 2. p. 347.) crustâ tenui griseo-rufescente subnullâ, apotheciis sparsis maximis concavis marginatis, demum planis immarginatis. — In Alpibus ad rupes micaceas. (Abest in herb. DC. et Dub.) †

18. *P. CITRINELLA* (Dub. mss.) crustâ leprosa granulato-pulverulentâ flavo-virescente, apothecis sessilibus confertis marginatis atris intus concoloribus, demum convexis immarginatis confluentibusque. — Ad terram in sylvis suprà muscos destructos aut crustæ Bæomycæ rufi parasitica propè Mimatem (cl. Prost), Vire ex cl. Delise, in sylvâ Compiègne ex Graves. — Lecidea citrinella Ach. in nov. act. holm. v. 16. t. 5. f. 5. (v. s.)

19. *P. SABULETORUM* (Spreng. syst. veg. 4. p. 264.) crustâ effusa granulata subverrucosa tenui cinereo-albidâ interdum subvirescente, apotheciis confertis sessilibus primâ planis marginatis demum convexis hemisphæricisque subconfluentibus immarginatis atris intus subpulveraceis concoloribus. — Suprà muscos destructos inque terrâ nudâ passim. — Lecidea sabuletorum Ach. syn. 20. *L. miliaria* Fries? (v. s.)

β. geochroa (Wahlemb.) crustâ effusa granulata subcohærente albida cæsiâ vel cinereo-fuscâ, apotheciis hemisphæricis subglobosis sæpè confertis conglomeratis confluentibus subnitentibus. — *P. muscorum* Fl. fr. 2. p. 349. Lecidea muscorum *β. geochroa* Ach. lich. 179. — Jacq. coll. 4. t. 7. f. 1. — eng. bot. t. 626. (v. v.)

γ. euphorea (Flörke) crustâ effusa granulato-verrucosa subareolata albida cinereâque, apotheciis subdistinctis confertissimisque semi-immersis sessilibusque plano-convexis marginatis. — In ligno vetusto.

20. *P. DOLOSA* (Dub. mss.) crustâ subgranulato-pulverulentâ ferrugineo-cinerascente, apotheciis superficialibus sparsis atris intus concoloribus, junioribus planis marginatis integris, demum flexuosis convexisque immarginatis. — In cortice squamosâ Pini et Abietis passim circa Mimatem (Prost), Beauvais ex Graves. — Lecidea dolosa Ach. syn. 19. Hanc speciem nihil esse nisi Lecideam sabuletorum leprâ rubenti coloratam affirmat cl. Meyer nebenst. 1. p. 62. (v. s.)

* * *Patellis nigris intus corneis.*

21. *P. PREMNEA* (Dub. mss.) crustâ tenui diffusa submembranacea contigua subtartarea cinerascente, apotheciis majusculis sessilibus atris intus corneis concoloribus, strato sub disco cartilagineo albo, junioribus planis margine elevato integro, demum rotundatis margine flexuoso aut subevanescente. — Ad trunco arborum in provinciis boreali-occidentalibus. — Lecidea premnea Ach. syn. 17. (v. s.)

22. *P. GELATINOSA* (Dub. mss.) crustâ membranacea gelatinosa nitenti-viridi, apotheciis adpressis planiusculis immarginatis sæpè confluentibus atris intus corneis, demum convexiusculis subirregularibus. — Suprà terram propè Bruyères (cl. Mong. et Nestl. vog. n. 843.) — Lecidea gelatinosa Flörke Ach. (v. s.)

23. *P. CONFLUENS* (Dub. mss.) crustâ crassâ tartarea subeffusa rimoso-areolata æquabili plumbeâ, apotheciis magnis sessilibus atris intus corneis concoloribus strato sub disco tenui cinerascente, demum irregularibus convexis subglobosisque confluentibus immarginatis. — In saxis et rupibus passim. — Lecidea confluens Ach. syn. 16. *Verrucaria confluens* Hoffm. lich. t. 19. f. 1. — Fl. dan. 8. t. 1350. f. 1. (v. s.)

β. Delisei, crustâ subinæquabili albâ, apotheciis semi-immersis planis marginatis demum convexis subimmarginatis. — In Neustriâ propè Vire (cel. Delise). (v. s. D.)

24. *P. LAPICIDA* (DC. fl. fr. 5. p. 181.) crustâ tartarea effusa rimoso-areolata albido-cinerascente, apothecis inter crustæ areolas depresso planis tenuiter

650 ACOTYL. seu CELLULARES. PATELLARIA.

marginatis atris intus corneis cinerascenti-nigris demum convexis subconfluentibus. — Ad saxa duriora. — Lecidea lapicida Ach. syn. 13. L. cinereoatra Ach. lich. — Hoffm. lich. t. 62. f. 1-4. — eng. bot. t. 821. (v. v.)

g. cicatricosa (Ach.) crustâ cinereo-famosâ, areolis rugoso-rimosis impressionibusque minutis irregularibus rufescens notatis, apotheciis aggregatis angulosis. (v. s.)

g. lithophila (Ach. lich.) crustâ effusâ tenui subgranulosa rimoso-areolata cinerascente aut subnullâ, apotheciis immersis sessilibusve planis demum aggregatis angulosis atris opacis intus albicantibus. — Ad lapides et in muris. — Lecidea lithophila Ach. syn. 14. (v. s.)

25. *P. IMMERSA* (DC. fl. fr. 2. p. 346.) crustâ effusâ tenui subcontiguâ albicante, apotheciis subconcavis lapidi immersis marginatis atris disco subpruinoso, humectatis sanguineis, demum convexiusculis intus albicantibus. — In rupibus imprimis calcariis. — Lecidea immersa Ach. syn. 27. excl. plur. synon. — Schrad. spic. 1. t. 1. f. 7. a-b. eng. bot. t. 193. Huic speciei non priori referunt cl. Meyer et Sprengel Lecideam lithophilam Ach. (v. v.)

g. emergens (Ach.) crustâ subnullâ, apotheciis adultis majoribus elevatis convexiusculis difformibus subconfluentibus undis nigris humectatis rufo-fuscis. — In saxis calcariis duris. (v. s.)

26. *P. PURPURASCENS* (Dub. mss.) crustâ tenui effusâ contiguâ tartareâ roseopurpurascente, ambitu rivisque serpentinis nigro-sanguineis aut roseis, apotheciis lapidi profundè immersis concavis atro-rubris marginatis margine crasso, demum planiusculis immarginatis atris intus corneis deciduis. — Ad saxa Delphinatus ex Hoffm., Mimatis (cl. Prost), Pyrenæorum (Ramond). — Verrucaria purpurascens Hoffm. lich. t. 15. f. 1. Fl. fr. 2. p. 317. Lecidea Wulfenii Ach. — Lichen marmoreus Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 13. f. 1. Hanc ut præcedentem oxydo quodam coloratam habet cl. Meyer nebenst. 1. p. 70. (v. s.)

27. *P. ALBOZONARIA* (DC. fl. fr. 2. p. 348.) crustâ tartareâ tenui contiguâ glomerulosa demum tenuissimè rimoso-areolata albido-ochrolencâ, apotheciis semi-immersis sessilibusque planis marginatis atris intus corneis strato sub disco cinereo, demum hemisphæricis immarginatis. — In saxis durissimis calcario-silaceis. — Lecidea ochrochlora Ach. syn. 23. (v. s.)

28. *P. DRYINA* (Dub. mss.) crustâ effusâ subcontiguâ subpulverulentâ albâ aut subnullâ, apotheciis minutis subglobosis demum planiusculis adpressis tandem rugosis irregularibus atris intus carnosis cinereo-fuscis. — In cortice crassâ Aceris propè Mimatem (cl. Prost). — Lecidea dryina Ach. Hanc speciem cum Verrucariâ byssacea Ach. syn. conjungunt cl. Meyer et Spreng. et pro stipitibus nondum evolutis Calycii adspersi Pers. Ach. habent. (v. s.)

29. *P. ELÆOCHROMA* (Dub. mss.) crustâ effusâ sublimitatâ rugoso-granulatâ rimosaque pallidè flavo-virescente interdum flavo-cinerascente, apotheciis confertis atris intus corneis fusco-cinerascentibus, junioribus planis marginatis, demum convexis subimmarginatis rugosis difformibusque interdum subarginoso-atris. — Ad corticem arborum, in saxis ex Ach. — Lecidea elæochroma Ach. syn. 18. L. parasema & elæochroma Ach. lich. (v. s.)

* * * *Patellis nigris intus albis.*

30. *P. ENTEROLEUCA* (Dub. mss.) crustâ subcartilagineâ tenui contiguâ effusâ sublimitatâ rugoso-granulosâ rimosâque cinerascente, apotheciis adpressis atris intus corneis albis, junioribus planiusculis marginatis, demum convexis subimmarginatis rugosis. — In cortice arborum et ligno semi-putrido Neustriae (Le Prév.), Bellovacî (Graves). — Lecidea enteroleuca Ach. — An satis a priore diversa? (v. s.)

31. *P. ELATA* (Dub. mss.) crustâ tartareo-farinosâ contiguâ seu tenuissimè rimulosa plerumque orbiculariter effusâ æquabili aut pulvinata albâ vel sulphureopruinosâ, apotheciis elevatis atris intus albis margine crasso prominente,

demum confluentibus deformatibus immarginatis. — Ad saxa in Pyrenæis ex cl. Schær. — Lecidea elata Schær. spic. 3. p. 137. — Apothecia inter majora hujus generis, juniora disco plano crustæ farinâ vulgo suffuso, demum omnino glabra.

32. P. SYNOTHEA (Dub. mss.) crustâ leprosa subgelatinosa flocculoso-granulata inæquabili atro-virescente, apotheciis minutis crustæ innatis convexis scabris demum gibberulosis subimmarginatis atris, intus corneis albidis. — Ad sepimenta lignea vetusta passim. — Lecidea synothea Ach. (v. s.)

33. P. DAPHÆNA (Dub. mss.) crustâ areolata lœvigata sanguineo-fuscâ areolis planis, apotheciis superficialibus planis subimmarginatis demum angulosis diffiformibus confluentibus fusco-atris, intus sublaminâ tenui albis. — In rupibus propè Falaise ex cl. de Brébisson, Vire (cl. Delise). — Lecidea daphæna Ach. syn. 22. — Varietas P. immersæ ferri minera colorata ex Spreng. (v. s.)

34. P. OBSCURATA (Dub. mss.) crustâ tenui effusa badio-fuliginosa opacâ rimoso-areolata areolis planis nigro-marginatis, apotheciis concavis sapè umbonatis atris intus albis demum atro-cinereis, margine prominente crasso. — Ad rupes montis Rotabac Vogesorum (cl. Mougeot). — Lecidea obscurata Schær. in natur. anz. aug. 1818. p. 9; spic. 3. p. 130; lich. exs. n. 180. (v. s.)

35. P. FUSCO-ATRA (Hoffm. lich. t. 54. f. 1.) crustâ effusa tenuissimâ fusca opacâ rimoso-areolata areolis planis nigro-marginatis nitidis, apotheciis convexiusculis depressis atris marginatis intus albidis. — In rupibus et saxis. — Fl. fr. 2. p. 351. Lecidea fusco-atra Ach. syn. 12. — Wolf. in Jacq. coll. 2. t. 14. f. 3. (v. v.)

B. gibba (Wahlemb.) areolis gibbosis subimbricatis subiculum atrum obtengentibus. (v. s.)

36. P. PROSTII (Dub. mss.) crustâ rugoso-plicata granulato-pulvinata inæquabili griseo-nigrescente, granulis sublobatis, apotheciis sessilibus conglomeratis planis marginatis atris intus albis, demum convexis irregularibus confluentibus diffiformibusque. — In muscis et terrâ ad rupes Mimatis (cl. Prost). (v. s.)

37. P. SQUALIDA (Dub. mss.) crustâ rugoso-plicata granulata inæquabili cinereo-fuscescente, granulis sublobatis, apotheciis adpressis planis marginatis demum convexis irregularibus confluentibus conglomeratisque nigris intus albidis. — Ad terram in rupibus Mimatis (cl. Prost), Vogesorum ex cl. Mougeot. — Lecidea squalida Ach. syn. 19. Schær. lich. exs. n. 170. (v. s.)

38. P. LEPTODERMA (Dub. mss.) crustâ cinereo-ochracea tenuissimâ vix perceptibili saepiusque subnullâ, apotheciis confertis sessilibus convexis atris immarginatis intus albidis, demum subglobosis irregularibus confluentibus difformibusque. — Ad muros argillaceos Neustriæ circâ Bernay (cl. Le Prévost). (v. s.)

39. P. BIFORMIS (DC. fl. fr. 2. p. 353.) crustâ effusa subrimosa flavidâ, apotheciis carnosis nigris intus albis, primo semi-immersis planis marginatis, demum exsertis convexis irregularibus immarginatis. — In rupibus Pyrenæorum ex cl. Ramond I. c. (Abest in herb. DC. et Dub.) †

* * * * *Patellis nigris intus rubris.*

40. P. SANGUINARIA (Dub. mss.) crustâ rugulosa cinereo-albicante, apotheciis sessilibus planis marginatis demum convexis hemisphæricis subtuberculosis atris, intus corneis nigris, strato inferiori palveraceo sanguineo. — In lignis, ramis exsiccatis et rupibus. — Lecidea sanguinaria Ach. Verrucaria sanguinaria Hoffm. lich. 2. t. 41. f. 1. Fl. fr. 2. p. 316. — eng. bot. t. 153. (v. v.)

* * * * *Patellis pruinosis cæsiis.*

41. P. ALBO-CÆRULESCENS (Hoffm. lich. t. 14. f. 2.) crustâ tartarea contigua inæquabili demum rimosa albida aut cinerascente, apotheciis sessilibus elevatisque planis atris cærulecenti-pruinosis, margine flexuoso nudo nigro, intus nigris strato tenui sub disco cinerascenti. — Ad saxa et rupes. — Fl. fr. 2. p. 351. Lecidea albo-cærulescens Ach. Fl. dan. 8. t. 433. f. 2. — Jacq. coll. 2.

652 ACOTYL. SEU CELLULARES. PATELLARIA.

- t. 15. f. 1. *Crusta variat alba, cinerea et ferruginosa.* Huic speciei referunt cl. Meyer et Sprengel Lecideam pantostictam γ spilotam Ach. syn. (v. v.)
- B. turgida* (Ach. syn.) crustâ subdeterminatâ contigâ albo-cæsiâ, apotheciis immersis, disco depresso concaviusculo pruinoso, margine tumente supra crustam prominente. — Patellaria multipuncta Hoffm. lich. 3. t. 63. f. 1-3. (v. s.)
42. *P. DICKSONII* (DC. fl. fr. 2. p. 352.) crustâ areolato-granulatâ ferrugineo-ochraceâ, apotheciis minutis elevatis planis nigris cærulecenti-pruinosis, margine crasso tumidulo, intus subeoneoloribua. — In rupibus. — Lecidea Dicksonii Ach. lich. 165 excl. fortè syn. et var. *B.* — Lichen cæsius Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 6. (v. s.)
43. *P. SILACEA* (Hoffm. lich. 1. t. 19. f. 2.) crustâ tartareâ effusâ tenuissimè rimoso-areolatâ areolis planis ruberrimâ aut ochraceo-flavicante aut etiam griseo-ferrugineâ, apotheciis sessilibus planis marginatis demum convexiusculis difformibus confluentibusque atris disco plus minus pruinoso, intus corneo-nigris strato sub disco hyalino albicante. — In saxis. — Fl. fr. 2. p. 351. Lecidea silacea et flavicunda Ach. — eng. bot. t. 1118. Huic speciei referunt cl. Meyer et Sprengel insupèr Lec. flavo-cærulecentem Ach. (Fl. dan. t. 1431. f. 1.) et has omnes habent ut formas ferro coloratas Patellariæ albo-cærulecentis. (v. v.)
44. *P. CYANEA* (Flörke in litt. ad cl. Moug.) crustâ tartareâ effusâ pulverulentâ tenuissimè areolato-rimosâ griseo-albescente, apotheciis subimmersis planis confertis atris disco plus minus pruinoso margine crasso elevato, intus albis. — In cautibus siliceis circâ Bruyères (cl. Mougéot). (v. s. D.)
45. *P. CORTICOLA* (DC. fl. fr. 2. p. 353.) crustâ effusâ subtartareâ granulato-areolatâ inæquabili albissimâ, apotheciis minutis planis confertis subimmersis cæsio-pruinosis demum subglobosis immarginatis nudis atris intus cinerascentibus. — In cortice arborum. — Lecidea corticola Fl. dan. 8. t. 1350. f. 2. Lec. albo-atra & corticola Schær. spic. 3. p. 140. Verrucaria albo-atra Hoffm. lich. t. 15. f. 2. (v. v.)
- B. farinosa* (Ach.) crustâ leproso-pulveraceâ apotheciisque subimmersis demum globosis immarginatis pulvere albicante suffusis. — Lecidea albo-atra & amylacea Schær. 1. c. (v. s.)
46. *P. MARGARITACEA* (DC. herb.) crustâ tartareâ contiguâ albido-glaucemente nigro-limitatâ, apotheciis minutis immersis demum emergentibus sessilibus crassis albo-pruinosis intus atris, margine proprio tumente. — Ad rupes passim. — Lecidea margaritacea Ach. (v. s.)
47. *P. SPEIREA* (Dub. mss.) crustâ tartareâ contiguâ determinatâ albissimâ, apotheciis sessilibus crassis atris albo-pruinosis marginatis demum convexis nudis basi thallode subindè cinctis, intus atris strato sub disco cinerascente. — In saxis et rupibus. — Lecidea speirea Ach. syn. 31. — Verrucaria calcaria Hoffm. lich. 3. t. 52. f. 2? (v. s.)
- B. cretacea* (Ach.) crustâ tartareâ tenuissimè areolato-rimosâ pulverulentâ albissimâ, apotheciis minutis sessilibus planis cæsio-pruinosis in basi thallode submarginante elevatis. — Patellaria cretacea DC. fl. fr. 2. p. 353. (v. v.)
48. *P. EPIPOLIA* (DC. fl. fr. 2. p. 353.) crustâ tartareâ determinatâ rimoso-areolatâ candidâ rarius griseâ areolis tumentibus inæquabili, apotheciis sessilibus confertis hemisphæricis cæsio-pruinosis intus atris basi margine proprio tenui pruinâ albido cinctis. — Ad lapides et muros. — Lecidea epipolia Ach. Lec. albo-atra & epipolia Schær. spic. 3. p. 141. — eng. bot. t. 1137. Lichen niveo-ater Dicks. crypt. 4. t. 12. f. 3. (v. v.)
- ***** *Patellis fuscis brunneisve.*
49. *P. INCANA* (Spreng. syst. 4. p. 265.) crustâ effusâ molli leproso-farinosa inæquabili glauco-virescente aut incandescente, apotheciis sparsis sessilibus brunneis, margine integro pallidiore. — In terra et ad corticem arborum. — Le-

cidea incana Ach. syn. 36. *Lepra incana* DC. fl. fr. 5. p. 175. *Byssus incana* L. — eng. bot. t. 1683. Apothecia raro occurunt. (v. v. sine apoth.)

β. latebrarum, crustâ crassâ griseâ. — In cryptis umbrosis petrarum. — *Lepraria latebrarum* Ach. syn. 331. Apothecia nondum nota. (v. v. sine apoth.)

50. *P. LAURO-CERASI* (Delise ined.) crustâ effusâ tennissimâ subpulverulentâ æruginoso-viridi, apotheciis sessilibus sparsis immarginatis primo albo-carneis carneisve planis, demum dilatè brunneis convexis intus concoloribus. — Ad corticem Cerasi Laurocerasi circa Vire detexit cl. Delise. (v. s. D.)

51. *P. QUERNEA* (Spreng. syst. 4. p. 265.) crustâ leprosa granulato-farinosa subcontigua badio-flavescente plerumque nigro-limitata, apotheciis subimmersis sparsis planis fusco-rubellis vix marginatis, demum convexis immarginatis fuscis nigrisque, intus concoloribus. — In cortice Fagi in Vogesis (cl. Moug.), in truncis quercinis Bellovaci (cl. Graves), Neustriæ. — *Lecidea Querneae* Ach. — Dicks. crypt. 1. t. 2. f. 3. eng. bot. t. 485. (v. s.)

52. *P. DECOLORANS* (Hoffm. lich. 2. t. 39. f. 2.) crustâ granulosâ effusa inaequabili albo-cinereâ aut griseâ demum virescente pulvrenentâ, apotheciis planiusculis incarnaatis lividis fusco-nigricantibusque, margine elevato pallidiori demum flexuoso. — Ad terram suprà muscos destructos, muros argillaceos et ligna putrida. — *Lecidea decolorans* Ach. syn. *Lecanora minutula* Ach. lich. univ. — Fl. dan. t. 1063. f. 1. (v. v.)

β. granulosa (Ach.) crustâ solidiori granulato-subpapillosâ, apotheciis demum hemisphæricis rugosis fusco-nigris atrisque confluentibus. — *P. granulosa* DC. syn. gall. 74. *Lecidea escharoides* et *desertorum* Ach. lich. — Hoffm. lich. 2. t. 30. f. 5. — eng. bot. t. 1185 et 1247. (v. s.)

53. *P. LIGHTFOOTII* (Dub. mss.) crustâ subeffusa granulata cinereo-virescente, apotheciis adpressis planis fusco-atris, intus sordide albis, margine tenui flexuoso disco dilutiori. — Ad corticem arborum propè Beauvais ex cl. Graves, Vire ex cl. Delise. — *Lecidea Lightfootii* Ach. — eng. bot. t. 1451. Cum Pat. rivulosa conjuncta à cl. Fries, sed, ut videtur ex cl. Schær. spic. 3. p. 132, immeritò.

54. *P. RIVULOSA* (Spreng. syst. 4. p. 265.) crustâ tenui tartarea subeffusa rimoso-areolata cinereo-fuscâ lineolis nigris limitata decussatâque, apotheciis sessilibus nigris humectatis fascis intus albidis, junioribus planis demum convexis marginatis irregularibus. — Ad saxa quartzosa et in granitide Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), Mimatis (cl. Prost), propè Falaise ex de Bréb., Parisios ex Cheval. — *Lecidea rivulosa* Ach. syn. 28. (v. s.)

β. decussata (Ach.) apotheciorum disco demum convexo nigro marginem crustæ concolorē tandem crenatum suboblitante. (v. s.)

55. *P. ANTHRACINA* (Dub. mss.) crustâ effusa subleprosa inaequabili subscabridâ fuliginoso-atrâ, apotheciis minutis planis rufo-fuscis margine dilutiori, demum convexiusculis fusciscentibus. — Ad saxa, in cortice et candice truncorum vetustarum arborum. — *Lecidea anthracina* Ach. syn. 43. *Lepra fuliginea* Fl. fr. 5. p. 175. *Lepraria fuliginosa* et *atra* Ach. lich. 667 et 678. — Apothecia rarissima ob minutiem non nisi oculis armatis observanda. Cum hac specie et non cum *P. uliginosa*, *Lecidea fuliginea* Ach. conjugit cl. Sprengel. (v. s. sine apoth.)

56. *P. MIXTA* (Dub. mss.) crustâ tenui effusa subcartilaginea tennissime rimosâ inaequabili griseo-cinerascente, apotheciis confertis fusco-brunneis nigricantibusve planiusculis margine elevato concolori intus concoloribus, demum convexis immarginatis confluentibus disformibus. — Ad troncos arborum in Neustriâ (cl. Le Prév.). — *Biatora mixta* Fries in vet. act. holm. 1822. p. 267. lich. exsicc. n. 40. (v. s.)

57. *P. ANOMALA* (Spreng. syst. 4. p. 264.) crustâ tenui subcartilaginea rimosâ laeviusculâ demum inaequabili verruculosa albo-cinerascente interdum subnullâ, apotheciis confertis carueo-pallidis fuscis aut fusco-brunneis planius-

654 ACOTYL. SEU CELLULARES. PATELLARIA.

culis margine vix elevato dilutiori, intus carneis albidis, demum convexis immarginatis confluentibus difformibus. — Ad corticem et truncos arborum.

— Lecidea anomala Ach. syn. 38. — Lichen ferruginosus Turn. — Species polymorpha ob marginem in apotheciis junioribus dilatiorem Lecanoræ speciem præ se ferens. (v. s.)

β. cyrtella (Ach.) crustâ tenui submembranaceâ lœvigatâ albida, apotheciis minnitis pallidè fuscis demum fusco-nigricantibus, margine juniorum tenui albicante tandem concolore vel evanescente. — eng. bot. t. 2155. (v. s.)

γ. flavicans (Ach.) crustâ subdeterminatâ pallidè flavo-virescente, apotheciis concaviusculis nigricantibus margine ferrugineo. (v. s.)

58. *P. CONFERTA* (Duby mss.) crustâ tenui granulatâ rimoso-areolatâ inæquabilis ochraceo-cinereâ, apotheciis confertissimis numerosissimis luteo-fuscis intus corneis hyalinis, primo planiusculis margine tenui dilutiori crenato, demum globosis subimmarginatis subprainosis. — Ad muros argillaceos Neustriæ propè Bernay (cl. Le Prév.). — Primo adspectu Lecanoræ speciem præ se fert. (v. s.)

59. *P. FUNGICOLA* (Dub. mss.) crustâ tenui indeterminatâ granulatâ cinereo-subvirescente, apotheciis parvis confertis semi-immersis convexis hemisphæricisque immarginatis fuscoc-atribus, intus albicantibus. — In Boleto ungulato propè Beauvais ex cl. Graves. — Lecidea fungicola Ach. lich. in add. p. 672. Patellariæ decoloranti relata ex cl. Fries.

60. *P. VIRIDESCENS* (DC. fl. fr. 2. p. 350.) crustâ effusâ tenui granulato-farinosa æruginoso-viridi, apotheciis sparsis sessilibus convexiusculis irregularibus confluentibus brunneis, margine integro pallidiori, demum rugulosis fusco-nigricantibus. — Ad truncos humidos putrescentes. — Lecidea viridescens Ach. — eng. bot. t. 2217. (v. s.)

61. *P. SANGUINEO-ATRA* (Dub. mss.) crustâ tenui membranaceâ effusâ albo-viridi-cinereâ demum pulvere granuliformi adspersâ, apotheciis confertis planis marginatis, margine tenui disco subdilutiori, atro-fuscis demum hemisphæricis subimmarginatis glabriusculis fuscoc-nigricantibus, intus corneis albicantibus. — Suprà inuscos destructos. — Lecidea sanguineo-atra Ach. lich. — Lichen sanguineo-ater Wulf. L. muscorum Web. Sw. non Wulf. Ach. lich. (v. s.)

62. *P. VERNALIS* (Spreng. syst. 4. p. 265.) crustâ tenuissimâ effusâ albido-virescente granulis subglobosis pallidis tandem sordidè cinerascentibus subobtectâ, apotheciis sessilibus confertis rubellis aut pallidè rufo-ferrugineis concavis margine tumido dilutiori, demum planis, tandem subglobosis immarginatis confertis conglomeratis. — In cortice arborum et ad strata muscorum. — *P. rubella* DC. fl. fr. 2. p. 356. *P. sphæroidea* Fl. fr. 2. p. 357. excl. syn. Dicks. et Hoffm. Lecidea vernalis Ach. syn. 36. Lec. luteola Ach. syn. 41. — Lichen vernalis L. Hoffm. en. lich. t. 5. f. 1. eng. bot. t. 845. Lich. rubellus Ehr. (v. v.)

β. sphæroidea (Ach. lich. 197.) crustâ subcartilagineâ diffracto - rimosâ subindè granulosâ leprosâque, apotheciis convexiusculis demum globosis sessilibus confluentibus. — Ad terram et corticem arborum. — *P. rosella* DC. fl. fr. 2. p. 355. Lecidea alabastrina *β* et *γ*. Ach. syn. 46. Lichen sphæroides Dicks. crypt. t. t. 2. f. 2. Lich. rosellus Pers. Fl. dan. 7. t. 1243. f. 2. (v. v.)

63. *P. CARNEOLA* (Spreng. syst. 4. p. 265.) crustâ tenui membranaceâ incanâ demum granulato-subpulverulentâ, apotheciis sessilibus concavis crassis tumidis cinnamomeo-fuscis margine subconcolori, demum convexis. — Ad corticem squamosam arborum propè Beauvais ex cl. Graves, Vire (cl. Delise). — Lecidea carneola Ach. syn. 42. L. cornnea Ach. meth. 56. Lichen corneus With. arr. 4. t. 31. f. 3. eng. bot. t. 965. (v. s.)

* * * * * *Patellis rubro-fuscis rubrisve.*

64. *P. FUSCO-LUTEA* (Hoffm. lich. 3. t. 65. f. 1.) crustâ tenui effusâ membra-

naceâ albido-cinereâ nitidâ granulosâ, granulis conglomeratis sublobatis, apotheciis superficialibus planis rubro-luteis demûm rufo-fuscis intùs cinereis, margine dilutioni elevato tandem flexuoso. — Suprà muscos semi-destructos. — *P. sinapiisperma* Fl. fr. 2. p. 349. — eng. bot. t. 1007. — Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 2. (v. v.)

B. leucorhoa (Ach.) crustâ cinerascente tenuissimâ granulosâ, apotheciis convexis marginatis subglobosis rufo-fuscis aut fusco-nigricantibus hinc inde atris. (v. s.)

65. *P. PACHYCARPA* (Delise ined.) crustâ tenui effusâ membranaceâ albo-cinereâ inæquabili pulveruleuto-granulosâ, granulis conglomeratis sublobatis, apotheciis sparsis superficialibus rubro-brunneis primo cupulato-concavis margine tumido crasso integro aut subcrenato concolori, demûm planis margine depresso dilutioni. — In sylvâ Neustriæ Fougères detexit cl. Delise, Briquebec cl. Despréaux, in Vogenesis cl. Mongeot. (v. s.)

66. *P. DELISEI* (Dub. mss.) crustâ tenui membranaceâ effusâ albo-cinereâ granulosâ granulis podetiformibus conglomeratis sublobatis, apotheciis roseis demûm confluentibus difformibus immarginatis. — In cortice arborum propè Vire (cl. Delise). — Lecidea Delisei Bory ex Delise in litt. (v. s. specimen imperfectum).

67. *P. AERUGINOSA* (Spreng. syst. 4. p. 266.) crustâ leprosâ inæquabili subgranulosâ albo-virescente, apotheciis subsessilibus planis incarnatis demûm convexis flexniosis rugulosis, margine tenui subnullo. — Ad terram suprà muscos, truncos arborum et ligna subputrida. — Baeomyces aeruginosus et elveloides Fl. fr. 2. p. 343. Lecidea icmadophila Ach. syn. 45. — Hoffm. en. lich. t. 8. f. 1. — Fl. dan. t. 472. f. 4. (v. v.)

68. *P. MICROPHYLLA* (Dub. mss.) crustâ effusâ membranaceâ cervino-fuscâ aut nigricante granulosâ granulis conglomeratis sublobatis, apotheciis sparsis adpressis planiusculis marginatis carneo-rubris demûm convexis rufescensibus fusco-nigricantibusque immarginatis confluentibus. — Ad terram in montosis. — Lecidea microphylla Ach. syn. 53. Pannaria microphylla Delise. — Ach. in nov. act. holm. 16. t. 5. f. 3. eng. bot. t. 2128. (v. v.)

B. triptophylla (Ach.) crustâ cinereo-cervinâ granulosâ, granulis demûm in ramulos teretes surrectos coralloideos confertos abeuntibus, apotheciis convexis rufo-fuscis. — In cortice vetustâ arborum. — Collema microphyllum DC. fl. fr. 2. p. 381. non Ach. (v. s.)

T. picina (Ach.) crustâ nigro-piceâ, granulis minutis arctè imbricatis, apotheciis depressis planiusculis nigris. (v. s.)

69. *P. FERRUGINEA* (Hoffm. lich. t. 12. f. 1 et t. 35. f. 1.) crustâ tenui effusâ inæquabili subrimosa albo-cinereâ demûm evanidâ, apotheciis planiusculis confertis ferrugineo-rubris demûm anguloso-difformibus nitidis convexiusculis, margine tenui persistente. — Ad corticem arborum. — Fl. fr. 2. p. 358. Lecidea cinereo-fusca Ach. (v. s.)

70. *P. LAMPROCHEILA* (DC. fl. fr. 2. p. 357.) crustâ tennissimâ rimoso-areolata cinereo-cæsiâ ant subochrolencâ, apotheciis planis confertis aurantiaco-rufis, margine tumido nitido integrerrimo dilutioni persistente. — In saxis. — Lecidea cæsio-rufa & festiva Ach. syn. 44. (v. s.)

B. cæsio-rufa, crustâ cinereo-cæsiâ, apotheciis ferrugineo-rufis margine tandem nitido crenulato, demûm convexis subimmarginatis atro-rubentibus. — Lecidea cæsio-rufa Ach. lich. 203. Lichen ferrugineus eng. bot. t. 1650. Lichen crenularius With. arr. 4. t. 31. f. 5. — Hanc speciem cum priore conjugit cl. Sprengel. (v. s.)

71. *P. ERYTHROCARPIA* (DC. fl. fr. 5. p. 182.) crustâ tartarea determinata areolata subpulverulentâ albâ, apotheciis minutis confertis crustæ adpressis plano-concavisculis rufro-fuscis margine dilutioni minuto, demûm convexis. — Ad rupes calcarios Parisiorum (D'. E. Mercier), Divionis, Mons-pelii, Mimatis. — Lecidea erythrocarpia Ach. — Forma Patellariæ ferrugineaæ calcariis incidentis ex Meyer nebenst. 1. p. 218. (v. s.)

656 ACOTYL. SEU CELLULARES. PATELLARIA.

72. *P. RUPESTRIS* (DC. fl. fr. 2. p. 360.) crustâ tenui contiguâ tartareâ albo-cinerascente seu virescente punctis luteis interdum obsitâ, apotheciis semi-immersis planis marginatis demum convexis margine subpersistente rufo-aurantiacis, intus concoloribus. — In rupibus. — *Lecidea rupestris* Ach. syn. 39. *Lichen calvus* Dicks. crypt. 2. t. 6. f. 4. eng. bot. t. 948. (v. v.)

8. pyrithroma (Ach.) crustâ contiguâ subpulverulentâ, apotheciis concavis flaveolis margine tamido dilatiori, demum pallidioribus hemisphæricis immarginatis. (v. s.)

73. *P. IRRUBATA* (Dub. mss.) crustâ subeffusâ rimosâ obscurè cinereo-olivacea, apotheciis immerso-adnatis plano-convexiusculis subrotundo-diformibus confluentibus immarginatis flavo-rufescens. — In saxis et rupibus Neustriæ? Jurassi? — *Lecidea irrubata* Ach. syn. 40. *Forma nigra* *P. rupestris* ex cl. Meyer nebenst. 1. p. 65.

***** Patellis flavis.

74. *P. EPIXANTHA* (Dub. mss.) crustâ pulveracea e pallido cinerascenti-luteâ, apotheciis adpressis planis cerino-luteis concoloribusque margine tenui dilatiori subpulverento. — Ad terram in muscis putrefactis propè Vire ex cel. Delise, Beauvais ex cl. Graves.

75. *P. LUCIDA* (Spreng. syst. 4. p. 267.) crustâ leprosâ flocculoso-pulveracea citrino-virescente determinata, apotheciis plano-convexiusculis subimmarginatis pallido-flavicantibus. — In saxis et rupibus. — *Lecidea lucida* Ach. syn. 48. — eng. bot. t. 1550. (v. s.)

76. *P. PINETI* (Spreng. syst. 4. p. 267.) crustâ tenuissimâ sordide flavo-aut cinereo-pallescente, apotheciis sessilibus minutis aggregatis concavis luteocarneis, margine elevato integerrimo. — In Pinetis ad arborum radices propè Mimatem (cl. Prost), in Vogesis ex cl. Moug. — *Lecidea Pineti* Ach. (v. s.)

Sect. II. RHIZOCARPON *Ramond* in DC. fl. fr. 2. p. 365. — *Lecidea*
sect. II. Schær. spic. 3. p. 124.

Thallus areolatus areolis varie coloratis subiculo tenuissimo fibrilloso atro insidentibus.

77. *P. VIRIDI-ATRA* (Dub. mss.) crustâ tartareâ rimosâ verrucoso-areolata areolis rugulosis è rufo-flavo-virescente, apotheciis crustæ innatis planis immarginatis demum convexis difformibus confluentibus atris intus concoloribus. — Ad rupes Vogesorum ex cl. Mong. — *Lecidea viridi-atra* Ach. lich. 166.

78. *P. GEOGRAPHICA* (Dub. mss.) areolis flavo-virescentibus planis angulosis adpressis minutis confertis crustam atram subobtegentibus in ambitu atro-limitatis lineolisque atris subdecaussatis, apotheciis e subiculo oriundis planiusculis atris orbiculatis oblongisve intus concoloribus. — In saxis et rupibus. — *Lecidea atro-virens* Ach. *Verrucaria atro-virens et geographicæ Hoffm.* lich. t. 17. f. 4 et t. 54. f. 2. *Rhizocarpon geographicum* DC. fl. fr. 2. p. 365. — Dill. musc. t. 18. f. 5. (v. v.)

79. *P. ATRO-ALBA* (Dub. mss.) areolis griseo-albis convexis angulosis adpressis minutis subiculum atrum obtegentibus, apotheciis e subiculo oriundis plano-convexiusculis atris orbiculatis intus concoloribus. — Ad lapides siliceos. — *Rhizocarpon conservoides* DC. fl. fr. 2. p. 365. *Lecidea atro-alba* Ach. *Lichen atro-albus* L. eng. bot. t. 2336. (v. v.)

8. dendritica (Schær. spic. 3. p. 128.) subiculo dendritice effigurato. — In saxis siliceis. — *Verrucaria dendritica* Hoffm. lich. 1. t. 19. f. 4. — *Lecidea dendritica* Ach. meth. p. 44. *Lichen dendriticus* Ach. prod. 77. Dicks. crypt. 4. t. 12. f. 1. eng. bot. t. 1734. *Rhizocarpon asteriscus* DC. fl. fr. 5. p. 183. (v. s.)

80. *P. MORIO* (Dub. mss.) areolis confertis laevissimis planis flavo-cupreis angulis adpressis nigro-variis crustam obtegentibus, apotheciis atris planis

margine tenui cinctis. — In rupibus graniticis Pyrenæorum detexit cl. Ramond. — Rhizocarpon morio DC. fl. fr. 2. p. 366. Lecidea Morio Schær. (v. s.)

81. P. ARMENIACA (Dub. mss.) areolis confertis flavo-armeniaceis subconvexis ætate rugosis crustam atram obtegentibus, apotheciis ex areolis oriundis atris orbicularibus planis subrugosis intus albis. — In rupibus calcariis Pyrenæorum detexit cl. Ramond. — Rhizocarpon armeniacum DC. fl. fr. 2. p. 367.

a. pallida (Schær. in litt. ad cl. Moug.) subiculo atro rarius conspicuo, areolis pallide armeniacis. — Ad rupes graniticas montis Hohneck Vorgesorum (cl. Mongeot). — Lecidea viridi-atra Ach. syn. 21. L. spectabilis Flörke. L. armeniaca Schær. lich. exs. n. 174. (v. s.)

b. nigrita (Schær. l. c.) subiculo atro per omnem superficiem conspicuo, areolis obscurioribus nitidis atro-fimbriatis. — Cum priore (cl. Mongeot). — Lecidea nigrita Schær. spic. 3. p. 126. lich. exs. n. 175. (v. s.)

82. P. ATRO-BRUNNEA (Dub. mss.) areolis subdistantibus magnis convexis brunneo-atris subiculum tenui atrum subobtegentibus, apotheciis e subiculo oriundis atris planis orbiculatis aut difformibus margine convexo subnitido intus albis. — In rupibus schisto-micaceis Pyrenæorum et Alpium. — Rhizocarpon atro-brunneum DC. fl. fr. 2. p. 367. Lecidea atro-brunnea Schær. spic. 3. p. 134. (v. s.)

XXIV. PSORA DC. fl. fr. 2. p. 367. — Psoræ sp. Hoffm. — Lecideæ sp. Ach.

Apothecia a thallo discolora sessilia membranâ cartilagineâ coloratâ undique vestita, disco concavo demum convexiusculo, margine concolori evanescente, margini squamarum adnata. — Thallus crustaceo-foliaceus expansus adnatus crassus squamis distinctis planis aut convexis confertis conflatus.

* *Squamis convexis.*

1. P. TABACINA (DC. fl. fr. 2. p. 367.) crustâ crassâ grumosâ subimbricatâ fulvo-rufâ squamosâ squamis confertis complicatis bullatis subnitidis, apotheciis numerosis confertis atris intus albis planiusculis margine tenui, demum convexis tandem globosis confluentibus difformibusque immarginatis. — In rupibus Pyrenæorum (cl. Ramond), montium Mimatis (cl. Prost). (v. s.)

2. P. GALBULA (DC. fl. fr. 2. p. 368.) crustâ crassâ citrinâ, squamis confertis distinctis complicatis bullatis, apotheciis atris crassis rotundatis planis tenuiter marginatis, demum convexis confluentibus difformibusque immarginatis. — Ad terram in editioribus Pyrenæis detexit cl. Ramond. — Lecidea Wahlebergii Ach. lich. 211. ex cl. Delise. (Abest in herb. DC. et Dub.). †

3. P. VESICULARIS (DC. fl. fr. 2. p. 368.) crustâ crassâ subimbricatâ nigro-fusca cæsio-prainosâ, squamis distinctis integris complicatis obovatis turgidis, apotheciis atris planis marginatis, demum hemisphæricis immarginatis, intus albidis. — Ad terram in montanis. — P. opuntioides fl. fr. 2. p. 368. Lecidea vesicularis Ach. Lichen opuntioides Vill. dauph. 3. t. 35. Lichen cæruleo-nigricans eng. bot. t. 139. Hall. helv. t. 47. f. 3. (v. v.)

4. P. CANDIDA (Hoff. germ. 164.) crustâ crassissimâ subimbricatâ candidâ prainosâ, squamis confertis crenatis complicatis obovatis turgidis demum rugulosis, apotheciis adpressis nigris glauco-prainosis planis marginatis, intus concoloribus, demum convexis confluentibus difformibusque. — Ad rupes et supra muscos destructos. — Fl. fr. 2. p. 369. Lecidea candida Ach. Lichen candidus eng. bot. t. 138. Lichen mammillaris Gouan. (v. v.)

** *Squamis plano-concavis.*

5. *P. TESTACEA* (Hoffm. lich. t. 22. f. 5. 6.) crustâ subimbricatâ crassâ cinerascente, squamis aggregatis repando-crenatis, apothecis marginalibus convexis rufis demum immarginatis difformibus. — Ad saxa calcaria Jurassi, Montis-Aurei ex cl. Delise. — Fl. fr. 5. p. 184. Lecidea testacea Ach. — eng. bot. t. 1955. Mich. gen. t. 51. f. 2. (v. s.) *
6. *P. LURIDA* (DC. fl. fr. 2. p. 370.) crustâ imbricatâ fusco-virescente, squamis subtus pallidioribus concaviusculis orbiculatis crenatis, apothecis planis margine crasso vix tumido fusco-nigris intus albescientibus, demum convexiusculis immarginatis atris. — Suprà terram ad rupes. — Lecidea lurida Ach. Moug. et Nestl. vog. n. 643. Lichen luridus eng. bot. t. 1329. — Dill. musc. t. 30. f. 134 et 135. (v. s.)
7. *P. CINEREO-VIRENS* (Dub. mss.) crustâ imbricatâ squamis exiguis reniformibus crenatis lobatisve demum in pulvinulos coacervatis lœvibus obscurè cinereo-virescentibus subtus margineque albidis nudis, apothecis planis marginatis atris cæsio-pruinosis intus albis. — In Galliâ (Vogesis?) terræ instratam ad cl. Schærer misit cl. Mougeot. — Lecidea cinereo-virens Schær. spic. 3. p. 109.
8. *P. DECIPiens* (Hoffm. lich. t. 43. f. 1-2.) crustâ subimbricatâ incarnatâ aut fuscescente, squamis subdiscretis subpeltatis subrotundis concaviusculis subtus margineque albis demum convexo-flexuosis, apothecis marginalibus convexis subglobosisque subimmarginatis nigris intus albis. — Ad terram in montosis. — Fl. fr. 2. p. 369. Lecidea decipiens Ach. Lichen decipiens Hedw. st. cr. 2. t. 1. f. B. eng. bot. t. 870. L. dispermus Vill. dauph. 3. t. 55. (v. v.)

XXV. SQUAMMARIA DC. fl. fr. 2. p. 374. Cheval. fl. par. 1. p. 638. — Lecanoræ sp. Ach. — Psoræ sp. Hoffm.

Apothecia scutelliformia subsessilia subtus a thallo formata; lamina proligera discum efformans colorata margine crassiusculo a thallo formato et eidem concolori cincta. — Thallus crustaceo-foliaceus expanso-lobatus crassus cartilagineus, squamis distinctis vel coalitis saepius imbricatis e centro radiatibus suprà apothecia gerentibus constans.

1. *S. ELECTRINA* (DC. fl. fr. 2. p. 364.) crustâ imbricatâ flavo-citrinâ centro squamulosa, squamis subdiscretis complicatis turgidis obovatis, ambitu radiosoplicato lobis convexis incisis, apotheciorum disco subconcolori demum convexo flexuosoque marginem thallodem excludente. — Ad saxa in Pyrenæis, montibus Mimatis (cl. Prost), Alpibus. — Lecanora chlorophana Ach. — Wahl. lapp. t. 28. f. 2. (v. s.)
2. *S. INSULATA* (DC. fl. fr. 2. p. 375.) crustâ crassâ intus albâ extus flavo-pallescente, centro squamulosa, squamis distinctis demum confluentibus turgidis, ambitu radiosoplicato, apothecis planis rufis marginatis demum convexis confluentibus subimmarginatis. — Ad rupes calcarias in Pyrenæis detexit cl. Ramond. (Abest in herb. DC. et D.) †
3. *S. CERVINA* (Dub. mss.) crustâ imbricatâ subcastanea squamulosa, squamis subdiscretis subpeltatis subrotundis planiusculis subtus margineque albis, apotheciorum disco immerso planiusculo fusco-nigrescente, margine thallode prominulo integro. — Ad rupes in summis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), Mimatis (cl. Prost). — Lecanora cervina Ach. syn. 188. Lecan. badia α et β Ach. lich. Parmelia squamulosa Ach. meth. et Spreng. — eng. bot. t. 201. (v. s.)
4. *S. ALPHOPLACA* (Dub. mss.) crustâ crassâ subimbricatâ griseo-albâ centro squamulosa, squamis confertis complicatis turgidis, ambitu radiosoplicato lobis teretiusculis rugosis inciso-crenatis turgidis, apotheciorum disco piano-convexusculo sinuato nigro-cæsio, margine thallode demum flexuoso subevanidoque. — Ad rupes graniticas secùs torrentes Mimatis (cl. Prost), Alpium et Pyrenæorum ex cl. Delise. — Lecanora alphoplaca Ach. (v. s.)

5. *S. GELIDA* (Delise ined.) crustâ orbiculari rimosâ cinereo-carnæ centro verrucâ fuscâ radiatim rimosâ instructâ ambitu radioso-laciniato, apotheciis sparsis, disco depresso rubro, margine thallode crasso elevato integerrimo. — Ad rupes Alpium ex cl. Delise. — *Lecanora gelida* Ach. — eng. bot. t. 699.
6. *S. LAGASCAE* (Dub. mss.) crustâ crassâ subimbricatâ albissimâ squamulosâ, squamis confertis planis aut convexo-turgidis angulosis repando-sublobatis integris in ambitu crustæ subcrenulatis, apotheciorum disco plano testaceo demum subfusco, margine thallode tumido integerrimo tandem flexuoso. — Ad terram in Alpibus et Pyrenæis ex Ach. — *Lecanora Lagascae* Ach. *Urceolaria Lamarckii* DC. fl. fr. 2. p. 372, *Lichen tartareus* Wulf. in Jacq. coll. 4. t. 8. f. 2. (v. s. ex Helv.)
7. *S. PELTATA* (DC. fl. fr. 2. p. 377.) crustâ crassâ coriacea supra flavescente subtus nigrâ intus albâ in ambitu sublobatâ, apotheciis sparsis fulvis piano-convexusculis, margine thallode tumidiusculo flexuoso. — In Pyrenæis et Alpibus ad saxa. (Abest in herb. DC. et D.) †
8. *S. RUBINA* (Hoffm. lich. t. 32. f. 1.) crustâ cartilagineâ imbricatâ supra flavopallescente subtus et margine nigrâ squamulosâ, squamis adpressis flexuosis crenato-laciniatis, apotheciis aggregatis planis flexuosis subconcoloribus rubrisque, margine thallode crenato demum subevanescente. — In Alpibus et Pyrenæis ad rupes graniticas et schistosas. — *Lecanora liparia* β *rubina* Ach. syn. 190. (v. s.)
- β . *liparia*, crustâ pallido-virescente, apotheciis sparsis concavis concoloribus vel rubescensibus, margine thallode elevato crassiusculo crenato, demum convexis cæsio-pruinosis. — Ad rupes Mimatis (cl. Prost). — *Lecanora liparia* α Ach. l. c. (v. s.)
9. *S. CHRYSOLEUCA* (Dub. mss.) crustâ imbricatâ albido-virescente, squamis confertis inciso-crenatis convexis irregularibus, apotheciis confertis disco planisculo carneo-pallido subflavante, margine thallode tenui demum flexuoso crenato. — Ad rupes in Pyrenæis ex Ach. — *Lecanora chrysoleuca* Ach. *Lichen chrysoleucus* Sm. in linn. trans. 1. t. 4. f. 2. Apothecia perætatem complicata et disformia evadunt thallumque ferè totum obtiegunt. Hanc speciem à priori non diversam vult cl. Meyer. (v. s. ex Helv.)
10. *S. CRASSA* (DC. fl. fr. 2. p. 375.) crustâ imbricatâ albo-fuscoque-virescente squamulosâ, squamis adpressis inciso-crenatis undulatis irregularibus, apotheciis sparsis disco plano tumente rufo-fulvo tandem fusco-nigricante, margine thallode tumidiusculo flexuoso integro demum subevanescente. — Ad terram. — *Lecanora crassa* Ach. *Lichen laqueatus* Jacq. coll. 3. t. 5. f. 2. *L. cespitosus* Vill. dauph. 3. t. 55. — Dill. musc. t. 24. f. 74. (v. v.)
- β . *melaloma* (Ach.) squamis crassis rotundatis subintegris, apotheciis pallidis fuscescentibus tumentibus repandis subimmarginatis. (v. s.)
11. *S. SMITHII* (DC. fl. fr. 2. p. 375.) crustâ imbricatâ glauco-viridescente squamulosâ, squamis aggregato-complicatis rotundatis concavis margine albis flexuosis repandis inciso-crenatisque, apotheciis sparsis disco plano rufo-fulvo, margine thallode tumido integro demum attenuato subcrenulato. — Ad terram et rupes calcarias. — *Lecanora Smithii* Ach. *Lichen gypsaceus* Sm. in linn. trans. 2. t. 4. f. 2. — Mich. gen. 94. t. 1. f. 1. (v. v.)
12. *S. CARTILAGINEA* (DC. fl. fr. 2. p. 376.) crustâ imbricatâ cinereo-pallidâ squamulosâ, squamis aggregato-complicatis concavis flexuosis linearis-ant lanceolato-laciniatis, apotheciis in centro numerosis, disco plano fulvo, margine thallode tenui demum flexuoso repando crenatoque persistente. — Ad saxa in Pyrenæis et montibus Mimatis (cl. Prost), propè Vire (cl. Delise). — *Lecanora cartilaginea* Ach. *Lichen cartilagineus* Ach. in nov. act. holm. t. 16. t. 5. f. 4. (v. s.)
13. *S. MELANOPHTHALMA* (DC. fl. fr. 2. p. 377.) crustâ cartilagineâ imbricatâ flavoviridescente squamulosâ, squamis lobatis confertis complicatis subtus et margine nigris, apotheciorum disco plano nigro-brunneo aut pallescente

660 ACOTYL. SEU CELLULARES.

margine thallode tumidinsculo, demum sinuosus irregularibus. — Ad saxa in Pyrenæis. (v. s.)

14. *S. LENTIGERA* (DC. fl. fr. 2. p. 376.) crustâ orbiculari albâ imbricatâ centro squamulosa, squamis confertis concavis crenato-lobatis, ambitu radiosoplicato lobis concaviusculis flexuosis incisis crenatis, apotheciorum disco planiusculo flavo-rufescens, margine thallode elevato tumido inflexo subcrenulato. — Suprà terram et muscos in montosis. — *Lecanora lentigera* Ach. *Psora lentigera* Hoffm. lich. t. 48. f. 1. — eng. bot. t. 871. (v. v.)

15. *S. PRUINOSA* (Dub. mss.) crustâ imbricatâ albâ centro squamulosa, squamis convexiusculis angustis complicatis nigro-pulverulentis, ambitu radiosoplicato lobis convexiusculis inciso-crenatis, apotheciis centro congestis carneofuscis albo-pruinosis demum rufo-fuscis difformibus, margine thallode tenui pulvulerento subcrenulato. — Ad rupes calcarias apricas propè Aginnum (cl. Chaubart). — *Lecanora pruinosa* Chaub. in St.-Am. agen. 495. (v. s.)

16. *S. DIFFRACTA* (Dub. mss.) crustâ imbricata e pallido cinereo fuscoque virescente centro squamulosa, squamis discretis angulo-sublobatis nigro-marginatis, ambitu effigurato lobato, apotheciorum disco obscure rubro demum convexo marginem thallodem tenuem subexcludente. — Ad saxa Mimatis (cl. Prost), Montis-Aurei et Alpium ex cl. Delise. — *Lecanora diffracta* Ach. — Apothecia rarissimè occurunt. Hanc cum Placodio ochroleuco (*Lecanora saxicola* Ach.) conjungit cl. Meyer. (v. s. sine apoth.)

XXVI. PLACODIUM DC. fl. fr. 2. p. 377. — *Lecanoræ* sp. Ach. — *Parmelia* sp. Spreng.

Apothecia scutelliformia sessilia subtus a thallo formata; lamina proligera discum efformans colorata margine crassiusculo a thallo formato et eidem concolori cincta. — Thallus crustaceo-foliaceus adnatus stellato-radiatus centro granulosus ambitu plicatus sublobatus apothecia in parte granulosa gerens.

1. *P. OCHROLEUCUM* (DC. fl. fr. 2. p. 379.) crustâ subimbricata squamoso-rugosa inæquabili pallido-virescente aut ochroleucâ, ambitu radioso-lobato, apotheciis confertissimis disco plano lutescente fulvo subochraceo, margine thallode dilutioni flexuoso crenatoque. — In saxis et muris. — *Lecanora saxeola* Ach. *Lichen saxeola* eng. bot. t. 1693. *L. ochroleucus* Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 13. f. 4 a. (v. v.)

2. *P. OREINUM* (Dub. mss.) crustâ rimosâ areolato-verrucosâ pallide griseâ areolis parvis subregularibus, ambitu extremo lobato lobis incisis planis, apotheciis adpressis disco piano tumidulo nigro, margine thallode crasso tonido discum primò superante dein æquante. — Ad saxa Mimatis (cl. Prost). — *Lecanora oreina* Ach. *Parmelia straminea* Spreng. (v. s.)

3. *P. RADIOSUM* (DC. fl. fr. 2. p. 380.) crustâ rimoso-areolata tartarea medio nigricante areolis parvis subregularibus convexis, ambitu albo-cinerascente radiosoplicato linear-laciñato, apotheciis confertis demum angulosis, disco areolis innato piano fusco-nigro marginem thallodem tenuem subæquante demum subconvexo. — Ad lapides calcarios et muros. — *Lecanora circinata* et *L. myrrhina* Ach. syn. 181 et 182. *Lichen radiosus* Hoffm. eu. lich. t. 4. f. 5. Ach. in nov. act. holm. v. 15. t. 6. f. 5. Huic speciei refert cl. Meyer *Lecanoram alpestrem* et *L. Agardhianam* Ach. (v. v.)

4. *P. VERSICOLOR* (Delise ined.) crustâ subrugosa inæquabili albo-virescente ambitu subimbricato, lobis planiusculis crenato-incisis obtusis, apotheciis confertis, disco pallide carneo demum convexo rufescens marginem thallodem tenuem excludente. — In rupibus propè Parisios ex cl. Delise. — *Lecanora versicolor* Ach. — Hanc speciem cum *P. ochroleuco* conjungit Sprengel.

5. *P. ALBESCENS* (DC. fl. fr. 2. p. 380.) crustâ suborbiculari tartarea subimbriciata

cata rugulosa sordide albâ pulverulenta in ambitu lobato-crenata pallida, apothecis confertis orbicularibus angulosisque disco planiusculo livide carneo-fuscescente pruinoso, margine thallode elevato demum crenato flexuoso-que. — In muris, saxis et rupibus calcariis. — *Lecanora galactina* Ach. *Psora albescens* Hoffm. (v. v.)

B. dispersum (Ach.) crustâ dispersâ granulatâ inæquabili subcinerascente vel nullâ, apotheciis sparsis, disco planiusculo dilutè fusco-cæsio nigro-que, margine thallode elevato tenui crenulato. — *Lichen dispersus* Pers. *Lichen crenulatus* Dicks. cr. 3. t. 9. f. 1. eng. bot. t. 930. (v. v.)

6. *P. SWARTZII* (Dub. mss.) crustâ tartarea rimosâ inæquabili demum verrucoso-granulatâ albâ ambitu radioso-simbriata, apothecis sessilibus convexis subglobosisque cinereo-glancis pruinosis demum aggregato-conglomeratis difformibus, margine thallode crasso demum tenui tandemque subevanescente. — Ad rupes Mimatis (cl. Prost), Vogesorum (cl. Maugeot), et circa Vire ex cl. Delise. — *Lecanora Swartzii* Ach. *Lichen Swartzii* Ach. prod. t. 1. f. 2. nov. act. holm. n. 15. t. 6. f. 3. (v. s.)
7. *P. OCELLATUM* (Dub. mss.) crustâ orbiculari tartarea rimoso-areolata inæquabili granulatâ ambitu gyroso-plicata, apotheciis adnato-sessilibus centralibus confertis, disco plano-concaviusculo nigricante cæsio-pruinoso, margine thallode crasso incurvo integro flexuoso intus sub disco albis. — In rupibus calcariis. — *P. Villarsii* Delise in litt. *Lecanora Villarsii* Ach. *Urecolaria ocellata* DC. fl. fr. 2. p. 372. *Ure. scruposa* & Schær. *Lichen ocellatus* Vill. dauph. 3. t. 55. (v. v.)
8. *P. CANDICANS* (Dub. mss.) crustâ suborbiculari tartarea subimbricata rugulosa albâ centro interdum nigro-pulverulenta in ambitu radioso-plicata lobata lobis apice dilatatis truncato-crenatis, apothecis centralibus confertis orbicularibus disco planiusculo nigricante cæsio-pruinoso, margine thallode crasso tumidiusculo demum subcrenato. — Ad rupes Neustriæ (cl. Le Prévost), Aginni (cl. Chamb.), Mimatis (cl. Prost). — *Lichen candicans* Dicks. cr. 3. t. 9. f. 5. eng. bot. t. 1778. *Lecanora explicata* Chamb. in St. Am. agen. — Observante cl. Le Prévost a sequente cum quâ ab Achario confusa fuerat distincta species. (v. s.)
9. *P. EPIGÆUM* (Cheval. fl. par. 1. p. 638.) crustâ minutâ suborbiculari tartarea plicato-rugosâ pruinosa albissima in ambitu lobato-crenata, apotheciis dispergitis minutis orbicularibus disco plano demum convexiusculo aterrimo, margine tenui albo demum evanescente. — Ad terram et supra muscos in Vogesis et propè Gisors (cl. Le Prévost), propè Noyon in monte dicto St. Simeon (cl. Graves), Parisios ex Cheval. — *Lecanora epigaea* Ach. syn. 179. excl. syn. Dicks. et eng. bot. *Lichen epigaeus* Pers. (v. s.)
10. *P. CANESCENS* (DC. fl. fr. 2. p. 379.) crustâ orbiculari tartarea rugoso-plicata granuloso-pulverulenta glanco-caudicante aut subcinerata, in ambitu lobato-plicata, apotheciis subcentralibus orbicularibus, disco plano demum convexo atro subpruinoso margine proprio elevato conciore demum subevanescente instructo, margine thallode tenuissimo subconspicuo evanescente. — In muris et trucis arborum. — *Lecidea canescens* Ach. *Lichen canescens* Dicks. cr. 1. t. 2. f. 5. eng. bot. t. 582. (v. v.)
11. *P. TEICHOXYTUM* (DC. fl. fr. 5. p. 185.) crustâ subcontigua tartarea granuloso-pulverulenta aut incano-cinerascente aut grisea, ambitu radioso-plicato lobato-crenato, apotheciis sparsis adpressis disco concaviusculo rubro, margine thallode crasso elevato flexuoso pulverulento subcrenulato. — Ad muros et lapides calcarios. — *P. versicolor* Fl. fr. 2. p. 380. excl. syn. *Lecanora teicholyta* Ach. (v. s.)
12. *P. FULGENS* (DC. fl. fr. 2. p. 378.) crustâ suborbiculari subcontigua tartarea rugoso-plicata inæquabili pulverulenta pallido-flavescente ambitu plicato-sublobato lobis flexuosis planis, apotheciis sparsis sessilibus disco ruberrimo piano-concavo demum convexiusculo, margine thallode crasso elevate colorato demum flexuoso crenatoque tandem subevanescente. — Ad terram et

662 ACOTYL. SEU CELLULARES.

super muscos ramos. — *Lecanora fulgens* Ach. *Psora citrina* Hoffm. lich. t. 48. f. 2. *Lichen fulgens* Swartz. (v. v.)

B. bracteatum (Ach.) crustâ granulatâ, granulis passim sublobatis, ambitu consimili subeffigurato, apotheciorum disco plano rubro, margine thallode elevato tenui integrerrimo dilutiori. — *Psora bracteata* Hoffm.

13. *P. oxytotonum* (DC. fl. fr. 5. p. 185.) crustâ rimosâ verrucoso-areolatâ glabra viride citrinâ, ambitu radioso-plicato, laciniis convexiusculis inciso-lobatis, apotheciis confertis disco immerso concaviusculo flavo-rubro, margine thallode elevato rugoso crenulato persistente. — Ad saxa quartzosa Vogesorum et Alpium. — *Lecanora oxytona* Ach. — Hanc speciem cum priori conjungit cl. Sprengel. (v. v. DC.)

14. *P. calloplismum* (Mérat fl. par. 184.) crustâ orbiculari subrimoso-areolatâ planâ pallidè flavâ subpruinosâ, ambitu radioso-plicato lobato flavissimo laciniis dilatatis planis inciso-crenatis, apotheciis centralibus confertis disco convexiusculo aurantiaco, margine thallode dilutiori integro angulosoque discum subæquante. — In muris et saxis passim. — *Lecanora callopisma* Ach. syn. 184. — Non a sequenti diversum vult cl. Meyer forsitan meritò. (v. v.)

15. *P. murorum* (DC. fl. fr. 2. p. 378.) crustâ orbiculari rimosâ plicato-rugosâ vitellinâ superficie pulveraceo-pruinosâ, ambitu radioso-plicato laciniis linearibus convexis incisis, apotheciis centralibus confertis disco plano-concavo saturatiōri demūm convexo, margine thallode pallidiore flexuoso integro aut subcrenulato. — In saxis et muris. — *Lecanora murorum* Ach. *Lichen murorum* Hoffm. en. lich. t. 9. f. 2. — Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 6. f. 1. (v. v.)

B. miniatum, crustâ subgranulatâ miniatâ superficie nudâ ambitu radioso-lobato, laciniis convexis brevissimis inciso-crenatis, apotheciis turgidis intense miniatis, disco plano demūm hemisphaerico marginem thallodem integrimum subconcolorem excludente. — *Lecanora miniata* & Ach. — Hoffm. lich. t. 60. f. 1. (v. v.)

y. obliteratum, crustâ subeffusâ areolato-verrucosâ miniato-flavicante, ambitu irregulari subeffigurato aut obsoleto, apotheciis confertis concoloribus convexis suboblitterata. — *Lecanora miniata* & obliterata Ach. *Patellaria obliterata* DC. fl. fr. 2. p. 367. (v. v.)

16. *P. elegans* (DC. fl. fr. 2. p. 379. excl. syn. Hoffm.) crustâ suborbiculari subimbricatâ plicato-rugosâ flavo-aurantiâ superficie nudâ, lobis linearis-laci-natis flexuosis convexis subdiscretis radiantibus, apotheciis sparsis disco piano-concavo concolori, margine thallode pallidiore crasso subinfexo integro. — In rupibus calcariis micaceisque. — *Lecanora elegans* Ach. — Dill. musc. t. 24. f. 68. — Cum priori conjungit cl. Sprengel. (v. s.)

XXVII. LECANORA. — *Lecanoræ* sp. Ach. — *Patellariæ* sp. DC. — *Parmeliæ* sp. Sprengel.

Apothecia scutelliformia adnato-sessilia subiùs a thallo formata; lamina proligera discum efformans colorata margine plus minus crasso a thallo formato et eidem concolori cincta. — *Thallus crustaceus* adnatus expansus uniformis determinatus vel effusus.

* *Apothecius flavis.*

1. *L. vitellina* (Ach. lich. 403.) crustâ effusa indeterminatâ granulatâ flavo-vitellinâ, apotheciis confertis disco plano crustæ concolori demūm convexiusculo saturatiōri subpruinoso difformi, margine thallode elevato tenui tandem flexuoso subpulveralento subevanescente. — Ad parietes, ligna lapidesque. — *Patellaria vitellina* Hoffm. lich. t. 26. f. 1. et t. 27. f. 2. Fl. fr. 2. p. 359. *Parmelia vitellina* Fl. dan. t. 1347. f. 2. Forma *Parmeliæ* parietinæ ex cl. Meyer. (v. v.)

B. coruscans (Ach.) crustâ diffractâ areolatâ granulatâ saturate vitellinâ granulis conglomeratis in ambitu sublobato-crenatis subobtectâ, apothe-

ciis numerosis confertissimis, disco plato aurantiaco, margine thallode crenato. — Ad sepimenta lignea. (v. s.)

y. Prevostii, crusta diffracto-areolata granulata vitellina, apotheciis sparsis aut confertis, disco primum planiusculo crustae subconcolori demum subhemisphaerico difformi rufo-fuscescente, margine thallode splendide vitellino tandem flexuoso. — Ad muros argillaceos in Neustriâ (cl. Le Prévost). (v. s. D.)

2. L. SALICINA (Ach. lich. 400.) *crusta granulato-inaequabili sordide lutescente, apotheciorum disco plato demum convexo subaurantiaco, margine thallode tenui subcrenulato demum integro flexuoso tandemque evanescente. — Ad corticem Salicis, Ulmi etc. — Patellaria salicina Hoffm. lich. t. 61. f. 3-9. — eng. bot. t. 1305. — Hanc cum priori conjungit cl. Sprengel, forsitan non immixta. (v. s.)*

3. L. CITRINA (Ach. lich. 176.) *crusta leprosa granulato-pulverulentâ citrinâ demum obscuriori subrimosa, apotheciis parvis adpressis disco plato demum convexo aurantio, margine thallode tenui pulverulento. — In muris et saxis. — Patellaria candelaris DC. fl. fr. 2. p. 359 pro parte. Lichen Linckii Gmel. — Apothecia tantum in crusta seniori occurunt. Forma Plicodii murorum ex cl. Meyer. (v. v.)*

3. xanthostigma (Ach.) *crusta tenuissimâ albicante granulis citrinis conglomeratis adspersâ, apotheciis planis demum subglobosis luteo-aurantia glabris, margine concolori demum evanescente. — Ad corticem arborum. — Verrucaria flava Hoffm. — Forma Parmeliæ parietinæ ex Mey. nebenst. t. p. 223. (v. v.)*

4. L. LUTEO-ALEA (Dub. mss.) *crusta nullâ, apotheciis plus minus confertis plano-concavis demum convexis hemisphaericisque vitellinis, margine thallode tenui disco subconcolori integro subevanescente aut albescente crenulato. — In cortice arborum. — Lecidea luteo-alba Ach. syn. 49. Lichen luteo-albus Turn. in trans. linn. 7. t. 8. f. 3. — Crusta levigata alba quam describit Acharius l. c. nihil mihi videtur nisi corticis epidermis albicans. Hanc speciem habet cl. Meyer ut apothecia Parmeliæ parietinæ. (v. v.)*

3. aurantiaca, *crusta nullâ, apotheciis confertis plano-convexis hemisphaericisque aurantiacis, margine thallode tenuissimo evanescente aut albescente integro aut subcrenulato. — Lecidea luteo-alba γ pyracea Ach. syn. 49. Patellaria aurantiaca DC. fl. fr. 2. p. 358. Lecidea aurantiaca Ach. Biatora aurantiaca Fries. Patellaria ulmicola DC. fl. fr. 2. p. 358. Gyalecta Persooniana Ach. syn. 10. Lichen aurantiacus Lightf. Hoffm. en. lich. t. 4. f. 7. (v. v.)*

5. L. FLAVO-VIRESCENS (Dub. mss.) *crusta tenui effusa rimosâ areolato-subrugosa flavo-virescente, apotheciis confertis planis demum convexo-globosis rubro-aurantiacis nitidis marginem thallodem flavo-vitellinum crassum integrum demum subcrenulatum tandem excludentibus. — In cortice arborum et rupibus. — Patellaria flavo-virescens Hoffm. lich. t. 20. f. 1. Fl. fr. 2. p. 359. Lecanora erythrella Ach. Lichen flavo-virescens Jacq. coll. 2. t. 13. f. 4. a-b. — Forma apotheciis altius coloratis Parmeliæ parietinæ ex cl. Meyer. (v. v.)*

3. rubescens (Ach.) *crusta areolato-verrucosa pallidâ vel cinereo-virescente, apotheciis demum hemisphaericis ruberrimis, margine thallode disco subconcolori tandem evanescente. (v. s.)*

6. L. CHLOROLEUCA (Ach. lich. 405.) *crusta tenui leproso-granulata albescente, apotheciis confertis elevatis, disco concavo demum plato flavo-virescente, margine thallode elevato crasso undulato cinereo-candidente. — Inter muscos proprie Caen (cl. Le Prévost). — Lichen chloroleucus eng. bot. t. 1373. Lecanora cerina & stillicidiorum Ach. syn. 173. — Forma Parmeliæ parietinæ ex cl. Meyer. (v. s.)*

7. L. CERINA (Ach. lich. 390. excl. var. γ stillicidiorum) *crusta effusa indeterminatâ tenui inaequabili albida aut cinerea, apotheciorum disco plato tandem convexo flavo-cerino, margine thallode elevato inflexo integro demum sub-*

664 ACOTYL. SEU CELLULARES. LECANORA.

crenulato albo-cinereo. — In cortice arborum et sepimentis ligueis. — Patellaria cerina Hoffm. lich. t. 33. f. 1. Fl. fr. 2. p. 360. — Forma in locis humidis crescentia Parmelia parietina ex cl. Meyer. (v. v.)

B. crano-lepra (DC.) crustâ cinereo-cæsiâ sublimitatâ. (v. s.)

8. *L. HEMMATITES* (Chaub. in Saint-Am. agen. 492.) crustâ effusâ tenui inæquabili subrimosa cæsio-cærulecente nigro sæpius limitata, apotheciorum disco plato rubro-fusco demùm convexo, margine thallode elevato inflexo integro aut crenulato griseo-pruinoso. — In cortice Populi fastigiatae propè Beauvais (cl. Graves), Gisors (cl. Le Prév.), Vire (cl. Delise), Aginnum (cl. Chaubart). (v. s.)

* * *Apothecius fuscis.*

9. *L. SCRUPULOSA* (Ach. lich. 375.) crustâ determinatâ rimosâ areolato-verrucosa albo-cinerascente, apotheciorum minutorum disco crustæ verrucis innato planiusculo carneo-cerino subsuscente nigroque, margine thallode demùm elevato crassiusculo integerrimo tandem flexuoso. — Ad corticem vetustam arborum propè Beauvais et Compiegne ex cl. Graves et totius Galliae ex Ach. — Hanc cum Lecan. subsuscâ conjungit cl. Sprengel.

10. *L. SUBFUSCA* (Ach. lich. 393.) crustâ tenui contiguâ cartilagineâ lævigatâ demùm granulatâ inæquabili albâ cinerascenteque, apotheciis sessilibus disco plano-convexiusculo rufescenti-fusco, margine thallode tumido integro tandem flexuoso crenatoque. — Ad corticem arborum et ligna vetusta frequens. — Patellaria subfusca Hoffm. lich. t. 5. f. 3. Fl. fr. 2. p. 362. — Dill. musc. t. 18. f. 16. t. 55. f. 8. (v. v.)

- B. atrynea* (Ach.) crustâ tartareâ areolato-rimosâ verrucosa albida cinerascenteque, apotheciis confertis disco plato demùm convexo fuscescente nigroque, tandem irregularibus flexosis. — In saxis et montibus. (v. s.)

11. *L. VOGESIACA* (Duby mss.) crustâ nitidâ lævi areolato-rimosâ verrucosa albido-lutescente, apothecis minutis prominulis demùm subglobosis, disco griseo-fusco nitido nudo primo plato-concavo demùm valde convexo marginem thallodem integerrimum lævissimum æquante aut subsuperante. — Ad rupes Vogesorum (cl. Mougeot). (v. s. D.)

12. *L. POPULICOLA* (Dub. mss.) crustâ granulatâ inæquabili cinereo-nigricante, ambitu albo subzonato, apotheciorum disco concaviusculo pallido vel subcarneo-livescente, margine thallode elevato crenulato. — In cortice Populi albæ et aliarum arborum. — Patellaria populicola DC. fl. fr. 2. p. 363. Lecan. subsuscâ chlorona Ach. syn. 158. (v. s.)

13. *L. EPIBRYON* (Ach. lich. 396.) crustâ leproso-cartilagineâ pulverulentâ inæquabili niveâ aut albescente, apotheciis sparsis disco plato nitido castaneo-fusco, margine thallode crasso demùm tenui flexuoso crenulatoque. — Super strata muscorum. — Patellaria hypnorum DC. fl. fr. 2. p. 362. Lichen hypnorum Wulf. in Jacq. coll. 4. t. 7. f. 4. — Forma Lecanoræ subsuscæ ex Meyer. (v. v.)

14. *L. EFFUSA* (Ach. lich. 386.) crustâ effusâ tenui subpulverulentâ cinereo-virescente, apotheciis numerosis minutis adpressis disco plato demùm convexo pallide fusco-rufescente, margine thallode tenui pallido subevanescente. — In salicis truncis cavis. — Patellaria effusa DC. fl. fr. 2. p. 356. Lichen salignus Schrad. (v. s.)

15. *L. VARIA* (Ach. lich. 377. excl. var.) crustâ inæquabili granulatâ subverrucosa pallide flavo-virescente, apotheciis minutis confertis adpressis, disco plato aut concavo pallido-fuscescente varioque, margine thallode elevato crustæ concolori subinfexo demùm flexuoso subcrenulato. — Ad asperos parietes et sepimenta lignea. — Patellaria varia Hoffm. lich. t. 23. f. 4. Fl. fr. 2. p. 360. — eng. bot. t. 1666. (v. v.)

16. *L. DETRITA* (Ach. lich. 376.) crustâ verrucosa plicato-rugosa conglomerataque inæquabili albo-cinerascente, apotheciis planis innatis irregularibus

pallidis demum fusco-rufescentibus nigrescentibusque, margine thallode tandem elevato crassiusculo flexuoso crenatoque. — Ad cortices arborum passim. — Patellaria detrita Hoffm. lich. 3. t. 64. f. 1-4. non DC. (v. s.)

17. L. RETORIDA (Chaub. in St.-Am. agen. 493.) crustâ tartareâ tenui granulatâ pallidè cinereo-viridi, apotheciorum disco planiusculo rubro-fusco aut fusco-brunneo convexiusculo demum difformi subnigrescente, margine thallode tenui pulverulento cinereo-viridi demum evanido. — In tegulis tectorum propè Aginnum (cl. Chaubart). (v. s.)

18. L. CRASPEDIA (Ach. lich. 391. excl. var. *g.*) crustâ rimosâ areolatâ subgranulatâ inæquabili albidâ, apotheciorum disco plano rufescenti-ferrugineo demum fusco, margine thallode crastæ concolori tumidulo granulato tandem flexuoso. — In lateribus saxis et rupibus imprimis arenariis. — Lecanora rubricosa Ach. syn. 163. Patellaria craspedia DC. fl. fr. 2. p. 355. P. arenaria Hoffm. lich. t. 58. f. 1. Lichen cæsio-rufus eng. bot. t. 1040. — Forma Patellaria ferruginea ex Mey. nebenst. 1. p. 218. (v. s.)

19. L. BADIA (Ach. syn. 154.) crustâ effusâ inæquabili granulosâ subsquamulosaque verrucosâ olivaceo-fuscâ glabrâ, apotheciis adpressis, disco plano demum convexiusculo badio aut fusco-atro subnitente, margine thallode crasso crastæ discoque dilatiori persistente. — In saxis. — Patellaria badia Hoffm. lich. t. 51. f. 2. Fl. fr. 2. p. 361. Lichen fuscatus Schrad. L. picens Dicks. cr. 4. t. 12. f. 5. (v. v.)

20. L. MOUGEOTIANA (Dub. mss.) crustâ tenui effusâ cartilagineâ subgranulatâ cinereo-viridescente, apotheciis minutis sessilibus numerosis confluentibus, disco plano demum convexiusculo rubro-fusco, margine thallode tenui pallescente demum subcrenulato. — In Vogesorum sylvâ Beauremont propè Bruyères detexit cl. Mougéot, Falaise (cl. de Brébisson). — Patellaria Mougéotiana DC. fl. fr. 5. p. 182. Lecanora incolorata Ach. syn. 160. ex cl. Moug. (v. s.)

21. L. VENTOSA (Ach. lich. 399.) crustâ tartareâ crassâ inæquabili pallescente rimoso-areolatâ areolis convexis plicato-rugosis, apotheciis adpressis demum irregularibus, disco plano-tumente rubro-brunneo margine proprio interdum instructo marginem thallodem tenuem pallidiorem integerrimum superante et demum excludente. — In saxis montium. — Patellaria ventosa DC. fl. fr. 2. p. 354. Lichen ventosus L. eng. bot. t. 906. L. cruentus Web. Hoffm. L. flavescens Jacq. misc. 2. t. 9. f. 1. (v. v.)

* * * Apotheciis rubris aut roseis.

22. L. HÆMATOMMA (Ach. lich. 388.) crustâ crassâ tartareâ pulverulentâ areolato-diffractâ canescenti-sulphureâ, apotheciis innatis sparsis confluentibusque, disco ruberrimo piano demum convexiusculo marginem thallodem pulveraceum subexcludente. — In saxis et rupibus. — Patellaria hæmatomma Hoffm. lich. t. 11. f. 1. et t. 48. f. 1. Fl. fr. 2. p. 355. Lecidea Lallavei Ach. syn. Lichen hæmatomma eng. bot. t. 486. — Huic speciei refert cl. Meyer nebenst. 1. p. 218. Lecanoram Stonei et L. inalpinam, Lecideam saxetanam et L. callosynem Ach. (v. v.)

g. porphyria (Ach.) crustâ solidiusculâ granulato-pulverulentâ, apotheciis sessilibus, margine thallode elevato crasso rugoso-crenulato persistente. — Verrucaria porphyria Hoffm. lich. t. 51. f. 1. Lichen coccineus Dicks. cr. 1. t. 2. f. 1. (v. s.)

23. L. MARMOREA (Dub. mss.) crustâ tenui cinerascente, apotheciis sparsis disco primù punctiformi impresso demum dilatato profunde concavo carneo-cerino margine thallode albo-roseo crassissimo elevato tumido integerrimo pro parte obtecto. — Ad corticem arborum et ad terram supra museos putrefactos. — In Jurasso (cl. Chaillet). — Patellaria marmorea DC. fl. fr. 5. p. 182. Lecidea marmorea & Ach. syn. 46. excl. syn. Scop. et eng. bot. (v. s.)

24. L. CUPULARIS (Dub. mss.) crustâ leprosa tenuissimâ virescenti aut rubescenti, apotheciis sparsis sessilibus disco primù punctiformi impresso demum dilata-

666 ACOTYL. SEU CELLULARES.

LECANORA.

tato profundè conaveo carneo-rubro margine thallode albo-roseo crasso elevato tumido lævi crenato pro parte obteco. — In rupibus schistosis et calcariis Pyrenæorum (cl. Ramond), Mimatis (Prost), Jurassi (Chaillet). — Patellaria cupularis DC. fl. fr. 2. p. 356. Lecidea marmorea & cupularis Ach. Gyalecta cupularis Schær. Lichen marmoreus Scop. eng. bot. 739. L. fuscō-rubens Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 2. f. 2. (v. s.)

25. *L. RUBRA* (Ach. lich. 389. et syn. 177. excl. syn. eng. bot.) crustâ effusa submembranacea lævigata demum inæquabili granulato-pulverulentâ albâ , apotheciis disco concavo dilutè rubro, margine thallode tumido convexo inflexo subcrenulato albo-pulverulento. — In cortice arborum. — Patellaria rubra Hoffm. lich. t. 17. f. 2. Fl. fr. 2. p. 361. Parmelia rubra Fl. dan. 8. t. 1351. f. 1. Lichen Ulmi Ach. (v. v.)

* * * * * *Apothecius rufescens*.

26. *L. BRUNNEA* (Ach. lich. 419.) crustâ granulatâ subimbricata viridi-fuscâ semi-gelatinosâ , apotheciis crustæ innatis confertissimis demum difformibus disco convexiusculo rufescenti aut rufo-fusco , margine thallode elevato crenulato persistente. — Ad terram et suprà muscos putrefactos. — Lecidea microphylla γ pezizoides Schær. spie. 3. p. 111. Patellaria nebulosa Hoffm. lich. t. 40. f. 1. P. brunnea DC. fl. fr. 2. p. 350. Lichen brunneus eng. bot. t. 1246. L. pezizoides Dicks. er. 1. t. 2. f. 4. (v. v.)

β. *coronata* (Ach.) apotheciis minutis sparsis , disco fusco-rufescente demum convexo nigroque. — Propè Mimatem (cl. Prost). — Lecidea microphylla β coronata Schær. l. c. Psora coronata Hoffm. lich. t. 56. f. 1. (v. s.)

27. *L. LEPIDORA* (Ach. lich. 418.) crustâ interruptâ imbricata granulato-squamulosâ flavo-fuscâ aut fusco-virescente , apotheciis confertis submembranaceis , disco concavo demum plano dilatato badio aut rufescenti-fusco , margine thallode elevato inflexo crenato crustâ discoque dilatiori. — Ad terram et muscos montium Mimatis, montis Aurei , Alpium. — Fl. fr. 5. p. 183. Lecanora hypnorum Ach. syn. 193. non lich. univ. Psora hypnorum Hoffm. lich. t. 63. f. 4. 7. Lichen hypnorum eng. bot. t. 740 non Ach. prod. (v. s.)

* * * * * *Apothecius lutescens*.

28. *L. EHRARTIANA* (Dub. mss.) crustâ cartilaginea granulato-areolata subglobulosa rimosâ pallidâ subvirescente , apothecis subadpressis planis demum convexiusculis flexuosis difformibus conglomeratis pallidè flavicantibus , margine thallode tenui subcrenulato evanido. — Ad corticem et ligna arborum Neustriæ (cl. Le Prévost). — Lecidea Ehrartiana Ach. Lichen Ehrartianus Ach. prod. t. 2. f. 1. eng. bot. t. 1136. (v. s.)

β. *polytropa* (Ach.) crustâ subtartarea rimoso-areolata pallidâ , apothecis planiusculis margine flexuosis conglomeratis demum subglobosis immarginatis carneo-flavescens. — Ad lapides Mimatis (cl. Prost). — Patellaria polytropa Ach. lich. t. 58. f. 2. Lichen polytropus eng. bot. t. 1264. L. atro-virens Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 14. f. 2. (v. s.)

29. *L. INTRICATA* (Ach. lich. 380.) crustâ dispersâ diffracto-areolata albido-ochroleucâ aut cinerascente , apotheciis subinnatis confertis disco plano viridi-olivaceo demum olivaceo-fusco marginem tenuem integerrimum stramineum superante vel excludente. — In saxis Mimatis (cl. Prost), Bellovacis (cl. Graves). — Lichen intricatus Schrad. Hanc cum priori conjungit cl. Meyer. (v. s.)

* * * * * *Apothecius pallidis lividis aut pruinosis*.

30. *L. CARNEO-LUTEA* (Ach. lich. 374.) crustâ tenuissimâ lævi subinæquabili canescenti-albâ , apotheciis subinnatis paivis , disco plano carneo-lutescente , margine thallode subinfexo crenato. — Ad corticem arborum in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves. — Parmelia carneo-lutea Turn. in trans. linn. 9. t. 12. f. 2. Lichen carneo-luteus eng. bot. t. 2010.

31. *L. TURNERI* (Ach. lich. 373.) crustâ effusâ cartilagineâ leprosa granulata pulvrenlentâ albo-cinereo-virescente, apotheciis sparsis crassis pulvrenlentis, disco concaviusculo incarnato-pallescente, margine thallode crasso tumido integro flexuosique. — Ad truncos vetustos arborum Neustriæ (cl. Le Prévost), Mimatis (cl. Prost). — *Lichen Turneri* eng. bot. t. 857. (v. s.)
32. *L. PARELLA* (Ach. lich. 370.) crustâ tartareâ effusâ rimosâ plicato-verrucosâ albâ aut viridescente, apotheciis crassis confertis difformibus, disco concaviusculo demum piano convexoque pallide carneo pulvrenlento, margine thallode turgido integerrimo. — Ad truncos, rupes et muros. — *Patellaria parella* Hoffm. lich. t. 12. f. 3. Fl. fr. 2. p. 364. *Lichen parellus* L. eng. bot. t. 727. — Dill. musc. t. 18. f. 10. (v. v.)
- β. tumidula* (Ach.) crustâ tenui laviusculâ demum inæquabili granulatâque incano-cinerascente, apotheciorum disco piano dilatato pruinoso subconcolori demum convexiusculo marginem thallodem tenuem integrum æquante vel superante. — In cortice arborum. — *Lichen tumidulus* Pers. (v. s.)
- γ. pallescens* (Ach.) crustâ plicato-rugosâ granulato-verrucosâ inæquabili sordidè albo-pallescidente, apotheciorum disco subspongioso piano-concavo pallido, margine thallode crasso elevato integro aut flexuoso. — Ad truncos arborum etiam in saxis. — *Psora alabastrina* Hoffm. lich. t. 21. f. 2. a-b. *Lichen pallescens* L. (v. s.)
- δ. Upsaliensis* (Ach.) crustâ tennissimâ membranaceâ lavigatâ demum subgranulatâ albo-glaucescente, apotheciis orbicularibus, disco demum dilatato piano pallido-lutescente, margine thallode crasso elevato integerrimo. — Ad terram inter cespites et suprà muscos quos incrastat. — *Patellaria Upsaliensis* Hoffm. lich. t. 21. f. 2. Fl. fr. 2. p. 362. *Lichen Upsaliensis* L. eng. bot. t. 1654. Dicks. cr. 2. t. 2. f. 7. (v. v.)
33. *L. TARTAREA* (Ach. lich. 372.) crustâ tartareâ effusâ granulato-conglomeratâ turgidâ albo-cinerascente, apotheciis sparsis crassis, disco piano-convexiusculo ruguloso pallide testaceo, margine thallode tumente inflexo demum flexuoso crenatoque. — In rupibus saxis et stratis muscorum. — *Patellaria tartarea* DC. fl. fr. 2. p. 364. *Lichen tartareus* L. eng. bot. t. 156. — Dill. musc. t. 18. f. 13. (v. v.)
- ε. frigida* (Ach.) crustâ tenui albo-glaucescente in papillas ramulosque spinulosos abente. — Ad terram suprà muscos et lichenes in Pyrenæis et in sylvis Neustriæ propè Vire ex cl. Delise. — *Lichen frigidus* L. Swartz meth. musc. t. 2. f. 4. eng. bot. t. 1879. (v. s.)
34. *L. REPANDA* (Fries in litt. ad cel. Le Prévost.) crustâ crassâ effusâ lavigatâ subrimosa albâ pulvrenlentâ ambitu subuplicata, apotheciis sparsis junioribus adpressis demum sessilibus elevatis crassis, disco piano fusco-nigricante pruinoso aut albo-pulvrenlento marginem thallodem crassum integrum flexosumve æquante. — Ad rupes Massiliæ loco dicto Montredon detexit cl. Le Prévost. (v. s.)
35. *L. GLAUCOMA* (Ach. lich. 362.) crustâ tartareâ rimoso-areolatâ æquabili tenui effusâ albo-cinerascente, apotheciis crustæ subimmersis, disco piano demum conico convexo subglobosoque glauco-pruinoso tandem denudato fusco-nigricante, margine thallode integro cæsio-pruinoso demum evanescente. — In saxis Pyrenæorum, Mimatis, Andegaviæ (cl. Guépin). — *Patellaria glaucoma* Hoffm. lich. t. 52. 53. Fl. fr. 2. p. 352. *Lichen sordidus* Pers. *L. varians* Davies in linn. trans. 2. t. 28. f. 3. Color disci sub pruinâ variat incarnatus, pallidus, fuscescens et niger. (v. s.)
36. *L. LIVIDA* (Ach. lich. 375.) crustâ effusâ rimoso-areolatâ verrucoso-granulata glabrâ ex albo-lividâ, apotheciis minutis confertis, disco planiusculo crustæ innato lividè carneo demum convexo exerto, margine thallode crasso elevato flexuoso. — In saxis montium Mimatis (cl. Prost.). (v. s.)
37. *L. ALBELLA* (Ach. lich. 369.) crustâ tenui effusâ cartilagineâ lavigatâ lactea, apotheciis sparsis, disco piano dilutè subcarneo demum convexo cinereo-

668 ACOTYL. SEU CELLULARES. LICHANORA.

pruinoso, margine thallode crasso integro rarius subcrenulato tandem subevanescente. — In cortice lavigata arborum et fruticum propè Mimatem (cl. Prost.), in Nenstriâ ex Le Prév. et Delise. — *Lichen albellus* Pers. Discus derasâ pruinâ pallide carneus aut carneo-fuscus; etiam crusta nou raro pruinosa. (v. s.)

38. *L. ANGULOSA* (Ach. lich. 364.) crustâ tenui submembranaceâ lavigatâ demum inæquabili crassiusculâ rugosâ subrimosâ cinerascente, apotheciis confertis pressione subangulosis plano-convexusculis tandem hemisphæricis, disco pallido-fuscescente glauco-pruinoso, margine thallode integerrimo demum subevanescente. — In cortice arborum. — *Patellaria angulosa* DC. fl. fr. 2. p. 363. excl. var. *B.* (v. v.)

B. leptyrea (Ach.) crustâ suborbiculari albida, apotheciis minutis plano-convexusculis, disco pruinoso marginem thallodem tumidulum persistentem æquante. — *Lichen pallidus* Schreb. — Has 2 varietates cum Lec. subfuscâ conjungit cl. Meyer. (v. v.)

39. *L. SUBCARNEA* (Ach. lich. 365.) crustâ tartareâ subdeterminatâ rimosaâ albâ demum inæquabili, apotheciis carneis pruinosis demum convexis conglomeratis difformibus, disco lavigato demum dilatato et margine proprio prominulo instructo marginem thallodem excludente. — In saxis. — *Lecidea subcarnea* Ach. syn. 45. *Patellaria angulosa* L. DC. fl. fr. 2. p. 363. *Lichen subcarneus* Ach. in nov. act. holm. v. 15. t. 6. f. 4. (v. v.)

40. *L. HAGENI* (Ach. lich. 367.) crustâ tenuissimâ cartilagineo-membranaceâ albo-cinerascente, apotheciis confertis numerosis minutis, disco plano demum convexo fusco-nigro fuscoque cæsio-pruinoso, margine thallode integerrimo nudo persistente. — Ad corticem arborum. — *Patellaria dispersa* DC. fl. fr. 2. p. 363. excl. syn. *Lichen Hageni* Ach. prod. L. cæruleascens Hagen hist. lich. t. 1. f. 5. Formam Parmeliæ Aipoliæ vult cl. Meyer nebenst. 1. p. 225. (v. s.)

B. crenulata (Ach.) crustâ demum inæquabili subgranulatâ cinerascente vel nigricante, apotheciis confertissimis, disco piano, margine thallode crenulato demum flexuoso cæsioque pulverulento. — In tectis lignis vetustis saxisque. — *Lichen umbrinus* Ehr. (v. s.)

41. *L. SYMMICTA* (Ach. syn. 340.) crustâ subgranulatâ sulphureâ subobtectâ apotheciis planiusculis demum convexis difformibus subglobosisque confluentibus concretis pallide luteolis fuscescentibusque, margine thallode juniorum tenui integerrimo evanescente. — Ad ligna demorta et truncos arborum vetustos. — *Lecidea symmicta* Ach. syn. 36. (v. s.)

B. apochræa (Ach. l. c.) crustâ subnullâ, apotheciis in subiculo tenuissimo lavigato albo-glaucoscente nudo subinde sorexifero frequenter sparsis, disco planiusculo pallido luteolo livescenti-fusco nigroque marginem thallodem tenuem subcrenulatum pallide flavicantem æquante. — In septimentis ligneis. — *Lec. apochræa* Ach. syn. 262. *Spiloma vitiligo* et *S. sorediatum* Ach. lich. quoad crustam, meth. lich. t. 1. f. 1. *Coniocarpone vitiligo* DC. fl. fr. 5. p. 176. (v. s.)

42. *L. OROSTHRA* (Ach. lich. 400.) crustâ rimoso-areolata inæquabili subpulverulentâ flavicanti-sulphureâ, apotheciis minutis adpressis disco crustæ subconcolori demum convexo irregulari pallido-fuscescenti subpruinoso marginem thallodem tenuem excludente. — In rupibus Mimatis (cl. Prost.). — *Lecidea orosthea* Ach. syn. 37. *Lichen orostheus* eng. bot. t. 1549. Cum sequenti à cl. Sprengel conjuncta. (v. s.)

43. *L. LUTESCENS* (Ach. lich. 367.) crustâ effusa tenui membranaceâ verrucosâ pallidâ pulvere lutescenti-viridi pallido conspersâ, apotheciis sparsis subinnatis, disco piano lutescenti-pallido demum elevato convexo-subgloboso e carneo flavoque rufescenti cæsio-pruinoso marginem thallodem palverulentum flexuosum primò æquante demum superante. — Ad truncos arborum, rarius fructificans. — *L. expallens* Ach. lich. 374. *Patellaria lutescens* DC. fl. fr. 2. p. 354. (v. v.)

44. *L. INCRUSTANS* (Ach. lich. 405.) crustâ verruculosâ pallido-flavigante sub-pulverulentâ aut subevanescente, apotheciis parvis immersis disco plano-concaviusculo demum convexiusculo cerino flavo-pruinoso marginem thallodem integrum flavum demum superante. — In rupibus calcariis. — *Patellaria incrustans* DC. fl. fr. 2. p. 361. excl. syn. (Abest. in herb. DC. et D.)
45. *L. SULPHUREA* (Ach. lich. 399.) crustâ tartareâ rimoso-diffractâ inaequabili laevigata sulphurea, apotheciis adnatis demum irregularibus, disco piano fusco-nigro pruinoso demum convexo disformi, margine thallode tenui demum evanescente. — In rupibus arenosis. — *Patellaria sulfurea* DC. fl. fr. 2. p. 354. *Verrucaria sulphurea* Hoffm. lich. 1. t. 11. f. 3. *Lichen sulfureus* eng. bot. t. 1186. (v. v.)
46. *L. FRIESIANA* (Duby mss.) crustâ tartareâ effusa rimoso-areolata inaequabili granulato-verrucosa pallide sulphurea, apotheciis numerosissimis minutis sessilibus orbicularibus, disco convexo demum subgloboso ruguloso nigro subpruinoso marginem thallodem tenuem integrum demum superante. — Ad muros argillaceos propè Bernay detexit cl. Le Prévost et cl. Friesio communicavit qui hanc ut speciem novam salutavit. (v. s.)
47. *L. ATHEROCARPA* (Dub. mss.) crustâ tenui griseâ rimoso-diffractâ inaequabili granulosâ obtectâ apotheciis numerosissimis dense aggregatis demum distorsibus, disco convexo aut globoso fusco-nigro cæsio-pruinoso, margine thallode tenui griseo-albescente integro aut subcrenulato demum evanescente. — Ad vetustos trunca in Neustriâ detexit cl. Le Prévost. (v. s.)
- ***** *Apothecius atris.*
48. *L. EXIGUA* (Ach. meth. 154.) crustâ effusa rimosâ granulatâ inaequabili cinereo-virescente, apotheciis confertis, disco piano ruguloso nigro demum convexo globosoque subdifformi, marginethallode cinereo-virescente flexuoso-subcrenulato. — Ad parietes ligneos vetustos inque cortice rimosâ Quercus. — *L. periclea* *B. exigua* Ach. lich. 356. *Patellaria exigua* DC. fl. fr. 2. p. 346. *Lichen exiguus* Ach. in nov. act. holm. 16. t. 5. f. 6. d-e-f. (v. v.)
49. *L. PERICLEA* (Ach. lich. 355.) crustâ tenui subleprosa inaequabili passim pulverulentâ dispersâque albida, apotheciis minutis confertis, disco piano-convexo atro punctato-scabrido demum subhemisphærico marginem thallodem tenuem exiguum subexcludente. — In cortice Pini, Populi, etc. (v. s.)
50. *L. MILVINA* (Ach. lich. 359. var. *B.*) crustâ dispersâ rimosâ verrucoso-areolata granulata nigro-picea, apotheciorum disco planiusculo demum papillato nigro, margine thallode elevato subintegro. — In saxis arenariis prope Beauvais ex Graves, in Gallia ex Persoon in Ach. l. c.
51. *L. SOPHODES* (Ach. lich. 356.) crustâ subdeterminata verrucoso-granulata e cinereo-fusco-virente, apotheciis minutis aggregatis, disco piano demum convexo nigro, humectato fusco, margine thallode tumido subinfuso integrimo. — Ad corticem arborum et in lignis putridis. (v. s.)
- B. laevigata* (Ach.) crustâ dispersâ subverrucosa cinereo-fuscescente, apotheciis sparsis planiusculis, disco demum papillato. (v. s.)
- y. colobina* (Ach.) crustâ effusa leprosa granulato-pulveracea cinereo-viridi, apotheciis adpressis minutis, margine integro demum flexuoso crenatoque. — Ad corticem et ligna putrescentia. (v. s.)
52. *L. METABOLICA* (Ach. lich. 351.) crustâ tenni membranacea demum leprosa rimosâ inaequabili cinereo-fusco-virescente, apotheciis minutis confertis, disco concaviusculo tandem convexo nigro humectato subfusco, margine thallode crassiusculo elevato integro albo demum fusco discoque subconcolori. — Ad corticem Ulmi, Betulæ albæ et Quercus. — *L. sophodes* *drymea* Ach. lich. *Patellaria metabolica* DC. fl. fr. 5. p. 183. (v. s.)
53. *L. THARCIDIA* (Ach. syn. 147.) crustâ cartilagineo-membranacea rugoso-verruculosa albicante, apothecis adpressis disco atro piano marginem thallodem tenuem æquante, demum convexo rugoso marginem baseos submembranaceum integrimum obtegente ac excludente. — Ad corticem Juglandis

670 ACOTYL. SEU CELLULARES.

in Gallia ex Ach., propè Beauvais ex Graves. — Margo thallodes aliquando
fuscescens evadit.

54. *L. ARGOPHOLIS* (Ach. lich. 346.) crustâ lævigatâ verrucoso-globulosâ pal-
lescente, verrucis demum subimbricatis sublobatis difformibus, apotheciorum
disco concavo atro aut fusco-atro, margine thallode acutiusculo coarctato
crenulato. — Ad rupes propè Vire ex cl. Delise.

55. *L. ATRA* (Ach. lich. 344.) crustâ subdeterminatâ rimosâ granulato-verru-
cosâ albo-cinerascente, apotheciorum disco plano demum tumidulo atro,
margine thallode elevato albo tandem flexuoso crenulatoque. — In saxis,
rupibus atque cortice arborum. — *Patellaria tephromelas* DC. fl. fr. 2. p. 362.
Lichen ater Huds. eng. bot. t. 949. — Variat crustâ magis albida vel cinerea,
apotheciis sparsis vel confertissimis planis et convexis, minutis et majoribus.
(v. v.)

B. confragosa (Ach.) crustâ subdispersâ granulato-globulosâ inæquabili
cinereo-virescente, apotheciis minutis confertis demum convexisculis,
margine thallode tumente integrerrimo. (v. s.)

γ. grumosa (Ach.) crustâ rimosâ granulatâ pulverulentâ cinereo-cæru-
lescente, apotheciis innatis disco convexisculo, margine thallode de-
mum rugoso albicante. — *Patellaria grumosa* Hoffm. lich. t. 51. f. 1. 2.
Urceolaria Segestria Flörke. (v. s.)

56. *L. DISCOLOR* (Dub. mss.) crustâ effusa leprosa subrimosa granulata inæqua-
bili albo-virescente, apotheciis confertissimis, disco plano lævi opaco aterrimo
demum convexo subundulato, margine thallode cinereo-virescente crasso
flexuoso subcrenulato. — Ad muros argillaceos circa Bernay detexit cel. Le
Préost. (v. s. D.)

XXVIII. URCEOLOARIA Ach. meth. 141. lich. univ. 74. t. 6. f. 8-11. DC. fl. fr. 2.
p. 370.

Apothecia orbiculata plana vel concava thallo immersa ab eo margi-
nata et subtus formata; lamina proligera discum efformans colorata
urceolata in thalli substantiâ tota immersa, margine proprio tenuissimo
interdum instructa, vel in ambitu cum margine thallode elevato a quo
cingitur concreta. — *Thallus crustaceus tartareus* vel *subleprosus*, ad-
natus, uniformis, determinatus vel effusus, rimoso-areolatus vel ver-
rucosus.

1. *U. MUTABILIS* (Ach. lich. 335.) crustâ cartilagineo-membranaceâ lævi conti-
guâ demum globuloso-coacervatâ rugosâ rimosâ verrucosa cinereo vel livido-
glancâ, laminâ proligerâ verrucis immersâ atrâ planâ tandem concavâ mar-
gineque thallode elevato integro cinctâ. — Ad corticem Juglandis propè Mi-
matem (cl. Prost). — Schær. exs. n. 134. (v. s.)

2. *U. SCRUPOSA* (Ach. meth. 147.) crustâ effusa tartarea granulata rimoso-areo-
latâ areolis rugoso-verrucosis albo-cinerascente, laminâ proligerâ urceolata
nigrâ cinereo-pratinosa tandem dilatata, margine thallode crasso granuloso
inflexo marginem discoideum obtegente. — Ad terram inque saxis et rupibus.
— Fl. fr. 2. p. 372. *U. gibbosa* Ach. syn. 139. *Lichen pertusus* Wolf. in Jacq.
coll. 2. t. 13. f. 3. *L. fibrosus* eng. bot. t. 1732. — Dill. musc. t. 18. f. 15. B. (v. v.)

δ. bryophila (Ach. meth. lich. 148.) crustâ rugoso-plicata albâ vel subci-
nerascente, apotheciis minutis nigro-cæsiis, margine thallode contracto
rugoso, proprio tandem prominente. — Ad terram suprà muscos et alios
Lichenes. — *Gyalecta bryophila* Ach. syn. 10. *Patellaria muscorum*
Hoffm. lich. 1. t. 21. f. 1. *Lichen scruposus* eng. bot. t. 266. — Hall.
helv. t. 47. f. 6. (v. v.)

γ. cretacea (Schær.) crustâ rugosâ pulverulentâ albâ, apotheciis immersis
dilatatis rugosis, margine proprio crasso, thallode discreto vel nullo. —
Ad rupes umbrosas Mimatis (cl. Prost). — *Gyalecta cretacea* Ach. syn.
p. 10. (v. s.)

δ. diacapsis (Schær.) crustâ tenuissimè rimosâ rugoso-plicata albâ pulve-

volenta, laminâ proligerâ planâ dilatatâ nigra albo-pruinosâ, margine proprio crasso infexo libero flexoso thallode exteriori cincto. — In saxis et muris circa Aginnum (cl. Chaubart), Vire (cl. Delise). — Lichen diacapsia eng. bot. t. 1954. (v. s.)

3. U. CLESIO-ALBA (Le Prévost in litt.) crustâ effusa tartareâ inæquabili globulosâ-coacervata rugoso-plicata rimosâ verrucosâ glanco-cinerascente, laminâ proligerâ verrucis immersâ concavâ tandem subdilatatâ margine thallode crasso infexo crenulato cinctâ. — In muris argillaceis circa Bernay in Neustriâ detexit cl. Le Prévost. (v. s.)
4. U. SCHLEICHERI (Ach. lich. 332.) crustâ orbiculatâ læviusculâ areolato-sublobatâ flavo-citrinâ, laminâ proligerâ demum planâ atrâ, margine thallode tenui elevato subcrenulato. — Ad terram, inter muscos et supra Urceolariam scrupulosam Monspelii. — Fl. fr. 5. p. 184. (v. s.)
5. U. DIAMARTA (Ach. lich. 331.) crustâ subdeterminatâ rimoso-areolatâ subverrucosâ rubro-ochraceâ, laminâ proligerâ immersâ atrâ immarginatâ demum disformi et angulosâ, margine thallode elevato demum flexoso. — Ad saxa in agro Mimatis (cl. Prost), Arvernico ex cl. Delise. — Lecidea Dicksonii & Ederi Ach. lich. 165. Lecidea Ederi Ach. syn. 22. Lichen Ederi Sw. eng. bot. t. 1117. (v. s.)
6. U. ACHARII (Ach. lich. 331.) crustâ subdeterminatâ lævigatâ tenuissimè rimosâ pallide testacea, laminâ proligerâ immersâ concavâ rubrâ orbiculari ellipticâ aut elongatâ, margine thallode tumido. — Ad saxa Neustriæ prope Cherbourg (cl. Le Prévost), Vire (cl. Delise). — Parmelia Acharii Spreng. Lichen Acharii eng. bot. t. 1087. Crustæ color variat magis ruber vel flavicans et ferrugineo-ochraceus. (v. s.)
7. U. STRIATA (Duby mss.) crustâ effusa tartareâ areolato-rimosâ inæquabili verrucosâ, areolis planis, laminâ proligerâ immersâ atrâ albo-pruinosâ orbiculari aut ellipticâ, disco impresso punctiformi aut rimæformi, margine crasso tumido striato, margine thallode vix elevato crasso integro. — In silicibus circa Rothomagum detexit cl. Le Prév. (v. s.)
8. U. PREVOSTII (Duby mss.) crustâ contigua tartareâ griseo-cinerascente, laminâ proligerâ concavâ orbiculari aut oblongâ profunde immersâ discretâ carnososo-gelatinosâ carneo-pallidâ demum nigra, margine elevato libero integro. — Ad rupes calcarias Jurassi (cl. Mong. et Nestl.), Rothomagi (cl. Le Prév.), Mimatis (cl. Prost). — Mong. et Nestl. vog. n. 848. Biatora Prevostii Fries ined. ex cl. Le Prév. in litt. (v. s.)
9. U. OPEGRAPHOIDES (DC. fl. fr. 2. p. 371.) crustâ crassâ planâ rimoso-areolata subleprosa albida, laminis proligeris minutis punctiformibus nigro-cæsiis immersis demum confluentibus angulatis planis in lineas subdispositis. — In saxis. (v. s.)
10. U. CINEREA (Ach. lich. 336.) crustâ rimosâ areolato-verrucosâ cinerea cinereo-ochraceâ aut albo-cæsiâ interdum nigro limitatâ, laminâ proligerâ verrucis immersâ primò punctiformi atrâ demum dilatatâ orbiculari elevata interdum margine proprio tenuissimo instructâ, margine thallode prominente crassiusculo integro. — In rupibus. — U. tessulata DC. fl. fr. 2. p. 371. Verrucaria ocellata Hoffm. lich. t. 20. f. 2. Lichen cinereus L. eng. bot. t. 1751. Lecanora cæcna Ach. Sagedia depressa Ach. — Variat areolis planis et convexis, apotheciis raris et frequentissimis. (v. v.)
- U. polygonia* (Ach.) crustâ rimoso-areolata cinerea areolis multangulis, apotheciis in singulâ areolâ pluribus concaviusculis minutis. (v. s.)
11. U. LÆVATA (Fries ex cl. Mong. in litt.) crustâ lævigatâ rugosiusculâ subrimosa sordidè glaucescenti-lurida, laminâ proligerâ verrucis immersâ concavâ atrâ orbiculari, margine elevato nigrescente tumido subrugoso. — Ad rupes montis Hohneck Vogesorum (cl. Mougeot). — Sagedia lœvata Ach. lich. 327. — Crusta subinde determinata lineolâque nigra serpentinâ limitata, humectata virescens. (v. s.)
12. U. CASTANEA (DC. fl. fr. 2. p. 371.) crustâ castaneâ areolato-verrucosâ, areo-

672 ACOTYL. SEU CELLULARES.

lis convexis conglomeratis, apotheciis solitariis immersis. — In rupibus Pyrenæorum circa Barèges ex cl. Ramond. (Abest in herb. DC. et D.) †

13. *U. CALCARIA* (Ach. meth. 142. t. 4. f. 1.) crustâ determinatâ subfarinosâ rimoso-areolatâ albâ, laminâ prolierâ minntâ concaviusculâ nigrâ cæsiopruinosa, margine thallode sub prominulo tandem discreto, discoideo tenui tandem discreto integro. — Ad lapides calcarios. — Verrucaria contorta Hoffm. lich. 1. t. 22. f. 1-4. Lichen Hoffmanni eng. bot. t. 1940. L. calcareus Linn. — Mich. gen. n. 20. t. 54. f. 7. (v. v.)

U. aggregata (Flörke) crustæ areolis fertilibus aggregatis plano-convexis angulosis glabriusculis in medio elevatis, laminâ prolierâ plano-concavâ, margine thallode ruguloso crenato. (v. s.)

U. contorta (Ach.) crustâ rimoso-areolatâ sordide cinerascente, areolis sejanetis depressis irregularibus in medio elevatis, laminâ prolierâ concaviusculâ, margine thallode ruguloso pulverulento albidiori. — U. contorta DC. fl. fr. 2. p. 370. U. calcaria & Hoffmanni Ach. syn. 143. Lichen rupicola Hoffm. en. lich. t. 6. f. 3. (v. v.)

XXIX. CHIODECTON Ach. in linn. trans. t. 12. p. 35. t. 3. f. 2-3. syn. 108.

Apothecia subpulveracea subglobosa atra, plura in receptaculo verrucæformi è propriâ substantiâ albâ formato inclusa subconfluentia, ad ejus superficiem punctis elevatis notabilia. — Thallus crustaceus plano-expansus adnatus uniformis.

1. *C. MYRTICOLA* (Fée crypt. exot.) crustâ effusa albo-farinosa subgranulosâ, verrucis turgidis ovalibus deformibus subfarinaceis, apotheciis angulatis atris. — In cortice Myrti communis insul. Stæchadum (Dr Montagne). (v. s.)

XXX. PERTUSARIA DC. fl. fr. 2. p. 319. — Porina Ach. lich. t. 7. f. 1. 2. syn. 109. — Porophoræ sp. Mey. Spreng.

Apothecia plura rarius singula in verrucis a thallo formati immarginatis semiglobosis ellipticis et deformibus ostiolis pertusis inclusa. — Thallus crustaceo-cartilagineus plano-expansus adnatus uniformis.

1. *P. DELISEI* (Duby mss.) crustâ crassâ membranacea glabra plicato-rugosa aurantiaco-rubrâ, apotheciorum verrucis confertis rotundatis difformibusque supra planis, ostiolis pluribus minutis punctiformibus depressis concoloribus intensioribusve. — Ad rupes propè Granville (cl. Delise). (v. s. D.)

2. *P. GLOMERATA* (Schær. spic. 66. exs. n. 120.) crustâ cartilagineo-membranacea demum pulvulentâ albâ, apotheciorum verrucis agglomeratis globosis, ostiolo solitario protuberante convexo nigro, demum profundè impresso submarginato. — Ad terram muscos incrustans propè Minatæ (cl. Prost). — Porina glomerata Ach. lich. t. 7. f. 2. Variat crustâ et verrucis nudis glabriusculis et pulvulentis. Ostiolum jàm protuberans jàm depresso. — Habitus Urceolaria verucosæ. (v. s.)

3? *P? CHIONÆA* (DC. syn. gall. n. 873; fl. fr. 5. p. 173.) crustâ granulatâ niveâ verrucis convexis difformibus albissimis glabris obiectâ, ostiolis pluribus minutis subconcoloribus fuscisque. — In saxis propè Fontainebleau. — Porina chionæa Ach. lich. 311. Thelotrema chionæum Ach. meth. t. 8. f. 2. Porophora chionæa Meyer. Spreng. — « Ob crustam tartaram in genere numquam occurrentem et defectum thalamiorum verorum Porinæ species vix est, sed thallum ignoti cuiusdam lichenis tautum offert. » Ach. syn. 113. (v. s.)

4. *P. COMMUNIS* (DC. fl. fr. 2. p. 320.) crustâ membranacea æquabilis levigata effusa albido-cinerascente, apotheciorum verrucis confertis subglobosis, ostiolis pluribus punctiformibus depressis nigris. — In cortice ad truncos arborum. — Schær. exs. n. 118. Porina pertusa Ach. lich. t. 7. f. 1. Lichen pertusus L. eng. bot. t. 677. — Mich. gen. t. 52. et t. 56. f. 1. 2. (v. v.)

P. plumbea (Le Prév.) crustâ plumbeâ, ostiolis concoloribus aut nigrescentibus. — In Neustriâ in cortice Castaneæ detexit cl. Le Prévost. (v. s.)

P. areolata (Ach.) crustâ lutescenti-cinereâ crassâ rimoso-areolata. — In saxis propè Mimatem (cl. Prost). (v. s.).

5. *P. pustulata* (Dub. mss.) crustâ lævigatâ subrimosa albicante, apotheciorum verrucis subhemisphaericis, ostiolis pluribus elevatis papillæformibns aggregato-confluentibus nigris. — In cortice Fagi propè Mimatem (cl. Prost). — *Porina pustulata* Ach. *Porophora pustulata* Spreng. — An satis distincta species? (v. s.)
6. *P. WULFENII* (DC. fl. fr. 2. p. 320.) crustâ subeffusâ membranacea glabra pliato-rugosâ cinereo-olivacea aut cinereo-virescente, apotheciorum verrucis confertis rotundatis demùm difformibus angulosis supra depresso ambitu tumente subgibboso-flexuoso submarginatis, ostiolis in centro verrucæ solitariis pluribusque subconfluentibus demùm dilatatis difformibus nigris. — In arborum cortice. — *Porina fallax* Ach. syn. 110. *Thelotrema hymenæum* Ach. meth. Lichen pertusus Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 13. f. 3. Schrad. spic. t. 1. f. 5. non L. — Forma monstruosa *P. communis* ex cl. Meyer. (v. v.)
7. *P. LEIOPLACA* (Schær. spic. 66. exs. n. 119.) crustâ membranacea tenuissimâ lævigatâ tandem subrimosa albâ, apotheciorum verrucis sparsis convexis, ostiolis solitariis pluribusve rotundatis depresso fuscouscentibus in ostiolum unicum rimæforme irregulare sèpè confluentibus. — Ad corticem in truncis arborum Neustriæ (cl. Le Prév.), propè Parisios ex Cheval. — *Porina leioplaca* Ach. lich. t. 7. f. 2. — Apothecia minus quam in præcedenti depresso. *P. communis* in arboribus vigentibus crescentis et cortice dilaceratae forma ex cl. Meyer nebenst. 1. p. 199. (v. s.)
8. *P. MELALEUCA* (Dub. mss.) crustâ membranacea tenuissimâ nitidâ lævigatâ demùm rimoso-areolata lutescenti-albâ, apotheciorum verrucis sparsis convexo-planis vix elevatis, ostiolis in centro verrucæ solitariis pluribusve punctiformibus vix coloratis et vix depresso demùm in ostiolum unicum difforme plerumque rimæforme depresso nigrescens confluentibus. — In cortice arborum Neustriæ (cl. Le Prévost). — *Thelotrema melaleucum* Schær. ined. ex cl. Le Prév. Lichen melaleucus eng. bot. t. 2461. (v. s.)

XXXI. THELOTREMA Ach. meth. 130. lich. univ. 62. t. 6. f. 1. 2. — *Volvaria* DC. fl. fr. 2. p. 373. — *Antrocarpum* Meyer.

Apothecia membranacea solitaria in verrucis a thallo formatis apice apertis marginatis inclusa. — Thallus crustaceo-cartilagineus plano-expansus adnatus uniformis.

1. *T. LEPADINUM* (Ach. meth. 132.) crustâ tenui effusâ membranacea albicante, apotheciorum verrucis sessilibus conoïdeis interdùm aggregatis truncatis apice apertis, aperturæ margine tenui simplici subinfexo-coarctato, fundo atro-cinereo membranâ rumpente tecto. — In cortice annosarum Quercnum. — Ach. lich. t. 6. f. 1. Moug. et Nestl. vog. n. 257. *Volvaria truncigena* DC. fl. fr. 2. p. 374. Lichen inclusus eng. bot. t. 678.
B. scutelliforme (Ach.) crustâ crassâ subtartarea inæquabili subpulverulentâ, apotheciorum verrucis parum elevatis, aperturæ dilatatae margine tumido subrugoso. — Ad arborum truncos vetustos et saxa.
2. *T. EXANTHEMATICUM* (Ach. lich. 313.) crustâ tenui contiguâ effusâ leprosa cinerascente aut cinereo-ochraceâ, apotheciorum verrucis semi-immersis plano-convexusculis sparsis albidiobus, aperturæ subocclusæ radiato-rimosæ demùm hiantis fundo velato carneo-lutescente. — Ad rupes præsertim calcarias passim. — *T. clausum* Schær. exs. n. 122. *Volvaria exanthematica* DC. fl. fr. 2. p. 373. *Parmelia exanthematica* Spreng. *Lecanora crateriformis* Chaub. in Saint-Am. agen. 492. Sm. in linn. trans. 1. t. 4. f. 1. eng. bot. t. 1184. (v. v.)
3. *T. CONCHYLIOIDES* (Dub. mss.) crustâ subnullâ, apotheciorum verrucis rotundatis applanatis albis subdepresso apice apertis, post lapsum apothecii

nigri orbicularis lentiformis cyathiformibus. — In rupibus silaceis circa Parisiis. — *Volvaria conchylioides* DC. fl. fr. 2. p. 373. (v. s.)

4. *T. VARIOLARIOIDES* (Ach. in act. holm. v. 33. p. 95.) crustâ subdeterminatâ glabrâ subrugulosa cinerascente, apotheciorum verrucis confertis irregularibus albidis aperturâque ampliâ nigrâ floccoso-pulverulentia margine crasso subangulato lacero-crenato. — Ad corticem Carpini, Populi, Fraxini in provinciis boreali-occidentalibus. — « Habitus Variolariæ. Variat crustâ magis cinerascente, verrucis rariis sparsis et aggregatis, disco floccoso vel nullo nigro et margine verrucarum crasso subintegro. » Ach. (v. s.)

β. agelaeum (Ach.) crustâ albâ granulis sorediisque minutis adspersâ vel pulverulentâ, apotheciorum verrucis adpressis rarâ crustâque submersis. — eng. bot. t. 1923. Plantam dubiâ generis et a variis heterogenieis conflatara suspicatur cl. Fries sched. crit. n. 192. (v. s.)

+++++ APOTHECIA PULVERULENTA AUT NULLA THALLO PULVERULENTO INSERTA.

XXXII. *VARIOLARIA* Pers. in Ust. ann. bot. st. 7. DC. fl. fr. 2. p. 324. Ach. lich. 67. t. 5. f. 1-9. — *Pertusariæ* et *Parmeliæ* transformatae Meyer. Spreng.

Apothecia verruciformia sessilia a thallo formata plerumque soredifera submarginata alba; lamina proligera compressa intrâ verrucam inclusa atque ab eâ suprâ velata tectaque. — Thallus crustaceus plano-expansus adnatus uniformis.

1. *V. GLOBULIFERA* (Ach. lich. 322.) crustâ subcartilagineâ rimosâ cinerascente granulis sorediisque irregulariter adspersâ inæquabili, apotheciorum verrucis sparsis subglobosis glabris demum suprâ depressis sorediferis, nucleo concavo incluso. — Ad corticem Abietis propè Mimatem detexit cl. Prost. — Turn. in linn. trans. g. t. 10. f. 2. — eng. bot. t. 2008. — Hanc Meyer habet ut statum monstruosum corticali substantiâ dissolutâ et nucleis deformatis *Pertusariæ* communis. (v. s.)

2. *V. VERRUCULOSA* (Delise ined.) crustâ subcartilagineâ glabrâ inæquabili rimosâ cinerascente, apotheciorum verrucis elevatis rotundis pulverulentis demum suprâ depressis in pulvinulos sparsos conglomeratis. — Ad corticem arborum propè Fougères (cl. Delise). (v. s. D.)

3. *V. COMMUNIS* (Ach. lich. 322.) crustâ cartilagineâ lavigatâ albicante demum inæquabili cinereâ sorediis albis immarginatis adspersâ, apotheciorum verrucis sphæroideis pulverulentis, nucleo submembranaceo planiusculo pallido tandem denudato. — Ad corticem arborum, in ligno vetusto et saxis. — Crusta ferè insipida.

a. orbiculata (Ach.) crustâ tenui granulatâ subradiato-rimosâ zonato-limitatâ albo-cinerascente, sorediis centralibus sparsisque planiusculis submarginatis concoloribus. — In lignis et ad truncos arborum etiam cortice denudatos. — *Verrucaria orbiculata* Hoffm. en. lich. t. 7. f. 2. (v. v.)

β. faginea (Ach.) crustâ subeffusa glabrâ rugosâ rimosâque albicante, sorediis hemisphæricis sparsis immarginatis solidiusculis pulverulentis albissimis. — *V. faginea* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 322. *Lichen fagineus* L. — Status júnior *Pertusariæ* communis ex cl. Mey. neb. 1. p. 202. (v. v.)

γ. aspergilla (Ach.) crustâ tartareo-cartilagineâ determinatâ glaresente, ambitu lavigato radiato-rimoso, sorediis sparsis superficialibus planis subimmarginatis obsoletisque albidioribus. — In rupibus et saxis. — Fl. fr. 5. p. 176. *Crusta sterilis* Leeanoræ albo-cærulescentis ex Meyer. (v. s.)

4. *V. DISCOIDEA* (Pers. in Ust. ann. bot. st. 7.) crustâ effusa rugoso-rimosâ inæquabili plus minus pulvrentâ albâ aut cinerascente, apotheciorum verrucis adpressis plus minus confertis plano-concavinsculis marginatis sorediferis concoloribus. — Ad truncos arborum vetustos. — Fl. fr. 5. p. 176.

V. amara Ach. *Verrucaria discoidea* Hoffm. en. lich. t. 7. f. 5. *Lichen fagineus* eug. bot. t. 1713. non L. — *Sapor* totius *Lichenis amarissimus*. Hanc cl. Meyer ut statum juniorēm *V. communis* et idecirco ut statum efflorescentem *Pertusariæ communis*. (v. v.)

5. *V. DEALBATA* (DC. fl. fr. 2. p. 325.) crustā crassā tartareā rimosā albā passim granuloso-papillatā, apotheciorum verrucis hemisphæricis supra depressisculis, nucleo lentiformi velamine tenui pulveraceo supra tecto. — Ad rupes Vogesorum, Fontishleaudi, Mimatis. — *V. corallina* Ach. *Transformatio Pertusariæ communis* ex cl. Meyer. (v. s.)
6. *V. LACTEA* (Pers. in Ust. ann. bot. st. 7.) crustā tenui tartareā determinata rimoso-areolatā lacteā aut cinerascente, apotheciorum verrucis hemisphæricis confertis marginatis supra mammilosis albissimis pulverulentis, demum dilatatis rotundato-diformibus subconfluentibus. — Ad rupes Pyrenæorum, Mimatis, Vogesorum. — Fl. fr. 2. p. 325. *Lichen lacteus* L. — Hanc cl. Meyer nebenst. 1. p. 204. habet ut crustam sterilem *Lecanora* tartareæ aut *Ureola-*riæ serposæ. (v. s.)
7. *V. ALBO FLAVESCENS* (DC. fl. fr. 2. p. 325.) crustā effusa tenui tartareā rimoso-areolatā inæquabili sordidè albo-glaucā aut glauco-virescente, apotheciorum verrucis convexis confertis marginatis supra mammilosis albis pulverulentis, demum post pulveris lapsu concavis flavo-carneis. — Ad saxa et arborum truncos in provinciis australibus. — *Lecanora parella* & *pallescens* Ach. *Lichen albo-flavescens* Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 5. f. 1. (v. s.)

XXXIII. CONIOCARPON DC. fl. fr. 2. p. 323. — *Spiloma* Ach. lich. univ. 23. t. 1. f. 2. — *Conioloma* Flörke.

Apothecia? e corpusculis in pulvinulos nudos planiusculos homogeneos subpulveraceos difformes coloratos aggregatis composita. — *Thal-*lus crustaceus tartareus plano-expansus adnatus uniformis.

1. *C. TRICOLOR* (Dub. mss.) crustā subtartareā rimosā pulverulentā albā, apotheciis subrotundis convexis aggregatis confluentibus rufis detritis ferrugineo-flavescentibus. — In axis Aginni (cl. Chab.). — *S. tricolor* Ach. *S. auratum* eng. bot. t. 2078. (v. s.)
2. *C. ELEGANS* (Dub. mss.) crustā membranacea lavigatā albā, apotheciis punctiformibus substellatis fusco-brunneis. — Ad corticem Pini Piceæ in Vogesis (cl. Moug. et Nesl.), propè Vire rarissima ex cl. Delise. — *Spiloma elegans* Ach. lich. t. 1. f. 1. m-a. — Sequentis status senescens ex cl. Schärer in litt. (v. s.)
3. *C. CINNABARINUM* (DC. fl. fr. 2. p. 323.) crustā subcartilagineā albicante, apotheciis confertis tumidis oblongo-diformibus scabridis fusco-nigricantibus subpruinosisque demum rufescensitatibus tandemque cinnabarinis. — In cortice arborum imprimis Carpini. — *Spiloma tumidulum* Ach. lich. 136. (v. v.)
4. *C. FERRUGINEUM* (Delise ined.) crustā subnullā, apotheciis sparsis vel confluentibus minutis irregulariter discoideis oblongo-diformibusque scabridis sorediformibus ferrugineis. — In cortice Ulmi propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)
5. *C. TUBERCULOSUM* (Dub. mss.) crustā pulverulentā albissimā verrucosā, apotheciis prominulis ovatis rotundis difformibusve tandem confluentibus scabridis atris. — Ad muros argillaceos Neustriæ (cl. Le Prév.). — *Spiloma tuberculosum* eng. bot. t. 2256. malè, Schær. exs. n. 5. (v. s.)
6. *C. NIGRUM* (DC. fl. fr. 2. p. 324.) crustā tenui submembranacea inæquabili subpulverulentā albida, apotheciis convexisculis ovatis rotundis difformibusve scabridis atris. — Ad corticem arborum. — *Spiloma melaleucum* Ach. Trachylia melaleuca Fries. — Variat crustā lineolis nigris decussatā vel limitata plus minusve pulverulentā. (v. v.)
7. *C. RETICULATUM* (Dub. mss.) crustā tartareā amylacea pulverulentā friabili

subconfigna albâ, apotheciis subrotundis convexis aggregatis demum reticulato-confluentibus atris. — In saxis et muris calcariis propè Aginnum (cl. Chaubart), Rothomagum (cl. Le Prévost). — Spiloma reticulatum Chaub. in St. Am. ag. 470. (v. s.)

8. *C. OLIVACEUM* (DC. fl. fr. 2. p. 323.) crustâ albida, apotheciis rotundatis convexiusculis demum confluentibus pulverulentis luteis demum fusco-olivaceis. — In cortice vetustâ Salicum. (v. s.)

9. *C? SPÆRALE* (Dub. mss.) parasiticum, crustâ nullâ, apotheciis minntis subglobosis scabris atris opacis. — Ad crustam et podetia Isidii corallini in Vogesis (cl. Le Prév.), propè Mimatem (cl. Prost), Vire (cl. Delise). — Spiloma sphærale Ach. syn. 2. — Species valde paradoxa. Ad Fungos amandat cl. Fries et ut typum generis Sclerococci habet. (v. s.)

10? *C? XANTHOSTIGMA* (Dub. mss.) apotheciis (in crustâ cinereo-nigricante peregrinâ?) planiusculis punctiformibus pulveraceis flavo-virescentibus. — Ad corticem in truncis vetustis Alneis et Salicinis. — Spiloma xanthostigma Ach. — Species valde paradoxa. Granula dispersa crustæ Lecanoræ vitellinæ ex Fries sched. crit. n. 160. (v. s.)

11? *C? LEUCOSTIGMA* (Dub. mss.) apotheciis (in crustâ fusco-nigricante peregrinâ?) sparsis minutis demum concaviusculis marginatis sorediformibus albis. — In cortice antiquâ Quercum propè Vire (cl. Delise). — Spiloma leucostigma Ach. — Species valde paradoxa ; probabiliter initium ejusdam Lichenis. (v. s.)

XXXIV. LEPRA Hall. helv. DC. fl. fr. 2. p. 322. — *Lepraria* Ach. lich. 132. t. 14. f. 12. 13. syn. 329.

Apothecia nulla aut ignota. Crusta irregularis expansa adnata pulvulenata aut subfilamentosa. — Genus vix hujus familiæ et ex elementis heterogeneis (*Lichenum* crustâ sterili , *Fungorum* , *Algarum* primâ evolutione?) probabiliter conflatum.

1. *L. CHLORINA* (DC. syn. gall. 68.) crustâ crassâ pulvinatâ viridi-flavâ e pulvere in globulos villosiusculos conglomeratos compositâ. — In rupibus umbrosis montium. — *Pulveraria chlorina* Ach. meth. t. 1. f. 1. eng. bot. t. 2038. *Sporotrichum pulveraria* Linck. (v. s.)

2. *L. FLAVA* (Ach. lich. 663.) crustâ effusa æquabili tenui subrimosa flavissimâ e granulis subglobosis nudiusculis compositâ. — In corticibus, parietibus. — Fl. fr. 5. p. 175. *Lichen flavus* eng. bot. t. 1350. Fl. dan. t. 899. f. 2. *Parmelia citrina* & *flava* Ach. meth. lich. 180. *Patellaria candelaris* Fl. fr. 2. p. 359. pro parte. (v. v.)

3. *L. CINEREO-SULPHUREA* (Ach. lich. 664.) crustâ tenuissimâ arachnoideo-membranacea albida granulis minutissimis confertis viridi-flavescentibus demum cinereis adspersâ. — Ad corticem arborum propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

4. *L. ISIDIIFORMIS* (Delise ined.) crustâ tenui inæquabili albescente granulis elevatis subpodetiiformibus carneo-fulvis obtectâ. — Ad corticem arborum propè Vire (cl. Delise). (v. s. D.)

5. *L. LEIPHÆMA* (Ach. lich. p. 664.) crustâ tenuissimâ submembranacea lactea extremo ambitu pannosa granulis pulverulentis pallidis adspersa. — Ad trunhos. — Fl. fr. 5. p. 173. Ach. meth. lich. 4. t. 1. f. 2. Crusta sterilis Lecanoræ hæmatomiae ex Fries sched. crit. n. 200. (v. s.)

6. *L. SULPHUREA* (Ehr. crypt. dec. 21. n. 208.) crustâ æquabili glauco-viridi demum virescenti-pallidâ e granulis minutissimis nudiusculis compositâ. — In cortice arborum propè Beauvais ex cl. Graves. — Ach. syn. 330. Forma Lecanoræ lutescentis ex Spreng.

7. *L. BOTRYOMYS* (DC. fl. fr. 2. p. 322.) crustâ tenui effusa pulverulentâ saturate viridi e granulis subconcrenatis compositâ. — Ad corticem arborum

vetustam. — Ach. syn. 331. *Byssus botryoides* L. *Falmella botryoides* Ag. syst. alg. 14. (v. v.)

8. *L. RUBENS* (Ach. meth. 6. syn. 331.) crustâ effusa rubrâ demum luteo-cinerascente e granulis flocculosis subconcreta compositâ. — Ad asseres semi-puridos et corticem arborum in Armoraciâ ex cl. Delise. — *L. odorata* Ach. prod. 12. Fl. fr. 2. p. 323. *Lichen rubens* Hoffm. lich. t. 1. f. 5.

9. *L. CÆSIA* (Ach. lich. 667.) crustâ tenui subpulverulentâ nigro-cæsio cinerascente. — Ad lapides arenarios propè Beauvais ex cl. Graves, Vire ex cl. Delise.

10. *L. ANTIQUITATIS* (Ach. meth. 7.) crustâ atrâ tenuissimâ latè effusa. — In rupibus. — Fl. fr. 2. p. 322. *Byssus antiquitatis* L. *Lichen antiquitatis* Hoffm. en. lich. t. 3. f. 5. (v. v.)

Ordo CXX. HYPOXYLA DC. fl. fr. 2. p. 280. excl. plur.
gen. *Ad. Brongn. in dict. class. 8. p. 478.* — *Xylomici Willd.*
— *Pyrenomyctetes Fries.*

Crusta aut frons nulla. Receptacula solitaria aggregata connatave aut *stromate* (basi communi) juncta, varia, compacta, coriacea aut lignosa contextu celluloso denso formata, primò clausa dein apice poro pertusa vel rimoso-rumpentia, nucleo distincto molliori subdeliquescente. Sporulæ variæ muco involutæ vel receptæ *thecis* (*ascis*) id est regulariter et seriatim dispositæ in utriculis membranaceis elongatis subcylindraceis clavatisve basi fixis erectiusculis paraphysibus immixtis, demum subdiffuentes. — Vegetabilia rariùs terrestria aut entomogena plerumque in plantis mortuis aut vivis nascentia, plerumque nigra, rariùs rubella lutescentia etc.

Trib. I. *SPHÆRIACEÆ* Fries syst. myc. 2. p. 318. *Ad.*
Brongn. cl. champ. p. 94.

Receptaculum clausum ostiolo aut rimâ longitudinali dehiscens thecis diffluentibus farctum.

I. *SPHÆRIA* Haller. hist. III. p. 120. Tode meck. 2. p. 7. DC. fl. fr. 2. p. 282. Fries syst. myc. 2. p. 319. — *Hypoxylon* et *Variolaria* Bull. — *Sphæria* et *Depazea* *Ad. Brongn.* — *Xylaria*, *Stromatosphæria*, *Cucurbitaria*, *Cryptosphæria*, et *Sphæria Greville*.

Receptacula (sphærulæ) ossea rotundata solitaria aut basi communi (*stromate*) carnosâ aut coriacea juncta, singula apice ostiolo perforata; thecae elongatae cum substantia gelatinosâ post exitum effusa exeuntia.

Sect. 1. *EUSPHÆRIA*. — *Sphæria* *Ad. Brongn. class. nat. des champ. 94.*

Receptacula orificio circulari dehiscens.

A. Compositæ Fries syst. 2. p. 320.

I. PERIPHERICÆ Fries syst. l. c.

Receptacula subdivergentia in ambitu stromatis collocata, ostiolo æquali, collo destituta. — Libere evolutæ superficiales.

1. CLAVÆFORMES (Nees syst. p. 289.). *Stroma erectum caulescens simplex vel ramosum immarginatum stipite sterili suffultum; receptacula peripherica demum prominentia.*

* *Velum nullum; receptacula pallida in strato proprio a stipite discreto et clavam obducente collocata. — Species carnosæ, contextu fibroso.*

1. S. ENTOMORHIZA (Dick. cr. 1. t. 3. f. 3.) carnosa, capitulo subgloboso fusco granulato, stipite tenui subcompresso longissimo. — Ad larvas insectorum emortuas in Vogesis ex cl. Maugeot. — Pers. syn. 4. — Stipes simplex vel duplex biuncialis et ultrà.

2. S. MILITARIS (Ehr. beyt. 6. p. 4.) carnosa aurantiaca, capitulo clavato tuberculoso, stipite dilutioni æquali. — In sylvis, ad terram inter muscos cortices etc. — Fl. fr. 2. p. 282. Sow. fung. t. 60. Pers. obs. 2. t. 2. f. 3. Clavaria militaris L. Cl. granulosa Bull. champ. t. 496. f. 1. — Vaill. bot. t. 7. f. 4. Capitulum passim in plures clavulas dividitur.

3. S. CAPITATA (Pers. syn. 3.) carnosa sæpè cespitosa, capitulo ovato-globoso badio aut nigrescente, stipite flavo crasso æquali glabro demum nigrescente. — Ad Scleroderma cervinum in sylvis abiegnis Vogesorum (cl. Moug. et Nestl.), circè Ermenonville ex cl. Graves. — Pers. myc. eur. 1. t. 10. f. 1-4. Moug. et Nestl. vog. 8. n. 763. S. agariciformis Bolt. f. 130. Sow. t. 354. — Stipes 1-4 unc. longus 2-4 lin. crassus.

4. S. OPHIOGLOSSOIDES (Ehr. exs. 160.) carnosa, capitulo clavato rufo-nigrescente, stipite olivaceo-nigrescente radicato intùs flavo. — Ad terram in ericetis et pinetis. — S. radicosa fl. fr. 2. p. 283. Moug. et Nestl. vog. n. 565. Clavaria radicosa Bull. champ. t. 440. f. 2. Cl. ophioglossoides Schmied. ic. t. 5. f. inf.

** *Velum pruinosum fugax; stroma cum stipite confluens et contignum apice sterili plerumque terminatum; receptacula atra in ipso stromate collocata. — Species carnoso-suberosæ vel suberosæ.*

5. S. GUEPINII (Moug. in litt.) carnoso-suberosa ramosa glabra, clavulis oblongo-ovatis turgidis difformibus rufescens apice sterili obtuso ostiolis prominulis acutis nigris undique exasperatis, stipite longissimo glabro. — In hortis propè Augers (cl. Guépin ex cl. Maugeot). — Stipes simplex ramosusve in terrâ immersus.

6. S. DIGITATA (Ehr. beit. 6. p. 7.) carnoso-suberosa cespitosa è rufescenti-atra glabra intùs alba, clavulis teretibus apicibus sterilibus acutis, junioribus velo innato albido subpulverulento mox fusco obductis, stipitibus basi connatis. — Ad asseres et ligna semiputrida interdùm terrâ tecta. — Fl. fr. 2. p. 284. Pers. obs. 2. t. 1. f. 1-6. Clavaria digitata Linn. Bull. champ. t. 220. Cl. hypoxylon Schäff. t. 265.

7. S. POLYMORPHA (Pers. syn. 7. obs. 2. t. 2. f. 2.) carnoso-suberosa gregaria glabra turgida difformis ex albido nigra intùs alba, clavulâ undique receptaculis cincta. — Ad trabes, ligna, truncos etc., vere et autumno. — Fl. fr. 2. p. 283. Xylaria polymorpha Grev. crypt. fl. t. 237. — Weig. obs. p. 49. t. 3. f. 6. — Mich. gen. t. 54. f. 4. Junior albida velo innato vix pulverulenta. Forma quam maximè varia, nunc obovata nunc cylindrica vel spathulata, etiam apice sterili terminata; sporidia ovato-globosa.

8. S. HYPOXYLON (Ehr. exs. n. 150.) suberosa simplex ramosaque gregaria compressa junior albo-pulverulenta sterilis demum nigra receptaculis scabra apice sterili, stipite recto villoso tomento nigro dein fusco tandemque secedente. — Ad trabes et truncos vetustos, junior autumno, adulta vere. —

Sow. t. 55. *S. cornuta* Hoffm. cr. t. 3. f. 1. Fl. fr. 2. p. 283. *Clavaria Hypoxylon* Linn. suec. Bull. champ. t. 180. — Bocc. mus. t. 116. Mich. gen. t. 55. f. 1.

β. cupressiformis (Pers.) minor simplex, clavulā discretā cylindricā conico-acuminatā. — Mich. gen. t. 55. f. 2. Pers. obs. t. t. 1. f. 1. *S. cupressiformis* Woodw. Desmaz. cat. p. 30.

γ. pedata (Fries) glabra nigra, clavulā subdiscretā pedato-incisa.

9. *S. CARPOPHILA* (Pers. obs. myc. 2. t. 1. f. 3.) suberosa solitaria gracilis simplex, clavulā subulatā albido-pulverulentā demum nudā tuberculosa nigricante, stipite longissimo flexuoso subviloso radiciforme. — Ad pericarpia Fagi in locis humidis decidua et foliis obiecta in sylvā Compiegne ex cl. Graves. — Stipes sèpè 2-4-pollicaria. Præcedenti nimis affinis ex cl. Fries.

10. *S. FILIFORMIS* (Fries in vet. acad. handl. 1816. p. 133.) suberosa gregaria filiformis simplex ramosaque glabra junior pallens demum nigra striata ad basin rarissimè pilosa absque stipite discreto, apice sterili roseo subpruinoso, receptaculis ovatis valde prominulis. — Ad caules herbarum majorum in Jurasso, in petiolis et foliis deciduis. Èst. aut. — Rhizomorpha simplissima Pers. myc. — 1-2 unc. longa, $\frac{1}{2}$ -1 lin. lata.

2. **CUPULÆFORMES** (Poronia Willd. Fries.). *Stroma marginatum cupulæforme apertum stipitatum; receptacula ovata in disco tantum cupulæ collocata peripherica, ostiolis prominulis.*

11. *S. PUNCTATA* (Sow. fung. t. 54.) carnoso-coriacea gregaria intus alba extus fuligineo-nigricans turbinata, disco truncato albo orbiculari nigro-punctata, receptaculis ovatis sparsis primò immersis demum prominulis, stipite brevi. — In fimo equino et asinino. — Fl. fr. 2. p. 288. *S. Poronia* Pers. *S. truncata* Bolt. t. 127. f. 2. *Peziza punctata* Linn. Bull. champ. t. 252. — $\frac{1}{2}$ -1 unc. alta.

3. **PULVINATÆ** (Fries syst. 2. p. 330.). *Stroma sessile convexum subhemisphæricum immarginatum, receptaculis periphericis.*

* *Velum pulverulentum subinnatum fragax; receptacula atra; thecae linear-clavatae, sporidiis septatis pulveris instar atri erumpentibus.*

12. *S. CONCENTRICA* (Bolt. t. 180.) globoso-difformis magna junior rubiginosa pruinosa lœvis, demum rugosa inæqualis fusco-nigricans, intus stratis concentricis zonata, receptaculis oblongis immersis. — Ad truncos variarum arborum. — Fl. fr. 2. p. 284. Fries syst. 2. p. 331. *S. fraxinea* Sow. t. 160. *Lycopteron atrum* Schæff. t. 329. — Humida gelatinosa, secca atro-pulvacea. Variat magnitudine nucis ad pomi.

β. pedicellata (Pers.) obovata basi angustata substipitata. — Pers. syn. t. 1. f. 3. 4. Nees. syst. f. 308.

13. *S. FRAGIFORMIS* (Pers. syn. 9. t. 1. f. 1-2.) globosa gregaria carnosa junior sordide lutescens pruinosa lœvis, demum miniato-rubiginosa tandem ferrugineo-nigrescens, intus atro-nitens, receptaculis ovatis confertis, ostiolis plus minusve prominulis. — Ad corticem Fagi, Juglandis, Esculpi, etc. — Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 20. Moug. et Nestl. vog. n. 273. Grev. crypt. fl. t. 136. *S. bicolor* DC. fl. fr. 2. p. 286. *Hypoxylon coccineum* Bull. champ. t. 495. f. 2. — Hall. helv. t. 47. f. 10. — Magnitudo Pisi vel Nucis Avellanae. — *S. lateritia* DC. fl. fr. 5. p. 137 est ex cl. Fries hujus forma juvenilis.

14. *S. FUSCA* (Pers. ann. bot. 2. t. 2. f. 3.) orbicularis convexa pulvinata sèpè confluens fusca intus concolor, receptaculis minutis globosis atris subimmersis, ostiolis umbilicatis. — Ad cortices. — Fl. fr. 2. p. 287. Nees syst. f. 310. Moug. et Nestl. exs. n. 178. *S. glomerulata* et *S. Coryli* Fl. fr. 2. p. 287. *Hypoxylon glomerulatum* Bull. champ. t. 468. f. 3. *S. tuberculosa* Bolt. t. 123. f. 1. Sow. t. 374. f. 8. — Dill. musc. t. 18. f. 7. — 2-3-lineas lata.

15. *S. ARGILLACEA* (Fries obs. 1. p. 171. t. 2. f. 5. non Pers.) subglobosa argillacea subpulveracea fuscescens intus fuscescenti-nigra, receptaculis globosis

680. ACOTYL. &c CELLULARES. SPHERIA.

prominulis papillatis. — Ad cortices duriores circa Parisios ex Cheval. — Chev. hist. hypox. ic.

16. *S. CONVERENS* (Pers. syn. 11.) gregaria confluens convexo-plana primo lavis sordide fuscescens dein nigrescens, intus nigra, receptaculis demum prominulis papillatis. — Ad corticem Fagi aliarumque arborum. — Fl. fr. 2. p. 286. Nees syst. f. 310.

17. *S. GRANULATA* (Sow. fung. t. 355.) magna disformis primò rugosa fusco-rubiginosa dein nuda nigra, intus cinereo-nigra, receptaculis subglobosis denum prominentibus papillatis. — Ad trancos et cortices copiose. — Fl. fr. 2. p. 286. *S. rubiformis* Pers. ann. bot. 2. t. 2. f. 1. *S. peltata* Fl. fr. 2. p. 287. *S. argillacea* Pers. ic. pict. t. 3. f. 1-3. Fl. fr. 5. p. 117 non Fries. *S. multiformis* Fries obs. 1. t. 1. f. 2. 3. *Hypoxylon granulosum* Bull. champ. t. 487. f. 2. Ex aetate et loco, colore formâ et superficie admodum varians.

** *Velum nullum; receptacula membranacea; thecae sporidiis simplicibus pallidis referentes.*

18. *S. RUFÀ* (Pers. obs. 1. p. 20.) carnosa irregularis convexa lavis demum inaequabilis et rugosa rufa intus albida, ostiolis prominulis. — Ad trancos Pinorum propè Beauvais ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 2. p. 335 ex quo sequenti nimis affinis.

19. *S. GELATINOSA* (Tod. meckl. 2. p. 48. f. 123 et 124.) carnosa gregaria convexa æqualis mollis pallide lutea viridis vel umbrina intus albida, receptaculis prominentibus obscurioribus. — Ad ligna molliora putrescentia arborum propè Parisios ex Cheval. Sept.-dec. — Fries syst. myc. 2. p. 336. *S. pallida* Pers. — 1-3-lin. lata.

4. **CONNATÆ** (Fries in Kunze et Schm. myc. heft. 2. p. 33.).
Stroma latè effusum indeterminatum immarginatum planum e receptaculis connascentibus ortum; receptacula collo destituta.

* *Receptacula membranacea emergentia; sporidia simplicia.*

20. *S. CITRINA* (Pers. syn. 18.) carnosa effusa planiuscula lavis citrina, receptaculis globosis subimmersis, ostiolis minutis convexis prominulis fuscescentibus. — Ad terram, trancos et Fungos vetustos exsiccatos. — Fries syst. 2. p. 337. Grev. crypt. fl. t. 215. — Nunc 4-5 uno longa, nunc brevis interrupta. Gelatina alba globuli instar erumpens, mox in farinam fatiscens.

21. *S. ROSEA* (Pers. syn. 18.) effusa tenuis rosea, margine byssino albicante, receptaculis prominulis obscurioribus. — Ad terram et radices arborum propè Parisios ex cl. Cheval., raro. — Fries syst. myc. 2. p. 338.

22. *S. AGARICICOLA* (Chaill. in Fries syst. myc. 2. p. 339.) effusa carnosa glabra spadicea intus sordide intescens, receptaculis ovato-globosis confertis molibus fuscescentibus aliis emergentibus aliis immersis, ostiolis obtusis. — In Agarico fusipede propè Beauvais ex cl. Graves, in Vogesis ex cl. Mougeot. — Superiorem Fungi partem præcipue incrustat.

23. *S. TYPHINA* (Pers. syn. 29. ic. pict. t. 7. f. 1.) culmos ambiens elongata cylindrica carnosa albida mox saturate lutea ostiolis prominulis obscurioribus demum granulosa, receptaculis ovatis. — Ad graminum culmos vivos, aest. — DC. fl. fr. 2. p. 292. Nees syst. f. 314. Mong. et Nestl. exs. n. 79. Polystigma typhina DC. mem. mns. 3. p. 338. Dothidea typhina Fries syst. myc. 2. p. 553. Stromatosphæria typhina Grev. er. fl. t. 204. — Unc. 1-2 longa primò lavis, receptacula horizontalia contigua apice rotunda; thecae utrinque attenuatae acutæ.

** *Receptacula subcornuta atra primò velo subinnato fugaci tecta; sporidia septata.*

24. *S. RUBIGINOSA* (Pers. syn. 11.) latè effusa subcrassa pulvere primò lutescente dein rubiginoso dense obtecta demum nuda nigrescens, intus nigra, receptaculis latentibus rariis prominulis. — In locis umbrosis ad ramos dejectos et obtectos. — Stromatosphæria rubiginosa Grev. er. fl. t. 110. —

Maculae 2-4-unciales; receptacula in stromate duplici aut triplici serie disposita astoma; sporulae subfuscæ.

25. *S. RUBRICOSA* (Fries ined. ex cl. Guép. in litt.) latè effusa crassa indeterminata inæquabilis tenuissimè rimosa rubro-fusca demùm nigra intùs grisea, junior pulvere rubiginoso-rubro densè obtecta, receptaculis globosis minutis immersis atris astomis. — Ad cortices Castaneæ circà Angers (cl. Guépin). — Receptacula in stromate simplici aut rariis duplici serie disposita.
26. *S. ATROPURPUREA* (Tode meck. 2. f. 105.) latè effusa tenuis indeterminata applanata purpurascens-nigra intùs atra, junior velo fugaci fuscenscente tecta, demùm nuda subnitida, receptaculis connatis prominulis, apice plano. — Ad corticem Alni circà Vire (cl. Lenormand), ligna putrescentia Faginea in Vogesis (cl. Mongeot), agro Lezurense (cl. Prost). — Fries syst. myc. 2. p. 340? *S. vogesiaca* Pers. in Mong. et Nestl. p. 765. ex cl. Fries. — Papillam in specie Friesianâ descriptam non vidi, idcirco de ejus synonymia dubius hæreo.
27. *S. SERPENS* (Pers. syn. 20.) effusa tenuis applanata junior villo cinereo pruinosa mox nuda rugosa atra, receptaculis subglobosis prominulis papillatis. — Ad ligna emortua molliora. — Fl. fr. 2. p. 289. Nees syst. f. 317. 318. *S. scoria* DC. fl. fr. 2. p. 286. *S. mammiformis* Hoffm. veg. cr. 1. t. 3. f. 1. — Mich. gen. t. 55. f. 1. Forma et magnitudine maximè varia, 3-4 unc. longa et ultra, sæpè in series elongatas serpens.
28. *S. COLICULOSA* (Schwein. syn. fung. carol. n. 82.) effusa tenuis coliculosa rugosa nigra, receptaculis maximis irregularibus subdistantibus crusta tectis, ostiolis minutis papillatis. — In truncis cariosis Quercus? in Vogesis ex cel. Mongeot. — Fries syst. myc. 2. p. 341.
29. *S. CONFLUENS* (Tod. meck. 2. t. 10. f. 87.) brevis rigida junior tomento mucido albo obducta, dein nuda nitida, receptaculis subglobosis rugulosis linearum dispositis et in cespitulum confluentibus circà ostiola subdepressis. — In ligno carioso Salicino. — Fries syst. 2. p. 342. *S. uva* var. *salicaria* Pers. syn. *S. albicans* Pers. syn. 70. Fl. fr. 2. p. 296. — 3 circiter lineas longa, linearum lata.
30. *S. BOTRYOSA* (Fries scl. suec. exs. p. 112; syst. myc. 2. p. 342.) receptaculis 5-10 globosis in tuberculum valde prominens corrugatum densissimè conglobatis connatisque opacis atris primo velatis demùm rimosis irregularibus indistinctis apice depressis. — Suprà ligna Quercina durissima exsiccata in Vogesis ex cl. Mongeot, agro Lezurense (cl. Prost). — Ex cortice receptaculorum exteriori formatur stroma commune tenui aternum.
31. *S. INCrustans* (Pers. obs. 1. p. 70.) latè effusa indeterminata glabra tenuis aterima, receptaculis subrotundis amplis sparsis subconfluentibusve atris, ostiolis perforatis crassiusculis conicis obtusis. — Ad truncos Populi, Aceris, Roboris, etc. — Fl. fr. 5. p. 137. Crusta 3-4 unc. lata.

II. HYPOPHERICÆ Fries syst. myc. 2. p. 320.

Receptacula verticalia immersa stromate tecta, in collum attenuata. — Errantes liberatæ.

5. *GLOBOSÆ* (Schmidt myc. heft. 2. p. 25.). *Stroma subeffusum determinatum globosum demùm rigidum fragile; receptacula ovata ampla, ostiolis æqualibus.* — *Emergenti-superficiales nigricantes.*
32. *S. CRUSTA* (Hoffm. cr. 1. t. 1. f. 2.) effusa crassa undulato-rugosa, junior carnosa cinereo-albida pulverulenta, dein nuda rigida fuscenscente-nigra demùm atra fragillima, receptaculis magnis ovatis sparsis emergentibus. — Ad truncos vetustos, in sylvis frequens. — Fl. fr. 2. p. 283. Mong. et Nestl. exs. n. 276. *S. maxima* Bolt. t. 181. Sow. t. 338. *Hypoxylon ustulatum* Bull. champ. t. 487. f. 1. — Mich. gen. t. 54. f. 1. Crusta 1-3 unc. lata.
33. *S. TURULINA* (Alb. et Schw. 6. t. 4. f. 4.) effusa oblonga crassa undulato-rugosa sublaevosella ferruginea demùm nigra fragillima subpulverulenta, receptaculis maximis aretè aggregatis demersis, ostiolis hemisphaericis demùm pro-

682 ACOTYL. SEU CELLULARES. ARALIA.

minulis. — Ad truncos emortuos Aceris Pseudoplatani in Vogesis (cl. Mougeot). — Unc. 2-4 longa, 1-2 unc. lata et ultra, lignis cariosis ad dimidium ferè immersa, ex ostiolis porosa; recept. 3-5 lin. longa, 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata.

34. *S. SONDYLINA* (Fries syst. myc. 2. p. 347.) erumpens difformis convexa bullata subrugosa, extus intusque atra, receptaculis ovatis demersis, ostiolis latentibus. — Ad corticem Fraxini? in Vogesis ex cl. Mougeot, vere. — Demum omnino libera evadit 1-2 lin. lata et crassa.

35. *S. NUMMULARIA* (DC. fl. fr. 2. p. 290.) determinata orbicularis vel longitudinaliter effusa planissima contigua extus intusque atra humida e gelatinâ in pulverem atrum fatiscente pruinosa sicca nuda subnitens, receptaculis confertis magnis immersis ovatis, ostiolis globosis prominulis. — Ad truncos et ramulos mortuos. — Mong. et Nestl. vog. n. 374. *S. anthracina* Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 16. *S. diffusa* Sow. t. 373. *Hypoxylon nummularium* Bull. champ. t. 468. f. 4. — 2-2 unc. lata et ultra, 1 lin. crassa.

6. **LIGNOSÆ** (Schmidt l. c. p. 23.). *Stroma effusum tenue planum subdeterminatum lignosum rigidum semper basi lined nigrd circumscriptum; receptacula atra ad basin demersa nec emergentia stromate plane obiecta, ostiolis prominulis.* — Erumpentes juveniles pallidæ mox nigrae.

36. *S. BULLATA* (Ehr. exs. n. 199.) gregaria determinata orbicularis ovatave convexo-plana læviuscula atra intus candida, receptaculis globosis, ostiolis papillosis. — Ad ramos exsiccatos Salicis albæ, Coryli, etc. — Fl. fr. 5. p. 121. Hoffm. cr. 1. t. 2. f. 3. Pers ic. pict. t. 3. f. 6, 7. Mong. et Nestl. vog. n. 866. *S. depressa* Bolt. t. 122, f. 1. Sow. t. 216. — 2-4 lin. lata.

37. *S. UNDULATA* (Pers. syn. 21.) effusa nuda crassiuscula interrupta undulaterrugosa atra intus alba, ostiolis subrotundis prominulis. — Ad ramos mortuos Coryli in Vogesis (cl. Mong. et Nestl.). — Mong. et Nestl. n. 371. DC. fl. fr. 5. p. 120. *Stromatosphæria undulata* Grev. crypt. fl. t. 223. f. 1. — Duas uncias lata, 1-2 lin. crassa.

38. *S. STIGMA* (Hoffm. cr. 1. t. 2. f. 1.) latè effusa tenuis applanata lævis junior pallida vel incarnata demum fuscescens tandemque nuda rimosa atra, ostiolis immersis planiusculis. — Ad cortices varios frequens, copiosissimè in Cratægo Oxyacanthæ? — Fl. fr. 2. p. 289. Nees. syst. t. 319. Mong. et Nestl. vog. n. 372. *Stromatosphæria stigma* Grev. cr. fl. t. 223. f. 2. *Hypoxylon operculatum* Bull. champ. t. 478. f. 2. — Mich. gen. t. 55. f. 2. — Longissimè latisimèque effusa.

β. decorticata (Pers.) crassiuscula, ostiolis convexis prominulis. — Ad corticem Fagi, Quercus, Coryli quorum epidermidem destruit. — *S. decorticata* Fl. fr. 2. p. 289. Mong. et Nestl. vog. n. 373. *S. decorticans* Sow. t. 137.

39. *S. DISCIFORMIS* (Hoffm. cr. 1. t. 4. f. 1.) orbicularis effusa plana lævis junior incarnata mox fusca nigraque intus alba, receptaculis ovatis minoribus in collum tenuem attenuatis, ostiolis punctiformibus distantibus. — Ad corticem ramorum exsiccatorum Fagi. — Fl. fr. 2. p. 290. Mong. et Nestl. vog. n. 80. *Stromatosphæria disciformis* Grev. cr. fl. t. 314. — Hall. helv. t. 47. f. 9. — 1-2 lin. lata.

γ. grisea (Fries) disco depresso griseo molliusculo. — *S. grisea* DC. fl. fr. 5. p. 122.

40. *S. FAVACEA* (Fries obs. myc. 2. t. 8. f. 5.) difformis nunc orbicularis nunc confluens junior ligneo-pallens demum nigra, receptaculis oblongo-ovatis amplis basi subconnatis collo brevi, stromate tenui albido tectis, ostiolis prominulis convexo-subrotundis. — Ad ligna dejecta Betuligna cortice adhuc tecta prope Parisios ex cl. Cheval., in Vogesis (cl. Mougeot). — *S. betuligna* Cheval. — 2-4 lin. et ultra lata, 1-2 lin. crassa.

41. *S. VERRUCIFORMIS* (Ehr. exs. n. 280.) angulata convexa rugosa nigra intus subconcolor basi circumscripta, receptaculis ovatis collo brevi, ostiolis sublatentibus. — Ad ramos exsiccatos Coryli, Carpinii, Fagi, etc. — Pers. syn.

- t. 1. f. 5, 6 et 7. a. Fl. fr. 5. p. 120. Mong. et Nestl. vog. n. 869. — Tres circiter lineas magna, lacinii epidermidis stellatim fissis cincta.
42. *S. FLAVOVIRENS* (Hoffm. cr. 1. t. 2. f. 4.) orbicularis aut latissime confusa inaequalis rugosa primò flava mox flavo-virescens demum olivaceo-nigra, intus pulverulenta flavo-virens, receptaculis globosis collo brevi, ostiolis prominulis punctiformibus. — Ad cortices et ligna arborum frondosarum. — Fl. fr. 5. p. 121. Mong. et Nestl. vog. p. 375. — 1-2 unc. effusa, $\frac{1}{2}$ -1 lineam lata.
43. *S. UDA* (Pers. syn. 33. t. 1. f. 11-13.) brevis difformis subelliptica determinata emarginata, receptaculis paucioribus subovatis, ostiolis obtusis inaequalibus. — Ad ligna arida Quercina Faginea etc., in locis uidis dejecta. — Fl. fr. 5. p. 119. Fries syst. myc. 2. p. 358. — 2-3 lin. plerumque longa.
- f. lineata*, in seriem elongatam conferta rufo-fusca, receptaculis hemisphaericis mollibus subconfluentibus, ostiolo conico brevi. — In Jura (cl. Chaillet). — *S. lineata* DC. fl. fr. 5. p. 135. non Alb. et Schw. *S. ordinata* Fries syst. 2. p. 454. Ex ipso delenda.
7. **VERSATILES** (Fries l. c. 359.). *Stroma immersum dein emer-gens determinatum lignoso-ceraceum demum friabile, nullā linea-nigrā basi circumscriptum; receptacula verticalia irregulariter ni-dulantia, collis distinctis rectis primò inclusis dein receptaculis emergentibus exsertis.*
44. *S. SCABROSA* (DC. fl. fr. 2. p. 288.) emergenti-superficialis rigida primò sub-contigua dein rimosa tuberculosa tuberculis subrotundis stipatis in crustam latam confluentibus, junior extus ferrugineo-nigricans intus albida dein extus intusque nigra ostiolis obtusis conicis undique prominulis scabra, receptaculis minutis collo brevi. — Ad ligna duriora præcipue Quercina. — *Hypoxylon scabrosum* Bull. champ. t. 468. f. 5.
45. *S. PODOIDES* (Pers. syn. 22.) liberato-erumpens prominens rigida verruciformis inaequalis nigra intus albida demum nigrescens, ostiolis brevibus spinulosis ad latera plerumque erumpentibus. — Ad trunco Quercinos. — *S. scabrosa* & *podoides* Fries. — Lineam lata et crassa.
46. *S. FRIABILIS* (Pers. syn. 24.) erumpens valde prominens subrotunda convexa aut disco depresso rugoso-plicata opaca intus albida friabilis, ostiolis latentibus. — Ad ramos Salicinos circa Parisios ex cl. Cheval. — Fries syst. myc. 2. p. 361. — 1-2 lin. lata.
47. *S. SORDIDA* (Pers. syn. 25.) erumpens subrotunda aut elliptica teres rugosa opaca sordide nigra intus molliuscula fuscescenti-cinerea, disco depresso, ostiolis latentibus. — Rarius ad ramos Fraxini, Alni, Quercus, etc. propè Parisios ex Cheval., Logdunum ex cl. Balbis. — Fries syst. myc. 2. p. 361. — Magnitudine varia a lin. 1 ad 2 lata.
48. *S. QUERCINA* (Pers. syn. t. 1. f. 7-8.) erumpens suborbicularis convexa subcarnosa junior fuligineo-pallescens demum nigrescens intus subconcolor, receptaculis confertis, ostiolis prominulis tetragonis. — Ad ramos Quercinos in Jura (cl. Chaillet), Vogesis (cl. Mong. et Nestl.). — Fl. fr. 5. p. 120. Mong. et Nestl. vog. n. 868. Nees syst. f. 321. — 1-2 lin. lata.
49. *S. CINCTA* (DC. fl. fr. 5. p. 119. non Fries.) transversim erumpens lanciformis convexa atra intus e cinereo-nigricans, receptaculis paucis tenuibus majusculis globosis, ostiolis latentibus demum prominulis. — Ad corticem Betulæ. — *S. lanciformis* Fries. *S. foraminosa* Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 774 ex cl. Mougeot in litt. — Lin. 2 circiter lata.
50. *S. FERRUGINEA* (Pers. obs. 1. t. 5. f. 1-2.) transversim erumpens subrotunda inaequalis nigra, stromate pulverulento ferrugineo, receptaculis ovatis aggre-gatis collis plus minus longis, ostiolis teretibus spinulosis. — Ad trunco emortuos Coryli, Populi, Sorbi, Betulæ. — Fl. fr. 5. p. 123. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 12. Mong. et Nestl. vog. n. 377. — 2-3 lin. longa.
51. *S. PETICINOSA* (Fries in litt. ad cl. Mong.) orbicularis difformis convexa nigra intus albo-fusca, receptaculis nigris amplis stipatis in collum tenue atte-

684 ACOTYL. SEU CELLULARES.

SPHÆRIA.

- nuatis, ostiolis globosis æqualibus. — Ad ramos Populi nigrae in Vogesis (cl. Moug.). — S. ferruginea & petiginosa Fries el. fung. 2. p. 73. ex cl. Moug. — Erumpens epidermide dilacerata cincta 1-2 lin. lata basi lineâ nigrâ circumscripta.
52. S. CERATOSPERMA (Tode meck. 2. t. 17. f. 131.) erumpens subrotunda convexa opaca sordidè nigra, intus albido-fuscescens, receptaculis globosis irregulariter immersis collis longis, ostiolis spinulosis confertis rectis scabris. — Ad ramos demortuos Rosæ et Quercus. — Mong. et Nestl. vog. n. 567. Fries syst. myc. 2. p. 364. — 2 lin. lata, cortice sæpè stellatim fiso erumpens.
53. S. HYSTRIX (Tode meck. 2. t. 16. f. 127.) transversim erumpens depresso-ovata planiuscula nigra intus fuscescens, receptaculis globosis subimmersis, ostiolis rostellatis longissimis distantibus lævibus rigidis obtusis superne subincrastatis divergentibus. — In ramis deciduis Aceris et Quercus, rariores. — Fl. fr. 5. p. 128. Fries syst. myc. 2. p. 364. — Lineam lata.
54. S. VERSATILIS (Fries syst. myc. 2. p. 364.) transversim erumpens prominens convessa oblonga inæquabilis nigra, stromate corticali, ostiolis conicis. — Ad ramos Coryli emortuos propè Parisios ex Cheval. — Ostiola rarissime elongantur et divergunt.
55. S. STRUMELLA (Fries in vet. acad. hand. 1817. p. 101.) transversim erumpens depresso-elliptica planiuscula nigra, receptaculis numerosis globosis confertis, stromate corticali, ostiolis obtusis nitidis cylindricis lævibus. — In ramis exsiccatis Ribis. — Fries syst. myc. 2. p. 365. Cheval. hist. hyp. icon. — Receptacula in cortice interiori nidulantia; ostiola erumpentia plerumque brevia in locis humidis vero longa rostellata subforta.
56. S. LEPROSA (Pers. ined. in Fries syst. myc. 2. p. 365.) immersa, receptaculis paucis globosis erectis irregulariter stipatis in cortice nidulantibus, collis rectis longiusculis stromate albo conjunctis, disco subelliptico minuto depresso erumpente, ostiolis minimis convexis. — In cortice Tiliæ emortuæ in Vogesis (cl. Mongeot), propè Parisios ex cl. Cheval. hist. hyp. ic. ex fl. par. 1. p. 491. — Discus semilineam latus.
57. S. INSITIVA (Tode 2. t. 13. f. 108.) longitudinaliter immersa elongata plana alba, stromate pallido demùm fuscescente, receptaculis numerosis globosis minimis nigricantibus collis brevibus, ostiolis prominulis subglobosis nigris. — In rimis sarmentorum Vitis, vere. — Fl. fr. 5. p. 118. Fries syst. myc. 2. p. 366. — Nunc brevis interrupta elliptica, nunc in series longas lineariacuminatas nascentes.
- 58? S. PURPURASCENS (DC. fl. fr. 5. p. 118.) orbicularis planiuscula carnosa purpurascens sæpè confluens intus albescens, receptaculis nigris ovoideis profunde immersis collo plus minus elongato, ostiolis punctiformibus nigris. — In plagiis transversalibus suprà ligna denudata Cerasi in Jurasso (cl. Chaillet). — 3-4 lin. lata.
8. CONCRESCENTES (Fries in Schmidt myc. heft. 2. p. 33.). *Stroma tenue effusum indeterminatum nunquam circumspectum innatum nec erumpens e matrice vel receptaculis connatis formatum; receptacula subglobosa verticalia irregulariter aggregata primò solitaria dein concrecentia emergentia atra, in collum breve rectum attenuata, ostiolis erumpentibus solitariis. — Innato-erumpentes.*
59. S. SPINOSA (Pers. syn. 34. t. 2. f. 9, 10, 11 et 12.) latissimè effusa emergens indeterminata aterrima junior immersa scabrosa villosa rugosa receptaculis subliberis crustâ tenui tectis, adulta submersa receptaculis connascentibus ovato-globosis, ostiolis spinosis crassis quadrigonis sulcatis. — Ad ligna putrescentia varia. — Fl. fr. 2. p. 598. Moug. et Nestl. vog. n. 376. — Lignum atro-inquinans.
60. S. SPICULOSA (Pers. syn. 33.) subeffusa immersa atra, receptaculis globosis, ostiolis erumpentibus longis teretibus tenuissimis inæqualibus. — Ad ramos et ligna Sambuci Salicis, etc., ad radices demortuas Hederae (cl. Gnépin).

raro, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 369. Ramulos colore nigro maculæformi inquinat.

61. S. LATÆ (Pers. syn. 29.) latè effusa emergens contigua inæquabilis opaca, receptaculis ovato-globosis confertis ligno immersis intùs albidis stromate tenui nigro tectis, ostiolis prominulis conicis. — Ad ligna cortice denudata. — Fl. fr. 5. p. 121. Mong. et Nestl. exs. 568. S. fuliginosa Sow. t. 373 f. 9. S. papillata Hoffm. veg. cr. 1. t. 4. f. 3. — 3-4 uncias longa, imò interdum pedalis.
62. S. LEIOPLACA (Fries syst. myc. 2. p. 370.) emergens elongata interrupta lævis nigra intùs concolor, receptaculis in stromate proprio stipatis globosis, ostiolis minimis demùm umbilicatis. — Ad ligna lævigata molliora in Vogesis ex cl. Mongeot. — Maculæ cum ligno nigrefactio parùm elevatæ. An à priori satis diversa?
63. S. MILLIARIA (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 82.) latè effusa emergeus ligno elevato immutato tecta undè cinerea, receptaculis globosis confertis intùs albidis, ostiolis subglobosis distinctis nigris sparsis demùm umbilicatis rugosis. — In ligno vetusto Pini, Fagi, etc., propè Parisios ex Cheval. — Fries syst. myc. 2. p. 371. Cheval. hist. hyp. ic. ex fl. par. 1. p. 489.
64. S. DECIPiens (DC. fl. fr. 2. p. 285.) latè effusa dura plana, receptaculis ovato-oblongis immersis intùs atris cortice cinereo-nigrescente tectis, ostiolis confertis hemisphæricis excavatis rugosis. — In cortice annosorum truncorum Carpini innata. — Fries syst. myc. 2. p. 371.
65. S. VITICOLA (Schwein. fung. car. n. 64.) tecta emersa in series parallelas crescentia fusco-nigra, stromate brunneo, receptaculis magnis paucis globosis, ostiolis latentibus. — In ramis emortuis Vitis in Vogesis (cl. Mongeot). — Fries syst. myc. 2. p. 374. — Series sparsæ cum epidermide assurgente prominentes non vero erumpentes, receptacula 1-3 in singulâ verrucâ.
66. S. FIMETI (Pers. syn. 64. ic. pict. t. 24. f. 7.) latè effusa crustacea immersa nigra, receptaculis confertis oblongis connascentibus, ostiolis elongatis conicis subobliquis emergentibus. — In fino vaccino et equino, aut. hyeme. — Fl. fr. 5. p. 134. Fries syst. myc. 2. p. 375. — Crusta nigra aut cæsiocinerea.
67. S. CRUSTATA (Fries syst. myc. 2. p. 376.) tecta effusa demùm atro-inquians, receptaculis immersis solitariis conglomeratisque, ostiolis valde prominentibus conico-cylindricis rugosis apice incrassatis truncatis. — Ad ramos emortuos Populi nigræ in Vogesis (cl. Mongeot). — Epidermidem non solvit sed cum cortice in crustam concrescit, undè stromate tecta videtur. Ostiola 1-2 lin. longa.
68. S. SALICELLA (Fries syst. myc. 2. p. 377.) tecta, receptaculis numerosissimis aggregatis distinctis exiguis epidermidis plaga expallentibus, ostiolis erumpentibus cylindricis supra corticem prominentibus. — In ramis Salicinis in Vogesis (cel. Mongeot), autumno. — Maculæ expallentes elongatæ irregulares parùm elevatæ, sub quâ nidulantur receptacula passim stromate pulverulento albicante corticali cincta.

III. AMPHIPHERICÆ Fries syst. myc. 2. p. 321.

Receptacula convergentia circinnantia, stromate spurio undique pustulato cincta, in collum attenuata. — Cortici immersæ.

69. CIRCUMSCRIPTÆ (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 87.). *Stroma a matrice formatum subrotundum conceptaculo proprio nigro ventricoso basi adnato apice integro coarctato inclusum, absque disco heterogeneo; receptacula irregulariter circinnantia aggregata atra, colis longiusculis convergentibus immedio conceptaculi erumpentibus confertis demùm umbilicatis. — Minores pustulæformes basi ligno adnatæ; ab corticis epidermide quam perforant ostiola discreta.*

69. S. PRUNASTRI (Pers. syn. 37.) transversum erumpens lentiformis, junior

686 ACOTYL. SEU CELLULARES. SPERMATI

cortice interiori obtecta et tunc stroma corticale et circumscriptum, adulta liberata, stromate cinereo-nigrescente, receptaculis numerosis aggregatis, ostiolis elongatis confertis 4-6-gonis sulcatis subdivergentibus. — Ad ramos, exsiccatos Pruni, Cerasi, etc. — Fl. fr. 5. p. 126. Moug. et Nestl. vog. n. 378.

70. *S. SORBI* (Schmidt myc. heft. 1. p. 59.) subrotunda pulvinata nigricans, receptaculis numerosis globosis stromate albido cinctis, ostiolis stipatis longis sulcato-angulatis in cylindrum crassum connatis apice umbilicatis. — In ramis exsiccatis Sorbi in Vogesis (cl. Maugeot et Nestl. exs. n. 869.). — Fries syst. myc. 2. p. 380. *S. coronata* Wahlemb. *S. pentagona* Fries in vet. act. holm. 1817. — Lin. 1-4 lata.
71. *S. STELLULATA* (Fries syst. myc. 2. n. 380.) subrotunda immersa, stromate albo circumscripto, receptaculis minutis globosis, ostiolis primò punctiformibus lèvibus demùm ovato-globosis brevibus radiato-stellatis. — Ad ramos sicclos Ulmi in Gallia boreali (cl. Moug. et Nestl.).
72. *S. ENTEROLEUCA* (Fries syst. myc. 2. p. 381.) orbicularis convexa libera, stromate albo, receptaculis minutis subglobosis numerosis, ostiolis confertis liberis globosis rostellatisque subrugosis. — In ramis exsiccatis. — *S. ceratosperma* DC. fl. fr. 2. p. 381. ex cl. syn. Pers. *Variolaria ceratosperma* Bull. champ. t. 432. f. 1. — Conceptaculum magnitudine Pis.
73. *S. ANOMIA* (Fries syst. myc. 2. p. 381.) convexo-difformis libera passim confluens rugosa nigra, stromate ligneo cinereo-nigricante, receptaculis paucioribus magnis ovatis confertis erectinsculis, ostiolis primò subnullis demùm exsertis distantibus magnis lèvibus. — In ramis exsiccatis Robiniae in Jurasso (cl. Chaillet), Vogesis (cl. Maugeot), Angers (cl. Guépin). — *S. irregularis* DC. fl. fr. 5. p. 116. non Sow. nec Fries. *S. torquata* Pers. — Subiculum latissimè effusum lignum intrans cui insident pustulæ.
74. *S. MONADELPHA* (Fries syst. myc. 2. p. 382.) lentiformis libera basi adnata, receptaculis 5-7 circà receptaculum centrale circinnantibus cum stromate cinereo-nigro arctè inclusis, ostiolis exsertis subglobosis stipatis in discum convexum connexis. — Ad ramos Ligustri circà Angers (cl. Guépin). — Suprà ligna denudata variat effusa ostiolis distinctis.
75. *S. SYNGENESIA* (Fries obs. 2. t. 7. f. 1.) conica libera basi adnata, stromate cinereo-nigricante, receptaculis subquinis globosis immersis, ostiolis exsertis in corpus corrugatum deciduum connatis. — Ad ramos Rhamni Frangulae in Vogesis (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 870.) — Fries syst. myc. 2. p. 382. — Conceptaculum concentricè striatum apice coarctatum ostiolisque deciduis albo-umbilicatum.
76. *S. CORNICULATA* (Ehr. exs. n. 300.) innata subrotunda, stromate albido conceptaculo nigro tecto, receptaculis decumbentibus, ostiolis erumpentibus confertis crassinsculis subcylindricis distinctis lèvibus obtusis apice umbilicatis. — In ramis tenuioribus exsiccatis Salicis, Quercùs, etc. — Fl. fr. 5. p. 124. Nees syst. f. 330. Fries syst. myc. 2. p. 384. — Semi-lineam circiter lata.
77. *S. FIBROSA* (Pers. syn. 40. t. 2. f. 3, 4.) innata conico-depressa, subiculo latè effuso nigro subcorticali, stromate fibroso circumscripto, ostiolis confertis subrotundis lèvibus nitidis demùm umbilicatis in discum atrum confluentibus. — In cortice fibrosa Prunorum. — Fl. fr. 5. p. 126. Fries syst. myc. 2. p. 384. — Ostiola corticis epidermidem perforant et in ambitu pallidam reddunt.
78. *S. BETULI* (Pers. syn. 39.) innata subrotunda, stromate corticali pallido lineâ circumscripto, receptaculis circinnantibus numerosis stipatis, ostiolis confertis globosis lèvibus subpapillatis demùm umbilicatis. — Ad ramos sicclos Carpini Betuli. — *S. Carpini* Fries syst. myc. 2. 384. non Hoffm. DC. — Ostiola epidermide stellatim fissâ erumpunt; in locis uidis elongantur et subrostellata evadunt.
79. *INCUSÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 385.). *Stroma a matrice formatum orbiculatum inferne in conceptaculo proprio dimidiato su-*

pernè cum epidermide tegente subconnato inclusum, tandem in discum subceraceum planiusculum erumpens; receptacula in centro subaggregata irregulariter circinnantia in ambitu et supernè stromate cincta, collis discum perforantibus. — Pustulæformes sub epidermide arborum nascentes.

79. *S. NIVEA* (Hoffm. cr. 1. t. 6. f. 3.) stromate conico albo demùm cinerascente in conceptaculo aretè incluso, disco demùm erumpente truncato farinaceo niveo sensim cinerascente, receptaculis immersis globosis, collis tenuissimis nigris, ostiolis exiguis subprominulis globosis lœvibus. — Ad corticem variarum arborum, præcipue Populi Tremulæ. — Fl. fr. 2. p. 291. Sow. t. 219. Mong. et Nestl. exs. n. 278. Lichen rosaceus Fl. dan. t. 825. f. 1.
80. *S. LEUCOSTOMA* (Pers. syn. 39.) pustulæformis subconica, stromate corticali aretè incluso, disco truncato albo, pôris nigrescentibus perforato-punctato. — Ad cortices exsiccatos Prunorum. — Fl. fr. 5. p. 123. Nees syst. f. 332. *S. pustulata* Mong. et Nestl. vog. n. 659. non Hoffm. DC. *S. marginata* Sow. t. 372. f. 7. — Ostiola pauca 1-2.
- β. polypora* (Fries) ostiolis pluribus minutis sparsis subexsertis. — *S. talus* var. *pileata* Tode meck. 24. f. 80.
81. *S. MICROSTOMA* (Pers. syn. 40.) orbicularis subimmersa, disco prominente planiusculo albescente ostiolis plurimis confertis minutissimis globosis obtecto. — Ad cortices præcipue Prunorum propè Parisios ex Chevall. — Nees syst. f. 331. Fries syst. myc. 2. p. 388. — Lin. 1-2 lata, 1 alta.
82. *S. KUNZEI* (Fries in Kunze myc. heft. 2. p. 45.) orbicularis conica, stromate luteo pallido aretè incluso, disco erumpente angustato truncato sordidè cinereo, primo poro pertuso dein ostiolis minimis atris umbilicatis, receptaculis minutis numerosis confertis. — In cortice Pini et Abietis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — Fries syst. myc. 2. p. 389. *S. oxytoma* Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 767. ex Fries syst. orb. 1. p. 363. — Conceptaculum vix 1. lin. latum scutelliforme nigrum cortici interiori adnatum.
83. *S. MELASPERMA* (Fries syst. myc. 2. p. 389.) elliptica aterrima, receptaculis paucis aggregatis erectiusculis ovatis siromate proprio palveraceo ex olivaceo-fuligineo-nigricante cinctis, disco erumpente minuto nigro rugoso, ostiolis sparsis obsolete prominulis. — Ad cortices vetustos Betulæ propè Beauvais ex cl. Graves. — In ætate juvenili pustulæ cortici omnino innatae, linea fusca circumscriptæ; in adultâ pustulæ ellipticæ 2 lin. longæ depresso cortici interiori innatae; conceptaculum subliberum tenue atrum epidermidì adnatum ut hâc sublatâ dimidiatum persistit scutellæforme.
84. *S. SCUTELLATA* (Pers. syn. 37.) orbicularis pulvinata erumpens atra, receptaculis vasculosis confertis conceptaculo scutellæformi impositis, ostiolis sparsis teretiusculis crassis acutis erumpentibus. — Ad ramos Acerinos, Alneos etc., aut. — Fl. fr. 5. p. 122. Nees syst. f. 333. Fries syst. 2. p. 390. — Junior Sphæriam simplicem repræsentat et ostiolum sæpè unicum crassum subrotundum protrudit, deinde totus cespitus conspicitur tumidus 2 lin. ferè latus i crassus, tandem partem superiorem cum sphærulis amittit.
85. *S. ANGULATA* (Fries sc'. suec. n. 72; syst. myc. 2. p. 390.) laxè circumscripta pustulata immersa passim confluens, stromate corticali, receptaculis paucis magnis ovatis albo-farctis in centro confertis, disco erumpente angustato subangulato piano nigro, ostiolis perexiguis primum punctiformibus dein cupulæformibus. — In ramis exsiccatis Fagi, Betulæ, in Vogesis ex cl. Mongeot, circâ Angers (cl. Guépin). — Postulæ 1-2 lin. latae, epidermide stellatim fissâ erumpentes; conceptaculum immersum cupulæforme, lineæ instar circularis nigrae ad lignum usque descendenter singulam postulam et sæpè etiam epidermidem supernè tegentem circumscribens.
86. *S. RADULA* (Pers. syn. 37.) laxè circumscripta pustulata subrotunda vel elliptica depressa, stromate corticali, receptaculis exiguis in centro confertis, disco albo, ostiolis paucis rostellatis subtéreribus inæqualibus sebris. — Ad

688 ACOTYL. SEU CELLULARES.

ramos Quercinos. — Fl. fr. 2. p. 291. — Pustulæ cortici interiori innatae, superne epidermide tectæ.

β taleola, ostiolis punctiformibus immersis lœvibus. — S. taleola Fries syst. myc. p. 391.

87. S. PROFUSA (Fries in vet. ac. handl. 1817. p. 86.) pustulis basi in subiculo latissimè effuso atro fibroso immersis, stromate albido corticali, receptaculis magnis globosis lineâ nigrâ variâ circumscriptis, ostiolis in disco minuto prominulis angulatis convexis vel subglobosis. — In cortice ramorum emortuorum Robiniae pseudacaciae. — Moug. et Nestl. vog. n. 871. S. circumscripta Schmidt et Kunze.

88. S. DISSEPTA (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 102.) laxè circumscripta, receptaculis sparsis excipuliformibus amplis in cortice interiori sparsis nidulantibus raro solitariis passim circinnantibus sæpius aggregatis, stromate corticali, ostiolis erumpentibus raro solitariis sæpius in discum inæquabilem homogeneum collectis. — In ramis exsiccatis præcipnè Ulmi, in Galliâ boreali ex cl. Desmazières rarissima. — Fries syst. myc. 2. p. 392. — Species admodum polymorpha; stroma quando receptacula valdè conferta nigrescens, quando epidermis facile secedit ab hâc coloratum testaceum.

89. S. TESSELLA (Pers. syn. 48.) laxè circumscripta, receptaculis circinnantibus globosis, stromate corticali, ostiolis erumpentibus solitariis circinnatis aut in quincuncem sparsis, junioribus convexis nitidis dein umbilicatis. — Ad ramos demortuos Salicis propè Parisios ex Cheval., Lugdunum ex cl. Balbis. — Fries syst. myc. 2. p. 393. — Ostiola lineâ nigrâ epidermidem penetrante cincta.

β subscripta (Fries) lineâ cingente suboblitterata, ostiolis in disculo erumpente solitariis.

11. OBVALLATÆ (Fries syst. myc. 2. p. 394.). *Stroma mere corticale absquè omni proprio conceptaculo; receptacula cortici interiori immersa tenuia in orbem aggregata, supernè a matrice cum collis convergentibus erumpentibus ascendente pustulato-elevata in tuberculum subdisciforme collecta; apices collorum subclavati exserti sistunt ostiola primò papillata dein umbilicato-pertusa, nunc sola in discum stipata, nunc in stromate cum ostiolis ascendentem erumpente disciformi exserta. — Cortici interiori immersæ, receptaculis junioribus sæpè pallidis, adultis atris.*

90. S. CILIATA (Pers. obs. myc. 2. t. 5. f. 3.) pustulata subrotunda, receptaculis circinnantibus ovatis convergentibus, ostiolis tenuissimis ciliæformibus acutis divaricatis subflaccidis. — Ad cortices Ulmi, Alni etc. hyeme. — Nees syst. f. 329. Fries syst. myc. 2. p. 394. — Ostiola longitudine varia, circiter 1-2. lin.

91. S. TORTUOSA (Fries syst. myc. 2. p. 395.) pustulata, receptaculis globosis confertis aggregatis, ostiolis intrâ pustulam convergentibus, fasciculatim erumpentibus subcylindricis inæqualibus obtusis subdivergentibus elongatis subnodosis. — In cortice ligneo in Vogenesis ex cl. Mougeot, circa Angers (cl. Guépin). — Receptacula in orbem cortici interiori immersum disposita, pustulæ corticali prominulæ tecta.

β inæqualis, ostiolis elongatis deflexis rugoso-nodosis. — In ramulis Rhamni cathartici circa Mimatem (cl. Prost).

92. S. CORONATA (Hoffm. cr. 1. t. 5. f. 2.) receptaculis subdifformibus decumbentibus circinnantibus in cortice interiori nidulantibus pustulæ orbiculatæ corticali tectis, ostiolis lœvibus obtusis primò globosis in discum convexum orbicularem nitidum stipatis, dein rostellatis divergentibus. — In ramis exsiccatis Corni, Cratægi, Betulæ albae etc. — Fl. fr. 2. p. 292. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 14. — Ostiola in centro erumpentia coronæ instar imposita.

93. S. FRIT (Fries syst. myc. 2. p. 393.) pustulata subprominula, receptaculis pusillis globosis circinnantibus vix decumbentibus, ostiolis erumpentibus distinctis teretibus strictis atris sursum attenuatis. — Ad ramos exsiccatos in Vogenesis ex cl. Mougeot, circa Angers ex cl. Guépin. — Pustulæ e cortice in-

teriori formatæ, epidermide stellatim fissâ erumpentes, sæpe in series elongatas dispositæ.

94. *S. DECORTICANS* (Fries in vet. ac. handl. 1817. p. 95.) pustulata orbicularis depressa pustulis minutis e cortice interiori elevato formatis erumpentibus tandem nigris, receptaculis consertis subdifformibus, ostiolis minutis consertis nitidis globosis umbilicatis. — In ramulis Quercus emortuis in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), agro Lezurensi (cl. Prost). — Fries syst. myc. 2. p. 396. *S. penicillus* Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 768 ex Fries syst. orb. 1. p. 373. — Pustulæ lineam latæ; stroma proprium nullum sed discus mere corticalis; colla divergentia interdum elongata cylindrica.

95. *S. PINI* (Alb. et Schwein. p. 20. t. 8. f. 1.) pustulæ orbicularibus prominentibus convexis, receptaculis copiosissimis ovatis exiguis collis convergentibus stromate flavo tectis, ostiolis exsertis subglobosis obtusis lævibus primò minutissimè papillatis dein pertusis in discum planum stipatis. — In cortice Pini sylvestris. — Fl. fr. 5. p. 117. Fries syst. myc. 2. p. 397. — Pustulæ passim confluentes epidermide leucophæato tectæ apice ostiolorum cylindro brevissimo disciformi coronatæ.

96. *S. ABIEIS* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 96; syst. myc. 2. p. 398.) immersa pustulata orbicularis, stromate tenui albido, receptaculis ovatis aggregatis rubro-fuscis demùm nigris; ostiolis minutis oblongis lævibus nitidis umbilicato-pertusis fastigiatis in discum stipatis. — Ad corticem squamosam Abietis in Vogesis (cl. Mongeot). Cucurbitaria Pinastri Grev. cr. fl. t. 50. — Pustulæ in cortice interiori omnino detrusæ numerosæ lin. latæ, receptacula profundiè immersa.

97. *S. LEIPHAEMIA* (Fries in vet. ac. handl. 1817. p. 95; syst. myc. 2. p. 399.) pustulata, pustulæ orbicularibus demùm superne nigrescentibus, stromate corticali discoqæ erumpente pallido, receptaculis globosis aggregatis tenuibus, ostiolis sparsim exsertis ovatis papillatis dein consertis pertusis tertiusculis. — Ad ramos emortuos Quercus, Cratægi. — Pustulæ et discus erumpens a cortice interiore formans; in aetate juniori receptacula obsoleta vel pallida, discus erumpens planus formosus lutescenti-pallidus; in hoc statu monente cel. Fries in syst. orb. veg. t. 1. p. 159 est Spermadermia clandestina Tode meck. 1. t. 1. f. 1? DC. Fl. fr. 5. p. 17. Kunze myc. heft. 2. p. 95. t. 2. f. 6.

98. *S. TURGIDA* (Pers. obs. myc. 1. p. 17.) pustulata hemisphærica prominens, receptaculis globosis erectiusculis consertis magnis turgidis, ostiolis in disco primo punctiformi erumpente dein rubrotundo fusco-nigro demùm exsertis convexis obtusis umbilicatis. — Ad ramos exsiccatos Fagi. — Fries syst. myc. 2. p. 400. *S. faginea* Pers. syn. 44. Fl. fr. 2. p. 292. — Receptacula suboctoria, absq[ue] oinni stromate cum receptaculis ascendentे. Gelatina e loculis profusa atro inquinat aut fulvo-rubiginoso tingit ramos.

99. *S. SALICINA* (Pers. syn. 47.) pustulata, receptaculis distinctis minutis globosis circinnantibus, collis junctis in discum ceraceum erumpentem minutum primò fuliginosum dein albescentem poro nigro pertusum, ostiolis minimis globosis nitidis serò exsertis. — In ramis Salicis vulgaris. — Fl. fr. 5. p. 124. *S. cancellata* Tode meck. 2. f. 107.

100. *S. AMBIENS* (Pers. syn. 44.) receptaculis cortici interiori immersis circinnantibus centralibus astomis marginalibus in collum attenuatis, ostiolis obtusis subglobosis lævibus primò papillatis dein pertusis consertis discum ceraceum albido-griseum demùm atrum cingentibus. — Ad cortices Cratægi, Fagi, Rosæ, etc. — Fl. fr. 2. p. 124. Moug. et Nestl. vog. n. 872. *S. talus* var. licheniformis Tode meck. 2. f. 95. *S. calvula* Wahl. lapp. t. 30. f. 4. — In cortice tenuiore ramorum pustulata prominens, in crassiore deppressa. Magnitudine admodum varia.

101. *S. STILBOSTOMA* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 23.) receptaculis numerosis circinnantibus erectis disco erumpente ceraceo albido tectis, ostiolis globosis lævibus nitidis primò papillatis dein umbilicatis sparsim erumpentibus pro-

minentibus demum discum obliterantibus. — In corticibus variis. — S. talus var. conferta Tode meck. 2. p. 94. S. hystrix Moug. et Nestl. vog. n. 569. non Tode ex cl. Moug. in litt. — Discus formâ et magnitudine quam maxime varius.

102. S. TESSERA (Fries syst. myc. 2. p. 405.) immersa, receptaculis subdenis aggregatis globosis irregulariter circinnantibus disco erumpente plano mere corticali tectis, ostiolis sparsis prominulis. — In cortice Coryli? in Vogenesis ex cl. Mongeot, aut. — Receptacula exserendo ostiola globosa sublævia corticem interiorem elevant qui erumpens format discum 1-2 lin. latum, colore et substantiâ omnino corticis interioris.

102. CIRCINNATÆ (Nees syst. 311.). *Stroma nullum; receptacula epidermide tecta simplicia aggregata in orbem disposita pallida mox nigra, in colla attenuata quæ juncta epidermidem perforant, dein scpius libera absque conceptaculo et disco; ostiola simplicia pertusa.* — Innato-immersæ, suprà corticem interiorem nascentes, subsimplices.

103. S. FRIESII (Duby mss.) circinnata, receptaculis globosis cortice interiori immersis decumbentibus intùs nigris, collis longis stromati albo immixtis, ostiolis erumpentibus subæqualibus subdivaricatis cylindrico-conicis apice truncatis umbilicatis. — Ad rainulos Pini Piceæ in Vogenesis (cl. Mongeot). — S. Picea Fries in litt. ad cl. Moug. non syst. myc. — Colla inæqualia alia erumpentia alia subinnata; gelatina lutescens apice ostioli erumpens. An potius Sphæronematis sp.?

104. S. PULCHELLA (Pers. syn. 43.) circinnata atro-brunnea, receptaculis globosis decumbentibus, ostiolis longissimis flexuosis obtusis convergentibus apice primò junctis mox liberis. — Sub cortice Cerasi. — Fl. fr. 5. p. 127. Nees syst. p. 305. f. 333. Moug. et Nestl. vog. n. 279. Grev. crypt. fl. t. 67. — 3-9 lin. lata; ostiola $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ lin. longa.

S. minor (Fries) rostris brevibus. — Sub cortice Betulæ albæ. — S. pusilla Wahl. S. Wahlemburgii Desm. crypt. exs. n. 179.

105. S. UMBILICATA (Pers. syn. 45.) circinnata, receptaculis parvis, ostiolis prominulis confertis subcupularibus asperis. — Ad caules Angelicæ sylvestris propè Beauvais (cl. Graves). — Inter minores hujus sectionis.

106. S. QUATERNATA (Pers. obs. 1. p. 64; syn. t. 2. f. 1. 2.) circinnata, receptaculis subquaternis nudis ovatis decumbentibus, ostiolis brevibus obtusis levibus pertusis inter se liberis sed discum minimum convexum tuberculosum efformantibus. — Sub cortice Fagi, Aceris, etc. — Fl. fr. 5. p. 127. Nees syst. f. 336. — Ostiola epidermidem perforant sed non prominent.

107. S. CONVERGENS (Tode meck. 2. p. 39. f. 111.) circinnata minuta, receptaculis subsenis ovatis subimmersis, ostiolis convergentibus teretibus subattentatis erumpentibus apice perforatis. — Ad ramos demortuos Betulæ albæ, propè Parisios frequenter ex cl. Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 410. — Receptacula non decumbentia sed leviter convergentia.

IV. EPIPHERICÆ Fries syst. myc. 2. p. 321.

Subcompositæ. Receptacula horizontalia suprà stroma nuda collocata, sed primò a matrice tecta, collo nullo. — Subinnatæ epidermide tectæ.

108. CESPITOSÆ (Pers. syn. 48.). *Stroma subrotundum determinatum convexum grumosum subinnatum; receptacula cespitosa superficialia libera absque collis elongatis, ostiolis æqualibus.* — *Superficiali-innatae, stromate suberumpente vel obliterato.*

* Ostiolo papillæformi.

108. S. CINNABARINA (Tode 2. p. 9. f. 68.) cespitosa, receptaculis globosis corrugatis cinnabarinis decolorantibus, ostiolo vix papillæformi. — In ramis arborum frondosarum frequens, hyeme, vère. — S. decolorans Pers. syn. 49.

- Moug. et Nestl. vog. n. 570. *S. pezizoidea* a DC. fl. fr. 5. p. 125. *S. fragiformis* With. Sow. t. 256. non Pers. *Cucurbitaria cinnabariua* Grev. crypt. fl. t. 135.
109. *S. coccinea* (Pers. syn. 49; ic. pict. t. 12. f. 2. a-c.) cespitosa, receptaculis ovatis lœvibus lâtè rubris, ostiolo papillæformi. — In cortice arborum variarum et Abietis. — Fl. fr. 5. p. 126. *S. decidua* Tode meck. 2. f. 104. *S. Mori* With. Sow. t. 255. — Stroma varium sublatescens; receptacula tenuia sed non regulariter collabescentia variant colore plus minus intenso.
- β. parasitica* (Fries) receptaculis aggregatis, subiculo obliterato. — In Sphæriis variis parasitica, undè his destructis receptacula stromati nigro insidere videntur.
110. *S. sinopica* (Fries el. fung. 2. p. 81. ex cl. Moug.) mollis cespitosa, receptaculis globosis lœvibus rubris demùm cinnamomeis collabescentio concavis, ostiolo papillato intensiore demùm deciduo. — Ad radices et caules Hederæ in Vogenesis (cl. Moug.), propè Vire (cl. Lenormand), Augers (cl. Guépin). — Receptacula solitaria aut 2-12 in cespitulos aggregata; gelatina globulum format.
111. *S. aquifolii* (Fries in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 879; el. fung. 2. p. 82.) dense aggregata, receptaculis brunneis lœvibus nitidis molibus globosis dein suprà planis et sic inversè turbinatis demùmque collabescentio concavis. — Ad ramos Ilicis Aquifolii in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.), vere. — Valde elegans sub epidermide tenui nascens, jamjā erumpens et epidermidis dilaceratæ vestigia cincta.
112. *S. Ribis* (Tode meck. 2. f. 103.) cespitosa subrotunda transversim erumpens, stromate compacto inferius corticali lutescenti, superius rubenti, receptaculis subglobosis lœvibus primò purpureo-rubris dein fuscescentibus massâ ceraceâ albâ farctis. — In ramis Ribis rubri, circâ Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 413. — Lin. 1-2 et ultra lata; receptacula facile decidua.
- β. appendiculata*, stromate villoso-appendiculato. — *S. appendiculata* Pers. syn. 50.
113. *S. Laburni* (Pers. syn. 50.) cespitosa atra sèpè confluens ruptâ epidermide cincta, stromate subcompacto, receptaculis globosis rugulosis nigris, ostiolo minutissimo. — In ramis demortuis Cytisi Laburni, hyeme, vere. — Fl. fr. 2. p. 292. Nees syst. f. 325. Fries syst. myc. 2. p. 413.
114. *S. Populinæ* (Pers. obs. 2. t. 5. f. 10. 11.) cespitosa atra, stromate compacto, receptaculis prominulis oblongo-ovatis lœvibus subnitidis subdivergentibus. — Ad ramos Populinæ, in Vogenesis ex cl. Mongeot, propè Beauvais ex cl. Graves, hyeme, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 413.
115. *S. conglobata* (Fries syst. myc. 2. p. 414.) cespitosa, cespitibus subrotundis prominentibus, receptaculis opacis subglobosis rugulosis nigris, ostiolo papillæformi obsoleto. — Ad ramos exsiccatos Coryli et Betulæ in Vogenesis ex cl. Mongeot, Robiniae pseudo-acaciæ circâ Mimatem (cl. Prost). — Cespites lineam lati; ostiola sub lente tantum distingui possunt.
116. *S. dioica* (Fries el. fung. 2. p. 82. ex cl. Moug.) pustulata, receptaculis stipatis ovato-globosis amplis stromate fusco e matrice formato tectis, ostiolis exsertis globosis obtusis in discum planiusculum stipatis demùm rimosè dehiscentibus. — Ad ramos Aceris pseudo-platani in Vogenesis (cl. Mongeot). — Pustula innato-erumpens epidermide dilaceratâ cincta, receptacula cortici innata, ostiola magna conferta stroma demùm obliterantia.
- ** *Ostiolo nullo, receptaculis interdùm rimosè dehiscentibus.*
117. *S. cucurbitula* (Tode meck. 38. t. 14. f. 110.) cespitosa subrotunda rariùs elongata, receptaculis ovato-globosis lœvibus aurantio-rubris collapsis cupulaformibus, ostiolo obsoleto. — In variarum arborum ramis ramulisque demortuis, hyeme, vere. — Nees syst. f. 327. *S. pezizoidea* β DC. fl. fr. 5. p. 125. — Cespites 1-3 lin. longi.
118. *S. Berberidis* (Pers. syn. 52. ic. pict. t. 2. f. 3-5.) cespitosa sèpiùs elongata, stromate tenui fusco-atro, receptaculis globosis astomis primò rubris mox rufo-fuscis demùm rimoso-rugosis nigris farctis. — In ramis Berberidis

emortuis. — Fl. fr. 2. p. 293. Nees syst. 1. f. 324. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 874. S. rufo-fusca Fries obs. 1. t. 4. f. 3. in jun. et. Cucurbitaria Berberidis Grev. cr. fl. t. 84. — Cespites magnitudine varii sæpius elongati; spornæ magnæ luteæ.

119. *S. NAUCOSA* (Fries in Schmidt myc. heft. 2. p. 36; syst. myc. 2. p. 416.) cespitosa, cespitibus minutis subrotundatis, receptaculis coacervatis globosis lævibus fuscescenti-nigris astomis intùs albis. — Ad ramulos Ulmi in Vögisis ex cl. Mougeot, Tiliæ microphyllæ circà Lugdunum ex cl. Balbis.
120. *S. VARIA* (Pers. syn. 52.) cespitosa transversim erumpens, receptaculis astomis globosis sublævibus aterrimis, aliis minoribus ovatis cavis, alis majoribus subglobosis farctis interdùm subumbilicatis. — Ad ramos exsiccatos Cerasi et Ulmi propè Parisios ex Chevall. — Fries syst. 2. p. 416.
121. *S. ACERVATA* (Fries syst. myc. 2. p. 416.) cespitosa erumpens, stromate proprio nullo, receptaculis turbinatis læviusculis astomis nigris collabescendo cupulæformibus. — Ad cortices Mali propè Beauvais ex cl. Graves, Lugdunum ex cl. Balbis, hyeme, vere.
122. *S. CUPULARIS* (Pers. syn. 53. t. 1. fig. 10.) cespitosa subirregularis, stromate tenui nigro, receptaculis globosis rugulosis astomis nigris collabescendo cupulæformibus. — In ramis arborum exsiccatis, hyeme, vere. — Fl. fr. 5. p. 128. Fries syst. myc. 2. p. 416.
123. *S. AGGLOMERATA* (Pers. in litt. ad. cl. Moug.) cespitosa aut sparsa atra nitida, receptaculis globoso-turbinatis in parte superiori depressis lævibus astomis collabescendo concavis. — Ad ramos exsiccatos in hortis Vogesorum (cl. Moug.), circà Angers (cl. Gnépin). — Fries el. fung. 2. p. 83. — Erumpentisuperficialis, receptacula pauca (2-12) interdùm solitaria demùm decidua suprà stroma parvum convexum nigrescens agglomerata.
124. *S. RHAMNI* (Nees syst. f. 326.) subeffusa, receptaculis rotundatis concentrica sulcati astomis nigris collabescendo umbilicatis. — Ad ramos exsiccatos Rhamni circà Lugdunum ex cl. Balb. — Fries syst. myc. 2. p. 417. Balb. fl. lugd. 2. p. 201. — Cespites longitudinaliter effusi irregulares; receptacula subaggregata aut distantia opaca.
125. *S. PULICARIS* (Fries in Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 37.) cespitosa diffinis, stromate a cortice formato faligineo-nigrescente, receptaculis superficialibus perexquis stipatis astomis rimoso-dehiscentibus collabescendo complanatis demùmque subcupulatis. — Ad ramos Sambuci nigrae recens emortuos in Vögisis ex cl. Mougeot. — Cespites subrotundi vel elliptici in tuberculis rimosis prominentibus corticis nidificant.
126. *S. COACERVATA* (Moug. in litt.) cespitosa diffinis, stromate nigro-fusco a cortice formato, receptaculis globosis rugulosis confertis astomis nigris rimoso dehiscentibus collabescendo complanatis. — Ad ramos Salicis in Vögisis (cl. Moug.). — *S. acervalis* Fries el. fung. 2. p. 83. — Cespites subrotundi aut elliptici magnitudine varii; receptacula basi coadunata demùm libera.
127. *S. VACCINII* (Sow. t. 373. f. 1.) cespitosa subrotunda sæpius irregulariter confluens superficiali-innata, receptaculis minutis coacervatis subconnatis subglobosis farctis aterrimis opacis astomis primò villosis dein nudis. — In caulinis languescentibus Vaccinii Vitis idæ in Vögisis (cl. Moug. et Nestl.) circà Mimatem (cl. Prost.). — Fries syst. myc. 2. p. 418. *S. accumulata* Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 665.
128. **CONFLUENTES** (Fries syst. myc. 2. p. 419:). *Stroma tenue subrotundum vel effusum indeterminatum vere innatum; receptacula tenuia simplicia mollia connata primò immerso-innata dein erumpentia subliberata confluentia, collo nullo.*
128. *S. MELOGRAMMA* (Pers. syn. 13.) subrotunda oboconica subconfluens primò grisea demùm nigrescenti-faliginea intùs fusco-nigra, receptaculis obovatis confluentibus subprominulis, ostiolis indistinctis. — Ad ramos languescentes Fagi sylvaticæ. — Fl. fr. 2. p. 288. Moug. et Nestl. exs. n. 274. *Variolaria*

melogramma Bull. champ. t. 492. f. 1. — Mich. gen. t. 54. f. 2. — In series elongatas erumpens.

129. *S. QUERCUM* (Schwein. fung. car. n. 125.) gregaria minuta subelliptica planiuscula nigra, receptaculis subglobosis albo-farctis connatis, ostiolis prominulis. — Ad corticem juniorem Quercus in Vogesis (cl. Mougeot et Nestl.) — Fries syst. myc. 2. p. 420. *S. fuliginosa* Moug. et Nestl. vog. n. 770. non Pers. — Receptacula stromati tenui incident, sed nullo tecta vel cincta sunt.

130. *S. DULCAMARÆ* (Schmidt myc. heft. 1. p. 62.) subrotundo-elongata atra, stromate tenui vidente, receptaculis globoso-depressis coacervatis confluentibus granulatis primò papillatis dein pertusis vivis nitidis siccis opacis. — Ad ramos Solani dulcamaræ ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 421. Chevall. hist. hypox. ic. ex fl. par. 1. p. 479. — Cespites immersi 3 lin. longi; receptacula albido-farcta.

131. *S. ACINOSA* (Fries syst. myc. 2. p. 422.) latissimè effusa interruptè erumpens atra, receptaculis globosis in crustam scabiosam irregularem aterrimam confluentibus, ostiolis latentibus. — In cortice crassiore Tiliae et Ulmi in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), propè Parisios ex Chevall. — Moug. et Nestl. vog. n. 769. — Receptacula intùs primò albo-farcta, dein nucleus ater tandemque evacuatus.

132. *S. ELONGATA* (Fries obs. 1. p. 175; syst. myc. 2. p. 422.) nigra, stromate longissimo ambiente effuso fuligineo-nigro, receptaculis primò immersis dein erumpentibus confertis globosis confluentibus circà ostiolum papillæformie annulato-depressis. — Ad ramos emortuos Robiniae pseudacaciæ. — Moug. et Nestl. vog. n. 875. Cucurbitaria elongata Grev. crypt. fl. t. 195. — Stroma vere innatum cum cortice concretum ejusque fibris intertextum, receptacula primò farcta stromati ut puncta alba immersa, dein enversa astoma, tandemque subconfluentia, etc.; sporidia oblonga lutea compressa striata.

β. coronillæ (Fries) stromate tenuissimo, receptaculis in series elongatas erumpentibus. — In ramis Coronillæ Emeri.

γ. simplex (Fries) stromate suboblitato, receptaculis solitariis. — In ramis Cytisi sessilifolii.

133. *S. FULIGINOSA* (Pers. obs. 2. p. 68.) subeffusa erumpens innata, stromate proprio nigro tenuissimo, receptaculis inæqualibus nunc liberis nunc confluentibus globosis farctis astomis fuliginoso-nigris. — Ad ramos Salicis propè Angers (cl. Guépin), Beauvais ex cl. Graves, Robiniae pseudacaciæ propè Parisios ex Chevall., in Vogesis ex cl. Mougeot, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 423. — Cortex interior sub stromate proprio ad subiculum crassum subceraceum olivaceo-luteum turgescens.

134. *S. DOTHIDEA* (Moug. in Fries syst. myc. 2. p. 423.) subrotunda erumpenti-innata, stromate fusco-atro, receptaculis globosis subimmersis. — In ramulis dejectis Fraxini in Vogesis (cl. Moug.). — Tumores 2-3 lin. lati, epidermide in rimas flexuosas dehiscente tecti, sub quâ latet stroma tuberculo corticali subprominenti incumbens.

135. *S. SPARTII* (Nees in Kunze deutsch. sch. 8. n. 178.) nigra conferta, stromate tecto ambiente effuso, receptaculis erumpentibus ovatis aggregatis confluentibusque albo-farctis demum evanatis, ostiolis truncatis obtusis demum pertusis. — In ramis exsiccatis Cytisi scoparii (Spartii scoparii L.). — Moug. et Nestl. exs. n. 644. Fries syst. myc. 2. p. 424. — Junior cortice omnino tecta; dein erumpens ostiolis epidermidem perforantibus.

136. *S. PITHEOPHILA* (Schmidt et Kunze exs. n. 133.) atra, stromate tenui crustæ-formi fusco, receptaculis erumpentibus confertis lœvibus opacis, primò globosis albido-farctis dein pertusis evanatis demum collabescendo concavis. — Ad corticem truncorum et ramorum adhuc vigantium Pinæ sylvestris in Vogesis ex cl. Mougeot, agro Lezouensi (cl. Prost), vere. — Fries syst. myc. 2. p. 425. — Primo aspectu superficialis, sed accentuatus inspecta erumpens et innata videtur; receptacula secundum rimulas epidermidis aggregata raro confluunt.

137. *S. MUCOSA* (Pers. obs. 2. p. 68. syn. p. 29.) effusa mollis erumpens con-

694 ACOTYL. seu CELLULARES. APHÆRIA.

fluens astoma primò rubescens demùm opaca nigrescenti-grisea. — Ad corticem fructus Cucurbitarum. — Fl. fr. 5. p. 122. Fries syst. myc. 2. p. 425. — Stroma proprium vix ullum; receptacula confluentia in maculas 1-3 unc. lata.

135. SERIATÆ (Fries syst. myc. 2. p. 426.). *Stroma tenue effusum indeterminatum tecto-innatum granulosum, a parenchymate matricis corrosæ formatum vel nullum; receptacula epidermide adnatâ primò tecta demùm subnuda subglobosa in series parallelas disposita, sœpius inter se connata sed a matrice subdiscreta atra intus farcta, ostiolis brevibus. — Immerso-innatae, in caulinis herbarum mortuarum vel languescentium nascentes.*

138. S. RIMOSA (Albert. et Schw. 13. t. 3. f. 1.) *tecta lineari-oblonga nebulosa per rimas parallelas erumpens, stromate nigro, receptaculis minutis stipatis compressiusculis seriatis albo-faretis astomis. — Ad culmos Arundinis Phragmitis, vere. — Fl. fr. 5. p. 119. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 15. — Bullas cistit 1-6 lin. latus, $\frac{1}{4}$ -2 unc. longas acutas.*

139. S. PTERIDIS (Sow. t. 394. f. 10. non Rebent. nec Alb. et Schw.) *subiuncta parallela irregularis confluens nitida nigra, stromate nigro, receptaculis connatis seriatis per rimas parallelas erumpentibus, ostiolis prominulis. — In stipitibus Pteridis aquilinæ propè Parisios ex Chevall., in Vogesis ex cl. Maugeot, vere. — S. filicina Fries syst. myc. 2. p. 427.*

140. S. JUNCI (Fries scl. sicc. exs. n. 5.) *epidermide tecta dein rimosè erumpens subrotunda tuberculosa, receptaculis minutis subglobosis seriatis nigro-faretis stromati tenui nigricanti primò immersis dein emergentibus subastomis. — In culmis exsiccatis Junci communis. — Fries syst. myc. 2. p. 428. — Receptacula inter culmi fibras immersa parva formant tubercula rariū solitaria sœpius in maculas irregulares 3-4 lin. latus confluentia.*

141. S. STALAEFORMIS (Fries scler. exs. n. 195; syst. myc. 2. p. 428 non Mong.) *epidermide atratâ innatâ tecta demùm medio rumpens lanceolata brevis acuta, receptaculis seriatis albo-faretis astomis. — In caulinis exsiccatis plantarum circa Lugdunum ex cl. Balbis lugd. 2. p. 189. — Receptacula serie simplici vel duplii disposita; striæ confertæ lanceolatae $\frac{1}{4}$ -2 lin. longæ atrinque acutæ parallelæ, sœpius maculâ dealbatâ cinctæ.*

142. S. LINEARIS (Nees in Fries syst. myc. 2. p. 429.) *receptaculis uniserialibus globosis intus nigris confluentibus in strias breves lineares, ostiolis minutis globosis prominulis. — Ad caules exsiccatos Solidaginis Virgæ-aureæ propè Beauvais ex cl. Graves.*

143. S. ALOPECURI (Fries ined. ex cl. Guépin in litt.) *receptaculis 1-2-serialibus globosis confertis interdùm connatis epidermide nigrescente tectis intus nigris, ostiolis minutissimis depressis atris. — In culnis Alopecuri circa Angers (cl. Guépin). — Receptacula minuta secùs strias culni disposita, epidermis circa ostiolum frequenter albescens.*

144? S. GALLI (Fries ined. ex cl. Moug. in litt.) *immerso-innata interrupta tecta ovato-orbicularis prominula convexa atra, receptaculis 1-5 subglobosis subseriatis albis astomis in stromate albo immersis. — Ad caules Gallii Moluginis in Vogesis (cl. Moug.), circa Angers (cl. Guépin). — Stromata sparsa magna epidermide tecta semilineam ferè longa. An potius Dothideæ sp.? Hanc inter Caulicolas monente cl. Moug. reponit cl. Fries el fung. 2. p. 105.*

145. S. ANETHI (Pers. syn. 30.) *epidermide tenui tecta elongata interrupta rugosa primò subcinerea dein nigrescens, receptaculis multiseriatis cohaerentibus subnudis papillatis intus albo-faretis. — In caulinis exsiccatis Anethi graveolentis in Galliâ boreali (cel. Maugeot et Nestler.) — Fries syst. myc. 2. p. 429. S. microscopicæ Ehr. exs. n. 222. — Receptacula in strias 2-4 lin. longas, 1-2 latus inæquales aggregata.*

146. S. NEBULOSA (Pers. syn. 31.) *epidermide tecta, receptaculis minutissimis gregariis maculas griseas interruptas inæqualiter lineatas efformantibus,*

- ostiolis prominulis subacutis. — Ad caules Umbelliferarum Solani, Phlogis paniculatae, etc., vere. — Nees syst. f. 341. — Maculae nebuliformes 3-4 lin. et ultra longae, 1-2 latae.
147. S. LONGISSIMA (Pers obs. 2. p. 68. syn. p. 31.) epidermide tecta nigra, receptaculis minutis stromati tenuissimo insidentibus demum subprominulis in series longissimas parallelas confluentibus, ostiolis obsoletis. — Ad caules Umbelliferarum propè Parisios ex cl. Chevali, hyeme, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 430. — Striae ab uno caulis nodo ad alterum porrectae vix lineam latæ passim confluentes.
148. S. MELÆNA (Fries scl. suec. exs. n. 200; syst. myc. 2. p. 431.) indeterminata ambienti-effusa epidermide atrata tecta, receptaculis subglobosis liberis seriatis subprominulis albo-farctis astomis demum pertusis. — In caulis exsiccatis Astragali glyciphylli propè Beauvais ex cl. Graves, Medicaginis salsatæ in Vogesis (cl. Mongeot). — Nudo oculo caules undique atro-inquinati apparent.
149. S. PICEA (Pers. syn. 31; ic. pict. 2. t. 10. f. 7. 8.) epidermide connata tecta elongata inæqualis picea, receptaculis inter se distinctis sparsis subdepressis subprominulis latentibus astomis demum pertusis. — Ad caules aridos Solani tuberosi propè Beauvais (cl. Graves), in Vogesis ex cl. Mongeot, vere. — Maculae opacæ unciam ferè longæ, 1-4 lin. latæ.
150. S. POLYGRAMMA (Fries scl. suec. exs. n. 196; syst. myc. 2. p. 432.) epidermide tecta, stromate nullo, receptaculis prominulis minutis serialis globoso-depressis astomis nigris nitidis subconfluentibus in maculas latè effusas dispositis albo-farctis apice umbilicatis. — Ad caules plantarum majorum in Gallia boreali ex cl. Desmazières, vere. — Receptacula sèpè in maculas eleganter effiguratas scripturam tenuissimam referentes aggregata.
151. S. GRAMINIS (Pers. obs. 1. t. 1. f. 1-2; syn. 30.) epidermide tecta inæqualis rugulosa prominula nigra, receptaculis globosis subseriatis ostiolisque latentibus. — In foliis graminum languescentibus. — Nees syst. f. 314. Fl. fr. 2. p. 291. Moug. et Nestl. vog. n. 876.
- α Elymorum* (Fries) oblonga sublinearis epidermidi adnata aterrima nitens.
- β Poarum* (Fries) subrotunda transversim elliptica minor epidermide tecta cinerascenti-nigra opaca.
152. ? S. GANGRENA (Fries ined. ex cl. Moug. in litt.) tecta inæquabilis aterrima receptaculis astomis prominulis demum depressis tuberculosa. — Ad folia Graminum in agro Mimatis (cl. Prost). — Maculae elongatae 2-4 lin. longæ ex folii parenchymate in stroma aternum commutato formatae; receptacula omnino immersa.
153. S. CARICIS (Fries syst. myc. 2. p. 435.) epidermide tecta inæquabilis confluens nigra receptaculis globosis prominentibus astomis epidermide nigrefacta tectis tuberculosa. — In foliis Caricis depauperatae in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves, vere.
154. S. TRIFOLII (Pers. syn. 30.) epidermide tecta hypophylla subrotunda prominula tuberculoso-rugosa atra, receptaculis tenerimis junioribus albo-farctis, in stromate pulverulento immersis, ostiolis latentibus. — In foliis Trifoliorum variorum, aut. hyeme. — Fl. fr. 5. p. 123. Desmaz. cr. exs. n. 180. — Tubercula $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{2}$ lin. lata subconfluentia opaca.
155. S. FIMBRIATA (Pers. obs. 1. p. 36. var.) epidermide tecta hypophylla cespitosa, receptaculis confertis in parenchymate folii nidulantibus globosis in

696 ACOTYL. SEU CELLULARES. SPHERIA.

tuberculum nigrum confluentibus, ostiolis erumpentibus distantibus tertibus spinulosis basi fimbriâ albicante cinctis. — In foliis Carpiui Betuli. — Moug. et Nestl. vog. n. 277. S. Carpini Hoffm. cr. 1. p. 1. t. 1. f. 1. DC. fl. fr. 5. p. 128. non Pers. S. spiculosa Batsch. cont. 1. f. 182. — Ostiola lineam longa.

156. S. CORYLI (Batsch el. cont. 2. t. 42. f. 231.) epidermide tecta hypophylla, receptaculis distinctis in circulum dispositis nigris, ostiolis erumpentibus spinulosis basi fimbriâ albicante cinctis. — In foliis Coryli. — Fl. fr. 5. p. 129. non 2. p. 287. Moug. et Nestl. vog. n. 877. S. fimbriata & Coryli Pers. S. gnomon DC. fl. fr. 2. p. 294. excl. syn. — Simillima priori sed minor et magis dispersa.

157. S. BIFRONS (Schm. et Kunze deutsch. schw. exs. n. 204.) innata bifrons pustulata, pustulis atris maculæformibus applanatis subrotundo-angulatis elongatisve interdum confluentibus orbiculatim dispositis, receptaculis paucis subindè solitariis superne prominulis distinctis convexis demum umbilicato-pertusis tandemque cum epidermide secedente sæpè profugis. — Ad folia languida aut exsiccata Quercus. — Fries syst. myc. 2. p. 438. Xyloma bifrons DC. fl. fr. 5. p. 156; mem. mus. 3. p. 322. t. 3. f. 11. X. circinnans Pers. in Moug. et Nestl. exs. n. 480. Sph. circumvallata Sow. t. 373. f. 4. — Pustulæ circinantes circa maculas exaridas albidas indeterminatas.

158. S. OREADES (Fries ined. ex cl. Moug. in litt.) innata epiphylla, receptaculis minimis solitariis globosis astomis nigris intus albis in maculâ expaliente elevata applanata aggregatis aut annulatim dispositis. — Ad folia exsiccata Quercus in agro Mimatensi reperiit cl. Prost. — Maculæ griseo-lutescentes solitariæ 1-2 lin. latæ orbiculares; receptacula numerosissima aggregata maculam ferè omnem occupantia aut in annulum disposita maculæ centro sterili.

159. ? S. ODEMA (Fries in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 880.) hypophylla gregaria suborbicularis nigra opaca innata epidermidem tegentem primò sublevans dein dilacerans, receptaculis minimis in maculâ nigrâ aggregatis intus albis demum rimosè dehiscentibus. — Ad folia decidua Ulmi in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), agro Lezurense (cl. Prost), hyeme, vere. — An potius Dothideæ sp.? Receptacula sub lente valde convexa tantum distinguenda.

160. S. CEUTHOCARPA (Fries syst. myc. 2. p. 439.) innata bifrons applanata angulata nigra opaca in maculâ expaliente sparsa, receptaculis in paginâ inferiori demum prominentibus subsolitariis subconvexis astomis latentibus. — In foliis exsiccatis Populi, hyeme, vere. — Xyloma populinum Pers. syn. 107. Moug. et Nestl. exs. n. 269. DC. fl. fr. 2. p. 304. X. concentricum Poir. — Gir. Chant. conf. t. 17. f. 39.

B. Simplices Fries syst. myc. 2. p. 320.

V. SUPERFICIALES Fries syst. 1. c.

Receptacula bicorticata, supra stroma effusum villosum vel matricem plane superficialia libera primo velata.

17. BYSSISEDÆ (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 249; syst. myc. 2. p. 439.). Receptacula libera glabra subiculo tomentoso e fibris dense intertexto insidentia, ostiolo brevi subpapillæformi. — In corporibus mucidine corruptis.

161. S. AURANTIA (Pers. syn. 68; ic. pict. 2. t. 11. f. 4-5.) receptaculis minutis confertis subrotundis papillatis aurantiis e subiculo tomentoso effuso aurantio emergentibus, ostiolo obtuso brevi crasso dilutiori. — Ad ligna mucida, fungos suberosos putrescentes etc., propè Parisios ex cl. Chevall. — Nees syst. f. 362. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 17. Cryptosphaeria aurantia Grev. crypt. fl. 78.

162. S. ROSELLA (Alb. et Schw. p. 38. t. 9. f. 3.) receptaculis minutis gregariis globoso-ovatis papillatis sanguineo-roseis subiculo tomentoso laxè contexto margine albo in centro incarnato insidentibus. — Ad terram in locis umbro-

sis, ligna mucida, fungos vetustos, propè Parisios ex Chevall. — Nees syst. f. 362. b. Fries syst. myc. 2. p. 441. Grev. crypt. fl. t. 138. — Variat receptaculis et subiculo intensioribus.

163. *S. AQUILA* (Fries syst. myc. 2. p. 442.) receptaculis magnis gregariis globosis firmis papillatis fusco-atris e subiculo tomentoso fusco late effuso adnato persistente emergentibus. — Ad ligna et ramos, hyeme, vere. — *S. hyssidea* & Tode meck. 2. t. 9. f. 70. *S. byssidea* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 295. — Papilla acutiuscula nigra.

164. *S. BYSSIDEA* (Tode meck. 2. t. 9. f. 69. var. α) receptaculis sparsis glaberrimis nitidis depresso-globosis firmis papillatis cinereis subicolo interrupto fibroso griseo-fusco insidentibus. — Ad ligna et ramos Salicinos, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 442. — Papilla obtusiuscula concolor.

165. *S. TRISTIS* (Tode meck. 2. t. 9. f. 67.) receptaculis minutis confertis globosis rugulosis astomis aterrimis demum collapsis subicolo tenui effuso strioso indeterminato insidentibus. — Ad cortices Fagi, Quercus, etc., vere. — Pers. ic. t. 12. f. 5. 6. — Receptacula punctulis minimis rugulosa.

168. *VILLOSAE* (Fries syst. myc. 2. p. 446.). *Receptacula sublibera firma ovata vel globosa villo haud intertexto persistente tecta, ostiolo æquali subpapillæformi raro elongato vel obsoleto.* — In vegetabilibus emortuis pérennis, raro terrestres.

166. *S. CHIONEA* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 113.) sparsa omnino superficialis, receptaculis globosis rugulosis pubescens albis, ostiolo acento flavescente sèpius subulato stricto. — Ad folia Pinea in locis nudis Vogesorum (cl. Mongeot). — Fries syst. myc. 2. p. 446. Ceratostoma Fries obs. myc. 2. t. 7. f. 2.

167. *S. OVINA* (Pers. syn. 71.) receptaculis sparsis globosis ovatisque liberis villo mucido albido tectis, basi nudis, ostiolo papillato nigricante. — Ad trunca mucidos decorticatos, aut. — *S. mucida* α et β Tode. *S. lichenoides* Sow. t. 373. f. 12.

168. *S. MUCIDA* (Tode meck. 2. p. 16. f. 75. var. fusca) receptaculis confertis subglobosis villo mucido fusco tectis, basi nudis, ostiolo papillato nigrescente. — In rimulis lignorum putridorum, propè Parisios ex cl. Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 447.

169. *S. CANESCENS* (Pers. obs. 1. p. 67; syn. p. 72.) receptaculis confertis aggregatis globosis ovatisque hirsutis papillatis incanis subinde in crustam connexis, ostiolo papillæformi. — Ad ramos putrescentes Quercus, Fagi, etc., aut. — Fries syst. myc. 2. p. 448.

170. *S. STRIGOSA* (Alb. et Schw. p. 37. t. 5. f. 7.) receptaculis aggregatis dense confertis globosis ovatisque papillatis nigris pilis longis rigidis incanis undique strigosis. — Ad ligna putrida Abiegn et Picea propè Parisios ex cl. Chevall., in Vogesis (cl. Mongeot). — Chevall. hist. des hypox. ic. ex fl. par. 1. p. 474. A præcedente non facile dignoscitur.

171. *S. BIFORMIS* (Pers. syn. 56. t. 2. f. 14; ic. pict. t. 24. f. 3.) receptaculis confertis subovatis subtuberculosis nigris pilis strigosis concoloribus tectis, subicolo strigoso-villoso crustaceo insidentibus, ostiolo subelongato. — Ad ligna putrida et in terrâ argillacea Pyrenæorum ex cl. Fries. — Fries syst. myc. 2. p. 448. *S. terrestris* Sow. t. 373. f. 7.

172. *S. RACODIUM* (Pers. syn. 74.) receptaculis solitariis vel aggregatis subglobosis rugulosis hirtis nigris papillatis e subiculo tomentoso lato nigro emergentibus, ostiolo papillæformi nudo. — In lignis et corticibus Fagi, propè Parisios ex Chevall. — Chevall. hist. hyp. icon. ex fl. paris. 1. p. 475.

173. *S. HIRSUTA* (DC. fl. fr. 5. p. 139.) receptaculis confertis subglobosis ovatisque tuberculatis nigris pilis sparsis concoloribus tectis, ostiolo obsoleto. — Ad ligna sicca. — Fries syst. myc. 2. p. 448 an Pers. syn. 73?

β , *acinosa* (Fries) receptaculis globosis subdepressisque nigro-fuscis. — *S. acinosa* Batsch. el. t. 30. f. 179. *S. hirsuta* Sow. t. 386. f. 3.

174. *S. CRINITA* (Pers. syn. 72.) aterrima opaca ligno mucido ad dimidium immersa, receptaculis subglobosis lăviusculis pilis confertis mollibus tectis aut fibrillis longissimis in ligno repentibus cinctis, ostiolo obsoleto. — Ad ligna mollissima carie consumpta Fagi, Coryli, etc. — Fries syst. myc. 2. p. 450. — An satis distincta species?

175. *S. PILOSA* (Pers. syn. 73; ic. pict. 2. t. 10. f. 9. 10.) atra, receptaculis minutis rotundato-ovatis lăviusculis pilis brevibus divergentibus plus minus confertis tectis, ostiolo simplici suboblitato. — Ad ligna et ramos exsiccatos. — Chevall. hist. hypox. ic. ex fl. par. 1. p. 474.

176. *S. HISPIDA* (Tode meck. 2. t. 10. f. 84.) receptaculis sparsis atris ovato-conicis lăvibus cum ostiolo confluentibus pilis brevibus rarioris adspersis. — Ad ligna exsiccata et demorta. — Fl. fr. 5. p. 140.

179. **DENUDATÆ** (Fries syst. myc. 2. p. 452.). *Subiculum nullum; receptacula nuda sublibera ovata vel globosa mox glabra, ostiolo brevi subpapillæformi persistente. — Adnato-superficiales confertæ lignatile juniores velo fugacissimo tectæ.*

177. *S. PEZIZA* (Tode meck. 2. p. 46. f. 122.) minor gregaria conferta molliis basi subpilosa, receptaculis globosis lăvibus subpapillatis junioribus dilatioribus adultis subminiatis, denum expallentibus collabescendo concavis. — Ad lignum semiputridum. — Fl. fr. 2. p. 295. Mong. et Nestl. exs. n. 483. Grev. crypt. fl. t. 186. f. 2.

a. villifera (Fries) gelatinâ villi instar farinosi albi ex ostiolis exente. — *S. miniata* Hoffm. bot. taschenb. 2. t. 12. f. 2. Nees syst. f. 316.

f. globifera (Fries) gelatinâ globulum formante. — *Peziza hydrophora* Bull. champ. t. 410. f. 2. Sow. t. 23.

178. *S. SANGUINEA* (Sibth. ox. 404.) sparsa molliis minima glaberrima, receptaculis ovatis lăvibus papillatis aurantiaco-sanguineis. — Ad ligna denudata, vire. — Bolt. t. 121. f. 1. Fl. fr. 2. p. 297. Sow. t. 254. Nees syst. f. 360. Grev. cr. fl. t. 175. f. 1. Hypoxylon phænicum Bull. champ. t. 487. f. 3.

f. media (Fries) aggregata, parasitica, receptaculis subglobosis flaccidis subpapillatis. — Ad Sphærias destractas, aut. — *S. erythroccocos* Ehr. beyt. p. 29.

179. *S. EPISPHERIA* (Tode meck. 2. f. 89.) gregaria molliis minima subaggregata sanguinea, receptaculis subcompressis flaccidis collabescientibus et suberispis, papilla convexo-oblonga. — In Sphæriâ stigmate et aliis parasitica, prope Parisios. — Fl. fr. 5. p. 142. Nees syst. f. 351. Grev. crypt. fl. t. 175. f. 2. — An à præcedenti satis distincta?

180. *S. LATERICOLLA* (DC. fl. fr. 2. p. 294.) gregaria sparsa fusco-atra lăvis, receptaculis minutis firmis glabris compressis denum collabescendo concavis, ostiolo atro laterali conico rigido subacuto. — Ad ligna denudata Quercus. — In sectione Pertusarum ut vult cl. Fries syst. myc. 2. p. 464 minime collocanda.

181. *S. SERIATA* (Pers. syn. 65; ic. pict. t. 16. f. 2.) in seriem elongatam conferta atra, receptaculis minutis molibus glabris rugulosis orbiculatim depressis papillatis. — Ad ligna Quercus putrida in sylvâ Compiegne ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 2. p. 454. — Receptacula nunc albo-facta nunc vacua.

182. *S. POMIFORMIS* (Pers. syn. 65; ic. pict. t. 3. f. 4. 5.) gregaria minuta atra glabra opaca, receptaculis pomiformibus lăvibus circa ostiolum papillæformi impressis denum lacerato-apertis. — Ad trunco exsiccatos putridosve. — Fl. fr. 5. p. 135. Mong. et Nestl. exs. p. 482. *S. corona* Sow. t. 393. f. 7. — Variat conferta et sparsa.

f. rugulosa (Pers.) molliuscula, receptaculis subrotundo-ovatis rugulosis ostiolo subpapillæformi obtuso.

183. *S. MAMMÆFORMIS* (Pers. syn. 64; ic. pict. t. 5. f. 6. 7.) gregaria major opaca atra glaberrima, receptaculis tenuibus globosis lăvibus passim confluentibus

circà ostiolum minutum papillæforme interdùm depresso. — Ad cortices et ligna semiputrida. — Fl. fr. 2. p. 295. Moug. et Nestl. exs. n. 380. S. byssiseda var. γ Fl. fr. I. c. S. papillosa Sow. t. 236. Hypoxylon globulare Bull. champ. t. 487. f. 2.

184. S. STERCORARIA (Sow. fung. t. 357.) nigra nitida glabra, receptaculis globosis crassis firmis lœvibus, ostiolo papillæformi. — In fimo et stercoribns. — Fries syst. myc. 2. p. 455. — Variat conferta et sparsa.

β. stercoris (Fries) receptaculis ovoideis, ostiolo latente. — In fimo cervino et ovino. — S. stercoris DC. fl. fr. 2. p. 294.

185. S. OBDUCENS (Fries syst. myc. 2. p. 456.) conferta minor atra opaca glabra rugulosa, receptaculis ovato-rotundatis inæqualibus rigidis subconfluentibus, ostiolo subpapillæformi. — Ad ramos Fraxini in Vogesis (cl. Mougeot). — Receptacula nec collabentia nec circà ostiolum depressa intus grisea.

186. S. BOMBARDA (Batsch. el. cont. I. f. 181.) fasciculata humida badio-fusca lœvis, sicca rugulosa opaca nigrescens, receptaculis ventricosis molibus, ostiolo papillæformi acuto nigro. — Ad truncos annosos discum præci-pue truncatum occupans, propè Parisios ex Chevall., in sylvâ Compiegne ex Graves. — Nees syst. f. 35. S. clavata DC. fl. fr. 2. p. 293? Hypoxylon clavatum Bull. champ. t. 444. f. 5? — Receptacula nunquam collabentia, gelatinâ pulveris instar albi expulsâ cava.

187. S. SPERMOIDES (Hoffm. cr. 2. t. 3. f. 3.) conferta atra opaca rugulosa, receptaculis rigidis globosis deorsum subteretibus, ostiolo papillæformi obso-leto. — Ad truncos putrescentes frequens. — Fl. fr. 2. p. 297. Moug. et Nestl. exs. n. 484. Grev. crypt. fl. t. 6. S. globularis Batsch. el. cont. I. f. 180. Hypoxylon miliaceum Bull. champ. I. t. 444. f. 3. — Crustaceo-cohærens, sicca non collapsa sed sæpè diffracta.

188. S. SORDARIA (Fries scler. suec. n. 270; syst. myc. 2. p. 458.) gregaria sæpè seriata subemergens atra, receptacalis minutis globosis opacis mollibus col-labentibus rugulosis cum ostiolo obsoleto confluentibus. — Ad lignum Po-puli in Vogesis (cl. Mougeot). — Receptacula fibrillis ligni canescens eincta. An vetè hujus tribūs? ex Fries.

189. S. MORIFORMIS (Tode meck. 2. t. 11. f. 90.) gregaria conferta atra rigida opaca, receptaculis obovatis corrugato-tuberculatis, ostiolo simplici. — Ad ligna et ramos exsiccatos. — Fl. fr. 5. p. 141. Moug. et Nestl. exs. n. 382. S. claviformis Sow. t. 337.

β. fasciculata (Fries) erumpens fasciculata.

γ. globosa (Fries) globosa corrugata. — Tode I. c. t. 91. S. rubiformis Sow. t. 373. f. 2.

190. S. PULVIS-PYRUS (Pers. syn. 86.) conferta atra, receptaculis minutis rigidis ovatis globosissime rugosis medio plerumque sinuatis. — Ad truncos sicclos frequens. — Fl. fr. 5. p. 141. Moug. et Nestl. exs. n. 381. Nees syst. f. 348. Grev. crypt. fl. t. 152. f. 2.

191. S. PULVERACEA (Pers. syn. 83.) conferta minor atra, receptaculis subovatis rugulosis rigidis nitidulis, ostiolo distincto pertuso. — Ad ligna exsiccata imprimis Faginea. — Fl. fr. 2. p. 297. Fries syst. myc. 2. p. 459. — Præ-denti minor, superficie inæquali sed non tuberculatâ ostioloque facile distincta.

192. S. MYRIOCARPA (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 267.) conferta atra ni-tida, receptaculis minimis globosis lœvibus astomis demum apice pertusis. — Ad annosos truncos Aceris Pseudoplatani in Vogesis (cl. Mougeot). — Fries syst. myc. 2. p. 459. Grev. crypt. fl. t. 152. f. 1. — Omnipotens superficialis interdùm sparsa.

20. PERTUSÆ (Fries syst. myc. 2. p. 460.). *Receptacula nuda firma glabra basi applanata adnata vel immersa, ostiolo æquale subpapillæformi demum deciduo pertusa. — Innato-superficiales solitariae lignatiles vel corticolæ.*

193. S. MOBILIS (Tode meck. 2. t. 9. f. 71.) gregaria libera minima mollis, recep-

- taculis globosis lœvibus fascis demùm nigrescentibus, papillâ deciduâ. — Ad ligna denudata et putrida Quercus, vere. — Fl. fr. 5. p. 141.
194. *S. TORNATA* (Fries el. fung. 2. p. 96. ex cl. Moug. in litt.) sparsa consertave atra nitida, receptaculis conico-pyramidalis acutis lœvibus circâ ostiolum tenue papillæforme subdepressis. — Ad ligna indurata in Vogesis (cl. Moug.), agro Lezurenzi (cl. Prost). — Basis applanata suborbicularis sensim usque ad apicem decrescens, $\frac{1}{2}$ lin. ferè alta.
195. *S. MYCOPHILA* (Fries obs. 1. p. 183; syst. myc. 2. p. 462.) sparsa atra fragilis nitidula, receptaculis hemisphæricis lœvibus subinæqualibus ostiolo papillato atro minuto instructa demùm deciduo pertusa. — In Polyporis putrescentibus propè Parisios ex cl. Chevall.
196. *S. UMBONATA* (Fries syst. myc. 2. p. 462.) sparsa atra opaca glaberrima, receptaculis orbiculatis depresso-lœvibus, ostiolo papillæformi. — Ad ligna Faginea in sylvâ Compiegne ex cl. Graves, aut. — Adinodum regularis, ultra lineam lata.
197. *S. GLANDIS* (Dub. mss.) sparsa ant hinc indè aggregata aterrima nitida, receptaculis applanato-convexis lœvibus, ostiolo minimo vix prominulo demùm pertuso. — Ad corticem Glandis Quercinæ (cl. Prost). — Receptacula orbiculata regularia applanata basi interdùm subdilatata.
198. *S. INSCULPTA* (Fries el. fung. 2. p. 95. ex cl. Mong. in litt.) sparsa nigra nitida, receptaculis ellipticis convexis semi-immersis lœvibus ostiolo maximo circulari demùm pertusis. — Ad ramos Ilicis in Vogesis (cl. Moug.). — Receptacula firma glaberrima in ligno profundi insculpta decidua et post lapsum foveolas profundiusculas relinquentia.
199. *S. MASTOIDEA* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 267; syst. myc. 2. p. 463.) sparsa nigra nitida glaberrima, receptaculis conicis semiimmersis lœvibus, ostiolo minuto nitido papillæformi dein pertuso. — Ad corticem Salicis in Vogesis ex cl. Mugeot. — Ad basin cortex passim albicat sed nullum adest subiculum tomentosum.
200. *S. PERTUSA* (Pers. syn. 13.) sparsa nigra, receptaculis emergentibus inæqualibus rigidis conicis subrugosis ostioli brevis conici acutinsculi lapsu pertusis. — Ad ligna indurata Vogesorum ex cl. Mugeot, propè Beauvais ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 2. p. 464.
201. *S. ASPEGRENII* (Fries in Kunze myc. heft. 2. p. 40; syst. myc. 2. p. 465.) subgregaria atra firma, receptaculis emersis hemisphæricis lœvibus nitidis ostiolo vix papillato demùm apice pertuso instructis tandemque umbilicato-depressis. — Ad ligna et cortices in Vogesis ex cl. Mugeot.
202. *S. NUCULA* (Fries scl. suec. exs. n. 230; syst. myc. 2. p. 466.) subgregaria nigra opaca, receptaculis minutis ovatis lœvibus, primò semiimmersis ostiolo minuto brevi subcylindrico vel compresso instructis, dein emersis ostiolo deciduo umbilicato-pertusis. — Ad corticem crassiorem Quercus in Vogesis ex cl. Mugeot, Populi in agro Lezurenzi (cl. Prost).
203. *S. VILIS* (Fries in vet. ac. handl. 1817. p. 268; syst. myc. 2. p. 466.) solitaria atra dispersa, receptaculis orbicularibus oblongisve convexo-planis obtusis minimis atris basi planâ, ostiolo papillato deciduo minimo. — In ligno molli putrido in Neustriâ (cl. Le Prévost). — Ferè microscopica punctiformis e ligno albicante emergens, dein ferè superficialis.

VI. *SUBIMMERSÆ* Fries syst. myc. 2. p. 322.

Receptacula immersa sèpè erumpentia, ostiolo insigni dilatato vel in collum attenuato.

21. *PLATYSTOMÆ* (Pers. syn. 54.). *Receptacula juniora tecta, adulta subnuda glabra firma; ostiolum latissimum compressum rimâ longitudinali dehiscens.* — *Cristatæ, emergentes, sparsæ, ligni-vel corticicolæ.*

204. *S. BARBARA* (Fries in Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 55; syst. myc. 2.

p. 468.) sparsa, receptaculis emersis rotundatis lœvibus glabris canescens-
cinereis demumque nigrantibus ostiolo subdeciduo rimâ transversali fissis.
— Ad ramos Salicis, Sorbi, Fraxini, etc. exsiccatos, verè. — Hysterium cine-
reum Pers. syn. 99. Fl. fr. 5. p. 168. Hyst. rotundum Bernh. in Röm. arch. 1.
t. 1. f. 5. — Rami quibus innascitur determinate exalbitantes, quare crastæ
tenuissimæ insidere videntur receptacula, magnitudine ferè semiq. Cannabis.
Habitus Hysterii.

205. *S. FILEATA* (Tode meck. 2. t. 9. f. 78.) sparsa, receptaculis emersis subglo-
bosis nigris, ostiolo obconico plano. — In ramulis aridis tum cortici tum li-
bro immersa, vere. — Pers. syn. 54. *S. macrostoma* a Fl. fr. 5. p. 142. —
Ostioli figura ovalis est superne dilatata et truncata, lateribus ad verticem
receptaculi contractis, unde cono trunco inverso quodammodo simile fit.

206. *S. CRISTATA* (Pers. syn. 54. var. a. t. 1. f. 15.) sparsa, receptaculis emersis
subglobosis nigris sursum leviter coaretatis mox verò in ostiolum compres-
sum latissimum compressum cristatum convexum dilatatis. — Ad ramos de-
mortuos Pruni spinosae. — Nees syst. f. 350. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 9.
S. crenata Fries syst. myc. 2. p. 469.

207. *S. MACROSTOMA* (Tode meck. 2. t. 9. f. 76, 77.) sparsa, receptaculis globosis
primo immersis fuscenscentibus dein semiemersis atris, ostiolo brevi elliptico
compresso dehiscente. — Ad ligna et cortices arborum. — Fl. fr. 5. p. 142.
excl. var. a. *S. dehiscens* et *S. libera* Pers. syn. 55. Nees syst. f. 350. b.

208. *S. COMPRESSA* (Pers. syn. 56. t. 2. f. 13.) sparsa, receptaculis immersis
compressis nigris, ostiolo linearí longissimo cristato. — Ad ligna corticesve
siccos. — Fl. fr. 5. p. 142. — Receptacula semilineam longa tota immersa,
ostiolo emergente.

209. *S. DIMINUENS* (Pers. syn. 57.) sparsa, receptaculis prominentibus rotunda-
tis subdepressis nigris, ostiolo angusto compresso diminuto interdum sub-
conico. — Ad ramos tenuiores Cratægi, Corai, Xylostei, Rubi, etc. in Vo-
gesis (cl. Mougeot), vere. — Fries syst. myc. 2. p. 471. — Receptacula in
ramis decorticatis nuda, in corticatis emergentia, ostiolo fracto truncata.

210. *C. CERATOSTOMÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 471.). *Receptacula*
primo tecta sæpè villo cincta, dein emersa nuda libera firma atra,
ostio elongato rostrato cylindrico ipsis plerumque longiore ter-
minata. — Immerso-erumpentes, sparsæ vel gregariæ, ligni-vel
corticolæ.

210. *S. LAGENARIA* (Pers. syn. 58.) gregaria mollis, receptaculis emergenti nudis
primo flavescenti-sulvis molibus mox badiis demum nigrescentibus globosis
rugulosis, ostiolis longissimis subulatis sursum attenuatis. — Ad Boletum
igniarium in sylvâ Compiegne ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 2. p. 472. —
Basis villo substrigoso plerumque obducta, sed adventus videtur; ostiola re-
ceptaculis multoties longiora.

211. *S. PILIFERA* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 116. non DC.) gregaria nuda
atra, receptaculis minimis globosis lœvibus, ostiolo capillari longissimo acu-
minato. — Ad ligna Pini, Abietis, etc. — *S. rostrata* Schum. Nees syst. f. 354.
— Admodum subtilis, subinde subicule villoso vel mactulæ fuligineo-nigres-
centi insidens.

β. Pinastri (Fries) emersa nuda, ostiolo breviori stricto.

γ. dryina (Fries) emergens solitaria, ostiolo breviore flexili. — Ad ligna
Quercina cortice denudata. — *S. dryina* Pers. syn. t. 2. f. 6. et 5. a. Fl.
fr. 5. p. 132.

212. *S. ROSTRATA* (Tode meck. 2. p. 14. var. a. t. 9. f. 79.) gregaria emergens
atra, receptaculis globosis corrugatis nunc immersis nunc nudis, ostiolo lon-
gissimo inæquabili subobtuso. — Ad ligna Quercus, Fagi, Betulae, etc.,
— Fl. fr. 5. p. 132. — Ostiola sub lente longitudinaliter striata flexuosa vel
deflexa.

213. *S. BARBIROSTRIS* (Dasour in Turp. icon. f. 1.) conglomerata atra, receptaci-

lis globosis scabris, ostiolo elongato clavato subincurvo pubescente. — Ad ligna Galliae ex Fries syst. myc. 2. p. 474.

214. *S. STRICTA* (Pers. syn. 59.) seriato-conglomerata glabra atra, receptaculis globosis lœvibus subnudis, ostiolo rostellato crassiusculo stricto obtusiusculo.

— Ad ligna Quercina, in Vogesis (cl. Mougeot). — Fries syst. myc. 2. p. 474.

S. trichina Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 666. ex Fries l. c. p. 452. — Receptacula mox emersa rigida fragilia quare saepius circumscissa cupulata reperiuntur; ostiola receptaculis vix duplo longiora.

215. *S. CUSPIDATA* (Fries scl. suec. exs. n. 117; syst. myc. 2. p. 474.) conferta glabra atra, receptaculis ovato-globosis rugulosis primò immersis mox nudis interdum confluentibus, ostiolo cylindrico stricto obtuso lœvinculo longitudo receptaculi. — Ad ligna Carpinea in sylvâ Hallatte propè Beauvais ex cl. Graves. — Receptacula pauca sparsa, plurima stipata.

216. *S. BREVIROSTRIS* (Fries syst. myc. 2. p. 474.) sparsa glabra aterrima, receptaculis junioribus immersis dein semiemmersis globosis lœvibus, ostiolo cylindrico recto æquali subobtuso receptaculis duplo breviore. — Ad ligna mollia cariosa in Vogesis ex cl. Mougeot.

217. *S. ROSTELLATA* (Fries obs. 1. t. 3. f. 3; syst. myc. 2. p. 476) gregaria atra, receptaculis tectis subrotundis albido-farcitis demum evanatis supra depressionis, ostiolis erumpentibus cylindrico-attenuatis nudis. — Ad ramos Rosae rubiginosæ propè Beauvais ex cl. Graves. — *S. Rubi* Mart. erlang. 487. *S. clavus* Schmidt. — Sub epidemide nidulantur receptacula ferè innata; ostiola receptaculis longiora stricta rigida. Valde affinis *S. acutæ* ex cel. Fries.

218. *S. MICROSCOPICA* (Fries in vet. acad. handl. 1817. p. 117; syst. myc. 2. p. 476.) sparsa atra, receptaculis nudis minimis ovatis lœvibus, ostiolo subulato stricto receptaculi ferè longitudine. — Ad cortices dejectos in Vogesis, ex cel. Mougeot, aut. — Nudo oculo hand conspicua.

219. *S. OBTECTÆ* (Fries syst. myc. 2. t. 477.). *Receptacula semper immersa latentia tecta, collo brevi erumpente, apice saepius dilatato.* — *Sparsæ vel gregariæ constanter immersæ in partibus vegetabilium perennibus.*

220. *S. EUTYPA* (Fries in vet. acad. handl. 1818. p. 181; syst. myc. 2. p. 478.) sparsa, receptaculis immersis globosis minutis nigris, ostiolis punctiformibus in macula nigra elongata determinata prominulis convexis demum umbilicatis. — Ad caules Hederæ in Vogesis (cl. Mougeot). — *S. decomponens* Sow. t. 217. *Lichen eutypus* Ach. prod. 14.

β. *aspera* (Fries) ostiolis prominulis elongatis subteretibus asperis. — *S. operculata* Pers. syn. 80. — Ad lignum emortuum in Vogesis (cl. Mougeot), circa Angers (cl. Guépin).

221. *S. CRYPTA* (Fries in vet. acad. handl. 1818. p. 102; syst. myc. 2. p. 479.) sparsa, receptaculis immersis subglobosis, ostiolo brevi æquali absque collo angustato demum macula atroquinata cincto. — Ad ramos Sambuci racemosæ (cl. Mougeot), hyeme, vere. — Ostiola ad ligni superficiem tantum attingunt et prominent; lignum neque determinata nigrescit neque exalbitat.

222. *S. ANSERINA* (Pers. ic. pict. 5. t. 1. f. 8.) subsparsa, receptaculis ovatis immersis cum ligno pustulam decoloratam effidente prominulis nigris, ostiolis erumpentibus papillato-teretibus atro-nitidis. — Ad ligna sicca denudata propè Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 480. Chevall. hist. des hypox. ic. ex fl. par. 1. p. 467.

223. *S. DECEDENS* (Fries in Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 49; syst. myc. 2. p. 481.) gregaria, receptaculis globosis immersis nigris in collum breve rectum attenuans, ostiolis epidermidie lacerata erumpentibus pertusis distantibus. — Ad ramos Coryli circa Parisios ex cl. Chevall. — *S. tessella* β Pers. syn. 48. Nees syst. f. 340. — Receptacula nunc solitaria nunc conferta, in cortice interiore immersa, nullà lineâ nigra circumscripta.

224. *S. CORTICIS* (Fries syst. myc. 2. p. 481.) sparsa, receptaculis globosis immersis persistentibus nigris, ostiolis prominulis minimis punctiformibus

applanatis. — In cortice Populi in Vogesis ex cl. Mougeot, propè Parisios ex Chevall. — S. populina Pers. ic. pict. t. 21. f. 5. non syn. — *Cortex cui in-nascitur omnino lœvigatus et immutatus ex ostioliis solis prominulis nigro-punctatus.*

224. *S. MILLEPUNCTATA* (Dub. mss.) *gregaria*, receptaculis nigris numerosissimis globosis leviter tectis intus albis demum evacuatis nigris, ostiolo minimo obtuso vix erumpente umbilicato. — Ad ramos Fraxini in Vogesis (cl. Mougeot). — *Cryptosphaeria millepunctata* Grev. scot. crypt. fl. t. 360. — Receptacula epidermide sublatâ dimidiata permanent; thecæ apice acutæ, sporidia linearia curvata. An satis a priore diversa?
225. *S. VITORA* (Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 106.) *sparsa*, receptaculis tectis liberis globosis mox collabentibus nigris, ostiolo convexo nitido nigro erumpente in disco minimo heterogeneo prominulo. — Ad ramos emortuos Alni in Galliâ boreali ex cl. Desmazieres. — Fries syst. myc. 2. p. 482. Desmaz. crypt. exs. n. 181. — Quandò epidermis tollitur ei adhaerentes observantur cupolæ minutæ ortæ e receptaculis arcte et regulariter collabentibus; discus erumpens sordide pallidus.
226. *S. MEDUSINA* (Fries el. fung. 2. p. 75. ex cl. Mougeot.) *gregaria*, receptaculis subiculo atro subtomentoso insidentibus globosis intus albescientibus primò tectis dein erumpentibus epidermidi innatis pilis longis rigidis strigosis stellatim divaricatis concoloribus hirsutis. — Ad corticem Platani in Vogesis (cl. Mougeot). — Receptacula primò calva ostiolo depresso demum crinibus onusta. A cl. Friesio inter Concrecentes collocata.
227. *S. TETRAGONA* (Dub. mss.) *gregaria*, receptaculis tectis globosis persistenter nigris glabris, ostiolo prominulo crasso globoso-conico 4-costato. — Ad corticem ramosum Fraxini circà Mimatem (cl. Prost), Cytisi scoparii circà Angers (cl. Guépin). — Receptacula in greges latas difformes aggregata, e longinquo maculas latas in cortice efficiuntia; ostiola interdum 3-5 costata.
228. *S. RHODOSTOMA* (Albert. et Schw. t. 4. f. 3.) receptaculis tectis globoso-depressis concentrica striatis sordide nigris crustæ concolori, innatis ore denudato roseo. — Ad ramos emortuos Rhamni Frangulæ propè Beauvais ex cl. Graves. — Nees syst. f. 338. — Crusta latè effusa ramos ambieus omnino spuria; receptacula collis parvis subconicis epidermidi innatis, quâ ablatâ apparent ore roseo-rubro pertusa.
229. *S. RUDIS* (Fries ined. ex cl. Mougeot. in litt.) receptaculis aggregatis sparsis globosis firmis atris intus albis epidermide tegente sublatâ dimidiatis, e subiculo dense tomentoso nigro persistente emergentibus, ostiolis papillatis minimis. — Ad ramos Cytisi Laburni in Vogesis (cl. Mougeot). — Subiculum latè effusum aduatum a tomento dense intertexto contextum; receptacula magna subvillota tecta epidermide demum dehiscente.
230. *S. CLANDESTINA* (Fries syst. 2. p. 484.) receptaculis globoso-depressis persistentibus nigricantibus dimidiatis intus albidis, superne epidermide adnatâ tectis, ostiolo tenuissimo obsoleto. — Sub epidermide ramorum siccorum Sorbi Aucupariæ propè Beauvais ex cl. Graves, Mali circa Angers (cl. Guépin). — Paradoxa et heteroclitæ species potius ad Cytisporas referenda. Sub epidermide lœvigata omnino latet neque prominent discus vel ostiolum; in paginâ inferiore vero epidermidis observantur bullæ convexæ hemisphericæ dimidiato-adnatæ corticali sæpè colore tinctæ vel materia incrustatae.
231. *S. TILIÆ* (Pers. syn. 84.) *sparsa*, receptaculis tectis subampullæformibus circumscisis glabris nigris, collo erumpente inæquali nigro, ostiolis disciformibus subrotundis inæqualibus vel in appendicem crassam plicato-rugosam exercentibus. — In ramis exsiccatis Tiliæ. — Nees syst. f. 339. Fl. fr. 2. p. 298. Mong. et Nestl. exs. n. 660. — Receptacula majuscula cortici interiori fibroso subimmersa.
232. *S. PRUINOSA* (Fries obs. 2. p. 328; syst. myc. 2. p. 486.) *gregaria*, receptaculis tectis depressis epidermidi adnatis griseo-pruinosis, ostiolis bullato-erumpentibus vix prominulis umbilicato-pertusis. — Ad corticem ramorum Fraxini in Vogesis (cl. Mougeot), Galliâ boreali ex cl. Desmaz. exs. n. 182.

233. *S. INQUINANS* (Tode neck. 2. t. 10. f. 85.) gregaria atro-inquinans, receptaculis immersis globosis lœvibus glabris superne ab epidermide tectis, papillâ erumpente nigra. — In cortice ramorum Aceris Pseudoplatani et campestris. — Fl. fr. 2. p. 298. Nees syst. f. 356. — Sow. t. 372. f. 3. *Variolaria ellipso-sperma* Bull. champ. t. 493. f. 3. — Receptacula cortici interiori immersa majuscula superne cum epidermide connata, quare illa avulsâ ad medium denudata.

E. xylostei (Pers.) receptaculis emergentibus, ostiolis in maculâ nigra pronostinulis demum pertusis. — Ad ramos emortuos Lonicerae Xylostei. — *S. Xylostei* Fries syst. myc. 2. p. 487.

234. *S. CLYPEATA* (Nees syst. t. 315. f. 355.) gregaria, receptaculis depressis epidermide nigrefactâ quinatâ tectis, ostiolo emerso conico-truncato. — Ad ramos exsiccatos Rubi propè Beauvais (el. Graves). — Fries syst. 2. p. 487. — Ostiola nullo limbo corticali cincta.

235. *S. PINASTRI* (DC. fl. fr. 5. p. 133.) minuta sparsa, receptaculis globosis depressis immersis in collum breve epidermidem disrumpens productis, ostiolo brevissimo non exerto. — Ad folia dejecta Pinorum. — *Cytispora Pinastri* Fries syst. myc. 2. p. 544. ? *Cryptosphaeria Taxi* Grev. crypt. fl. t. 13. excl. syn. Sow? — Receptacula ad alterutrum latus nervi medii disposita nigra; epidermis folii convexa centro paululum elevata et rufo; sporulae ex el. Grev. nudæ? minutissimæ.

236. *S. CYTISPORA* (Fries syst. myc. 2. p. 489.) atro-inquinans, receptaculis minutissimis ovato-globosis atris, collo brevi inclusa apice areolâ minimâ albicante cincto. — Ad paginam superiorem foliorum Vaccinii Vitis-ideæ in Vogesis (cel. Mougeot), hyeme. — *Cytispora Vaccinii* Fries scl. suec. exs. n. 29b. — Species oculo armato tantum observabilis; in parenchymate foliorum recentius emortuarum nigrescentium observatur ut puncta minima nigra.

237. *S. OLEÆ* (DC. fl. fr. 5. p. 136.) sparsa, receptaculis sub epidermide nidulantibus ovatis atris minutissimis, ostiolo brevissimo conico epidermidem poro protradente. — Ad paginam superiorem et interdum inferiorem foliorum emortuarum Oleæ Europeæ circa Monspelium (cel. DC.). — Fries syst. myc. 2. p. 489. — Species oculo armato tantum observanda.

VII. SUBINNATÆ Fries syst. myc. 2. p. 322.

Receptacula epidermidi matrix subinnata, velo nullo, gelatinâ diu farcta.

24. *OBTURATÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 490.). *Receptacula primò innata epidermide tecta dein erumpentia nuda ferè superficialia crassa, ostiolo nudo papillæformi vel rimose dehiscente. — Sub arborum epidermide nascentes.*

238. *S? TUBERCULARIA* (DC. fl. fr. 2. p. 295.) tuberculosa carnosa roseo-rubra demum fuliginea, tuberculis ovato-obtusis ruptâ epidermidē cinctis, ostiolo subdepresso. — Ad corticem Juglandis. — Habitus *Tuberculariae*, vix inter *Sphaerias* collocanda.

239. *S. MICULA* (Fries ined. ex cl. Moug. in litt.) sparsa glabra, receptaculis ovato-globosis erumpentibus fusco-nigris pruinosis lœvibus, ostiolo elongato conico firmo fragili nitido papillæformi fusco-lutescente receptaculis sublongiore. — Ad ramos Rhamni Alpini in agro Mimattensi (cl. Prost). — Receptacula demum omnino emergentia epidermide dilacerata persistente basi cincta, intus atra, nucleo demum evacuato.

240. *S. PROTUSA* (Fries syst. myc. 2. p. 491.) gregaria erumpens, receptaculis globosis lœvissimis nigris, ostiolo minuto papillæformi. — Ad ramulos exsiccatos in Galliâ boreali ex cl. Desmazières. — Cortici interiori superficiali innata, epidermidem excutiens; receptacula intus tapetio candido vestita.

241. *S. LONICERA* (Sow. t. 393. f. 6.) *gregaria erumpens, receptaculi globosis tenibus nigris subliberis mox laceratis cupuliformibus, ostiolo simplici punctiformi.* — Ad ramos Lonicerae in Vogesis (cl. Mongeot), in Gallia boreali ex cl. Graves et Desmazières. — Fries syst. myc. 2. p. 493. Desmaz. cr. exs. n. 233. — Rimas plerumque longitudinales occupat.
242. *S. FRAXINI* (Fries syst. myc. 2. p. 493.) *sparsa erumpens, receptaculis globosis laevibus astomis nigris demum collabentibus in discum irregularem subrugoso-tuberosum.* — In ramulis exsiccatis Fraxini in Gallia boreali ex cl. Graves et Desinazières, aut. — Innata, epidermide fissâ erumpens, intus primò farcta atra dein evanescens alba. — Desmaz. cr. exs. n. 234.
243. *S. PALINA* (Fries syst. myc. 2. p. 494.) *sparsa erumpens sublibera, receptaculis conicis rugosis nigricantibus intus pallidis poro pertusis truncatis.* — Ad ramos emortuos Padi in Vogesis (cl. Mongeot et Nestl.), vere. — Moug. et Nestl. exs. n. 878.
244. *S. CONIGENA* (Dab. mss.) *gregaria erumpens, receptaculis subdifformibus rotundatis primò molibus fuligineis dein firmis nigris laevibus nucleo albido farctis rimâ longitudinali subdehiscentibus.* — Ad conos dejectos Abietis. — *S. strobilina* Fries. *Hysterium conigenum* Pers. obs. myc. 1. p. 30. *Hypoderma conigenum* Fl. fr. 2. p. 305. — Plures sèpè in strias longitudinales confluent. Forma valde varia; plerumque lacerata et irregularis observatur.
245. *S. VERRUCARIA* (Fries syst. myc. 2. p. 496.) *gregaria superficiali-innata, receptaculis minutis hemisphaericis rigidis confertis rugulosis nigris astomis intus pallidis.* — Ad ramos Sambuci racemosæ in Vogesis (cl. Mongeot). — Receptacula inferiori cortici in ambitu albicanti innata.
25. **SUBTECTÆ** (Fries syst. myc. 2. p. 496.). *Receptacula primò innata teeta cum matrice concreta, demum prominula supra denudata absque ostiolo prominente.* — *Gregariæ minutæ atræ, erumpenti-innatae plerumque in parenchymato sub epidermide ramorum vel foliorum perennium, demum erumpentes.*
246. *S. PANACIS* (Fries scl. suec. exs. n. 319; syst. myc. 2. p. 497.) *gregaria, receptaculis immersis tectis globosis collabescendo concavis opacis nigris, nucleo nigro, disco erumpente rugoso.* — Ad sarmenta emortua Clematitis Vitalbae in Vogesis (cl. Mongeot). — In cortice interiori immersa, demum suberumpens, sed omnino distincta ad epidermide quam bullatum protrudit.
247. *S. SÆPINCOLA* (Fries obs. myc. 1. p. 181; syst. myc. 2. p. 498.) *gregaria, receptaculis tectis globosis opacis subrugosis intus albis ostiolo simplici exili pertusis.* — Ad ramos emortuos Rosæ aliorumque fruticum in Gallia boreali ex cl. Desmazières, Evonymi Europæi in Vogesis (cl. Mongeot). — *S. Corni* Sow. t. 370. f. 5. — Epidermidi fere innata.
248. *S. TAXI* (Sow. eng. fung. t. 394. f. 6.) *gregaria, epidermide cinerascente tecta, receptaculis subimmersis convexis nigricantibus demum epidermidem poro perforantibus.* — Ad ramulos et folia languescentia Taxi, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 500. Desmaz. cr. exs. n. 280. — An a *S. Pinastri* cum quâ confusa a cel. Greville satis distincta?
249. *S. ATROVIRENS* (Alb. et Schwein. p. 48. t. 2. f. 1. a Visc.) *sparsa e viridi-nigricans, receptaculis subimmersis molibus globosis ovatisque, disco erumpente ruguloso demum rimoso rupto.* — In ramulis, petiolis et pagina inferiori foliorum Buxi. — Schmidt in myc. heft. 2. t. 1. f. 2. S. Visc. DC. fl. fr. 5. p. 146. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 486. — Primordialis tota immersa dein murescens sensim assurgit paulo post cirrulos simplices tenues virentes propellit.
- β. Buxi* (Alb. et Schw.) in quindecim sparsa cinereo-nigricans, receptaculis globosis prominulis, disco tecto depresso albo demum erumpente nudo. — Ad ramulos et paginam inferiorem foliorum Buxi, Russio-

706 ACOTYL. SEU CELLULARES. SPHÄRIA.

rum, etc. — Præcedente minor vix virens demum epidermide stellatum fissâ, laciniis albicantibus erumpens.

250. *S. Ilicis* (Fries syst. myc. 2. p. 501.) gregaria nigra minuta, receptaculis globosis prominulis epidermide fuscescente tectis, dein erumpentibus nitidis rimose dehiscentibus. — Ad folia arida Ilicis Aquifolii. — *Xyloma Ilicis* Schl. X. aquifolii DC. fl. fr. 5. p. 169. mem. du mus. 3. t. 3. f. 7.

251. *S. ALIENA* (Fries syst. myc. 2. p. 502.) receptaculis emerso-innatis minimis globosis farctis nigris astomis in epidermidis maculâ elongata expalente confertis. — Ad ramos languescentes Evonymi, in Vogenesis (cl. Maugeot). — Sclerotio Alismatis adeo affinis ut eamdem facile dices, nisi locus natalis differret; receptacula nebulam in epidermide sistunt *S. nebulosæ* similem.

252. *S. MACULARIS* (Fries obs. myc. 1. t. 2. f. 4. syst. myc. 2. p. 502.) receptaculis sparsis globosis minutissimis astomis nigris deñum erumpentibus maculæ cinerascenti ab epidermide tenui tectæ insidentibus. — Ad folia dejecta Populi Tremulæ in Galliâ boreali ex cl. Desmazières. — Species singularis stromati proprio tenuissimo subrotundo fusco cum parenchymate folii conato ab epidermide tenni tegente cinerascenti insidens; receptacula omnium minima deñum a folio delabunt.

26. *CAULICOLÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 503.). *Receptacula subinnata primò tecta, deñum epidermide secedente nuda, a matrice discreta.* — In caulis herbarum emortuis nascentes.

253. *S. COMATA* (Tode meck. 2. t. 10. f. 81.) sparsa, receptaculis rotundatis obtusis fragillimis nigris astomis vertice pilis longissimis subfastigiatis deciduis comato. — Ad caules herbarum dejeclos, vere. — Fl. fr. 5. p. 140. — Receptacula sæpè diffracta dimidiata intus albida.

254. *S. RUBELLA* (Pers. syn. 63.) sparsa rariū conferta, receptaculis erumpentibus subdepressis nigrescentibus, maculâ rubellâ aut purpurascente cinctis, ostiolo elongato conico subrugoso. — Ad caules Belladonae, Solani, Epilobii, etc., vere. — Fl. fr. 5. p. 135. Nees syst. f. 353. *S. porphyrogonæ* Tode meck. 2. t. 9. f. 72. — Receptacula minuta, juniora mollia subpurpurascens mox nigra.

255. *S. HALONIA* (Fries syst. myc. 2. p. 506.) gregaria, receptaculis pusillis tectis globosis glabris pellucidis olivaceo-pallidis, ostiolo erumpente obtuso nigro, poro albo pertuso. — In caulis Equiseti limosi propæ Beauvais ex cl. Graves, vere.

256. *S. ACUTA* (Hoffm. veg. cr. 1. t. 5. f. 2.) subgregaria sub epidermide libera vel illâ secedente nuda, receptaculis subglobosis lœvibus atris nitidis, ostiolo rostellato stricto cylindrico obtuso. — Ad caules Urticæ, Epilobii, Solani frequens, vere. — Fl. fr. 5. t. 132. Sow. t. 119. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 181. *Cryptosphæria acuta* Grev. crypt. fl. t. 239. f. 1. — Receptacula deñum collabentia; ostiola crassiuscula receptaculis sæpius longiora facilè diffracta; sporidia linearia utrinque attenuata striis 4-5 notata.

257. *S. LINEAM* (Tode meck. 2. t. 16. f. 126.) gregaria, receptaculis junioribus diffornibus convexis lœvibus mox depresso-concavis rugosis atris, ostiolo rudi decumbente deñum deciduo. — Ad caules herbarum raro, vere. — Fl. fr. 5. p. 134. — Admodum polymorpha, mixta reperiuntur individua variae aetatis et formæ.

258. *S. PENICILLUS* (Schmidt in Fries syst. myc. 2. p. 508.) sparsa, receptaculis globosis tectis turgidis lœvibus glabris atris, ostiolo erumpente papillato cylindrico apice pilis minutissimis penicillato. — In caulis herbarum Gallicæ borealis ex cl. Desmazières.

259. *S. COMPLANATA* (Tode meck. 2. t. 11. f. 88.) sparsa, receptaculis minimis subglobosis lœvibus nigris mox collabescendo plano-depressis, ostiolo nitido papillæformi persistente. — Ad caules herbarum frequens, vere. — Fl. fr. 2.

- p. 299. excl. var. γ et δ . Desmaz. cr. exs. n. 37. S. herbarum var. α Pers. S. herbarum DC. fl. fr. 5. p. 134. S. Patella DC. syn. gall. p. 62. excl. syn.
260. S. CONFORMIS (Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 109; syst. myc. 2. p. 508.) sparsa, receptaculis conicis lăvibus nitidis atris, ostiolo crasso confluente obtuso pertuso. — Ad caules Urticæ, Umbelliferarum, etc. — Desmaz. cr. exs. n. 235. — Inter majores, plerumque tecta demum nuda.
261. S. DOLIOLUM (Pers. ic. et desc. 2. t. 10. f. 5-6.) sparsa vel gregaria tecta dein nuda, receptaculis conico-rotundatis obtusis nigris nitidis, plicis lateribus distinctis, ostiolo obtuso papilliformi pertuso. — Ad caules herbarum majorum, vulgaris. — Moug. et Nestl. exs. n. 571. Cryptosphaeria dolium Grev. crypt. fl. t. 239. f. 2. — Admodum quoad staturam et magnitudinem varians.
- β . vagans (Fries) ovata opaca, ostiolo simplici pertuso.
- γ . rimarum (Fries) subimmersa compressa, ostiolo inaequali saepius latente. — Secundum rimas caulinum erumpens.
262. S. Pisi (Sow. t. 393. f. 8.) sparsa, receptaculis elliptico-subrotundis depresso superne longitudinaliter plicatis opacis nigris, ostiolo latente subcompresso. — Ad caules exsiccatos Pisi sativi propè Beauvais ex cl. Graves, hyeme, vere.
263. S. CAULIUM (Fries syst. myc. 2. p. 509.) receptaculis immersis globoso-ellipticis nigris, ostiolo nudo elliptico vel lineari-labiato dehiscente. — Ad caules siccis Urticæ, etc., in Vogenesis ex cl. Maugeot, vere. — Lophium herbarum Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 114. — In ipso caule epidermide destituto immersa nec prominens sed passim macula nigrescente tecta; ostiola aequa lata ac receptacula.
264. S. CULMIFRAGA (Fries syst. myc. 2. p. 510.) sparsa, receptaculis tectis erumpentibus subcompressis atris, ostiolo nudo breve conico. — Ad culmos graminum in Vogenesis (cl. Maugeot), vere. — Valde mutabilis, sed semper erumpendo culmos rimosse frangens.
- β . linearis (Fries) erumpenti-nuda pusilla, receptaculis sublineari-compressis. — Ad culmos Tritici repentis, etc., vere.
265. S. SCIRPI (DC. fl. fr. 2. p. 300 et 5. p. 147. in adn.) sparsa minor atra, receptaculis immersis globosis collo brevissimo, ostiolis nudis punctiformibus subglobosis. — In culmis languescentibus aut siccis Scirpi lacustris, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 511. — Inter minimas.
266. S. HERBARUM (Fries in vet. acad. handl. 1818. p. 109; syst. myc. 2. p. 511.) subgregaria minor atra, receptaculis subtectis globoso-depressis lăvibus, ostiolo prominulo punctiformi interdum latente. — Ad caules herbarum. — S. herbarum var. tecta Pers. syn. 79. obs. 2. p. 69. — Junior tecta dein nuda subcollapsa, cæterum ex cl. Fries farrago specierum minimarum.
267. S. PATELLA (Pers. syn. 76.) sparsa, receptaculis primo hemisphaericis dein collapsis urceolato-patellatis rugulosis opacis atris, ostiolo minuto concolori deciduo astomis. — Ad caules herbarum siccis in Pyrenæis (ill. DC.), Vogenesis (cl. Maugeot et Nestl.), propè Beauvais (cl. Graves), vere. — Moug. et Nestl. exs. n. 485. Heterosphaeria Patella Grev. cr. fl. t. 103. Peziza Ligustici DC. fl. fr. 5. p. 21. Phacidium Patella β campestre Fries el. fung. 2. p. 133 ex cl. Moug. — Habitus omnino Pezizæ sed ostiolo globulari primo coronata quo mox collapso urceolato-patellata astoma remanet.
268. S. GALBANA (Fries syst. myc. 2. p. 512.) receptaculis globosis minimis liberatis astomis nigris intus concoloribus e macula albicante-testacea emergentibus. — Ad caules herbarum propè Beauvais ex cl. Graves. — Circum nodos caulin rarius observantur maculae indeterminatae albidolutescentes quasi mucidineæ, e quibus emergunt globula minuta sclerotioidea sed intus cava et atra.
269. S. OLEAUM (Fries el. fung. 2. p. 99. ex cl. Moug.) receptaculis globosis minutissimis nitidis liberatis astomis nigris inter fibras nascentibus. — Ad

708 ACOTYL. seu CELLULARES. SPHERIA.

caules exaridos Brassicæ oleraceæ observavit cl. Prost. — Receptacula minutissima nudo oculo non distinguenda sparsa aut adeò confertissima ut nudo oculo truncus colore nigro indatus appareat. Hanc cl. Fries inter obtectas in vicinio S. inquinantis reponit.

27. **FOLIICOLÆ** (Fries syst. myc. 2. p. 513.). *Receptacula innata tecta teuuia cum matrice concreta, vix unquam erumpentia, nullâ maculâ exarida cincta. — Sub epidermide foliorum nidulantes.*

270. **S? BARBATA** (Pers. syn. 60. ann. bot. st. 11. t. 2. f. a. b. c.) receptaculis tectis subglabris basi pilis radiantibus cinctis, ostiolis spinulosis apice in fibrillulas dissectis. — Ad folia decidua Quercus in sylvâ Compiègne ex cl. Graves. — Nees syst. f. 244. — Ulterius examinanda.

271. **S. PHAEOCOMES** (Rebent. neom. t. 1. f. 4.) sparsa aterrima, receptaculis globoso-hemisphæricis subastomis pilis erecto-divergentibus obsitis. — In foliis exsiccatis Graminum in Galliâ boreali ex cl. Desmazières, vere. — Fries syst. myc. 2. p. 515. — In utrâque folii paginâ prominet folium frindens; in situ alba est contextu Sclerotii sed in centro adest receptaculum minutum nigrum.

272. **S. TULAFORMIS** (Tode meck. 2. t. 16. f. 128.) receptaculis tectis subglobosis glabris nigricantibus, ostiolo rostellato stricto subæquali terreo-fulvo receptaculis triplo fere longiori. — In foliis dejectis Alni, Betulæ, Fagi, Coryli, hyeme, vere. — Fl. fr. 5. p. 129. Nees syst. f. 343. Schmidt myc. heft. 2. t. 1. f. 7. Mong. et Nestl. exs. n. 180. — Receptacula in maculâ expallente gregaria majuscula ob epidermidem tegentem fulvo-terrea.

273. **S. MELANOSTYLA** (DC. fl. fr. 5. p. 129.) receptaculis subrotundis minutis prominulis tectis è rufesceni-nigris, ostiolo nigro gracili subtorto acuto receptaculo 5-6-plò longiore. — Ad paginam inferiorem foliorum Tiliae, vere. — Ostiolum nunc rectum atque subacuminatum nunc inflexum.

274. **S. JUGLANDIS** (DC. fl. fr. 5. p. 130. non Fries.) receptaculis conico-prominulis rufescensibus, ostiolo gracili brevi stricto nigro. — Ad pag. infer. foliorum Juglandis in Jurasso (cl. Chaillet), Vogesis ex cl. Mongeot, vere. — S. leptostyla Fries.

275. **S. GNOMON** (Tode meck. 2. t. 16. f. 125.) receptaculis minutis nigris primò globosis tectis dein erumpentibus subcollapsis, ostiolo elongato elevato recto nigro. — Ad folia decidua Coryli, vere. — Fl. fr. 5. p. 130. non 2. p. 294. ann. bot. 11. t. 2. f. 6. Sow. t. 373. f. 6. Schmidt in myc. heft. 2. t. 1. f. 6.

276. **S. CAPREÆ** (DC. fl. fr. 5. p. 130.) receptaculis tectis supernè in maculâ orbiculari nigro-fuscâ circumscriptâ prominulis subconvexis obscure fuscis, ostioli filiformi gracili subcurvato nigro demùm deciduo. — Ad folia emortua Salicis Capreæ in Jurasso (cl. Chaillet) et in Vogesis ex cl. Mongeot, vere. — Receptacula à villo paginæ inferioris abscondita.

277. **S. ARIÆ** (DC. fl. fr. 5. p. 131.) receptaculis tectis depressis sublatentibus, ostiolo stricto æquali gracili nigro apice incrassato-capitato. — Ad folia languida aut emortua Cratægi Ariæ in Jurasso (cl. Chaillet) et Vogesis ex cl. Mongeot, vere.

278. **S. SETACEA** (Pers. syn. p. 62.) receptaculis tectis globosis minutis sparsis utrinque prominulis, ostiolo setaceo subobliquo attenuato nigro. — In foliis arborum et herbarum, hyeme, vere. — Fl. fr. 5. p. 131. S. ciliaris var. epiphylla Fl. fr. 2. p. 300.

279. **S. SOLANI** (Pers. syn. 62.) atrâ, receptaculis minimis tectis globosis lævibus, ostiolo erumpente tenerrimo flexili. — Sub cortice tuberam putrescentium Solani tuberosi. — Fries syst. myc. 2. p. 518. — Minutissima, nudo oculo vix observabilis, loco natali dignoscenda.

280. **S. AMOKNA** (Nees in act. nat. cur. 9. t. 6. f. 24.) receptaculis tectis subglobosis, ostioli duplò longioribus filiformibus compressiusculis discum eleva-

tum roseum perforantibus. — In petiolis foliorum emortuorum *Coryli avelanæ* in ditione Bellovacensi propè Clermont ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 2. p. 519. — Sparsa, tota atra.

281. *S. DUXLEX* (Sow. t. 375. f. 4.) sparsa, receptaculis immersis globosis latentibus nigris, ostioliis nudis depresso-dilatatis hemisphæricis. — Ad caules *Equiseti arvensis* propè Beauvais ex cl. Graves; in petiolis *Sparganii*, *Typhæ*, *Sagittariæ* nascentem vidit cl. Fries.

282. *S. SENTINA* (Fries syst. myc. 2. p. 520.) gregaria, receptaculis immersis latentibus globosis nigris albis, ostiolo erumpente subgloboso. — Ad folia decidua *Pruni* circà Mimatem (cl. Prost), Malii ex Fries. — Receptacula in folii parenchymate latentia non prominentia minima opaca plerumque farcta.

283. *S. ALNEA* (Fries obs. 1. p. 185; syst. myc. 2. p. 520.) sparsa, receptaculis tectis globoso-depressis collabescendo concavis atris, ostiolo erumpente obsoeto. — Ad folia *Alnea* propè Beauvais ex cl. Graves, vere. — Folia quibus innascitur plerumque alblicant; receptacula plerumque secundum nervos disposita vix prominula sed epidermide sublatâ libera cupulas minutus atras referentia.

284. *S. GROSSULARIÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 521.) sparsa, receptaculis tectis globosis utrinque prominentibus atris intus albis, ostiolo minato nigro. — In foliis exsiccatis *Ribis Alpini* circà Mimatem (cl. Prost). — Receptacula demùm collabentia intus primò albido-cellulosa puncto centrali nigro, dein evanescuta.

285. *S. ERYTHROSTOMA* (Pers. obs. 2. p. 70; syn. 81.) sparsa, receptaculis tectis subglobosis utrinque prominulis, ostioliis erumpentibus corneis subinduratis obtusis teretibus rubellis. — Ad folia exsiccata *Cerasi avium* e ramlis adhuc pendula in Jurasso (cl. Chaillet), vere. — Fl. fr. 5. p. 144.

286. *S. HEDERÆ* (Sow. t. 371. f. 5.) sparsa, receptaculis cum epidermide innata prominulis convexis lœvibus nigris, ostiolo pertuso albo. — Ad folia arida doriora subperennia *Hederæ*, *Rusei*, *Aquifolii*, *Fagi*, etc. — Fries obs. 1. t. 4. f. 6. *S. leucostigma* Fl. fr. 5. p. 144. *S. complanata* var. ♂ Fl. fr. 2. p. 299. non Tode.

287. *S. VINCÆ* (Fries in litt. ad cl. Mong.) sparsa, receptaculis innatis prominulis globosis lœvibus nitidis nigris collabescendo concavis ostioliis minimis albis tenuissimè pertusis. — Ad folia mortua *Vincæ majoris* in Vogesis (cl. Mong.), propè Vire (cl. Lenormand), Mimatem (cl. Prost). — Bifrons, ostiola demùm nigra.

288. *S. LEPTIDEA* (Fries obs. 2. p. 333.) gregaria, epidermidi tegenti innata, leviter convexa collabescendo umbilicato-depressa lœvis atra, ostiolo pertuso. — Ad folia emortua *Vaccinii* *Vitis-ideæ*, in Vogesis ex cl. Mougeot. — Fries syst. myc. 2. p. 522. — In inferiore paginâ foliorum conferta et sèpè confluens, intus albida; ostiolum punctiforme.

289. *S. EMPETRI* (Fries syst. myc. 2. p. 522.) gregaria sparsave epidermidi tegenti innata atra, junior lœvis hemisphærica dein collapsa rugosa, ostiolo obsoletè papillato. — Ad folia Empetri in Jurasso (cl. Chaillet), Vogesis (cl. Mong. et Nestl.). — Hypoderma sphærioides ♂ Empetri Fl. fr. 5. p. 165. Mong. et Nestl. exs. n. 481.

290. *S. AQUILINA* (Fries syst. myc. 2. p. 522.) gregaria, epidermidi tegenti innata subrotunda diffinisque rugulosa atra opaca, disco pertuso. — Ad frondes *Pteridis aquilinæ* in Vogesis ex cl. Mougeot, propè Falaise (cl. de Brébisson).

291. *S. ARTOCREAS* (Tode meck. 2. t. 9. f. 73.) gregaria innata orbicularis nigra nitida primò convexa lœvis mox circâ ostiolum papillato-punctiforme depresso, demùm collapsa rugoso-plicata. — Ad folia sicca aut exarida *Fagi*, *Quercus*, *Betulæ*, *Tiliæ*, *Pruni*, etc., vulgatissima, vere. — Fl. fr. 5. p. 143. Xyloma lenticulare DC. fl. fr. 5. p. 155. mem. mus. 3. t. 3. f. 14. — Junior convexa, mox verò collabitur plica annulari circâ ostiolum cineta, dein evanescuta depresso-plicata valde rugoso-plicata difficile pro Sphæriâ habenda.

710 ACOTYL. SÆC. CELLULARES.

SPERMATIA.

- S. faginea*, duplò triplò minor conferta sæpè confluens. — *Xyloma fagineum* Pers. syn. 107. Fl. fr. 5. p. 157.
292. *S. CARPINA* (Fries syst. myc. 2. p. 523.) *gregaria innata hypophylla difformis astoma opaca nigra superficie inæquali.* — Ad folia exarida Carpini, in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves, vere. — *S. punctiformi* vix major, sordem nigram referens nec umbilicata.
293. *S. MYRIADEA* (DC. fl. fr. 5. p. 145.) *epiphylla, receptaculis minutissimis innumeris inuato-prominulis astomis nigris subinæqualibus in maculas cinereas dendroideas aggregatis.* — Ad folia dejecta Quercùs, vere. — Maculas exhibet latas indeterminatas confluentes circà nervos folii expansas ortas ex epidermide cinerascente cum receptaculis ascendentे et subinde quasi stellatim rupta?, nudis oculis vix conspicua.
294. *S. RECUTITA* (Fries syst. myc. 2. p. 525.) *aggregata innato-prominula minutissima astoma nigra strias longissimas parallelas exhibens.* — In soliis Graminum. — Receptacula inter se libera et distincta subcompressa nudo oculo vix perceptibilia. Species nostra a Friesianâ differt receptaculis epiphyllis non hypophyllis, cæterum omniñ congruit.
295. *S. ERYNGII* (Fries ined. ex cl. Prost in litt.) *bifrons, receptaculis innato-prominulis minutissimis globosis confertis nigris intus albis astomis in maculâ crustæformi brunnæ conglomeratis.* — In foliis Eryngii campestris (cl. Prost). — Receptacula nudo oculo vix perceptibilia inter venulas foliorum maculas parvas nigras formantia.
296. *S. MACULÆFORMIS* (Pers. syn. 90; ann. bot. 2. t. 2. f. b. c. d.) *hypophylla, receptaculis innato-prominulis punctiformibus globosis nigris astomis in maculam nigram inæqualem conglomeratis.* — Ad folia exsiccata arborum et fruticum, frequens vere. — Fl. fr. 5. p. 143. Moug. et Nestl. exs. n. 661. *Xyloma punctulatum* DC. fl. fr. 5. p. 157. — Receptacula inter venas foliorum plus minus aggregata nunc confluentia nūc dispersa.
297. *S. PUNCTIFORMIS* (Pers. syn. 90.) *sparsa, receptaculis innatis punctiformibus lœvibus subnitidis nigris prominulis collabescendo umbilicatis, ostiolo obsoleto.* — Ad folia Quercùs, Fagi, etc., vulgatissima. — Fl. fr. 2. p. 299. Moug. et Nestl. exs. n. 662. *S. craterium* DC. fl. fr. 2. p. 298.
298. *S. MINIMA* (Dub. mss.) *sparsa, receptaculis innatis minutissimis lœvibus nitidis atris prominulis omnino astomis.* — Ad folia variarum plantarum, v. g. *Digitalis*, *Alchemillæ alpinæ*, etc. — Amphigena sed præsertim epiphylla intus albescens.
299. *S. PALUSTRIS* (Fries ined. in litt. ad cl. Moug.) *sparsa, receptaculis innatis epidermide tectis punctiformibus nigris nitidis convexis, centro prominulo?* — Ad paginam inferiorem foliorum emortuorum Calthæ palustris in Vogesis (cl. Mong.). — Receptacula minima interdum subiculo nigro maculæformi vix lin. lato insidentia.
300. *S. CRUCIFERARUM* (Fries syst. myc. 2. p. 525.) *sparsa, receptaculis innatis hemisphæricis turgidis lœvibus nigris nitidis ostiolo simplici pertusis.* — In foliis et silicalis Cruciferarum vivarum. — *S. punctiformi* paulò major subgregaria sicca evacuata non collabescens; ostiolum non omnino æquabile sed passim rimosum.
301. *S. SUBRADIANA* (Fries in vet. ac. handl. 1817, p. 248; syst. myc. 2. p. 525.) *gregaria, receptaculis innatis utrinque prominentibus hemisphæricis lœvibus astomis atris, basi fibrillis subradianibus, intus albo-faretis.* — Ad folia Allii Victorialis circa Mimatem (cl. Prost). — Receptacula amphigena sat distincta. Species Friesiana folia emortua Convallariæ maialis habitat an diversa?
302. *S. BRUNNEOLA* (Fries in Kunz. myc. heft. 2. p. 41; syst. myc. 2. p. 526.) *gregaria, receptaculis globosis minimis astomis nigris è maculâ oblongo-lineari brunneo-nigricante emergentibus.* — Ad folia emortua Convallariæ maialis in provinciis borealibus ex cl. Graves et Desmazières. — In utrâque

folii paginae observantur maculae; receptacula in folii substantia nidulantia epidermide sublatâ conspicienda.

303. S. OSTRUTHII (Fries obs. 1. p. 174; syst. myc. 2. p. 526.) hypophylla aggregata, receptaculis globosis minimis astomis atris e maculae crustaeformi determinata grisea emergentibus. — Ad folia Angelicae montanae in agro Mimatensi (cl. Prost.). — Maculae angulatae 1-2 lin. longae passim confluentes.
304. S. ÆGOPODII (Pers. obs. 1. p. 17.) sparsa subaggregata, receptaculis innatis prominulis astomis nigris maculae albæ crustaeformi insidentibus. — Ad folia languescentia Ægopodii Podagrariae. — Fl. fr. 5. p. 144.

Sect. II. DEPAZEA Fries obs. 2. p. 264. Ad. Brongn. class. des champ. 94. — Phyllosticta Pers. champ. comest. p. 55. — Sphaeria lichenoides DC. fl. fr. 5. p. 147.

Simplex; receptacula epidermide tecta poro seu operculo dehiscentia, maculas decoloratas in foliis procreantia.

305. S. BUXICOLA (Fries syst. myc. 2. p. 528.) maculis candidis nigro cinctis, receptaculis hypophyllis sparsis leviter convexis atris. — Ad folia Buxi. — S. lichenoides γ buxicola Fl. fr. 5. p. 149. Phyllosticta limbalis Pers. champ. com. p. 148. — Maculae ovales vel oblongae 2-3 lin. latæ semper marginales.

306. S. ILCICOLA (Fries ined. in litt. ad cl. Mong.) maculis rufescensibus centro demum albidis ambitu violaceo cinctis, receptaculis sparsis hemisphaericis nigris epidermidem perforantibus intus albis. — Ad folia adhuc viva Ilicis Aquisolii in Vogesis (cl. Mongeot). — Epiphylla, maculae interdum confluentes subtus atro-virides 2-3 lin. latæ.

307. S. HEDERÆCOLA (Fries l. c.) maculis albidis ambitu late fuscō, receptaculis epiphyllis gregariis sparsisve convexis globosisve nudis opacis nigrescentibus. — Ad folia Hederæ. — S. Lichenoides ε hederæcola Fl. fr. 5. p. 148. Phyllosticta hyalina Pers. — Maculae latæ rotundatae vel irregulares confluentes.

308. S. FAGICOLA (Fries l. c.) maculis minutis subrotundis atris e receptaculis confertissimis globosis nitidis planè obliteratis. — Ad folia subarida Fagi. — S. lich. δ fagicola Fl. fr. 5. p. 147. — Maculae sparsæ lin. latæ, passim ambitu fuscō.

309. S. TREMULÆCOLA (Fries l. c.) maculis orbiculatis fuscis, receptaculis epiphyllis sphæricis nitidis in centro griseo stipatis. — Ad folia languida Populi Tremulæ. — S. lich. ζ Tremulæcola Fl. fr. l. c. Xyloma concentricum Pers. — Maculae minutæ 1-2 lin. latæ.

310. S. FRONDICOLA (Fries l. c.) maculis albo-cinerascentibus fuscō cinctis, receptaculis plerumque hypophyllis sparsis depressis mox circumscisis. — Ad folia viva Populi Tremulæ, nigræ, Italicae. — S. lichen. γ Populicola Fl. fr. l. c. Depazea frondicola Fries obs. 2. t. 5. f. 6-7. Desmaz. cr. exs. n. 184. Phyllosticta populina Pers. l. c. — Maculae oblongae 1-6 lin. et ultra; receptacula numerosa mox circumscissa, disco cupulari albido, punctulo centrali nigro.

311. S. JUGLANDINA (Fries syst. myc. 2. p. 621.) maculis indeterminatis griseo-rufescensibus, receptaculis nigris minutis nitentibus planis subrugulosis annulatim dispositis. — Ad paginam inferiorem foliorum Juglandis. — Xyloma Juglandis DC. fl. fr. 5. p. 158. — Maculae subrotundatae 2-3 lin. latæ.

312. S. ACERICOLA (Dub. mss.) maculis latis indeterminatis rubro-fuscis, receptaculis epiphyllis orbicularibus depressis concavisve nigricantibus in centro albido griseove sparsis. — In foliis Aceris pseudoplatani (cl. Prost.). — Maculae irregulares confluentes, receptacula pauca parva.

313. S. CASTANEÆCOLA (Fries l. c.) maculis indeterminatis pallidè lutescentibus, receptaculis epiphyllis sparsis punctiformibus atris. — Ad folia emortua Castaneæ. — S. lich. η Castaneæcola Fl. fr. l. c. — Maculae magnitudine variae difformes confluentes subinde linea flexuosa nigra circumscripæ; receptacula rara.

712 ACOTYL. SEU CELLULARES. SPERMAT.

314. S. CORNICOLA (Fries l. c.) maculis orbiculatis griseis lineâ obscuriore aut fusco-purpureâ cinctis, receptaculis plerumque epiphyllis sparsis orbiculatis centro depresso. — Ad folia Corni sanguineæ. — S. lich. ♂ cornicola fl. fr. l. c. — Vix 1-2 lin. latæ.

315. S. ESCULICOLA (Fries l. c.) maculis orbiculatis lacteis fusco cinctis, receptaculo epiphylo solitario depresso-excavato albo. — Ad folia Esculi Hippocastani in Gallia boreali ex cl. Desmazières. — Maculæ 1-2 lin. latæ.

316. S. XYLOSTECOLA (Dub. mss.) maculis fuscescentibus suborbiculatis interdum confluentibus lineolâ intensiore circumscriptis, receptaculis epiphyllis in centro pallidiore aggregatis paucis nitidis nigris convexis demum circumscisis. — In Lonicera Xylosteo (cl. Prost.). — Maculæ vix 1-2 lin. latæ.

317. S. RHAMNICOLA (Dub. mss.) maculis ovatis orbicularibus albido-fuscescentibus fuso cinctis, receptaculis epiphyllis minutissimis paucis subcentralibus concaviusculis nigris centro pellucidis. — In foliis Rhamni cathartici (cl. Prost.). — Maculæ 1-2 lin. latæ; receptacula interdum utrinque prominula.

♂. *Rhamni-alpini*, maculis latè confluentibus fuscescentibus, receptaculis hypophyllis hiuc indè aggregatis. — In foliis Rhamni-alpini circa Mimatem (cl. Prost.). Maculæ 1-2 lin. latæ confluentes interdum semiunciales.

318. S. RIBICOLA (Fries syst. myc. 2. p. 530?) maculis latiusculis pallide brunnneis, receptaculis pluribus minimis nigris centro pellucidis concavis. — In foliis Ribis petrae circa Mimatem (cl. Prost.). — Receptacula in centro maculæ gregaria. Differt a specie Friesii colore macularum et absentia pilorum quos in meo specimine non vidi.

319. S. RUBI (Dub. mss.) maculis parvis albis epiphyllis, receptaculis paucis sparsis minimis convexis nigris subprominulis. — Ad folia Rubi fruticosi. — Maculæ lacteæ albæ aut subsqualidæ vix lineam latæ.

320. S. DIANTHI (Alb. et Schw. t. 6. f. 2.) maculis indeterminatis luteis albescentibusve, receptaculis sparsis globoso-depressis nigris, disco collapso pallido. — Ad folia Dianthi, Saponariæ, Silenes, etc. — S. Saponariæ fl. fr. 5. p. 146. Næmaspora epiphylla DC. syn. gall. p. 83. — Maculæ $\frac{1}{2}$ -1 unc. circiter latæ haud limitatæ; receptacula albido-farcta gelatinâ subcirrhosâ.

321. S. CRISPANS (Pers. in litt. ad cl. Mong.) maculis primò fulvo-luteis demum albis et receptaculis nigris confertissimis subrotundis lævibus nigrescentibus. — In foliis Convallariæ bifoliæ in Vogesis (cl. Mong.). — Depazea crispans Fries el. fung. 2. p. 110. Maculæ paulisper expansæ demum folium totum occupantes et crispantes.

322. S. CONVALLARICOLA (DC. fl. fr. l. c. sub. S. lich.) maculis albido-rufescentibus in ambitu atro-sanguineis, receptaculis sparsis subrotundis lævibus nigris. — Ad folia Convallariæ polygonati et multifloræ. — Maculæ 4-5 lin. latæ subrotundæ vel ovales passim confluentes.

323. S. BRASSICÆCOLA (Fries ined. in litt. ad cl. Mong.) maculis viridibus centro subrufescentibus, receptaculis aggregatis numerosis subrotundis nigrescentibus lævibus. — Ad folia Brassicæ (cl. Mong.). — Maculæ 2-3 lin. latæ confluentes, receptacula hypophylla minima nigra sed epidermide tegente cinerascentia.

324. S. GENTIANÆCOLA (Fries l. c.) maculis rufescensibus subzonatis vix circumscriptis, receptaculis centralibus confertis convexis nigris. — In foliis Gentianæ luteæ. — S. lich. ♂ Gentianæcola fl. fr. l. c. — Maculæ orbiculares unciales.

♂. *Convolvulicola* (fl. fr. l. c.) maculis minoribus, receptaculis rariss. — Ad folia Convolvuli sepium.

325. S. HEPATICÆCOLA (Dub. mss.) maculis fusco-nigricantibus latis demum confluentibus et folium totum occupantibus, receptaculis minutis sparsis epi-

phyllis convexis nigris maculam totam occupantibus. — In foliis Hepaticæ trilobæ (cl. Prost.). — Receptacula in foliis omnino maculis occupatis hinc inde aggregata.

326. S. CALTHÆCOLA (Fries l. c.) maculis albis vix circumscriptis, receptaculis minutis sparsis planis nigris. — Ad folia Calthæ. — S. lich. et Calthæcola fl. fr. l. c. — Maculae 1 lin. latæ rotundatæ ovales vel confluentes sèpè steriles.

327. S. VAGANS (Fries l. c.) maculis albidis ambitu fusco cinctis, receptaculis minimis sparsis nigris. — Ad variarum herbarum folia. — S. lich. *, †, λ, μ, π, σ, ε. Fl. fr. l. c. Depazea brassicæcola Desmaz. exs. n. 185.

II. DOTHIDEA Fries obs. 2. p. 347. syst. myc. 2. p. 548. Ad. Brongn. class. des champ. p. 94. — Sphæriæ et Xylomatis sp., Polystigma et Asteroma DC.

Cellulæ plures vel solitariæ in stromate immersæ subrotundæ absque receptaculo proprio, demùm ore simplici apertæ, farctæ nucleo cereo ex thecis erectis fixis subelevatis paraphysibus immixtis composito. — Tubercula carnosæ nigrescentia rariùs colorata in ligno emortuo ramis aut etiam in foliis vivis occurrentia.

I. Erumpenti-innatae liberatae superne nudæ. — Sub epidermide ramorum et foliorum perennium nascentes.

1. D. RUBIS (Fries ined. in litt. ad cl. Moug.) erumpens elliptica convexa extùs tuberculo-so-rugosa nigra intùs concolor, cellulis immersis albescens de-mùm evanescens nigris. — Ad ramos exsiccatos Cytisi Laburni in Vogenesis (cl. Moug.) circa Angers (cl. Guépin). — Cellulæ numerosæ densè aggre-gatæ stromate nigro tectæ.

2. D. RIBESIA (Fries syst. myc. 2. p. 550.) erumpens mollis elliptica depresso nigra intùs concolor, receptaculis minimis periphericis albicantibus. — Ad ramos emortuos Ribis rubri, hyeme. — Chevall. fl. par. 1. t. 8. f. 5. Sphæria ribesia Pers. syn. 14. Fl. fr. 5. p. 117. Reb. neom. 1. t. f. 5. Nees syst. f. 312. Moug. et Nestl. exs. n. 275. — Transversim erumpens prominens, disco ca-naliculato, nonc lœvigata nunc ex ostiolis prominulis sub lente granulosa.

3. D. SAMBUCI (Fries l. c.) erumpens orbicularis planiuscula lœviuscula atra intùs carnosæ mollis cinerascens, cellulis minimis periphericis albis. — Ad ramos siccos Sambuci nigræ, vere. — Sphæria Sambuci Pers. Fl. fr. 5. p. 117. Nees syst. f. 311. S. natans Tode meck. 2. p. 27. f. 98. — Præcedente minor, vix ultrà lineam lata opaca primò lœvis dein ex ostiolis prominulis gra-nulosa.

4. D. RUCCINOIDES (Fries l. c.) erumpens difformis subconvexa atra intùs fir-mula cinerascens, cellulis numerosissimis subimmersis albidis. — In ramis et foliis Buxi. — Sph. puccinoides DC. fl. fr. 5. p. 118. Moug. et Nestl. vog. n. 566. — In foliis tubercula prominent orbiculata convexa 1 lin. lata; in ra-mulis longitudinaliter erumpunt elliptica planiuscula; cellulæ albidæ ostiolis subtilissimis superficiem perforantibus.

5. D. LATITANS (Fries syst. myc. 2. p. 552.) in parenchymate in stroma fusco-atrum mutato immersa, epidermide lacerata tecta, cellulis immersis numero-sis subconfertis stipatissimis albis. — Ad folia secca nigrefacta Vaccinii Vi-tis-Ideæ in Galliæ boreali ex cl. Desmazières, in Vogenesis (cl. Mougeot), hyeme. — In parenchymate folii latet, ægre observanda nisi folium propè superficiem superiorem dissecatur.

6. D. GENISTALIS (Fries syst. myc. 2. p. 552.) tecta dein epidermide lacerata erumpens tuberculosa difformis atra intùs alba, cellulis minotis periphericis albis. — In foliis vivis et exsiccatis Genistæ sagittalis. — Sphæria genistalis Pers. in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 488. — Tubercula minuta subconfuentia; stroma compactum albidum.

7. D. SPHEROIDES (Fries obs. 2. p. 348; syst. myc. 2. p. 552.) gregaria subfasci-

714 ACOTYL. SEU CELLULARES. DOTHIDEA.

culata erumpens difformi-angulata planiuscula nigra intus albida. — Ad corticem Populi in Gallia boreali ex cl. Desmazières, circa Angers (cl. Guépin). — Sclerotium sphærioides Pers. syn. 125. — Subinde obsoletè rumpens; forma valde incostans nunc simplex Sclerotioidea, nunc confluens, cellulæ pluribus obsoletis.

8. *D. DISPAR* (Fries ined. ex cl. Guép. in litt.) longitudinaliter erumpens difformis confluens rugulosa nigra intus subconcolor, cellulæ majusculis pallidis. — In cortice Taxi circa Angers (cl. Guép.). — Sphæria? dispar Fries syst. myc. 2. p. 366. — Vix lin. lata seriatim disposita; discens planus interdum concavus.
9. *D. JUGLANDIS* (Fries ined. ex cl. Guépin in litt.) sparsa erumpens subovata convexa nigra intus concolor disco erumpente planiusculo epidermide cincto. — Ad corticem Juglandis circa Angers (cl. Guépin). — Cellulæ paucæ parvæ subdilatiores.
10. *D. PYRENOPHORA* (Fries in vet. ac. hand. 1816. p. 88; syst. myc. 2. p. 552.) erumpens elliptica plano-depressa lœvis atra intus alba cellulæ solitariæ atra. — Ad ramos exsiccatos Sorbi Aucupariae in Gallia boreali ex cl. Desmaz.

II. Innatæ, stromate ab epidermide adnatæ tecto. — In partibus vegetabilium annuis nascentes.

1. *Polystigma* (Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 271. DC. fl. fr. 5. p. 164; mem. mus. 3. p. 337.). *Multiloculares*, cellulæ immersis demùm evacuatis, ostiolis vix conspicuïs, ambitu uniformi.
11. *D. RUBRA* (Fries syst. myc. 2. p. 553.) hypophylla orbicularis rubra demùm rufo-fusca, cellulæ immersis rubentibus minimis numerosis, ostiolis subimmersis obscurioribus demùm prominulis. — Ad folia Pruni spinosæ et P. domesticæ. — *Xyloma rubrum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 599. *Polystigma rubrum* Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 270. DC. fl. fr. 5. p. 164; mem. mus. p. 337. t. 4. f. 7. Grev. crypt. fl. t. 120. — Junior plana maculæformis dein subconvexa 2 lin. et ultrà lata, ambitu æquabili.
12. *D. FULVA* (Fries l. c.) hypophylla subangulata ochracea demùm fulva, cellulæ immersis concoloribus numerosis minimis, ostiolis immersis. — In foliis Pruni et Cerasi. — *Sphæria ochracea* Wahlemb. *Polystigma fulvum* Pers. in Moug. et Nestl. exs. n. 271. DC. fl. fr. 5. p. 164; mem. mus. l. c. t. 4. f. 8. *Pol. aurantiacum* Pers. myc. eur. t. 5. f. 1. — Maculæ latiores intus albæ, ostiolis in paginâ inferiore tantum conspicuïs.
13. *D. BETULINA* (Fries l. c.) epiphylla angulato-difformis subconfluens tuberculosa atro-nitens rugulosa intus nigra, cellulæ albæ, ostiolis minimis punctiformibus demùm umbilicatis. — Ad folia Betulina. — Grev. crypt. fl. t. 200. f. 1. *Xyloma betulinum* Moug. et Nestl. vog. n. 270. DC. fl. fr. 5. p. 154; mem. mus. 3. t. 3. f. 1. — Tubercula minuta prominula epidermidè omnino nnata.
14. *D. ULMI* (Fries syst. myc. 2. p. 555.) epiphylla subrotunda confluens demùm convexa cinereo-nigra intus nigra, cellulæ albæ, ostiolis granulæformibus. — Ad folia Ulmi. — Grev. crypt. fl. t. 200. f. 2. *Sphæria Ulmaria* Sow. t. 374. f. 3. *S. Ulmi* Nees syst. f. 21. *B. S. xylomoides* DC. fl. fr. 2. p. 288. — Epidermide non innatæ tecta.
15. *D. PTERIDIS* (Fries syst. myc. 2. p. 555.) hypophylla nervisequa elongata cinereo-nigra opaca subinde confluens intus aterrima, ostiolis minutis prominulis punctata, cellulæ atris. — Ad folia Pteridis aquilinæ. — *Sphæria Pteridis* Reb. neom. t. 1. f. 3. *Xyloma Pteridis* DC. fl. fr. 5. p. 154. — *Gregaria*, formâ varia ovalis vel elongata; stroma ex cellulæ concoloribus intus apparet uniforme aterritum demùm pulverulentum ruptum.
16. *D. HERACLEI* (Fries syst. myc. 2. p. 556.) amphigena confluens angulata rugoso-tuberculosa opaca atra intus nigricans, cellulæ albæ numerosis minimis globosis conformatissimis. — Ad folia Heraclei *Sphondylii*, in Gallia bo-

reali propè Lille ex cl. Desmazières, circa Argentoratum (cel. Mong.), Mimatem (cl. Prost.). — Desmaz. crypt. exs. n. 285. — Vix lineam lata convexa vel plana cellulis in stromate nigricante immersis.

2. *Stigmea* (Fries syst. myc. 2. p. 556.). *Compositæ, tuberculis aggregatis prominulis, ambitu simplici uniformi.*

17. D. *LONICERÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 557.) amphigena, in cespitulum orbiculari coacervata rotundata nitida apice plano-depressa atra intus conceolor. — In foliis Loniceræ cæruleæ et *Xylostei*. — *Xyloma Loniceræ* Fries obs. 1. t. 4. f. 7. *Lasiobotrys Loniceræ* Kunze myc. heft. 2. p. 88. *Grev. crypt. fl. t. 191.* Mong. et Nestl. exs. n. 860. — *Tubercula rarius solitaria* plerumque in cespitulum convexum subregulari 1 $\frac{1}{2}$ lin. latum stipata semilibera intus nigro-farcta undè cellulæ obsoletæ.

β. Xylostei, in aunculum disposita. — X. *Xylostei* DC. fl. fr. 2. p. 599; mem. mus. 3. t. 3. f. 2.

3. *Asteroma* (DC. fl. fr. 5. p. 162; mem. mus. 3. p. 336.). *Cellulæ minimæ prominulæ confertæ subconfluentes, ambitu maculæformi vel fibrillis innatis subradiato.* — *Juniores sistunt maculam sterilem sœpè fibrilloso-centrifugam.*

18. D. *EPILOBII* (Fries syst. myc. 2. p. 558.) maculis ambientibus lævigatis uniformibus passim confluentibus piceis, cellulis minutis sparsis prominulis demùm apice depressis. — In caule Epilobii angustifolii in Jurasso ex cl. Chaillet. — Maculæ subrotundo-diformes, determinatæ 1-4 lineas longæ, in quâ prominent cellulæ læves albo-farctæ.

19. D. *ULMARIÆ* (Fries ined. in litt. ad cl. Mong.) maculâ lævigatâ nitidâ brunneâ è fibrillis longitudinalibus approximatis confluentibusque composita, cellulis sparsis nigris subconico-prominulis centro umbilicatis. — Ad caules Spireæ Ulmariae in Vogesis (cl. Mong.). — *Tubercula convexa* sæpius maculæ insidentia sed interdum maculâ destituta.

20. D. *VERNICOSA* (Fries syst. myc. 2. p. 559.) maculâ lævigatâ nitidâ nigrâ, ad margines fibrillis tenuissimis radiatâ, cellulis centralibus minimis subconicis sparsis. — Ad caules aridos Spireæ Arunci, Umbelliferarum, etc. — *Sphæria vernicosa* DC. fl. fr. 5. p. 138. — Maculæ epidermidi innatæ 5-20 lin. longæ, fibrillæ marginales tantum sub lentibus optimis distinguendæ.

21. D. *HIMANTIA* (Fries syst. myc. 2. p. 559.) maculis nigris ambientibus primò fuscescentibus dein aterrimitis è fibrillis tenuissimis radiantibus ramosissimis formati, cellulis prominulis seriatis centro confertis. — Ad caules aridos Umbelliferarum majorum. — *Sphæria Himantia* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 138. — Maculæ indeterminatæ longæ latæque in medio subcontiguæ.

22. D. *RETICULATA* (Fries syst. myc. 2. p. 560.) epiphylla atra, maculâ nullâ, fibrillis tenuissimis liberis longitudinaliter serpentibus subramosis jungentibus cellulas minimas subseriatas primò convexas nigras dein in discum planum album orbiculari margini annulari nigro cinctum expansas. — Ad folia exsiccata Convallariae Polygonati, autumno. — Chevall. fl. par. t. 11. f. 28. valde aucta. *Sphæria reticulata* DC. fl. fr. 5. p. 138. — Etiam in caules desceduit ex cl. Fries.

23. D. *GEOGRAPHICA* (Fries l. c.) epiphylla atra, maculâ nullâ, cellulis planis minimis orbiculatis centro prominulis fibrillis nigris flexuosis insidentibus. — Ad folia exsiccata Cratægi Ariæ, in Jurasso (cl. Chaillet), vere. — *Sphæria geographicæ* DC. fl. fr. 5. p. 159. — Lineolæ mappam geographicam referunt.

24. D. *STELLARIS* (Fries syst. myc. 2. p. 560.) amphigena tenuissima maculæformis picea, fibrillis radiantibus apice liberis pallidis demùm confluentibus, cellulis minimis centralibus. — Ad folia Phyteumæ et Campanulæ. — Mong. et Nestl. vog. n. 863. *Xyloma stellare* Pers. *Asteroma Phyteumæ* DC. fl. fr. 5. p. 162; mem. mus. 3. t. 4. f. 1.

25. D. *CERAMOIDES* (Dub. mss.) epiphylla tenuissima maculæformis aterrima,

716 ACOTYL. SEU CELLULARES. DOTHIDEA.

fibrillis radiantibus distinctis gracillimis nigris demum confluentibus et cellulis minimis confertis oculo nudo non distinguendis obtectis. — In foliis Alchemillæ vulgaris circa Mimatem detectis cl. Prost. — Maculæ subjacentes sæpè confluentes primò purpurascentes demum fibrillis omnino obtectis et intertextis atræ; fibrillæ elegantissimæ sub lente moniliformes in morem Ceramiorum minimorum dispositæ.

26. D. ASTEROMA (Fries syst. myc. 2. p. 560.) epiphylla subrotunda maculæ-formis nigra, fibrillis obsoletis in margine tantum subdistinctis, cellulis minimis confertis obtecta. — Ad folia Convallariæ, Dentariæ pinnatæ, Violæ bifoliæ, etc. — Asteroma Polygonati, A. Dentariæ, A. Violæ DC. fl. fr. 5. p. 163; mem. mus. t. 4. f. 2-3 et 5. a. — Maculæ subrotundæ vel ovatæ determinatæ 2-4 lin. longæ.
27. D. FRAXINI (Fries l. c.) amphigena maculæ-formis orbicularis fusca centro subrugulosa, fibrillis tenuissimis confertis margine vix distinctis, cellulis minutissimis confertis. — Ad folia subemortua Fraxini excelsioris in Jurasso (cl. Chaillet), aut. — Asteroma Fraxini DC. fl. fr. 5. p. 163; mem. mus. t. 3. f. 4. Sphæria Echinus Biv. Bernh. manip. t. 4. f. 1. ex Friesio. — Maculæ variæ confluentes.
28. D? PADI (Spreng. syst. veg. 4. p. 417.) epiphylla rubra, fibrillis distinctis byssoides applanatis ramoso-dichotomis radiantibus apice albidis demum centro confluentibus. — Ad folia viva Cerasi Padi. — Species quoad genus et locum et veram structuram valde incerta, Dothideæ status juvenilis ex cl. Fries, sed ex cl. Desmazières cum sequente genus valde distinctum constitutus.
29. D? ROSÆ (Dub. mss.) epiphylla maculæ-formis fusco-nigra, fibrillis albis ramosis radiantibus innatis, cellulis nigris sparsis ovalibus rotundisve interdum concentrica dispositis. — Ad folia viridia Rosæ, imprimis Rosæ turbinate. — Asteroma Rosæ Libert in ann. soc. linn. paris. 1826. Desmaz. crypt. exs. n. 232. Himantia? pulchella Pers. myc. eur. 1. p. 91. Sporotrichum macularum Linck sp. t. 6. p. 20. — Cellulæ minimæ interdum confluentes; ascos subclavatos 3-4 annulatos describit cl. Desmaz. l. c.
30. D. RANUNCULI (Fries syst. myc. 2. p. 562.) hypophylla, maculæ indeterminata uniformi nigra, cellulis subgregariis depressis inæqualibus. — Ad folia Ranunculi acris, repentis, etc., aut. — D. Ranunculorum Desm. exs. n. 285. — Maculæ effusæ variæ interdum confluentes.
31. D. CAMPANULAR (Fries syst. myc. 2. p. 562.) pustulis minimis hypophyllis caulinisve distinctis aggregatis fusco-nigris convexiusculis demum punctulatis et quasi e plurimis conflatis. — In foliis et rariis caule Campanulæ Trachelii. — DC. fl. fr. 5. p. 159; mem. mus. t. 3. f. 10. — Folium circa maculas primum subfuscens demum pallescens.
32. D. SOLIDAGINIS (Fries l. c.) hypophylla, pustulis minimis distinctis nigris rugosis umbilicatis intus fascis in maculam subrotundam ambitu passim fibrilloso-adpresso stipatis. — In foliis Solidaginis virgæ-aureæ, aut. — Xyloma Virgæ-aureæ DC. fl. fr. 5. p. 158; mem. mus. l. c. t. 3. f. 12. — Maculæ irregulares tenuissimæ aliquot lineas latæ primò subviolaceæ in ambitu pallescentes dein nigricantes.
34. D. NERVISEQUA (Fries l. c.) hypophylla secùs nervos seriato-reticulata, cel-

4. Pseudosphaeria. Uniformes simplices vel passim seriatæ absque fibrillis, maculam exaridam nullam in foliis procreantes.

33. D. ANEMONES (Fries syst. myc. 2. p. 563.) aggregata subconfluens diffinis rugosa purpurascenti-fusca dein nigricans intus albida. — In petiolis foliis pedunculis et petalis Anemones sylvestris et nemorosæ vivarum, vere. — Sphæria Anemones DC. fl. fr. 5. p. 143. Mong. et Nestl. vog. n. 487. — Macula nulla; cellulæ passim confluentes ambientes superficie corrugatâ nitidâ medio depressâ.

- Iulis minimis nigris globosis prominulis laevibus. — Ad folia viva Melampyri in Jurasso (cl. Chaillet). — Sphaeria nervisequa DC. fl. fr. 5. p. 140.
35. D. HEDERÆ (Mougeot in Fries syst. myc. 2. p. 564.) epiphylla sparsa subrotunda inæqualis glabra opaca nigra intus cinerascens. — Ad folia viva Hederae in sylvis. — Moug. et Nestl. vog. exs. n. 861.
36. D. ARBUTI (Sprengel ex cl. Soleiroli.) epiphylla conferta orbicularis interdum confluens elongata nigra nitida concava glabra inæqualis intus nigricans, maculæ fuscæ insidens. — Ad folia Arbuti Unedinis in Corsica (cl. Soleiroli).
37. D. UMBILICATA (Fries syst. orb. veg. 1. p. 363.) amphigena sparsa orbicularis nigra nitida subapplanata centro umbilicato-perforata. — Ad folia arida Crataegi oxyacanthæ in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.), hyeme. — Xyloma umbilicatum Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 761.
38. D. ALNEA (Fries l. c.) amphigena sparsa subrotunda minima nigra nitida collapsa rugoso-plicata. — Ad folia viva Alni glutinosæ et incanæ, ætate, Grev. crypt. fl. t. 146. f. 2. — Xyloma alnum Pers. syn. 108. DC. syn. gall. p. 63. fl. fr. 5. p. 15; mem. inus. 3. p. 322. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 78. — Folia circè postulas subrubescentia.
39. D. ROBERTIANI (Fries l. c.) epiphylla gregatim sparsa hemisphærica laevis nitida nigra intus alba. — Ad folia Geranii Robertiani in sylvaram locis humidis, vere. — Grev. scott. cr. t. 146. f. 1. Moug. et Nestl. exs. n. 862. — Sphaeriam referens sed tuberculum immediate absque receptaculo cum folii parenchymate confluit.

III ? ACTINONEMA Pers. myc. eur. 1. p. 51.

Fibrillæ ex centro radiantes noduloso-exasperatae matrici arctè adnatæ. — Genus valdè dubium et hic ut investigationi denuo subjicitur insertum. — Dothideæ incunabula censem cl. Fries forsitan non immerito.

1. A. CRATÆGI (Pers. l. c.) suborbiculare maculæforme fusco-nigrum filis ubique distinctis. — Ad folia adhuc viridia Cratægi terminalis in Jurasso (cl. Chaillet), propè Beauvais (cl. Graves). — Moug. et Nestl. vog. n. 864. — Junior maculam solummodo efficit fuscam dein fibrillæ apparent distinctæ.
2. A. CAULINCOLA (Pers. l. c.) fuscescens, fibrillis densis medio in maculam confluentibus. — Rarissime in caulinis Umbelliferarum; 2-3 lin. latum.

IV. EUSTEGIA Fries syst. myc. 2. p. 532. Ad. Brongn. class. nat. champ. 95. — Stegia Fries obs. non DC. fl. fr.

Receptacula orbiculata sessilia cupulæformia aperta sed infra marginem liberum operculo convexo demum deciduo tecta, undè circumscissa; thecæ elongatae erectæ fundo receptaculi innatæ paraphysibus immixtae.

1. E ? ILCIS (Chevall. fl. par. 1. p. 443.) conferta subapplanata, receptaculis rotundatis distinctis nitidis atro-subcinerascens, margine albido annulato, operculo caduco. — Ad folia Ilicis Aquifolii in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.), propè Parisios ex cl. Chevall. — Sphaeria complanata Ilicis Moug. et Nestl. vog. n. 82. — An hujus generis ex Fries l. c. — Hanc vult cl. Brongean in ann. soc. linn. par. 1826, nihil esse nisi statum non evolutum et abortivum Agarici Hudsoni Pers.

V. LOPHIUM Fries obs. bot. 2. p. 345; syst. myc. 2. p. 533. Ad. Brongn. l. c.

Receptacula verticalia compressa submembranacea clausa rimâ longitudinali dehiscentia; thecæ erectæ paraphysibus immixtae sporidia sim-

718 ACOTYL. seu CELLULARES.

plicia exigua in cludentes mox in pulverem fatiscentes et e receptaculo exentes. — Fungilli simplices emerso-superficiales liberati.

1. *L. MYRTILINUM* (Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 116.) subpedicellatum sursum dilatatum transversim striatum atro-nitens. — Ad ligua annosa semi-putrida. — Grev. crypt. fl. t. 177. *Hysterium mytilinum* Pers. Nees syst. f. 301. *H. ostraceum* DC. fl. fr. 2. p. 306. *Hypoxylon ostraceum* Bull. champ. t. 444. f. 4. — Ecrustrā latē effusā indeterminatā nigrā plerumque emergit; receptacula intus plerumque cava nucleo albido mox in pulverem terreo-fuscum fatiscente.

Trib. II. *PHACIDIACEÆ* Fries syst. myc. 2. p. 117. Ad. Brongn. cl. champ. p. 96.

Receptaculum rimis pluribus rumpens, disco apertum; thecae erectæ fixæ persistentes.

VI. *HYSTERIUM* Tode meck. 2. p. 4. Fries syst. myc. 2. p. 579. Ad. Brongn. l. c.
— *Hysterium* et *Hypoderma* DC. fl. fr. 2. p. 304 et 306.

Receptacula simplicia sessilia ovalia vel elongata rimâ longitudinali dehiscentia primò clausa demùm subaperta, nucleo discifero linearis subpersistente; thecae erectæ fixæ elongatæ sporulis uniserialibus referuntur. — Fungi minuti subgregarii subinnati subinde confluentes.

* *In partibus plantarum perennibus nascentia.*

1. *Denudata.*

1. *H. PULICARE* (Pers. syn. p. 98.) superficiale ellipticum oblongumve longitudinaliter striatum atrum, labiis obtusis, disco linearis. — Ad cortices et ligna annosa Quercus, Alni, Betulæ, etc. — Fl. fr. 2. p. 307. Nees syst. f. 302. Moug. et Nestl. exs. n. 268. Grev. crypt. fl. t. 167. f. 1. Lichen n. 7. Mich. gen. t. 54. f. 2. — Sparsum vel gregarium nitidum crustis Lichenosis sèpè innatum undè pro Opegraphâ facile sumendum.
2. *H. angustatum* (Fries) elongatum lineare subparallelum lèviusculum. — Ad cortices. — *H. angustatum* Pers. syn. 99. Fl. fr. 2. p. 600.
2. *H. elongatum* (Wahl. lapp. p. 528.) superficiale oblongum rectum lèviusculum opacum atrum, labiis tumidis, disco linearis. — Ad ligna decorticata Populi circà St. Just propè Beauvais (cl. Graves). — Superficies rugulosa raro striata opaca; plerumque crustulæ maculæformi nigræ innascitur.
3. *H. curvatum* (Fries ined. in litt. ad cl. Moug.) superficiale elongatum prominentis flexuoso incurvumve nitidum atrum intus albidum, labiis humidis longitudinaliter striatis, disco linearis. — Ad ramum exsiccatum Pruni spinosæ reperiit in Vogenesis cl. Mongeot. — *H. elongatum* & *curvatum* Fries cl. fung. 2. p. 138. — Receptacula $\frac{1}{2}$ –1 lin. longa simplicia interdum confluentia.
4. *H. graphicum* (Fries obs. myc. 1. p. 194; syst. myc. 2. p. 581.) superficiale confertum elongatum curvatum subramosum opacum nigrum labiis sub prominulis intus albidum. — Ad corticem Quercus propè Beauvais ex cl. Graves. — Subculo tomentoso nigro expando passim innascitur subcompressum 2 lin. sere longum; labia prominentia demum aperta.
5. *H. acuminatum* (Fries in vet. ac. handl. 1819. p. 92; syst. myc. 2. p. 582.) subimmersum atrum, receptaculis rectis discoque corneo linearis-lanceolatis acuminatis, labiis tenuibus prominulis. — Ad lignum denudatum Fagi propè Parisios ex cl. Chevall. — Plerumque sparsum tenuis $\frac{1}{2}$ –1 lin. et ultra longum opacum.
6. *H. lineare* (Fries ll. cc.) subimmersum confertum parallelum lineare nigrum, labiis tumidulis lèvibus, disco linearis. — Ad ramos cortice denudatos Pyri, Aceris, etc. — Grev. crypt. fl. t. 167. f. 2. *H. angustatum* Moug. et

Nestl. vog. n. 563 non Pers. syn. — Ligno atrato basi immersum, apicibus obtusis, opacum; labia parallela; interdum adeo stipatum ut crustam omnino constituat.

7. *H. AGGREGATUM* (DC. fl. fr. 5. p. 167.) parallele aggregatum pusillum oblongum vel elongatum atrum lave rimula longitudinali vix conspicua. — Ad ligna denudata Quercus, in Jurasso (cl. Chaillet). — Nudo oculo refert maculas nigras irregulares 2-3 lin. longas sub lente compositas e receptaculis minutissimis convexis compressis secundum ligni fibras.
8. *H. PROSTII* (Dub. mss.) subinnatum sparsum aggregatum lineari-ellipticum angustum utrinque obtusum atrum, disco nitido primò rimæformi demum concavo, labiis tumidis obtusis elevatis subdistantibus. — Ad superficiem internam corticis secedentis Mali circa Mimatem obs. cl. Prost. — Sequenti affine sed caracteribus laudatis et magnitudine diversum.
9. *H. MINUTUM* (DC. fl. fr. 5. p. 168.) subinnatum sparsum ovatum minutissimum aggregatum atrum, disco nitido concavo, labiis elevatis distantibus. — Ad corticem ramorum exsiccatorum Salicis et Mali, in Jurasso (cl. Chaillet). — *H. ellipticum* Fries. — Nudo oculo puncta nigra perexigua irregularia sistit.

2. *Erumpentia.*

10. *H. ELATINUM* (Pers. syn. in add. p. 28.) erumpens sparsum difforme majuscum curvatum rugosum atrum, labiis distantibus disco rufescens-nigro. — Ad corticem Abietis. — Moug. et Nestl. exs. n. 479. — Lin. 1-2 et ultra longum opacum.

B. crispum (Fries) elongatum flexuosum, labiis distinctis tenuibus crista-
tis. — Ad ramos tenuiores Abietis. — *H. crispum* Pers. syn. 101. ic. pict.
t. 9. f. 1. Hypoderma crispum DC. fl. fr. 5. p. 167. Triblidium crispum
Pers. myc. eur. t. p. 332. — Receptacula epidermide cincta erumpunt
extus primò fuscescentia disco atro.

11. *H. ELEVATUM* (Pers. myc. t. t. 1. f. 4. ex cl. L. Dufour.) erumpens exsertum sparsum majuscum oblongum lavigatum crassum aternum, labiis tumidis involutis tandem transversim diffracto-rimosis, disco planiusculo rufescente subtomentello. — Ad ramos dejectos ad montem Lupi propè Monspe-
lium ex cl. L. Dufour. — Triblidium hysterinum Duf. in ann. sc. nat. t. 13.
t. 10. f. 3.

12. *H. DEGENERANS* (Fries in Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 60; syst. myc.
2. p. 585.) erumpens gregarium rotundum vel elongatum variam nigrum,
disco aperto dilatato molli aperto. — Ad ramos emortuos Vaccinii uliginosi,
in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.). — Primò clausum demum apertum labiis
distantibus subcrenatis.

13. *H. FRAXINI* (Pers. syn. 98.) erumpens ellipticum durum convexum nigrum,
labiis tumidis lœvibus, disco lineari. — Ad ramos exsiccatos Fraxini, hyeme,
vere. — Grev. cr. fl. t. 72. Hypoderma Fraxini DC. fl. fr. 5. p. 187. Sphaeria
sulcata Bolt. t. 124. — Sparsum vel gregarium prominens lineam longum
apicibus obtusis sed interdum trigonum trifarium dehiscens; sporulae magnæ
flavæ.

14. *H. CONIGENUM* (Moug. et Nestl. exs. n. 75 non Pers. nec DC.) erumpens
pusillum punctiforme nitidum rimula longitudinali dehiscens. — Ad strobilos
Pini sylvestris. — Fries syst. myc. 2. p. 586. Desmaz. cr. exs. n. 287. — Con-
fertum rotundatum vel elongatum aternum Sphaeriam minutam referens.

3. *Subtecta.*

15. *H. SAMBUCI* (Schum. säll. 2. p. 152.) receptaculis ovatis vel subrotundis pro-
minentibus atris subconfluentibus, labiis tumidiisculis rugulosis. — In cor-
tice ruguloso trunci Sambuci nigrae propè Beauvais ex cl. Graves.

16. *H. RUBI* (Pers. obs. myc. 1. p. 84; syn. p. 100.) subinnatum gregarium

720 ACOTYL. SEU CELLULARES. HYSTERIUM.

- subparallelum elongatum acutum laxe nitidum nigrum primò depresso appanatum clavatum demum prominulum intus griseum, labiis carinatis apertis demumque secedentibus. — Ad ramos emortuos Rubi. — Mong. et Nestl. exs. n. 564. Grev. crypt. fl. t. 24. Hypoderma virgulatorum a DC. fl. fr. 5. p. 165. Lophodermium Rubi Chevall. — Thecae apicibus rotundo-clavatae.
17. *H. striola* (Fries ined. ex cl. Guép. in litt.) caulinum, innato-immersum longitudinaliter positum lineare elongatum in stria longas parallelas interraptas dispositum, acutum opacum nigrum intus griseum. — In caulinis Umbelliferarum circà Angers (cl. Guépin). — Gregarium valde angustum epidermide longitudinaliter rupta persistente tectum.
18. *H. nervisequum* (Fries syst. myc. 2. p. 587.) hypophyllum nervisequum in striam longissimam rectam confluens nigrum convexum, disco deliscente pallido. — Ad folia Pinæ Piceæ, in montibus Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — Hypoderma nervisequum DC. fl. fr. 5. p. 167. — Primo interraptum sistens puncta oblonga, demum verò confluens in striam longitudinalem totius nervi longitudinem occupantem.
19. *H. Pinastri* (Schrad. journ. bot. 2. t. 3. f. 4.) epiphyllum innato-immersum ovali-oblongum laxe nigricans ore elliptico apertum disco livido. — Ad folia Pinorum. — Mong. et Nestl. exs. n. 76. Grev. cr. fl. t. 60. Hypoderma Pinastri DC. fl. fr. 2. p. 303. Lophodermium Pinastri Chevall. — Sparsum sed passim plura specimina lineola nigra circumscripta; labia in siccis cinerascent in vegetis rufescunt.
20. *H. Oxcoccos* (Fries scl. suec. exs. p. 169; syst. myc. 2. p. 588.) epiphyllum subiunatum elliptico-lanceolatum obtusum nigricans, labiis tenuissimis inflexis, disco livido. — Ad folia Vaccinii Oxcoccos in Vogenesis (cl. Mougeot), vere. — In statu humido extus fuligineo-nigrum in sicco rufescens, labiis crispatis.
21. *H. melaleucum* (Fries obs. myc. 1. t. 2. f. 1.) minutum hypophyllum innatum ellipticum vel subrotundum laxe nigrum opacum primò convexum dein lineā prominente carinatum demum rimā longitudinali albâ disruptum. — Ad folia emortua Vaccinii Vitis Ideæ in Vogenesis (cl. Mougeot et Nestl.), propè Beauvais (cl. Graves). — Mong. et Nestl. vog. n. 654. Grev. crypt. fl. t. 88. — Foliis subdeterminate albicantibus innascitur, omnino superficiale apprens sed revera epidermide plane connatâ tectum.

** In partibus Plantarum annuis nascentia.

22. *H. commune* (Fries syst. myc. 2. p. 589.) innatum oblongum obtusum opacum atrum, labiis subrugosis fragilibus, disco subfolagineo. — Ad caules herbarum majores v. g. Epilobii, Aconiti, Artemisiæ, etc. — Lophodermium herbarum Chevali. fl. par. 1. p. 437. Hypoderma virgulatorum ♂ et ♀ DC. fl. fr. 5. p. 165. — Affine *H. rubi*. Labia subdepressa longitudinaliter rugosa vel laevia dein diffracta discum dilatatum nudum relinquunt.
23. *H. typhænum* (Fries syst. myc. 2. p. 590.) innatum oblongum epidermide bullatâ tectum dein nudum nigrum, labiis tumidulis parallelis. — Ad folia et caulem Typhæ propè Beauvais ex cl. Graves. — Pers. myc. eur. t. 2. f. 5. 6. — Species major, a lin. et ultra longa recta apicibus subobtusa.
24. *H. scirpinum* (Pers. ined. in DC. fl. fr. 5. p. 166.) innatum elongatum rectum depresso aterrimum, labiis medio in cristam elevatis parallelis demum apertis secedentibus. — Ad culmos Scirpi lacustris. — Hypoderma Scirpinum DC. l. c. Mong. et Nestl. vog. n. 475. — Maculæ pallidæ sèpè circumscriptæ innatum a lin. serè longum, labia demum secedentia discum albidum denudantia.
25. *H. arundinaceum* (Schrad. journ. bot. 2. t. 3. f. 3.) innatum ovale depresso rugulosum opacum fusco-nigrum rimâ longitudinali demum hians. — Ad culmos emortuos Arundinis. — Mong. et Nestl. vog. n. 655. Hypoderma arundinaceum DC. fl. fr. 2. p. 305. et 5. p. 166. — Sparsum lineam vix lon-

gum e fusco ferrugineo-nigricans, in ambitu fuscescens, absque crista prominente.

26. *H. CULMIGENUM* (Fries obs. myc. 2. t. 7. f. 3; syst. myc. 2. p. 591.) innatum elliptico-oblongum prominens laxe nigrum primò clavatum demum apertum, disco pallido elliptico. — Ad culmos gramintum siccis, vere. — Desmaz. cr. exs. n. 238. — Maculas expallentes incolunt receptacula plura subgregaria.

β. graminum (Moug. et Nestl. vog. n. 368.) punctiforme ellipticum utrinque obtusissimum applanatum. — Ad culmos aridos graminum. — *H. gramineum* Grev. cr. fl. t. 87.

27. *H. MACULARE* (Fries syst. myc. 2. p. 592.) maculae exaridæ pallidæ innatum subrotundo-ellipticum depresso nudum atrum, disco stramineo. — Ad folia sicca Vaccinii uliginosi in Vogesis (cl. Mougeot). — Sparsum minutum opacum laxe rimâ longitudinali demum dehiscens.

28. *H. POLICOLUM* (Fries in vet. ac. handl. 1819. p. 102; syst. myc. 2. p. 592.) innatum sparsum ellipticum obtusum tumidulum laxe nudum nigrum rimâ longitudinali depressâ. — Ad folia sicca arborum præcipue e familiâ Rosacearum, vere. — Grev. crypt. fl. t. 129. f. 1. *Xyloma hysteroides* Pers. ic. pict. t. 10. f. 3-4. *Hypoderma Xylomoides* DC. fl. fr. 2. p. 305 et 5. p. 164. — In utrâque folii paginâ occurrit, nullâ maculâ exaridâ cinctum.

29. *H. HERBARUM* (Fries syst. myc. 2. p. 593.) innatum sparsum ellipticum depresso submarginatum laviusculum nigrum, disco subfuligineo. — In foliis siccis Convallariæ mayalis, Polygonati aliarumque herbarum. — Valde affine præcedenti sed in maculâ exaridâ albicante sparsum demum concavum cupulæforme.

30. *H. PUNCTIFORME* (Fries obs. 2. p. 356; syst. myc. 2. p. 593.) innatum subrotundo-ellipticum minimum nigrum rimâ inæquali. — Ad nervos foliorum semivivorum Quercus propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Habitus omnino Sphæriæ punctiformis et vix majus, sed forma elliptica et rimâ longitudinali dehiscens.

VII. PHACIDIUM Fries obs. 1. p. 167. Ad. Brongn. class. des champ. p. 96; dict. class. 13. p. 318. — Pezizæ et Xylomatis sp. Auct.

Receptacula sessilia subrotunda depressa primò clausa dein a centro versus ambitum dehiscentia in lacinias plures a nucleo disciformi subpersistente discreta; thecæ erectæ fixæ paraphysibus immixtæ sporulis uniserialibus refertæ. — Fungilli subinnati in ramis et foliis demortuis nascentes.

I. *Receptacula sub epidermide nascentia demum erumpentia.*

1. *P. PINI* (Schmidt in myc. heft. 1. p. 30. t. 2. f. 11.) erumpens subrotundum truncato-disciforme atrum, receptaculi laciniis obtusis, disco fuligineo. — Ad cortices Pinii sylvestris in Jurasso (cl. Chaillet), in agro Lezurense (cl. Prost). — *Xyloma Pini* Alb. et Schw. t. 5. f. 8. DC. fl. fr. 5. p. 160. *Hysterium valvatum* Nees syst. f. 399. — Sparsum subinnatum 1-2 lin. latum primò nitens dein opacum; stratum sub disco carnosum album.

2. *P. CARBONACEUM* (Fries in vet. ac. handl. 1819. p. 106; syst. myc. 2. p. 574.) erumpens subrotundum inæquale nigrum in lacinias obtusas dehicens, disco sicco nigrescente. — Ad ramos Salicis viminalis propè Beuvais ex cl. Graves, S. capreæ circâ Mimatem (cl. Prost). — Gregarium, primò epidermide in ambitu lutescente tectum cinerascens convexum nitidulum dein depresso opacum.

3. *P. ANDROMEDÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 574.) erumpens pusillum subsphaericum atrum dein depresso, receptaculi laciniis 3-4 obtusis, disco fusco-pallido. — Ad folia Andromedæ polifoliae, in Vogesis (cl. Mougeot). — Maculæ exaridæ albicanti determinatae sed non circumscripæ innascitur.

722 ACOTYL. SEU CELLULARES. PHACIDIUM.

4. P. VACCINII (Fries l. c.) epiphyllum sparsum erumpens minutum convexum nitidum in lacinias 4 dehiscens rugosum, disco fuligineo-nigro. — Ad folia Vaccinii Vitis-Ideæ in Vogenesis (cel. Mongeot), Galliæ boreali ex Desmaz.
5. P. TAXI (Fries l. c.) erumpens minutum appланatum cinereo-nigrum, receptaculi lacinias acutis, disco nigro. — Ad folia Taxi dejecta propè Beauvais ex cl. Graves.
6. P. LAURO-CERASI (Desmaz. crypt. exs. n. 188.) sparsum subhemisphæricum minutissimum primò nigro-olivaceum demùm opacum, receptaculi lacinias tribus, disco carnosò concavo. — Ad paginam inferiorem foliorum demoraturum Pruni Lauro-cerasi propè Lille ex cl. Desmaz., Vire (cl. Lenormand), Angers (cl. Guépin), aut. — An potius Ceuthosporæ sp?
7. P. TINI (Duby mss.) sparsum subhemisphæricum minutissimum subintatum depresso-concavum olivaceo-nigrum in lacinias plures olivaceas dehiscens, disco pallidiore concavo. — Ad paginam inferiorem foliorum demoraturum Viburni Tini culti circè Vire observavit cl. Lenormand et mihi sub nomine Xyloma Tini misit.
8. P. LEPTIDEUM (Fries in vet. ac. handl. 1819. p. 107; syst. myc. 2. p. 576.) subintatum depresso-planum subintens nigrum punctulatum in lacinias plures acutas dehiscens, disco stramineo. — In caulinis exsiccatis Vaccinii Myrtilli propè Glatigny in ditione OESiacâ ex cl. Graves. — P. quadratum Schmidt. — Rotundatum demùm 3-5-gonum lineam latum maculæ lutescenti expallidæ innascens.

II. Receptacula cum epidermide concreta.

9. P. CORONATUM (Fries obs. 1. p. 167; syst. myc. 2. p. 577.) gregarium innatum orbiculare hemisphærico-depressum nigricans, in lacinias plures acutas dehiscens, disco flavescente. — Ad folia dejecta Quercus, Fagi, Betulæ, etc. — Mong. et Nestl. exs. n. 559. Ad Brongn. class. champ. t. 8. f. 5. Grev. crypt. fl. t. 52. Xyloma pezizoides Pers. ic. pict. t. 10. f. 1. Fl. fr. 5. p. 161. Sclerotium Quercinum fl. dan. t. 1380. Peziza comitialis Batsch. cont. 1. f. 152. Sow. t. 118. — Lineam et ultrà latum; discus planus pallidus citrinus lividusve.
10. P. DENTATUM (Schmidt myc. heft. 1. p. 41.) quadratum maculæ pallidæ insidens medio depresso atrum nitens, in lacinias 4-5 acutas dehiscens, disco sordide lateo. — Ad folia dejecta Quercus. — Sphaeria lichenoides DC. fl. fr. 5. p. 147. — Junius punctiforme dein dilatatum planum subquadratum.
11. P. FIMBRIATUM (Schmidt l. c. p. 39.) innatum orbiculare hemisphærico-applanatum radiatum striatum atrum, in lacinias plures teneras rumpens, disco albo. — Ad folia Populi Tremulæ circè Compiègne ex cl. Graves. — Vix lin. latum opacum.
12. P. RUBI (Fries scl. suec. exs. n. 56; syst. myc. 2. p. 578.) gregarium innatum rotundum rugulosum atrum hemisphærico-applanatum primò papillæ obtusa centrali umbonatum, dein in lacinias inæquaes obtusas rumpens, disco albido. — Epiphyllum in variis Rubis Galliæ borealis ex cl. Desmazieres, vere. — Desmaz. cr. exs. n. 187. — Gregarium 1-2 lin. latum vivum nitidum, siccum opacum.
13. P. HERBARUM (Dub. mss.) innatum subrotundum viridi-pallens denūm nigrum in lacinias obtusas inæquaes rumpens, disco fuligineo. — Ad caules petiolos rarius folia viva variarum herbarum v. g. Potentillarum, Cerastii, Galii, etc. — Phacidium repandum Fries. Xyloma herbarum Alb. et Schw. t. 14. f. 6. DC. fl. fr. 5. p. 161. — Primò minutum punctiforme dein dilatatum.
14. P. ? ARUNDINACEUM (Schmidt in Kunze et Schm. myc. heft. 1. p. 44.) innatum orbiculatum rufo-fuscum sparsum confertumve, disco piano centro subpapilloso, margine fusco prominulo integro. — Ad caules aridos Arun-

dinis Phragmitis in Jurasso (cl. Chaillet). — *Xyloma arundinaceum* DC. fl. fr. 5. p. 162.

VIII. RHYTISMA Fries in vet. ac. handl. 1819. p. 104; syst. myc. p. 564. Ad. Brongn. class. champ. p. 97. — *Placuntium Ehrenb.* — *Xylomatis* sp. DC.

Receptacula simplicia primò clausa demùm in rimas flexuosas transversales irregularesve rumpentia a nucleo discreta; nucleus compositus submultilocularis receptaculo rupto sistens hymenium placentæforme carnosum subpersistens; thecæ erectæ fixæ paraphysibus immixtæ sporulis uniserialibus refertæ. — *Sessilia subinnata*.

1. R. ANDROMEDÆ (Fries l. c.) epiphyllum innatum oblongum costato-rugosum nitidum, disco cinereo fuligineo, intùs album. — Ad folia viva Andromedæ polifoliae. — *Xyloma Andromedæ* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 155; mem. mus. 3. t. 3. f. 13. Moug. et Nestl. exs. n. 176. — Primò admodum tenue dein crassiusculum.
2. R. SALICINUM (Fries l. c.) innatum crassum tuberosum subnitens squamoso-rumpens intùs album, disco lutescente stramineo. — Ad folia Salicinum variarum. — *Xyloma Salicinum* Pers. disp. p. 5. t. 2. f. 4. Nees syst. f. 20. Moug. et Nestl. vog. n. 175. Grev. crypt. fl. t. 118. f. 2. X. leucocreas DC. fl. fr. 2. p. 303 et 5. p. 154; mem. mus. 3. t. 3. f. 5.
β. *umbonata* (Alb. et Schw.) minus subrotundum umbonatum. — *Xyloma umbonatum* Hoppe.
3. R. ACERINUM (Fries l. c.) epiphyllum rugosum innatum maculæforme confluens intùs albidum, in labia flexuosa dehiscens, disco pallescente. — Ad folia Aceris. — *Xyloma Acerinum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 302; mem. mus. 3. t. 3. f. 9. Nees syst. f. 21. Grev. crypt. fl. t. 118. f. 1. *Mucor granulosus* Bull. champ. t. 504. f. 13. — In ætate juvenili subcontiguum sed in soliis exsiccatis tubercula prominent in plagas interruptas rimâ longitudinali sed valde irregulari et ramosâ erupta.
4. R. PUNCTATUM (Fries l. c.) innatum confertum angulato-subrotundum rugosum atro-nitens frustulatim rumpens intùs fusco-atrum. — Ad folia Aceris Pseudoplatani. — *Xyloma punctatum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 303; mem. mus. 3. t. 6. b. Moug. et Nestl. exs. n. 477. — Receptacula minora 20 circiter in maculam subrotundam disposita tamen inter se libera nec nisi rarius confluentia subumbonata. — Hanc ut prioris formam habet cel. Greville.
5. R. ONOBRYCHIS (Fries l. c.) innatum hypophyllum confluens oblongum rugoso-sulcatum opacum intùs albidum. — Ad folia viva Onobrychis sativæ, in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.). — *Xyloma Onobrychis* DC. fl. fr. 5. p. 159; mem. mus. 3. t. 3. f. 3. — Maculæ aterrimæ totum folii discum fere occupantes.
6. R. URTICÆ (Fries suec. exs. n. 209; syst. myc. 2. p. 570.) innatum aternum in crustam elongatam ambientem cohaerens, tuberculis prominulis lœvibus flexuoso-dehiscentibus intùs cinerascentibus. — Ad caules Urticæ dioicæ, hyeme, vere. — Moug. et Nestl. vog. exs. n. 865. — Maculæ 1-2 unc. longæ epidermide caulis innatæ tectæ.

Trib. III. CYTISPOREÆ Ad. Brongn. cl. champ. p. 97. — Cytisorei et Xylomacei Fries.

Receptaculum ostiolo dehiscens aut rimose rumpens; nucleus sporulis farctus, thecæ nullæ? aut dissolutæ?

724 ACOTYL. SEU CELLULARES.

IX. SPHÆRONEMA Fries obs. 1. p. 187; syst. myc. 2. p. 535. Ad. Brongn. l. c.
— Sphæriæ sp. DC.

Receptacula elongata subcylindrica grumosa, poro simplici aperta, in sacculo tenuissimo includentia sporulas mucosas minimas dein erumpentes in globulum demum fatiscentem induratas. — Simplicia, velo fugacissimo, innato-superficialia.

1. S. SUBULATUM (Fries l. c.) sparsum, receptaculis conico-subulatis aenatis lutescentibus, globulo ovali persistente pallidiore. — Ad pileos Agaricorum putridorum exsiccatos. — Grev. crypt. fl. 1. 189. Sphæria subulata Tode meck. 2. f. 117. DC. fl. fr. 5. p. 137. Nees syst. f. 345 B. — Receptacula spinulas referunt rigida glabra indurata cornea.
2. S. CLADONISCUM (Fries obs. 1. t. 2. f. 7; syst. myc. 2. p. 537.) gregarium, receptaculis cylindricis subramosis nigris, apice truncato subaperto, globulo minimo inclusio albo. — Ad ligna putrida in Vogesis (cl. Mongeot), propè Parisios ex Cheval. — Calycium cladoniscum Ach. univ. p. 241. — Vix ultra semi-lineam altum.
3. S. CYLINDRICUM (Fries in vet. ac handl. 1818. p. 357; syst. myc. 2. p. 538.) receptaculis cylindricis simplicibus gracilibus lœvibus nigris, apice rotundato obtusissimo, globulo prominulo albo. — Ad ligna molliora Salicis, Quercus, etc. — Sphæria cylindrica Tode meck. 2. f. 114. — E ligno carie consumto emergens, nudo oculo vix conspicuum, armato cylindricum diametro longitudinem duplò superante.
4. S. PYRIFORME (Fries syst. myc. 2. p. 539.) pusillum, receptaculis latè conicis acutis lœvibus aterrimis glaberrimis, globulo ovali deciduo aterrimo. — Ad lignum putridum Salicis, in Jurasso (cl. Chaillet). — Sparsum vel gregarium basi dilatata adnatum.

X. CYTISPORA Ehrenb. sylv. ber. p. 28. Fries syst. myc. 2. p. 540. — Bostrichia Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 117. — Sphæriæ et Næmasporæ sp. DC. Pers.

Receptacula cellularia, cellulis difformibus membranaceis tenuibus tubculo grumoso vel cortici immersis, circà columnam centralem circinnantibus subconnatis apice junctis in tubo communi dehiscentibus, collo perforante discum erumpentem undè ostiolum solitarium; gelatina sporulosa thecis destituta per ostiolum commune in cirrhum expulsa indurescens. — Immerso-innatæ, jove humido fructificantes.

1. C. COCCINEA (Fries syst. myc. 2. p. 541.) immersa, ostiolo subprominente nigrescente, cirris filiformibus coccineis. — Ad ramos siecos Robiniae Pseudacaciæ, propè Beauvais ex cl. Graves.
2. C. CHRYSOSPERMA (Fries l. c.) stromate olivaceo-cinerascente pulveralento supernè in discum exiguum nigrescentem rotundum erumpente in conceptaculo inclusio, cellulis oblongis atris minoribus, cirris lateis. — Ad corticem Populi, etc. — Moug. et Nestl. vog. exs. n. 881. Desmaz. cr. exs. n. 345. Næmaspora chrysosperma Pers. obs. myc. 1. t. 5. f. 8. Fl. fr. 2. p. 301. Sphæria cirrhata Sow. fung. t. 138. Hypoxylon cirratum Bull. champ. t. 487. f. 4. — Conceptaculum orbiculare conicum basi convexâ scutellari in cortice interiore innata et supernè epidermide adnata inclusum; ostiolum centrale nigrum; cellulæ difficile discernuntur.
3. C. CARPHOSPERMA (Fries scl. suec. exs. n. 155; syst. myc. 2. p. 543.) conceptaculo nullo, cellulis numerosis nigris circinnantibus, disco erumpente piano sordido, cirro albo-lutescente. — Ad corticem Tiliæ in sylvâ Hallatte prope Beauvais ex cl. Graves, Salicis circâ Mimatem (cl. Prost). — Pustulæ orbiculatæ depresso nigrae in cortice interiore fibroso nidulantes, stromate ceraceo

tegente formantes discum centro ostiolo nigro perforatum; gelatina straminea sicca lutescens.

4. C. *LEUCOSPERMA* (Fries I. c.) conceptaculo nullo, cellulis nigris circinnantibus, disco plano albido, ostiolo centrali sub prominente, cirrho albo. — Vulgatissima ad ramos Fagi, Carpi, Aceris, Rosæ, etc. — *Næmaspora leucosperma* Pers. Fl. fr. 2. p. 301. *Sphæria cirrhata* Hoffm. veg. crypt. t. 6. f. 1. — Cellulæ in corpus lobatum nigro marginatum confluent.
5. C. *AQUIFOLII* (Fries in litt. ad. cl. Mong.) conceptaculo nullo, cellulis nigris circinnantibus, disco convexo griseo, ostiolo centrali prominulo aterrimo. — Ad corticem Ilicis in Vogenesis (cl. Mong.). — Pustulæ orbiculatae convexæ nigrescentes; cellulæ numerosæ difformes intus albido-griseæ.
6. C. *RUGAX* (Fries syst. I. c.) conceptaculo nullo, cellulis atris circinnantibus, disco plano fuliginoso, cirrhis tenellis pallidis. — Ad corticem Alni, Salicis, Coryli, etc. — Desmaz. cr. exs. n. 346. *Sphæria pustulata* Hoffm. crypt. t. 5. f. 5. Fl. fr. 2. p. 292. *Variolaria fugax* Bull. champ. t. 432. f. 2. — Pustulæ prominentes lentiformes cum epidermidè concretæ.
7. C. *FERRUGINEA* (Desmaz. cr. exs. n. 347.) cellulis 15-20 extus albis circinnantibus coacervatis in conceptaculo atro crasso orbiculari planiusculo epidermidè tecto, ostiolo centrali epidermidem perforante et sub formâ puncti albi prominulo, cirrhis ferrugineis. — Ad ramos Fagi circa Lille ex cl. Desmaz., hyeme.
8. C. *SPHÆRULA* (Dub. mss.) cellulis numerosis atris orbicularibus ovatisve regulariter circinnantibus in conceptaculo erumpente prominulo sphæroideo atro inclusis, conceptaculis solitariis epidermidè ruptâ cinctis, disco minuto subconcolore, ostiolo minuto. — Ad ramos demortuos Quercus circa Mimatem (cl. Prost). — Sequenti valde affinis et forsitan ab hac non diversa.
9. C. *PISIFORMIS* (Fries in litt. ad. cl. Mong.) cellulis numerosissimis atris difformibus irregulariter coacervatis in conceptaculo erumpente atro-fusco globoso inclusis, conceptaculis solitariis confluentibusve, disco minuto subconcolore plano, ostiolo centrali nigro. — Ad ramos Quercus in Vogenesis (cl. Mougeot). — Conceptaculum epidermidè laceratâ cinctum; cellulæ cerâ griseâ farctæ.
10. C. *GUTTIFERA* (Fries I. c.) cellulis atris in tuberculum immersum nigrum mox attenuatum in collum erumpens conicum obtusum coadunatis, gelatinâ globosâ albida. — Ad corticem ramorum juniorum Quercus. — *Sphæria guttifera* DC. fl. fr. 5. p. 136. — Gelatinæ globulus demum nigrescens.

XI. CEUTHOSPORA Fries syst. orb. veg. t. p. 119. Grev. crypt. fl. p. 253 et 254.
— *Xylomatis* sp. DC.

Receptacula cellularia innata astoma demum irregulariter dehiscentia nucleum atrum includentia; sporidia e nucleo dissoluto erumpentia cylindracea. — Fungilli in foliis demortuis nascentes.

1. C. *PHACIDIOIDES* (Grev. crypt. fl. t. 253.) orbicularis plana nigra nitida, receptaculis demum in lacinias 3-5 pallidas breves dehiscentibus. — Ad folia Ilicis Aquifolii. — *Xyloma multivalve* DC. fl. fr. 2. p. 303; mem. mss. 3. t. 3. f. 8. *Phacidium multivalve* Schmidt. Fries syst. myc. 2. p. 576. Moug. et Nestl. vog. n. 560. *Sphæria Hederæ & Ilicis* Nees pl. myc. t. 2. f. 53. S. bitrons Sow. fung. t. 316. — Receptacula gregaria aut sparsa lin. circiter lata; nuclei 3-5 ovati.

XII. PILIDIUM Kunze in myc. heft. 2. p. 92. Ad. Brongn. class. champ. p. 97.

Receptaculum simplex sessile hemisphaericum ab initio clausum demum rimis pluribus ex centro ruptum fœvens massam e sporulis fusiformibus compositam.

1. P. *ACERINUM* (Kunze I. c. t. 2. f. 5.). In foliis dessicatis Aceris in Jurasso detexit cl. Chaillet ex Kunze. — Receptacula inordinata sparsa rotunda nigra nucleus albus; laciniae receptaculi interdum deciduae.

XIII. LABRELLA Fries syst. orb. veg. 1. p. 364.

Receptaculum subinnatum difforme rimâ dehiscens sporulas ellipsoïdeas vel fusiformes diaphanas simplices massæ gelatinosæ immersas foveas.

1. L. PTARMICÆ (Desmaz. crypt. exs. n. 189.) receptaculis minutissimis punctiformibus lucidis atris ovalibus difformibusve paululum prominulis. — Ad caules et utramque paginam foliorum Achilleæ Ptarmicæ in hortis circâ Lille ex cl. Desmazières.

XIV. LEPTOSTROMA Fries obs. myc. 1. p. 196; syst. myc. 2. p. 597. — Schizoderma Ehrenb.

Receptaculum compressum innatum lâve effusum maculæforme centro subumbonatum, sporulas obtegens, absque ostiolo, demùm vero basi circumscissum totum a matrice secedens et sporulas denudatas relinquent. — Species epiphytæ minimæ atræ.

1. L. SCIRPINUM (Fries scl. exs. n. 175; syst. myc. 1. c.) orbiculare opacum centro umbonatum demùm totum secedens, disco albido. — In culmis Scirpi lacustris in Vogesis (cl. Mougeot), propè Parisios ex cl. Chevall. — L. xylomoides Fries obs. 1. t. 1. f. 6. Schizoderma scirpinum Ehrenb.
2. L. JUNCINUM (Fries in scl. suec. n. 330; syst. 1. c.) oblongo-difforme planum nitidum totum secedens, disco fusco. — In culmis exsiccatis Junci communis. — Moug. et Nestl. vog. n. 653. — Passim confluens.
3. L. FILICINUM (Fries obs. 1. p. 197; syst. myc. 2. p. 599.) elongatum difforme lâve striatum nigrum, adultum costâ elevatâ insignitum, demùmque totum secedens. — Ad stipites variarum Filicum. — Hypoderma striæforme DC. fl. fr. 5, p. 166. Moug. et Nestl. vog. n. 476. Sclerotium Pteridis Pers. in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 673.
4. L. SPIREÆ (Fries syst. 1. c.) conglomerato-connatum difforme rugosum nitidum intùs griseum, totum secedens. — In caulinis Spireæ. — Xyloma Spireæ Kuze, Moug. et Nestl. vog. n. 760.
5. L. VULGARE (Fries 1. c.) simplex subrotundum varium rugulosum nitidum demùm totum secedens. — Ad caules herbarum plurimarum v. g. Aconiti Napelli, Lunariæ redivivæ, etc. — Sclerotium nitidum Pers. in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 674.
6. L. IRIDIS (Ehrenb. sylv. ber. p. 27.) subsparsum latum oblongum aterrimum pallido-areolatum, epidermide striatâ. — Ad folia Iridis Pseudacori propè Beauvais (cl. Graves), Parisios ex cl. Chevallier. — Ectostroma Iridis Fries. f. Typhæ (Fries ined.) sparsum oblongo-lineare aterrimum, epidermide striatâ. — Ad folia viva Typhæ latifoliae in Vogesis (cl. Mougeot).

XV. LEPTOTHYRIUM Kunze in myc. heft. 2. p. 79. Ad. Brongn. 1. c.

Receptaculum scutiforme longitudinaliter sulcatum, sporulas obtegens fusiformes.

1. L. LUNARIA (Kunze 1. c.). — Ad caules exsiccatos et maturas siliculosas Lunariæ redivivæ in Jurasso detexit cl. Chaillet ex Kunze. — Receptacula minima nigra nitida dense stipata et sàpè in maculam majorem irregularem confluentia.

XVI? ACTINOTHYRIUM Kunze in myc. heft. 2. p. 81. t. 2. f. 3. Fries syst. myc. 2. p. 597.

Receptaculum innatum scutiforme, sporulas fusiformes obtegens demùm circumscissum et sub formâ operculi membranacei radiatofibrosi secedens.

1. *A. GRAMINIS* (Kunze l. c.) — Ad culmos et folia graminum vere frequens. — Moug. et Nestl. vog. exs. n. 657. Grev. crypt. fl. t. 218. — Sparsum vel gregarium subinde confluens orbiculatum $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ lin. latum planum opacum aternum subinde centro umbonatum.

XVII. *PHOMA* Fries syst. myc. 2. p. 546. *Ad. Brongn. in dict. class. 13. p. 399.* —

Receptaculum nullum sed nucleus grumosus in tuberculo a matrice formato innatoque inclusus, demumque sporulis ore simplici pertuso rejectis evacuatus; thecae nullae. — Fungilli in solis demortuis nascentes subfuscæ pustulæformes.

1. *P. SALIGNUM* (Fries l. c.) epiphyllum uni-ant multiloculare lave orbiculare convexum fusco-nigrum centro subumbonatum. — Ad folia dejecta Salicis, hyeme, vere. — Desmaz. cr. exs. n. 348. *Xyloma salignum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 304. Moug. et Nestl. vog. n. 268. *Sphaeria salicina* Sow. t. 372. f. 1. — Pustulæ intus albido-ferruginea loculis majusculis subcavis nunc unico, nunc pluribus (2-5) in eadem pustulæ.
2. *P. LAUROCERASI* (Desmaz. in litt.) bifrons sparsum orbiculare convexum atrum opacum. — Ad folia sicca Pruni Laurocerasi propè Lille ex cl. Desmaz. l. c., autumno. — Pustulæ epidermidem sublevantes minimæ numerosæ; sporidia minutissima sphærica (Desmaz.).
3. *P. PUSTULA* (Fries syst. myc. 2. p. 547.) bifrons uniloculare convexum lave rufescens-fuscum intus album, nucleo atro. — Ad folia dejecta Quercus. — *Sphaeria pustula* Pers. ann. bot. t. 2. f. 7. b. Fl. fr. 2. p. 300. — Simplex vel rarius e 2-3 confluentibus compositum subnitidum apice demum depresso.
4. *P. SAMARORUM* (Desmaz. crypt. exs. n. 349.) atrum orbiculare convexum ore rotundo dein subelongato margine albescente dehiscens. — Ad fructus Fraxini circà Lille ex cl. Desmaz., aut. hyeme. — Sporulæ oblongæ minutissimæ (Desm.).
5. *P. HEDERÆ* (Desmaz. l. c. n. 350.) atrum elongato-orbiculare convexum ore rotundo dein subelongato margine albescente dehiscens. — Ad caules emortuos Hederæ circà Lille ex cl. Desmaz., hyeme, vere. — Sporulæ subglobosæ crassiores hyalinæ (Desm.).

XVIII? *GRAPHIOLA* Poiteau in ann. scienc. nat. t. 3. p. 473. t. 26. f. 2. — *Trichodesmium* Chevall. fl. par. 1. p. 382. t. 11. f. 1.

Receptaculum membranaceum in tuberculo (stromate?) atro crustaceo fragili dein pertuso primò reconditum demum illo longius inciso-partitum sporulas globosas minutissimas foveas dein filamenta numerosa simplicia fasciculata pellucida per tuberculi ostiolum erumpentia proferens, tandem marcescens. — Per epidermidem vivam erumpens. — Genus valde anomalam, a cl. Poiteau ad *Lycogaleas* in vicinio Didermatis, a cl. Chevallier ad *Uredineas* in vicinio *Æcidiorum* sectionis Ceratitis relatum et ab utroque ut peridio dupli, externo (tuberculo) crasso crustaceo interno membranaceo inciso-partito donatum, descriptum, sed quantum per analogiam et specimen siccum et imperfectum quod vidi dijudicare licuit, inter Hypoxyla referendum.

1. *G. PHÆNICIS* (Poit. l. c.) minuta, tuberculo nigro, receptaculo intus rufo margine laciniato, filamentis albidis, sporulis pellucidis flavescentibus. — Ad folia Phænicis in Corsicâ (cl. Soleiro) et in tepidariis Parisiorum. — *Phacidium Phænicis* Fries syst. myc. 2. p. 572.

728 ACOTYL. seu CELLULARES.

Ordo CXXI. FUNGI *Ad. Brongn. in dict. class. 3. p. 461;*
class. champ. p. 76. — Hymenomycetes *Fries syst. myc. 1.*
p. 1; syst. orb. veg. 1. p. 63. — Fungorum pars DC.

Crusta aut frons nulla. Receptacula carnosa suberosa spongiosa gelatinosave, formâ varia globosa cupulata clavæformia aut pileata, contextu solido filamentoso aut vesiculoso, obtecta membranâ fructificante (*hymenio*) in quâ collocata sunt sporulæ aut nudæ aut plerumque in thecis inclusæ, interdùm basi radicata aliquando *velo* (*cortinâ*) id est membranâ pileum aut pilei partem inferam obtegente instructa, rarius *volvâ* id est involucro primum clauso demùm rumpente omnino obvoluta. — Vegetabilia terrestria lignicola simicola, etc., sed in plantis vivis non parasitica.

Trib. I. TREMELLINÆ *Ad. Brongn. l. c. Fries syst. orb. veg. 1. p. 91.*

Fungi difformes membranacei vel gelatinosi molles, contextu filamentoso. Hymenium cum receptaculo confusum; thecae nullæ; sporulæ nudæ.

I. HYMENELLA *Fries scl. exs. dec. 22. (1821) non Seringe (1824). Ad. Brongn. class. champ. p. 79.* — Tremellæ species Pers.

Receptaculum cum hymenio confusum sessile adnatum applanatum lave tenuissimum determinatum, humidum molle subgelatinosum, siccum coriaceum; sporulæ immersæ sparsæ. — Species epiphytæ in superficie fructificantes.

1. H. ARUNDINIS (Fries l. c.) majuscula subrotunda subcoriacea subrotunda nigrescens demùm subrimosa. — Ad culmos exsiccatos Arundinis Phragmitis, in Jurasso reperiit cl. Chaillet, vere. — Tremella Arundinis Pers. myc. eur. 1. p. 109. — Effusa $\frac{1}{2}$ -1 unc. lata subinterrupta opaca.

II. AGYRIUM *Fries syst. myc. 2. p. 231. Ad. Brongn. l. c.*

Receptaculum compactum homogeneum ceraceum innato-sessile sphæricum lave undique glabrum et fructificans, humidum gelatinosum, sporulis sparsis obtectum; contextus filamentosus; papillæ nullæ. — Fungi minimi punctiformes gregarii lignatiles sèpè maculæ crustæformi insidentes.

1. A. RUFUM (Fries l. c.) gregarium convexum vel sphæricum compactum, humidum incarnatum, siccum rufo-fuscum. — Ad ligna vetusta aëri exposta, præcipue Pinea. — Grev. cr. fl. t. 232. Stictis rufa Pers. obs. 2. t. 6. f. 6; myc. eur. 1. p. 338. Tremella Stictis Pers. syn. p. 628. — Punctiforme lave basi appланatum innatum maculâ albicante plerumque cinctum.

2. A. pallens (Fries), convexum, humidum pallens, siccum luteolum. — Ad ligna decorticata Populi Tremulæ. — A. pallidum Chevall. fl. par. 1. p. 99.

2. A. NIGRICANS (Fries l. c.) adnatum subrotundum convexum demum rugosum, fuligineo-nigricans. — Ad lignum putridum Quercus et Tiliæ prope Parisios ex cl. Chevall., hyeme. — Gregarium confluens.

III? PYRENİUM Tode meck. 1. p. 35. Fries syst. myc. 2. p. 243; syst. orb. veg. 1. p. 94. Ad. Brongn. cl. champ. 78.

Receptaculum subrotundum sessile arhizum lave glabrum persistens pulpam gelatinosam mollem demum in nucleum ceraceum commutatam continens; sporulae ex cl. Tode et Pers. cum pulpâ externâ commixtae, ex cl. Fries in ambitu nidulantes. — Fungi minores gregarii terrestres persistentes nunquam rumpentes.

1. P. TERRESTRE (Tode l. c. t. 6. f. 50.) aggregatum globosum glaberrimum lave intus extusque aurantiacum. — Ad terram inter Lichenes decompositos circa Parisios ex cl. Chevall. — Magnitudo Pisi interdum multo minus sub lente leviter papillosum.

IV. DACRYMYCES Nees syst. p. 89. Fries syst. myc. 2. p. 228. Ad. Brongn. class. champ. p. 79. — Tremellae sp. Pers. DC.

Receptaculum subsessile rotundatum carnosogelatinosum homogeneum undique fructificans glabrum demum subdeliquescens; papillæ nullæ; contextus filamentosus filamentis assurgentibus quibus sporulae interspersæ. — Species minores gregariæ epiphytæ.

1. D. FRAGIFORMIS (Nees syst. p. 155.) subcompactus rotundatus ruber plicis confertis sublobatis. — Ad cortices variarum arborum et imprimis Pinorum langidorum propè Fontainebleau ex cl. Chevall. — Tremella fragiformis Pers. ic. pict. t. 10. f. 1; myc. eur. 1. p. 99. — Exsiccatus 4-6 lin. latus cæterum ad unciam magnus, colore fragi intus pallescens.
2. D. VIOOLACEUS (Fries l. c.) minor compactus subcompressus gyrosus violaceus. — Ad truncos Pyri communis, propè Beauvais ex cl. Graves, hyeme. — Tremella violacea Pers. — Erumpens, gregarinus 3-4 lin. longus 1 crassus, siccus nigrescens.
3. D. DELIQUESCENTS (Dub. mss.) gregarinus parvus rotundatus convexus demum plicatus e luteo aurantiacus. — Ad ligna Abietina fabrefacta. — D. stillatus Nees syst. f. 90. Grev. crypt. fl. t. 159. Tremella deliquescens Bull. champ. t. 455. f. 3. Fl. fr. 2. p. 91. T. Abietina Pers. Fl. fr. 5. p. 28. — Subconfluens 1-4 lin. latus, junior sphæricus dein turbinatus vel irregularis, sessilis vel stipitatus.
f. lacrymalis, lutescens nitidus siccus fuscescens. — Ad truncos Quercus. — Tremella lacrymalis Pers.
4. D. URTICÆ (Fries l. c.) gregarius minutus difformis planiusculus lavis aurantio-ruber. — Ad caules exsiccatos Urticæ dioicæ, hyeme, vere. — Tremella Urticæ Pers. Fl. fr. 5. p. 28. T. sæpincola Willd. Fusarium tremelloides Grev. cr. fl. t. 10. — Humidus turgidus ceraceo-gelatinosus, siccus adpressus maculæformis.

V. ACROSPERMUM Tode meck. 1. p. 8. Fries syst. myc. 2. p. 244. Ad. Brongn. class. champ. p. 80. — Clavariæ sp. Pers. DC.

Elongatum subclavatum saepè stipitatum homogeneum intus cartilagineo-carnosum, cortice tenuissimo membranaceo inseparabili persistente obtectum; apex demum subturnens e sporulis superficialibus sparsis pruinosus. — Fungi rigidi minuti perpendiculares libere evoluti in vegetabilibus emortuis parasitici.

1. A. COMPRESSUM (Tod. meck. 1. t. 2. f. 13.) stipitatum plerumque lanceolatum subcompressum obtusiusculum nigrescenti-olivaceum. — Ad caules exsiccatos herbarum. — Grev. crypt. fl. t. 182. Clavaria herbarum Pers. comm. clav. t. 3. f. 4. DC. fl. fr. 5. p. 30. Scleroglossum lanceolatum Pers. in Mong. et

730 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Nestl. vog. n. 671. — Gregarium 2 lin. ferè longum, primò lève demùm apice concentrica sulcatum et a sporidiis erumpentibus albo-pruinosum.

2. *A. sclerotioides* (Fries l. c.) sursum incrassatum badium basi tuberosum.

— Ad caules exsiccatos Gentianæ luteæ, in Jurasso (cl. Chaillet), aestate.

— Clavaria sclerotioides DC. fl. fr. 5. p. 29. Pistillaria sclerotioides Fries syst. myc. 1. p. 246. — Pers. myc. eur. t. 11. f. 3-4. — Carnosum 2-3 lin. longum deorsum attenuatum apice obtusum, tubercula compacta granulata intus alba. — A. Phacorrhizæ sclerotioide non diversum suspicatur cel. Greville.

3. *A. conicum* (Fries l. c.) conicum lève nigrescens apice dilutius. — Ad caules plantarum exsiccatos, propè Parisios ex Chevall., vere. — Gregarium rectum subulato-conicum, apice molliori fructificans, intus album.

4. *A. cornutum* (Fries l. c.) corniforme lève siccum sulcatum rufum apice demùm dilutius. — Ad Agaricos putridos propè Parisios ex cl. Chevall., autumno. — Bull. champ. t. 256 pro radice Agarici tuberosi. — Gregarium subulato-conicum curvatum 3 lin. longum et ultrà.

VI. TREMELLA Fries syst. myc. 2. p. 210. Ad. Brongn. class. champ. p. 80. — Tremellæ sp. Pers. DC.

Receptaculum gelatinosum molle homogeneum subpellucidum multiforme lobatum vel plicatum undique similare glabrum, contextū fibroso-celluloso; sporulæ sparsæ ad superficiem hymenii lèvis et sine papillâ. — Fungi majores vel mediæ magnitudinis libere evoluti sed basi intra corticem et ligna radicantes.

I. HYGROMITROIDEÆ Fries l. c.

Gelatinosæ tremulæ firmulæ stipitæ in capitulum expansæ.

1. *T. HELVELLOIDES* (DC. fl. fr. 2. p. 93.) gelatinoso-tremula roseo-aurantiaca erecta, stipite basi sulcato frondescente, marginibus sinuosis. — Ad terram humidam in sylvis Fagorum ad radices Jurassi (cel. DC.). — Gyrocephalus Juratensis Pers. in ann. soc. linn. 1824. Guepinia tremelloides Fries syst. orb. p. 92. — Unc. 2 circiter alta; stipes compressus canaliculatus mox dilatatus in expansionem nunc rectam nunc nutantem aut in formam infundibuli incompleti inflexam.

II. MESENTERIFORMES Fries l. c.

Cartilagineo-gelatinosæ molles cespitosæ in plures lobos tenues flexuosos flaccidos partitæ. — Flaccidæ, truncicolæ.

2. *T. FIMBRIATA* (Pers. obs. myc. 1. p. 97; myc. 1. p. 103.) cespitosa erecta corrugata nigrescens, lobis flaccidis margine incisis undulato-fimbriatis. — Ad trunco et ramos præcipue Alneos in locis humidis, aut. — *T. verticalis* Bull. champ. t. 272. *T. mesenteriformis* Bull. champ. t. 272. t. 499. f. 6 X. *T. mesenterif. f. violacea* DC. fl. fr. 2. p. 92. *T. tinctoria* Pers. myc. 1. p. 101. *T. undulata* Hoffm. veg. cr. 1. t. 7. f. 1. — Magna, nigrescens luci obversa olivacea vel purpurascens; cespites 2-3 uncias alti e lobis plurimis basi connatis erectiusculis flaccidis margine inciso et undulato eximie fimbriatis compoñiti.

3. *T. FRONDOSA* (Fries syst. myc. 2. p. 212.) cespitosa maxima lèvis satis firma luteo-pallescens, lobis gyroso-undulatis. — Ad trunco vetustos Quercus, hyeme. — Bull. champ. t. 499. f. T. — Sequenti proxima sed triplo major.

4. *T. SOLIACEA* (Pers. obs. 2. p. 98; myc. eur. 1. p. 101.) cespitosa magna lèvis diaphana undulato-plicata basi crispa cinnamomeo-cárnea. — Ad trunco vetustos Abietis, Pini, Betulæ, etc., sero autumno. — Bull. champ. t. 496. f. A. a. — Cespites 1-2 unc. alti e lobis undulatis integerrimis basi connatis sulcatis compoñiti.

β. succina, tenuis pellucida plicata fuscescenti-succina. — *T. succina* Pers.
myc. eur. l. c.

5. *T. LUTESCENS* (Pers. ic. pict. t. 8. f. 9.) cespitosa minor mollissima pallidè flava undulato-gyrosa, lobis nudis. — Ad ramos dejectos Fagi. — Subflexilis; cespites e lobis confertis flexuosie integris compositi, $\frac{1}{2}$ -1 unc. lati.
- a. albida* (Fries). — *T. mesenteriformis* *α alba* DC. fl. fr. 2. p. 92. — Bull. champ. t. 406. f. C.
- β. lutescens* (Fries). — *T. mesenteriformis* *β lutea* DC. l. c. Bull. t. 406. f. B. D. t. 499. f. 6. U. V. T. *lutescens* Fl. fr. 5. p. 28.

III. CEREBRINA Fries l. c.

Pulposo-gelatinosæ turgidæ primò subcompactæ e sporidiis emersis demùm pulveraceæ vel pruinosaæ.

6. *T. MESENTERICA* (Retz in vet. ac. handl. 1769. p. 249.) *expansa* ascendens subtenax plicato-undulata aurantiaca. — Ad ramos arborum frondosarum deciduos, hyeme, vere. — Jacq. misc. 1. p. 142. t. 13. eng. bot. t. 709. *T. chrysocoma* Bull. t. 174. *T. auriformis* Hoffm. veg. cr. 1. t. 6. f. 4. *T. expansa* Chevall. — Vaill. bot. t. 14. f. 4. — Valdè varians, sed colore anteo superficie gyrosâ utrinque sporidiis flavis inquinantibus conspersâ facile distinguenda. Forma nunc auriculæ nunc foliolii nunc coni nunc clavæ.
7. *T. ALBIDA* (Huds. ang. 2. p. 565.) minor *expansa* tenax undulata subgyrosa albida. — Ad ramos varios sed præcipue Fraxini, hyeme, vere. — Eng. bot. t. 2117. *T. candida* Pers. *T. cerebrina* *α alba* DC. fl. fr. 2. p. 92. — Bull. t. 386. f. A. — Admodum varians demùm pruinosa substantiâ fere callosâ.
- 8? *T? PERSISTENS* (Bull. champ. p. 223. t. 304.) subcoriaceo-cartilaginea tenuis glabra dimidiata undulata vinoso-violacea. — Super trunco et ramos Juniperi Sabinæ. — Fl. fr. 2. p. 91. — Exsiccata vix visibilis, madida pristinam formam iterum acquirit. Ut synonyma *Gymnosporangii* fusci refert cl. Steudel nom. bot. 2. p. 191 forsitan non immerito.

IV. CORYNE Pers. myc. eur. 1. p. 106. — *Coryne* Nees syst. p. 678.

Erectæ subclavataæ nunc compresso-lobataæ nunc cylindricaæ; sporidia apicem versus subinde capituliformem discretum in ambitu conferta.

9. *T. SARCOIDÆS* (With. arr. 4. p. 78.) cespitosa mollis viscosa carneo-pallida primò clavæformis dein compressa lobata plicataque. — Ad trunco et ramos deciduos, autumno serotino, hyeme. — eng. bot. n. 2450. *T. dubia* Pers. syn. 630. *T. amethystea* Bull. champ. t. 499. f. 5. Fl. fr. 2. p. 91. *Coryne acrospermum* Nees syst. f. 143. — *Diaphana erecta* $\frac{1}{2}$ unc. circiter alba; junior subsimplex dein aggregata compressa; color carneus vinosus lilacinus purpurascens albicansve, basis vero obscurior sæpè atro-purpurea.
- β. galeata* (Fries) minor, capitulo subrotundo albicante, stipite distincto firmo e fuligineo-purpurascente. — Ad ramulos dejectos, aut. — *T. cylindrica* Schum. *Helotium galeatum* Pers. syn. 678. *Acrospermum unguinosum* Tode in berl. naturf. fr. 4. t. 12. fl. dan. t. 1076. f. 3.
10. *T. CLAVATA* (Pers. ic. pict. t. 10. f. 1; myc. eur. 1. p. 106.) solitaria simplex incrassata carneo-rubra, basi nigricante. — Ad ramos patridos in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, sero autumno. — *T. stipitata* Willd. — Unc. 1 $\frac{1}{2}$ longa 1-2 lin. crassa teres obtusa; clavula subfoliata. A priori vix diversam censem. cl. Fries syst. myc. 2. p. 218.

VII. EXIDIA Fries syst. myc. 2. p. 220. Ad. Brongn. l. c. — Auriculariæ et Tremellæ sp. Pers.

Receptaculum molle gelatinosum homogeneum horizontale submarginatum, subtus villosum vel rugosum supra tantum fructificans;

732 ACOTYL. seu CELLULARES.

hymenium persistens papillis prominulis tectum demum costato-plicatum undulatumve; sporulæ ex tubulis plus minus obsoletis in hymenio inclusis exeuntes. — Fungi simplices raro cespitosi majores vel medii, lignatiles irregulariter rotundati concavi vel planiusculi subtus liberi vel matrici applanati.

I. AURICULÆ Fries l. c.

Receptaculum concavum subauriforme plicatum subtus villosum vel punctato-seabrum; tubuli seminiferi sat distincti.

1. E. AURICULA-JUDÆ (Fries l. c.) sessilis concava flexuosa tenuis nigrescens utrinque venoso-plicata subtus subtomentosa olivaceo-cinerea. — Ad annosos truncos Sambuci nigrae vix alios, aut. hyeme. — Peziza Auricula Linn. Bull. champ. t. 427. f. 2. Fl. fr. 2. p. 88. eng. bot. t. 2447. Auricularia Sambuci Pers. myc. eur. 1. p. 97. — Clus. hist. 276. ic. Mich. gen. t. 66. f. 1. — Subcespitosa 2-3 unc. usque lata.

2. E. GELATINOSA (Dub. mss.) molliissima truncato-plana subrepanda fusco-succina subtus punctato-scabra, stipite brevissimo excentrico obliquo. — Ad ramos putrescentes Salicum imprimis S. Capreæ, hyeme. — Peziza gelatinosa Bull. champ. t. 460. Fl. fr. 2. p. 89. Tremella recisa Dittm. ap. Sturm. t. 13. Nees syst. f. 141. Pers. myc. eur. 1. p. 103. — Buxb. comm. pet. 3. t. 14. f. 3. Exidia recisa Fries syst. myc. 2. p. 223. — Gregaria subsessilis auriformis flaccida $\frac{1}{2}$ -1 unc. lata sicca nigrescens; discus planus nitens primò lèvis deinde inter costas elevatas scrobiculatus.

II. GLANDULOSÆ Fries l. c.

Receptaculum irregulare subapplanatum plano-convexum demum undulatum subtus rugosum; tubuli seminiferi obsoleti.

3. E. GLANDULOSA (Fries l. c.) effusa subapplanata crassa undulata nigricans papillis conicis spiculosa subtus cinerea subtomentosa. — Ad truncos et ramos vulgatissima, aut., hyeme. — Tremella glandulosa Bull. champ. t. 420. f. 1. Fl. fr. 2. p. 90. T. spiculosa Pers. Moug. et Nestl. exs. n. 395. T. arborea Huds. Hoffm. veg. cr. 1. t. 8. f. 1. Spicularia glandulosa Chevall. — Dill. musc. t. 10. f. 15. — Admodum varians, junior orbicularis adpressa maculæformis, dein late effusa turgida pezidoidea, exsiccata membranulam nigrum sistens, primò albido-glaucia dein nigrescens.

VIII. CYPHELLA Fries syst. myc. 2. p. 201. Ad. Brongn. class. champ. p. 81. — Pezizæ sp. Auct.

Receptaculum submembranaceum concavum obliquum cernuum indè subtus quodammodo fructificans; hymenium discretum nullum, thecæ nullæ; sporulæ globosæ majuscules pulvris instar sparsæ. — Fungi minores; cupula libere evoluta subexcentrice adfixa, in stipitem sæpius producta demum lacera.

1. C. DIGITALIS (Fries l. c.) submembranacea, cupula pendula digitaliformi basi oblique-gibba intùs ex albido-cæsiâ extùs cum stipite brevi nimirinâ. — In Vogesis ad corticem Pinii Piceæ. — Peziza digitalis Alb. et Schw. t. 5. f. 1. Moug. et Nestl. exs. n. 585. — Stipes 1-2 lin. longus incurvus; cupula primò clausa tuberculiformis mox aperta extùs fibrillis longitudinalibus innatis rugulosa 3-5 lin. lata; discus quasi e farinâ compactâ conflatus demum obscurior, sporidiis albis farinaceis secedentibus.

Trib. II. FUNGINEÆ Ad. Brongn. in dict. class. 3. p. 461. — Pileati Elvellacei et Clavati Fries.

Fungi formâ varii carnosí suberosive. Hymenium distinctum limitatum; sporulæ in thecis receptæ.

Subtrib. I. *HELVELLACEÆ* Fries syst. myc. 2. p. 1. Ad. Brongn. l. c.

Receptaculum cupulatum pileatum aut mitriforme; hymenium superficiem superiorem obtegens thecas elongatas sporulas includentes gerens.

Sect. I. *PEZIZÆ* Fries syst. myc. 2. p. 38.

Receptaculum cupulatum primò clavatum.

IX? *SOLENIA* Pers. disp. p. 36 et 73; myc. eur. 1. p. 334. Fries syst. myc. 2. p. 200. non Agardh. — *Pezizæ* sp. DC.

Receptaculum elongatum tubuliforme simplex membranaceum erectum, terminatum disco minimo cupulæformi ore integro constricto; hymenium distinctum nullum; sporulæ vix discernibiles. — Fungilli molles superficiales libere evoluti.

1. *S. FASCICULATA* (Pers. myc. eur. 1. p. 335. t. 12. f. 8. 9.) gregaria subfasciculata clavato-cylindrica glabrincula alba. — Ad ligna dejecta putrescentia Pini, Betulæ, etc. — *Peziza Solenia* DC. fl. fr. 2. p. 80. excl. synon. *S. candida* Moug. et Nestl. exs. n. 96. non Hoffm. — Conferta subfasciculata 1-3 lin. longa, junior granuliformis mox annuliformis demam in formam cylindricam sursùm incrassatam elongata, extus pilis adpressis subsericea.

2. *S. CANDIDA* (Hoffm. cr. t. 8. f. 1.) sparsa cylindrica glabra candida. — Ad ligna Faginea putrida propè Parisios ex cl. Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 200. — Tubuli tenuissimi exacte cylindrici inter se distantes.

X. *STICTIS* Pers. obs. 2. p. 73; myc. eur. 1. p. 335. Fries syst. myc. 2. p. 191. — *Pezizæ* et *Hysterii* sp. Pers. syn. DC.

Receptaculum obliteratum proprie nullum sed hymenium lave determinatum orbiculatum vel ellipticum matrici totum immersum et ab eadem marginatum primoque velatum; thecae tenues hymenio affixa; sporulæ minutæ globosæ secedentes. — Fungi simplicissimi minutæ gregarii omnino innati margine heterogeneo sèpè limbati concavi disco glabro.

I. STICTES. — *Stictis* Fries l. c.

Ceraceo-coriaceæ vel submembranaceæ, parte omnino innata tantum hymenio tecta, limbo sterili accessorio sèpè obliterato eiusdem.

1. *S. CHRYSOPHÆA* (Pers. myc. eur. 1. p. 335.) erumpens orbicularis, disco excavato rubro, limbo crassiusculo aureo. — Ad ramos siccos decorticatos Abietis propè Ermenonville ex cl. Graves. — *Peziza chrysophæa* Pers. ic. pict. t. 8. f. 1. 2. — Sparsa urceolata sed limbus erectus subrepandus.

2. *S. RADIATA* (Pers. obs. 2. p. 73; myc. eur. 1. p. 336.) immersa orbicularis limbo niveo integro aut sublacero pulverulento. — Ad ramos exsiccatos. — Fl. fr. 2. p. 270. Grev. cr. fl. t. 227. *Peziza marginata* Sow. fung. t. 16. *Lichen excavatus* Hoffm. en. lich. t. 7. f. 4. *Sphaerobolus rosaceus* Tode meck. 1. t. 7. f. 58. *Lycoperdon radiatum* Linn. — Valde varia, urceolata, ore primum clauso punctiformi, hymenio plano in fundo locato aurantio secundente tum discus albus.

3. *S. ARUNDINACEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 336.) immersa orbicularis nitida, margine prominente integrerrimo, disco cærulecente. — In culmis vetustis Arundinaceis Jurassi detexit cl. Chaillet ex Persoon. — Gregaria.

4. *S. PELVICULA* (Pers. myc. eur. 1. p. 337.) orbicularis majuscula profundiexcavata lavis rufescenti-pallida. — Ad ramos siccos Salicis in Jurasso. — Lin. 1-2 lata subnitida margine corticis subprominente cincta in formam cupulæ.

5. *S. PALLIDA* (Pers. obs. 2. t. 6. f. 7; myc. eur. 1. p. 338.) gregaria immersa punctiformis pallida, ore connivente subelliptico delhiscente. — Ad ligna

734 ACOTYL. SEU CELLULARES.

exsiccata cariosa. — *Peziza punctiformis* Pers., syn. p. 674. — In ligno paucim determinate expallente sparsa observantur puncta albida macula oblonga albidiore cincta; sub lente observatur hymenium urceolatum gilvo-pallidum ligno parum prominente cinetum; discus urceolatus variat albidus incarnatus luteolus.

6. *S. HEMISPHERICA* (Fries syst. myc. 2. p. 196.) prominens hemisphaerica punctiformis nigra ore subconnivente rotundo intus pallida. — Ad ligna *Pinea agri Lezurense* (cl. Prost.). — Facies ferè Sphaeriæ; primò clausa dein hians ore rotundo disco tenuissimo pallido demùm subrufescens.

II. XYLOGRAPHA Fries syst. myc. 2. p. 197.

Erumpentes ellipticæ vel elongatae margine tenui cinctæ humidæ molles siccæ contractæ subcorneæ; hymenium minute punctulatum demùm deliquescentes.

7. *S. PARALLELA* (Fries l. c.) erumpens striæforme primò clausum dein apertum, disco marginem obliterante rufescente in siccis nigro. — In ligno decorticato vetusto. — *Hysterium Abietinum* Pers. Fl. fr. 2. p. 169. *Hyst. parallelum* Wahlemb. *Opegrapha parallela* Ach. lich. — Striæ longitudinales; excipulum tenuissimum membranaceum.

III. PROPOLIS Fries syst. myc. 2. p. 198.

Ceraceæ firmæ rotundæ vel subdifformes; hymenium lave in pulverem fatiscens.

8. *S. FARINOSA* (Pers. myc. eur. 1. p. 339.) orbicularis elliptica convexo-plana, disco farinaceo subrimoso, margine subprominente nigro. — In ligno Populi nigrae a cl. Dufour detecta ex Pers. — Disciformis lineam lata extus nigrescens.

9. *S. VERSICOLOR* (Fries exs. n. 276; syst. myc. 2. p. 198.) immersa suboblonga plana, marginè accessorio fatiscente, disco demùm farinaceo. — Ad ligna exsiccata duriora. — *Gregaria* 1-2 lin. longa.

a. Faginea, disco lacteo albo demùm nigrescente. — *S. Faginea* Pers. myc.

eur. 1. p. 337. *Tremella Saligna* Alb. et Schw. t. 9. f. 7.

b. viridis, disco æruginoso pulvaceo. — *S. viridis* Pers. myc. eur. p. 338.

c. Hippocastani, disco fusco demùm nigro rimoso. — *S. Hippocastani* Pers.

XI. CENANGIUM Fries scl. suec. exs. dec. XII; syst. myc. 2. p. 177. Ad. Brongn. class. champ. p. 82. — Pezizæ Sclerodermatis et Triblidii sp. Pers. myc. — Pezizæ, Sphaeriæ et Hysterii sp. DC.

Receptaculum primò arcte clausum demùm plus minusve apertum marginatum epidermide crassâ discolori; hymenium lave persistens; thecae fixæ paraphysibus intermixtæ sæpè connatæ, sporulis secedentibus. — Fungi minores subdifformes gregarii vel cespitosi centro adfixi sæpè stipitati innato-erumpentes; substantia duplex, exterior coriacea membranacea, interior subgrumosa. — An ut censem cl. Brongn., subgenera 4 ut genera potius habenda.

I. SCLERODERRIS Fries l. c.

Erumpentes liberatae substipulatae; receptaculum primò Sphaeriæforme dein apertum, ore orbiculari integro.

1. *C. Ribis* (Fries l. c.) cespitosum subnudum fusco-nigrescens, cupulæ sub-turbanatae, margine fimbriato connivente, disco pallido, stipitibus in tuberculum connatis. — Ad ramos exsiccatos Ribis, rubri et nigri. — *P. Ribesia* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 19. — Dense cespitosa; cupulæ rugulosæ primò globosæ dein turbinatae sed ob marginem conniventem collapso-cupulatae, nec nisi jove pluvio apertæ, internâ substantiâ albida.

2. *C. REPARDUM* (Fries in Mong. et Nestl. vog. n. 890.) dense cespitosum micrum, cupula obconico-cylindrica primò subclavata superne plano-rotunda demum dehiscente, disco pallido, stipitibus basi in tuberculatum subconnatis. — Ad ramos Ribis petræ in præruptis montis Hohneck Vôgesorum, vere. — Cespites parvi, cupulis paucis dense confertis.
3. *C. HYPODERMIUM* (Dub. mss.) cespitosum subiculo maculæformi griseo demum atro pulvulento insidens, primò tuberculatum subrugosum griseum, dein cupulas elongatas obconico-teretes glabras extus nigras superne planas albo-griseas margine nigro aut obsoleto explicans. — Ad corticem Cerasi sub epidermide occultatum. — *Peziza hypodermia* DC. fl. fr. 5. p. 19. — Cespites inæquales epidermidem sublevantes sed raro erumpentes; juniores sistant tubercula sphæriæformia grisea; demum protruduntur cupulæ elongatæ firmæ subcylindricæ deorsum sensim attenuatæ vix semilineam altæ.
4. *C. CERASI* (Fries l. c.) subcespitosum difforme primò tuberculatum rugosum argillaceo-rufescens dein cupulas superne planas nigrescentes explicans. — Ad ramos exsiccatos Cerasi. — *Junior*: *Sphæria dubia* Pers. ic. pict. t. 20. f. 1. *S. achroa* DC. fl. fr. 5. p. 125. *Adulta* *Peziza Cerasi* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 19. Mong. et Nestl. vog. exs. n. 494. — Cespites inæquales transversim erumpentes, juniores sistant tubercula pallida quæ disjecta ostendunt celulas obscuriores lineares; demum protruduntur cupulæ crassæ lineam et ultrà latæ.
- β. Padi* (Fries) subsolitarium subtus ferrugineum disco nigrescente. — In Pruno Pado. — *Sphæria padina* Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 667.
5. *C. PRUNASTRI* (Fries l. c.) subcespitosum subcorneum nudum nigricans, cupulis primò subulæformibus dein apertis concavis substipitatis. — Ad ramos siccos Pruni domesticæ. — *Peziza Prunastri* Pers. Fl. fr. 5. p. 20. — Vix lineam latum.
- β. rigidum* (Fries) atrum primò attenuato-rostellatum pertusum demum in cupulam stipitatam dilatum. — *Sphæria rigida* DC. fl. fr. 5. p. 132. — Ad ramos Pruni spinosæ e cortice erumpunt subulæ rudes teretes sursù leviter attenuatæ sèpè curvatæ quæ rarissime in Cenangium explicitantur.
6. *C. AUCUPARIAE* (Fries l. c.) cespitosum nigrum albido-pulvulentum cupulis primò elongato-subcylindricis clausis demum apice apertis. — Ad ramos Sorbi Aucupariae, propè Parisios ex cl. Chevall. — *Sphæria Aucupariae* Pers. syn. 51. — Stipites bini vel terni deorsum sèpè connati. Habitum cum Sphæriis cespitosis convenit sed receptacula nulla distincta adsunt demumque apice cupulas minutæ explicat.
7. *C. CHLORELLUM* (Fries el. fung. 2. p. 21 ex cl. Mong.) cespitosum nigricans pulvere atro-viridi densè obtectum, cum stipite brevissimo confluens, cupulis globoso-obconicis primò concavis demum apertis. — Ad ramos Pinii Piceæ in Vogenesis (cel. Mongeot). — Cupulæ minutæ 2-7 in cespitem densum congestæ primò albo farctæ demum evacuatæ.

II. *TRIBLIDIUM* Fries l. c. — *Triblidium Rebent. ind. p. 40.* —
Triblidii sp. Pers. myc. eur.

Erumpentes liberatæ substipitatæ; receptaculum orbiculare primò pezizoidum dein rimis pluribus e communi centro hiætibus apertum extus subrugosum.

8. *C. CALICIFORME* (Fries l. c.) solitarium subsessile globoso-depressum e rimis minutis rugoso-verrucosum opacum atrum laciñato-dehiscens, disco pallido. — Ad trunco Quercus. — *Peziza Hysterium* Pers. syn. 671. *Triblidium caliciforme* Rebent. Pers. myc. eur. 1. t. 2. f. 3. 4. *Cyphelium scabrosum* Ach. in vet. ac. handl. 1815. t. 6. f. 10. — *Sparsum* vel *gregarium* e rimis corticis erumpens sed adultum omnino superficiale apprens, lincam latum; discus pallidus demum griseo-niger.

736 ACOTYL. SEU CELLULARES. CERANGIUM.

9. *C. PINASTRI* (Fries l. c.) erumpens substipitatum difforme rugosum atro-nitena demùm in lacinias plures obtusas dehiscens, disco albido. — Ad corticem Pini et Abietis emortuarum frequens. — *Peziza Pinastri* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 20. *Triblidium Pinastri* Fries scl. exs. n. 55. Moug. et Nestl. vog. n. 587. — Valde polymorphum; cupula clausa etiam depressa et acutè marginata, dissecta intùs alba.

10. *C. SERIATUM* (Fries l. c.) gregarium globoso-depressum rugosum nudum atrum in lacinias obtusas lacerum, disco fuligineo-atro. — Ad corticem Betulæ in Vogenesis (cel. Mongeot), propè Lille ex cl. Desmaz., aut. hyeme. — *Phacidium seriatum* Fries el fung. 2. p. 131. ex cl. Mong. *Peziza truncatula* Rebent. neom. p. 388. non Pers. — Per rimas corticis transversales erumpens; stipes brevia inter corticem nidulat; cupulae opacæ clausæ centro depresso demùm apertæ.

III. *CLITHRIS* Fries l. c. — *Pezizæ* et *Hypodermatis* sp. DC. — *Triblidii* sp. Pers. myc..

Eruptentes liberatæ primò compressæ clausæ dein rimâ longitudinali dehiscentes subsessiles Hysteriformes, extùs subprainosæ.

11. *C. ABIEIS* (Dub. miss.) gregarium coriaceo-membranaceum subsessile rugosum subprainosum cervino-nigrescens ore compresso inflexo humido patulo, disco lutescente. — Ad ramos exsiccatos Abietis et Pini sylvestris. — *C. ferrugineum* Fries syst. myc. 2. p. 187. Grev. crypt. fl. t. 197. *Peziza Abietis* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 20. Moug. et Nestl. exs. 399. *Triblidium pineum* Pers. myc. eur. 1. p. 332. — Admodum varians, primò simillima *Sphæria* receptaculis subrotundis pulvere ferruginoso tectis, dein 1-2 lin. lata subnuda humida aperta subrotunda.

β. strobilina (Alb. et Schw.) sparsa e badio nigricans. — Ad strobilos Abietis. — *P. strobilina* DC. fl. fr. 5. p. 21.

12. *C. DIVFORMA* (Fries in Moug. et Nestl. vog. n. 889.) gregarium membranaceum breviter stipitatum rugosum fusco-brunneum humidum nigricans, ore compresso inflexo humido hiante, disco fusco. — Ad ramos Salicis Capræ in Vogenesis, vere ac æstate. — *C. fuliginosum* Fries el. fung. 2. p. 23. qui hocce habet ut statum perfectum *Sphæria* fuliginosæ Pers. syn. non Moug. et Nestl. vog. n. 770. quæ *S. Quercinum* Fries est. — Plagas longas in cortice occupans, densè cespitosa; cupulae conicæ orbiculares aut compressæ mox Triblidio mox Clithri referendæ.

13. *C. QUERCINUM* (Fries syst. myc. 2. p. 189.) simplex gregarium elongatum flexuosum primò clausum prainosum nigricanti-cinereum, demùm disco lato pallido apertum. — Ad ramos demortuos Quercùs. — *Hysterium Quercinum* Pers. syn. 100. Nees syst. f. 300. *Hypoderma Quercinum* DC. fl. fr. 2. p. 306. *Sphæria collapsa* Sow. 1. 373, f. 3. *Hyst. nigrum* Tode meck. 2. t. 8. f. 64. *Variolaria corrugata* Bull. champ. t. 432. f. 4. — Aliquot lineas longum; cupula aperta lata subnavicularis submembranacea.

IV. EXCIPULA Fries l. c.

Innatæ soberuptentes sessiles nudæ vasculiformes; réceptacula cornea sub-clausa demùm aperta ore orbiculari integerimo, disco minuto molli subdelineante.

14. *C. TURGIDUM* (Dub. miss.) erumpens, cupulis subcoriaceis rugulosis nigris, disco concavo albido humectato molli turgido. — Ad ramos exsiccatos Coryli, autumno. — *Excipula turgida* Fries l. c. *Peziza leucomela*? Pers. DC. fl. fr. 5. p. 21. — Sparsa margine erecto.

15. *C. RUBI* (Fries exs. n. 101; syst. myc. 2. p. 190.) innato-erumpens, cupulis subcorneis laevibus planinsculis atris, demùm disco aperto pallescente. — Ad ramos Rubi Idæi, in Vogenesis (cl. Mongeot), propè Parisios ex Chevall. — *Corticis epidermaidi innascens*.

16. *C. ASPERUM* (Dub. miss.) punctiforme minutissimum subsphaericum costato-

asperum siccum nigricans ore subconnivente albido. — Ad basin caulum aridorum Osmundæ regalis in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), propè Parisios ex Chevall., vere. — Excipula aspera Fries syst. myc. 2. p. 597. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 886. Chevall. fl. par. 1. t. 9. f. 8. et 8 d.

17. *C. sphærioides* (Dub. mss.) punctiforme minutissimum innato-superficiale hypophyllum atrum, margine inflexo, disco pallido. — In foliis deciduis Salicis Capreæ. — Excipula sphærioides Fries exs. n. 138; syst. myc. 2. p. 191. *Xyloma sphærioides* Pers. syn. 106. DC. fl. fr. 5. p. 161. — Sphæriam punctiformem referens sed discus apertus margine tenui crispulo cinctus.

XII. TYMPANIS Tode meck. 1. p. 23. Fries syst. myc. 2. p. 173. Ad. Brongn. class. champ. p. 83. — Pezizæ sp. Pers. DC.

Receptaculum cyathiforme marginatum, discus corneus concolor membranulâ tenui fugacissimâ primò obtectus; hymenium primò membranulâ tectum demùm unà cum thecis tenuibus fixis fatiscens. — Fungi minores gregarii primò innati dein erumpentes, cupulâ nigricante subturbanâ etiam in stipitem productâ, disco aperto planiusculo.

* *Disco magis aperto.*

1. *T. FRANGULÆ* (Fries syst. myc. 2. p. 174.) sessilis turbinato-truncata orbicularis opaca nigricans, disco umbrino marginem suboblitante. — Ad ramos exsiccatos Rhamni Frangulæ propè Parisios ex cl. Chevall., vere. — *Sphæria versiformis* var. *Rhamni* Alb. et Schw. — *Gregaria passim cespitosa*, cortici innata vix lin. alta.
f. *substipitata*, stipite crasso brevissimo. — In Vogesis (cl. Mougeot), circa Glatigny propè Beauvais ex cl. Graves. — *Peziza Frangulæ* Pers. myc. 1. p. 324.
2. *T. ALNEA* (Fries l. c.) substipitata opaca umbrino-nigrescens, cupulâ subflexuosa obsoleta marginatâ. — Ad ramos sicclos Alni propè Parisios ex cl. Chevall., Lille ex cl. Desmaz., vere. — *Peziza Alnea* Pers. myc. eur. 1. p. 325. — Parva, exsiccata disco excavata vel potius margine magis prominente distincta non verò clausa. An prioris var. ut suspicatur cel. Fries?

* * *Disco primò clauso mox aperto.*

3. *T. CONSPERSA* (Fries l. c.) cespitosa, primò clausa sphæriæformis nuda atra mox aperta e velo fatiscente albo-pulverulenta. — Ad ramulos præcipue Sorbi Aucupariæ sed etiam Pyri, Betulæ, Alni, etc. — *Peziza Pyri*, P. Aucupariæ et P. sphærioides Pers. myc. eur. 1. p. 327 et 328. P. sphærioides Roth. in Ust. ann. bot. 1. t. 1. f. 6. Nees syst. f. 231. *Sphæria versiformis* Fl. fr. 5. p. 127. an Alb. et Schw. ? — Cespites subrotundi stipati e corticibus erumpentes nunc ferè sessiles nunc stipitibus sàt longis infernè in tuberculum connatis; receptacula adulta disco magis dilatato margine tenui subirregulari.
4. *T. SALIGNA* (Tode meck. 1. t. 4. f. 37.) sessilis subelongata nitidula atra, disco concavo marginato. — Ad ramos exsiccatos Salicis propè Parisios ex cl. Chevall., veré. — Fries l. c. Chevall. fl. par. 1. t. 9. f. 11. auct. — *Gregaria subcespitosæ* undè passim connata; junior globularis dein sàpè elongata apice semper obtuso truncata. Velum bombacinum candidum dein fugax.

XIII. DITIOLA Fries syst. myc. 2. p. 169. Ad. Brongn. l. c. — *Tubercularia* Tode fung. 1. p. 18.

Receptaculum orbiculatum patellatum marginatum nunquam clausum sed velo universali membranaceo fugaci tectum; hymenium discoideum primò lève velatum cum receptaculo concretum dein nudum tumens gelatinosum corrugato-plicatum deliquescens; thecae tenerrimæ fixæ deliquescentes. — Fungi gregarii firmi stipitati stipite cum cupulâ con-

738 ACOTYL. SEU CELLULARES.

fluente, primò tuberculiformes mox plano-concavi; margine demum ex hymenio turgido reflexo oblitterato.

1. **D. RADICATA** (Fries l. c.) disco planiusculo aureo, stipite crasso villoso albo radicato. — E lignis decorticatis fabrefactis vel sylvestribus Pini *sylvestris* erumpens, in Jurasso. — *Peziza Turbo* Pers. myc. eur. 1. p. 321. *Leotia tuberculata* Fl. dan. t. 1378. f. 2. *Helotium radicatum* Alb. et Schw. t. 8. f. 6. *Tuberularia flavescens* Rebent. neom. t. 3. f. 15. — *Buxb. comm. petr.* 4. t. 283. f. 5. — Stipes brevis crassus ex individuis pluribus (2-4) connatis sàpè ramosus plerumque 2-3 lin, longus subinde nullus; discus 1-4 lin. latus formâ varius; hymenium primò valde tenue velo albido tectum dein firmum rubrum, mox tumens mollius aurantiacum tandem deliquescent et a receptaculo secedens.

XIV. BULGARIA Fries syst. myc. 2. p. 166. Ad. Brongn. class. champ. 83. — *Burcardia* Schmied. anal. pl. 3. p. 261. — *Pezizæ* sp. Pers. DC.

Receptaculum orbiculatum marginatum ventricoso-turbanatum primò clausum mox apertum planiusculum intùs gelatinosum extùs rugosum; hymenium discoideum laeve glabrum nudum persistens; thecæ magnæ distinctæ primò hymenio immersæ demum cum sporidiis elasticè erumpentes paraphysibus persistentibus immixtæ. — Fungi gregarii crassi elasticici tremelloso-gelatinosi plerumque è corticibus erumpentes.

1. **B. INQUINANS** (Fries l. c.) turbinata firma extùs rugulosa furfuracea umbrina, disco planiusculo atro-inquinante. — Ad trunco cæsos præsertim Quercinos, frequens. — Chevall. fl. par. 1. t. 9. f. 4. *Peziza nigra* Bull. champ. t. 460. f. 1. Fl. fr. 2. p. 89. Sow. fung. t. 428. Mong. et Nestl. exs. n. 197. *P. inquinans* Pers. *Ascobolus inquinans* Nees syst. f. 296. — Hall. helv. t. 48. f. 8. — Junior obovata clausa firma dein discus dilatatus plano-convexus.
2. **B. SARCOIDES** (Fries l. c.) cespitosa polymorpha firmula incarnato-rubra extùs subvenosa, disco incarnato. — Ad trunco cæsos subputridos. — *Peziza sarcoides* Pers. myc. eur. 1. p. 320. *P. tremelloidea* Bull. champ. t. 410. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 89. *Helvella sarcoides* Bolt. fung. t. 101. f. 2. *Elvella purpurea* Schœff. fung. t. 323, 324. *Lichen sarcoides* Jacq. misc. 2. t. 22. — Specimina maxima uncialia plus minus repanda et diformia extùs subtomentosa; minora substipitata turbinata 2-3 lin. lata.

XV. ASCOBOLUS Pers. disp. meth. p. 35; myc. eur. 1. p. 340. — *Pezizæ* sp. Bull. DC.

Receptaculum orbiculatum submarginatum disco patellæformi; hymenium discoideum persistens; thecæ amplæ clavatæ maturæ emersæ discrete demum elasticè dissilientes sporidiis uniserialibus farctæ. — Fungi minuti gregarii molles simili colo primò subconniventes mox aperti sessiles vel brevissimè stipitati.

1. **A. FURFURACEUS** (Pers. obs. 1. t. 4. f. 3-6.) sessilis subconcavus fuscus vel virescens externe furfuraceus. — In fimo vaccino frequens. — Bern. manip. 4. t. 6. f. 5. Grev. crypt. fl. t. 307. *Peziza stercoraria* Bull. champ. t. 376. DC. fl. fr. 2. p. 79. *P. fusca* Bolt. fung. t. 109. f. 2. *Elvella fimetaria* Scop. in ann. hist. nat. 4. t. 1. f. 6. — *Gregarius* 1-2 lin. latus primò elatus distinctè marginatus.
2. **A. GLABER** (Pers. obs. myc. 1. t. 4. f. 3-b, f. 7. a. b. c.) sessilis minutus glaber nitens subconvexus marginatus spadiceus. — In fimo vaccino vulgaris. — Confertus colore varius primò rubens dein spadiceus demum niger.
3. **A. IMMERSUS** (Pers. obs. 1. t. 4. f. 7. d. e.) immersus irregularis subconicus marginatus externe subfurfuraceus. — In fimo vaccino propè Parisios ex cl. Chevall., varius. — Praecedenti proximus sed totus ferè immersus solummodo

nudo oculo thecis longioribus et ob sporidia iis inclusa nigrescentia sese manifestans.

4. *A. CARNEUS* (Pers. syn. p. 676; myc. eur. 1. p. 341.) sessilis planus immarginatus glaber carneus. — In fino vaccino propè Beauvais (cl. Graves), Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 165. — Gregarius superficialis minutus $\frac{1}{2}$ lin. latus.

XVI. PEZIZA Dill. gen. p. 74. — Pezizæ sp. Pers. DC. — Pezizæ sp. et Patellaria Fries syst. myc. 2. p. 41 et 158.

Receptaculum marginatum patellæ-aut cupulæforme primò subclavatum demùm apertum, epidermide contiguâ; hymenium lave persistens distinctum; thecæ amplæ fixæ sporidia elasticè ejicienda incurrentes. — Fungi carnosæ vel ceracei, centro affixi passim stipitati libere evoluti plus minus cavi demùm planiusculi.

Sect. 1. PEZICA. — *Peziza* Fries syst. myc. 2. p. 41. Ad. Brongn class. champ. p. 84.

Receptaculum cupulæforme; thecæ distinctæ paraphysibus immixtæ.

Ser. 1. ALEURIA l. c.

Cupulæ carnosæ molles fragiles; velum universale concretum tenuë superficiem pruinosa vel flocculoso-furfuracea reddens. — Species majores ferè omnes terrestres.

I. *Helvelloidea* (Fries l. c.). Velum tenuë; cupula semper aperta vel junior connivens nunc integra nunc dimidiata vel contorta; sporidia sporis duobus fæta. — Magnæ terrestres.

1. *Acetabula* (Fries l. c.). Stipes crassus sulcatus; cupula subintegra.

1. *P. ANCILIS* (Pers. myc. eur. 1. p. 219.) griseo-brunnea integra, stipite brevissimo apice costato-diviso, ramulis crassisculis cum cupulâ coalitis. — Ad terram in sylvulis circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, vere. — Stipes terræ immersus nonnullas lineas longus sub cupulâ ad medium in ramos 6 præcipuos divisus; cupula 2-3 unc. lata externè farinosa basi albicans.

2. *P. ACETABULUM* (L. sp. 1650.) cyathiformis fuliginea extùs venis ramosis e stipite brevi fistuloso lacunoso porrectis sulcatâ. — Ad terram in sylvis umbrosis undis, vere. — Bull. champ. t. 485. f. 4. Fl. fr. 2. p. 84. Sow. fung. t. 59. — Vaill. bot. t. 13. f. 1. — Stipes $\frac{1}{2}$ unc. vel ultrà longus crassus pallidus; cupula profundè excavata demùm rimosa 1-2 unc. lata.

3. *P. SULCATA* (Pers. syn. p. 643. t. 5, f. 1.) minor hypocateriformis expallens albida extùs lœvis, stipite farcto crasso sulcato. — In sylvâ Compiègne ex cl. Graves, vere. — Pers. myc. eur. 1. p. 219. — Stipes unc. 1 longus 4 lin. circiter crassus; cupula $\frac{1}{2}$ unc. lata disco e fuligineo expallente.

β. *leucomelas* (Fries), disco nigrescente. — *P. leucomelas* Pers. myc. cur. 1. p. 219 non p. 310.

2. *Cochleatæ* (Fries syst. myc. 2. p. 46.). Cupula subsessilis extùs pruinosa dimidiata vel obliqua flexuoso-contorta, demùm saepius uno latere incisa subconvoluta.

4. *P. VENOSA* (Pers. syn. p. 618.) sessilis subcontorta badio-umbrina infernè alba venis costatis rugosa. — Ad terram in sylvis propè Parisios ex cl. Chevall., vere. — Elvella cochleata Wulf. in Jacq. misc. aust. 2. t. 17. f. 1. — Unc. 1-2 lata junior subglobosa integra mox aperta hemisphærica, subtus pruinosa.

5. *P. BADIA* (Pers. obs. 2. p. 78.) subsessilis integra flexuosa brunnea margine primò involuto, extùs pruinosa dilutior subolivacea. — In sylvis frondosis ad terram. — Fl. fr. 2. p. 593. Helvella cochleata Bolt. fung. t. 99. — Vaill.

740 ACOTYL. SEU CELLULARES. PRIZA.

bot. t. 11. f. 8. — Subcespitosa difformis 1-2 unc. lata extus basi villosa; discus versicolor.

6. *P. ABETINA* (Pers. syn. p. 637.) subcespitosa concava flexuosa integra subcinnamomea extus farinosa basi lacunosa albido-villosa. — In sylvis Abietinis collieulosis passim, ang.-oct. — *P. grandis* Pers. syn. p. 639. — *Magna* 1-2 unc. lata unciam alta sèpius stipitata. Variat cinnamomea, ferruginea aut olivaceo-umbrina.

f. rubiginosa (Pers.) gregaria majuscula rubiginosa externè dense farinosa, stipite brevissimo subtomentoso. — In Vogenesis, præsertim ad margines viarum sylvaticarum. — Unc. lata obiecta polvere farinaceo concolore in verrucas acutas compacto.

7. *P. LEPORINA* (Batsch. el. p. 117.) substipitata uno latere elongata auriformis subferruginea extus farinosa basi et intus lèvis. — Ad terram inter muscos in pinetis, aug.-oct. — Pers. syn. 637. *P. felina* Pers. myc. eur. 1. p. 223. *P. anticula* Schæff. fung. t. 156. fl. dan. t. 1077. f. 2. *P. cochleata* Holmsk. — *Gregaria erecta* lateraliter dehiscens 1 unc. alta, $\frac{1}{2}$ unc. lata et ultra; stipes brevissimus. Occurrit etiam fusca pallidè umbrina alutacea cinerea etc.

8. *P. CANTHARELLA* (Fries syst. myc. 2. p. 48.) stipitata uno latere elongata auriformis lutea extus glaberrima venosa. — Ad terram in sylvâ Abietinâ propè Liergue in agro Lugdunensi ex cl. Balbis, sept. — *Balb. fl. lugd.* 2. p. 305. — *Cantharelli* speciem referens, stipes brevissimus distinctus basi albido-villosus unâ cum copulâ 2 unc. alta.

9. *P. ONOTICA* (Pers. syst. p. 637.) substipitata uno latere elongata auriformis extus farinacea intus rosea basi demùm rugosa. — In sylvis frondosis ad folia dejecta rariùs, aest., aut. — Dittm. in Sturm. deutsch. fl. 3. t. 16. *P. leporina* Sow. fung. t. 79 non Batsch. — Plerumque solitaria, cupula firma oblique aperta *P. leporinâ* major.

10. *P. COCCINEA* (Schæff. fung. t. 148.) subsessilis irregularis obliqua cespitosa coccineo-aurantiaca extus subpruinosa albida. — Ad terram secus vias et ad radices truncorum Quercùs et Fagi, aut. — Bull. champ. t. 474. Fl. fr. 2. p. 86. Sow. t. 78. *P. aurantiaca* Fl. dan. t. 657. f. 2. Nees syst. f. 279. Fries syst. myc. 2. p. 49. *P. dichroa* Holmsk. ot. 2. t. 7. — Berg. phyt. 2. t. 49. — Peimò integra dein flexuosa et contorta 1-2 unc. lata; in seriem aut circulum crescens.

11. *P. CONCINNA* (Pers. myc. eur. 1. p. 221.) cespitosa magna fragillima externe citrina demùm rugulosa intus incarnato-pallida. — Ad folia Quercùs dejecta in sylvis circa Parisios, aest. — *Elvella vesiculosus* Bolt. fung. t. 175. E. scutellata Schæff. t. 150. — Individua majora palmaria.

12. *P. COCHLEATA* (Linn. sp. 1625.) sessilis cespitosa magna auriformis externe umbrina extus pruinosa. — Ad terram in sylvaticis, aest., aut. — Fl. fr. 2. p. 88. Bull. champ. t. 154. f. 2. *P. umbrina* Pers. *Elvella ochroleuca* Schæff. t. 274. — Weium. phyt. t. 522. f. F. — Buxb. comm. petr. 4. t. 29. f. 1. — Plerumque 1-2 unc. lata raro 3-4 unc., plus minus irregularis et contorta.

f. alutcea (Fries) minor subsessilis contorta externe albida intus pallescenti-ferruginea. — *P. alutacea* Pers. *P. ochracea* Schæff. t. 155.

13. *P. EKOCROEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 220.) magna solitaria alutaceo-cinerea convoluta internè basi tuberculosa albida, radice crassâ horizontali. — In sylvis circa Parisios unicà vice reperiit cl. Persoon. — Cupula $1\frac{1}{2}$ unc. alta $\frac{3}{4}$ unc. lata externe squamulosa deorsum terreo-fuliginea fragilis.

13. *Pustulatae* (Fries syst. myc. 2. p. 51.). *Cupula sessilis* passim basi radiciformi stipitata centralis e formâ marsupii expansa integra sed margine subinciso, extus granulosa vel verrucosa.

14. *P. CORONATA* (Jacq. misc. 2. t. 10. non Bull. nec Batsch.) sessilis magna inciso-repanda intus subrugosa fusca aut lutescens extus farinosa albida basi radicato-producta. — Ad terram, ad truncos vetustos mucidos propè Beauvais ex cl. Graves, propè Lille ex cl. Desmaz. — Pers. myc. eur. 1. p. 231. P.

repanda Pers. ic. pict. t. 22. f. 3. Fries syst. myc. 2. p. 51. Grev. cr. fl. t. 59.
— *Solitaria vel subcespitoso*, junior concava cyathiformis demum 1½-4 unc.
lata valde fragilis.

15. *P. CEREA* (Sow. fung. t. 3.) magna infundibuliformis repanda intescens extus basisque stipitiformis villosa albida. — Ad terram in hortis simetosis coriariis, aest., aut. — Pers. myc. eur. 1. p. 232. DC. fl. fr. 5. p. 27. Bull. herb. t. 44? — *Gregaria subcespitoso* valde fragilis ventricosa 1-2 unc. lata demum subfuliginea.
16. *P. LYCOPEROIDES* (DC. fl. fr. 2. p. 87.) major integra sessilis primò globoso-turbinata connivens dein campanulata ore subcrenato fuscescenti-albida extus furfuracea pallida. — In simetis, ad terram pingue, etc., vere, aut. — *P. vesiculosa* Bull. champ. t. 457. f. 1. E. F. Fries syst. myc. 2. p. 52. Pers. myc. eur. 1. p. 228. Grev. cr. fl. t. 107. Elvella Lycoperdoides Scop. — Mich. gen. t. 86. f. 2. — Junior globosa mox turbinata demum hemisphaerica ½-3 unc. lata; color variat albidus albido-ferrugineus rarius fuscus.
17. *P. PUSTULATA* (Pers. syn. p. 646; myc. eur. 1. p. 226.) sessilis subglobosa pallida subfuliginea extus albido-furfuracea, margine integro. — In sylvis locis deustis humidis et alibi ad terram uidam propè Parisios ex cl. Chevall., aest., aut. — *P. spurcata* Pers. l. c. Octospora pustulata Hedw. musc. fr. 2. t. 6. f. A. — Basi applanata ½ unc. circiter lata demum magis expansa margine inflexo obtuso.
18. *P. PLICATA* (Pers. myc. eur. 1. p. 226.) sessilis majuscula subglobosa griseocinerea extus subfurfuracea intus livescens, ore subuplicato. — Ad terram in sylvula Romainville propè Parisios ex cl. Persoon, nov. — Adulta semiunciam magna cerea fragilis. Praecedenti nimis affinis ex ipso Pers.

II. *Geopyxis* (Fries syst. myc. 2. p. 55.). *Velum innatum; cupula junior subglobosa clausa dein aperta orbicularis; sporidia simplicia.* — *Terrestres.*

1. *Macropodes* (Fries l. c.). *Stipes elongatus gracilis; cupula subtenera.*
19. *P. STIPITATA* (Huds. ang. 2. p. 639.) cupulâ hemisphaericâ hirto-verrucosâ cinereâ, disco inurino-expallente, stipite longissimo attenuato nunc laevi nunc irregulariter lacunoso. — Ad terram in umbrosis, aest., aut. — Bull. champ. t. 457. f. 2. Fl. fr. 2. p. 85. Sow. fung. t. 38. *P. macropus* Pers. Fl. dan. t. 1200. f. 2. Fries syst. myc. 2. p. 57. Grev. crypt. fl. t. 70. *P. hispida* Schæff. t. 166. Bull. t. 196. Bolt. t. 96. — Buxb. comm. petrop. 4. t. 29. f. 2. — *Solitaria aut subgregaria* 1-3 unc. alta; cupula uncialis demum explanata fuligineo-livida sicca albida.
- β. *hirta* (Fries) minor magis villosa, disco nigricante. — *Octospora hirta* Hedw. musc. frond. 2. t. 19. f. B.
20. *P. BULBOSA* (Nees syst. f. 289.) cupulâ hemisphaericâ cinerascente minuto squamułosâ, disco fusco, stipite firmo tuberoso. — In sylvis ad terram nudam humidam umbrosam, propè Parisios ex Chevall., aest., aut. — Pers. myc. eur. 1. p. 236. *Octospora bulbosa* Hedw. musc. fr. 2. t. 10. f. C. — Buxb. l. c. t. 29. f. 3. — Stipes ½ unc. et ultra longus lineam vix crassus laevis vel sublacunosus; cupula ½-1 unc. lata repanda. Antecedenti valde affinis.
21. *P. TUBEROSA* (Bull. champ. t. 485. f. 2. 3.) tenuis, cupulâ infundibuliformi spadiceâ expallenti, stipite elongato basi tuberi nigro difformi innato. — Ad terram in nemoribus umbrosis humidis et pratis muscosis, vere. — Fl. fr. 2. p. 84. Sow. fung. t. 63. Moug. et Nestl. vog. n. 397. *Octospora tuberosa* Hedw. musc. 2. t. 10. f. B. — Stipes plus minus terræ immersus et radiciformis demum elongatus 1-3 unc. altus; cupula pyriformis demum dilatata 4-5 lin. lata.
22. *P. RAPULUM* (Bull. champ. t. 485. f. 3.) tenuis fragilis flavescens-fusca, cupulâ infundibuliformi glabrinculâ, stipite torto elongato deorsum fibrillis longis vestito. — Ad terram, humo profundè infixo. — Fl. fr. 2. p. 84. Nees

syst. f. 291. P. radicata Holmsk. ot. 2. t. 9. — Stipes 1-2 unc. longus; cupula repanda uncialis.

23. P. MELANIA (Pers. myc. eur. 1. p. 239.) fusco-atra, cupula campanulata glabra, stipite brevi striato basi fibrilloso subradicato. — In sylvis Abietinis suprà terram aut ligna putrida muscis tecta in Vogesis, propè Beauvais ex cl. Graves, vere. — P. Vogesiaca Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 584. — Buxb. comm. pet. 4. p. 282. f. 1. — Stipes 3-5 lin. longus; cupula unciam lata extus spadiceo-nigra, disco concavæ nigro.

2. *Cupulares* (Fries syst. myc. 2. p. 61.). *Cupula extus pruinosa membranacea vel carposa, stipite nullo vel brevissimo.*

24. P. CUPULARIS (Linn. suec. n. 1273.) subsessilis tenuis globoso-campanulata cervina vel pallens extus farinosa, margine crenato. — Ad terram, in fossis humidis. — Berg. phyt. t. 171. P. crenata Bull. champ. t. 396. f. 3. Pers. obs. myc. 2. t. 4. f. 6. 7. Fl. fr. 2. p. 86. — Vaill. bot. t. 11. f. 1-3. — Lin. 3-8 lata. Magnitudo et forma cupulæ glandis Quercinæ.

25. P. ARENARIA (Osbeck in vet. ac. handl. 1762. t. 7. f. 1-4.) sessilis radicata fusca extus verruculosa primò globoso-campanulata dein dilatata lacerata. — Ad terram in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, aut., hyeme. — Pers. myc. eur. 1. p. 241. P. sepulchralis Reb. neom. t. 4. f. 18. — Gregaria tenuis; cupula extus verrucis acutis minutis muricata $\frac{1}{4}$ -1 unc. lata.

26. P. PURPURASCENS (Pers. myc. eur. 1. p. 242. t. 12. f. 10.) subgregaria sessilis livido-purpurascens, capula campanulata ore lato subobliqua. — Ad terram nudam, loco dicto *butte d'Aumont*, propè Senlis ex cl. Graves. — Ex icona laudato obscure fuliginea patens $\frac{1}{2}$ unc. lata passim incisa.

27. P. CAPREOLI (Pers. myc. eur. 1. p. 298.) sessilis obconica e livido-purpurascens, sicca umbrina, extus subrugosa, margine membranaceo prominente. — Suprà sterlus Cervi Capreoli in sylvâ Vincennes ex cl. Pers., aest. — P. undella Fries. — Cupulæ dense approximatæ subcrassæ lin. $1\frac{1}{2}$ latæ, pyriformes, extus subvenosæ.

28. P. GRANULOSA (Bull. champ. t. 438. f. 3.) minuta sessilis aurantio-rubra extus papillis rugoso granulata. — Ad fimum imprimis vaccinum, aut. — Fl. fr. 2. p. 79. Pers. myc. eur. 1. p. 298. P. scabra fl. dan. t. 655. f. 2. — Rai syn. 3. t. 24. f. 2. Vaill. bot. t. 13. f. 14. — Gregaria primò globosa demum explanata margine subserrato.

III. *Humaria* (Fries syst. myc. 2. p. 67.). *Velum tenue subfilamentosum fugax submarginale; cupula sessilis integra hemisphærica explanata carnosa parva; sporidia sporounico fæta. — Terrestres.*

1. *Lomeæ* (Fries l. c. p. 42.). *Subsessiles concavæ.*

29. P. FULGENS (Pers. myc. eur. 1. p. 241.) magna sessilis campanulata integra superne rubra inferne alba. — In pinetis Helvetiae propè Neufchâtel ex cl. Persoon et probabiliter in Jurasso finitimo, maio, junio.

30. P. UTILANS (Rai syn. p. 19. n. 14.) subsessilis media e campanulato-explanata depressa extus tenuissime pubescens pallida, disco fulvo-rubro. — In sylvis circâ Beauvais ex cl. Graves, vere, aut. — P. utilans Fries syt. myc. 2. p. 68. P. ericetorum Pers. myc. eur. 1. p. 241. — Subgregaria sèpè stipite albido crasso terræ immerso instructa $\frac{1}{2}$ unc. lata extus subrugosa.

31. P. ARANEOSA (Bull. champ. t. 280.) exigua tenuis fragilis aurantio-miniata turbinata subtus fibrillis intricatis operta, cupula complanato-concavæ, stipite brevi firmo. — In sylvis umbrosis et in hortis. — Fl. fr. 2. p. 77. Pers. syn. p. 651 non myc. eur.

32. P. POLYTRICHI (Schum. säll. p. 423.) gregaria subsessilis orbicularis concauuscula cinnabarina extus dilutior pilis fasciculatis viridescentibus obsita. — Ad muscos turfosos in sylvâ Troissereux propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — P. turcosa Pers. myc. eur. 1. p. 246. — Lin. 1-2 lata acute marginata.

33. *P. LEUCOLOMA* (Rebent. fl. neom. p. 386.) sessilis sparsa e concavo plana rubra, margine albo lacinulato. — Ad terram inter muscos, vere, aut. — Fl. fr. 5. p. 23. Nees syst. f. 268. Octospora leucoloma Hedw. muse. frond. 2. t. 4. f. A. — Primò subglobosa clausa dein aperta scutelliformis 1-2 lin. lata.

34. *P. HUMOSA* (Fries obs. myc. p. 309.) sessilis carnosa concavo-plana glabra sanguineo-rubra, margine integerrimo. — Ad terram subudam propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — *P. cartilaginea* With. Sow. t. 369. f. 2. *Helvella cartilaginea* Bolt. fung. t. 101. f. 1. — Fl. dan. t. 656. f. 2. — Lin. 2-4 lata orbicularis subtus paulò dilutior; substantia neutiquam cartilaginea.

2. *Convexulæ* (Fries syst. myc. 2. p. 42.). *Sessiles convexæ.*

35. *P. OMPHALODES* (Bull. champ. t. 485. f. 1.) sessilis conferta fragilis, cupulis minutis planiusculis subumbilicatis ex aurantio lilacinis tomento albo fugaci incidentibus. — Ad terram in sylvaticis et etiam vaporariis et caldariis. — Bull. champ. t. 485. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 77. *P. confluens* Pers. obs. myc. 2. t. 5. f. 6. 7; myc. eur. 1. p. 274. — Variat colore luteo, aurantio, rubro, miniatu, incarnato, lilacino, situ confluenti-imbricato et distincto; cupulæ parvæ carnosæ non distinctè marginatæ subtus in statu juniore fibrillosæ.

IV. Encælia (Fries syst. myc. 2. p. 74.). *Velum universale fugax; cupula valde cava membranacea nunc fragilis nunc firma suberumpens. — Corticolæ.*

36. *P. POPULNEA* (Pers. syn. p. 671; myc. eur. 1. p. 329.) cespitosa sessilis coriaceo-membranacea difformis, cupulis concavis rugosis nigricantibus extus farinaceis. — Ad trunco emortuos putridos Fraxini, Salicis, et imprimis Populi Tremulæ. — Fl. fr. 5. p. 27. *P. fascicularis* Alb. et Schwein. t. 12. f. 2. Pers. myc. Fries. Desmaz. crypt. exs. n. 269. — Cespitosa cupulis 6-12 junctis, rarius solitaria; cupula hemisphærica sed compressa et margine sinuosa 4 lin. lata, cortici interiori adnata sed epidermide secedente superficialis evadens.

37. *P. AMPLIATA* (Pers. ic. pict. t. 8. f. 4; myc. eur. 1. p. 227.) sessilis carnosofragilis campanulata integerrima fuligineo-fusca extus subnuda. — Ad latera truncorum propè Parisios ex Chevall., aut. — Cupula tenuis a basi mox ampliata $\frac{1}{2}$ unc. alta et lata internè subcinnamomea externè pallida.

38. *P. FURFURACEA* (Roth. catal. 2. t. 9. f. 3.) solitaria aut subcespitosa sessilis carnosocoriacea extus pallida furfuracea, margine involuto integro, disco cinnamomeo-nigro. — Ad ramos Coryli, Alni incanæ. — Pers. myc. eur. 1. p. 328. *P. Coryli* DC. fl. fr. 5. p. 27. — Cupulæ semi-unciam circiter latæ extus undique furfure ferrugineo-pallido denso obsitæ.

39. *P. CINNAMOMEA* (DC. fl. fr. 5. p. 23.) erumpens sessilis carnosocoriacea tenuis rubiginoso-lateritia subtus pruinosa disco subimmarginato. — Ad Quercus trunco inter Lichenes, in Jurasso (cl. Chaillet), vere. — Pers. myc. eur. 1. p. 268. — *Gregaria vel fasciculata* plana aut margine undulato-sinuosa 1-2 lin. lata subtus glabra sed pulverulenta.

Ser. II. *LACHNEA* Fries syst. 2. p. 77.

Cupulæ ceraceæ firmæ rarius carnosæ; velum discretum distinctè villosum vel pilosum persistens cupulam setosam vel hirtam reddens. — Species minores vegetabilia emortua fere omnes incolentes.

V. Sarcoscypha (Fries l. c.). *Cupula carnosa vel carnosomembranacea; subiculum nullum. — Ad terram aut sœpius ad ligna carie plane consumpta nascentes.*

* *Stipitatae lignatiles.*

40. *P. COCCINEA* (Jacq. aust. t. 169. non Bull. DC.) cupulâ infundibuliformi extus stipiteque villo brevi adpresso tomentosis albidis, disco coccineo. — Ad ramos putridos ad terram dejectos humo plerumque tectos in locis hu-

744 ACOTYL. SEU CELLULARES.

PEZIZA.

midis umbrosis, febr.-apr. — Bolt. fung. t. 104. Nees syst. f. 288. Grev. crypt. fl. t. 171. P. epidendra Bull. champ. t. 467. Sow. fung. t. 13. Fl. fr. 2. p. 85. P. poculiformis Hoffm. er. t. 7. f. 5. — Buxb. comm. pet. 4. t. 29. f. 4. — Stipes firmatus sursūm incrassatus plerumque brevis $\frac{1}{2}$ uncialis; cupula uncialis et infrā marginē subcrenato.

41. P. MELASTOMA (Sow. fung. t. 149.) majuscula cespitosā, cupulā carnosā, disco urceolato nigro, extūs fuscescente pulvere rubiginoso adspersā, stipite brevi tomento denso radicante atro strigoso. — Ad trūcos muscosos aut radices terrā denudatas rariūs. — P. rhizopus Alb. et Schw. t. 1. f. 4. — Stipes 2-4 lin. longus, cupula 4-5 lin. lata.

* * Sessiles extūs lanatae vel pilis fasciculatis tectae. — Hemisphærica subterrestres majores.

42. P. NIGRELLA (Pers. syn. p. 648.) sessilis major hemisphærica concava atra, extūs hyssino-tomentosa intūs lāvis. — Ad ligna putrida, ad terram in pinetis, aut., vere. — Fl. fr. 5. p. 22. — Gregaria subcespitosa primò globoso-hemisphærica dein expansa concava integerrima 4-6 lin. lata, tomento basi radicante extūs tecta.

43. P. LEUCOTRICA (Alb. et Schw. t. 7. f. 5.) sessilis hemisphærico-concava carnosula extūs intricato-strigosa candida, disco albo glaucescente. — Ad terram in umbrosis propè Parisios, ex Chevall., aug., sept. — Subgregaria primò globosa 3-4 lin. lata.

44? P. CARNOSA (Bull. champ. t. 396. f. 1.) crassa sessilis cinerea subtūs tomentoso-lanuginosa, carne roseā, cupulā profundè concavā tomentosā. — Ad ligna semiputrida ex Bull. — Fl. fr. 2. p. 78.

45. P. HEMISPHÆRICA (Hoffm. veg. cr. 2. t. 7. f. 6.) sessilis hemisphærica cerea extūs subfuscā pilis fasciculatis densis tecta, disco albo-glaucēnte. — Ad terram in sylvis, jun.-dec. — Fl. dan. t. 1558. f. 2. Fries syst. myc. 2. p. 82. P. Labellum Bull. champ. t. 204. Fl. fr. 2. p. 87. P. fasciculata Schrad. journ. Pers. myc. eur. P. hispida Sow. fung. t. 147. P. replicata Tode in Schr. berl. nat. 4. t. 13. f. 3. P. lanuginosa Bull. champ. t. 396. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 86. Elvella albida et E. foliacea Schæff. fung. t. 151 et 319. — Mich. gen. t. 86. f. 4. — Sparsa primò globosa mox hemisphærica integerrima demùm quoque margine replicato-margine ciliis liberis subdeciduis coronata. Colore pallido, fusco, rufescente, etc., et staturā ex 2-12 lin. varians.

* * * Sessiles extūs setis ciliatæ. — Terrestres aut in lignis putridis nascentes.

46. P. VITELLINA (Pers. myc. eur. 1. p. 257.) majuscula subcespitosa flexuosa lāte flava ad oras setosa. — In pratis et locis humidis circā Parisios ex cl. Pers., aug. — Carnosa fragilis undulata 4 lin. circiter lata versūs marginem fimbriis erectis sparsis obsita.

? sabulosa (Pers.) subplana regularis disco cinnabarino, extūs setis badiis brevibus hirta. — In Vogesis ad terram sabulosam aut in pratis siccis detexit cl. Mongeot ex Pers., junio. — Crassa subdepressa 2-3 lin. lata, exsiccata flavescens.

47. P. SCUTELLATA (L. suec. 458.) applanata miniato-rubra extūs pallidior marginem versūs setis nigris strictis hispida. — Ad ligna putrida rariūs ad ipsam terram, maio-nov. — Sow. t. 24. Bull. champ. t. 10. Fl. fr. 2. p. 77. Fl. dan. t. 1437. f. 2. P. ciliata Hoffm. crypt. 2. t. 7. f. 3. Octospora hirta Hedw. crypt. 2. t. 3 B. Elvella ciliata Schæff. t. 284. — Lin. 3 circiter lata subcoccinea et etiam albida; setæ marginales primò inflexæ dein erectæ strictæ.

48. P. CRINITA (Bull. champ. t. 416. f. 2.) exigua tenuis firma subglobosa concava intūs purpureo-rubra, subtūs cinerea ciliata. — Ad ligna semiputrida. — Fl. fr. 2. p. 78. — Inferne sed præcipue ad marginem pilis longis confertis nigris hirta.

49. P. CÆRULEA (Bolt. fung. t. 108. f. 2.) plana ciliata, disco cæruleo, extūs ni-

grecens pilis pallidis mollibus hirta. — Ad trunco Abiegnos in sylvâ Betz propè Beauvais ex cl. Graves, aut.

50. *P. SETOSA* (Nees syst. p. 260. f. 275.) *gregaria excavata aurantiaca extus setis longissimis erectis fuscis vestita. — Ad trunco vetustos carie consumtos propè Parisios ex cl. Chevall. aut. — Fries syst. myc. 2. p. 87. — Lin. 1-2 lata.*

51. *P. STERCOREA* (Pers. obs. 2. p. 89; myc. eur. 1. p. 246.) *gregaria concava fulva extus setis badiis subrectis propè marginem obsessa ciliata. — In fimo vaccino, equino, etc. — P. ciliata Bull. champ. t. 438. f. 2. Fl. fr. 2. p. 78. P. scutellata Bolt. t. 108. f. 1. non L. P. equina Fl. dan. t. 779. f. 3. Sow. t. 352. Octospora scutellata Hedw. musc. 2. t. 3. f. A. — Rai syn. t. 24. f. 3. — Gregaria junior globoso-clausa dein concava demùm applanata 1-2 lin. lata sicca fuscescens; extus junior pilis tenuibus fugacibus albidis tecta.*

52. *P. DIVERSICOLOR* (Fries syst. myc. 2. p. 88.) *gregaria exigua obconica rubens luteo-subferruginea viridis aut albida disco convexulo, extus pilis erectis strigosa. — Ad fimum propè Parisios, rarior, æst., aut. — P. cervina, chlorina et vaccinea Pers. myc. eur. 1. p. 254.*

53. *P. PAPILLATA* (Pers. syn. 650.) *gregaria minima rubescens disco papillato, margine ciliata. — In fimo vaccino eqnino, etc., propè Parisios ex Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aut., hyeme. — Nees syst. t. 38. f. 276. — Setæ erectæ subconcolores.*

VI. *Dasyphypha* (Fries syst. myc. 2. p. 89.). *Cupula tenuis ceracea sicca, disco glabro, extus undique pilosa vel villosa; subiculum nullum. — Pusillæ in statu sicco clausæ humectatæ apertæ epiphytæ.*

* *Stipitatae.*

54. *P. VERNALIS* (Schum. sell. p. 425.) *firmula cinereo-pallida, cupula hemisphærica extus stipiteque elongato filiformi flexuoso villosis. — Ad stipites dejectos propè Parisios ex cl. Chevall., vere. — Fries syst. myc. 2. p. 89. — Stipes $\frac{3}{4}$ unc. longus; cupula 2 lin. ferè lata; margo primò involutus demùm patulo-erectus.*

55. *P. CILIARIS* (Schrad. journ. bot. 2. p. 63.) *stipitata cyathiformis nivea extus pilis sparsis longis obsessa. — Suprà folia dejecta Quercus, Fagi, etc., in Galliâ boreali ex cl. Desmazières, aut., vere. — Fries syst. myc. 2. p. 89. — Sequenti maxime affinis ex Fries.*

56. *P. VIRGINEA* (Pers. obs. myc. 1. p. 28.) *gregaria candida stipitata, cupula hemisphærica extus pilis confertis patulis obsessâ. — Ad ligna, cortices, folia emortua. — Holmsk. ot. 2. t. 14. P. nivea Sow. fung. t. 66. P. parvula Fl. dan. t. 1016. f. 4. P. lactea Bull. champ. t. 376. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 81. — Mich. gen. t. 86. f. 15. — Lineam alta et demùm disco explanato lata; stipes tenuis æqualis raro oblitteratus; pili longi strigosi in margine ciliares.*

β. carpophila (Pers.) *minor turbinata densius villosa, ore connivente. — In pericarpiis Fagi.*

57. *P. NIVEA* (Fries syst. myc. 2. p. 90 non Dicks. Sow. nec Batsch.) *stipitata candida turbinata extus villoso-tomentosa. — Ad ligna et ramulos putridos in locis humidis dejectos, aut. — P. clandestina Bull. champ. t. 416. f. 5. non descr. P. virginea Fl. dan. t. 1440. f. 2. Octospora nivea Hedw. fil. t. 8. f. B. — Stipes minus distinctus villosus sursùm incrassatus.*

58. *P. PATULA* (Pers. obs. 1. p. 42.) *stipitata, cupula hemisphærica villosa albâ, disco plano lutescente. — Ad folia dejecta Quercus, Populi, Betulæ circa Parisios ex Chevall., aut., vere. — Pers. myc. eur. 1. p. 262. Nees syst. f. 284. — Pusilla, nudo oculo punctiformis, cupula primò globosa extus dense villosa.*

59. *P. CALYCINA* (DC. fl. fr. 5. p. 25. an Pers. syn. 653?) *erumpens parvula stipitata, cupula submembranacea infundibuliformi, extus albido-villosa, disco roseo-ochraceo. — Ad corticem Abietis in Jurasso (cl. Chaillet), Voge-*

sis. — *B. chrysophthalma* Pers. myc. eur. 1. p. 259. *Octospora calyciformis* Hedw. musc. fr. 2. t. 22. — Lin. 2 et ultrà lata subcespitosa aut solitaria; stipes brevis crassiusculus.

60. *P. bicolor* (Bull. champ. t. 410. f. 3.) sparsa subsessilis globosa tomentosa alba, disco coccineo aurantiaco vel luteo. — Ad ramulos exsiccatos Quercus, Oxyacanthæ et imprimis Coryli, vere. — Fl. fr. 2. p. 79. Sow. fung. t. 17. *P. minuta* Fl. dan. t. 779. f. 2. *P. pulchella* Pers. myc. eur. 1. p. 260. *P. Quercina* l. c. — Conferta globosa clausa humida aperta, disco concavo; margo piloso-denticulatus.

61. *P. cerina* (Pers. syn. 651; myc. eur. 1. p. 263.) stipitata hemisphærica furfuraceo-villosa lutescenti-olivacea, disco concavo luteo. — Ad ligna putrida, aut., vere. — Nees syst. f. 283. Moug. et Nestl. vog. n. 687. *P. biformis* Fl. dan. t. 1620. fig. inf. *P. marginata* Holmsk. ot. 2. t. 20. — Stipes nunc nullus, nunc distinctus brevis $\frac{1}{2}$ lin. ferè altus crassus ater; cupula sèpè connivens.

P. grisea (Fries) minuta sessilis lutescenti-grisea, cupulis globosis duabusculis.

62. *P. clandestina* (Bull. champ. p. 251 excl. ic.) gregaria stipitata turbinata cervina extùs furfuraceo-villosa, disco pallido. — Ad ramulos dejectos Rubi Idæi, fruticosi, Sambuci, etc., vere. — Fl. fr. 2. p. 83. Pers. obs. 1. p. 41; myc. eur. 1. p. 262. — Stipes $\frac{1}{2}$ lin. longus; cupula integerrima, humida pro more aperta valde concava.

63. *P. caulincola* (Fries syst. myc. 2. p. 94.) minuta gregaria firmula lutescenti-fusca pallida, cupulâ turbinato-globosâ farinoso-pubescente, stipite brevi glabro. — Ad caules plantarum, hyeme, vere. — *P. albo-marginata* et *P. Serratulæ* Pers. myc. eur. 1. p. 265 et 263.

P. cyathula (Fries) subferruginea, cupulâ infundibuliformi tomentosa, stipite sublongo glabro. — *P. cyathula* Pers. l. c.

* * *Sessiles.*

64. *P. ALBOVIOLASCENS* (Alb. et Schw. p. 322. t. 8. f. 4.) gregaria sicca dura subsessilis applanata villosa-hirta sèpiùs clausa, disco pallescente. — Ad ramos exsiccatos suprà corticem Tiliæ, Robiniæ propè Beauvais (cl. Graves), Lille ex cl. Desmaz., hyeme. — *P. fallax* Pers. myc. eur. 1. p. 96. — Junior subglobosa dein magis applanato-hemisphærica 1-2 lin. lata.

65. *P. corticalis* (Pers. obs. 1. p. 28; myc. eur. 1. p. 267.) gregaria sessilis subglobosa firma e cinereo-rufescens extùs strigoso-hirta. — Suprà cortices duriores siccis arborum adhuc vegetarum, Populi, Quercus, etc. — Fl. fr. 2. p. 80. — Superficialis, humida disco aperto subrufescens, sicca clausa albido-grisea.

66. *P. FLAMMEA* (Alb. et Schw. p. 319. t. 11. f. 7.) sparsa sessilis subglobosa firma strigoso-villosa unicolor flammeo-rubiginosa. — Ad ramos vetustos induratos nudos in Jurasso, aut.-vere. — Fl. fr. 5. p. 24. — Primò tota clausa globosa subrugosa, dein patens cupularis hemisphærica 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. æquans.

67? *P. AMORPHA* (Pers. syn. fung. 657; myc. eur. 1. p. 269.) sparsa et subconfluens subcoriacea majuscula sessilis, cupulis orbicularibus subeffusisque tomentosis rufescenti-pallidis, disco planiusculo rufo. — Ad corticem Abietis dejectæ in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.), Jurasso (cl. Chaillet), vere. — Moug. et Nestl. vog. n. 398. Fl. fr. 5. p. 23. — Junior tuberculiformis et tota villosa, adulta in cupulam 2-3 lin. latam sèpè irregularem et passim cum vicinâ confluentem expansa.

68? *P. tumida* (Pers. myc. eur. 1. p. 269.) sparsa, cupulis subcoriaceis depresso-ventricosis, disco tumido nigrescente, externè tenue tomentosis opacis gilvo-pallidis. — Ad sarmenta Vitis viniferæ rarissime inventa a cl. Chaillet in pago Neocomensi, et probabiliter reperienda in Galliâ finitimâ. — Junior tota clausa tomento involuta, dein ore circulari aperta; discus tandem conspiciebundus prominens immarginatus lineam latus.

69. *P. PICEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 269.) sparsa minuta subureolata pulvra-
ceo-pubescentia grisea aut dilute cinerea, disco plano nigrescente. — Ad folia
Pini Piceæ in Jurasso detexit cl. Chaillet ex Pers.
70. *P. CORVINA* (Pers. myc. eur. 1. p. 248.) suberumpens gregaria sessilis minuta
subdepressa externè pilosa utrinque atra. — Ad ligna exsiccata indurata,
propè Parisios ex Chevall., Lille ex Desmaz. — Subicolo maculæformi nigri-
canti plerumque insidens, primò punctiformis dein latè aperta.
71. *P. HISPIDULA* (Schrad. journ. bot. 1779. 2. p. 64.) sessilis carnosa concava
extrinsecus hispidula e rufo-nigricans, intùs lœvis albida. — Ad ligna et
ramulos dejectos, vere. — Fl. fr. 5. p. 25. Fries syst. myc. 2. p. 98. — Cupula
1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lata extùs setis nigris nitentibus obsessa.
72. *P. SPADICEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 252.) sparsa sessilis subgloboso-hemi-
sphærica, ore connivente, tomento denso subcompacto spadiceo vestita. —
Ad ramos Populi Tremulæ, in Jurasso aprili detexit cl. Chaillet ex Pers. —
Majuscula sicca; junior orbicularis nitide badia, adulta expallescens opaca.
73. *P. BERBERIDIS* (Pers. syn. 649; myc. eur. 1. p. 249.) sparsa minuta sessilis
rufo-fuscescens hirta, basi setis strigosis subradiantibus cincta. — Ad ramos
siccos Berberidis propè Parisios ex Chevall., Beauvais ex cl. Graves, rarò.
— Fries syst. myc. 2. p. 99. — Cupulæ basi villis longioribus subiculum tamen
non efficientibus matrici adnatæ.
74. *P. PELLITA* (Pers. myc. eur. 1. p. 99.) gregaria sessilis, cupulis subglobosis
primò clausis firmis densè tomentosis e griseo dilute gilvis, disco pallido. —
Ad ramulos Lonicerae Caprifolii in Vogesis ex cl. Pers., vere. — *P. barbata*
 β pellita Fries syst. myc. 2. p. 99. — Adnata 1-2 lin. lata sicca rugoso-crispa
connivens.
75. *P. RUFO-OLIVACEA* (Alb. et Schw. t. 11. f. 4.) sessilis orbicularis applanata,
extùs villoso-pulveralenta sordidè rufo-ferruginea, disco virescenti-olivaceo.
— Ad ramos emortuos humidos Rubi Eboli et Ligustri, æstate. — Fl. fr. 5.
p. 25. — Sparsa adnata disco patente plano demùm nigrescente.
76. *P. FLAVO-FULIGINEA* (Alb. et Schw. p. 319. t. 11. f. 7.) gregaria sessilis dilatata
planiuscula mollis strigoso-hirta latè sulphurea intùs olivaceo-fuliginea. —
Ad folia madida putrida dejecta in paludosis sylvarum, propè Parisios ex
Chevall., aut. — Nitidula initio cupularis dein applanata 1-2 lin. lata.
77. *P. PAPILLARIS* (Bull. champ. 244. t. 467. f. 1.) gregaria sessilis libera con-
cava ceracea villoso-hirta utrinque lactea, margine granulato. — Ad ligna
putrida. — Fl. fr. 2. p. 80. Sow. t. 177. *P. granuliformis* Alb. et Schw. non
Pers. — Conferta non adnata firmula vix lineam lata, margine integro den-
ticulato, sicca clausa flavescens.
78. *P. RELICINA* (Fries syst. myc. 2. p. 103.) gregaria sessilis minuta oboconica
badia, pilis densis erectis strigosis. — Ad caules Atropæ Belladouæ et Sam-
buci in Jurasso (cl. Chaillet), Sonchi Alpini et Cacaliæ Petasitis in Vogesis
(cl. Moug. et Nestl.). — *P. Atropæ* Alb. et Schw. Moug. et Nestl. vog.
n. 686.
79. *P. NIDULUS* (Schm. et Kunze deutsch. schw. 8. n. 72.) minuta sessilis he-
misphærico-applanata strigoso-hirsuta badia, disco pallidè flavescente. — In
caulibus siccis imprimis Convallariae multifloræ, vere. — Moug. et Nestl.
vog. n. 588. Pers. myc. eur. 1. p. 250. — Subtenax vix gregaria, villositatem
demùm amittere videtur.
80. *P. SULPHUREA* (Pers. disp. p. 33.) sparsa minuta sessilis subglobosa dein
explanata strigoso-tomentosa sulphurea, disco pallido. — Ad caules planta-
rum majorum præcipue Urticæ, vere. — Grev. crypt. fl. t. 83. *P. citrinella*
DC. fl. fr. 5. p. 24. — Junior et exsiccata globosa; color aliquando fuscescens
opacus.
- β. leucophæra* (Pers.) sessilis depressa strigoso-hirta fuscescens, disco plano
albido et subincarnato. — Ad caules exsiccatos Urticæ dioicæ circè Pari-

sios ex Pers. aut., ad caules Heraclei Sphondylii propè Lille ex cl. Desmaz.
— Desmaz. cr. exs. n. 173.

81. *P. VILLOSA* (Pers. syn. 655.) sparsa sessilis minuta persistens globosa villosa alba ore subconnivente. — Ad stipites, caules herbarum majorum, etc., vere. — Fl. fr. 5. p. 26. *P. Sclerotium* Pers. obs. myc. 2. p. 84. *P. granuliformis* Pers. syn. 651. *P. sessilis* Sow. t. 389. f. 1. — Granula superficialia nunc aggregata nunc absque ordine sparsa jove pluvio tantum aperta; villus non semper distinctus.

82. *P. MICACEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 268.) congesta minutissima sessilis, cupulis tenerrimis farinoso-subtomentosis pallidè helvolis. — In caule Cardui nuntantis in Jurasso detecta a cl. Chaillet ex Pers., Cirsii eriophori propè Beauvais ex cl. Graves. — Late disseminata dilutè cinnamomea subnitens arenuliformis.

83. *P. DAYOPHILA* (Pers. myc. eur. 1. p. 265.) gregaria minutissima epiphylla sessilis orbicularis subfugax badia villosa, ore subconnivente. — Ad folia aggregata Quercùs circà Parisios ex cl. Pers. et Chevall., vere, aut. — *P. punctiformis* Fries syst. myc. 2. p. 105. — Ut puncta fusco-nigrescentia rariùs alba ant cærulecentia apparent cupulæ plerumque contractæ aliter hemisphærica.

VII. *Tapezia* (Pers. myc. eur. 1. p. 270. Fries syst. myc. 2. p. 105.).

Cupulæ ceraceæ vel subcoriaceæ subsessiles crustaceo-conglomeratæ vel subiculo subtomentoso insidentes. — Lignatiles raro epiphyllæ.

* *Cupulæ villosæ.*

84. *P. ANOMALA* (Pers. obs. 1. p. 29.) substipitata confertissima incrustans, cupulis turbinatis villosis cervinis, disco urceolato albido. — Ad ramos deciduos exsiccatos. — Fries syst. myc. 2. p. 106. *P. stipata* Pers. myc. eur. 1. p. 270 non Fries. *P. rugosa* Sow. fung. t. 369. f. 3. — *Sabicalum villosum* tenuè passim obliteratum; cupulæ tenues regulares conniventia siccæ crispatæ, variant colore sordidè luteo cervino et ferrugineo.

85. *P. PORIÆFORMIS* (DC. syn. gall. 17; fl. fr. 5. p. 26.) sessilis, cupulis confertis teretiusculis tomentosis cinereis, subiculo denso concolori. — Ad Salices cavas et ligna humida propè Parisios. — Fries syst. myc. 2. p. 106. *P. anomala* γ *poriæformis* Pers. syn. p. 656. *P. tephrosia* myc. eur. 1. p. 271. — Subiculum ex 4 lin. ad 1½ unc. latum irregulariter effusum dilutè cinereo-umbinum.

86. *P. AURELIA* (Pers. myc. eur. 1. p. 270.) sparsa sessilis ovato-globosa aureorubiginosa ore contracto, subiculo amplio villoso dilutiori. — Ad pericarpia foliaque decidua Fagi et Quercùs, in Vogesis (cl. Mong. et Nestl.), vere. — Mong. et Nestl. vog. exs. n. 783. *P. Vauchii* Grev. cr. fl. t. 139. — Cupulæ majusculæ submembranaceæ subcrispatae 1-2 lin. latæ.

87. *P. CÆSIA* (Pers. syn. p. 657; myc. eur. 1. p. 272.) sessilis applanata villosa albida, basi pilis longis in subiculum intertextis, disco subtremeloso cæsio. — Ad ligna dejecta Quercùs et Abietis, aut., vere. — Fl. fr. 5. p. 25. Nees syst. f. 272. Dittm. in Sturm deutsch. fl. 3. t. 3r. *P. lichenoides* Pers. ic. pict. t. 7. f. 1. — Cupulæ confertæ juniores concavæ dein explanatae.

88. *P. CONSPERSA* (Pers. myc. eur. 1. p. 271.) crustacea sessilis conferta urceolata fusco-nigra pulvère albido obtecta, subiculo concolori. — Ad corticem arborum Jurassi (cl. Chaillet), Parisios ex Chevall., aest. — Fries syst. myc. 2. p. 108. *Thelebolus hirsutus* DC. fl. fr. 2. p. 272. — Cupulæ innatæ subglobosæ ore connivente nigricantes; humectatae verò magis apertæ fuscescentes ore albido. Vix hujus generis.

89. *P. ROSÆ* (Pers. obs. 2. p. 82; myc. eur. 1. p. 278.) sparsa sessilis subcoriacea concava subtomentosa spadicea, subiculo tomentoso concolori insidens. — Ad ramos aridos Rosarum. — Fl. fr. 5. p. 18. *Myriothecium hispidum* Tode meck. 1. p. 27. f. 41. Subiculum late effusum indeterminatum ramos plerum-

que ambiens; cupulæ nunc sparsæ nunc aggregatæ primò ureolatae ore inflexo dein magis apertæ siccæ corrugatæ difformes.

* * *Cupulis glabris.*

90. *P. FUSCA* (Pers. obs. 1. p. 29; myc. eur. 1. p. 273.) sessilis, cupulis concavis fuscis demum applanatis cinereis subtus pilis subiculo lato tomentoso adfixis. — Ad cortices Alni, Populi, Salicium, Coryli, etc. — Fl. fr. 5. p. 18. Grev. crypt. fl. t. 192. *P. Pruni-avium* Pers. obs. 2. p. 82. — Subiculum e pilis minutis deuse contextum indeterminatum floccoso-furfuraceum; cupulæ juniores minutæ ureolatae nigricantes ore albido connivente, dein magis inagisque explanatae expallentes.

91. *P. LATERITIA* (Pers. myc. eur. 1. p. 273.) sessilis, cupulis nigris majusculis glabris subiculo denso lateritio immersis. — Ad ligna circà Parisios ex cl. Persoon, rarissima. — Tomentum crassum cui cupulæ planæ aut subconcavae sat profundè immersæ observantur.

92. *P. SANGUINEA* (Pers. disp. 33; myc. eur. 1. p. 273.) cupulis minutis concavis glabris nigrescentibus basi tomento compacto brevi sanguineo cinctis. — Ad ligna exsiccata duriora Fagi. — Fl. fr. 5. p. 21. Nees syst. f. 271. Fries syst. myc. 2. p. 110. — Cupulæ plus minus aggregatæ juniores molles fuscescentes margine rubello cinctæ dein induratæ nigrae apothecium Patellariæ referentes.

VIII. *Fibrina* (Fries syst. myc. 2. p. 111.). *Cupulæ ceraceæ vel subcoriaceæ siccæ glabrescentes, pilis adpressis longitudinaliter fibrosæ vel rugoso-striatæ, margine serrato vel lacero, subiculum nullum. — Superciales lignatiles vel epiphytæ.*

93. *P. FARINACEA* (Pers. syn. 672. nou myc. eur. 1. p. 326.) parva subcoriacea subsessilis extus fibroso-striata rugosa fusco-nigricans margine infexo fimbriato, disco expallente. — Ad corticem Pini sylvestris, aut., vere. — Fl. fr. 5. p. 20. *P. pinicola* Rebent. neom. p. 385. Fries syst. myc. 2. p. 113. — Superficialis, junior hirto-pulverulenta mox nuda, siccæ nigricans humectata fusca, disco ureolato subclauso fuligineo, humectato expallente albicante. Variat solitaria brevissimè stipitata regularis aut cespitosa contorta subsessilis.

94? *P. CALYCIODIDES* (DC. fl. fr. 2. p. 82.) alba aut sulphurea, stipite tenui, disco rotundato piano vel subconvexo lœvi glabro, extus tuberoso-scabro. — Ad truncum arborum cavarum. — Species ulterius examinanda.

Ser. III. *PHIALEA* Fries obs. 2. p. 305; syst. myc. 2. p. 116.

Capulæ ceraceæ vel membranaceæ glaberrimæ mox apertæ; velum nullum; subiculum nullum. — Species parvæ epiphytæ.

IX. *Hymenoscypha* (Nees syst. p. 266. Fries l. c.). *Libere evolutæ glabræ nudæ; cupula tenuis membranacea stipite tenui subæquali suffulta; hymenium distinctum, thecis amplis clavatis. — In virgultis fructibus et caulinis plantarum nascentes.*

1. *Ciborioideæ* (Fries l. c.). *Firmulæ, stipite sublongo, cupulâ primò infundibuliformi dein dilatata. — Majores epiphytæ.*

95. *P. SUBULARIS* (Bull. champ. t. 500. f. 2.) lateritia fragilis, stipite longissimo tenui, cupulâ hypocrateriformi integrerrimâ. — Ad semina semiputrida Helianthi annui et Bidentis tripartitæ. — Fl. fr. 2. p. 83. *P. subulipes* Pers. myc. eur. 1. p. 282.

96. *P. ECHINOPHILA* (Bull. champ. t. 500. f. 1.) magna crassiuscula firma glabra, cupulâ plano-infundibuliformi dilatè cinnamomea, stipite longo dilatiore primò subtomentoso. — Ad involucra putrescentia Castaneæ. — Fl. fr. 2. p. 82. — Stipes longitudine rariùs subsemi-uncialis; cupula 2-4 lin. lata firma.

97. *P. FRUCTIGENA* (Bull. champ. t. 228.) *gregaria* tenax glabra pallida intescens, cupulâ patellæformi, stipite longo tenui flexuoso. — Ad ramulos deciduos et glandes Quercinos. — Fl. fr. 2. p. 82. Sow. t. 117. Nees syst. f. 282. *P. virgulitorum* Fl. dan. t. 1016. f. 2. Octospora fungoides Hedw. cr. p. 53. t. 19. f. A. — Color albidus flavus rufescens; cupula 1-2 lin. lata demum convexa.
2. *Salicina* (Fries) flava, cupulâ tenui flexuosa, stipite tenui deorsum attenuato. — *P. Salicina* Pers. syn. 663. *P. flavescens* Holmsk. ot. t. 11. Pers. myc. eur. p. 277. — Ad ramos Salicis.
2. *Cyathoideæ* (Fries syst. myc. 2. p. 120.). *Stipes brevis*; *cupula ex urceolato-concava orbicularis sicca connivens*. — *Minores caulicolæ*.
98. *P. CORONATA* (Bull. champ. t. 416. f. 4.) parva stipitata pallescens, cupulâ concavâ margine dentibus setaceis coronatâ. — Ad caules dejectos plantarum Urticæ, etc., aut., aest. — Fl. fr. 2. p. 83. *P. armata* Roth. *P. radiata* Pers. myc. eur. 1. p. 287. Nees syst. f. 293. *P. subulata* Fl. dan. t. 1380. f. 1. — Sparsa subgregaria lœvis glabra; stipes 1-2 lin. longus subincurvus; cupula lineam lata dentibus primò conniventibus dein erectis.
99. *P. INFLEXA* (Bolt. fung. t. 106. f. 2.) stipitata alba, cupulâ subhemisphæricâ margine dentibus triangularibus cinctâ. — Ad caules Urticæ dioicæ rariùs propè Parisios ex Pers., Beaufvais ex Graves, aut. — Sow. fung. t. 306. *P. Coronilla* Pers. myc. eur. 1. p. 287. — Præcedente paulo major; stipes sat longus subincurvus.
100. *P. LITTOREA* (Fries syst. myc. 2. p. 121.) parva stipitata, cupulâ hemisphærico-depressâ disco rubescente, margine sublacero. — Ad culmos sicclos Arundinis propè Lille ex cl. Desmazières, aut. — *Gregaria glabra*; stipes brevis; margo inflexus primò velatus.
101. *P. PERSOONII* (Pers. myc. eur. 1. p. 288. t. 12. f. 1-4.) cupulâ urceolatâ aurantiacâ, margine prominente membranaceo albido, stipite cylindrico roseo. — Ad Equiseta arida, in pratis humidis Vogesorum detexit cl. Mongeot ex Pers., vere, aut. — Grev. crypt. fl. t. 162. *Lycoperdon Equiseti* Hoffm. veg. cr. 2. t. 5. f. 1. — Stipes brevis medio attenuatus; cupula lineam alta subven-tricosa basi dilutior.
102. *P. URTICÆ* (Pers. myc. eur. 1. p. 2^o6.) stipitata sparsa, cupulâ submembranaceâ hemisphæricâ ex albo dilute fuscescente margine connivente, stipite longiusculo. — Ad caules aridos Urticæ dioicæ, vere. — *P. striata* Fries syst. myc. 2. p. 112? — Exsiccata crispa aut subuplicata quasi tenui pulvere conspersa.
103. *P. CACALIÆ* (Pers. myc. eur. 1. p. 285.) turbinata lœvis fuscescens firmula, ore albidiore subconnivente, stipite sublongo crassiusculo. — Ad caules Cacaliæ Petasitis in Vogesis ex cl. Pers.; et variarum Compositarum ex Fries, vere, aut. — Fries syst. myc. 2. p. 122. — Glaberrima subnitens, junior albida adulta et sicca fusca, humida infundibuliformis imò explanata.
104. *P. SCUTULA* (Pers. myc. eur. 1. p. 284.) firmula hypocrateriformis lœvis luteo-rufescens, margine integerrimo, stipite sublongo tenui æquali. — Ad caules plantarum exsiccatarum, propè Parisios, ex cl. Chevall., aut., vere. — *Gregaria*, cupula magis magisque dilatata leviter concava $\frac{1}{2}$ lin. lata.
105. *P. CYATHOIDÆ* (Bull. champ. p. 250. t. 416. f. 3.) tenuis albido-pallida, cupulâ globoso-cyathiformi dein explanatâ integrerimâ, stipite filiformi longiusculo. — Ad stipites et caules plantarum frequens. — Fl. fr. 2. p. 82. *P. Solani* Pers. obs. *P. tenella* Batsch. cont. 1. f. 151. Nees syst. f. 294. *P. tenerima* Holmsk. ot. 2. t. 11. Octospora albidula Hedw. musc. frond. 2. t. 9. f. B. — Minuta demum planiuscula; color in humidâ aquose pallidus albidus lutescens subincarnatus, in sicca obscurior.

3. *Volutelleæ* (Fries syst. myc. 2. p. 126.). *Cupula utrinque planiuscula semper aperta centro subumbilicata. — Minimæ epiphytæ.*

106. *P. CULMIGENA* (Fries syst. myc. 2. p. 127.) sparsa pusilla aquose pallida tenuis, cupulâ planâ subumbilicatâ, stipite capillari glabro pallido. — Ad culmos exsiccatos præcipue Scirpi lacustris in valle Bray propè Beauvais ex cl. Graves.

X. *Calycina* (Nees syst. p. 263. Fries syst. myc. p. 2. p. 128.). *Liberæ evolutæ nudæ glabræ; cupula ceracea crassa firma obconica in stipitem plus minus producta; hymenium distinctum excipulo tenuius; thecæ parvæ. — Lignatiles.*

1. *Calyculæ* (Fries syst. l. c.). *Obconicæ distinctè stipitatæ, disco concavo marginato.*

107. *P. TUBA* (Bolt. fung. t. 106. f. 1.) gregaria lutea, cupulâ turbinatâ disco piano margine tumido, stipite longo gracili. — Ad ramos prostratos in locis humidis, propè Lille ex cl. Desmaz., aut. — Fries syst. myc. 2. p. 128. — Stipes subfiliformis æqualis; cupula extus lævis unc. lata, primò clavata.

108. *P. JANTHINA* (Fries syst. myc. 2. p. 130.) violacea, cupulâ concavâ marginatâ integrimâ, stipite subbrevi glabro. — Ad trunco vetustos Salicis propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Octospora violacea Hedw. musc. 2. t. 8. f. A. — Primò cylindrica dein sursùm incrassata urceolata, demùn ferè infundibuliformis 3 lin. alta lævis glabra.

109. *P. CITRINA* (Batsch. cont. 2. f. 218.) conferta citrina, cupulis plano-concavis cum stipite brevi crasso pallidiore obconicis. — Ad trunco et ramos putridos frequens, aut. — Fl. fr. 5. p. 22. *P. aurea* Sow. t. 150. Octospora citrina Hedw. st. cr. 2. t. 8. f. B. — Ray. syn. 3. t. 24. f. 4. — Carnoso-ceracea crassiuscula firma 1-2 lin. alta; cupulæ margo prominens subindè flexuosa.

110. *P. PALLESCENS* (Pers. obs. 85; myc. eur. 1. p. 294.) conferta glabra minor dilutè flava vel albido-pallens, cupulâ concavâ, stipite brevi crassiuseulo pallido. — Ad ligna exsiccata et trunco vetustos propè Lille ex cl. Desmaz., aut. — *P. lenticularis* Hoffm. germ. crypt. t. 13. — *P. citrina* affinis sed substantia tenuior discus semper concavus margo subtumidus, stipes brevior.

2. *Lenticulares* (Fries syst. myc. 2. p. 133.). *Subsessiles, stipite obliquo papillæ formi disco planiusculo demùn subconvexo.*

111. *P. LENTICULARIS* (Bull. champ. t. 300. f. a. c.) convexa adpressa firma nitida lutea, stipite brevi papillæformi nigrescente. — Ad trunco vetustos Fagi, etc., aut. — Fl. fr. 2. p. 77. Octospora citrina Fl. dan. t. 1294. f. 1. — Subsessilis gregaria glabra lineam lata, junior cava dein convexa.

112. *P. FERRUGINEA* (Schum. sæll. p. 429. non Pers.) substipitata obconica, disco concavo luteo-ferrugineo extus margineque tumido pallidè luteo. — Ad trunco vetustos Quercùs, etc., aut. — *P. lenticularis* Bull. t. 300. var. — Priori affinis, sed minor gregaria primò turbinata dein magis dilatata sed vix lineam lata.

113. *P. MOUGROTII* (Pers. myc. eur. 1. p. 289. t. 12. f. 5-7.) gregaria conferta subsessilis, cupulis tereti-ventricosis cum stipite brevi confluentibus, disco planiusculo aurantiaco, margine tenuissimè fimbriato albicante. — Ad terram propè nives deliquescentes in summis Vogesorum ex cl. Pers. — Species minuta carnosa hinc vix excavata crustâ quâdam pulverulentâ substrata.

114. *P. CUPRESSINA* (Batsch. el. p. 119.) gregaria flavo-rufescens, cupulis carnosæ-ceraceis integrimis primò clavæformibus dein hemisphæricis, stipite brevi crasso juniore villoso. — Ad folia Cupressi et Juniperi Sabinæ propè Parisios reperit cl. Thuiillier ex Pers. — Pers. myc. eur. 1. p. 290. — Mich. gen. t. 86. f. 20. — Pusilla, aurea.

752 ACOTYL. SEU CELLULARES. PRIZA.

115. *P. IMBEABIS* (Bull. champ. t. 467. f. 2.) carnosو-ceracea glabra alba, cupulis plano-concavis subflexuosis, stipite papillaeformi. — Ad ligna vetusta, aut. — Fl. fr. 2. p. 81. *P. nivea* Batsch. cl. t. 12. f. 56. Pers. myc. eur. 1. p. 295.

116. *P. HERBARUM* (Pers. syn. p. 664.) gregaria carnosو-ceracea glabra alba, cupulis plano-convexis adpressis, stipite brevissimo. — Ad caules exsiccatos herbarum majorum, aut., hyeme. — Fl. fr. 5. p. 27. Moug. et Nestl. vog. n. 785. — Cupula lineam et ultra lata integerrima demum subinde rufescens, saepius immarginata.

117. *P. PAGINEA* (Pers. disp. 84; myc. eur. 1. p. 296.) gregaria minuta, cupula planiuscula albida, stipite brevi crasso. — Ad pericarpia sicca Faginea in locis umbrosis dejecta, aut. — *Ervella fungiformis* Scop. ann. 4. t. 2. f. 8. — Lin. $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ lata.

118. *P. EPIPHYLLA* (Pers. disp. 72; myc. l. c. 295.) sparsa sessilis vel substipitata glabra convexo-plana marginata ochraceo-pallida. — Ad folia dejecta putrescentia Fagi, Betulæ, etc., propè Parisios ex cl. Chevall., aut., vere. — Fries syst. myc. 2. p. 137. — Cupula carnosو-ceracea subtenuis 1-2 lin. lata demum rufescens.

XI. *Mollisia* (Fries syst. myc. 2. p. 137.). Libere evolutæ glabre; cupula turbinato-stipitata saepius sessilis ceraceo-mollis aquosa subintegerrima; hymenium confluens; thecae tenues vel nullæ.

1. *Claviformes* (Fries l. c.). Obconico-stipitatae crassiusculæ carnosو-tremellosæ plano-convexæ.

119. *P. FLAVOVIRENS* (Pers. myc. eur. 1. p. 323.) sparsa ceraceo-mollis minuta flavo-virens primò subumbilicata demum convexo-plana, stipite crasso brevissimo. — Ad lignum putridum prostratum in locis humidis Vogesorum, vere. — Applanata vix marginata deinde subconvexa lineam lata, sicca rufescens.

2. *Udae* (Fries l. c.). Sessiles subtremellosæ crassiusculæ.

120. *P. CHRYSOCOMA* (Bull. champ. t. 376. f. 2.) gregaria sessilis subgelatinosa glabra luteo-fulva, junior sphærica immarginata dein centro deppressa. — Ad lignum putridum. — Sow. fung. t. 152. Fl. fr. 2. p. 78. *P. aurea* Pers. — Junior magnitudine seminis Pisi, sicca valde contracta subcornea flexuosa concava margine involuto.

121. *P. CARNEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 301.) sparsa aut gregaria aut majuscula sessilis glabra carneo-rufa, cupulis carnosو-tremellosis hemisphæricis, disco subdepresso margine tumido. — Ad ligna ex cl. Pers. — *P. lilacina* / carneæ Fries. — Junior subrotunda.

122. ? *P. CARPinea* (Pers. syn. p. 673; myc. eur. 1. p. 312.) cespitosa minuta subtremellosa sessilis carneo-pallens, cupulis subdifformibus obconicis planiusculis in subiculo carnosò concolore aggregatis. — Ad corticem exsiccatum Carpini propè Beauvais (cl. Graves), in Vogesis (cl. Moug. et Nestl. vog. 787.). — Discus intensor, margo subpellucidus; cupulae sicce depressæ omnino difformes. — Clar. Fries (syst. orb. veg. 1. p. 363.) Ditiola videtur sed characteri generico in multis repugnat.

123. *P. VINOsa* (Pers. myc. eur. 1. p. 303. an Alb. et Schw.?) minuta subtremellosa sessilis fulvo-carnea subrosea planiuscula immarginata. — Ad caules plantarum propè Parisios ex cl. Chevall., vere. — Orbicularis tenuis nitida $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ lin. lata.

124. *P. RUBELLA* (Pers. syn. 635.) sessilis ceraceo-mollis planiuscula glabra incarnato-rubra margine sublaetato. — Ad ligna et cortices putridos circa Lugdunum ex cl. Balbis, aut. — Fries syst. myc. 2. p. 141. Balb. fl. lugd. 2. p. 308. — Gregaria minuta semipellucida 1-2 lin. lata subtus planiuscula supra convexa dein applanata subflexuosa.

125. *P. ATROVIRENS* (Pers. syn. 635; myc. eur. 1. p. 306.) sessilis sparsa subtre-

mellosa, junior *globosa viridis* adulta *hemisphaerica disco plano subcarneo*. — Ad ligna putrida siccave carie exesa, propè Parisios ex Chevall., vere. — Sicca atra, humida intumescit viridescitque.

P. seriata (Fries) cupulis subseriatibus orbicularibus subconcavis recentibus dilutè viridibus exsiccatis nigris, disco fusco. — Ad ramos Quercinos cortice denudatos, in Jurasso detexit cl. Chaillet, ex Pers. — *P. seriata* Pers. myc. eur. 1. p. 305.

126. *P. AQUATICA* (DC. fl. fr. 2. p. 76.) coccinea sessilis plana vel subconvexa margine nullo. — Ad trabes inundatas vel aqueductum ligneum in ipso fundo sub aquâ vegetans. — Pers. myc. eur. 1. p. 298. — Ad Algas referendam censem cl. Fries.

127. *P. CINEREA* (Batsch. fung. 2. f. 137.) sparsa vel gregaria sessilis mollis minuta scutellata cinerea, margine integerrimo albidiore. — Sow. t. 64. Fl. fr. 2. p. 77. Nees syst. f. 269. Fries syst. myc. 2. p. 142. *P. callosa* Bull. champ. t. 416. f. 1. Batsch. el. 2. f. 219. Fl. dan. t. 1490. f. 2. Fl. fr. 2. p. 77. — Junior urceolata dein dilatata omnino plana; color variat in humidis fuscus et saepius cinereus, in siccis expallens albicans.

128. *P. CHAILLETII* (Pers. myc. eur. 1. p. 288.) sparsa sessilis pallide fuscescens, cupulis suburceolatis carnosulis gilvis margine denticulato nigrescente. — Ad caules Angelicæ sylvestris in Jurasso detexit cl. Chaillet ex Pers., propè Lille ex cl. Desmaz., Gentianæ luteæ in Vogesis ex cl. Mongeot. — Juniores suburceolatae fuscescentes adultiores magis depresso subventricosæ, aquâ irrigatae subturgidæ et margine dentibus subtriangularibus erectis ornatae, in statu sicco concavo-delapsæ margine subinflesso.

129. *P. PTERIDIS* (Alb. et Schw. t. 12. f. 7.) sessilis minima ceraceo-mollis cupularis intus sordide lutescens extus subgranulosa olivascens, margine crenato. — Ad stipites exsiccatos Pteridis Aquilinæ et Osmundæ regalis in sylvâ Montmorency propè Parisios ex Chevall., vere. — Pers. myc. eur. 1. p. 300. — Sparsa vel gregaria punctiformis basi subapplanata humida mollis aperta sicca contracta.

130. *P. BRYOPHILA* (Pers. myc. eur. 1. p. 305.) glabra minutissima orbicularis sessilis carnosomollis saturatè viridis exsiccata nigrescens, cupulis planis marginatis. — Ad muscos detritos imprimis Jungermanniam scalarem in Vogesis ex cl. Pers. — *P. Jungermanniae* Fries syst. myc. 2. p. 144. — Sparsa punctiformis.

3. *Ceracellæ* (Fries syst. myc. 2. p. 146.). *Sessiles subtus liberæ et punto centrali adfixæ tenues aquoso-ceraceæ*.

131? *P. VIRENS* (Alb. et Schw. t. 10. f. 10.) sparsa vel subgregaria subiculo sordide virescenti insidens sessilis minutissima glabella, cupulis subrotundo-hemisphaericis excavatis albidis subcarneisve, margine integerrimo. — Intrà Abietis cavernulas in Jurasso, vere. — Fl. fr. 5. p. 24. — Carnosa in statu humido pellucida. An potius Lichenis species?

132. *P. ATRATA* (Pers. syn. 669; myc. eur. 1. p. 306.) gregaria minuta sessilis subglobosa glabra nigrescens, ore connivente albicante. — Ad truncos, ramos, cortices deciduos nec non caules plantarum, hyeme, vere. — Nees syst. f. 266. — Subglaucescens concava extus rugulosa.

f. Eboli (Fries) concava cinereo-nigra margine inflesso albicante. — Ad caules Eboli propè Beauvais (cl. Graves), aut. — Paulo major ceraceo-tenuis primò sphærica mox aperta urceolata dein magis dilatata.

XII. *Patella* (Nees syst. p. 257, Fries syst. myc. 2. p. 149.). *Glabræ; cupula sessilis passim subinnata sed vix erumpens ceraceo-sicca applanata aperta marginata; hymenium sat distinctum; thecæ tenues.*

133. *P. MELANOPHILA* (Fries syst. myc. 2. p. 150.) sessilis sicca piano-patellata extus margineque cinnamomea disco atro. — Ad ligna exsiccata Quercus humili delapsa propè Parisios, ex Chevall., aut. — *P. bicolor* Nées syst. f. 265

754 ACOTYL. SEU CELLULARES. PEZIZA.

non Bull. — Sparsa $\frac{1}{4}$ lin. lata; discus opacus primò concauus dein planus marginem æquans.

134. P. VITICOLA (Pers. myc. eur. 1. p. 309.) sessilis subcoriacea crassiuscula subseriata cupulis orbicularibus planiusculis sordidè nigris margine tenui cinctis, disco superficiali rufo-carneo. — In rimis rānorū Vitis vinaferæ propè Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 151. — Subiculum tenuē nigrescens subpulverulentum.

135. P. LECIDEOLA (Fries obs. 1. t. 4. f. 1.) sessilis minuta subcornea concava nigra, crustæ maculæformi cinerascenti insidens. — Ad ligna demortua propè Parisios ex Chevall. — Gregaria punctiformis superficialis, humectata mollior et discus pallescens fuliginens vel obscurè olivaceo-viridis.

136. P. COMPRESSA (Pers. syn. 670; myc. eur. 1. p. 307.) sessilis innata tenuis minutissima nigrescens disco atro, exsiccata compressa conchiformis. — In assulis et lignis duris siccis. — Fl. fr. 5. p. 22. — Sparsa confertave humectata extus sèpè rufescens, subrotunda elliptica vel angulata.

137. P. SALICARIA (Pers. syst. myc. 1. p. 308.) conferta sparsaque immersa sessilis compressa minima concava varie flexuosa e spadiceo-nigricans. — Ad lignum cariosum Salicis propè Parisios ex cl. Pers. et Chevall., Lille ex cl. Desmaz. — P. flexella Fries syst. myc. 2. p. 152. — Habitus Lichenis sed subiculum nullum; cupulæ subcoriaceaæ a ligno sat discretæ.

138. P. JUNCINA (Pers. myc. eur. 1. p. 314.) sparsa sessilis glabra subceracea applinata obscurè rufa margine sub prominente. — In uliginosis ad culmos siccos Junci communis propè Parisios, aest. — Fries syst. myc. 2. p. 152. — Minuta adpressa linearis.

139? P. LEPIDA (Pers. myc. eur. 1. p. 314.) sparsa suberumpens dura rufescens nitida, cupulis vasculosis subconniventibus. — Ad caules plantarum propè Parisios ex Pers. et Chevall. — E caule plantarum erumpere videtur, saltem iis arcte adnata stipite brevissimo; $\frac{1}{2}$ -1 lin. magna, primò subteres.

140? P? UMBILICATA (Pers. myc. eur. 1. p. 323.) sparsa orbicularis minuta coriaceo-tremellosa nigrescens, disco applanato umbilicato, secco concavo, vix marginato. — Ad caules exsiccatos Gentianæ luteæ in Vogesis (cl. Moug. et Nestl.), Angelicæ sylvestris propè Beauvais ex cl. Graves. — Moug. et Nestl. vog. n. 788. — Aliud ad genus forsitan pertineat ex cl. Pers.

141? P. GENTIANÆ (Pers. myc. eur. 1. p. 310) subgregaria erumpens minuta, cupulis concavis umbrinis nigricantibus, disco submollis griseo-albido, margine sublacero. — In Vogesis, ad caules emortuos Gentianæ luteæ detexit cl. Mugeot ex cl. Pers. — Excipula Gentianæ Fries el. fung. 1. p. 148. — Cupulæ solitariæ aut in seriem aggregatae ceraceæ. Sub epidermide observatur crusta quædam nigrescens in quâ residet hæc species.

142. P. NERVISEQUA (Pers. myc. eur. 1. p. 308.) seriata nigra, cupulis parvis subepresso-flexuosis subiculo iudicato linearis foliorum nervis erumpenti insidentibus. — Ad folia emortua Plantaginis lanceolatae in Vogesis reperiit cl. Mugeot, circâ Mimatem cl. Prost. — Moug. et Nestl. vog. n. 786. Excipula nervisequa Fries el. fung. 1. p. 147.

Sect. II. PATELLA Chevall. fl. par. 1. p. 302. — Patellaria Fries syst. myc. 2. p. 138. Ad. Brongn. class. champ. p. 84 non Hoffm. DC.

Receptaculum patellæforme; thecæ connatæ absque paraphysibus.

143. P. CORIACEA (Bull. champ. t. 438. f. 1.) subcoriacea glabra, cupulæ glabriuscula in stipitem tortuosum attenuata, disco sublateritio pulvralento. — In fimo cervino equino et asinino, rarius. — Fl. fr. 2. p. 75. — Gregaria vel sparsa firma 2-4 lin. alta 2 lin. lata.

144. P. PATELLARIA (Pers. syn. p. 670.) subcoriacea patellæformis sessilis applanata nigra margine tumido, disco subpruinoso. — Ad ligna et cortices arborum frequens. — Fl. fr. 2. p. 76. Nees syst. f. 265. Patellaria atrata Fries

1. c. *Lichen atratus* Hedw. musc. frond. 2. t. 21. f. A. — *Gregaria apothecium*
Patellariæ exacte referens.

XVII. *HELOTIUM* Pers. syn. 677. DC. fl. fr. 2. p. 74. Ad. Brongn. class.
champ. 84. — Pezizæ tribus Fries.

Receptaculum immarginatum stipitatum nudum primò apertum planum demùm convexo-hemisphæricum basi a stipite æquali sat distans; hymenium lave persistens distinctum; thecæ amplæ fixæ sporulas elastice ejiciendas includentes. — Fungilli parvi ceracei.

1. *H. PITHYUM* (Fries syst. myc. 2. p. 155.) receptaculo planiusculo extùs stipite que brevi villosis rubellis, disco aurantio-rubro. — Ad candices et ramos languidos emortuosve Pini Piceæ in Vogesis (cl. Mong. et Nestl.), Jurasso (cl. Chaillet), hyeme et primò vere. — *Peziza pithya* Pers. ic. pict. t. 11. f. 2; myc. eur. 1. p. 259. Nees syst. f. 287. DC. fl. fr. 5. p. 23. Mong. et Nestl. exs. n. 298. — *Gregaria majuscula* firma 2-5 lin. et ultrà lata, subtùs pallidior demum fere glabra.
2. *H. AUREUM* (Pers. syn. 678.) obscurè flavum, capitulo hemisphærico-convexo glabro, stipite tenui basi tomentoso. — Ad ligna decorticata Pinea patrida Vogesorum, Jurassi, hyeme, vere. — Fl. fr. 5. p. 17. Mong. et Nestl. vog. p. 782. — *Gregarium* tenue; capitulum lave 1 lin. latum; stipes basi tomentulo niveo cinctus.
3. *H. HIRSUTUM* (Tode meck. 1. t. 4. f. 36.) fugax niveum, stipite tenui hirsuto; capitulo convexo hemisphærico hirsuto subtùs glabro lavei. — In ramulis et herbis putridis in umbrosis sylvarum circà St.-Sever ex cl. L. Dufour in ann. sc. nat. t. 13. p. 320. t. 10. f. 2. — Capitulum semilineam vix latum.
4. *H. AGARICIFORME* (DC. fl. fr. 2. p. 75.) candidum glabrum, stipite elongato æquali, capitulo tenui orbiculari primum plano demùm convexo. — Ad lignum putridam, aut. — *H. aciculare* Pers. syn. 677. *Leotia acicularis* Pers. obs. 2. t. 5. f. 1; t. 6. f. 1. 2. *Helvella acicularis* Bull. champ. t. 473. f. 1. *Helv. agariciformis* Bolt. fung. t. 98. f. 1. Sow. fung. t. 57. — *Gregaria tenax* demùm cinerascens; stipes $\frac{1}{2}$ unc. longus tenuis firmus; capitulum 1-2 lin. latum.
5. *H. FIMETARIUM* (Pers. syn. 678.) parvum amœne rubrum glabrum, stipite gracillimo æquali, capitulo e conico explanato subangulato. — Ad finum vaccinum exsiccatum, serò aut. — Fl. fr. 2. p. 75. *Leotia fimetaria* Pers. obs. myc. 2. t. 5. f. 4. 5. — *Gregarium* vix semi-lin. altum.

XVIII. *RHIZINA* Fries obs. myc. 1. p. 161; syst. myc. 2. p. 32. Pers. myc. eur. 1. p. 216. — *Helvellæ* sp. Pers. syn. DC.

Receptaculum tenue effusum crustaceum bullatum subtùs concavum, fibrillis pluribus sparsis marginalibusve radiciformibus suffultum; hymenium lave persistens totam superficiem superiorem occupans; thecæ fixæ amplæ. — Fungi persistentes rigidi fragiles carnosí terrestres, margine primò byssino, stipite nullo.

1. *R. UNDULATA* (Fries obs. 1. p. 161.) effusa undulata spadicea, margine infexo, subtùs flocculosa fibrisque pallidis. — Ad terram nudam aut suprà muscos, vere, æstate imprimis autumno. — *Helvella acaulis* Pers. syn. 614. Fl. fr. 2. p. 93. *Elv. inflata* Schæff. fung. t. 153. — *Junior planiuscula uncialis* margine albicante, adulta convexa undulata 2-3 unc. lata.

Sect. II. HELVELLÆ Ad. Brongn. class. champ. p. 84.

Receptaculum inverse cupulatum aut mitriforme nunquam clausum.

XIX. *HELVELLA* Linn. gen. Fries syst. myc. 2. p. 13.

Receptaculum suborbiculare pileatum centro suffultum deflexum

756 ACOTYL. seu CELLULARES. HELVELLA.

subinflatum sinuosum subtus concavum sterile supra marginaque tecum hymenio lœvi persistente; thecæ fixæ. — Fungi persistentes subfragiles ceraceo-membranacei stipitati, stipite cum centro receptaculi contiguo, pileo adulto mitræformi compresso lobato subtus pruinoso; ad terram vel ligna valde mucida obvii.

I. Pezizoideæ (Fries l. c.).

Stipes elongatus tenuis primò farctus demùm subcavus; pileus membranaceus lœvis semper liber. — Graciles non edules.

1. H. BREVIPEX (DC. fl. fr. 5. p. 28.) stipite brevi tereti fistuloso vix subsulcato, pileo fusco libero mitræformi. — Ad terram in sylvâ Funay propè Cænomanum reperti cl. Desportes, vere. — Stipes unciam vix altus.

2. H. CINEREA (Vill. dauph. p. 1045.) pileo deflexo libero lobato undulato fuligineo, subtus stipiteque medio attenuato subnudis. — Ad terram humosam in sylvis Delphinatûs ex Vill. — H. pulla Holmsk. ot. 2. t. 26. Fries syst. myc. 2. p. 20. — Mich. gen. t. 86. f. 9. — Stipes 2 unc. vel. parum ultrà longus, 2 lin. crassus fuliginosus; pileus 1-1 ½ unc. latus, junior lœvis compressus demùm inflatus undulatus.

3. H. ELASTICA (Bull. champ. t. 242.) pileo libero lœvi inflato demùm acute lobato, stipite elongato tenui attenuato pruinoso. — Ad terram in humidis et sylvis frondosis, aest., aut. — Fl. fr. 2. p. 94. H. mitra Bolt. fung. t. 95. H. albida Pers. H. fuliginosa Sow. fung. t. 154. Schæff. t. 220. — Var. albida pallidè fuliginea et fusca, 3-4 unc. alta; pileus unciam vix attingens 2-3-lobas subindè orbicularis leviter plicatus.

II. Mitræ (Fries l. c.).

Stipes firmus deorsum subincrassatus; pileus ceraceo-membranaceus inflatus primo stipiti adnatus demùm liberatus undulato-plicatus. — Magnæ edules.

* Stipite lacunoso.

4. H. CRISPA (Fries syst. myc. 2. p. 14.) pileo deflexo lobato liberato criso pallido, subtus dilute rufescente, stipite fistuloso costato-lacunoso. — Ad solum subhumidum sylvarum, aut. — Mich. gen. t. 86. f. 7. — Solitaria magna 3-5 unc. alta; stipes niveus exsiccatione flavescens; pileus inflatus laciniato-contortus et crispatus.

a. alba, pileo albo pallescente. — H. mitra var. alba Bull. champ. t. 466. DC. fl. fr. 2. p. 94. H. mitra Sow. fung. t. 39. H. leucophæa Pers. Grev. crypt. fl. t. 143. H. albida Schæff. fung. t. 282.

b. fulva, lutescens sicca subfulva. — H. mitra var. fulva Bull. et DC. l. c. — Bolt. fung. t. 2. f. G.

5. H. LACUNOSA (Afzel. in vet. ac. handl. 1783. p. 303. var. a.) pileo inflato lobato cinereo-nigro, lobis deflexis adnatis, stipite fistuloso costato-lacunoso. — Ad terram et truncos mucidos, vere et aut. — Holmsk. ot. 2. t. 24. Fries syst. myc. 2. p. 15. Chevall. fl. par. 1. t. 6. f. 5. — Pileus 2-4-lobus vix laciniatus; præcedenti plerumque minor.

a. major (Fries) stipite albo. — H. mitra Schæff. fung. t. 154. Ness syst. f. 163. H. mitra var. fusca Bull. et DC. ll. cc.

b. minor (Fries) stipite nigricante. — H. monacella Schæff. fung. t. 162.

* * Stipite lœvi.

6. H. ESCULENTA (Pers. comm. 64; syn. 618.) pileo inflato difformi undulato gyroso-rugoso brunneo, margine stipiti lœvi villosa adnexo. — In pinetis regionum montosarum Vogesorum ex cl. Pers. et probabiliter Galliae totius, in locis nudis subhumidis, præcipue ad viarum latera arenosa, vere. — Tratt. ess. schw. p. 161. t. CC. Pers. champ. com. t. 4. — Mentz. pug. t. 6. id. 1um. Weinm. herb. t. 523. f. J. — Stipes albidus mollis angulatus vel compressus

4-8 lin. crassus villo albicante vestitus; pileus 1-3 unc. latus fulvo-spadicenus subtus villosus albidus.

7. *H. INFULA* (Schäff. fung. t. 159.) pileo deflexo lobato adnato subcinnamomeo, stipite sublaevi villoso pallido. — Cum priore. — Pers. champ. com. p. 80. *H. mitra* Willd. sv. bot. t. 264. f. 3. *Phallus triceps* Fl. dan. t. 835. — Weinm. herb. t. 524. f. a. — Major; stipes 1-2 unc. longus villo tenui albidus obductus junior teres demum compressus; pileus 2-4 unc. latus subtus villosus albidus.

8. *H. MONACHELLA* (Fries syst. myc. 2. p. 19.) pileo deflexo lobato adnato laevi subspadiceo, stipite cavo laevi glabro albo. — Ad aggeres sub arboribus propè Parisios ex cl. Pers., vere. — *H. leucopus* Pers. myc. eur. 1. p. 213. *H. spadicea* Schäff. fung. 4. t. 283. *Phallus monachella* Scop. — Mich. gen. t. 86. f. 8. — Stipes 1-2 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. vix crassus primo teres dein subcompressus; pileus colore varius badius spadiceus nigrescens, etc.

XX. MORCHELLA Dill. gen. 74. Pers. disp. 36. DC. fl. fr. 2. p. 212. — *Phalli* sp. Linn. Vent.

Receptaculum rotundatum clavatum vel pileatum plicato-reticulatum cellulisque numerosis et irregularibus excavatum centro suffultum et cum stipite confluens; hymenium superficiem superiorem occupans plicatum persistens; thecae fixæ. — Fungi majores terrestres firmi cereo-carnosi diu persistentes esculenti, stipite subcavo.

* *Pileo basi adnato.*

1. *M. ESCULENTA* (Pers. syn. 618.) pileo ovato basi adnato, costis firmis in areolas anastomosantibus, stipite laevi cylindrico. — Ad terram, vere. — Fl. fr. 2. p. 213. Grev. crypt. fl. t. 68. *Phallus esculentus* Linn. Schäffer fung. t. 199. Bull. champ. t. 218. Bolt. t. 91. — Lob. ic. 2. p. 271. — Stipes uncialis molles albidus; pileus quoad formam magnitudinem et colorem admodum varians.

a. rotunda (Fries) pileo areolisque rotundis. — Mich. gen. t. 85. f. 1. — Color albido-pallidus siccus stramineus.

b. vulgaris (Pers.) pileo ovali, areolis subquadrangularis. — Tourn. inst. r. h. t. 329. Mich. gen. t. 85. f. 2. — Color plerumque livido-fuligineus siccus brunneus.

c. fulva (Fries) pileo areolisque oblongis. — Batt. hist. t. xi. f. F. — Color fulvus aut fulvo-fuscens.

d. conica (Fries) pileo conico areolis elongatis. — *M. conica* Pers. champ. comest. 256. — Fl. dan. t. 53. sv. bot. t. 258. — Color brunneus spadicenus nigricans.

2. *M. DELICIOSA* (Fries syst. myc. 2. p. 8.) pileo subcylindrico acuto basi adnato, costis longitudinalibus firmis, rugis transversalibus connexis, stipite laevi. — In graminosis frondosis, ad agrorum margines circa Parisios ex Vaill. et Chevall., vere. — Vaill. par. 21. Weinm. herb. t. 533. f. 1. — Stipes cavus vix unciam attingens 3-4 lin. crassus; pileus flavicans e conico-cylindricus 1-2 $\frac{1}{2}$ unc. longus, areolis oblongo-linearibus profundis.

3. *M. CRASSIPES* (Pers. syn. 621.) pileo brevi conico celluloso acuminato, stipite inferne dilatato superne attenuato. — Circa Pontchartrain. — Fl. fr. 3. p. 213. *Phallus crassipes* Vent. mem. inst. 1. p. 509. f. 2. — Pileus brunneus.

4. *M. TREMELLOIDES* (Pers. syn. 621.) pileo ampio inflato undulato lobato cellularoso-lacunoso, stipite brevi crassissimo. — Ad terram circa Pontchartrain. — Fl. fr. 2. p. 213. *Phallus tremelloides* Vent. l. c. p. 509. f. 1. Bull. herb. t. 218. f. 1. *Gyrocephalus carnutensis* Pers. — Stipes pruinatus laevia pallidus; pileus 2-4-lobus 2-3 unc. latus flavescens.

* * *Pileo basi a stipite libero.*

5. *M. PATULA* (Pers. syn. 619.) pileo subrotundo-ovato obtuso ad medium li-

bero, areolis rhomboideis, stipite lœvi cavo. — Ad terram in sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., et probabiliter in omni Gallia, vere. — Nees syst. f. 164. Chevall. fl. par. 1. t. 8. f. 6. Helvella esculenta Sow. t. 5r. fig. med. — Stipes 2 unc. circiter longus albidus; pileus supra flavus rufescens fulvo-spadicens, siccus obscurior.

6. M. SEMILIBERA (DC. fl. fr. 2. p. 212.) pileo conico ad medium libero, costis longitudinalibus in areolas oblongas intus venosas junctis, stipite longissimo lœvi. — In sylvis circa Parisios, vere. — Helvella hybrida Sow. fung. t. 238. — Mich. gen. t. 84. f. 3. — Stipes 3-4 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus albus, pileus brevis uncialis lutescens siccus sordide fulvus.
7. M. RIMOSIPES (DC. fl. fr. 2. p. 214.) pileo conico obtuso basi subcontracto rufo-brunneo, areolis rhomboidalibus, stipite elongato irregulariter rimoso cavo. — Ad terram in sylvis circa Fontainebleau ex cl. DC., Mortefontaine ex cl. Graves. — Unc. 6 alta; stipes crassus albidus subceraceus.
8. M. FUSCA (Pers. myc. eur. 1. p. 205.) pileo subrotundo obscure fusco, areolis costis majoribus rectis subparallelis, stipite longo fuligineo-albido. — Circà Parisios ex cl. Pers. in sylvâ Abbécourt propè Beauvais ex cl. Graves. — Stipes 3 unc. altus, 1 crassus lœvis subflaccidus; pileus brevis submembranaceus.

XXI. VERPA Swartz in vet. ac. handl. 1815. p. 29. Pers. myc. eur. 1. p. 202.
Fries syst. myc. 2. p. 23.

Receptaculum pileatum campanulatum centro suffultum carnosum supra hymenio undique tectum; hymenium lœve vel rugulosum non costatum persistens; thecæ fixæ. — Fungi terrestres stipitati stipite cavo subdiscreto a pileo orbiculari integro.

1. V. DIGITALIFORMIS (Pers. myc. eur. 1. p. 202. t. 7. f. 1-3.) pileo campanulato subcylindrico digitaliformi umbrino ruguloso, stipite æquali transversim squamuoso. — In sylvis Jurassi detexit cl. Chaillet ex Pers., propè Compiègne (cl. Graves), vere. — Gregaria; pileus 3-4 lin. altus totidem latus inferne pallidus aut subalutaceus; stipes 1 $\frac{1}{2}$ -2 uncias longus 3 lin. crassus fuscescens.
2. V. AGARICOIDES (Pers. myc. eur. 1. p. 203. t. 7. f. 4. 5.) pileo campanulato subplicato dilutè badio subtus stipiteque lœvi pallescente. — In sylvâ Boloniensi propè Parisios, in sylvis circa Beauvais ex cl. Graves, vere. — V. morchellula Fries syst. myc. 2. p. 24. Morchella agaricoides DC. fl. fr. 2. p. 212. — Subsolitaria; stipes 3 unc. circiter longus lin. 2 crassus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. altus et latus deinùm corrugatus.

XXII. LEOTIA Hill. hist. 43. Fries syst. myc. 2. p. 25. Ad. Brong. class. champ. 85.
— Helvellæ sp. DC. — Leotiæ sp. Pers.

Receptaculum pileatum orbiculare centro suffultum margine revolutum supra margineque hymenio vestitum; hymenium confluens undulatum vel lœve persistens; thecæ fixæ clavato-cylindricæ. — Fungi gregarii terrestres mediæ magnitudinis stipitati carnosò-molles subtermellosi.

Sect. I. CUCULLARIA Fries syst. myc. 2. p. 22.

Pileus carnosus exsiccatus persistens liber margine revolutus.

3. L. CIRCINANS (Pers. comm. clavæf. p. 31; ic. pict. t. 5. f. 5-7.) pileo carnosò convexo demùn undulato, margine involuto, nervis subtus in stipitem decurrentibus, stipite fistuloso subpulverulento. — In sylvis Abiegnis in uscosis Jurassi, aut. — Fries syst. myc. 2. p. 27. — Gregaria subcespitoa vel in circulos disposita; stipes 1-2 unc. longus 1-2 lin. crassus pulvere albido conspersus; pileus 4-7 lin. latius ex pallido ad subcinnamomeum varians, humidus viscosus.

2. *L. PLATYPODA* (Fries syst. myc. 2. p. 28.) pusilla, pileo subreflexo plicato undulato fusco, stipite compresso sordide albo. — Ad terram in Galloprovincia circa Grasse. — *Helvella platypoda* DC. fl. fr. 5. p. 29. — *Gelatinosa subcoriacea* 6 lin. alta.

Sect. II. *HYGROMITRA* Fries l. c. — *Tremella hygromitra* Nees syst. p. 157.

Pileus tremellosus aut carnoso-gelatinosus putrescens nec persistens clavatocapitatus margine subtus adnato.

3. *L. GELATINOSA* (Hill. hist. 43. n. 3. 4.) tremellosa, pileo tumido repando flavo-viridi margine rotundato, stipite cavo subæquali flavo. — Ad terram inter folia delapsa in humidis. — *L. lubrica* Pers. Fries syst. myc. 2. p. 29. Grev. cr. fl. t. 56. *Helvella gelatinosa* Bull. champ. t. 473. f. 2. Sow. t. 70. Fl. fr. 2. p. 95. — *Vaill. bot.* t. 11. f. 7-9. Mich. gen. t. 82. f. 2. — *Gregaria subcespitosa*; stipes 1-3 unc. longus; pileus lubricus unciam haud attingens margine inflexo connato. Variat pileo fusco-roso flavo et viridi.

a. flavo-virens, pileo tenui deflexo plano-lacunoso. — *Helvella flavo-virens* Nees syst. f. 162.

f. vulgaris, pileo plano-convexo subumbonato undulato-tuberculoso. — *L. lubrica* Pers. myc. eur. 1. t. 9. f. 4-7. Mong. et Nestl. vog. n. 224.

g. Cornucopiae, pileo depresso lævi. — *Peziza Cornucopiae* Hoffm. veg. cr. 2. t. 6. f. 1. *Clavaria tremula* Holmsk. ot. 1. p. 27. ic.

4. *L. ATRO-VIRENS* (Pers. myc. eur. 1. p. 202. t. 9. f. 1-3.) pusilla subcarnosa atro-virens, pileo orbiculari planiusculo stipiteque sursum incrassato lævibus. — In humidis ad vias sylvarum Vogesorum reperit cel. Maugeot ex cl. Pers. — *Gregaria* vix ultra 6 lin. alta; pilens 2-3 lin. latus.

XXIII. *VIBRISSEA* Fries syst. myc. 2. p. 31. Ad. Brongn. class. champ. 84.

Receptaculum capitatum centro suffultum margine primò undique stipiti adnato mox libero; hymenium superficiem superiorem occupans læve nudum persistens, dein verò ex thecis paraphysibusque erumpentibus velutinum. — Fungi minores gregarii lignatiles carnosoceracei, capitulo hemisphærico marginato subtus concavo.

1. *V. TRUNCORUM* (Fries l. c.) simplex, capitulo orbiculari aureo, stipite tereti e glauco-nigricante. — Ad ligna Pinea in Vogesorum rivulis (cl. Moug. et Nestl.), aest. — *Leotia truncorum* Alb. et Schw. consp. t. 3. f. 2. *Leotia Clavus* Pers. myc. eur. 1. t. 11. f. 9. Mong. et Nestl. vog. n. 781. — *Gregaria*; stipes lineam haud crassus albidos exsiccatus basique attenuatè nigrescens ex 2-12 lin. altus; capitulum 1-2 lin. latum flavum exsiccatum aurantio-rubrum, recens glabrum nudum mox verò in sole albo-floccosum; sub lente fila alba ex hymenio frequentissimè erumpere conspiciuntur, pileo longiora geniculata continuo oscillantia.

Subtrib. II. *CLAVARIEÆ* Fries syst. myc. 1. p. 461. Ad. Brong. l. c.

Receptaculum erectum claviforme in formam cylindricam tendens simplex vel ramosum; hymenium læve magnam partem receptaculi obtegens thecas sublineares gerens.

XXIV. *MITRULA* Fries syst. myc. 1. p. 491.

Receptaculum clavatum ovatum læve basi stipitem discretum arctè ambieus; hymenium superficiem externam undique obtegens; thecae elongatæ. — Fungi minores epiphyti carnosí simplices distinctè stipitati.

1. *M. PHALLOIDES* (Chevall. fl. par. 1. p. 114.) fragillima, clava obtusa lutea, sti-

760 ACOTYL. seu CELLULARES.

pite pallido. — Ad folia semiputrida in paludosis, maio-aug. — *M. paludosa* Fries. *Leotia nliginosa* Pers. champ. com. 83. Grev. crypt. fl. t. 312. L. Ludwigi, Dicksonii, Bulliardii, Laricina Pers. syn. t. 3. f. 13. Fl. dan. t. 1377. *Helvella Bulliardii* DC. fl. fr. 2. p. 95. H. Laricina Vill. dauph. 3. t. 56. *Clavaria phalloides* Bull. champ. t. 463. f. 3. Cl. epiphylla Dicks. cr. 3. t. 9. f. 10. — *Gregaria subcespitosa* intus cava; stipes nunc rectus uncialis nunc elongatus flexuosus; clavula 2-4 lin. longa.

XXV. TYPHULA Fries obs. myc. 2. p. 296; syst. myc. 1. p. 494.

Receptaculum subcylindricum hymenio undique sporigerō vestitum, a stipite capillari discretum; thecæ ob tenuitatem plerūque oblitteratæ. — Fungilli tenelli epiphyti; clavula carnosa; stipes subtenax sèpè pubescens.

I. TYPHELLA.

Clavula simplex aut *subramosa*.

1. T. *FUSCIPES* (Dub. mss.) clavulâ subincrassatâ flavo-cinnamomeâ, stipite longiusculo glabro nigro-fusco. — Ad ramulos siccos propè Parisios ex Thuill. et Chevall. — *Clavaria fusipes* Pers. myc. eur. 1. p. 189. — Lin. 9 ferè longa, $\frac{1}{2}$ lin. crassa; clavula subflexuosa obtusa.
2. T. *FILICINA* (Dub. mss.) sparsa elongata subfiliformis pallidè rufescens glabra, tuberculo nullo. — In locis humidis ad stipites aridos Filicis maris in Vogenesis et circà Parisios ex cl. Pers., propè Beauvais ex cl. Graves. — *Clavaria filicina* Pers. l. c. T. Todei Fries? — Unc. 1. altus $\frac{1}{2}$ lin. crassus; clavula teres subacuta stipite brevior et paulò erassior.
3. T. *PERONATA* (D. mss.) simplicissima albescens, clavulâ brevissimè subacutâ, stipite longiusculo pubescente, tuberculo nullo. — In Vogenesis rariùs ad strobilos Pini sylvestris ex Pers. — *Clavaria peronata* Pers. myc. eur. 1. p. 190. — *Clavula* vix 2 lin. longa; stipes 6-9 lin. longus membranâ villosâ quasi vestitus.
4. T. *GYRANS* (Fries obs. myc. 2. p. 296.) simplex alba, clavulâ cylindricâ glabra, stipite longo pubescente basi tuberculo albido lœvi minimo innato; — Ad folia decidua exsiccata, aut. — *Clavaria gyrans* Batsch. el. 1. f. 194. Fl. fr. 5. p. 29. *Clav. granulata* Willd. ber. t. 7. f. 17. — Lin. 3-5 alta; stipes debilis subdecumbens.
5. T. *ERYTHRORUS* (Fries l. c.) simplex minuta gregaria, clavulâ glabratâ cylindricâ brevi albâ, stipite elongato filiformi stricto atro-rubente tuberculo fusco depresso innato. — Ad stipites folia, etc., aut. — *Clavaria gyrans* Bolt. t. 112. non Batsch. *Cl. erythropus* Pers. syn. t. 3. f. 14. Fl. fr. 5. p. 23. *Phaeorrhiza erythropus* Grev. cr. fl. t. 43. — Stipes 6 lin. longus subcorneus; clavula 2-3 lin. longa.
6. T. *FILIFORMIS* (Fries l. c.) gracilissima subramosa elongata pubescens, clavulis incrassatis albidis pilosis. — Ad folia decidua semi-putrida in sylvis, aut. — *Clavaria filiformis* Bull. champ. t. 448. f. 1. Sow. t. 387. f. 4. Fl. fr. 2. p. 98. *Himantia lateritia* Pers. syn. *Ozonium lateritium* Pers. myc. eur. 1. p. 87. — Decumbens serpens libera subflexuosa modo fusca modo cinereo-rufescens ut plurimum lateritia.

II. PENICILLARIA Chevall. fl. par. 1. p. 111.

Clavula gracilis apice penicillatè incisa.

- 7? T? *PENICILLATA* (Dub. mss.) exigua elongata gracilis lutea glabra, apice penicillatim diasepto. — Ad ligna demortua. — *Clavaria penicillata* Bull. champ. t. 448. f. 3. Fl. fr. 2. p. 99. *Penicillaria multifida* Chevall. — Vaill. bot. t. 8. f. 3. — An hujus generis?

XXVI. PHACORRHIZA Pers. myc. eur. I. p. 193.

Receptaculum clavæforme cum stipite angustiore confluens in tuberculo volvaceo carnoso primò inclusum, dein ex hoc per fissuram protrusum. — Fungilli epiphyti; clavulâ carnosâ.

1. *P. SCLEROTIOIDES* (Pers. myc. eur. I. p. 193 excl. icon.) sparsa, clavulâ simplici elongatâ albâ, tuberculo badio aut nigro. — Ad caules exsiccatos Sonchi Alpini, Cacaliæ Petasitis, etc., in summis Vogesis detexit cl. Mongeot, vere et aest. — Moug. et Nestl. vog. n. 885. — Tuberulum globosum ab initio lœve et facile pro Sclerotio Semine habendum, demum collapsum rugosum; clavula elongata erecta aut incurvata flexuosa 2-4 lin. alta. — Generi sequenti (Pistillariæ) adnumerandam censem cl. Fries.
2. *P. AMANSII* (de Brondeau crypt. agenn. fasc. I. p. 10. t. I.) gregaria, clavulis cylindraceis albis e tuberculo ochraceo sinnato-rugoso fasciculatim emergentibus. — In Populi nigræ foliis deciduis circa Agianum ex cl. de Brond. — Stipes parum distinctus.

XXVII. PISTILLARIA Fries syst. myc. I. p. 496. Ad. Brongn. class. champ. p. 86. — Clavaria sp. Pers. DC.

Receptaculum tenué cylindricum absque stipite discreto; hymenium concretum totam ferè superficiem occupans lœve sed ad apicem tantum sporigerum; thecæ nullæ aut subobliteratae; sporulæ emergentes. — Fungilli exigui tenues epiphyti carnosí simplicissimi clavati vel lineares.

1. *P. MICANS* (Fries I. c.) obovata micanti-rosea, stipite brevissimo albidente. — Ad stipites et folia arida, vere. — Clavaria micans Pers. comm. 85. DC. fl. fr. 2. p. 96. Clav. acrospermum Hoffm. germ. crypt. I. 7. f. 2. Stilbum micans Pers. myc. eur. I. p. 355. — Sparsa subgregaria lin. 1-2 alta submollis; stipes ferè pellucidus.
2. *P. OBTTUSA* (Dub. mss.) candida oblongo-ovata obtusa cum stipite brevi colore confluens. — Ad caules exsiccatos Sonchi Alpini in præruptis Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.). — P. quisquiliaris Fries syst. myc. I. p. 497. Clav. obtusa Sow. t. 334. f. 1. Pers. myc. eur. I. p. 190. Moug. et Nestl. vog. n. 683. — Gregaria 3-4 lin. alta; clavula firmula quassim complanata vel bifida.
3. *P. MUSCICOLA* (Fries I. c.) subfiliformis sursùm leviter incrassata alba basi dilatata. — Inter folia viva magnorum Muscorum circa Parisios ex cl. Chevall. — Clavaria muscicola Pers. obs. myc. 2. t. 3. f. 2. Nees syst. f. 154. — Gregaria, 2-4 lin. longa subcurvata obtusa glabra.

XXVIII. SPATHULARIA Pers. comm. p. 34. DC. fl. fr. 2. p. 295.

Receptaculum clavatum verticale compressum utrinque in stipitem discretum decurrens; hymenium superficiem omnem occupans supernè thecis tectum; thecæ subelongatae. — Fungi epiphyti carnosò-membranacei simplices distincte stipitati.

1. *S. FLAVIDA* (Pers. I. c.; myc. eur. I. p. 197.) — Ad folia dejecta Pinorum, muscos putrescentes, etc., aut. — Fl. fr. I. c. Grev. crypt. fl. t. 165. Elvella clavata Schæff. t. 149. Clav. spathulata fl. dan. t. 658. Schmied. ic. t. 50. f. 1. — Gregaria primò pallida dein lutea, stipite albidoire.

XXIX. GEOGLOSSUM Pers. obs. myc. I. p. 11; myc. eur. I. p. 193. Fries syst. myc. I. p. 487. — Clavaria sp. DC.

Receptaculum erectum clavæforme aut subspathulatum deorsum in stipitem productum; hymenium concretum clavulam incrassatam am-

762 ACOTYL. seu CELLULARES.

biens undique thecas gerens a stipite vero diseretur; thecae elongatae.
Fungi terrestres subgregarii carnosí simplices nigricantes viridesve,
stipite tenuiori.

1. *G. HIRSUTUM* (Pers. syn. 608.) subfasciculare hirsutum nigrum, clavula elongata aut subrotunda compressa aut capitata. — In graminosis paludosis, etc., aut. — Nees syst. f. 157. Grev. crypt. fl. t. 185. Clavaria ophioglossoides Schmid. ic. t. 25. Holmsk. ot. 1. p. 18. ic. Sow. t. 83. Schæff. t. 327. — Mich. t. 87. f. 8. — Forma varia, unc. 1-3 alta.
2. *G. GLABRUM* (Pers. obs. 2. p. 61; syn. 608.) glabrum siccum nigricans, stipite subsquamuloso. — Ad terram in graminosis, aest., aut. — Clavaria ophioglossoides Linn. Bull. champ. t. 372. Fl. fr. 2. p. 101. Bolt. t. 111. f. 2. Fl. dan. t. 1076. f. 2. — Vaill. par. t. 7. f. 3. Mich. gen. t. 87. f. 4.
 - a. *vulgare* (Pers.) fusco-nigrum, stipite lœvi, clavula subangustâ passim bifida. — Gregarium; stipes elongatus basi albido-villosus; clavula uncialis 2-3 lin. lata.
 - β. *paludosum* (Pers.) glabrum nigrum, clavula subtereti, stipite lœvi. — In paludosis Vogesorum. — Moug. et Nestl. vog. n. 95. — Stipes glaberrimus olivaceo-niger.
 - γ. *Sphagnophilum*, glabrum, clavula olivaceo-atrâ, stipite tereti sublongo atro-purpureo. — In torfaceis Vogesorum et vallis Bray propè Beauvais ex cl. Graves. — Præcedentibus majus.
3. *G. GLUTINOSUM* (Pers. syn. 609.) glabrum nigricans subfasciculatum, clavula compressa subelliptica distincta, stipite viscoso. — Ad terram graminosam, præcipue in locis paludosis, aut. — Stipes subæqualis, uncialis et ultra spadiceo-nigricans; clavula obsoletè viscosa.
 - β. *lubricum* (Pers.) totum viscosum, clavula elliptica nigrâ, stipite atro-brunneo. — In herbidis sylvarum Vogesorum (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 780.).
4. *G. VIRIDE* (Pers. comm. 40; syn. 610.) gregarium subfasciculatum viride, clavula distincta, stipite squamuloso. — Ad terram in sylvis, aut. — Grev. crypt. fl. t. 211. Ad. Brongn. class. champ. t. 5. f. 4. Clavaria viridis Schrad. Fl. dan. t. 1258. f. 1. — Variat viride olivaceo-viride vel lutescens, siccum vel viscidum.

XXX. CLAVARIA Vaill. par. p. 39. Nees syst. p. 168. Fries syst. myc. 1. p. 465.
— Clavariæ sp. Pers. DC.

Receptaculum erectum cylindricum homogeneum cum stipite confusum, hymenium concretum lœve superficiem totam occupans sed supernè tantum thecas gerens; thecae subtenues. — Fungi carnosí vel corneo-gelatinosi edules sursum incrassati simplices vel ramosi ramis plerumque attenuatis.

Sect. 1. *CALOCERA* Fries syst. myc. 1. p. 485.

Corneo-gelatinosa tenax viscosa. — Lignatiles fulvæ vel luteæ.

1. *C. CORNEA* (Batsch. el. cont. 1. f. 161.) cespitosa minor simplex ramosaque viscosa lutea fragillima basi connata, apice acuminato. — Ad lignum semi-puridum, jul.-dec. — Fl. dan. t. 1305. f. 2. Sow. t. 40. C. aculeiformis Bull. champ. t. 463. f. 4. DC. fl. fr. 2. p. 98. C. striata Hoffm. 2. t. 7. f. 1. — Lin. 2-3 et ultra alta, recens mollis sublutea sicca cornea rigida aurantiaca.
2. *C. VISCOA* (Pers. comm. t. 1. f. 5.) tenax viscosa vitellina subramosa ramis ramulisque furcatis, caule tenui radicato. — Ad truncos vetustos Pini, jul.-dec. — Fl. fr. 5. p. 30. C. flammea et C. cornuta Schæff. t. 174. 289. C. gelatinosa Holmsk. ot. p. 81. ic. C. coraloides Moug. et Nestl. vog. p. 196 non auct. (ex ipso cel. Moug.). — Plerumque cespitosa, uncialis et ultra; rami æquales parum divisi.

Sect. II. CLAVARIASTRUM. — *Clavaria Fries l. c.*

Carnosum non viscosum sæpius terrestre.

I. *Corynoideæ* (Nees l. c. Fries syst. myc. I. p. 477.). *Simplices solitariæ vel cespitosæ basi attenuatæ.*

3. *C. TORTILIS* (Pers. myc. eur. I. p. 187.) subgregaria parva, clavulis elongatis teretibus aut subincrassatis candidis, stipite subtortili glabro spadiceo. — Ad ramulos et folia arida in Galliâ australi reperiit cl. Dufour ex Pers.
4. *C. EXILIS* (Pers. myc. eur. I. p. 186.) subcespitoa minuta candida, clavula incrassata obtusa acutaque substricta, stipite pellucente. — In pulvere coriario propè Rouen ex Pers., nov. — Lin. 2-3 alta $\frac{1}{4}$ vix crassa firmula. An satis distincta sp.?
5. *C. VIRGULTORUM* (Pers. myc. eur. I. p. 186.) gregaria conferta primò albida dein fuscescens, clavulis elongatis filiformibus basi villosis. — Ad folia sicca et stipites in umbrosis circa Versailles ex Pers., Beauvais ex Graves, aut. — Clavulæ medio paulò crassiores 2 unc. ad 2 $\frac{1}{2}$ altæ, valde tenues basi villositate albida ramulis adhærentes, exsiccatæ pallidæ fuscae.
6. *C. FALCATA* (Pers. comm. t. I. f. 3.) sparsa incrassata solitaria aut rarius geminata candida, clavula falcata obtusa, stipite brevi contiguo pellucido. — Ad terram humosam in fagetis umbrosis circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. I. p. 485. Mich. gen. t. 87. f. 9. — Uncialis et ultra; stipes subflexuosus lineam haud crassus basi leviter pubescens.
7. *C. VERMICULATA* (Mich. gen. t. 87. f. 12.) cespitosa cylindrica alba, clavulis farctis attenuatis subincurvis. — Ad terram in sylvis circa Parisios ex cl. Pers. et Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aut. — Pers. myc. I. p. 184. *C. SOLIDA* Pers. comm. 78. *C. vermicularis* Sow. in nov. act. suec. t. 6. f. 2? — Unc. 1-2 alta; clavulæ interdùm subcompressæ et apice subdivisæ.
8. *C. FRAGILIS* (Holmsk. ot. I. p. 7. ic.) gregaria cespitosa vel solitaria fistulosa fragilis alba aut lutescens infernè attenuata absque stipite distineto. — Ad terram in ericetis et sylvis, ang.-nov. — Fries syst. myc. I. p. 484. Grev. crypt. fl. t. 37. *C. eburnea* Pers. syn. 603. Fl. fr. 2. p. 97. — Mich. t. 87. f. 6. — Unc. 1-3 longa, subindè furcata junior farcta teres stricta dein cava compressa torta sæpè rugosa.
 - α. *gracilis* (Fries) clavulis subæqualibus vel sursùm attenuatis. — Mich. t. 87. f. 13. Fl. dan. t. 775. f. 2. *C. fragilis* Pers. comm. 77. *C. gracilis* - β. *cylindrica* (Fries) stipite tenui, clavulis turgidis obtusis. — *C. cylindrica* Bull. champ. t. 468. f. 2. Pers. comm. 76. *C. pistilliformis* Pers. myc. eur. I. p. 183. — Vaill. bot. t. 7. f. 5. Mich. gen. t. 87. f. 10.
9. *C. ERICETORUM* (Pers. obs. myc. 2. p. 60.) subcespitoa flavescens, clavulis incrassatis subcompressis obtusis interdùm divisis alutaceo-pallidis, stipitibus nitentibus flavis. — Ad terram in sylvis circa Beauvais ex cl. Graves, in ericetis circa Bruyères (cl. Mongeot), aut. — Pers. syn. 600; myc. eur. I. p. 180. *C. argillacea* Nees syst. f. 155. — Fries obs. 2. t. 5. f. 3. — Mich. t. 87. f. 11. — *Fragilis* 1-2 unc. alta carnosò-ceracea adulta rugulosa; stipes sat distinctus glaber luteus.
10. *C. HELVOLA* (Pers. comm. 69.) gregaria subfasciculata, clavulis elongatis sensim incrassatis obtusis flavo-aurantiacis, stipite tenui dilutiore. — Ad terram in pratis et sylvis, aut. — Sw. bot. t. 514. f. 4. Desmaz. cr. exs. n. 219. *C. simplicissima* Willd. *C. Intea* DC. fl. fr. 2. p. 97. *C. teres* Baumg. Lips. t. 4. f. 2 a. — Bull. champ. t. 463. f. 1. R. N. O. — *Fragilis* solida unc. 1-2 alta, lin. 1-2 lata læte flava apice interdùm ferruginea vel cinnamomea.
 - β. *aurantia* (Pers.) subcespitoa parva aurantio-rubra, clavulis subrugosis aut canaliculatis basi tomentosis. — In sylvis. — *C. aurantiaca* Pers. obs. myc. Fries syst. myc. I. p. 482. — *Clavulæ* unc. longæ.

764 ACOTYL. SEU CELLULARES. CLAVARIA.

- γ. *angustata* (Pers. myc.) cespitosa flavescentia, clavulis elongatis subascendentibus deorsum flexuosis. — In pratis montosis muscosis. — C. angustata Pers. comm. t. 1. f. 3. Fries syst. myc. 1. p. 481. — Clav. 2-3 unc. longæ vix lineam crassæ.
11. C. INEQUALIS (Fl. dan. t. 873. f. 1.) fasciculata inæqualis fragilis lutea, clavulis difformibus acutis. — Ad terram, aut. — Pers. myc. eur. 1. p. 178. Desmaz. crypt. exs. n. 309. C. fasciculata Vill. DC. fl. fr. 2. p. 97. C. bifurca Bull. champ. t. 364. DC. fl. fr. 2. p. 98. C. vermiculata Sow. t. 253. — Clavulae compressæ angulatæ vel caudiculatæ sæpe hispidæ et in senio lacerae.
12. C. FUSIFORMIS (Pers. syn. 601; myc. eur. 1. p. 178.) congesto-fasciculata aurea, clavulis subæqualibus incurvis levibus attenuatis basi subcohærentibus subtenacibus. — In ericetis vallis Bray propè Beauvais (cl. Graves), aut. — Sow. t. 224. C. pistillaris Bolt. t. 110. — Unc. 3 circiter alta; clavulae apice obscuriores.
13. C. JUNCÆ (Fries obs. 2. p. 291.) gregaria tenuis subæqualis flaccida obsoletè fistulosa pallida vel rufescens, basi repente fibrillosa. — In nemorosis, ad folia decidua, aut. serotino. — Pers. myc. eur. 1. p. 176. Desmaz. crypt. exs. n. 310. C. hirta Fl. dan. t. 1257. — Mich. gen. t. 87. f. 7. — Debilis 2-5 unc. longa glabra.
- β. *vivipara* (Fries) filiformis, fibrillis lateralibus brevibus deciduis operata. — Ad folia semiputrida. — C. fistulosa Bull. champ. t. 463. f. 12. Fl. fr. 2. p. 97. C. pilosa Pers.
14. C. PISTILLARIS (L. sp. 1651.) solitaria magna glabra firma e flavo subrufescens sursùm incrassata obtusa. — Ad terram in fagetis. — Schæff. t. 169. 270. Batsch. el. f. 46. Bull. t. 244. Sow. t. 277. Fl. fr. 2. p. 96. Schmid. ic. t. 4. f. sup. — Bocc. mus. t. 507. Mich. gen. t. 87. f. 1. 2. — Omnia maxima 4-5 unc. alta junior cylindrica dilatior dein clavata. Variat lutea fuliginea et ferruginea.

II. *Ramariæ* (Fries l. c.). *Ramosæ* trunco tenui erecto, ramis gracilioribus.

15. C. MUCIDA (Pers. comm. t. 2. f. 3; myc. eur. 1. p. 172.) gregaria minuta subramosa albida, apice subinciso lutescente, basi tomentulo cincta. — Ad ligna putrida et terram umbrosam. — DC. syn. gall. p. 20. C. pallida fl. dan. t. 1376. — Vix semiunciam longa carnosæ sicca lutescens, nunc linearis simplex vel vase ramulosa, nunc apice complanata cristata.
16. C. BYSSISEDA (Pers. obs. 1. p. 32; comm. t. 3. f. 1.) varia subramosa parva, junior villosa alba dein glabra pallidè rufescens, radiculis longis byssoides. — Ad ramos Quercus aut Salicis Capreæ propè Parisios ex Chevall., aest. et aut. — Ramaria fimbriata Holmsk. ot. 1. p. 98. ic. — Junior tota byssina alba dein glabriuscula pallidè rufescens; rami juniores plerumque simplices et curvati, maiores furcati 6-12 lin. longi.
17. C. KUNZEI (Fries syst. myc. 1. p. 474.) cespitosa ramosa candida, trunco glabro, ramis confertissimis ramosissimis furcatis subfastigiatis, axillis compressis. — Ad terram in sylvis circa Beauvais (cl. Graves), aut. serotino. — Cespites densi gregarii 1-2 unc. alti, 1 unc. lati; rami subintricati erecti stricti.
18. C. VITELLINA (Pers. myc. eur. 1. p. 170.) cespitosa lœtè flava, trunco tenuissimo simpliciter ramoso, ramulis furcatis obtusis fuscis. — Ad terram in sylvis umbrosis propè Parisios ex cl. Chevall. — Cespitem sublatum unciale sistens. An sp. sat distincta?
19. C. TRICORPUS (Pers. comm. t. 4. f. 3; myc. eur. 1. p. 168.) majuscula nivea ramosissima, trunco elongato tenui basi hirsuto, ramis crassiusculis furcatis palmatisque subfastigiatis. — Ad terram in sylvis circa Parisios ex Chevall. — Gregaria 3 unc. longa; rami glaberrimi.
20. C. RUGOSA (Bull. champ. t. 448. f. 2.) gregaria submagna incrassata simplex

ramosaque tenax rugosa albida, ramis paucis difformibus obtusis. — Ad terram præcipue in locis humidis, aug.-oct. — Pers. comm. t. 2. f. 4. Fl. fr. 2. p. 98. Fl. dan. t. 1301. C. coraloides Sow. t. 278. fig. inf. C. laciniata Schæff. t. 291. — Vaill. bot. t. 8. f. 2. — Unc. 1-2 longa admodum polymorpha.

21. *C. CRISTATA* (Pers. syn. 591; myc. eur. 1. p. 166.) cespitosa ramosa lævis glabra nivea vel albida demum fuliginea, ramis superne dilatatis cristatis acutis. — Ad terram humosam in sylvis, aut. — Desinaz. cr. exs. n. 217. Grev. crypt. fl. t. 190. *C. fallax* fl. dan. t. 1304. f. 2. *C. nivea* Pers. comm. t. 2. f. 4. *C. albida* Schæff. t. 170. *Ramaria cristata* Holmsk. ot. 1. p. 92. ic. — Buxb. cent. 4. t. 66. f. 1. — Admodum polymorpha 1-2 unc. alta; rami infernè simplices plerunque eleganter fimbriati.

β. fallax (Pers.) elongata subsimplex indurata cinerea nigro-punctata. — Truncus Sphæriæ? parasiticæ punctatus.

22. *C. CHIONEA* (Pers. myc. eur. 1. p. 167.) ramosissima nivea, caule tenuissimo ramulis elongatis tenuissimis inæqualibus acuminatis. — Ad terram inter muscos propè Parisios ex cl. Pers., sept. — Biuncialis; ramuli setacei; truncus exsiccando tomento tenui obtegitur.

23. *C. AMETHYSTEA* (Bull. champ. t. 496. f. 2.) ramosissima lævis violacea, ramis elongatis teretiusculis obtusis. — Ad terram in sylvis. Aug.-sept. — Fl. fr. 2. p. 101. Nees syst. f. 151. *C. purpurea* Schæff. t. 172. — Barr. ic. t. 1262. — Cespitosa 2 uncias alta; rami infernè simplices apice multifidi.

24. *C. CROCEA* (Pers. ic. pict. 36. t. 11. f. 6.) minuta tenuis crocea ramosissima, trunco nud. pallido, ramis congestis ramulisque conformibus subfurcatis. — Ad terram in sylvâ Saint-Paul propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. 1. . 474. — Exigua semiunciam alta flaccida.

25. *C. MUSCOIDI* (L. suec. 1270. non Bull.) solitaria erecta ramosa gracilescens lutea, trunco elongato bisterve furcato-diviso, ramis lunulatis acutis. — In sylvis circâ Bayeux (cl. Graves), aut. seniori. — Fl. dan. t. 775. f. 2. Sow. t. 157. *C. corniculata* Schæff. t. 173. Pers. Fries. — Rai syn. t. 24. f. 5. — Sicca exceptâ lisi tomentosa, colore nitido subvitellino; ramuli elongati attenuati alii acuti alii obtusi.

26. *C. PRATENSIS* (Pers. comm. t. 4. f. 5; myc. 1. p. 169.) cespitosa parva lutea, trunco tenui, ramis brevibus geniculatis divaricatis, ramulis subfastigiatis obtusis. — Inter muscos in pratis, aut. — *C. fastigiata* Bull. t. 358. f. D. E. Fl. fr. 2. p. 100. an Linn? *C. muscoidea* Fl. dan. t. 836. f. 2. Bolt. t. 114. non Linn. nec Bull. — Vaill. bot. t. 8. f. 4. — Vix unciam superans; rami molles inæquales.

27. *C. MUSCIGENA* (Schum. sœll. p. 400.) exigua fragilis glabra ramosissima ex alutaceo-ochracea, trunco tenui, ramis flexuosis multifidis, ramulis divaricatis. — Inter muscos ad troncos arborum, jul.-oct. — *C. muscoidea* Bull. champ. t. 358. f. A. B. C. D. fl. fr. 2. p. 99. non Linn. *C. crispula* Fries. — Radiculæ fibrillosæ albæ longissimæ; truncus 1-3 unc. altus flacidus ramis confertis.

28. *C. DECURRENS* (Pers. myc. eur. 1. p. 164.) flavo-fuscescens opaca ramosissima inæqualis, trunco tenui, radiculis fibrillosis albis. — Ad troncos aridos in sylvâ dictâ Laneuville en her propè Beauvais ex cl. Graves. — Cespitem densum efficiens; rami stricti adpressi, ramuli summi brevissimi subacuti. An sp. distincta?

29. *C. STRINGARUM* (Pers. myc. eur. 1. p. 164.) ramosissima helvola opaca, ramis approximatis strictis subglaucis, radice tuberoso-spongiosa. — Ad terram sub Lilacibus (*Syringis* L.) propè Parisios ex cl. Chevall., aut. serotino. — Sapor Amygdali amari.

30. *C. STRICTA* (Pers. comm. 45.) ramosissima pallida subfuscens, trunco tenui fibrillis radicato, ramis ramulisque adpressis strictis acutis. — Ad terram in radicibus annosorum troncorum in sylvis Villers-Coterets propè Parisios ex cl. Chevall., aug.-oct. — Fl. dan. t. 1302. *C. pallida* Schæff. t. 286. — Cau-

766 ACOTYL. seu CELLULARES.

Iis 3 lin. circiter longus et crassus; rami arcuato-divisi plerumque pallidi flavi.

III. Botryoideæ (Nees syst. 168. Fries syst. myc. 1. p. 466.). Ramo-sissimæ, truncо crasso, ramulis obtusis fastigiatis vel brevibus difformibus.

31. C. CINEREA (Vill. dauph. 3. p. 1050.) *gregaria cinereo-rufescens, ramis dilatatis coralloideis compressis glabris solidis, lateralibus subicocompletis, ramulis subfastigiatis obtusis.* — Ad terram in sylvis. — Bull. champ. t. 354. Fl. fr. 2. p. 100. Fries syst. myc. t. 468. Grev. crypt. fl. t. 64. *C. grisea* Pers. Fries l. e. *C. fuliginea* Pers. myc. eur. 1. p. 166. Desmaz. exs. n. 216. — Unc. 2-3 alta; ramuli nunc subulati acuti nunc furcati obtusiusculi.

32. C. CORALLOIDES (L. suec. 1268.) *erecta alba, truncо crassiscole, ramis elongatis rectiusculis dichotomis inaequalibus acutis.* — Ad terram in sylvis Abie-gnis. — Fl. fr. 2. p. 100. var. & Fries syst. myc. 1. p. 467. *C. alba* Pers. myc. *C. Holmskoldiana* Fries Sow. t. 278. fig. sup. — Holmsk. ot. 1. p. 113. t. 12. — Tota glaberrima et candida basi interdum violascens.

33. C. FLAVA (Pers. syn. 586.) *erectior, truncо crasso pallescente, ramis rectis teretibus fastigiatis flavis, ramulis obtusis.* — Ad terram in sylvis, aest. aut. — Fries syst. myc. 1. p. 467. *C. coralloides lutea* Bull. t. 222 et t. 496. f. L. M. P. DC. fl. fr. 2. p. 100. — Schäff. t. 175. 285. 287. — Tourn. inst. t. 332. — Barr. ic. 1260. — Fragilis cespites densos 3-4 unc. altos latosque formans.

34. C. FORMOSA (Pers. ic. pict. 1. t. 3. f. 6; myc. eur. 1. p. 162.) *truncо subde-cumbente albido, ramis elongatis aurantio-roseis, ramulis obtusis flavescen-tibus.* — In sylvā Compiegne ex el. Graves, aest. aut. — Fries syst. myc. 1. p. 466. — Traneus unciam et ultra crassus.

35. C. BOTRYTIS (Pers. comm. 42; myc. 1. p. 161.) *difformis, truncо crasso de-cumbente crassissimo pallido, ramis brevibus subrugosis, ramulis obtusis ru-bris.* — In ericetis et sylvaticis, aest. aut. — Nees syst. f. 150. Fl. dan. t. 1303. *C. plebeia* Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 13. — Schäff. t. 176. — Barr. ic. t. 1259. — Unc. 3 et ultra alta; truncus 1-2 unc. crassus. Var. alba incarnata in-tense lutea.

XXXI. MERISMA Pers. comm. 92; myc. eur. 1. p. 155. *Ad. Brongn. in dict. class. 10. p. 428. Grev. crypt. fl. p. 46.* — Clavariæ sp. DC. — Thelephoræ sp. Fries.

Receptaculum irregulare ramosum ramis compressis apice dilatatis et filamentosis; hymenium concretum lave utramque superficiem occu-pans sed subtus præcipue thecas gerens; thecae distinctæ. — Fungi ter-restres coriacei digitato-aut foliaceo-divisi. — Genus inter Clavariam et Thelephoram medium.

* *Erecta ramosissima, ramis distinctis.*

1. M. CORALLOIDEUM (Pers. myc. eur. 1. p. 159.) *erectum coriaceo-molluscum fusco-nigricans, ramis striatis dilatatis apice fimbriatis albicantibus.* — Ad terram et inter folia, aut. — Thelephora coralloides Fries. Clavaria coriacea Bull. champ. t. 452. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 102. — Apices tomentosi sinuosi dentati. Var. fuligineo-cinerea et nigricans.

2. M. PALMATUM (Pers. myc. eur. 1. p. 157.) *erectum cespitosum purpureo-fus-cum, ramis complanatis lævibus dilatatis palmatis pubescentibus apice albi-cantibus.* — Ad terram in pinetis subhumidis, aut. pluvioso. — *M. fætidum* Pers. syn. 584. Grev. crypt. fl. t. 46. *Clavaria palmata* Scop. Cl. tomentosa Lam. DC. fl. fr. 2. p. 102. — Unc. 1-2 altum basi attenuatum villosum subra-dicatum exsiccatum cinereo-ferrugineum. Odor fætidus.

M. anthocephalum (Fries) subferruginea, ramis approximatis obtuse lacinia-tis fastigiatis. — *M. petaloïdes* Chevall. fl. par. 1. p. 104. t. 6. f. 4. *Clav. anthocephala* Bull. champ. t. 452. f. 1. Sow. t. 156. DC. fl. fr. 2. p. 102.

Thelephora palmata Pers. myc. eur. I. p. 113. — Ramuli sæpè in pileolos cyathiformes concrescant.

γ. *flabellare* (Pers.) fusco-purpurascens tenerius, ramis paucis sublineari- bus incisis fastigiatis. — Ad terram in fageticis versuris, etc., aut. — Desmaz. cr. exs. n. 271. Clav. flabellaria Batsch. el. cont. 2. t. 28, f. 159. *Thelephora flabellaris* Fries. — Omnidò inodorum flexile subglabrum unc. 2-3 altum.

* * *Decumbentia subcrustacea.*

3. M. CINEREUM (Pers. myc. eur. I. p. 157.) griseo-cinereum basi incrustans, ramis ascendentibus apicibus albidiорibus incisis. — In sylvis umbrosis propè Parisios ex cl. Pers., aut. — An a sequenti distinctum?
4. M. CRISTATUM (Pers. comm. 96; myc. eur. I. p. 156.) subdecumbens incrusted tuberculosum pallidum, ramis planis dilatatis laciniatis subdiformibus rugosis fimbriato-cristatis. — Ad terram in locis subhumidis fagorum et pinorum, aug.-oct. — Clav. laciniata Bull. champ. t. 415, f. 1, Sow. t. 158. Fl. fr. 2. p. 102. *Thelephora cristata* Fries. — Mich. gen. t. 66. f. 5. — Primò effusum crustæforme subalbidum demù ramos valde difformes nunc teretes subglabros obtusos, nunc planos fimbriatos protrudens.
5. M. SERRATUM (Pers. comm. t. 4. f. 7; myc. eur. I. p. 156.) subascendens cespitosum viscosum fuligineo-albidum ramosissimum, ramis latiusculis serratis obtusis. — Ad terram inter muscos circà Parisios ex cl. Chevall. — Subcarnosum totum glabrum. Clavariæ potius referendum censem cl. Fries.
6. M. VERMICULARE (Pers. myc. eur. I. p. 155.) decumbens albicans ramosissimum, ramis teretibus attenuatis rugulosis subcarnosis. — Gramina et folia sicca subjacentia incrustans et ambiens in sylvis propè Parisios ex cl. Pers., Beauvais ex cl. Graves. — Rami sat longi sed tenues vix 2 lin. crassi ab initio subgelatinosi dein subcartilaginei.
7. M. FASTIDIOSUM (Pers. syn. 582.) effusum candidum late incrustans e ramis laminosis variis constans. — In sylvis umbrosis circà Beauvais (cl. Graves), aut. — *Thelephora fastidiosa* Fries. — Cespites latos difformes et cum corporibus vicinis confluentes efformans, dein laminosum evadens. Odor fortis fastidiosus.

Subtrib. III. AGARICEÆ Ad. Brongn. l. c. — Pileati Fries syst. myc. I. p. 3.

Receptaculum carnosum suberosumve horizontale nunc pileatum nunc resupinatum effusum crustæforme. Hymenium inferum subeffiguratum rarò lève thecas lineares fixas gerens. Stipes erectus vel adscendens sæpè obliteratus.

Sect. I. AURICULARINEÆ Fries syst. orb. veg. I. p. 81.

Hymenium lève aut papillosum.

XXXII. THÉLEPHORA Willd. ber. p. 396. DC. fl. fr. 2. p. 103. Fries syst. myc. I. p. 428. Pers. myc. eur. I. p. 110. — *Auricularia* Bull.

Receptaculum pileatum formâ varium, subtùs hymenio vestitum; hymenium cum pileo homogeneum et concretum lève vel papillis subrotundis obtusis sparsis obsitum, undique thecas gerens; thecae subimmersæ tenues rarò obsoletæ. — Fungi majores vel medii pileo coriaceo persistente rariùs regulari; st. pite rarissimo.

Sect. I. LEIOSTROMA Fries syst. myc. I. p. 452.

Receptaculum resupinatum subeffusum subcontiguum glabrum lève vel spurie papillosum; contextus subgrumosus; thecae nullæ. — Species lignicole arcte adnatæ non carnosæ vel fibrosæ.

I. T. CINEREA (Pers. syn. 579.) late effusa tenuis sicca lèvis aut papillis spurciis

768 ACOTYL. SEU CELLULARES. THELEPHORA.

irregularibus inaequabilis glabra cinerea. — Ad ramos arborum, vere et aut. — Fl. fr. 5. p. 32. Auricularia cinerea Sow. t. 283. — Nunc uncialis nunc spithamea exsiccata rimosa.

2. T. ACERINA (Pers. syn. 581.) brevis interrupta tenuis inaequabilis glabra albido-caesia spurie papillosa sicca. — Ad trunco Aceris. — Fries syst. myc. I. p. 453. — Subnitida argentea demum confluens.

Sect. II. PHYLACTERIA Pers. champ. com. p. 71; myc. eur. I. p. III.
Fries syst. myc. I. p. 449.

Receptaculum effusum coriaceo-membranaceum submolle imbricatum aut passim subinfundibuliforme; hymenium sublave glabrum setulis (sporidiis) quaterna serie dispositis distinctum. — Species terrestres involventes.

3. T. CARYOPHYLLÆA (Pers. syn. 565.) cespitosa coriacea fusco-purpurea, pileo infundibuliformi striato-fibroso subtus lavei, margine erecto albicante saepius inciso. — Ad terram inter folia et stipites in sylvis frondosis praesertim in pinetis, aut. — Fl. fr. 2. p. 103. Elvella caryophyllæa Schæff. t. 325. Auricularia caryophyllæa Bull. champ. t. 483. f. 6. — Varia tenax 1 1/2 unc. circiter alta; pileus convolutus nunc integer nunc incisus aut ad marginem dissectus; stipes brevis.

β. laciniata (Pers. myc.) imbricata obscurè fusca aut badia, pileo tenui laciniato criso subtus papillis congestis scabro. — T. laciniata Pers. syn. Fries syst. myc. I. p. 431. Grev. crypt. fl. t. 264. Auricul. caryophyllea Sow. t. 213. Helvella caryophyllea Bolt. t. 173.

γ. ambigua (Pers. myc.) minor gregaria, pileo ut plurimum inciso subtus lavei fusco supernè striato. — T. ambigua Pers. obs. I. t. 6. f. 8. et 10. Merulius radiatus Holmsk. ot. 2. t. 59. Nees syst. f. 250.

4. T. TERRESTRIS (Ehr. cr. n. 178.) cespitosa fusco-purpurea, pileo depresso fibroso-strigoso dimidiato, margine albicante, stipite brevissimo. — Ad terram in sylvis arenosis, aut. — Moug. et Nestl. vog. n. 297. Fl. fr. 5. p. 31. Nees. syst. f. 251. T. mesenteriformis Willd. ber. t. 7. f. 15. Auricularia caryophyllea Bull. t. 268. — Pileus plerumque imbricatus aut cum vicinis margine connatus subcrassus horizontalis et stipes inde plerumque lateralis aliquando centralis.

5. T. PHYLACTERIS (DC. fl. fr. 2. p. 106.) membranacea glabra maxima late effusa serpens obscurè fusca basi plicata, margine demum subreflexo tomentoso. — In sylvis plerumque ad basin arborum, aest. fine. — T. fusco-cinerea Pers. myc. I. p. 114. T. biennis Fries. Auricularia Phylacteris Bull. t. 436. f. 2. T. umbrina Pers. syn. — Latitudine saepius ultra palmari serpendo sese extendit; color opacus spadiceus demum nigricans.

β. murina (Pers. myc.) late effusa grisea, margine subimbricato reflexo dilutiore.

Sect. III. POLYPILUS Pers. myc. eur. I. p. 110.

Receptaculum pileatum subcarnoso-coriaceum horizontale aut infundibuliforme stipitatum; hymenium lave. — Sp. majusculæ terrestres cespitosæ.

6. T. FRONDOSA (Pers. myc. eur. I. p. 110.) maxima stipitata formâ varia, stipite tuberoso difformi, pileis imbricatis undulato-crispis glabris pallescentibus. — Ad radices Pini maritimæ detexit D. Cauvin ex cl. Pers., aut. — Stipes simplex aut ramosus 2 unc. longus 1 crassus; pilei lobiformes numerosi dimidiati margine saepius incisi, juniores subalbidi.

Sect. IV. STEREUM Pers. syn. 566; myc. eur. I. p. 116.

Receptaculum pileatum coriaceo-suberosum horizontale resupinatum aut effusum, margine libero; hymenium tuberculis aut papillis distinctis gaudens. Sp. plerumque in truicis aut ramis aridis nascentes.

* *Pileo imbricato horizontali aut effuso reflexo, margine libero.*

7. *T. HIRSUTA* (Willd. prod. ber. 397.) imbricata effuso-reflexa coriacea stri-goso-hirsuta zonata pallida, subtus glabra lœvis latescens fusca aut cinerea. — Ad trabes, ramos mortuos et truncos arborum. — Pers. syn. 570; myc. eur. 1. p. 116. *T. reflexa* Fl. fr. 2. p. 105. *Auricularia reflexa* Bull. champ. t. 274 et 483. f. 3. 4. Sow. t. 27. Grev. crypt. fl. t. 256. *Helvella acaulis* Huds. — Mich. gen. t. 66. f. 2. — Junior resupinata adpressa simplex dein uno latere reflectitur et horizontalis fit. Hymenium variat nunc lœte flavum aut subaurantiacum nunc fuscescens aut cinerascens plerumque verò pallidum.
8. *T. PAPYRINA* (DC. fl. fr. 2. p. 106.) imbricata effuso-reflexa submembranacea striata pubescens, subtus glabra ochracea demùm porosa. — Ad truncos putridos imprimis Pineos et Abietinos, crustas efformans, aut. — *T. ochroleuca* Fries. Pers. *T. sericea* Pers. myc. eur. 4. p. 118. *Auricularia papyrina* Bull. t. 402. Sow. t. 349. — Priori tenuior tomento brevi interdùm sericeo, colore albo vel pallido nitido; plerumque zonata zonis impressis paulò obscurioribus.
9. *T. TABACINA* (Fries syst. myc. 1. p. 437.) imbricata effuso-reflexa tenuis sericea ferruginea nitida, margine undulato criso, subtus glabrincula aut setulosa. — Ad ramulos varios præcipue Coryli, æst. aut. — Pers. myc. eur. 1. p. 118. *T. variegata* Schrad. Pers. *T. ferruginea* Pers. syn. p. 569 non myc. eur. 1. p. 141 nec DC. *T. reflexa* & *variegata* DC. fl. fr. 2. p. 105. Bull. champ. t. 483. f. 5. *Auricularia tabacina* Sow. t. 25. *A. nicotiana* Bolt. t. 174. — Longissimè effusa utrinque libera non rigida. Variat margine aureo aut albidente.
10. *T. RUBIGINOSA* (Schrad. spic. 185.) imbricata rigida zonata rubiginoso-spadicea subglabra, subtus papillosa velutina. — Ad truncos vetustos Quercus, Fagi. — Fl. dan. t. 1619. f. 2. *T. spadicea* Chevall. fl. par. 1. t. 7. f. 1. *T. ferruginea* DC. fl. fr. 2. p. 104. Sow. t. 26. *Auric. ferruginea* Bull. champ. t. 378. — Sublignosa, pilei dense impositi concrescentes, juniores velutini margine pallidiore, dein glabrescentes fusco-nigricantes; hymenium velutinum. Var. tota resupinata.
11. *T. PURPUREA* (Pers. syn. 571.) imbricata coriaceo-mollis strigoso-hirsuta pallida zonata zonis depressis fuscis, subtus glabra purpurea. — Ad truncos arborum, aut. — *T. reflexa* ζ *amethystea* Fl. fr. 2. p. 105. Bull. champ. t. 483. f. 1. *Auricularia persistens* Sow. t. 388. f. 1. — Mich. gen. t. 66. f. 4. — Pilei vix effusi convexo-undulati; hymenium etiam occurrit fuscescens vel expallens.
- T. lilacina* (Pers.) minor pallida tomentosa zonata vel azona subtus dilute purpurea. — *T. lilacina* Pers. syn. 592, fl. dan. t. 1619. f. 1. *Elvella lilacina* Batsch. el. cont. 1. f. 131.
- * * *Pileo resupinato seu lato effuso, margine libero rariùs subreflexo.*
12. *T. PICEÆ* (Pers. myc. eur. 1. p. 123.) resupinata inæqualis depressa glabra fusco-cinerea, subtus papillosa papillis majusculis disiformibus subrugosis. — In Vogenesis ad ramos Pini Piceæ detexit cl. Mougeot ex Pers. — Junior suborbicularis margine subpubescens, demùm irregularis margine libera $\frac{1}{2}$ -1 unc. lata.
13. *T. PINI* (DC. fl. fr. 5. p. 31.) tenuis coriacea resupinata orbiculata purpureo-fuscescens papillosa, subtus glabra pallida. — Ad cortices Pini sylvestris in Alpibus et Jurasso. — Fries syst. myc. 1. p. 443. Pers. myc. eur. 1. p. 123. — Lin. 3 vix excedens, aggregata; papillæ vix distinctæ.
14. *T. RUFO-MARGINATA* (Pers. myc. eur. 1. p. 124.) majuscula suborbicularis glabra rugulosa cinerea, margine rufescente, papillis majusculis confertis lœvibus. — Ad ramos Tiliaceos in Jurasso. — *Auricularia cinerea* Sow. fung. t. 388. f. 3. — Unc. 1 ferè lata rigida fusco-cinerea subunita.
15. *T. CORTICALIS* (DC. fl. fr. 2. p. 106.) resupinata coriaceo-membranacea longitudinaliter effusa carne, margine demùm involuto, subtus libera ni-

770 ACOTYL. seu CELLULARES. THALLOPODIA.

grescens. — Ad ramos emortuos, vere, aut. — T. Quercina Pers. Fries. Grev. crypt. fl. t. 142. Auricularia corticalis Bull. champ. t. 436. f. 1. — Junior per epidermidem ramulorum erumpens, mox dilatata coriacea adpressa dein subtus libera nunc pubescens nunc glabra; hymenium subpapillosum etiam rugosum et rimosum expallens.

16. T. CHAILLETTII (Pers. myc. eur. 1. p. 125.) latè effusa tota glabra subcervina nitens, margine repando demùm libero, papillis copiosis variis. — Ad trunacos Taxi in Jurasso ex cl. Pers. — Subcrassa ferrugineo-nitida 3 unc. longa 1 ½ lata.

17. T. CORYLEA (Pers. obs. myc. 1. p. 35; myc. eur. 1. p. 126.) latè effusa ochracea crassiuscula, margine breviter reflexo, infernè glabra subspadicea. — Ad trunacos Coryli Avellanæ in Vogesis ex cl. Nestl., propè Beauvais ex cl. Graves. — Unc. 3-4 lata; hymenium dilutè ochraceum sèpè rimosum papillis sparsis miuntis obsitum.

18. T. PELTATA (Pers. myc. eur. 1. p. 126.) latissima lutescenti-ochracea subrugulosa, margine demùm lacera infernè umbrina subtomentosa striis radiata. — Ad trunacos arborum propè Dax detexit cl. Thore ex Pers. — Spithamam ferè longa; papillæ vix nullæ.

19. T. AUDIS (Pers. myc. eur. 1. p. 126.) latissima subcrassa pallida ochracea, superficie inæquali rudi rimosâ, infernè strigoso-tomentosa. — Ad trunacos arborum propè Pontivy ex cl. Pers., Beauvais (cl. Graves). — Ramos obdicens ad latitudinem palmarem adpressa subbulbata.

20. T. DISCIFORMIS (DC. fl. fr. 5. p. 31.) tenuis resupinata subrotunda concava coriacea albida suprà glabra aut subpapillosa, margine libera, subtus velutina sordida. — Ad trunacos Querentum vivarum. — T. discoidea Pers. myc. eur. 1. p. 127. — Lin. 6-12 lata duriuscula extùs pallidè rufescens, disco quasi farinacea et lèvis sed demùm sèpius rimosâ.

Sect. v. CORTICUM Pers. syn. 573; myc. eur. 1. p. 128.

Receptaculum resupinatum effusum margine totum adnatum nec liberum; papillæ plerumque perspicue. — Species lignatiles.

* Colore alutaceo rufescente aut incarnato.

21. T. ALUTACEA (Pers. myc. eur. 1. p. 128.) latè effusa suborbicularis, disco rugoso alutaceo-carneo, margine latiusculo lèvi albido. — Ad arborum cortices in locis humidis jacentes propè Parisios ex Chevall., Beauvais ex Graves. — Cortices latè investiens, margine mollis sed non byssoidæ et papillis destituta; papillæ in disco majusculæ alutaceo-pallidæ.

22. T. RADIOSA (Fries obs. myc. 2. p. 277.) effusa confluens lèvis glabra alutaceo-pallida, margine albo fimbriato. — Ad ligna Faginea dejicta propè Parisios ex Chevall. — Arctè adnata 2-3 unc. lata; papillæ nullæ.

23. T. LÈVIS (Pers. syn. 575.) effusa membranacea lèvis pallida subtus margineque araneoso-tomentosa alba. — Ad ramos præsertim Populneos et ad plantarum in frigidariis fulcra in Galliâ boreali ex cl. Desmaz. — Desmaz. cat. 17. — Sèpè spithamæa et ultrà, mollis. Var. cornea alutacea albida.

24. T. ROSEA (Pers. syn. 575.) effusa tenuis membranacea lèviuscula rosea, subtus tomentosa, margine albo byssideo. — Ad cortices et ligna, aut. — Fl. fr. 5. p. 33. — Primò radiosæ-fibrosa dein membranacea contigua disco glabro subpapilloso, vix ultrà 2 unc. lata.

25. T. SALICINA (Pers. myc. eur. 1. p. 132.) latè effusa subcarnosa mollis primò albida dein incarnata, superficie bullato-tuberculatâ pruinosa. — In Salicibus cavis putrescentibus propè Parisios ex Pers., Beauvais ex Graves, Lille ex Desmaz. — Ferè palmaris, exsiccata fuscescit.

26. T. POLYGONIA (Pers. syn. 574.) subeffusa adnata glabra incarnata opaca, tuberculis magnis polygoniis. — Ad ramulos et corticem arborum. — Fl. fr. 5. p. 32. T. colliculosa Hoffm. germ. 2. t. 6. — Juniores suborbicularis margine

subhyssinæ dein confluentæ in erustam papillis spuriis confertis (e tuberculis subjacentibus Sphaeriarum formatis ex cl. Fries) tüberulosam.

27. *T. CASTANEÆ* (Pers. myc. eur. 1. p. 134.) effusa unicolor incarnata tota glabra expallens sicca demùm rimosa, papillis sat copiosis regularibus. — Ad ramos Castaneæ propè Parisios ex Chevall. — Junior orbicularis, margine subradiato arctè adpresso.

* * *Colore pallido ochraceo flavescente et subaurantiaco.*

28. *T. CORRUGATA* (Fries obs. myc. 1. p. 154.) irregulariter effusa arctissimè adnata tenuis rimosissimo-corrugata lurida, papillis nullis. — Ad truncum putridum Salicis propè Beauvais ex cl. Graves. — Glabra 2-3 unc. lata.

29. *T. FRUSTULATA* (Pers. syn. 577; myc. eur. 1. p. 134.) effusa durissima crassa glabra lœvis applanata pallida rimoso-partita, subtus nigricans. — Ad ligna durissima Quercūs. — Fl. fr. 5. p. 31. — Vix unc. 1. magna epapillosa in areolas crassas angulatas diffracta.

B. crassa (Moug. in litt.) subrotunda, disco tuberculoso et inæqualiter impresso, margine undulato-sinuoso, subtus spadicea zonis approximatis transversim sulcata. — Ad trabes Quercūs (cl. Moug. et Nestl. vog. n. 680.). — *T. sinuans* Pers. myc. eur. 1. p. 128.

30. *T. SEBACEA* (Pers. syn. 577; myc. eur. 1. p. 135.) lata effusa incrustans subcarnosa submollis lœvis pallida, papillis nullis, ambitu subsibroso. — Ad terram suprà gramina, folia sicca, etc., propè Lugdunum ex cl. Balbis, Parisios ex Chevall., Beauvais ex cl. Graves, æst. fine post pluvias. — *T. inerans* Pers. syn. 577. Fries syst. myc. 1. p. 448. — Sebi ad instar effusa leviter adhærens 2-3 unc. lata primò albida tandem subrusa.

31. *T. CONFLUENS* (Fries obs. 1. p. 152; syst. myc. 1. p. 447.) arctè adnata subrotunda confluens submembranacea contigua lœvis glaberrima, margine adnata. — Ad truncos arborum in sylvis circa Beauvais ex cl. Graves. — Junior uncialis orbicularis dein confluens alba aut lutea.

32. *T. COMEDENS* (Nees syst. p. 239, fl. 255?) effusa subcorticalis erumpens arctè adnata tenuis glabra intescenti-carnea lœvis demùm rimosa. — Ad ramos exsiccatos circa Lugdunum ex cl. Balbis. — Fries syst. myc. 1. p. 447. *T. decorticans* Pers. myc. 1. p. 137. — Cortices sejungens et destruens et ad spithamam usque longitudinaliter confluens.

33. *T. AURANTIA* (Pers. syn. 576.) elongata nuda glabra crassiuscula aut margine subhyssina aurantiaca, papillis rariss. — Ad lingua et ramulos decorticatos. — Uncialis et ultrà 3-4 lin. lata erumpens, sicca pruinata obiecta.

* * * *Colore croceo aut cruento.*

34. *T. CRUENTA* (Pers. syn. 575.) effusa coriaceo-membranacea utrinque glabra crassiuscula sanguinea, papillis tuberculosis confertis. — In Vogesis et Alpibus ad cortices Pini Piceæ, aut. — Fl. fr. 2. p. 594. Moug. et Nestl. vog. n. 581. *Palmella cruenta* Agardh syst. alg. 15. — Adnata 1-3 unc. effusa sub lente pruinosa interdùm carneæ; papillæ majusculæ in centro conglomeratæ.

* * * * *Colore ferrugineo flavo-fusco fusco-purpurascente aut badio.*

35. *T. FERRUGINEA* (1. syn. 578 non p. 569. nec DC.) effusa suborbicularis ubique tomentosa fer. tea medio pulveraceo-papillosa. — In fissuris truncorum aut sub cortice amorum. — Pers. myc. eur. 1. p. 141. *T. Persoonii* DC. fl. fr. 2. p. 107. — Latè effusa 3 unc. ferè magua.

36. *T. PADI* (Pers. myc. eur. 1. p. 142.) effusa tenuis griseo-ferruginea subfariñacea pilis brévissimis obsita ferè epapillata, plicis oblongis subanastomosantibus. — In Vogesis ad ramos exsiccatos Pruni Padi. — Grev. crypt. fl. 1. 234. — Sicca tenuis subcervina opaca; 3-6 unc. longa.

37. *T. LAXA* (Pers. myc. eur. 1. p. 143.) orbicularis parva subconfluens mollis subtus villosa alba, disco lœvissima fusco-carnaæ. — In summis Vogesorum

772 ACOTYL. seu CELLULARES. TRACHEOPORA.

ex cl. Pers. — *T. evolvens* & *exigua* Fries *el. fung.* — *Subtenuis vix 3 lin. lata flaccida subrimosa. Forte nondum benè evoluta ex Pers.*

38. *T. FRAXINEA* (Pers. myc. eur. I. p. 145.) *inæqualiter effusa fusco-cinerascens subtomentosa compacta, papillis angulatis. — Ad ramos exsiccatos Fraxini propè Beauvais ex cl. Graves. — Interrupta effusa arctè adpressa uncialis; papillæ subumbilicatæ.*

***** *Colore nigrescente cæruleo cæsio cinereo vel griseo.*

39. *T. FULIGINOSA* (Pers. myc. eur. I. p. 145.) *magna coriacea fuliginosa seu nigrescenti-spadicea setulis densis obsita. — Ad ligna cariosa mollia ex Pers. — Subtenuis contigua ad 3-4 unc. effusa 1½ unc. lata, papillis distinctis destituta.*

40. *T. CÆRULEA* (DC. fl. fr. 2. p. 107.) *longitudinaliter effusa subtomentosa amænè cærulea exsiccata rugosa, margine demùm sublibero, papillis parvis subacutis. — Ad ligna aut corticem arborum semiputridarum, hyeme. — Pers. myc. eur. I. p. 147. T. fimbriata Roth. Auricul. phosphorea Sow. t. 383. Mycinema phosphoreum Ag. syst. Desmaz. cr. exs. n. 307. — Nondum evoluta cespituli villosi speciem fert, demùm expansa cæsia cinerea tandemque grisea et subfuliginea evadit.*

41. *T. TILIÆ* (Pers. myc. eur. I. p. 14.) *sublate effusa lævis grisea, margine subtomentoso adpresso, papillis inæqualibus. — Ad ramos putrescentes Tiliæ in Vogesis ex cl. Pers. — Unc. 2 lata fuscescenti-cinerea, junior magis cinerea.*

42. *T. LYCIÆ* (Pers. myc. eur. I. p. 148.) *suborbicularis crassiuscula confluens glabra subnitida albido-cinerascens aut lilacina, papillis minutis subcongestis. — Ad ramos exsiccatos Lycii Barbari in horto botanico Parisiensi ex cl. Chevall., Lilacis ex cl. Pers., Fraxini propè Lille ex cl. Desmazières. — Desmaz. cr. exs. n. 119. — Subpulverulenta intùs fuscescens 6 lin. circiter lata.*

43. *T. GLEBULOSA* (Pers. l. c.) *irregularis glabra subparva cinereo-nitida, detrita intùs fuscescens. — Ad sepes in hortis propè Parisios ex cl. Chevall. — Nunc linearis et continua, nunc glebulosa subrotunda interrupta aut confluens demùm rimosa margine exciso. A priori probabiliter non distinguenda.*

***** *Colore albo.*

44. *T. GIGANTÆ* (Fries syst. myc. I. p. 448.) *magna membranacea subrigida lævissima glabra albido-pallens, recens glauca. — Ad truncos Pineos in Vogesis. — T. pergamentea Pers. myc. eur. I. p. 150. Moug. et Nestl. vog. n. 778. — Spithamam sublonga 2 uncias lata; tennis subpergamenea præcipue exsiccando; papillæ rarissimæ: margo liber subinvolutus.*

45. *T. CRETACEA* (Pers. l. c. non Fries) *lata submollis alba, margine hyssino, papillis confertis parvis rugulosa. — In cellariis et frigidariis ad tabulas Abietinas saepius humectatas ex cl. Pers. et Chevall., hyeme. — Subtenuis lactea exsiccata pallida; margo brevis.*

46. *T. LEUCOCOMA* (Pers. l. c.) *glabra lævissima albido-pallens, margine angusto fusco-nigro. — Ad sepes horti hot. Parisiensis ex cl. Pers. et Chevall. — Unc. 3 longa; margo subsinuatus.*

47. *T. SERA* (Pers. syn. 580.) *nivea effusa pruinato-subtomentosa tuberculosa mollis. — Ad Salices cavas circè Beauvais ex cl. Graves, Parisios ex cl. Chevall., aut. — T. cariosa Pers. l. c. — Subtenuis 2 unc. lata.*

48. *T. CALCEA* (Pers. syn. 581.) *gregaria parvula sicca glabra adhærens inæqualis confluens subrimosa albido-fuscescens, papillis paucis griseis obtusissimis. — Ad cortices arborum. — Fl. fr. 5. p. 32. — Ultra 2 unc. longa ½ unc. lata compacta.*

49. *T. SAMBUCI* (Pers. myc. eur. I. p. 152.) *effusa tenuis candida rugoso-tuberculosa farinoso-cretacea margine glabra, papillis obsoletis. — Ad truncos cariosos Sambuci nigræ, æst. et aut. post pluvias. — Moug. et Nestl. vog.*

n. 779. Desmaz. cr. exs. n. 220. Grev. crypt. fl. t. 242. T. eretacea Fries obs. non Pers. — Thecæ filiformes ; sporidia rotunda pauca.

XXXIII. CONIOPHORA DC. fl. fr. 5. p. 34. Pers. myc. eur. 1. p. 153. Desmaz. catal. 17. Ad. Brongn. in dict. class. 4. p. 399.

Receptaculum membranaceum tenue resupinatum molle ; hymenium cum pileo homogeneum et concretum sporulas in acervulos pulverulentos numerosissimos concentricos dispositas gerens. — Fungi facie sterili omnino adhaerentes orbiculati rugoso-tuberculosi.

1. *C. MEMBRANACEA* (DC. fl. fr. 5. p. 34.) latissima subtenuis membranacea albida zonata zonis fuscis, margine byssino pallido. — Ad trabes ligneas in tepidariis aut in locis humidis. — Pers. myc. eur. 1. c. — Suborbicularis 4-5 unc. lata e matrice facile evelenda.

β. leioplaca (Pers. myc.) suborbicularis levissima pallide fuscescens zonata zonis concentricis pulveraceis. — Ad parietes humori expositos. — Auricularia pulveralenta Sow. t. 214.

2. *C. MARMORATA* (Desmaz. cat. des pl. om. 18.) effusa tenuissima membranacea fusca irregulariter maculata, maculis dilutè tabacinis tuberculosis fusco-pulverulentis. — Ad muros in cellis circà Lille ex cl. Desmaz. — Contextus byssoides; tubercula convexa inæqualia albida aut rufa pulvere fusco obtecta.

3. *C. CEREBELLA* (Pers. myc. eur. 1. p. 155.) effusa irregularis membranacea undulato-gyrosa primò albicans mollis tuberculosa, tuberculis pulvere rubiginoso obtectis. — Ad ligna in cellis circà Lille ex cl. Desmaz., in sylvâ Compiègne ex cl. Graves. — Thelephora cerebella Pers. syn. 580. — Spithamam ferè lata.

XXXIV. AURICULARIA Pers. myc. eur. 1. p. 97. Ad. Brongn. class. champ. 88. — Auriculariæ sp. Bull.

Receptaculum pileatum coriaceo-tremellosum ; hymenium laxe aut subplicato-rimosum subgelatinosum superficiem inferiorem occupans ; thecæ nullæ ; sporulæ nudæ sparsæ. — Fungi cartilaginei sessiles primò crustæformes demùm dimidiati latere adfixi.

1. *A. MESENTERICA* (Pers. 1. c.) subimbricata, pileo demùm reflexo fasciato fuscescenti-griseo, disco purpurascente plicato. — Ad truncos arborum præsertim Juglandis. — *A. tremelloides* Bull. champ. t. 290. *Thelephora mesenterica* Pers. syn. 571. Bolt. fung. app. t. 172. *T. tremelloides* DC. fl. fr. 2. p. 104. excl. var. β et γ . *Phlebia tremelloides* Fries syst. orb. veg. 1. p. 83. Desmaz. cr. exs. n. 221. — Mich. gen. t. 66. f. 4. — *Fungus junior* resupinatus latè effusus : pileus superne griseo-aut cinereo-brunescens zonis concentricis distinctus et hirsutus.

XXXV. PHLEBIA Fries syst. myc. 1. p. 426. Ad. Brongn. in dict. cl. 13. p. 384.

Receptaculum pileatum sessile ; hymenium cum pileo homogeneum et concretum glabrum venoso-rugosum ; rugæ (papillæ elongatæ) interruptæ irregulariter dispositæ prominentes rectæ et flexuosæ cum hymenio undique thecas gerentes ; thecæ immersæ. — Fungi resupinati effusi subfloccosi tenaces corticolæ.

1. *P. MERISMOIDES* (Fries 1. c.) effusa incrustato-ramulosa carneo-rubra subtùs villosa alba margine aurantio-piloso, plicis rectis. — Ad muscos in sylvâ Belloy propè Beauvais ex cl. Graves, oct.-jan. — Grev. crypt. fl. t. 280. *Merulius Merismoides* Fries obs. 2. p. 235.

2. *P. RADIATA* (Fries 1. c.) orbicularis utrinque glabra obscurè carnea, plicis confertis seriatis versus ambitum radiatum evanescentibus. — Ad truncos

774 ACOTYL. SEU CELLULARES.

in sylvis propè Beauvais (cl. Graves), oct.-dec. — Carnoso-membranacea, junior orbicularis dein dilatata confluens 1-3 unc. lata; ambitus fibroso-radiatus, plicæ breves implexæ confertissimæ.

3. *P. contorta* (Fries l. c.) effusa utrinque glabra fusco-rubra, plicis distantibus irregularibus subflexuosis, margine subfimbriato. — Ad cortices et ligna Quercina in Vogesis ex cl. Pers., aut. — Ricnopora carnea Pers. myc. eur. 2. t. 18. f. 5. — Antecedenti valde affinis sed firmior et præcipue plicis nunc sparsis nunc conglomeratis magis prominulis diversa.

Sect. II. HYDNEÆ Fries syst. orb. veg. 1. p. 80.

Hymenium subulatum vel tubulosum.

XXXVI. SISTOTREMA Fries syst. myc. 1. p. 426; syst. orb. veg. 1. p. 82. Ad. Brongn. class. champ. 89. — Sistotrematis sp. Pers.

Receptaculum pileatum; hymenium à pileo subdiscretum dentato-lamellosum; lamellulæ interruptæ irregulariter dispositæ breves sparsæ denticulatae cristæformes utrinque thecas gerentes. — Pileus carnosus irregularis cum stipite quando adest contiguus.

1. *S. confluenta* (Pers. syn. 651; myc. eur. 2. p. 209.). — Ad terram in Pinetis præcipue ad latera viarum arenosa, aug.-nov. — Fries l. c. Grev. crypt. fl. t. 248. Hydnum sublamellosum Bull. champ. t. 453. f. 1. Sow. t. 112. Fl. fr. 2. p. 112. — Gregarium concrescens fragile candidum demùm flavescens; stipes deorsum attenuatus uncialis et infrà etiam obsoletus; pilei tenues 6-12 lin. lati flexuosi concrescentes; lamellulæ variant integræ et incisæ.

XXXVII. HYDNUM Linn. gen. n. 1076 Linck. diss. 1. p. 39. f. 60. DC. fl. fr. 2. p. 108. Ad. Brongn. in dict. class. 8. p. 408. — Sistotrema (exc. S. confluenta) Hericium et Hydnum Pers. myc. eur. t. 2.

Receptaculum stipitatum vel sessile formâ varium; hymenium cum pileo homogeneum et concretum aculeatum; aculei plus minus liberi conici vel compressi nunc subulati nunc incisi apice thecas gerentes; thecae tenues raro obsoletæ. — Pileus stipitatus vel sessilis raro regularis floccosus subscapus, subindè cum stipite confusus oblitteratus, frequenter resupinatus immarginatus.

Sect. I. RADULUM. — Radulum Fries syst. orb. veg. 1. p. 81 et 362.

Hymenium interruptum hinc indè tubulosum tuberculis irregularibus distantibus.

1. *H. THELEPHOROIDUM* (Dub. mss.) erumpens glabrum flavo-aurantiacum, aculeis sparsis aliis subrotundis aliis valde elongatis dissimilibus. — Ad ramos Fagi, Carpinii. — Thelephora hydnoides Pers. obs. 1. p. 15. Fl. fr. 5. p. 34. — Sub epidermide nascentes dein erumpens, matrici innata ad longitudinem 4 unc. et ultra saepè extensa.

2. *H. GLOSSOIDES* (Dub. mss.) membranaceum glabrum tenue ligneo-pallidum, dentibus longis distantibus ligulatis obscurioribus, aliis minoribus. — Ad corticem Quercinum? epidermide denudatum propè Abbeville detexit cl. de Clermont ex Pers. — Sistotrema glossoides Pers. myc. eur. 2. p. 193. — Aculei compressi et obtusi glabri sparsi lineam plus minusve a se remoti.

3. *H. MOLARIFORME* (Dub. mss.) longitudinaliter effusum glaberrimum, subiculo tenissimo, dentibus majusculis obliquis pluribus connato-fasciculatis, aliis solitariis subteretibus. — In cortice laevi Quercino in Helvetia finitima et probabiliter in Jurasso. — Sistotrema molariforme Pers. myc. eur. 2. t. 22. f. 1. 2. — Congeries aculeorum dentem molarem non male imitatur.

Sect. II. HYDNOIS. — *Hydnus et Irpex Fries syst. orb. veg. 1. p. 81 et 362.*

Hymenium aculeatum aculeis confertis liberis aut basi seriato-vel reticulato-conjunctis.

I. *Mesopus* (Fries syst. myc. 1. p. 398.). *Stipes solidus firmus cum pileo contiguus subcentralis perpendicularis sèpè brevissimus; pileus carnosus vel suberosus planus subdepressus rotundatus subintegerrimus. — Sp. terrestres.*

* *Carnosa exsucca; pileus subconvexus sèpè repandus. — Esculenta.*

4. *H. IMBRICATUM* (Linn. suec. 1257. excl. desc.) pileo carnoso umbilicato tessulato-squamoso azono umbrino, squamis crassis suberectis, aculeis nitidis albido-cinereis, stipite brevi. — In sylvis Abietinis summis Jurassi, aut. — Schæff. t. 140. fl. dan. t. 1500. Sow. t. 73. Fries syst. myc. 1. p. 398. Grev. crypt. fl. t. 71. *H. cervinum* Pers. myc. eur. 2. p. 158. excl. syn. DC. fl. fr. 2. p. 38. — *Stipes uncialis albido-cinerens; pileus 3-4 unc. latus; aculei teretes integri cervini.*

5. *H. SUBSQUAMOSUM* (Batsch. el. 3. t. 10. f. 43.) pileo carnoso irregulari diffracto-squamoso subzonato testaceo-ferrugineo, aculeis albidis, stipite crasso. — Ad terram in pinetis, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 399. *H. squamosum* Bull. champ. t. 409. DC. fl. fr. 2. p. 112. — *Stipes uncialis et ultrà inæqualis subcompressus pileo concolor dein obscurè ferrugineus; pileus convexus mox explanatus subrepandus; aculei æquales longi.*

6. *H. badium* (Pers. myc. 2. t. 21.) gregarium maximum, pileo badio, squamis aut fissuris latis depressis, stipite subbrevis concolore. — In Vogesorum Pinetis apricis detexit cl. Mougeot, in Jurasso cl. Chaillet ex Pers. — Interdùm pedalis; aculei ex albo cinerascentes dein subfuscii, in siccis spadicei.

6. *H. LÆVIGATUM* (Swartz in vet. ac. handl. 1810. f. 243.) pileo carnoso subrepando ruguloso azono rufo-cinereo, aculeis albido-cinereis, stipite inæquali lœvi. — In Pinetis passim, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 399. *H. imbricatum* Vill. dauph. p. 1042. — Mich. gen. t. 72. f. 1. — *Stipes crassus firmus albido-cinereus; pileus fragilis 3-12 unc. latus irregularis.*

7. *H. LEUCOPUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 158.) pileo carnoso campanulato regulari glabro lœvissimo fuligineo-fusco, aculeis tenuibus fusco-purpureis apice albiantibus, stipite crasso ovato extùs intùsque albo. — In Pinetis Jurassi det. cl. Chaillet ex cel. Pers. — *Pileus 3-unc.; stipes 1 ½ unc. altus obversè clavatus albus sed propè apicem aculeis concolor.*

8. *H. REPANDUM* (Linn. suec. 1258.) pileo carnoso subrepando glabro rugoso azono ex albo rufescente, aculeis inæqualibus crassiusculis stipiteque difformi pallidis. — In sylvis, aest. aut. — Fl. dan. t. 310. Bull. champ. t. 172. DC. fl. fr. 2. p. 111. Grev. cr. fl. t. 44. *H. flavidum*, *rufescens*, *squamosum* Schæff. t. 318, 141 et 278. *H. carnosum* et *clandestinum* Batsch. f. 136. 44. — Vaill. bot. t. 14. f. 6-8. Mich. t. 72. f. 3. — *Sparsum vel gregarium fragile; pileus irregularis 2-6 unc. latus; aculei alii æquales integri alii compressi et incisi. Var. albus flavus vel incarnato-pallidus.*

9. *H. RUFESCENS* (Pers. obs. 2. p. 95; syn. 555.) pileo carnoso tenui orbiculari subtomentoso obsoletè zonato rufescenti-carneo, aculeis tenuibus subæqualibus incarnato-ochraceis, stipite tenui æquali. — In sylvis cum priore. — Fries syst. myc. 2. p. 401. *H. repandum* Bolt. t. 88. — *Stipes 1-3 unc. longus pallidus; pileus 2 unc. circiter latus planiusculus; aculei rariùs incisi. — An potius prioris var?*

10. *H. BUBALINUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 161.) submagnum, pileo carnoso secco glabro lœvissimo dilutè spadiceo, aculeis tenuissimis densis dilutionibus, stipite brevissimo concolore. — In Pinetis Jurassi Galliae conterminis ex cl. Pers. — *Pileus 4-5 unc. latus; aculei vix filo crassiores brevissimi densusimi.*

776 ACOTYL seu CELLULARES. HYDNUM

11. *H. fusipes* (Pers. myc. eur. 2. p. 162. t. 20. f. 4-6.) gregarium concrescens, pileo carnoso-coriaceo lævi glabro fuscescente aut albido griseo, aculeis sub-brevibus decurrentibus albis, stipite sublongo incrassato. — In sylvis Abies-gnis Vogesorum detexit cl. Maugeot ex Pers. — Stipes basi interdùm concrescens 2 unc. ferè longus pileo concolor; aculei densi imbricati; pileus 1-2 unc. latus. Exsiccatus odorem habet Apii graveolentis.
- * * *Suberosa vel coriacea demùm lignosa; pileus turbinatus vel infundibuliformis.*
— Non cibaria.
12. *H. SUAVEOLENS* (Scop. carn. 472.) pileo suberoso molli tomentoso albido intùs albo et cæruleo variegato, aculeis tenuibus æqualibus violaceis, stipite brevi cæruleo. — In sylvâ Belloy propè Beauvais ex cl. Graves, jul.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 403. *H. pullum* Fries obs. — Stipes uncialis et infrà subtomentosus; pileus spithameus suprà planus undulatus. Oder fragrans subaniseus ex Fries, vix ullus ex Alb. et Schw.
13. *H. COMPACTUM* (Pers. syn. 556; myc. eur. 2. p. 166.) pileo suberoso ondulato tomentoso olivaceo-cinereo intùs fusco et cæruleo variegato, stipite crasso brevi. — Ad terram in pinetis et ericetis Galliæ borealis, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 402. *H. floriforme* Schæff. t. 146. — Buxb. cent. 2. t. 49. f. 1. — Submagnum solitarium aut gregarium difforme sèpè crustæ crassæ amorphæ simile; stipes interdùm nullus; pileus 1-6 unc. latus; aculei æquales fuscescentes vel castanei.
14. *H. AURANTIACUM* (Batsch el. cont. 2. t. 40. f. 222.) pileo suberoso inæquali tomentoso aurantiaco margine albo, intùs zonato stipiteque brevi inæquali aurantiacis. — In pinetis siccis Jurassi, aut. — Fl. fr. 5. p. 38. Fl. dan. t. 1439. *H. floriforme* Schæff. t. 146. f. 4. — Stipes subbulbosus tomentosus brevis; pilei juniores turbinati dein dilatati; aculei albi æquales dein sordide spadicei. Staturâ et magnitudine maximè varium. Præcedenti nimis affine.
15. *H. HYBRIDUM* (Bull. champ. t. 453. f. 2.) pileo suberoso molli velutino ferrugineo intùs azono, aculeis stipiteque inæquali cum pileo concoloribus. — Ad terram in pinetis, aut. — Fl. fr. 2. p. 111. excl. syn. *H. striatum* Schæff. t. 271. *H. ferrugineum* Fries. — Stipes longitudine varians; pileus obconicus dein dilatatus suprà planus vel depresso 2-4 unc. latus intùs ferrugineus.
16. *H. CINEREUM* (Bull. champ. t. 419.) pileo coriaceo-suberoso repando pubescente aut subsquamoso aculeisque griseis, stipite crasso ventricoso intùs ferrugineo. — Ad terram in pinetis. — Fl. fr. 2. p. 110. non Batsch. — Subgregarium, stipes difformis glaber primò globosus undique aculeatus demùm infundibuliformis suprà subcolliculosus; aculei tenues æquales.
17. *H. CYATHIFORME* (Bull. champ. t. 156.) pileo coriaceo plano-infundibuliformi rugoso fibroso zonato glabrescente stipiteque inæquali ferrugineis, aculeis rufescens. — Ad terram in sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 290. *H. concrescens* Pers. Moug. et Nestl. vog. n. 296. *H. zonatum* Batsch. el. cont. 2. f. 224. Nees syst. f. 242. — Mich. gen. t. 72. f. 7. — Gregarium interdùm concrescens; stipes uncialis et infrà; pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus; aculei juniores pallidi dein obscuriores subfuscæ tenues æquales.
18. *H. PULLUM* (Schæff. fung. t. 272. non Swartz nec Fries.) pileo coriaceo tenui striato irregulari glabro nigricante subzonato, disco colliculoso margine aculeisque albis, stipite cum pileo concolore. — In pinetis et locis muscosis montanis, aest. aut. — *H. melaleucum* Fries. *H. leptopus* Pers. myc. eur. 2. p. 170. — Cespidosum concrescens imbricatum; stipes nunc æqualis nunc ramosus nunc etiam nullus; pileus primò fusco-purpureus dein cæruleo-niger, exsiccus ater.
- β. *graveolens* (Pers.) gregarium parvum, pileo stipiteque tenui simplici fusco-griseo, aculeis pallescenti-griseis. — Inter muscos in sylvaticis Delphinatus circa Vienne det. D. Delastre ex Pers. — Odor Apii.
19. *H. AURISCALPIUM* (L. suec. 1260.) pileo coriaceo horizontali tomentoso exciso vel dimidiato aculeisque æqualibus subspadiceis, stipite laterali tomentoso concolore. — Ad strobilos vetustos Pini humi delapsos. — Schæff. t. 143. Bull. champ. t. 481. f. 3. Fl. fr. 2. p. 110. Sow. t. 267. Grev. cr. fl. t. 196. —

Mich. gen. t. 72. f. 8. Buxb. cent. 1. t. 57. f. 1. — *Stipes 2-3 unc. longus passim ramosus; pileus 3-12 lin. latus.*

II. *Tremellodon* (Pers. myc. eur. 2. p. 172. — *Pleuropus* Fries syst. myc. 1. p. 417.). *Stipes irregularis brevis simplex sæpè horizontalis; pileus inæqualis mollis dimidiatus vel excentricus. — Sp. carnosæ lignatiles.*

20. *H. GELATINOSUM* (Scop. carn. 472.) pileo gelatinoso albido-glaucio utrinque piano, aculeis mollibus pyramidatis glaucis, stipite brevi lateralí. — Ad truncos semi-purridos in umbrosis humidis, aut. — Jacq. aust. t. 239. Fl. fr. 2. p. 110. *H. crystallinum* fl. dan. t. 717. — *Stipes squamulis minutis obsitus rarò obsoletus; pileus ½-3 unc. latus tremulus.*

β. horrens (Pers.) aculeis undique tectum. — Jacq. coll. 1. p. 139. t. 9.

21. *H. ERINACEUS* (Bull. champ. t. 34.) maximum carnosum cordiforme albolutescens, pileo subsessili fibrilloso-lacero intus subcancellato, aculeis longissimis pendulis, stipite simplici lateralí incurvo. — Ad caudices Quercuum annosarum, oct. — Fl. fr. 2. p. 108. Tratt. fung. anst. f. 35. *Hericium Erinaceus* Pers. — Bocc. mus. t. 303. f. b. Buxb. cent. 1. t. 56. f. 1. — *Crassum mollissimum intus album; pileus spithameus et ultrà pileis minoribus sæpè imbricatus; aculei 1 ½-2 ½ unc. longi confertissimi molles passim connati.*

III. *Hericium* (Pers. comm. clav. 28; myc. eur. 2. p. 150. — *Merisma* Fries syst. myc. 1. p. 408.). *Carnosa; pilei cum stipite confusi oblitterati clavariæformes ramosissimi vel in truncum crassum abeentes. — Sp. lignatiles.*

* *Ramosissima, aculeis pendulis.*

22. *H. CORALLOIDES* (Scop. carn. 472.) magnum ramosissimum candidum demum lutescens, ramis intricatis flexuosis attenuatis, aculeis unilateralibus subalatis. — In sylvaticis ad truncos arborum annosarum, aut. — Schæff. fung. t. 142. Fl. fr. 2. p. 108. Sow. t. 252. *H. ramosum* Bull. champ. t. 390. *Hericium coralloides* Pers. — Bocc. mus. t. 303. f. 7. Mich. gen. t. 64. f. 2. — Cespites adulti pedales et ultrà ramis angulatis ramulis incurvis latere inferiori aculeatis Esculentum.

** *Truncus brevis simplex apice aculeis congestis obsitus.*

23. *H. CAPUT-MEDUSÆ* (Pers. syn. 564.) magnum albido, trunco obliquo crasso apice dilatato, aculeis undulatis densis. — Ad lignum putridum rariùs. — Fl. fr. 2. p. 108. Nees syst. t. 33. *Clavaria Caput-Medusæ* Bull. champ. t. 412. — Primò niveum dein cinereo-tuliginosum; aculei graciles primò stricti dein decumbentes.

IV. *Apus* (Fries syst. myc. 1. p. 410. Pers. syst. myc. 2. p. 173.). *Pileus dimidiatus sessilis latere adfixus horizontalis planus marginatus subtus aculeatus. — Sp. truncicolæ.*

24. *H. CIRRHATUM* (Pers. syn. 558; myc. eur. 2. p. 173.) magnum, pileo carnosò imbricato subflexuoso albo-pallido superne aculeis sparsis decumbentibus fibrilloso, aculeis longissimis. — Ad truncos Fagi et Quercùs propè Parisios ex cl. Chevall., aut. — Fries syst. myc. 1. p. 411. — Subreniforme 1-4 unc. latum cirris adpressis versus marginem liberis 2-3 lin. longis; margo fimbriatus; aculei 5-8 lin. longi æquales tenaces.

25. *H. PACHYODON* (Pers. myc. eur. 2. p. 174.) dimidiatum carnosum basi subeffusum, pileo glabro subrepando albicante, aculeis crassis, marginalibus compressis teretibus intermixtis concoloribus. — Ad truncos Quercuum vestustos detexit cl. Delastre ex Pers., in sylvâ Compiègne cl. Graves (in litt.). — *Pileus azonus biuncialis et 3 lin. ferè crassus; aculei marginales crassiusculi, medii æquales conferti.*

778 ACOTYL. SEU CELLULARES. HYDNUM.

26. *H. LUTESCENS* (Pers. myc. eur. 2. p. 174.) dimidiatum, pileo coriaceo subtomentoso lutescente, aculeis brevibus obscurioribus confertis concoloribus. — In Neustriâ ex cl. Pers. — Pileus zonis nonnullis semiconcentricis impressis notatus; tomentum brevissimum substrigosum; aculei crassiusculi.

27. *H. DICHROUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 213.) parvulum, pileo subtomentoso zonato pallido, aculeis regularibus crassiusculis obscure carneis. — Ad truncos cariosos Quercum detexit Delastre ex cl. Pers. — Nunc ad dimidium fere effusum et tunc simplex, plerumque subimbricatum basi porrectum subtriquetrum $\frac{1}{2}$ unc. latum.

28. *H. OCHRACEUM* (Pers. obs. myc. 1. p. 70.) effuso-reflexum aut longitudinale effusum, infernè subtomentosum albidum margine inflexum, aculeis congestis tenuibus rufo-ochraceis. — Ad truncos Pini et Abietis in Galliâ ex cl. Desvaux. — *H. ochr.* & repandum Pers. myc. eur. 2. p. 176. *H. spadiceum* Desv. — Longitudo triuncialis.

V. *Odontia* (Pers. disp. 30. — *Resupinatus* Fries syst. myc. 1. p. 415. — *Hydna* et *Sistotremata resupinata* Pers. syn. et myc.). *Pileus resupinatus effusus tenuis obliteratus ubique adnatus immarginatus in ambitu sœpè byssinus. — Sp. lignatiles.*

* *Aculeis teretibus æqualibus integris.*

29. *H. MEMBRANACEUM* (Bull. champ. t. 481. f. 1. non DC.) effusum tenue glabrum falvo-ferrugineum, aculeis æqualibus integris mediis rectis. — Ad ligna demorta humi delapsa, aest. — Sow. t. 327. Fries syst. myc. 1. p. 415. — Ambitus vix distinctus; janus pallidius demum subfuscum.

30. *H. ATERRIMUM* (Fries syst. myc. 1. p. 416.) effusum strigosum atrum aculeis elongatis subcompressis acutis nigris. — Cortici interiori Betulæ albæ innascentis epidermide solvens ramos et truncos undique sœpè ambiens, circa Rothomagum ex cl. Pers. — Racodium cornatum Pers. myc. 1. p. 68. ex cl. Fries. — Aculei minùs æquales subconferti cornei rugulosi.

31. *H. FERRUGINEUM* (Pers. syn. 562; myc. eur. 2. p. 189.) effusum tomentosum ferrugineum, aculeis acutis subintegris erectis rariùs obliquis. — Ad truncos in sylvis, aut. — Nees syst. f. 248. *H. tomentosum* Schrad. spic. t. 4. f. 2 non L. — Membrana tota e tomento dense contexta 2-3 unc. longa; aculei villosi nonnulli bifidi.

32. *H. ABIEtinum* (Dub. mss.) incrustans tenue villosum irregulariter effusum pallens, dentibus subfasciculatis erectis tenuiter incisis basi latoribus. — Ad cortices Abietis in Jurasso det. cl. Chaillet ex Pers. — *Sistotrema Abietinum* Pers. myc. eur. 2. t. 22. f. 3. — Aculei breves nunc aggregati nunc sparsi alii integri alii setaceo-incisi.

33. *H. ACUTUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 179.) albido-pallens tenuissimum cum matrice confluens (obsoletum) pruinatum, aculeis distantibus acutis firmis paucis compressis. — Ad lignum Populneum emolliatum reperit cl. Chaillet ex Pers. — Unc. 1-2 effusum; dentes majusculi rigidi. An sp. distincta?

34. *H. SETOSUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 213.) albido tenuis glaberrimum matrici arcte adnatum, aculeis longis setiformibus rigidis rectis. — Malorum cariosarum fissuras et lacunas investiens circa Beanvais ex cl. Graves. — Aculei indivisi; subiculi pars infera et villosa colore est dilute citrino.

35. *H. FASCICULARE* (Alb. et Schw. consp. t. 10. f. 9.) effusum albidum, subiculo nullo, aculeis fasciatis longis pendulis. — Ad truncos putridos Pini, in Jurasso, aut. — Fl. fr. 5. p. 35. Fries syst. myc. 1. p. 418. — Aculei 4-12 basi connati teretes acuti 5-4 lin. longi fasciculatum pendulum constituent.

36? *H. FARREUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 181.) longè latèque effusum, subiculo subtenue tomentoso albo, aculeis densis compactis teretiunculis ex albido latè ochraceis apice subincisis. — In ramis carie emolliatis et in locis suffocatis dejectis propè Parisios detexit cl. Pers. — Ad spithamam fere effusum ligno

arctè adnatum; juncis albido-farinaceum; aculei ab initio subgranuliformes et aliquando in globulos distantes aggregati.

37. *H. MUSCICOLA* (Pers. l. c.) albicans, subiculo tenui glabro membranaceo, aculeis tenerrimis subelongatis. — Ad muscos in sylvâ Belloy, propè Beauvais ex cl. Graves.

38. *H. MUCIDUM* (Pers. syn. 561.) effusum membranaceum album subtus marginaque villosum, aculeis longis confertis acutis. — Ad truncos Fagi in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, vere, aut. — Fries syst. 1. p. 418. — Latissimum sæpe pedale et ultrà a ligno solubile; aculei æquales recti molles.

39. *H. SUDANS* (Alb. et Schw. 272. in adn.) albido-pallens, subiculo lævi tenuissimo effuso, aculeis distantibus teretibus truncatis brevibus apice in porum serifluum desinentibus. — Ad lignum putridum Pini in Jurasso (cl. Chaillet), hyeme. — Fl. fr. 5. p. 35. — Oblongum 2-3 unc. longum 1 latum; aculei crassi guttulam primò viscosam pellucidam demùm induratam et persistentem exsudantes.

40. *H. CRUSTOSUM* (Pers. syn. 562; myc. enr. 2. p. 183.) effusum crustæforme subfarinaceum opacum albo-luteum, aculeis minimis obtusis. — Ad truncos Salicum, Abietis, etc., in Vogesis (cl. Mougeot), propè Parisios ex Chevall. — Nees syst. f. 247. — Subiculum indeterminate effusum adnatum; aculei nudo oculo vix conspicui, subindè apice excavati. A pluribus auct. cum seq. conjunctum.

41. *H. FARINACEUM* (Pers. syn. 562.) effusum crustæforme pallidum, ambitu subbyssino, aculeis tenuissimis subdistantibus acutis. — Ad truncos. — Fl. fr. 5. p. 35. — Subiculum arctè adnatum farinari stratum referens; aculei acutissimi.

42. *H. NIVEUM* (Pers. syn. 563.) latè effusum submembranaceum album margine byssino, aculeis confertis brevibus subacutis glabris. — Ad corticem Quercuum. — Fl. fr. 2. p. 109. Nees syst. f. 246. Odontia nivea Pers. disp. meth. t. 4. f. 6. 7. — Recens candidum dein pallescens; subiculum tenue; aculei minutti.

* * *Aculeis compressis subincisis variis vel angulatis.*

43. *H. VIRIDE* (Fries syst. myc. 1. p. 421.) effusum tomentoso-farinaceum molliissimum viride æruginosumve, aculeis erectis crassiusculis conicis integris ratiùs subincisis. — Ad truncos et ligna semiputrida ex Pers. — *H. viride* & psittacinum Pers. myc. enr. 2. p. 191. Sistotrema viride Alb. et Schw. t. 6. f. 4. — Color viridis cæruleus aut æruginosus; aculei conferti subconici 1 lin. ferè longi.

44. *H. BARBA-JOVIS* (Bull. champ. t. 481. f. 2.) effusum tomentosum pallidè album, aculeis teretibus pubescitibus albis apice aurantio-barbatis. — Ad truncos cariosos, aest.-aut. — Fl. fr. 2. p. 109. Sow. t. 328. Fries syst. myc. 1. p. 421. — Subiculum membranaceum ad latitudinem pedalem et ultrà expansum, junius album dein flavo-rufescens; aculei 2 lin. ferè longi.

45. *H? PLUMOSUM* (Dub. mss.) lanuginosum totum niveum, subiculo tenerissimo, aculeis plomo-so-penicillato-divisis. — Rarissimè ad terram, inter quisquillas in locis umbrosis Galliæ ex cl. Pers. — Sistotrema plulosum Pers. syst. myc. 2. p. 201. — Byssum simplicem terrestrem e longinquo referens; sub lente aculeos plumulas aut penicilla æmulantes, paucos teretes et integros, proferens. An hujus generis?

46. *H. FIMBRIATUM* (Fries syst. myc. 1. p. 421, non DC.) effusum membranaceum subcostatum incarnato-rufum, ambitu fimbriato, aculeis granulosis dein multisidis. — Ad truncos prostratos. — Pers. myc. 1. t. 6. f. 5. 6. Sistotrema fimbriatum Pers. syn. — Costæ radiciformes elongatae membranâ expansâ tenui junctæ tranco laxius adhærentes; margo albus; aculei minutti dein elongati.

47. *H. DERMATODON* (Dub. mss.) membranaceum glabrum latè pallidum, aculeis compressis parvis basi latioribus submembranaceis distantibus. — Ad ligna

780 ACOTYL. seu CELLULARES.

exsiccata Quercina detexit cl. Chaillet ex Pers. — Sistotrema dermatodon
Pers. myc. 2. p. 195. — Subiculum tenue matrici adnatum; aculei acuti glabri,
interdum imprimis laterales teretes.

48. *H. LAXUM* (Dub. mss.) albido-pallens, subiculo strigoso-villoso interdum compacto farinaceo, aculeis strigosis acutis, nonnullis brevissimis obtusis. — Ad cortices Betulæ albæ propè Fontainebleau ex Pers., ad Salices vetustas circà Lille ex Desmaz. — *Sistotrema laxum* Pers. myc. eur. 2. p. 201. — Irregularē unc. 1-3 effusum arctè adhærens; aculei densi majusculi villo conjuncti.

49. *H. FALLAX* (Fries obs. 1. p. 130; syst. myc. 2. p. 422.) effusum interruptum tente, ambitu byssino albo, aculeis minutis confertis incisis flavidis. — Ad hymenium Polypori fomentarii aut rarius ad ligna vetusta, in sylvis circà Beauvais ex cl. Graves, æst. aut. — *Subiculum viloso-furfuraceum* interdum nullum; aculei inæquales compressi acuti vix $\frac{1}{2}$ lin. longi.

50. *H. FAGINEUM* (Fries syst. myc. 1. p. 423.) subeffusum glabrum albo-pallidum, aculeis confertis elongatis connato-fasciculatis obtusis integris. — Ad ramos et truncos Fagi, in Jurasso (cl. Chaillet), circà Parisios ex Chevall. — *Sistotrema epiphegum* Pers. myc. 2. p. 194. *S. fagineum* Pers. l. c? — *Subiculum* primò orbiculare dein confluens late effusum adnatum e floccis tomentosis dense contextum.

51. *H. QUERCINUM* (Fries syst. myc. 1. p. 423.) effusum glabrum albo-pallidum, aculeis crassis difformibus incisis subadpressis. — Ad ligna demorta Quercina. — *H. membranaceum* DC. fl. fr. 2. p. 109. excl. syn. omn. et 5. p. 36. *Sistotrema Quercinum* Pers. Nees syst. f. 230. *H. candidum* Willd. in bot. mag. 4. t. 7. — *Subiculum* arctè adnatum persistens subtenue 2-3 unc. longum; aculei obliqui subcompressi nunc integri nunc plus minus incisi sublutescentes.

52. *H. RUDE* (Dub. mss.) subiculo juniore subtomentoso gilvo dein membranaceo opaco pallente, margine sublibero, dentibus crassiusculis erectis subfasciculatis plerumque integris. — In cortice Quercùs in Jurasso detexit cl. Chaillet ex cl. Pers. — *Sistotrema rude* Pers. — *Junius orbiculare* subtomentosum et rugulosum dein coriaceum exsiccatum fissum; aculei magnitudine variis subdistantes conici subobtusi.

53. *H. CRUSTACEUM* (Pers. myc. eur. 2. p. 193.) subicalo tenuissimo membranaceo lavi nitido, margine subtomentoso, aculeis acutissimis sparsis plerumque integris. — Ad ligna muscosa Quercina detexit cl. Chaillet ex Pers. — Adnatum dilatatum ambitu tamen sinuatum; aculei inæquales subobliqui basi dilatati. An à priore sat distinctum?

54. *H. PARADOXUM* (Schrad. spic. t. 4. f. 1.) effusum candidum, aculeis crassis confertis digitatis apice villosi. — Ad lignum denudatum Quercùs, Fagi, Salicis, vere. — Fl. fr. 5. p. 37. *Sistotrema digitatum* Pers. — *Subiculum membranaceum* inæqualiter expansum glabrum, ambitu byssino, aculei sæpe fasciculati $\frac{1}{2}$ lin. longi recti vel curvati.

XXXVIII. FISTULINA Bull. champ. p. 314. Pers. disp. p. 29. Fries syst. myc. 1. p. 396. — *Hypodrys Solen. cons. med. francof.* Pers. champ. com. 245. — *Boleti* sp. *Huds.* DC.

Receptaculum pileatum dimidiatum; hymenium e propriâ substantiâ formatum sed cum fibris receptaculi concretum primò verrucosum; verrucæ protrudant tubulos a se invicem liberos cylindricos primò clausos mox apertos, intùs thecas minutis gerentes. — Pileus carnosus spurius stipitatus vel sessilis.

1. *F. HEPATICA* (Fries l. c.). — Ad caudices vivos Quercuum annosarum rarius Fagorum et Castaneæ. — Grev. crypt. fl. t. 270. *F. buglossoides* Bull. champ. t. 74. 464. 497. *Boletus hepaticus* Schäff. fung. t. 116-120. DC. fl. fr. 2.

p. 113. Sow. t. 58. — Bocc. mus. 304. f. 3. Mich. gen. t. 60. — Admodum varium integrum vel lobatum sessile vel oblique stipitatum; substantia crassa mollis viscida rubro-marmorata; pileus spithameus usque, sanguineus dein rufo-fuscus; tubuli albidi lutei rufescentes aut violacei confertissimi 4-5 lin. usque longi ore subdenticulato.

Sect. III. POLYPOREÆ *Fries syst. orb. veg. I. p. 79.*

Hymenium porosum vel sinuosum.

XXXIX. BOLETUS Pers. champ. com. 230. *Fries syst. myc. I. p. 385.* — Suillus Mich. gen. 126. — Boleti sp. Linn. Pers. syn. DC.

Receptaculum pileatum hemisphaerico-explanatum; hymenium e propriâ substantiâ formatum a pileo discretum totum e tubulis in statum porosum connexis compositum; tubuli integri a se invicem separabiles longi pervii, intus thecas cylindricas gerentes. — Fungi pileo carnosò molli stipite centrali saepè reticulato.

I. *Velati* (Pers. syst. myc. 2. p. 123. — *Cortinariæ Fries syst. myc. I. p. 386.*). *Velum præsens* saepius fugacissimum; stipes solidus; tubuli lutei vel ferruginei; sporidia subochracea.

1. B. VOLVATUS (Pers. myc. eur. 2. p. 124. t. 17. f. 1.) pileo lævi subviscoso griseo-splendente subiùs albo, poris confusis sublaceris, stipite concolore basi volvato. — In sylvâ circâ Cœnomanum detexit Prof. Cauvin ex cl. Pers., apr. — Pileus subtenuis; volvæ particulæ in pilei superficie remanentes.

2. B. LUTEUS (Linn. suec. 1247.) pileo flavescente aut fusco unicolore aut rufo maculato glutine fusco secedente oblinito, tubulis adnatis rotundis luteis, stipite firmo annulato apice punctato. — Ad terram in sylvis, aut. — Schæff. t. 114. Sow. t. 265. Grev. crypt. fl. t. 183. B. annularis Bull. champ. t. 332. Fl. fr. 2. p. 127. Bolt. t. 169. Nees syst. f. 204. — Buxb. cent. v. t. 14. — Stipes 2 unc. circiter longus $\frac{1}{2}$ unc. et ultrà crassus; pileus compactus 2-4 unc. latus; tubuli demùm obscuriores, ore minuto æquali.

3. B. VELATUS (Pers. myc. eur. 2. p. 125. t. 20. f. 1-3.) gregarius, pileo viscoso umbonato lutescenti-subfusco, poris majusculis convexis angulatis obscurioribus primò velo muscoso obtectis, stipite longiusculo subtenui, annulo brevi viscoso demùm evanescente. — In umbrosis subhumidis et sphagnosis Vogesorum ex cl. Pers. — B. flavidus Fries syst. myc. I. p. 387? — Stipes basi saepius incrassatus 2-3 unc. longus; pileus 1-2 unc. latus glaber minus viscosus.

4. B. COLLARIUS (Pers. myc. eur. 2. p. 126.) pileo glabro depresso expallente opaco, tubis longis densis, poris majusculis, stipite subbrevi glabro apice reticulato, annulo tenui angusto. — Ad ripas rivulorum in Galliâ meridionali propè Barcelonette det. D. Petit ex cl. Pers. — Stipes subtenuis 4 lin. crassus unc. 1-2 altùs cylindricus; annulus parvus subreflexus; pileus 2-3 unc. latus intus immutabilis.

5. B. GRANULATUS (Linn. sp. 1647.) pileo subrepando crassiusculo flavidò glutine fusco secedente collinito, tubulis adnatis majusculis luteis, stipite breviusculo punctato-scabro. — In pascuis umbrosis circâ le Plessis-Piquet propè Parisios ex cl. Chevall., circinnatim aut seriatim rarius solitarie crescens. — Fries syst. myc. I. p. 387. B. circinnans Pers. Nees syst. f. 205. — Schæff. t. 115. 123. 126. — Mich. gen. t. 69. f. 1. — Stipes 2 unc. et ultrà longus junior albido dein flavescentis squamulis primò pallidis dein nigris superne scaber; pileus compactus 2-3 unc. latus intus luteo-albus immutabilis.

6. B. PITERATUS (Bull. champ. t. 451. f. 2.) pileo flexuoso glabro cinnamomeo, tubulis adnatis majusculis decurrentibus ferrugineis, stipite lævi intus basique flavissimo. — Ad terram in sylvis et ericetis, æst.-aut. — Sow. t. 84. Fl. fr. 2. p. 125. Nees syst. f. 207. B. ferruginatus Batsch. ex cl. cont. I. f. 28. — Stipes

1. *B. uncinatus* (Pers. myc. eur. 2. p. 129.) pileo longo subrugoso, intus luteo-siccus; pileus subirregularis 1-3 unc. latus intus flavus immutabilis. Sapor acris.
2. *B. mitis* (Pers. myc. eur. 2. p. 129.) pileo undulato, stipite cylindrico subflexuoso unicolor ferrugineo-rufo, tubulis majusculis compositis. — Inter Ericas in sylvis Vogesorum det. cl. Mougeot ex cl. Pers. — Pileus tempestate humidâ viscosus, aere sicco nitens et glaber. Sapor non acris. — An sp. distincta?
3. *B. guttatus* (Pers. l. c.) pileo repando subrubiginoso squamuloso pilosis guttato, intus citrino immutabili, tubulis majusculis cervinis vel pallide griseis, stipite longiusculo lævi subradicato. — In sylvis Pineto-frondosis Vogesorum det. cl. Mougeot ex Pers. — Pileus 4-6 unc. latus, substantia aquosa; stipes subcylindricus 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus citrinus.
4. *B. parasiticus* (Bull. champ. t. 451. f. 1.) pileo convexo glabro subcoriaceo fuligineo dein tessulato-rimoso, tubulis decurrentibus minutis aureis, stipite flavo lævi incurvo basi subattenuato. — In Scleroderinate verrucoso Pers. (*Lycoperdon verrucoso* Bull.) parasiticus. — Fl. fr. 2. p. 127. — Stipes tenuis 2 unc. longus basi subattenuatus; pileus fuscescens 1-2 unc. latus.
5. *B. lividus* (Bull. champ. t. 490. f. 1.) pileo convexo-plano glabro intus luteo-virescente, tubulis decurrentibus brevibus lateis, stipite lævi. — Ad terram in locis humidis paludosis rario, aug.-oct. — Fries syst. 1. p. 389. *B. chrysenteron* L. DC. fl. fr. 2. p. 126. — Stipes 2 unc. longus gracilis deorsum subattenuatus; pileus tenuis subcomplanatus demum depresso nunc cinereo-fusca nunc sordide rufescens aut fuligineo-lividus.
6. *B. brachyporus* (Pers. myc. eur. 2. p. 128.) pileo leviter convexo stramineo ruguloso compacto intus subcyanescente, tubulis brevissimis subdecurrentibus flavis, ore flexuoso crassiusculo, stipite duriusculo pallide fuligineo. — In sylvis humidis circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — Tubuli ferè superficiales vix lineam longi; pileus palmaris. Sapor acidus. Priori valde affinis ex ipso Pers.
7. *B. subomentosus* (Linn. suec. 1251.) pileo pulvinato convexo subomentoso siccо flavo-fuscescente, tubulis adnatis magnis angulatis lateis, stipite firmo lævi saepius rubiendo. — In sylvis, aest.-aut. — Nees syst. f. 206. Fries syst. myc. 1. p. 390. *B. chrysenteron* Bull. champ. t. 490. f. 3. Fl. fr. 2. p. 126. *B. communis* Bull. t. 393. *B. cupreus* et *crassipes* Schæff. t. 133. 112. — Magnitudo mediocris; stipes subæqualis flavo-ruber; pileus siccus in areolas polygonas dehiscens; caro flava saepè cærulescens. Pileus variat gilvus olivaceus fuscus æneus, etc. Edulis.
- β. sanguineus*, pileo sanguineo glabro. — *B. sanguineus* With. *B. communis* Sow. t. 225.
- γ. calopus*, pileo subolivaceo, tubulis flavis, stipite subæquali reticulato coccineo. — In ericetis vallis Bray ex cl. Graves. — *B. calopus* Pers. Fries. Nees f. 208. *B. terreus* Schæff. t. 315. — Minor; caro plus minus cærulescens.
8. *B. radicans* (Pers. syn. 507.) pileo pulvinato flavescenti-cinereo margine involuto subomentoso, tubulis stipiteque lævi radicato tomentoso citrinis. — In sylva Compiègne ex cl. Graves, aut. — Stipes tuberosus lævis radicem duram villosa-fibrosam exserens; tubuli subbreves; pileus 3 unc. latus subnitidus. Sapor amaricans.
9. *B. elatus* (Pers. myc. eur. 2. p. 134.) pileo pulvinato demum dilatato subrepando fuscescente glabro intus cærulecente, tubulis parvis lutescentibus, stipite longo subcrasso apice rivuloso-reticulato rubro inferne pallido. — In sylvis Abiegnis Vogesorum det. cel. Mougeot ex cl. Pers. — Stipes subradicans 3 unc. et ultra longus, unc. 1-1 $\frac{1}{2}$ crassus; pileus junior convexus subspadiceus dein dilatior, siccus rimoso-tessellatus.
10. *B. luridus* (Schæff. fung. t. 107.) pileo pulvinato subomentoso olivaceo dein subviscoso fulvo-fuligineo, tubulis sublitteris longissimis rotundis luteis

ore rubris, stipite longo crasso reticulato rubro. — In sylvis, aest. aut. — Pers. Fries. Grev. crypt. fl. t. 121. B. rubeolarius Bull. champ. t. 100 et 490. f. 1. Fl. fr. 2. p. 123. B. tuberosus Schrad. — Buxb. cent. 5. t. 13. Batt. t. 29.

— Stipes 2 unc. et multò ultrà longus bulbosus; pileus sèpè ingens spithameus sed et parvus 2-3-uncialis; caro lutea mutabilis mox cærulescens; tubuli 1 unc. et ultrà longi ore subrotundo minuto obtuso. Nocivus.

B. *tuberosus* (Pers.) pileo subhemisphærico olivaceo-æneo, stipite brevissime globoso-tuberoso. — B. bovinus Bolt. t. 85. B. rubeolarius Sow. t. 150.

y. erythropus (Fries) minor, pileo fusco-umbrino aut spadiceo, tubulis parvis aurantio-rubris, stipite breviusculo attenuato furfurato. — In sylvis circa Beauvais ex cl. Graves. — B. erythropus Pers.

16. B. *TESTACEUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 137.) pileo convexo-plano stipiteque testaceis glabris, carne albâ immutabili, tubulis æqualibus mediocribus, stipite glabro. — Propè Parisios in sylvâ Vincennes ex cl. Persoon, Chantilly ex cl. Graves. — Pileus palmaris $\frac{1}{2}$ unc. crassus firmus; stipes 3 unc. longus.

17. B. *CASTANEUS* (Bull. champ. t. 328.) pileo firmo subvilloso castaneo-lateritio, tubulis semiliberis minutis ex albo-flavis, stipite sublævi subfulvo. — In sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 124. — Stipes 2-3 unc. longus; pileus 2-3 unc. latus; caro albida immutabilis vel in superficie rubescens. Edulis ex cl. Pers.

18. B. *EDULIS* (Bull. champ. t. 60. et 494.) pileo pulvinato glabro fuscenscente, tubulis semiliberis subrotundis minutis albis dein flavo-virentibus, stipite crasso ventricoso reticulato pallide rufescente. — In sylvis, aest. aut. — Sow. t. 111. Fl. fr. 2. p. 124. B. *esculentus* Pers. — Mich. gen. t. 68. f. 1. Buxb. cent. 5. t. 12. — Subgregarius; stipes compactus carnosus nunc brevis ovato-bulbosus nunc 4-5 unc. longus ventricosus; pileus amplius hemisphæricus dein dilatatus variat vaccinus badius fuligineus albidus; caro alba immutabilis vel rufescens; tubuli longi. Esculentus.

19. B. *ÆREUS* (Bull. champ. t. 385.) pileo compacto glabro æneo-nigricante, tubulis subliberis brevibus sulphureis, stipite longo subæquali reticulato luteolo. — In sylvis. — Fl. fr. 2. p. 124. — Pileus nunc fuligineo-fuscens nunc fusco-nigricans; caro crassissima firma nivea aut dilute sulphurea rupta viridiuscula. Edulis.

f. leucoporus (Pers.) tubulis albis. — In prov. australibus. — B. Cepa Thore. — Pori stipati ita nt modo in adultis bene conspiciendi sint.

II. *Dermini* (Fries syst. myc. 1. p. 392.). *Velum præsens fugax*; *stipes solidus squamosus*; *tubuli albi demùm e sporidiis obscure ferrugineis colorati*.

20. B. *florculus* (Fl. dan. t. 1252.) pileo pulvinato griseo juniori tomentoso demùm squamis fasciculatis obducto, tubulis subliberis candidis, stipite velato squamoso. — In sylvis circa Parisios ex Chevall., Beauvais ex Graves., aest., aut. — Chevall. fl. par. 1. t. 6. f. 10. — Tomentum griseum juniorum fungum obvolvens in explicato in squamas crassas sparsas floccosas erectiusculas abit; stipes 4 unc. longus; pileus compactus 4 unc. latus; caro alba rubescens; tubuli longi.

21. B. *squarrosus* (Pers. myc. eur. 2. p. 145. t. 20.) nigrescenti-umbrinus, pileo hemisphærico pulvinato dense squamoso squamis crassis squarrosis erectis, tubulis majusculis albis, stipite longo apice sulcato basi fuligineo, cortinâ tomentosâ. — Ad truncos putridos aut ramos terrâ absconditos Pini Piceæ, in Vogesis det. cl. Mougeot ex Pers. — Pileus compactus carne albo-griseâ 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus; tubi longi albicanter; stipes 2-4 unc. altus; cortina albido-violascens sericea in juniori fungo pilei marginem et stipitem obtegens demùm lacerata et evanescens.

22. B. *viscidus* (Linn. suec. p. 452.) pileo pulvinato convexo glabro humido viscoso, tubulis liberis rotundis albis ore minuto obtuso, stipite firme alternato squamoso-scabro. — In sylvaticis, aest., aut. — B. seaber Fries syst.

784 ACOTYL. SEU CELLULARES.

myc. 1. p. 394. B. convexus Retz. — Buxb. cent. 5. t. 11. — Stipes longus, intus albus; velum fugacissimum; pileus 2-4 unc. et ultra latus, carne albâ immutabili subinde nigrescente; tubuli longi. Esculentus.

a. scaber, pileo subfuligineo aut subrufo, stipitis squamulis nigrescentibus.

— B. rufus Schæff. t. 103. B. aurantiacus Bull. champ. t. 489. f. 2. Sow. t. 110. B. scaber Bull. champ. t. 132 et 489. f. 1. Fl. fr. 2. p. 126. Sow. t. 175. — Fl. dan. t. 833. f. 2.

β. aurantiacus, pileo fulvo aut aurantio-rufo, stipitis squamulis albis aut subaurantiacis. — B. leucopodium Pers. B. aurantiacus Bull. champ. t. 236. Fl. fr. 2. p. 127.

III: *Hyporrhodii* (*Hyporrhodius* et *Leucosporus* Fries syst. myc. 2. p. 394 et 395.). *Velum nullum; tubuli albidi vel citrini, sporidiis albis aut roseis.*

23. B. FELLEUS (Bull. champ. p. 325. t. 379) pileo molli glabro convexo dein subapplanato fulvo aut subfuligineo, tubulis subadnatis angulatis albis subroseis, stipite ventricoso reticulato concolor. — In sylvis præsertim pinetis, æst., aut. — Fl. fr. 2. p. 125. Fries syst. myc. 1. p. 394. — Stipes 3 unc. et ultra longus subholivaceus intus albus; pileus 3-4 unc. latus, carne albâ fractâ roseâ; tubuli longissimi. Sapor amarus.

24. B. CYANESCENS (Bull. champ. p. 319. t. 369.) pileo compacto subtomentoso pallido aut subfuligineo, tubulis liberis rotundis æqualibus albis citrinisve, stipite farcto lævi ventricoso concolor apice niveo. — In sylvaticis passim, æst., aut. — Fl. fr. 2. p. 125. — B. constrictus Pers. syn. — Pileus rigidus 2-3 unc. latus, carne albâ, fractâ mox pulcherrimè cyaneâ, compressâ succum cyaneum fundente; tubuli breves.

XL. POLYPORUS Mich. gen. 129. Fries obs. 1. p. 121; syst. myc. 1. p. 341. Pers. champ. com. p. 237; myc. eur. 2. p. 35. — Boleti sp. Linn. Pers. syn. DC.

Receptaculum pileatum; hymenium cum pilei substantia homogeneum et concretum poris subrotundis subregularibus pertusum, dissepimentis tenuibus simplicibus thecas tenues gerentibus. — Pileus carnosocoriacetus aut suberosus nunc (rarius) stipitatus, nunc sessilis, nunc resupinatus.

Sect. I. MICROPORUS Pal. de Beauv. fl. oœw. p. 12. Fries syst. myc. 1. p. 342.

Pori minuti subrotundi.

I. *Milleporus* (Batsch. el. 103. — Mesopus Fries l. c.). *Stipes solidus cum pileo contiguus subcentralis; pileus latus plus minus depresso.*

* *Subcarnosi demum plerumque valde lenti, substantia et sporidia alba. Edules.*

1. P. LEUCOMELAS (Pers. myc. eur. 2. p. 40.) pileo carnosolento glabro subtenui læviusculo stipiteque fuligineo-nigricantibus, poris candidis æqualibus. — In sylva Mortefontaine ex cl. Graves, aut. — Stipes 6-9 lin. longus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus planiusculus subregularis; pori sat magni præsertim ad pilei marginem.

2. P. viscosus (Pers. myc. eur. 2. p. 41.) rufo-badius, pileo carnosolento viscoso, poris majusculis subirregularibus, stipite tenui subbrevi. — Propè Pontivy det. D. Cauvin ex cl. Pers. — Gregarius, pileus 2-3 unc. latus, stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus, 2 lin. et ultra crassus.

3. P. MELANOPUS (Pers. syn. 517; ic. pict. t. 4. f. 2.) pileo umbilicato tenui obscure fuligineo, poris pallescentibus, stipite tenui subcylindrico nigro. — Ad ramulos dejectos in sylvaticis. — Boletus melanopus Fl. fr. 5. p. 42. P. melano-

pus & cyathoides Fries syst. myc. i. p. 348. excl. syn. — *Pileus 2 unc. latus,*
2 lin. crassus.

f. infundibuliformis (DC.) pileo carnoso insundibuliformi ex albido-fuligino-
 noso, poris albidis, stipite deorsum incrassato nigrescente, apice dilutiore. — In sylvis ad basis truncorum, aut. — *B. infundibuliformis*
 Pers. syn. 517. ic. piet. t. 4. f. 1. — Major subrigidus; stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc.
 longus; pileus 2-3 unc. latus; pori minuti rotundi.

4. *P. FULIGINEUS* (Fries syst. myc. i. p. 348.) glaber, pileo carnoso cupulari lavi
 fuligineo-cinereo poris rotundis parvis albis, stipite pileo subdilutiore. —
 Ad terram in sylvis et hortis rarius, aut. — *B. Polyporus* Bull. champ.
 t. 469. DC. fl. fr. 2. p. 123. — Stipes centralis basi ventricosus et plerumque
 ferrugineus; pileus orbicularis tenuis; pori caroque primò albi demum sub-
 cinerei.

* * *Coriacei vel suberosi demum lignosi; pileus infundibuliformis; substantia et*
sporidia subferruginea. — Non cibarii.

5. *P. PERENNIS* (Linn. sp. 1646.) pileo coriaceo velutino zonato stipiteque cinna-
 momeis, poris minutis demum laceris concoloribus. — Ad terram et truncos
 antiquos, aut. — *Boletus perennis* Fl. fr. 2. p. 122. Fl. dan. t. 1075. f. 1.
 Sow. t. 192. Nees syst. f. 212. *B. coriaceus* Schäff. t. 125. Bull. champ. t. 28.
 et t. 449. f. 2. *B. leucoporus* Nees syst. f. 213. — *Buxb. cent.* 5. t. 15. f. 1.
 — Gregarius vel solitarius; stipes inaequalis subtuberous plerumque veluti-
 nus; pileus tenuis junior cyathiformis dein planiusculus concrescens.

f. fimbriatus (Roth.) umbrinus, pileo margine fimbriato, poris brevibus
 irregularibus. — *Boletus fimbriatus* Bull. t. 254. DC. fl. fr. 2. p. 122. —
 Mich. gen. t. 70. f. 8.

6. *P. RUFESCENS* (Fries syst. myc. i. p. 351.) pileo coriaceo hirto stipiteque sub-
 brevi rugosis rufescens, poris majusculis flexuosis laceris primò albidis
 demum concoloribus. — Ad terram in sylvis, aut. — *Sistotrema rufescens*
 Pers. ic. piet. t. 6; myc. eur. 2. p. 206. — Stipes subtuberous crassiusculus;
 pileus 2-4 unc. latus. Interdum pileo subdimidiato occurrit. Priori valde
 affinis.

f. biennis, pileo crasso subferrugineo, poris labyrinthiformibus cinereis
 demum laceratis, stipite lanato. — Ad terram et ligna putrida. — *Bo-
 letus biennis* Bull. champ. t. 449. f. 1. *Hydnom. bienne* DC. fl. fr. 2.
 p. 112. — Stipes vix uncialis.

7. *P. SISTOTREMOIDES* (Dub. mss.) inaequalis substipitatus subdimidiatusve, pileo
 suberoso tomentoso fusco-ferrugineo margine subtusque sulphureo-vires-
 cente, poris magnis difformibus laceris. — Ad terram præsertim ad trunco-
 rum radices, aut. — *P. Schweinitzii* Fries syst. myc. i. p. 351. Bol. Sistotre-
 moides Alb. et Schw. *Sistotrema ferrugineum* Pers. myc. eur. 2. p. 205. —
 — Pileus nonnunquam pedalis et ultrà; propter situm arctè cespitosum ple-
 rumque imbricatus et plus minus dimidiatus.

. II. *Pleuropus* (Nees syst. p. 220. Fries syst. myc. i. p. 352.). *Sti-
 pes lateralis simplex subhorizontalis; pileus difformis demum*
durus. — Sp. truncicolæ.

8. *P? LEVIGATUS* (Dub. mss.) pileo carnoso coriaceo glabro rufescens-albo, po-
 ris majusculis centralibus demum laceris albicantibus, stipite brevi laterali
 rufescente. — Ad truncos cæsos prope Poitiers ex cl. Pers. — *Sistotrema levi-
 gatum* Pers. myc. eur. 2. p. 206. — Junior linguae-vel spathulaeformis, adul-
 tus subrotundus margine subrepando; pileus ultrà 2 unc. latus.

9. *P. VARIUS* (Fries syst. myc. i. p. 352.) pileo coriaceo glabro lavi siccitate ri-
 gido, poris minutis subrotundis pallidis, stipite brevi lavi pallido deorsum
 frequentissime abruptè nigro. — Ad truncos. — Grev. crypt. fl. t. 202. Bol.
 calceolus Bull. champ. t. 360. 445. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 120. Bolt. t. 168. *B. an-
 rantiacus* Schäff. t. 110. *B. elegans* Bull. t. 46. *B. badius* Pers. syn. 523. *B. la-*

786 ACOTYL. seu CELLULARES. *POLYPORUS.*

teralis Bolt. t. 83. Fl. dan. t. 1075. f. 1. — Substantia albida junior carnosa demum valde dura; pileus 2-4 unc. latns; stipes subindè nullus, maximè variabilis; pileus badius fuscens ochraceus albidus, etc.

B. nummularius (Fries) tenuior, pileo regulari subcentrali pallescente, stipite perpendiculari. — Ad ramos delaplos exsiccatos. — Bol. *nummularius* Bull. champ. t. 124. Fl. fr. 2. p. 122. Nees syst. f. 214.

10. *P. LUCIDUS* (Fries l. c.) pileo subsuberoso stipiteque nitentibus castaneis glabris poris minutis rotundis pallidis. — Ad truncos, aest. — Grev. crypt. fl. t. 245. Bol. *lucidus* Leyss. Curt. lond. t. 224. Sow. t. 134. Pers. syn. B. *laccatus* Timm. Pol. *laccatus* Pers. myc. eur. 2. p. 54. B. *obliquatus* Bull. champ. t. 459. Fl. fr. 2. p. 121. B. *variegatus* Schäff. t. 263. — Admodum variabilis; stipes centralis lateralis aut nullus; pileus junior albido-lutens mox sanguineo-puniceus dein castaneus demum nigrescens; substantia dura tenacissima; pori æquales longissimi.

III. *Merismois*. — *Merisma* Fries syst. myc. 1. p. 354. *Flabellaria* Chevall. fl. par. 1. p. 239. *Fungi ramosissimi imbricati, stipite sublaterali passim obsoleto; substantia carnosâ albâ; poris decurrentibus tenuibus inæqualibus in partibus obliquis laceratis*. — Sp. *maximæ cespitosæ ad bases truncorum obviæ*.

11. *P. FRONDOSUS* (Pers. champ. com. 242.) *ramosissimus*, pileis dimidiatis rugosis fuligineo-griseis, poris albis. — Ad radices Quercum annosarum, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 355. Bol. *frondosus* Schranck. Fl. dan. t. 952. B. *ramosissimus* Schäff. t. 127. 129. B. *cristatus* Gouan non Pers. — Barr. ic. t. 1272. — Pilei numerosissimi dimidiati in cespitem convexum $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ pedalem condensati concrescentesqne $\frac{1}{2}$ -2 unc. lati basi in stipitem porrecti, juniores colore obseuniores subtomentosi. Caro mollis esculenta.

12. *P. GIGANTEUS* (Fries syst. myc. 1. p. 356.) *imbricato-multiplex*, pileis latissimis subzonatis mollibus rivulosis spadiceo-pallidis, poris inæqualibus pallescentibus, stipite crasso brevissimo. — Ad basin truncorum, aest. — Bol. *giganteus* Pers. B. *acanthoides* Bull. ch. t. 486. DC. fl. fr. 2. p. 121. B. *mesentericus* Schäff. t. 267. — Barr. ic. t. 1268. — Cespites maximi 1-2 pedales et ultrà; pilei spithamei formâ varii floccis subtilibus fuscis granulosi, primò pallidi dein spadicei; pori minutti dein lacerati. Caro mollis esculenta.

13. *P. CRISTATUS* (Fries syst. myc. 1. p. 356.) *imbricato-multiplex*, pileis carnosis subtomentosis difformibus virescentibus, poris niveis dein laceratis sulphureis, stipite albo. — Ad terram in sylvâ Compiègne ex el. Graves, in Vogenesis ex el. Pers., aut. — Bol. *cristatus* Schäff. t. 316. 317. Nees syst. f. 217. — Stipes demum fuscens; pilei irregulares lobati involuto-concrecentes 3 unc. circiter lati; pori primò albi lacerati plus minus virescentes.

14. *P. SULPHUREUS* (Fries l. c.) *multiplex subsessilis*, pileis latis imbricatis glabriusculis undulatis flavo-rubellis, poris minutis planis citrinis aut sulphureis. — Ad truncos Quercûs, Fagi, Pruni, etc., aest. — Grev. crypt. fl. t. 113. P. *Citrinus* Pers. Bol. *sulphureus* Bull. champ. t. 429. DC. fl. fr. 2. p. 120. Sow. t. 135. — Schäff. t. 131. 132. — Buxb. cent. 5. t. 1. — Cespites 1-2-pedales et ultrà pileis connatis spithameis et ultrà; vetustus aut exsiccatus ferè friabilis fit et colorem amittit.

15. *P. IMBRICATUS* (Fries l. c.) *multiplex subsessilis*, pileis imbricatis glabriusculis lateo-fulvis undulatis, poris minutis pallidis. — Ad truncos vetustos Quercûs et Fraxini, rario, aut. — Bol. *imbricatus* Bull. champ. t. 366. DC. fl. fr. 2. p. 119. — Pilei latissimi concrescentes interdum stipitati.

B. ramosus (Fries) in ramos subcylindraceos undique tubulosos expansus. — Ad tristes semiputridos in cryptis et lapidicinis. — B. *ramosus* Bull. champ. t. 418. DC. fl. fr. 2. p. 114. Nees syst. 1. 226. — Ad *P. sulphureum* a cel. Greville relatus.

IV. *Retiporus* (Batsch. el. 107. — Apus Fries syst. myc. i. p. 358.).
Pileus dimidiatus sessilis lateralis horizontalis vel effuso-reflexus marginatus. — Sp. lignatiles.

* Annui, poris strato simplici dispositis.

- a. Carnosi. — (Substantia alba junior succulenta vetusta fatiscens; pileus azonus; pori parvi subirregulares tenues nudi extus intusque albi.)
- 16. P. BETULINUS (Fries l. c.) pileo convexo glabro laevi reniformi fusco-rufescente, vertice obliquo brevissime stipitato, poris inaequalibus albis. — Ad truncos Betulae albae, passim, aest. — Grev. er. fl. t. 229. Bol. Betulinus Bull. champ. t. 312. DC. fl. fr. 2. p. 123. Bolt. t. 159. Sow. t. 212. — Solitarius; pileus magnitudine et formâ varius ad majores tamen pertinens; pori separabiles sed non tubulosi et a pilei substantiâ formati, ore dentato.
- 17. P. SPUMEUS (Fries l. c.) substipitatus albido-griseus, pileo carnoso convexo rugoso obtuso hispido, poris curtis subrotundis. — Ad truncos Fagi, Betulae, Ulmi in Gallia ex cl. Pers., aut. — Bol. spumeus Sow. t. 211. — Major 3-uncialis crassus; pori æquales integri non profundi.
- 18. P. DESTRUCTOR (Fries l. c.) albides, pileo inaequali rugoso glabro, poris subrotundis obtusis. — In sylvis humidis circa Beauvais ex cl. Graves. — Bol. destructor Schrad. Pers. — Magis minusve effusus mollis fibrosus exsiccatus friabilis; pori integri et laceri; odor gravis.
- b. *sebaceus* (Pers.) undulatus latè effusus fuscescens.
- 19. P. CÆSIUS (Fries l. c. p. 360.) simplex pileo carnoso subsericeo molli albido-cæsio, poris exiguis laceratis albis. — Ad truncos Fagi in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, aut. — Bol. cæsius Schrad. Pers. B. albidus Schäff. t. 124. Sow. t. 226. — Pileus 1-2 unc. latus cæsius vel cæruleus nunc effuso-reflexus nunc triquierter nunc substipitatus; raro tenuis tenax mollis. Var. pileo albo poris cæruleis.
- b. Subcarnosi. — (Substantia carnosâ-lenta tenax pileo concolor, vetusta putrescens; pileus villosus; pori parvi subrotundi extus intusque colorati, juniores pruinati.)
- 20. P. HISPIDUS (Fries l. c.) pileo carnosâ-fibroso crasso villoso ferrugineo demum-nigricante, poris longis secedentibus pallidis. — Ad truncos Quercus Juglandis et Mali, rarius, aest. — Grev. crypt. fl. t. 14. Boletus hispidus Bull. champ. t. 210 et 493. Fl. fr. 2. p. 120. Bolt. t. 161. B. velutinus Sow. t. 345. B. spongiosus Lightf. — Substantia carnosâ-fibrosa croceo-ferruginea; pileus 4-5 unc. variat lutescens et fuscus; pori exigui.
- 21. P. RUTILANS (Fries l. c. p. 363.) subimbricatus, pileo carnosâ-fibroso molli glabro rufescente, poris nitidis ferrugineis. — Ad truncos Populi nigrae propè Beauvais (cl. Graves), aut. — Bol. rutilans Pers. ic. pict. t. 6. f. 4. — Pileus mollis subfragilis convexus basi subeffusus, margine obtuso revoluto.
- 22. P. CUTICULARIS (Fries l. c.) pileo carnosâ-suberoso tomentoso ferrugineo margine sinuato, poris nitidis griseo-ferrugineis. — Ad truncos arborum emortuarum. — Boletus cuticularis Bull. champ. t. 462. DC. fl. fr. 2. p. 119. B. triquierter et Alnens ex Pers. — Solitarius ex Bull., imbricatus concrescens ex Fries; obsoletè zonatus basi subeffusus, tomentosus tomento demum evanescente; pori parvi demum laceri; substantia fibrosa dura, tenuissima ex Bull.
- 23. P. ADUSTUS (Fries l. c.) imbricatus, pileis carnosâ-tenacibus villosis fuligineo-pallidis, margine stricto nigrescente, poris minutis rotundis cinereis. — Ad truncos et ramos mortuos, aut. — Desmaz. cr. exs. n. 313. Bol. adustus Willd. ber. 392. B. pelloporus Bull. champ. t. 501. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 115. B. suberosus Batsch. el. cont. 2. t. 41. f. 226-227. — Magnitudine varius subrugosus obsoletè zonatus; pori breves rotundi primò argenteo-micantes dein subnigricantes.
- 24. P. AMORPHUS (Fries syst. myc. i. p. 364.) imbricatus, pileis carnosâ-tena-

788 ACOTYL. SRU CELLULARES. POLYPODIA.

cibus effuso-reflexis zonatis sericeis candidis, poris majusculis inaequalibus primò albis dein flavo-croceis. — Ad truncos Pini et Abietis in Jura (cl. Chaillet), aut. — *P. aureolus* Pers. myc. ear. 2. p. 60. *Boletus Abietinus* DC. fl. fr. 5. p. 40 non Dicks. — Pilei molles 2 unc. lati margine undulati, pori subrotundi.

25. *P. CROCEUS* (Fries l. c.) pileo carnoso-suberozo effuso-reflexo tomentoso lutescente, poris majusculis inaequalibus croceis. — Ad truncos cariosos Quercus in sylva Compiègne ex cl. Graves, aut. — *B. croceus* Pers. — Junior resupinatus ad unc. 4-5 effusus demum reflexus; substantia fibrosa humida.

c. Subsuberosi. — (Substantia carnoso-suberosa firma alba; pileus crassus rarissime effusus; pori pallescentes nudi.)

26. *P. SOLONIENSIS* (Fries l. c.) pileo suberozo carnoso fuscō, epidermide lacerata, poris flavescens. — Ad truncos in agro Soloniensi, aut. — *Bol. Soloniensis* DC. fl. fr. 5. p. 41. *Agaricus Soloniensis* Dub. orl. 177. — Semi-orbicularis pedalis, exsiccatus non putrescens. †

27. *P. LARICIS* (Dub. mss.) pileo suberozo carnoso ungulato zonato glabro laevi, poris brevissimis lutescentibus. — Ad truncos Laricis in subalpinis. — *Bol. Laricis* Jaq. misc. 2. p. 164. t. 20 et 21. *Bull. champ.* t. 296. Fl. fr. 2. p. 118. *Bol. purgans* Pers. *Polyp. officinalis* Fries et Pers. — *Mich. gen. t. 61. f. 1.* — Substantia mollis alba; pileus tuberculosus zonis lutescentibus et fuscescens variegatus. Americanus, nauseosus.

28. *P. SUAVEOLENS* (Fries l. c.) pileo carnoso-suberozo azono villosi albo, poris majusculis fuscescens. — Ad truncos Salicis, aut., hyeme. — *Bol. suaveolens* Linn. Sow. t. 228. non Bull. et DC. *P. suberosus* Bolt. t. 162. — *Buxb. cent.* 5. t. 5. — *Pileus solitarius* 2-4 unc. latus; pori primò albi et teretes dein fuscescentes interdūni inaequales. Odor aniseus gratus.

β. albus, submollis glaber albidus, poris demum rufis. — *Bol. Salicinus* Bull. champ. t. 433. f. 1. Sow. t. 227. Fl. fr. 2. p. 119. *P. inodorus* Chevall. — *Inodorus*?

29. *P. PORTULINUS* (Fries syst. myc. 1. p. 367.) minor subinodorus albus, pileis carnoso-suberosis azonis velutinis, poris parvis rotundis. — Ad truncos Populi, circa Parisios ex cl. Chevallier, aut. — Imbricatus concrescens; pilei $\frac{1}{2}$ unc. lati; pori æquales albi. An potius prioris var.?

30. *P. FUMOSUS* (Fries l. c.) imbricatus fuligineo-pallidus, pileis carnoso-fibrosis undulatis, poris minutis æqualibus concoloribus. — Ad truncos arborum in sylvis circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — *Bol. fumosus* Pers. — Primò albus dein rutilans aut lividus; substantia subzonata, pilei 2-4 unc. lati.

d. Coriacei. — (Substantia tenax alba aut rabra; pileus saepius zonatus et villosus; pori rotundi vel angulati parvi intus albi aut rubri.)

31. *P. HIRSUTUS* (Fries l. c.) albidus, pileo coriaceo-suberozo strigoso zonato, poris rotundis obtusis fuscescens. — Ad truncos circa Parisios ex cl. Chevall., aest., aut. — *Bol. hirsutus* Schrad. — Utrinque ferè planus reniformis saepè imbricatus 2 unc. circiter longus 1 $\frac{1}{2}$ latus; substantia tenax-mollis; pori cinerei aut lutei intus semper albi.

32. *P. VELUTINUS* (Fries l. c.) albidus, pileo coriaceo-suberozo subtenui subzonato velutino, poris rotundis albis. — Ad arbores in summis Vogesis (cl. Mougeot). — *Bol. velutinus* Pers. — *Pileus junior* convexus dein depresso tenuis circiter 2-uncialis albus vel lutescenti pallidus; pori parvi æquales. An à priore satis diversus?

33. *P. ZONATUS* (Fries l. c.) pileo suberozo-coriaceo subzonato villosi basi tuberoso, poris subangulis albicantibus. — Ad truncos Populi Tremulae circa Parisios ex Chevall., aest., aut. — *Bol. multicolor* Schæff. t. 269. *B. zonatus* Nees syst. f. 221. *B. ochraceus* Pers. — Variat pileo ochraceo, cinereo margine lutescente, griseo margine albo.

34. *P. VERSICOLOR* (Fries l. c.) cespitosus, pileis coriaceis villosis subcæruleis

- zonis pluribus dilatatis multicoloribus, poris minutis rotundis albis. — Ad arbores mortuos et trabes vulgaris, æst., aut. — Bol. versicolor Linn. Bull. champ. t. 86. Fl. fr. 2. p. 114. Bolt. t. 81. Sow. t. 229. 387. f. 7. B. atro-rufus Schæff. t. 263. — Subimbricatus tenuis margine sæpè glabriusculo pallido.
- β . *ochraceus* (Pers.) pileo unicolore ochraceo basi sæpius tuberculoso, subtus albo demum lutescente. — Bol. ochraceus Pers. syn. 539. Bull. t. 86. f. c.
- γ . *Olearium* (Pers.) pileo ex rufo et spadiceo subversicolore, poris minutissimis cinnamomeis. — Ad truncos Oleæ Europeæ in Gallia australi.
35. P. ABETINUS (Fries l. c.) effuso-reflexus, pileo coriaceo villoso albido, poris dentatis subviolaceis, demum expallentibus laceratis. — Ad truncos dejectos Abietinos, aut. — Pers. myc. eur. 2. p. 77. Grev. crypt. fl. t. 226. Bol. Abietinus Dicks. cr. 3. t. 9. f. 9. Pers non DC. B. incarnatus Fl. dan. t. 1298. Sistotrema violaceum Pers. syn. et myc. eur. 2. p. 203. Hydnom decipiens Sehrad. DC. fl. fr. 2. p. 113. — Buxb. cent. 5. t. 8. — Imbricatus tenuis margine sæpè undulatus; pori juniores integri angulati. Var. totus resupinatus.
36. P. PURPURASCENS (DC. fl. fr. 5. p. 41.) subcespitosus, pileo effuso-reflexo zonato villoso albido, poris primò albidis dein lilacinis minimis subconfluentibus. — Ad ramum quemdam demortuum in horto botanico Monspellensi (cel. DC.), aut. — Junior resupinatus albus orbicularis margine byssoides. — A priori non distinctum affirmat cel. Greville forsitan non immixtum.
37. P. DOLOsus (Pers. myc. eur. 2. p. 77.) effuso-reflexus tenerimus, pileo tomentoso albo, poris membranaceis majusculis, adultis laceris dentiformibus variis primò lutescentibus dein fusco-purpurascens. — Ad truncos et ligna Pinea in Jurasso (cl. Chaillet). — Bol. Abietinus Schl. non Dicks. Hydnom fimbriatum DC. fl. fr. 5. p. 37. non Fries. H. Psendo-boletus DC. l. c. Fries syst. myc. 1. p. 424. H. obliquum DC. l. c. p. 36. excl. syn. — Admodum secundum ætatem variabilis. Junior resupinatus squamas seu pelliculas orbiculares villoso-strigosas subtuberculosas sistens dein formam assumens cucullatam marginibus liberis et parùm reflexis.
38. P. CINNABARINUS (Fries syst. myc. 1. p. 371.) subgregarius unicolor cinnabarinus, pileo coriaceo-suberoso rugoso subzonato, poris rotundis conspicuis. — Ad truncos et ramos Cerasi Sorbi et etiam Fagi et Betulæ, aut. — Bol. cinnabar. Jacq. aust. 4. t. 304. B. coccineus Bull. champ. t. 501. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 115. — Pileus crassiusculus 3-4 unc. latus obsoletè zonatus, interdum basi subeffusus.
- ** *Perennes*, pileis pulvinatis durissimis, poris minimis æqualibus per strata dispositis.
39. P. PINICOLA (Fries syst. myc. 1. p. 372.) durus, pileo pulvinato-dilatato inæquabili nigrescente, margine cinnabarino, poris rotundis ochroleucis. — Ad truncos Abietis et Betulæ in Vogenesis ex cl. Pers. — Bol. Pinicola Swartz. B. ignarius Fl. dan. t. 953. Pers. syn. 534. non Linn. B. semi-ovoideus Schæff. t. 270. — Plerumque solitarius; pileus fusco-croceus versus basin nigrescens margine pallidus; pori minimi juniores albidí demum pallidè cinnamomei.
40. P. FRAXINEUS (Fries l. c.) durus, pileo crasso glabro zonato rugoso appalato ex pallido rufescente, poris minutis subferrugineis. — Ad Fraxini languescentis truncos. — Bol. Fraxinæ Bull. champ. t. 433. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 118. — Substantia crassa subrutila; pileus 1-2 palmaris unc. 1-2 crassus junior albus; pori interdum subcompressi et exinde lineares.
41. P. LÆVIS (Pers. myc. eur. 2. p. 68.) pileo coriaceo glabro albicante obsoletè zonato, poris majusculis sublinearibus lutescentibus aut subferrugineis. — Ad truncos (Salicis aut Cratægi) in sylvâ Compiègne ex cl. Graves. — Inter majores, spithamam ferè latus 1-2 unc. crassus; tubi longissimi quandoque stratificati.
42. P. PINI (Pers. myc. eur. 2. p. 83.) semi-cylindricus conicus basi dilatatus spa-

790 ACOTYL. SEU CELLULARES. POLYPORUS.

dicens, pileo zonato sulcato-rugoso scabro glabro, margine acuto subtomentoso subtusque cinnamomeo, poris irregularibus distinctis. — Ad truncos Pini rubrae propè Dax. — Bol. Pini Thore chl. 487. — Altitudine et latitudine basilari palmaris; pori brunnei magnitudine et formâ varii.

43. *P. DRYADEUS* (Fries syst. myc. 1. p. 374.) azonus, pileo explanato molli tuberculo subcinnamomeo, margine tamido porisque parvis albidis dein fusciscentibus. — Ad truncos Quercûs. — Bol. dryadeus Pers. obs. 2. p. 3. B. pseudo-igniarinus Bull. t. 458. DC. fl. fr. 2. p. 116. — Subsolitarius aut passim imbricatus 1-2 pedalis 2-3 unc. crassus.

44. *P. FOMENTARIUS* (Fries l. c.) pileo subtriangulo aut semi-orbiculari glabro fuligineo-canescente intus molli margine porisque minimis pallido-glaucis dein ferrugineis. — Ad truncos Fagi et Quercûs. — Bol. fomentarius L. Sow. t. 133. B. unguatus Bull. champ. t. 491. DC. fl. fr. 2. p. 116. — Tourn. inst. t. 330. — Magnus extus durus obsoletè fasciatus; pori per strata dispositi tubulos longos tenuissimos formant.

f. applanatus (Pers. myc.) dilatatus utrinque planiusculq., pileo glabro tuberculo-rugoso rufescente, poris primò albidis dein cum pileo concoloribus. — Bol. applanatus Pers. B. Lipsiensis Batsch. el. t. 25. f. 130.

45. *P. NIGRICANS* (Fries syst. myc. 1. p. 375.) durissimus, pileo pulvinato crasso concentrica sulcato nigro, margine porisque exiguis ferrugineis. — Ad truncos Betulæ in sylvis circâ Beauvais ex cl. Graves. — Substantia lignosa tenuis, zonæ concolores; pori longissimi. An ut vult. cl. Pers. subsequentis status vetustus?

46. *P. IGNARIUS* (Fries l. c.) durus, pileo crasso obtuso sublævi e ferrugineo cinereo margine porisque convexis exiguis cinnamomeis. — Ad truncos Salicûm, Fraxini, etc. — Bol. ignarius Bull. champ. t. 454. Sow. t. 132. Bolt. t. 80. B. obtusus Pers. DC. fl. fr. 2. p. 117. — Substantia tenuis; pilens e sordide ferrugineo fuscescens vel canus.

f. pomaceus, minor, pileo subperpendiculari cinereo-fuscescente opaco obsoletè fasciato, poris ferrugineis. — Ad truncos adhuc vivos Cerasi et Pruni. — P. pomaceus Pers. B. scutiformis Tratt. fung. 2. t. 5. f. 9. — Unc. 2 ferè magnus sublævis.

47. *P. TORULOSUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 79.) subsimplex dilatatus suberosus cinnamomens, pileo dimidiato subapplanato rugoso-tuberculo margine obtuso toruloso, subtus plano-convexo, poris minutissimis. — Ad truncos exsiccatos Quercûs. — B. ignarius var. c. Bull. t. 454. — Spithamam ferè latus 1½ unc. ferè crassus, tomento tenui obductus, zonis obsoletis. An sp. revera distincta?

48. *P. RIBIS* (Fries syst. myc. 1. p. 375.) dimidiatus, pileo suberoso subtenui rugoso applanato subpubescente obsoletè zonato spadiceo margine subtusque cinnamomeo, poris brevibus exiguis æqualibus. — Ad basin truncorum Ribis rubri, Grossulariæ, etc. — Desmaz. cr. exs. n. 314. Bol. Ribis DC. fl. fr. 5. p. 41. — Imbricatus inæqualis 4 unc. usque latus, substantia subspongiosa luteo-fulvâ.

49. *P. MARGINATUS* (Fries syst. myc. 1. p. 372.) durus, pileo crasso tuberculo-rufescente marginé stillante albido, poris pallidè citrinis. — Ad truncos Betulæ circâ Beauvais ex cl. Graves. — Bol. marginatus Pers. syn. B. fulvus Schæff. t. 262. — Unc. 3-4 latus glaber, pori minimi rotundi primo albi dein intusque citrini. Simplex aut subimbricatus.

50. *P. CONCHATUS* (Fries syst. myc. 1. p. 376.) durus spadiceus, pileo tenui effuso-reflexo fasciis imbricatis transversim striato, subtus concavo, poris exiguis cinnamomeis. — Ad truncos Salicis et rarius Fagi. — Bol. conchatus Pers. DC. fl. fr. 5. p. 42. — Unc. 2 ferè longus vix 3 lin. crassus. P. igniarium maxime affinis.

51. *P. LORICATUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 86.) durissimus perpendicularis, pileo crassiusculo suberoso effuso-reflexo spadiceo rugoso-tuberculo substrigoso, poris minutis æqualibus ferrugineis. — Ad truncos Jurassi det. cl. Chaillet

ex Pers. — Gregarinus, pileus 2 unc. latus 4 lin. crassus irregularis subsiccatus.

52. *P. CRYPTARUM* (Fries l. c.) coriaceo-spongiosus effuso-reflexus tenuis foligineo-ferrugineus, poris longissimis aliis rotundis aliis hiantibus. — Super trabes in cryptis. — Bol. cryptarum Bull. champ. t. 478. DC. fl. fr. 2. p. 114. Nees syst. f. 222. — Ad plurimum in congeriem crustaceam aggregatus superne per intervalla saepius hiens.

V. *Poria* (Hill. Pers. disp. 29; myc. eur. 2. p. 88. — Resupinatus Fries syst. myc. 1. p. 77. — *Physisporus* Chevall.). *Pileus resupinatus effusus totus ferè porosus obliteratus ubique adnatus immarginatus in ambitu sèpè byssinus.*

* *Poros intus coloratis.*

53. *P. MEGALOPORUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 88.) latissimus rubiginosus unicolor, subiculo tenui, tubis longissimis, poris æqualibus subfimbriatis. — Ad trabes in cryptis Vogesorum det. cl. Mongeot, ad trahes et portas cellarum propè Lille cl. Desmazières ex Pers. — Plerumque ad latitudinem pedalem expansus; subiculum coriaceum compactum vix 1-2 lin. crassum.

54. *P. SPONGIOSUS* (Fries l. c.) effusus coriaceo-spongiosus ferrugineus, poris rectis rotundis minutis. — In Salicibus cavis circa Beauvais ex cl. Graves. — Bol. spongiosus Pers. B. resupinatus Bolt. t. 165. — Nunc cespitosus nunc ferè crustaceus; pori longissimi totum ferè fungum constituant.

55. *P. SALICINUS* (Fries syst. myc. 1. p. 376.) durus late effusus undulato-rugosus glaber cinnamonomeus; poris rectis obliquisque. — Internus Salicum vetustarum investiens propè Lille ex cl. Desmaz. Beauvais (cl. Graves), Parisios ex Chevall. — Desmaz. cr. exs. n. 315. Bol. Salicinus Pers. — Pedalis et ultra saepè interruptus margine adpressus nunquam reflexus; tubi horizontales seu depresso.

56. *P. SCALARIS* (Pers. myc. eur. 2. p. 90.) glaber ligueo-pallidus undulato-interruptus, tubis perpendicularibus per intervalla altioribus nonnullis hiantibus, poris mediocribus crassiusculis. — In Helvetiae confinibus ad aqueductum det. cl. Gay ex cl. Pers. — Longitudine et latitudine inæqualis tamen plerumque 1-2 unc. latus 3-4 lin. crassus.

57. *P. UNDATUS* (Pers. l. c. t. 16. f. 3.) late effusus tenuis ligneo-fuscescens submembranaceus, superficie undulato-interrupta, poris minutissimis obliquis. — Ad tubum aqueductum destructum et putridum legit cl. Chaillet ex Pers. — Ex matrice facile evellendus glaber vix lin. crassus.

58. *P. OBLIQUUS* (Fries syst. myc. 1. p. 378.) latissimus spadiceus margine erecto cristato, poris minutis plerumque obliquis. — Ad truncos circa Parisios ex Chevall., aest. — Bol. obliquus Pers. syn. *P. incrustans* Pers. myc. — Durus contiguos integros truncos sèpè incrustans 2-4 lin. crassus; junior pallidus dein brunneus tandem niger; pori totum fungum constituentes nullà membranâ juncti.

59. *P. UNITUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 93.) suborbicularis spadicens opacus, margine depresso glabro, poris minutis subinconspicuis rectis æqualibus aliis obliquis sublinearibus sulcatis. — Ad ligna Abietina in montibus ex cl. Pers. — Unc. 3 ferè latus 2 lin. crassus superficie unitus tubis occultis.

60. *P. SUBSPADICEUS* (Fries syst. myc. 1. p. 378.) effusus tenuis albido-fuscus, ambitu tenui byssino albo, poris minutis inæqualibus. — Ad truncos Fagi in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves, aest. — Pori carni recti membranâ juncti.

61. *P. UMBRINUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 94.) longitudinaliter effusus umbrinus opacus, margine glabro, poris rectis æqualibus minutissimis. — Ad truncos cæsos Ulmi campestris propè Beauvais (cl. Graves). — Substantia sicca duriuscula; spithamam ferè longus unc. 1-2 latus 1-3 lin. crassus, intus junior ferruginosus.

P. humosus (Pers.) fusco-nigricans opacus intus ferrugineus, poris parvulis parietibus tenuissimis connexis, ore inæqualiter prominentem saepius den-

- ticulato. — Propè Angers ex cl. Pers. — Semi-spithamam longus 1 $\frac{1}{2}$ lin. crassus; pori congesto-subflexosi.
62. *P. TRISTIS* (Pers. myc. eur. 2. p. 94.) parvulus angustus fusco-nigricans, margine tenui brevi inflexo, subtus fasciis linearibus obscurioribus variegato, poris cibrosis æqualibus crassis. — Ad. corticem Quercum propè Neuchâtel ex cl. Pers., et probabiliter in Galliâ finitimâ. — Vix unc. magnus $\frac{1}{2}$ lin. crassus, pori majusculi obtusi, infernè subtomentosus zonis ferrugineis umbrinisque distinctus.
- 63? *P. BRUNNEUS* (Pers. l. c.) tennissimus inæqualiter effusus rufo-brunneus, margine vix ullo glabro, poris majusculis 4-6-gonis magnitudine inæqualibus acutis. — Ad ligna Abietina cum priore, vere. — Unc. 2 longus $\frac{1}{2}$ latius crutæformis nitens; pori cellulæformes. — An potius inter Favolos species collocanda?
- f. rufus* (Pers. l. c.) effusus coriaceus rufus, poris minutissimis rotundatis. — Ad Jaglandem prope Compiègne (cl. Graves). — Pori subrotundi 2 lin. acuti.
64. *P. NITIDUS* (Fries syst. myc. 1. p. 379.) effusus confluentis flavus, in ambitu sterili sublobatus pallidior, poris rectis subrotundis. — Ad truncos Fagi, aut. — Bol. nitidus Pers. obs. myc. 2. t. 4. f. 1. — Margo junior pubescens; superficies plerumque applanata.
65. *P. FUSCO-CARNEUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 97.) carnosus fascio-purpureus, margine crasso tomentoso, poris distinctis subrotundis. — Ad ramos exsiccatos dejectos propè Parisios ex cl. Pers., ad ramos Populi in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves. — Ad 6 unc. ferè expausus, ultrà unc. 1 latius.
66. *P. INCARNATUS* (Fries obs. 2. p. 262.) effusus coriaceus persistens durinclus glaber incarnatus, superficie undulato-interrupta, poris obliquis inæqualibus. — Ad ligna Abietina demortua in Jurasso (cl. Chaillet), aest. — Bol. incarnatus Pers. DC. fl. fr. 5. p. 40. *P. CRUENTUS* Pers. myc. eur. 2. p. 92. t. 16. f. 4. — Lævis firmus 1-4 unc. longus vix unc. latius; pori recti obliquique.
- ** *Poris intus albis.*
67. *P. MEDULLA-PANIS* (Fries syst. myc. 1. p. 380.) longitudinaliter effusus coriaceus subundulatus durus glaber siccus albus, poris parvis æqualibus. — Ad ligna prostrata, passim. — Bol. medulla-panis Jacq. misc. 1. t. 11. Bolt. t. 166. f. 1. DC. fl. fr. 5. p. 39. — Plerumque 3-4-uncialis unc. 1 latius 3 lin. ferè crassus; pori subrotundi e situ nunc recti nunc obliqui.
68. *P. COLLICULOSUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 103.) effusus crassus coriaceus glaber albido-griseus hinc indè tuberosus, margine pruinoso-pubescente, poris rectis majusculis subæqualibus. — Ad truncos Quercus in Jurasso (cl. Chaillet). — Bol. tuberosus DC. fl. fr. 5. p. 40. non Pers. — Unc. 4-5 longus; pori obtusè subfavoginei 2 lin. longi griseo-pallentes in ambitu albido-pubescentes substantiâ siccâ.
69. *P. FERTUSUS* (Pers. l. c.) subregularis albidus glaber compactus, poris subdistantibus æqualibus submagnis. — Ad truncum putridam Quercus propè Parisios initio hyemis det. cel. Pers. — Parvulus 1 $\frac{1}{2}$ unc. vix longus 1 latius subdorsus primò aporus margine subtomentosus; pori cupulares regulariter dispositi.
70. *P. VITREUS* (Fries obs. 2. p. 265.) effusus carnosus undulatus aquose albidus subhyalinus, poris minimis. — Ad truncos cariosos Fagi in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, vere, aut. — Bol. vitreus Pers. — Latè et inæqualiter effusus crassiusculus humidus glaber, margine tenui villoso candido; pori e situ recti vel obliqui.
71. *P. VERSIPORUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 105.) dilatatus difformis pallens subcrassus, pori ab initio formâ sitaque regularibus dein inæqualibus laceris aut in dentes fasciculatos prominentibus. — Ad corticem Quercus propè Compiègne (cl. Graves). — Spithamam nonnunquam longus 2 latius; junior ferè aporus lævis.

72. *P. VULGARIS* (Fries syst. myc. I. p. 381.) longè effusus tenuis siccens lèvis albus, margine subpubescente, poris exiguis æqualibus. — Ad ligna dejecta. — Bol. papyraceus Schranck. B. inversus Vill. B. cellulosus Fl. dan. t. 716. f. 1. B. proteus Bolt. t. 166. — Ad longitudinem usque pedalem effusus $\frac{1}{2}$ lin. crassus detritus immutabilis nec nisi in frustulis a ligno separabilis.
73. *P. CERASI* (Fries I. c. p. 382.) orbicularis dein confluentis albus in ambitu tomentosus, hymenio sinuoso-poroso, poris dissimilibus glabris demum laceras. — Ad truncos Cerasi, æst., aut. — Sistotrema Cerasi Pers. syn. 552. S. leucoplaca Pers. myc. Hydnnum Cerasi DC. fl. fr. 5. p. 36. — Adnatus subtenus elegans.
74. *P. MUCIDUS* (Fries I. c.) effusus carnosus mollis candidus, ambitu byssino, poris integris subrotundis. — Ad truncos cariosos Pineos circa Mortefontaine ex cl. Graves. — Bol. mucidus Pers. — Plerumque humens 5-6 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pori demum laceri. Var. minor et tenuior.
75. *P. RADULA* (Fries I. c.) effusus mollis albus subtomentosus, poris inæqualiter prominulis angulatis dentatis. — Ad ramos demortuos circa Parisios ex Chevall., sine æst. — Bol. radula Pers. — Indeterminatus 1-3 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. et ultra latus secedens; substantia subtomentosa persistens; pori congesti acuti.
76. *P. TERRESTRIS* (Fries I. c.) effusus byssinus delicatus fogacissimus albus, centro poris perexiguis dein rufescitibus instructo. — Ad terram humidam propè Parisios ex Chevall., inter lapides in Jurasso det. cl. Chaillet ex cel. DC. — Bol. terrestris DC. fl. fr. 5. p. 39. Poria terrestris Pers. ic. pict. t. 16. f. 1? — Substantia byssina adeo delicata ut ad aëris contactum convolvetur et digito pressa faciem mutet.
77. *P. LANEUS* (Pers. myc. eur. 2. p. 112. t. 17. f. 2.) suborbicularis niveus, subiculo toto velutino, poris ut plurimum per intervalla prominentibus horizontalibus, superioribus hiantibus. — Inter corticem et lignum Abietis in Jurasso finitimo det. cl. Chaillet ex Pers. — Substantia tota ex bysso molli formata; pori hinc indè in superficie conglomerati fenerimi, in parte interrupta rotundi et æquales, ceteri repentes fissi.
78. *P. RACODIOIDES* (Pers. I. c.) latissimus, parte sterili latâ mollissimâ lutescente subcervinâ, poriferâ glabra subferruginea poris obtusis æqualibus. — Propè Rothomagum det. D. Behéré ex cl. Pers., ad maros humidos circa Beauvais ex cl. Graves. — Membrana vix lin. crassa opaca; pars quæ poros profert compacta glabra; pori regulares sat magni crassi seu obtusi.
79. *P. VAILLANTII* (Fries I. c.) effusus byssinus costatus albido, poris hinc indè conglomeratis majusculis carnosis sèpè oblongis irregularibus. — Ad terram, truncos vetustos, trabes in cryptis et fodinis. — Bol. Vaillantii DC. fl. fr. 5. p. 38. Agaricus cryptarum Palis.-Beauv. in ann. mus. 8. t. 57. f. 2. 3. — Vaill. bot. t. 8. f. 1. — Membrana latè effusa tenuis byssacea contigua hinc indè costis percursa.
80. *P. MOLLUSCUS* (Fries syst. myc. I. p. 384.) effusus tenuis mollis albus, ambitu lato byssino et fibrilloso, poris tenerrimis densis inæqualibus. — Ad truncos putridos, etc. — Bol. molluscus Pers. Fl. dan. t. 1299. — Junior aporus et in ambitu Himantiam candidam Pers. refert, tenuissimus crustæ formis; pori medii sèpè laceri.
- P. epiphyllus* (Pers.) tenuissimus albus marginelato membranaceo, poris inæqualibus acutis. — Ad folia decidua, in locis suffocatis. — Poria epiphylla Pers. Bol. medulla panis Sow. t. 326. non Pers.

Sect. II. *FAVOLUS Pal. de Beauv. fl. ow. p. 12. Fries syst. myc. I. p. 342.* — *Platyporus Pers. myc. eur. 2. p. 35.*

Pori ampli 4-6-goni favum imitantes.

81. *P. GALLICUS* (Fries I. c.) effuso-reflexus fuligineo-fusecens coriaceo-suberosus, pileo subtriquetro strigoso squamoso, poris amplis. — Ad truncos

794 ACOTYL. SEU CELLULARES.

arborum emortuarum ant languentium, rarissimè. — Bol. Favus Bull. champ. t. 421. DC. fl. fr. 2. p. 114. Nees syst. f. 222. non Linn. — Elongatus subzonatus.

82. *P. rhombiporus* (Pers. myc. eur. 2. p. 211.) pileo integerrimo convexo lutescente, squamulis fuscis adpressis margine strigosis, poris membranaceis compresso-rhomboides albidis, stipite brevi subsquamuloso rufescente subfuligineo. — Ad truncos in Galliâ meridionali det. cl. Brondeau ex cl. Pers., aest. — Stipes $\frac{1}{2}$ unc. altus induratus; pori denticulati seu laceri; pileus unc. et ultrà latus ligneo-pallidus, margine subinvolutu et villo rudi hirto.

83. *P. squamosus* (Fries syst. myc. 1. p. 343.) amplius, pileo carnosulo-subochraceo, squamis obscurioribus subnigrescentibus, poris magnis flexuosis pallidis, stipite sublaterali obeso nigrescente. — Ad truncos varios præsertim Juglandis. — Grev. crypt. fl. t. 207. Bol. squamosus Huds. Schæff. t. 101, 102. Bolt. t. 77. Fl. dan. t. 1196. B. Juglandis Bull. champ. t. 19. DC. fl. fr. 2. p. 121. B. platyporus Pers. syn. — Nunc solitarius nunc cespitosus; stipes junior subcentralis dein lateralis; pileus 3-6 unc. latus intus niveus compactus. Odor fortis.

84. *P. Pes-CAPRÆ* (Pers. champ. com. 241. t. 5.) pileo dimidiato et subintegro fuscescenti-badio demùm tessulato, poris magnis acutis stipiteque ventricoso lutescenti-albidis. — In pinetis ad terram in Vogesis det. cl. Maugeot. — Pers. myc. eur. 2. p. 37. — Gregarius; stipes lateralis 2-3 unc. longus $1\frac{1}{2}$ crassus; pori subinæquales in stipite decurrentes; pileus 3-5 unc. latus. Edulis.

XLI. DÆDALEA Pers. syn. 499. Nees syst. f. 224. Fries syst. myc. 1. p. 381.

Receptaculum pileatum; hymenium sinuosum, sinuli cum pilei substantiâ suberosâ homogenei et concreti firmi subprofundi varii, nunc lamellas anastomosantes nunc poros elongatos flexuosos referentes; thecæ tenues. — Pileus suberosus vel coriaceus tenax raro stipitatus.

I. *Resupinatæ.*

1. *D. LATISSIMA* (Fries syst. myc. 1. p. 340.) effusa suberosa crassa undulata ligneo-pallens, poris subrotundis longissimisque flexuosis cervino-griseis. — Ad truncos Fagi in Jurasso Neocomensi ex cl. Pers. — *Polyporus cervinus* Pers. myc. eur. 2. p. 86. — Ex unc. 5 ad 2 pedes lata; pileus lacunosus irregularis margine hinc indè libero; pori primò nulli mox superficiales dein conserti varii; substantia dura lignea.

II. *Dimidiata sessiles.*

* *Sinuosæ porosæque.*

2. *D. RUBESCENS* (Fries syst. 1. p. 339.) sessilis, junior pruinosa, pileo subseroso lœvi e pallido-rubcente, poris longis rectis angustis. — Ad Salices propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Pileus subtenuis 2-3 unc. latus, vix tomentosus, adultus zonatus; pori ad marginem præcipue elongati.
3. *D. GIBBOSA* (Pers. syn. 501.) sessilis albida, pileo subseroso villoso basi porrecto gibboso, poris linearibus subrectis. — Ad truncos Fagi, Betulæ, Salicis, etc. — Bol. sinuosus Sow. t. 194. — Inodora subsolitaria dura elastica 3-5 unc. et ultrà intus alba; pori breves angusti recti.
4. *D. SUAVEOLENS* (Pers. syn. 502.) sessilis, pileo coriaceo subseroso glabro e niveo subfulvo, poris elongatis irregularibus rufescens. — Ad truncos Salicinos, aut. — Bol. suaveolens Bull. champ. t. 310. DC. fl. fr. 2. p. 118. non Linn. et Sow. — Junior alba dein rufescens supernè zonata scabra intus stramineo-fuliginea. Odor suavis aniseus.
5. *D. VARIEGATA* (Fries obs. 2. p. 240; syst. myc. 1. p. 327.) sessilis, pileo coriaceo zonis glabris villosisque discoloribus fasciato, sinulis elongatis flexuosis albis. — Ad truncos Fagi, aut. — Bol. coriacens Bull. champ. t. 537. f. I.

- K. L. — Imbricata reniformis unc. vix superans zonis depresso glabris cinea-fuscis, elevatis albis vel canis villosis; sinuli perangusti demum dentati.
6. D. IMBERBIS (Chevall. fl. par. 1. p. 247.) imbricata coriacea, pileo subrotundato glabro latiusculo zonatim sulcato flavo-albido, poris sinuosus flavo-pallidescens. — Ad truncos arborum mortuarum rarius. — Bol. imberbis Bull. champ. t. 445. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 115. — Unc. 4-5 lata; pori primò albi demum subumbrae breves irregulares.
7. D. UNICOLOR (Fries syst. myc. 1. p. 336.) imbricata sessilis cinerea, pileo coriaceo viloso zonato, sinulis inæqualibus subflexuosis demum laceratis. — Ad truncos, aut. — Boletus unicolor Bull. champ. t. 408, 501. f. 3. Bolt. t. 163. Sow. t. 325. DC. fl. fr. 2. p. 115. Sistotrema cinereum Pers. syn. 551; myc. eur. 2. p. 204. — Tenax flexilis, humida sèpè fuliginea, sicca albido grisea.
8. D. CONFRAGOSA (Pers. syn. 501.) sessilis, pileo suberoso-coriaceo zonato-sabro lateritio-fusco, sinulis labyrinthiformibus cinereis. — Ad truncos Pyri terminalis. — Bol. confragosus Bolt. t. 160. B. labyrinthiformis Bull. champ. t. 491. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 117. — Subimbricata fere lignosa intùs obscurè badia; sinuli lati varie contorti.
9. D. SUBEROSA (Dub. mss.) sessilis glaber rufescens, pileo molli dein coriaceo supernè rugoso vel zonato, poris latis irregularibus lacunis interjectis. — Ad truncos, palos, etc. — D. Bulliardii Fries. Bol. suberosus Bull. champ. t. 482. DC. fl. fr. 2. p. 116. — Junior mollis subaquosa intùs concolor; quoad formam varia.

** Lamellatæ.

10. D? RUFO-VELUTINA (Dub. mss.) sessilis subcespitosa rufescens, pileo suberoso-coriaceo tomentoso, lamellis paucis concoloribus integris interruptis. — In subterraneis Observatorii Parisiensis det. cl. Leman ex cel. DC. — Agaricus rufo-velutinus DC. fl. fr. 2. p. 134. †.
11. D. ABIEGINA (Fries obs. 2. p. 239; syst. myc. 1. p. 334.) sessilis, pileo suberoso-coriaceo subzonato glabrescente umbrino, lamellis rectis subramosis glaucis. — Ad tristes præsertim Abietinos. — Agaricus Abietinus Bull. champ. t. 442. f. 2; 541. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 133. — Junior tomento umbrino obductus dein glaber nigrescens, zonis concoloribus ad $1\frac{1}{2}$ unc. et ultrà elongatus sèpè seriato-confluens, demum nigrescens; lamellæ demum ferrugineæ subumbrae.
12. D. SEPIARIA (Swartz in vet. ac. handl. 1810. p. 2.) sessilis, pileo coriaceo zonato strigoso-tomentoso spadiceo, margine lamellisque ramosis anastomosantibus lutescentibus. — Ad ligna Pinea putrescentia. — Agaricus sepiarius Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 347. A. hirsutus Schæff. t. 76. A. betulinus All. — Vaill. bot. t. 1. f. 1-3. Buxb. cent. 5. t. 6. — Pileus durus planiusculus elongatus sèpè seriato-confluens, demum nigrescens; lamellæ demum ferrugineæ subumbrae.
- Ag. tricolor (Fries) versicolor, pileo reniformi, lamellis sinuatis dichotomis basi porosis lutescentibus. — Ag. tricolor Bull. champ. t. 541. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 133.
13. D. BETULINA (Rebent. neom. 351.) sessilis pallescens, pileo coriaceo tomentoso concentricè zonato, lamellis rectis subramosis. — Ad truncos exsiccatos frequens. — Desmaz. exs. n. 222. Ag. Betulinus Linn. Sow. t. 182. A. coriaceus Bull. champ. t. 537. f. 1. A.-F. DC. fl. fr. 2. p. 134. Bolt. t. 158. — Zonæ concolores vel obscuriores; lamellæ coriaceæ non raro etiam anastomosantes et sinuosæ demum margine laceratæ.
14. D. QUERCINA (Pers. syn. 500.) sessilis ligneo-pallens, pileo crasso suberoso ruguloso glabro, lamellis contortis implexis sinuosus, sinulis magnis. — Ad truncos arborum præsertim Quercus, frequens. — Grev. érypt. fl. t. 238. Agar. Quercinus L. Bolt. t. 73. Sow. t. 181. Fl. fr. 2. p. 133. Ag. labyrinthiformis Bull. champ. t. 352, 442. f. 1. A. dubius Schæff. t. 331. — Bocc. mus. t. 305. f. 5. Buxb. cent. 5. t. 4. f. 1. — Substantia nunc mollior subflexilis nunc dura crassa rigida; lamellæ crassæ. Magnitudine et formæ varia.

796 ACOTYL. seu CELLULARES.

Sect. IV. AGARICINÆ Fries syst. orb. veg. 1. p. 65.

Hymenium plicatum lamellatumve.

XLI. SCHIZOPHYLLUM Fries obs. 1. p. 330. — Agarici sp. Linn. DC.

Receptaculum pileatum subtus lamellatum, lamellæ radiantes subparallelæ dichotomæ nunquam anastomosantes, immixtis brevioribus, omnes longitudinaliter bifidæ; lamellulæ margine involutæ in superficie tantum exteriori thecas gerentes. — Pileus suberoso-coriaceus determinatus dimidiatus subsessilis.

1. S. COMMUNE (Fries l. c.) ad truncos arborum præsertim Alni. — Grev. cr. fl. t. 61. Agaricus Alneus Linn. Schæff. t. 246. f. 1. Bull. champ. t. 346, 581. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 134. Sow. t. 183. A. multifidus Batsch. et. f. 126. Nees syst. f. 181. — Vaill. bot. t. 10. f. 7. Buxb. cent. 5. t. 7. f. 1. — Gregarius unc. vix superans tomentosus albido-griseus margine lobatus sæpe multifidus subinde breviter stipitatus; lamellæ purpurascenti-cinereæ villosæ.

XLI. MERULIUS Fries syst. myc. 1. p. 326. Ad. Brongn. in dict. class. 10. p. 447. — Xylophaga Linck. — Xylomyzon Pers. myc. eur. 2. p. 26. — Merulii sp. Hall. Pers. DC.

Receptaculum pileatum irregulare; hymenium venosum vel sinuosoplicatum; plicæ absque tubulis anastomosantes angulatæ vel flexuosaæ inæquales cellulas irregulares formantes cum pileo concretæ et homogeneæ, interruptè thecas crassas gerentes. — Pileus sessilis resupinatus effusus tenuis raro reflexus et determinatus. Species omnes incolunt ligna putrida et cariosa quæ emolliendo destruunt.

1. M. CRUSTOSUS (Dub. mss.) latè effusus totus glaber fusco-pallens crustæformis, plicis porosis inæqualibus compressis parvis margine acutis. — Ad truncos Abietinos terræ incumbentes in summo Jurasso ex cl. Pers. — Xylomyzon crustosum Pers. l. c. p. 34. — Substantia secca ligno arctè adnata inferne albicans et hyssoidæ.
2. M. PAUCIRUGUS (Dub. mss.) flavo-brunnescens incrustans tenuis, margine subvilloso-albicante, hymenio læviusculo, plicis paucis latis transversè reticulatis superficialibus. — In Vogesis det. cl. Mougeot ex Pers. — Xylomyzon paucirugum Pers. myc. eur. 2. p. 33. t. 14. f. 6. — Ligno arctè adnatus applanatus inæqualiter et subinterruptè effusus confluens; hymenium ab initio omnino læve deinde hinc inde profert plicas laxas ægre dignoscendas.
3. M? ISOPORUS (Dub. mss.) longitudinaliter effusus tenuis rufo-carneus, margine repando angusto subhyssino rarius fimbriato gilvo, plicis densis majusculis regularibus, minoribus intermixtis, exterioribus subreticulatis. — Ad ramos cortice denudatos circa Parisios ex cl. Pers. — Xylom. isoporum Pers. l. c. t. 16. f. 1, 2. — Ligno arctè adhærens 3 unc. longus et 1 latus. Polyporum primò intuitu refert.
4. M. CROCEUS (Dub. mss.) inæqualiter effusus mollis flavo-croceus, margine hyssino albo-pallido, plicis laxis latè reticulatis, paucis obliquis, nonnullis dentato-laceris. — Ad truncos Abietinos Jurassi det. cl. Chaillet ex Pers. — Xylom. croceum Pers. l. c. t. 14. f. 3. — Primò omnino lævis dein proferens plicas formæ valde diversas, imò dentes seu appendicula compressa libera. An sp. satis distincta?
5. M. PULCHER (Dub. mss.) subtenuis rufo-carneus margine tomentoso albo-palescente cinctus, plicis rectis integerrimis regularibus. — Ad corticem Abietinum in Jurasso ex cl. Pers., rarius. — Xylom. pulchrum Pers. l. c. t. 14. f. 1. — Carnoso-membranaceus.
6. M. TAXICOLA (Dub. mss.) rufo-fuscus subumbrinus opacus immarginatus, plicis prolongatis teretiusculis subtubulosis. — Ad truncos Taxe baccati det. cl.

Chaillet ex cl. Pers. — *Xylom. taxicola* Pers. l. c. t. 14. f. 4, 5. Plicæ subtubulosæ; substantia coriaceo-carnosa.

7. *M. LACRYMANS* (DC. fl. fr. 2. p. 132.) effusus latissimus flavo-ferrugineus, margine lato albido tomentoso, plicis amplis poroso-sinuatis. — Ad trabes ligna, etc., in locis humidis. — *M. destruens* Pers. *Boletus lacrymans* Wulf. in Jacq. misc. 2. t. 8. f. 2. Sow. t. 113. Bolt. t. 167. f. 1. — Subiculum tenue membranaceum albidum ab initio byssoidem hinc indè guttulas aqueas copiosas exstans; plicæ amplæ aurantiacæ; sporidia cinnamomea.
9. *M. SERPENS* (Tode in hall. nat. ges. 1. p. 355.) coriaceo-membranaceus effusus glaber rubescens, margine simbriato albo, plicis primò rugæformibus dein poris minutis angulatis. — Ad sepimenta et ligna Pinea. — Fries syst. myc. 1. p. 327. — Vittas seu tænias æmulans a matrice facile solvendus vix semi-unctum latus sed nonnunquam spithamam longus; plicæ primò obsoletæ siccæ collabentes.
10. *M. RURUS* (Pers. syn. 498.) effusus cartilagineo-membranaceus carneo-rufus glaber, plicis porosis oblongis obliquis laceris. — Ad ligna Faginea, in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, aut. — Fries l. c. — Totus respinatus adnatus vel immersus.
11. *M. TREMELLOSUS* (Schrad. spic. 139.) effuso reflexus subimbricatus carnosotremellosus tomentosus albus, plicis parvis gyroso-poriformibus acutis rubicundis. — Ad truncos cæsos, aug.-dec. — Fl. fr. 2. p. 132. — Fl. dan. t. 1553. *Agaricus betulinus* Fl. dan. t. 776. f. 1. — Junior totus respinatus orbicularis pallidus in ambitu radiosus et liber demum reflexus magnitudine et formâ varius.
12. *M. variegatus* (Brond. in mem. soc. linn. par. t. 4. p. 276. t. 15.) magnus crassus lanuginosus albus vel rubescenti-incarnatus subzonatus, plicis intescentibus. — Ad terram in sylvarum locis opacis circa Aginnum ex cl. Brondeau.

XLIV. CANTHARELLUS. *Adans. Juss. gen. 6. Fries syst. myc. 1. p. 316. Ad. Brongn. cl. champ. p. 90. — Merulius et Craterellus Pers. myc. eur. 2. p. 11 et 4. — Merulii sp. Hall. Pers. syn. DC.*

Receptaculum pileatum subtus plicatum; plicæ radiantes ramosæ subparallelæ raro anastomosantes obtusæ cum hymenio undique thecigero homogeneæ et concretae. — Pileus carnosus vel membranaceus, adultus subhorizontalis determinatus, margine liber, cum stipite quando adest contiguus.

1. *Leptopilos*. — *Pleuropus* et *Apus* Schrad. spic. 176. Fries syst. l. c. *Stipes brevis lateralis verticalis vel nullus; pileus expansus tenuis submembranaceus inæqualis.* — *Epiphyti.*
1. *C. TENELLUS* (Fries syst. myc. 1. p. 325.) sessilis subgelatinosus supra niger infra fuscescens, venis prominulis inæqualibus radiantibus. — Ad trabes putridas. — *Merulius tenellus* DC. fl. fr. 2. p. 132. — *Minutus* 4 lin. circiter latus; venæ inæquales e centro divergentes.
2. *C. BRYOPHILUS* (Fries l. c.) candidus minutus pezizoideus, pileo membranaceo postice porrecto stipitiformi affixo, plicis distinctis simpliciter ramosis 2-3-fidis. — Ad muscos in sylvis Abietinis Jurassi, aest. — *Mer. bryophilus* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 43. Nées syst. f. 237. *Agaricus bryophilus* Pers. obs. 1. p. 3. f. 1. — *Pusillus* 2-3-linearis pubescens cupulæformis demum horizontalis; plicæ acutæ radiatæ.
3. *C. LEVIS* (Fries l. c.) gregarius subverticalis minutus sessilis planus candidus, venis obsoletis. — Inter muscos. — *Thelephora muscigena* Pers. syn. 572. DC. fl. fr. 2. p. 105. *T. vulgaris* Pers. myc. eur. 1. p. 115. t. 7. f. 6. — Carnoso-membranaceus exiguis 3-5 lin. latus tenuis mollis; hymenium demum leviter rugulosum.

798 ACOTYL. SEU CELLULARES. CANTHARELLUS.

4. *C. cucullatus* (Dub. mss.) carnoso-gelatinosus, pileo cucullato velutino fusco-fuligineo subtus fuligineo-nigro nitido, plicis latis prominentibus, stipite excentrico brevi concolor. — Ad Salices, emortuas decorticatas propè Estillac ex cl. de Brond. — Merulius cucullatus de Brond. crypt. agenn. fasc. 1. p. 11. t. 2.
5. *C. THOREI* (Dub. mss.) pileo sessili subtomentoso fuscescente margine subtusque amæne violaceo. — Ad vetustos Alnorum trunco propè Dax ex Thore. — Merulius violaceus Pers. myc. eur. 2. p. 21. non Fries obs. — Ultrà unciam latus; versus pilei marginem lineâ semicirculari violacea pictus.
6. *C. RETIRUGUS* (Fries l. c.) membranaceus tenuissimus verticalis sessilis subrotundus suprà laevis albido-cinereus, subtus reticulatum venosus subfuligineus. — Ad ramulos et muscos. — Merulius retirugus Pers. syn. 494. DC. fl. fr. 2. p. 131. Helvella retiruga Bull. champ. t. 498. f. 1. — Lin. 5 circiter latus paginae superioris fibrillis adfixus, margine primò integro dein variè fiso; plicæ tenellæ.
7. *C. CANDICANS* (Dub. mss.) albo-fuscescens, pileo membranaceo repando glabro, stipite tenuissimo excentrico, plicis rectis parallelis. — In turfosis ad muscos et stipulas ex cl. Pers. — Mer. candicans Pers. myc. eur. 2. p. 21. Helv. retiruga Sow. fung. 348. — Unc. 1 plus minusve latus forma sub 4-angularis, substantiæ tener pellucidus; stipes $\frac{1}{2}$ unc longns æqualis sed tenuis. An potius prioris forma?
8. *C. LOBATUS* (Fries l. c.) horizontalis sessilis lobatus fuscus, venis ramosis anastomosantibus. — In paludosis suprà Hypna in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, vere. — Mer. lobatus Pers. Helvella membranacea Dicks. Bolt. t. 177. Holmsk. ot. 2. t. 28. Fl. dan. t. 1077. f. 1. — Stipes plave nullus; pileus uncialis planus puncto laterali adfixus, siccus expallens.
9. *C. MUSCIGENUS* (Fries l. c.) gregarius horizontalis pallescenti-fuscus, pileo membranaceo ruguloso opaco glabro latere exciso, plicis nitidis ramosis, stipite lateralí brevi crassiusculo. — Ad muscos vivos, aut. — Merulius muscigenus Pers. syn. 493. DC. fl. fr. 2. p. 131. Nees syst. f. 236. M. serotinus Pers. myc. Agaricus muscigenus Bull. herb. t. 283. Helvella dimidiata Bull. herb. t. 498. f. 2. — Pileus albidus cinereus vel fuligineus obsoletè zonatus 9-12 lin. latus; stipes verticalis 9 lin. longus basi villosus subinde nullus.
10. *C. CRISPUS* (Fries l. c.) parvus subimbrieatus difformis villosus rufescens, pileo coriaceo-carnoso margine plicisque dichotomis crispis albicis. — Ad ramulos Betulæ, Fagi, Coryli, etc., aut., hyeme. — Mer. crispus Pers. ic. pict. t. 8. f. 7. DC. fl. fr. 5. p. 43. — Buxb. cent. 5. t. 7. f. 2. — Pileus junior pezizoideus dein horizontalis 6-12 lin. latus lobatus; plicæ tumidae. Var. stipitatus et sessilis.
11. *C? ALVEOLARIS* (Fries l. c.) coriaceus horizontalis sordidè albidus, pileo suborbiculari tenui, plicis alveolatim anastomosantibus, stipite crasso brevissimo lateralí. — Ad palos in vinetis Occitaniae superioris det. cel. DC. — Mer. alveolaris DC. fl. fr. 5. p. 43. — Siccus 1-2-unc. An ut jam observ. cl. Fries et Pers., hujus generis?
- II. *Gomphus* (Pers. comm. clav. p. 28; myc. eur. 2. p. 9.). *Stipes perpendicularis cum pileo clavæformi vix marginato confusus latere tenuissime venosus. — S. terrestris.*
12. *C. CLAVATUS* (Fries syst. myc. 1. p. 322.) simplex aut subramosus carneo-purpurascens turbinatus truncatus. — Ad terram in sylvis circa Beauvais ex cl. Graves, ang.-oct. — Gomphus truncatus Pers. l. c. Clavaria truncata Schmid. t. 60. Cl. elvelloides Jacq. coll. 2. t. 12. f. 5. Elvella carnea et purpurascens Schæff. t. 164. et 276. — Solitarius vel cespitosus 2 unc. altus; discus demum depresso obtuso demum repando; plicæ tenues.

III. Craterellus. — *Mesopus* Fries syst. myc. 1. p. 317. *Cantharellus* Pers. syn. et myc. *Stipes centralis in pileum expansum distincte marginatum infundibuliformem vel demum depresso diffusus; plicæ decurrentes.*

13. *C. KUNTHII* (Chevall. fl. par. 1. p. 242. t. 7. f. 5.) *minimus*, pileo plano ruguloso nigrescente, plicis lateralibus in stipitem plane decurrentibus stipiteque conoideo subpruinoso-cæsiis. — Ad terram arenosam in sylvâ Boloniensi propè Parisios ex cl. Chevall. — Lin. 5 altus.
14. *C. undulatus* (Fries l. c.) ex pallido-rufescens, pileo coriaceo-membranaceo depresso undulato criso subtus rugoso pallido, stipite solido concolore. — In sylvaticis ad terram. — Mer. undulatus Pers. Fl. fr. 2. p. 131. *Helvella crispa* Bull. champ. t. 465. f. 1. Elv. floriformis Schæff. t. 278. Sow. t. 75. — Stipes tenuis firmus $\frac{1}{2}$ -1 unc. longus; pileus 1-2 unc. latus; hymenium glabrum spurie venosum.
15. *C. cornucopioides* (Fries l. c.) subcespitosus, pileo tubæformi pervio squamuoso umbrino-nigro, margine reflexo, infernè glauco-cinereo, rugis obsoletis. — In sylvis, aug.-nov. — *Merulius cornucopioides* Pers. syn. 491. Fl. fr. 2. p. 130. *Craterellus cornucopioides* Pers. myc. eur. 2. p. 5. *Helvella cornucopioides* Schæff. t. 165. 166. Bull. t. 150, 498. f. 3. *Peziza cornuc.* Linn. Bolt. t. 103. Sow. t. 74. — Vaill. bot. t. 13. f. 2. 3. Mich. gen. t. 82. f. 5. 6. — Magnitudine varius; stipes elasticus nigricans; pileus membranaceus subundulatus.
16. *C. HYDROLIPS* (Dub. mss.) cespitosus, pileo infundibuliformi pervio squamuoso nigrescenti-griseo plicis distantibus cinereis nitidis, stipite cavo subplicato nigrescente. — In sylvis muscosis subapricis, aut. — *C. cinereus* Fries. *Merulius hydrophilus* Fl. fr. 2. p. 130. Mer. cinereus Pers. ic. pict. t. 3. f. 3. *Helv. hydrophilus* Bull. champ. t. 465. f. 2. — Priori affinis sed plicæ manifestæ crassæ distantes.
17. *C. leucophœus* (Pers. myc.) pileo subcoriaceo glabro lato-infundibuliformi fusco-umbrino plicis subsimplicibus albis, stipite tenuiculo pileo concolore. — In sylvis propè Pontivy det. D. Cauvin ex cl. Pers.
18. *C. lutescens* (Fries l. c.) cespitosus, pileo submembranaceo infundibuliformi undulato subfloccoso fusco-lutescente, venis implexis luteocinereis, stipite cavo luteo. — In locis uidis et sphagnosis sylvaram, jul.-nov. — *Merulius lutescens* Pers. syn. Fl. fr. 2. p. 129. Fl. dan. t. 1617. *Helvella canthareloides* Bull. champ. t. 473. f. 3. Elv. tabæformis Schæff. t. 157. — Stipes sæpè compressus circiter 2-unc.; pileus 1-4 unc. latus mollis demum lobatus siccus expallens; venæ confertæ flavæ luteo-cinereæ. Odor subspirituosus.
19. *C. MELANOXEROS* (Desmaz. ined. in litt.) pileo coriaceo-membranaceo infundibuliformi subfloccoso flavo-lutescente margine undulato, subtus obscuriore, stipite solido luteo. — Ad terram in sylvis circà Lille ex cl. Desmaz., oct. — Solitaris aut subcespitosus; siccus intènse niger; stipes sæpè compressus uncialis.
20. *C. ochreatus* (Dub. mss.) subcespitosus, pileo tubæformi pervio rugoso-squamuloso rufescenti-pallido, margine reflexo undulato, rugis obsoletis, stipite brevi nigro. — Circà Versailles ex cl. Pers. — *Craterellus ochreatus* Pers. myc. eur. 2. p. 5. t. 13. f. 2. — Pileus unc. 1 latus; stipes semi-unciam altus.
21. *C. XANTHOPUS* (Dub. mss.) gregarius, pileo infundibuliformi carnosomembranaceo ruguloso subumbrino, margine reflexo crenulato adulto expallente læviusculo, plicis simplicibus rectis dein reticulatis obtusis stipiteque sublongo cavo læte flavis. — In sylvis Abietinis Jurassi det. cl. Chaillet ex cl. Pers. — Mer. xanthopus Pers. myc. eur. 2. p. 19. t. 13. f. 1. — Pileus 6-12 lin. latus primo umbrinus et fere nigrescens margine eleganter et breviter fimbriato (crenulato ex ieone) tandem sæpè expallente et lævi.

800 ACOTYL. SEU CELLULARES.

21. *C. tubæformis* (Fries syst. myc. i. p. 319.) gregarius subcespitosus, pileo submembranaceo umbilicato ruguloso-squamoso fuscescente, plicis rectis cinereo-flavis, stipite cavo luteo. — Ad terram et ligna patrida, aug.-nov. — Mer. *tubæformis* Pers. Fl. fr. 2. p. 129. M. *villosus* Pers. ic. pict. t. 6. f. 1. Helv. *tubæformis* Bull. champ. t. 461. — Vaill. bot. t. 11. f. 9-10. — Stipes deorsum subincrassatus; pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus demum undulatus humidus lutescenti-cinerens fuscescens fuligineus, siccus expallens; plicæ dichotomæ distantes.
22. *C. sinuosus* (Fries syst. myc. i. p. 319.) gregarius subcespitosus, pileo submembranaceo infundibuliformi undulato floccoso-villoso fusco-griseo, plicis implexis cinerascentibus stipite farcto pallidioribus. — In nemoribus humidis circa Parisios ex Vaillant, Compiègne ex cl. Graves. — Vaill. bot. t. 11. f. 11-13. — Stipes disformis glaber 1 unc. et ultra longus; pileus uncialis humidus fuscus siccus griseus.
23. *C. cibarius* (Fries l. c.) gregarius vitellinus, pileo carnoso glabro subrepando, plicis tumidis, stipite solido deorsum attenuato. — In sylvis, jul.-nov. — Grev. crypt. fl. t. 258. Mer. *cantharellus* Pers. Fl. fr. 2. p. 123. Agariens canthar. Linn. Schæff. t. 82. Bull. champ. t. 62. 505, f. 1. Bolt. t. 62. Sow. t. 40. — Lob. ic. p. 273. — Vaill. bot. t. 11. f. 14-15. — Firmior subcompactus inodorus; plicæ crassæ angustæ subdistantes. Edulis.
24. *C. nigripes* (Dub. mss.) pileo primò convexo demum concavo fulvo-aufantiaco, plicis subramosis, stipite elongato solido fusco-nigricante. — Ad terram circa Parisios ex Bull. — Mer. *nigripes* Pers. Fl. fr. 2. p. 129. Agariens canthareloides Bull. champ. t. 505. f. 2. — Solitarius, pileus plus minus cavus carne nivea; stipes extus fusco-nigricans aut niger intus nivens. — Hunc, sed ut videtur minus faustè, ut *C. aurantiacum* stipite putredine nigrescentem habet cl. Fries.
25. *C. aurantiacus* (Fries syst. myc. i. p. 318.) pileo carnoso subdepresso tomentoso stipiteque farcto aurantiaco-ochraceis, plicis strictis aurantiaciis. — Ad terram in sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., aut., sed probabiliter per errorem indicatus. — Mer. *aurantiacus* Pers. Nees syst. f. 233. Agar. *aurantiacus* Wulf. in Jacq. misc. 2. t. 14. f. 3. — Stipes circiter 2-uncialis; pileus 2-3-unc. margine involutus interdum glaber; plicæ confertæ basi sèpè crispæ. Venenatus.

XLV. AGARICUS Linn. gen. 1074. DC. fl. fr. 2. p. 132. — *Agaricus* et *Amanita* Pers. Ad. Brongn.

Receptaculum pileatum subtus lamellatum; lamellæ e centro vel basi radiantes simplices parallelæ immixtis plerumque brevioribus, e membranâ duplice arctè connexâ compositæ transversim planæ a pileo subdiscretæ longitudinaliter thecigeræ. — Pileus carnosus vel membranaceus determinatus, margine libero juniori inflexo; stipes nunquam reticulatus raro obliteratus.

Sect. 1. COPRINUS Pers. disp. 62. Fries syst. myc. i. p. 306.

Lamellæ liberæ inæquales tenues simplices in aqua nigra liquescentes; velum universale concretum flocculosum fugax; thecae magnæ segregatæ quaternâ sporularum serie; sporulæ nigrae. — Stipes fistulosus elongatus albidus; pileus membranaceus raro subcarnosus junior ovato-conicus mox campanulatus demum lacerus revolutus deliquescens.

1. *A. radiatus* (Bolt. t. 39. f. C.) minutissimus tenerrimus fugax, pileo cinereo-tomentoso demum planiusculo radiato-fisso glabro, disco ochraceo, lamellis distantibus, stipite filiformi. — In fimetis, maio-oct. — Fries syst. myc. i. p. 313. *A. stercorarius* Bull. t. 68. 542. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 150. — Buxb. cent. 2. t. 50. f. 3. — Mich. gen. t. 79. f. 9. — Pileus junior ovatus dein planus 1-2 lin. latus; lamellæ paucæ.

2. *A. EPHEMERUS* (Bull. t. 542. f. 1.) gregarius minor tenuis mox glaber, pileo campanulato expanso fisso-striato subcinereo, disco rufescente, lamellis distantibus, stipite nudo longo glabro. — In stercoariis, maio-oct. — Fl. fr. 2. p. 149. *A. momentaneus* Bull. t. 128. *A. crenulatus* Fl. dan. t. 832. f. 2. — Buxb. cent. 2. t. 50. f. 2. Mich. t. 75. f. 9. — Stipes 2-uncialis et ultra tenuis; pileus circiter $\frac{1}{2}$ -unc., mox involutus diffluens.
3. *A. EPHEMEROIDES* (Bull. champ. t. 582. f. 1.) pileo squamuoso conico albido margine striato, disco luteo, lamellis nigricantibus, stipite subbulboso fistuloso filum hirsutum intus recondente, annulo integro primò fixo dein mobili. — In simetis. — DC. fl. fr. 2. p. 145. — Parvus, stipes basi nunc glaber nunc hirsutus; pileus cucullato-ovatus conicus dein revolutus.
4. *A. DOMESTICUS* (Bolt. t. 26.) pileo obtuso squamuoso furfuraceo undulato-sulcato fuligineo, lamellis confertis linearibus nigricantibus, stipite subsericeo. — Ad muros, pagos, hortos, circà Beauvais ex cl. Graves, jove pluvio. — Fries syst. myc. 1. p. 311. *A. sociatus* Schum. — Valde fragilis sèpè cespitosus; stipes 2-3 unc. longus 3 lin. crassus sursùm attenuatus; pileus membranaceus campanulatus 2 unc. latus; lamellæ juniores albæ mox rubellæ dein brunneo-nigrescentes.
5. *A. NIVEUS* (Pers. syn. 400.) pileo campanulato squamuoso-farinoso stipiteque tomentoso niveis, lamellis angustis fusco-nigricantibus. — In simo equino, aug.-nov. — Fl. dan. t. 1671. — Stipes 1-3 unc. longus 2-3 lin. crassus attenuatus; pileus clavatus mox expansus demùm revolutus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus; lamellæ subdistantes. Magnitudine variat.
6. *A. CINEREUS* (Bull. champ. t. 88.) pileo conico sulcato subtomentoso cinereo, vertice calvo lœvi livido, margine demùm lacerato inflexo, lamellis linearibus punctatis subflexuosis, stipite longo subtomentoso squamuoso. — Ad simum terram et truncos in sylvis, jul.-oct. — Schäff. t. 100. Fl. dan. t. 1195. DC. fl. fr. 2. p. 147. — Mich. gen. t. 80. f. 5. — Stipes elongatus 3 circ. lin. crassus basi incrassatus candidus; pileus membranaceus demùm revolutus 1-2 unc. latus; lamellæ lin. latæ.
- f. tomentosus* (Pers.) pileo primò pyramidali, lamellis numerosis angustis pallidis margine atris, stipite brevi tenui tomentoso. — *A. tomentosus* Bolt. fang. t. 156. Bull. herb. t. 138. Fl. fr. 2. p. 147. — Mich. gen. t. 73. f. 3.
- 7? *A. FLOCCULOSUS* (DC. fl. fr. 5. p. 45.) solitarius, pileo hemisphærico flocculoso striato griseo-cinereo, disco subrufo, lamellis fusco-violaceis demùm nigris, stipite albo nudo cylindrico flexuoso. — Ad terram in horto bot. Monspessulano det. summus DC., hyeme. — Stipes 15 lin. altus 3-4 crassus fistulosus; lamellæ numerosæ liberæ.
8. *A. GOSSYPINUS* (Bull. champ. t. 425. f. 2.) cespitosus, pileo campanulato lato subplicato ochraceo, lamellis distinctis liberis ventricosis, stipite nudo villoso basi incrassato. — Ad terram, exente vere. — Fl. fr. 2. p. 149. — Junior totus velo tomentoso albicante obductus dein glaber et pallescenti-rufus; pileus 3 unc. ferè latus.
9. *A. PSEUDO-EXTINCTORIUS* (DC. fl. fr. 2. p. 148.) solitarius, pileo campanulato pallido sursùm squamuoso apice fuscescente, margine inægnali demùm lacero-inciso, lamellis primò albidis demùm nigrescentibus, stipite nudo subcylindrico longiusculo basi tumidiusculo. — In simetis, aest. — *A. extinctorius* Bull. champ. t. 437. f. 1. non Pers. Bolt. et Linn. *A. digitellus* Fl. dan. t. 1371. *A. micaceus* d. Fries. — Stipes 4 unc. et ultra longus 2 lin. crassus; pileus subplicatus unc. circiter longus.
10. *A. MICACEUS* (Bull. champ. t. 246. 565.) cespitosus, pileo membranaceo sulcato campanulato ferrugineo squamuoso-furfuraceo, lamellis nitentibus primò roseis dein cinereis tandem nigrescentibus, stipite nudo tenui aequali. — In pratis sylvis et hortis haud infrequens, maio-nov. — Fl. fr. 2. p. 148. Fl. dan. t. 1193. Grev. crypt. fl. t. 76. *A. lignorum* Schäff. t. 66. *A. ferrugineus* Pers. — Lob. belg. 306. fig. sup. sinist. — Stipes 3-unc. et ultra 2 lin.

crassus; pileus siccus uncialis et ultra. Var. ferrugineus ochraceus et pallidus; lamellæ confertæ.

11. *A. RADIANA* (Desmaz. in ann. sc. nat. t. 13. p. 214. t. 10. f. 1.) solitarius aut subcespitosus, pileo membranaceo tenui fulvo-luteo centro obscuriori et squamuloso margine striato juniori sphærico demum campaniformi et plano, lamellis numerosis liberis inæqualibus primò albescens dein griseo-violaceis demum nigris, stipite nudo lœvi albo basi filamentis albis demum fulvo-aureis cincto. — Ad muros humidos circa Lille ex cl. Desmazières. — Lycoperdon radiatum Sow. eng. fung. t. 145 (junius). — Stipes 12-16 lin. altus; pileus 12-20 lin. latus; lamellæ angustæ.
12. *A. DELIQUESCENTS* (Bull. champ. t. 437. f. 2. et t. 558. f. 1.) subcespitosus, pileo membranaceo striato fuligineo, primò hemisphærico dein campaniformi elongato, lamellis linearibus liberis primò albido-purpurascens dein nigris, stipite tenui æquali. — In pratis et hortis, aug.-oct. — Fl. fr. 2. p. 150. *A. bicolor* Fl. dan. t. 1070. *A. fuscescens* Schæff. t. 17. — Stipes 4 unc. longus 3-4 lin. crassus; pileus tenuis vix squamosus 1-2-uncialis; lamellæ margine sèpè albicantes.
13. *A. ATRAMENTARIUS* (Bull. champ. t. 164.) cespitosus, pileo subcarnoso fuscescente vertice squamoso, primò globuloso dein campaniformi elongato, lamellis ventricosis ex albo purpureo fuscis, stipite albo æquali nudo. — In locis humidis ad pagos, truncorum radices, etc., jan.-dec. — Fl. fr. 2. p. 147. *A. luridus* Bolt. t. 54. *A. simetarius* Sow. t. 188. *A. deliquescens* Fl. dan. t. 1370. *A. fugax* Schæff. t. 67. 68. — Vaill. bot. t. 12. f. 10. 11. — Stipes firmus spithameus 4 lin. crassus; pileus diù campanulatus persistens 2-unc. demum explicatus revolutus 4 unc. latus; squamulæ adpressæ fuscescentes.
14. *A. PICACEUS* (Bull. champ. t. 206.) pileo membranaceo campanulato tenuissimo albido in squamas latas demum rupto, lamellis confertis nigrescentibus, stipite longissimo bulboso nudo. — In sylvis umbrosis, hortis, etc., ad vegetabilia aggregata putrida, sept.-oct. — Fl. fr. 2. p. 146. Sow. t. 170. Fl. dan. t. 1499. — Stipes 5-unc. et ultra 3 lin. crassus; pileus tenuis circiter 2-unc.
15. *A. STERQUILINUS* (Fries syst. myc. I. p. 308.) pileo submembranaceo sulcato disco squamoso, lamellis purpurascens, stipite attenuato basi annulato. — Ad finum vaccinum circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — Mich. gen. t. 80. f. 3. — Stipes 5 unc. longus 3 lin. crassus albus; pileus ovato-conicus dein campanulatus 3 unc. altus sericeo-villosus demum profundè sulcatus fissusque.
16. *A. COMATUS* (Fl. dan. t. 834.) gregarius, pileo subcarnoso conico squamoso albo, squamis flavescentibus, lamellis congestis albis dein purpurascens, stipite longissimo subbulboso, annulo mobili. — In hortis, ruderatis, ad sepes, aug.-oct. — Fries syst. myc. I. p. 307. Grev. crypt. fl. t. 119. *A. typhoides* Bull. t. 16 et 582. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 145. *A. simetarius* Bolt. t. 44. *Hydrophorus comatus* Batt. t. 26 B. — Lob. ic. p. 272. — Magnus. Stipes 6-7 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus junior cylindricus mox expansus superficie in squamas comatas secedente 3 unc. ferè altus; lamellæ cohærentes 3 lin. latæ.

Sect. II. PRATELLUS Fries syst. myc. I. p. 11; syst. orb. veg. I.
p. 74.

Lamellæ decolorantes nebulosæ dissolubiles; velum floccosum non araneosum; sporulæ fusco-purpureæ.

I. *Coprinarius* (Fries syst. myc. I. p. 300. — Coprini et Pratellæ sp. Pers.). *Velum marginè adfixum raro annuliforme plerumque fugacissimum; stipes fistulosus a pileo discretus; pileus subcarnosus*

*aut membranaceus glaber subpersistens; lamellæ sublignescentes;
sporulæ nigricantes.*

* *Lamellis adfixis vel liberis liquecentibus; pileo membranaceo demum striato
vel fisso vix revoluto.*

17. A. DIGITALIFORMIS (Bull. champ. t. 22. et 525. f. 1.) pileo albo aut rufo-albo primò ovoideo, dein digitaliformi centro rufescente margine striis nigris notato, lamellis liberis primò albescientibus dein nigrescentibus, stipite tenui nudo stricto longiusculo. — Ad truncos mortuos præsertim Salicis, æst., aut. — Fl. fr. 2. p. 149. A. disseminatus var. Pers. Fries. A. congregatus Bull. champ. t. 94? DC. fl. fr. 2. p. 151? — Stipes cylindricus fistulosus albus 1 $\frac{1}{2}$ unc. altus; pileus 4-8 lin. latus. An ut volunt cl. Pers. et Fries subsequentis var.?
18. A. DISSEMINATUS (Pers. syn. 403.) gregarinus parvus, pileo ovato-campanulato plicato, lamellis adnexis albido-cinerascens demum nigrescentibus, stipite incervo glabro. — Ad truncos præsertim Salicis, Populi, etc., vulgaris, vere et aut. — A. tintinnabulum Batsch. el. 1. f. 3. A. minutulus Schæff. t. 308. A. striatus Sow. t. 166. — Mich. gen. t. 79. f. 5. — Junior pallidè ochraceus mox albidus demum cinerascens; stipes plerumque uneialis vix lin. crassus; pileus 3 lin. altus et latus. Mox flaccescit et dissolvitur.
19. A. PAPYRACEUS (Pers. syn. 425.) pileo hemisphærico sublævi albido, lamellis liberis distantibus purpurascenti-nigritibus, stipite nudo albo fistuloso. — Ad truncos Quercūs in sylvā Chantilly ex cl. Graves. — A. membranaceus Bolt. t. 11. — Stipes 3 unc. longus æqualis; pileus 2 unc. latus diaphanus; lamellæ primò albæ diffuentes.
20. A. HYDROPHORUS (Bull. champ. t. 558.) cespitosus, pileo primò campaniformi deinde conico, disco lævi rufescente margine lacero striato griseo sursum replicato, stipite subradicato glabro. — Ad terram in pratis sylvis et hortis. — DC. fl. fr. 2. p. 150. — Stipes fistulosus albus 3-4 unc. altus; pileus 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. latus; lamellæ numerosæ inæquales liberæ albo-purpurascentes demum nigrae.
21. A. CONOCEPHALUS (Bull. champ. t. 563.) subsolitarius, pileo conico-campanulato striato livido-pallescens, lamellis liberis fusco-nigrescentibus, stipite longo albo basi incrassato. — Ad terram, æst. — Fl. fr. 2. p. 153. — Stipes tenuis albidus subspithameus; pileus obsoletè striatus.
22. A. TITUBANS (Bull. champ. t. 425. f. 1.) nitidus fragilis, pileo tenui campanulato plicato viscoso flavo, lamellis adnexis purpurascens dein incarnato-fuscis, stipite æquali lutescente nudo basi piloso. — Ad terram in sylvis, super folia mortua, æst. — Sow. t. 128. Fl. fr. 2. p. 152. — Admodum pulcher et delicatus; stipes 2-3 unc. longus; pileus junior ovato-campantulus lævis, mox explanatus uncialis disco flavo lævigato margine pallidiori plicato, demum diffuens; lamellæ distantes 1 lin. latæ.
23. A. BOLTONII (Pers. syn. 415.) pileo convexo subumbonato viscoso flavo, lamellis adnexis pallidis, stipite attenuato glabro luteo. — Ad fumum equinum circà Parisios ex cl. Chevall., vere. — Fries syst. myc. 1. p. 303. A. flavidus Bolt. t. 149. Sow. t. 96. — Stipes 3 unc. longus fragilis; pileus 2 unc. usque latus demum diffuens; lamellæ ex albido-lutescentes dein lividae. Valde sequenti affinis.
24. A. VITELLINUS (Pers. syn. 402.) pileo campanulato viscido vitellino subfisso, lamellis adnexis argillaceis, stipite æquali squamuoso pulverulento. — Ad fumum equinum in campestribus circà Parisios ex Chevall., Beauvais ex cl. Graves, vere. — Fries syst. myc. 1. p. 303. — Stipes 2-3 unc. longus 2-3 lin. crassus æqualis; pileus 1-2 unc. latus; lamellæ distantes.
25. A. STRIATUS (Bull. t. 552. f. 2.) pileo rufo-albicante conico demum convexo tandem plano, disco lævi rufescente, striis profundis aut plicis radiantibus sulcato, lamellis rotundatis-brunneis, stipite nudo albo cylindrico tenui. — Ad terram in sylvis et pratis. — Fl. fr. 2. p. 153. A. plicatus Schæff. fung.

804 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

t. 31. Bull. t. 80 non Pers. — Stipes fistulosus 2-4 unc. longus aqualis; lamellæ liberæ inæquales. Solitarius.

* * Lamellis adnatis cinereo et nigro variegatis; pileo subcarnoso conico-campanulato vel hemisphærico senio corrugato-contracto.

26. A. ARENARIUS (DC. fl. fr. 5. p. 45.) pileo primò convexo griseo demum piano centro rugoso margine evanescente, lamellis nigris siccis persistentibus, stipite nudo albo fistuloso glabro tereti basi attenuato. — In arenosis maritimis Monspelii. — Stipes 4-5 unc. altus; pileus circiter 2-uncialis.

27. A. SUBTILIS (Fries syst. myc. 1. p. 302.) pileo submembranaceo campanulato lœvi albido, lamellis adnatis nigris margine albis, stipite glabro albo. — Ad fimum et humum in sylvis circa Parisios ex Chevall., sept. — Tenellus; stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus filiformis; pileus 3 lin. altus et latus; lamellæ latiusculæ cinereo-nigricantes.

28. A. FIMICOLA (Fries l. c.) pileo subcarnoso hemisphærico fuscescente-albaceo, lamellis adnatis latis cinereo-atris, stipite glabro apice albo-pulverulento. — In pascuis et hortis circa Parisios ex cl. Chevall., vere. — Buxb. cent. 4. t. 25. f. 4. — Stipes 2-3-unc. pileo concolor; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus siccus lutescens, rufescens vel disco fulvus; lamellæ 2-3 lin. latæ. Valde affinis sequenti.

29. A. PAPILIONACEUS (Bull. t. 58, 561. f. 2) pileo subcarnoso campanulato sicco nigrescenti-fuligineo expallente, lamellis adnatis cinereo nigroque variis margine albis, stipite longo rufescente apice striato atro-pulverulento. — Ad folia mortua in sylvaticis, maio-nov. — Fl. fr. 2. p. 152. A. carbonarius Batsch. f. 6. A. acuminatus Schæff. t. 202. — Buxb. cent. 4. t. 13. f. 2. — Stipes 3 unc. longus 1-2 lin. crassus; pileus lœvis $\frac{1}{2}$ -1 uncialis; lamellæ confertæ integerimæ.

30. A. FIMIPUTRIS (Bull. champ. t. 66.) pileo subcarnoso campanulato umido cinereo-expallente, lamellis ascendentibus adnatis cinereo-atris margine concoloribus, stipite longo fusco annulato, annulo lacerato. — Ad fimum equinum et vaccinum, etc., aug.-oct. — Fl. fr. 2. p. 151. A. clypeatus Bolt. t. 57. — Gregarius, stipes 2-4 unc. longus supernè lœvis pulverulentus; pileus siccus lividus e velo appendiculatus; lamellæ deliquescentes.

31. A. SEPARATUS (Linn. snc. n. 1220.) pileo suhearnoso campanulato dein convexo viscoso argillaceo-albido, lamellis adnatis cinereo-atris, stipite longo albido plano tenui basi subincrassato, annulo integro persistente. — Ad fimum vaccinum in pratis et sylvis, aest. — A. nitens Bull. t. 84. DC. fl. fr. 2. p. 202. A. semiovatus Sow. t. 131. Fries syst. myc. 1. p. 300. A. ciliaris Bolt. t. 53. — Stipes spithameus strictus 2 lin. ferè crassus; annulus distans albus persistens; pileus 1 unc. latus; laminae 2-3 lin. latæ.

II. *Psathyra* (Fries syst. myc. 1. p. 295. — Pratellæ sp. Pers.). *Velum marginale fugacissimum; stipes fistulosus albus; pileus submembranaceus fragilis siccus vix glaber, sed plerumque fibrillis vel atomis innatis tectus; lamellæ adfixæ rarius liberæ fuscescentes; sporulae fusco-purpureæ et fusco-nigre.*

32. A. GRACILIS (Pers. syn. 425?) pileo submembranaceo campanulato obtuso, lamellis posticè latissimis adnatis cinereo-nigricantibus, margine roseo, stipite tenui roseo. — Inter folia decidua in hortis sylvis, etc., circa Parisios ex Chevall., Compiègne ex Graves, aug.-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 299. — Gregarius valde fragilis, humidus fuscescens siccus ochraceus alutaceus et sèpè albido-roseus; stipes 3-unc. et ultra vix 1 lin. crassus basi villosus; pileus mollis tenuis uncialis; lamellæ distantes integerimæ.

33. A. PELLOSPERMUS (Bull. champ. t. 561. f. 1.) pileo flavo-pallescente aliquando marginè striato, lamellis adnatis ex violaceo nigrescentibus, stipite nudo pallido nunc glabro nunc basi hirsuto. — Ad folia mortua in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 154. A. corrigis Pers? Fries? — Cespitosus, stipes 2-3 unc. altus;

pileus primò ovoideus dein conicus demùm planus interdùm siccus. A. corrugis differt pileo campanulato-umbonato roseo.

34. A. BULLACEUS (Bull. t. 566. f. 2.) pileo submembranaceo hemisphærico obscure rufo margine striato, lamellis planis latissimis cinnamomeis, stipite nudo subbrevi lanuginoso pallescenti-albo. — In simetis. — Fl. fr. 2. p. 152. — Gregarius parvulus, stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus; pileus 8-13 lin. latus; lamellæ $\frac{1}{2}$ unc. latæ.

35. A. CORROPHILUS (Bull. t. 566. f. 3.) pileo subcarnoso lævi late umbonato rufescens-faligineo, lamellis latis ventricosis areuato-adnexis lividis, stipite nudo hirsuto cinerascente. — In simetis. — DC. fl. fr. 2. p. 152. — Stipes 2-3 unc. longus 1 lin. crassus; pileus junior ovatus dein expansus 8-14. lin. latus; lamellæ $\frac{1}{2}$ unc. latæ.

36. A. FIBRILLOSUS (Pers. syn. 424.) pileo submembranaceo hemisphærico striatulo albido, lamellis adnatis latissimis purpurascensibus margine nigris, stipite longo albido fibrilloso-squamoso. — Inter folia decidua circà Parisios ex Chevall., oct. — Fries syst. myc. 1. p. 297. — Admodum fragilis; stipes 3-4 unc. longus 2-3 lin. crassus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus humidus livescens siccus albus, sæpè fibrilloso-squamosus; lamellæ primò cinereæ.

37. A. APPENDICULATUS (Bull. champ. t. 392.) cespitosus, pileo subcarnoso lævi glabro fuscescenti-livido demùni albido, lamellis adfixis violaceis decolorantibus, stipite fibrilloso, cortinâ fimbriante. — Fl. fr. 2. p. 156. A. mutabilis Fl. dan. t. 774. A. violaceo-lamellatus DC. fl. fr. 2. p. 143. A. Candolianus Fries syst. myc. 1. p. 296. — Stipites basi subincrassati 3 unc. longi apice striati; pileus junior spadicetus mox albidus 2-4-unc.; lamellæ juniores margine albicantes.

38. A. HYDROPHILUS (Bull. champ. t. 511.) cespitosus, pileo subcarnoso glabro fusco-spadiceo expallente margine striato vel sinuoso, lamellis adnatis subliberisve numerosis confertis incarnato-fuscis, stipite glabro albo fistuloso. — Abunde in sylvis post pluvias, jul.-nov. — Fl. fr. 2. p. 201. A. concinnus Bolt. t. 15. A. stipatus Pers. Fl. dan. t. 1673. Fries. A. spadicetus et spadiceo-griseus Schæff. t. 66 et 233. — Stipes 2-3 unc. longus 2-3 lin. crassus; cortina fimbriata alba; pileus 1-3 unc. latus. Valde variat, interdùm solitarius.

- III. *Psilocybe* (Fries syst. myc. 1. p. 289; syst. orb. veg. 1. p. 75. — Coprini sp. Pers.). *Velum marginale tenue fugacissimum*; *stipes tenax subfibrillosus*; *pileus subcarnosus lœvis glaber sæpè viscidus tenax a stipite subdiscretus*; *lamellæ latiusculæ*; *substantia persistens nunquam deliquescens*.

39. A. CAMPANULATUS (Bull. herb. t. 552. f. 1.) gregarius brunneus, pileo submembranaceo campanulato lævi, lamellis confertis latissimis liberis ferrugineis, stipite longo lævi obsoletè annulato. — Ad terram in sylvis, aug.-sept. — Fl. fr. 2. p. 154. — Stipes fistulosus 4 unc. longus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus siccus lutescens.

40. A. VENTRICOSUS (Bull. t. 41 f. 1.) pileo conico demùm expanso lævi umbrino-expallente, lamellis adnexis pallidè umbrinis sinuosis subdecurrentibus, stipite basi ventricoso radicato. — Ad terram frumentosam, æst. — Fl. fr. 2. p. 160. — Sæpè gregarius; stipes 2-unc. testaceo-alutaceus, radice fusiformi; pileus subcarnosus 2 unc. latus junior ovato-conicus mox campanulatus demùm expansus subdepressus.

41. A. MONTANUS (Pers. obs. 1. p. 9; syn. p. 428.) gregarius parvus, pileo subcarnoso convexo obtuso fuscescente, lamellis adnatis planis umbrinis, margine demùm subalbicante, stipite brevi glabro. — Ad terram propè Noyon ex cl. Graves, Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 1. p. 293. — Stipes uncialis apice pallidior; pileus humidus striatulus siccus lœvis 2-4 lin. latus; lamellæ subdecurrentes.

806 ACOTYL. SBU CELLULARES. AGARICUS.

42. *A. CALLOSUS* (Fries syst. myc. I. p. 292.) pileo conico sicco margine substriato; lamellis adnatis ascendentibus atro-purpureis, stipite tenaci glabro pallido. — Ad vias et in graminosis, circa Parisios vulgaris ex cl. Chevall., aug.-nov. — *A. semiglobatus* Sow. t. 240. f. 1. 3. *A. varius* Bolt. t. 66. Pers. syn. 414. — Buxb. cent. 4. t. 15. f. 1. — Gregarius; stipes 2-3 unc. longus saepè flexuosus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. et ultra latus albus luteus lividus spadicensve.
43. *A. unus* (Pers. syn. 414.) gregarius, pileo subcarnoso convexo ruguloso, sicco testaceo-fulvo expallente, lamellis adfixis ventricosis e pallido-purpurascenibus, stipite longissimo fibrilloso ferrugineo. — In paludosis turfosis circa Beauvais ex cl. Graves, jun.-oct. — Fries syst. myc. I. p. 292. — Stipes 2-6 unc. longus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus demum explanatus subochraceus; lamellæ laxæ latissimæ juniores albidae.
- f. elongatus* (Fries) pileo submembranaceo obtuso humido striatulo livido-flavo sicco laevi flavo, lamellis pallide nebulosis, stipite tenui. — *A. elongatus* Pers. ic. piet. t. I. f. 4. — Inter Sphagna circa Beauvais ex cl. Graves.
44. *A. ERICÆUS* (Pers. syn. 413.) solitarius, pileo subcarnoso hemisphaerico laevi nitente ferrugineo-fulvo aut spadiceo, lamellis latis adnatis nigricantibus, stipite elongato nudo. — Ad terram in sylvis humidis circa Parisios ex Chevall., aut. — *A. helvolus* Schæff. t. 210. *A. nitidus* Pers. — Stipes firmus 3-4 unc. longus lutescens pallidusve; pileus humidus subviscosus uncialis et ultra; lamellæ margine albicantes. Valde varians.
45. *A. STEACORARIUS* (Fries syst. myc. I. p. 291. an Schum. sæll. 386?) pileo obtuso laevi viscido livido-flavo primò hemisphaerico dein plano, lamellis latis decurrentibus fuscis, stipite albido stricto fibrilloso. — Ad humum et finum vaccinum in paludosis sylvaticis circa Parisios ex Chevall., jul.-oct. — Stipes 2-4 unc. longus 1 lin. crassus; pileus adultus luteus subnitens demum expallens $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus; lamellæ juniores adnatæ dein decurrentes.
46. *A. MERDARIUS* (Fries I. c.) pileo convexo-plano sicco lutescente humido fusco-luteo margine striatulo, lamellis latis adnatis umbrinis, stipite brevi glabro. — Ad fineta circa Parisios ex Chevall., aut. — Buxb. cent. 4. t. 15. f. 2? — Stipes pallidus subuncialis 1 lin. crassus; pileus siccus lutescens.
- IV. *Hypoloma* (Fries syst. myc. I. p. 287.). *Velum margini pilei et stipiti adfixum (cortina) telæ instar contextum fugax; stipes subcaius firmus a pileo discretus; pileus carnosus convexus dein explanatus; lamellæ adnatæ confertæ sublimescentes.*
- 47? *A. HYBAUDUS* (Bull. t. 368 et t. 562 E. H.) pileo umbonato demum convexo fulvo carne sulphurea, lamellis angustis adnexis flavescenibus; stipite fistuloso supra crasso infrâque subnato. — Ad truncos annosos, aut., vere. — DC. fl. fr. 2. p. 200. *A. capnoides* Fries? — Solitarius vel cespitosus; lamellæ 2 lin. lateæ. Admodum varians.
48. *A. FASCICULARIS* (Bolt. fung. t. 29.) cespitosus ochraceus, pileo subcarnoso umbonato, lamellis adnatis virescentibus, cortinâ nigrescente, stipite cavo tenui flavo. — Ad truncos putridos, maio-nov. — Sow. t. 285. Nees syst. f. 193. Desmaz. exs. n. 178. *A. polverulentus* Bull. t. 178. Fl. fr. 2. p. 155. *A. lateritius* Schæff. t. 49. f. 1. — Stipes 2-3 unc. altus; pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. margine valde tenuis pallidior. Intense amarus.
49. *A. LATERITIUS* (Schæff. t. 49. f. 5. 6.) cespitosus magnus, pileo carnosus obtuso subviscoso fulvo-lateritio, margine flavescente, lamellis subvirescentibus, stipite farcto longo valido, cortinâ nigrescente. — Ad truncos putrescentes, maio-oct. — Pers. syn. 421. *A. amarus* Bull. t. 30, 262. DC. fl. fr. 2. p. 155. *A. auratus* Fl. dan. t. 890. — Stipes flavus 2-3 unc. altus, pileus 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. latus; lamellæ totæ adnatæ lateæ demum nigrescentes. Sapor amarus.
50. *A. LACRYMABUNDUS* (Bull. t. 525. f. 3.) pileo carnosus campanulato piloso-

squamoso albo-fusco, lamellis umbrinis, stipite cavo fibrilloso. — Ad truncos et terram in sylvis, aug.-nov. — Sow. t. 41. DC. fl. fr. 2. p. 146. — Cespitosus fragilis; stipes 2 unc. longus 3-4 lin. crassus albido-fuscescens; pileus junior albidus dein fuscus 2-3 unc.; lamellae albidae dein fusco-purpureæ 3 lin. latæ.

V. *Psalliota* (Fries syst. myc. 1. p. 280. — *Pratellæ* et *Lepiotæ* sp. Pers.). *Velum annuliforme subpersistens; stipes firmus subæqualis a pileo discretus; pileus plus minus carnosus e convexo vel campanulato-expansus; lamellæ latæ fuscescentes.*

51. A. *ÆRUGINOSUS* (Curt. lond. 2. t. 309.) pileo carnosus flavo glutine cæruleo secedente collinito, indè viridi, lamellis adnatis planis purpureo-fuscis, stipite cavo squamoso, annulo incompleto fugaci. — In sylvis campis et ad truncos, aug.-nov. — Sow. t. 264. Fl. dan. t. 1373. A. *cyaneus* Bull. t. 170, 530. Bolt. t. 143. Fl. fr. 2. p. 157. A. *viridulus* Schæff. t. 1. — Pileus convexus interdùm squamosus. Variat magnitudine, solitarius aut cespitosus, lamellis purpureis et fuscis, etc.
52. A. *PSEUDO-CYANEUS* (Desmaz. cat. 22.) pileo convexo albo aut albo-æruginoso viscoso, lamellis liberis albis demùm purparascentibus, stipite farcto lævi albo aut azureo basi fibrilloso, cortinâ fugacissimâ. — In sylvis circa Lille ex cl. Desmaz., aut. — Stipes 2-4 unc. altus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ unc. latus.
53. A. *ECHINATUS* (Roth. cat. 2. p. 155. t. q. f. 1.) pileo subcarnoso squamoso-echinato fuliginoso, lamellis adnatis miniatis, stipite fistuloso squamoso, annulo incompleto. — In vaporariis ad Compiègne ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 1. p. 286. — Stipes $1\frac{1}{2}$ -2 unc. longus basi incrassatus nigricans, squamis reflexis fuligineis, supra medium glaber purpureus; pileus uncialis pulvere copioso cinereo-fusco adspersus.
54. A. *SQUAMOSUS* (Pers. syn. 409.) subcespitosus, pileo carnosus umberato subviscoso luteo squamoso, squamis sparsis concentricis, lamellis adnatis latis nigricantibus, stipite farcto infra annulum villoso-squamoso. — Inter folia decidua circa Parisios vulgaris, sept.-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 284. — Stipes 3-4 unc. longus 2 lin. crassus supra annulum integrum distantein pulverulentus; pileus hemisphaericus dein planus 1-3 unc. latus; lamellæ margine albidæ.
55. A. *SEMILOBATUS* (Batsch. el. cont. f. 110.) pileo hemisphaerico-lævi viscoso flavo; lamellis adnatis latissimis nigro-nebulosis, stipite longo fistuloso glabro annulato apice nigro-punctato. — Ad finum in pratis et sylvis, maio-nov. — Sow. t. 248. Pers. A. *glutinosus* Curt. lond. 1. t. 144. A. *nitens* Bull. t. 566. f. 4. non t. 84. — Gregarinus; stipes 3 unc. circiter altus pallidus; pileus carnosus $\frac{1}{2}$ -unc. et ultrâ.
56. A. *MELANOSPERMUS* (Bull. champ. t. 540. f. 2.) pileo carnosus lævi convexo flavo, lamellis rotundato-adnexis primò flavescentibus demùm nigris, stipite cavo albido annulato deorsum incrassato. — In graminosis pinguis et arvis, sept., oct. — Fl. fr. 2. p. 157. — Mich. gen. t. 74. f. 11. — Stipes 2 unc. longus annulo albo persistente; pileus demùm repandus et subdepressus 2-unc.
57. A. *SPHALEROMORPHUS* (Bull. herb. t. 540. f. 1.) solitarius, pileo hemisphaerico-convexo albido, lamellis confertis decurrentibus lutescentibus dein nigrescentibus, stipite annulato subtuberoso solido glabro. — Ad terram, æst., aut. — Pers. syn. 266. Fl. fr. 2. p. 156. A. *præcox* var. (?) Fries syst. myc. 1. p. 288. — Stipes 3 unc. ferè longus 3 lin. crassus; pileus 2-3 unc. latus.
58. A. *PRÆCOX* (Pers. syn. 420.) pileo carnosus lævi glutaceo-lutescente, lamellis adnexis planis tenuibus pallido-fuscis dente decurrente, stipite subfarcto glabro albo, annulo fugaci. — In arvis ad Pierrefitte propè Beauvais ex cl. Graves, et probabiliter in omni Gallia, vere, æst. — A. *festivus* auct. A. *candidans* Schæff. t. 217. A. *appendiculatus* Sow. t. 324. — Stipes 2-3 unc. lon-

808 ACOTYL SEU CELLULARES. AEGRIUS.

- gus, annulus subpatulus albus fugax subindè laceratus vel nullus; pileus convexo-planus 2-unc. circiter; lamellæ emarginatæ.
59. *A. HEMATOSPERMUS* (Bull. champ. t. 595. f. 1.) gregarius tennis, pileo umbonato demùm subdepresso glabro argillaceo-flavescente, lamellis liberis ventricosis lateritio-rufis, stipite fistuloso tenui, annulo parvo erecto. — Ad terram. — Fl. fr. 2. p. 207. — Stipes æqualis 2 unc. longus 1 lin. crassus; pileus submembranaceus 2 unc. latus subsquamulosus.
60. *A. CORONILLA* (Bull. champ. t. 597. f. 1.) solitarius minor, pileo carnosò maximè convexo umbonato glabro fulvo-rufescente, lamellis liberis rotundatis demùm fuscis, stipite cavo albo, annulo rotundato erecto integro fugaci. — Fl. fr. 2. p. 202. — Stipes uncialis, annulo parvo; pileus lævis 1-1 $\frac{1}{2}$ unc.; lamellæ ventricosæ juniores albæ dein rubræ.
61. *A. CAMPESTRIS* (Linn. sp. 1641.) gregarius magnus, pileo carnosò sicco candido subsquamoso aut sericeo lævi, lamellis liberis ventricosis demùm fuscis, stipite farcto longo bulboso annulato albo. — In arvis campis et sylvis, maio-oct. — Fl. dan. t. 704. Schæff. t. 33. Sow. t. 305. Bolt. t. 45. Nees syst. f. 195. Grev. crypt. fl. t. 161. Desmaz. exs. n. 177. *A. edulis* Bull. t. 134, 514. Fl. fr. 2. p. 157. — Mich. gen. t. 75. f. 1, 3. — Lob. ic. p. 271. — Stipes rarò squamulosus varius; annulus albus nunc amplius persistens nunc incompletus fugax; pileus carnosus convexo-explanatus albùs flavescentis rufescens subumbribus; lamellæ approximatæ confertæ juniores carneæ vel rubræ dein fuscæ subnigrescentes. Odor nullus; sapor gratus. Edulis.
62. *A. GRETAEUS* (Bull. champ. t. 374.) albus, pileo sicco sublævi, lamellis liberis antice latioribus albis demùm fuscis, stipite cavo lævi sursùm attenuato, annulo ascendeunte. — In ruderatis pinguis, aug.-nov. — Fries syst. myc. I. p. 280. *A. cepæstipes* a DC. fl. fr. 2. p. 202. excl. syn. et var. β . — Vaill. bot. p. 75. — Stipes firmus 3 unc. longus 3-6 lin. crassus; pileus mox planus epidermide nunc lævi nunc in squamulas secedente, 3 unc. et ultrà latus; lamellæ demùm dissolubiles; annulus variat lacernus.
- VI. *Volvaria* (Fries syst. myc. I. p. 277. — *Amanitæ* sp. Pers.).
Velum simplex universale discretum, junius fungum totum ovatum involucrans (volva) dein stipite protruso laciniato-ruptum; pileus carnosus campanulatus dein expansus a stipite discretus; lamellæ liberæ ventricosæ latæ confertæ decolorantes nebulosæ dissolubiles.
63. *A. pusillus* (DC. fl. fr. 2. p. 211.) pileo tenui sicco hemisphærico umbonato albido, lamellis ventricosis roseis, stipite fistuloso breviusculo albido, volvâ laxâ. — In sylvis et hortis, rarò, aug. — Fries syst. myc. I. p. 279 non p. 264. nec Batsch nec Hoffm. nec Schæff. *Amanita pusilla* Pers. *A. volvaceus minor* Bull. t. 330. — Parvus subgregarius; stipes uncialis albus; volva 4-5-fida extùs sericea; pileus 4 lin. latus planiusculus pellucidus demùm deliquescentis.
64. *A. GLOIOCEPHALUS* (DC. fl. fr. 5. p. 52.) pileo albo-murino glabro viscoso convexo demùm plano umbonato, lamellis albis demùm rufis, stipite solido æquali albo-rufescente exannulato, volvâ incompletâ obliteratâ. — In pratis circâ Monspelium, oct. — Volva alba parva membranacea; stipes 4 unc. altus; pileus lævis 2 unc. latus non squamulosus.
65. *A. VOLVACEUS* (Bull. t. 262.) cespitosus, pileo campanulato conico adpressè piloso cinereo nigroque variegato, lamellis pulverulentis carneo-rubris, stipite solido subæquali glabro, volvâ laxâ. — In vaporariis inter pulverem coriarii, aest. — Sow. t. 1. DC. fl. fr. 2. p. 211. *Amanita virgata* Pers. — Volva inæqualiter divisa fuscescens; stipes 3-5 unc. longus 1 unc. crassus albus; pileus 3 unc. latus; lamellæ posticè obtusæ ferè remotæ.
66. *A. BOMBYCINUS* (Schæff. t. 98.) pileo campanulato sericeo candido, lamellis carneis, stipite solido attenuato incurvo, volvâ laxâ. — Ad truncos in sylvâ Compiègne ex cl. Graves, aest. — Fries syst. myc. I. p. 277. *Amanita incar-*

nata Pers. — Stipes 3-6 unc. longus; pileus 3-7 unc. latus e globoso-explanatus subumbonatus. Edulis.

67. A. LEIOCEPHALUS (DC. fl. fr. 5. p. 53.) totus albus, pileo levissimo sericeo sicco convexo demum plano, lamellis inaequalibus liberis confertis, stipe brevi exannulato basi crasso, volva maxima. — Circa Monspelium. — Stipes 3-4 unc. longus; pileus 7-8 unc. latus. Edulis.

Sect. III. DERMINUS Fries syst. myc. 1. p. 10; syst. orb. veg. 1. p. 73.

Lamellae decolorantes persistentes; velum floccosum non araneosum; sporulae subferrugineae.

VII. Crepidotus (Fries syst. myc. 1. p. 272.). Velum tenuissimum fibrillosum; pileus inaequalis excentricus vel lateralis; lamellae inaequales.

68. A. BYSSOIDES (Pers. ic. pict. t. 14. f. 4; syn. 482.) pileo tenui villoso griseo, lamellis adnato-decurrentibus ventricosis incarnato-fuligineis, stipite brevissimo laterali incurvo, radiculis byssoides. — Ad truncos cariosos circa Paris ex cl. Chevall., aut. — Fries syst. myc. 1. p. 276. — Junior resupinatus demum horizontalis $\frac{1}{2}$ -unc.; pileus expallens; lamellae subfalcatae latiusculae primò albido-cinereae.

69. A. DEPLUENS (Batsch. el. cont. 1. f. 122.) pileo tenui reniformi rufescente-cano, basi villoso albido, lamellis distinctis divergentibus rufescens. — Ad terram in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Nees syst. f. 179. A. epigeus Pers. syn. 484. — Aquosus fragilis uncialis usque, margine substriatus; lamellae latæ, juniores griseæ; stipes demum evanescens.

70. A. EPIBRYUS (Fries syst. myc. 1. p. 275.) pileo tenui verticali sericeo candido, lamellis confertis gilvis. — In Hypno triquetro, propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Pilus laevis 2-3 lin. latus et ultra; lamellæ tennes confertæ parallelæ. An potius prioris var.?

71. A. VARIABILIS (Pers. obs. 2. t. 5. f. 12; syn. 483.) stipite primò centrali demum obliterato et lateralí, pileo membranaceo e resupinato-reflexo sericeo tomentoso albo, lamellis tenuibus inaequalibus albido-rubiginosis. — Ad truncos putridos, cortices, terram, aut. — Fl. fr. 2. p. 135. Grev. crypt. fl. t. 235. A. pubescens Fl. dan. t. 1073. f. 2. A. sessilis Bull. t. 152, 581. f. 3. A. niveus Jacq. aust. t. 288. — Pileus 4-5 lin. altus. Valde varius.

72. A. TRANSLUCENS (DC. fl. fr. 5. p. 43.) stipite nullo aut brevissimo lateralí, pileo orbiculato pellucido albido-subrufescente, carne nullâ, lamellis liberis pallidis dein lilacinis demum rufis. — Ad annosos truncos Salicis circa Monspelium.

73. A. MOLLIS (Schæff. t. 213. f. 1. non Bull. DC.) gregarius, pileo subsessili laevi flaccido pallido glabro, lamellis aquose cinnamomeis. — Ad truncos variis, aug.-oct. — Sow. t. 98. A. canescens Batsch. el. f. 38. A. violaceus Fl. dan. t. 1073. f. 1. — Caro plus minus crassa subgelatinosa aquose pallida; pileus 1-3-unc. glaber subviscosus dein e sporulis rufo-maculatus; lamellæ confertæ lineares primò albidae vel griseæ.

74. A. OLEARIUS (DC. fl. fr. 5. p. 44.) totus aurantio-fulvus, stipite pleno lateralí aut excentrico incurvo aut rarius recto, pileo difformi carnoso laevi glabro, lamellis decurrentibus inaequalibus. — Ad radices Oleæ, Carpini, Lilacis, etc., in Occitania. — Cespitosus raro solitarius. Venenatus.

VIII. Tapinia (Fries syst. myc. 1. p. 269. — Omphaliae sp. Pers.). Velum marginale villosum fugacissimum; stipes æqualis in pileum subdiffusus; pileus plus minus carnosus, junior plano-convexus margine involuto villosus dein depresso late umbilicatus; lamellæ adnato-decurrentes.

75. A. INVOLUTUS (Batsch. el. cont. f. 61.) magnus compactus, pileo depresso subferrugineo, margine involuto tomentoso, lamellis dichotomis basi pori-

810 ACOTYL. seu CELLULARES. Agaricus.

formibus, stipite obeso pleno. — Ad terram in sylvis, aug.-nov. — Pers. syn. 448. A. contiguns Bull. t. 240, 576. f. 2. Sow. t. 98. Fl. fr. 2. p. 171. — Schäff. t. 71, 72 et 252. — Buxb. cent. 4. t. 26. — Solitarius; tactus colore mutat. Stipes 2-3 unc. longus $\frac{1}{2}$ -1 unc. crassus; pileus 3-unc. et ultra, lamellæ dilatiorum. Variat subexcentricus truncicola.

76. A. ERIOCEPHALUS (DC. fl. fr. 2. p. 174.) rufescens, pileo primùm campanulato dein convexo imprimis margine gossypino, lamellis inæqualibus subdecurrentibus, stipite sareto cylindrico attenuato rufo aut albo. — Ad lignum mortuum. — A. gnaphalocephalus Bull. herb. t. 576. f. 1. A. strigiceps β Fries syst. myc. 1. p. 271. — Stipes 1-2 unc. altus glaber aut pubescens unciam circiter latus.

77. A. UNDULATUS (Bull. t. 535. f. 2.) parvulus, pileo tenui undulato inæquali umbonato planiusculo zonato albido, lamellis confertis subargillaceis decurrentibus, stipite longiusculo subflexuoso undulato. — Ad terram. — Pers. syn. 371. Fl. fr. 2. p. 174. — Gregarius subfragilis; stipes 2 unc. longus; pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus; lamellæ lin. 1 latæ. A. hirneoli varietas luxurians ex cl. Fries.

78. A. CUPULARIS (Bull. champ. t. 554. f. 2.) pileo subcarnoso lævi-flavescente, lamellis confertis obscurioribus, stipite cavo longo albidente. — Ad terram. — Pers. syn. 454. Fl. fr. 2. p. 167. — Stipes 3 unc. ferè longus ultra lin. 1 crassus; pileus vix unciam attingens; lamellæ arcuatæ 1 $\frac{1}{2}$ lin. latæ.

IX. Galera (Fries syst. myc. 1. p. 264. — Mycenæ sp. Pers.), *Vellum floccosum fugacissimum*; *stipes fistulosus gracilis a pileo discretus*; *pileus membranaceus campanulatus humidus substriatus*, *siccus lævis expallens*; *lam. adnexæ vel adnatæ*.

79. A. HYPNORUM (Schranck bav. 2. p. 605.) tenerrimus parvus ochraceo-ferrugineus, pileo campanulato subpapillato, hamido sulcato expallente, lamellis adnatis sublatis distantibus, stipite flexili apice pruinoso. — Inter muscos, jul.-nov. — A. Hypni Batsch f. 96. A. campanulatus Schäff. t. 63. — Mich. gen. t. 80. f. 8. — Stipes uncialis et ultra tenuis pileo dilutior; pileus 3-5 lin. latus; lamellæ ascendentes.

β . *bryophilus* (Pers.) pileo obtusè umbonato expallente lamellis que ventricosis cinnamomeis, stipite longo pallido apice pruinoso. — Pileus semiuncialis et ultra.

γ . *Sphagnorum* (Pers.) pileo convexo umbonato flavo-ochraceo, lamellis planis subtriquetris stipiteque longo glabro laxe pallidis. — Stipes 2-4 unc. longus obsoletè fibrillosus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus; lamellæ demum fulvæ.

80. A. MELINOIDES (Bull. champ. t. 560. f. 1.) gregarius, ochraceo-helvolus expallens, pileo carnosò-membranaceo hemisphærico planiusculo margine striato, lamellis adfixis ventricosis stipiteque subpruinato dilatioribus. — In graminosis et muscis, ant. — DC. fl. fr. 2. p. 162. Fries syst. myc. 1. p. 266. — Stipes 2 unc. longus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus; lamellæ serrulatæ demum aquose cinnamomeæ.

81. ? A. PHYSALOIDES (Bull. herb. t. 566.) pileo campanulato dein piano ant etiam concavo glabro flavescente margine non striato, lamellis latissimis subdecurrentibus rufescens, stipite cavo æquali Inteò vel flavo. — Ad terram. — DC. fl. fr. 2. p. 163. — Solitarius?; stipes 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. longus; pileus 8-12 lin. latus.

82. A. TENER (Schäff. t. 70.) pileo campaniformi obtuso humido striato sieco lævi ochraceo, lamellis adnatis linearibus, stipite longo glabro stricto. — In graminosis, ad vias, maio-nov. — Sow. t. 33. A. foraminulosus Bull. t. 535. f. 1. 403. f. B. C. — Buxb. cent. 4. t. 34. — Humidus totus unicolor pallide ferrugineus, stipes 3-4 unc. longus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. circiter altus; lam. 1 lin. latæ. In aquosis totus aquose ochraceus. Variat pileo stipiteque pilosis.

X. *Naucoria* (Fries syst. myc. I. p. 260.). *Velum cum epidermide pilei squamulosâ homogenum fugacissimum; stipes squamulosus; pileus carnosò-membranaceus e campanulato-planiusculus squamulis vel fibrillis innatis adpressis raro secedentibus tectis; lamellæ cinnamomeæ.*

83. *A. RYGMÆUS* (Bull. champ. t. 525. f. 2.) pileo subcarnoso primùm convexo dein plano glabro rufo, margine striato, lamellis liberis ventricosis ferrugineis, stipite tenui fistuloso albo basi pilis hirsuto. — Ad lignum mortuum. — Fl. fr. 2. p. 166. — Gregarius; stipes uncialis æqualis; pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus.
84. *A. SEMIORBICULARIS* (Bull. t. 422. f. 1.) pileo hemisphærico lævi nitido flavescente, lamellis numerosis latis liberis primò albo-griseis demum cinnamomeis, stipite rufo firmo nudo. — In graminosis ad vias. — DC. fl. fr. 2. p. 155. *A. arvalis* Fries syst. myc. I. p. 263? — Stipes $1\frac{1}{2}$ -2 unc. longus cortice separabili instructus; pileus 8-10 lin. latus; lam. numerosæ inæquales nunquam maculatæ.
85. *A. FURFURACEUS* (Pers. syn. 454.) rufescens, pileo hemisphærico regulari subcarnoso demum convexo vel plano siccuso squamoso, lamellis subdecurrentibus cinnamomeis, stipite basi incrassato squamoso squamulis erectis acuminatis. — Ad ramulos, folia dejecta, terram, aug.-oct. — *A. squarrosum* Bull. t. 538. f. 3. Fl. fr. 2. p. 173. *A. furfuraceus* & Fries. — *Velum squamulosum* totius fungi in pileo secedens et præcipue circâ marginem perspicuum albidum; stipes 1-2 unc. longus subspadiceus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus. Gregarius.
- & *viridarius*, pileo squamoso sericeo humido cinnamomeo sicco canescens-alutaceo, stipite furfuraceo. — *A. furfuraceus* Fries syst. myc. I. p. 262. non Bull. DC. *A. viridarius* With.

86. *A. CONSPERSUS* (Pers. ic. pict. t. 12. f. 3; syn. 318.) pileo subcarnoso hemisphærico deinde planiusculo rufescente squamulis farinaceis obtecto, lamellis adnexis emarginatis linearibus cinnamomeis, stipite apice furfuraceo-squamoso. — In sylvis humidis inter Sphagna, circâ Parisios ex cl. Chevall., jun.-oct. — Fries syst. myc. I. p. 260. — Gregarius; stipes 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 1 lin. crassus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus; lamellæ vix 1 lin. latæ subconfertæ.

XI. *Flammula* (Fries syst. myc. I. p. 250; syst. orb. veg. I. p. 73. — *Cortinariæ et Gymnopi* sp. Pers.). *Velum marginale fibrillum fugacissimum; stipes fibrillosus firmus in pileum leviter diffusus; pileus carnosus convexo-expansus lævis glaber; caro firma; lamellæ non emarginatæ.*

* *Cespitosi lignatiles, pileo sicco, lamellis adnatis.*

87. *A. PICREUS* (Pers. ic. pict. t. 4. f. 7.) cespitosus, pileo subcarnoso lævi cinnamomeo, lamellis tenuibus luteis, stipite nudo glabro fistuloso umbrino. — Ad Vitis fulcramenta in Helvetiâ finitimâ detexit cl. Alph. DC., probabiliter in Jurasso ad truncos Pineos reperiendus. — Fries obs. I. p. 28; syst. myc. I. p. 239. — Magnitudine mediocris; stipites tenues subpruinosi; pileus variat rufus badius fulvo-cinnamomeus.
88. *A. FLAVIDUS* (Schæff. t. 35.) cespitosus, pileo nimbato glabro lævi flavidus, lamellis adnatis e luteo-ferrugineis, stipite fibrilloso-squamoso subtenui cylindrico. — Ad truncos putrescentes, aug.-nov. — Pers. syn. 295. *A. lignatilis* Bull. t. 554. f. 1. Fl. fr. 2. p. 176. — Magnitudine admodum varians. Stipes basi ferrugineus; pileus 1-2 unc. et ultra; cortina telosa subinde annulata.
89. *A. ILICINUS* (DC. fl. fr. 5. p. 48.) pileo sicco convexo demum piano lævi rufo-fulvo, lamellis adnatis inæqualibus albido-rufis, stipite rufulo basi longe attenuato. — Ad truncos Quercùs Ilicis circâ Monspelium, aut. — Stipes solidus aut cavus; pileus edulis.
90. *A. SOCIALIS* (DC. fl. fr. 5. p. 48.) cespitosus, pileo fulvo planiusculo centro squamuoso, marginibus subrevolutis, lamellis rufis inæqualibus decurrens.

819 ACOTYL. SEU CELLULARES. *xericus.*

tibus, stipite tereti tortili rufo basi nigricante. — Ad truncos Ilicis circa Monspelium. — Pileus edulis.

* * *Subcespitosi, lignatiles et terrestres, pileo viscoso, lamellis adnatis.*

91. *A. CARBONARIUS* (Fries obs. 2. p. 33; syst. myc. 1. p. 252.) gregarius, pileo lœvi viscoso fulvo, lamellis adnatis argillaceo-fuscescens, stipite rigido squamoso. — Ad terram in carbonariis circa Parisios ex cl. Chevall., maius nov. — Parvus; stipes uncialis et ultra 1 lin. crassus pallidus; pileus planus nunc umboatus nunc depresso uncialis; caro lutea.

92. *A. LUBRICUS* (Pers. syn. 307.) pileo carnoso viscoso fulvo, lamellis confertis adnatis argillaceis, stipite solido longinculo fibrilloso albido. — Ad terram circa bases truncorum in sylva Chantilly ex cl. Graves, aug.-oct. — Major; stipes 2-4 unc. longus 3-5 lin. crassus siccus; pileus obtusus 2-4-unc. cinnamomeus; caro alba; lamellæ subdecurrentes.

93. *A. LENTUS* (Pers. syn. 287.) gregarius subcespitosus albidus, pileo carnoso piano lœvi viscoso, lamellis confertis, stipite solido fibroso-squamoso. — Ad terram et ramulos mortuos circa Parisios ex cl. Chevall., sept.-nov. — Fries l. c. — Stipes 2-3-uncialis; pileus obtusus 2-3-uncialis.

* * * *Gregarii terrestres, pileo sicco, lamellis subliberis.*

94. *A. CONVERENS* (Pers. syn. 306.) cespitosus, pileo subcarnoso molli umboato rugoso cinnamomeo, lamellis distinctis subadnexis aquose cinnamomeis, stipite cavo nitente badio. — Inter folia ad truncos et terram in sylva Belloy propè Beauvais ex cl. Graves, aug.-oct. — Alb. et Schw. p. 163. — Stipites basi membranâ communis cincti subfasciculati cornei 4 unc. ferè longi eleganter castanei; pileus 1-1 1/2 unc. latus.

95. *A. XANTHOPODRUS* (DC. fl. fr. 5. p. 49.) cespitosus, pileo convexo pallide fulvo glabro margine subrevoluto, lamellis liberis flavo-griseis angustis ad stipitem angustatis, cortinâ albido-flavâ, stipite tereti citrino angustè fistuloso. — In sylvis Ilicinis circa Monspelium, oct. — *A. hilaris* Fries syst. myc. 1. p. 254? — Stipes 1 1/2-2 unc. longus 3 lin. crassus; cortina ad pilei marginem persistens; caro firma lutea.

XII. *Hebeloma* (Fries syst. myc. 1. p. 249.). *Velum marginale flocculosum siccum fugax; stipes firmus fibroso-squamulosus; pileus carnosus convexus dein planus humidus viscosus; lamellæ emarginatæ confertæ.*

96. *A. CRUSTULINIFORMIS* (Bull. t. 308, 546.) cespitosus, pileo carnoso subepando opaco lateritio-rufo aut pallido, lamellis aquose cinnamomeis, stipite crasso fibrilloso-squamuloso albo. — In sylvis et pratis frequens, jul.-nov. — Fl. fr. 2. p. 191. *A. fastibilis* Pers. Fries, *A. gilvus* Schæff. t. 221. — Batsch. f. 195, 198, 199. — Stipes 1 1/2-3 unc. longus; pileus firmus humidus viscosus, colore admodum varius albus ochraceus rufus spadicens, etc.; lamellæ pallidæ, subincarnatae terreæ, etc. Venenatus; odor nauseosus.

XIII. *Pholiota* (Fries syst. myc. 1. p. 240. — *Lepiotæ et Gymnopi* sp. Pers.). *Velum siccum annuliforme nunc membranaceum nunc floccoso-radiatum; stipes subsquamosus; pileus convexus demum planiusculus non umbilicatus; lamellæ exsuccæ.*

97. *A. BLATTARIUS* (Fries syst. myc. 1. p. 246.) parvus, pileo subcarnoso glabro ferrugineo-expallente, lamellis liberis aquose cinnamomeis, stipite fistuloso lœvi, annulo reflexo. — In cultis et graminosis ad Abbecourt propè Beauvais ex cl. Graves, aest. — *Solitarius vel gregarius*; stipes 2 unc. longus 1 lin. crassus sericeus albus; pileus margine striato 1/2-1 unc. latus.

98. *A. MUTABILIS* (Schæff. t. 9.) pileo subcarnoso glabro convexo dein piano cinnamomeo-expallente, lamellis subdecurrentibus confertis latis pallide fer-

ruginosus, stipite tenui pleno dein fistuloso. — Ad terram et truncos, mai-
nov. — Fries syst. myc. I. p. 245. — Stipites tenaces longitudine varii in-
fernè umbrini superne pallidi; annulus distinctus fugax; pileus subumbonatus
lævis rarissime squamosus; lamellæ confertæ. Edulis.

a. caudicinus (Fries) cespitosus, stipite squamoso. — *A. caudicinus* Pers.

A. xylophilus Bull. t. 530. f. 2. Fl. fr. 2. p. 197. non Pers.

f. denudatus (Fries) subcespitosus, ochraceo-ferrugineus, stipite fibrilloso
lævi. — *A. acutus* Schum.

99. *A. MURICATUS* (Fries syst. myc. I. p. 244.) pileo subcarnoso campanulato-
convexo dein plano etiam depresso obtuso fulvo-luteo squamulis stipatis vil-
loso, lamellis adnatis primò flavis, stipite fistuloso sordidè luteo. — Ad trun-
cos varios circa Parisios frequens ex Chevall., jul.-oct. — *A. latens* Bolt.
t. 50. — Solitarius vel cespitosus; stipes 1-2 unc. longus 1-2 lin. crassus ve-
latus cortinatus aut annulus distinctus; pileus 1-2 unc. latus; lamellæ latæ
serrulatæ.

100. *A. CORTINELLUS* (DC. fl. fr. 5. p. 50.) pileo ovoideo demum convexo helvolo
seu griseo, lamellis ex albido-rufescens dein rufo-lilacinis demum vinosis,
cortinâ araneosâ, stipite albo tereti fistuloso basi molliter villosu. — Monspeli-
i, ad pedes aut truncos Salicum. — Cortina pileum demum fimbrians.
Edulis.

f. cortinatus, stipite basi glabro, pileo convexo, lamellis rufescens. —
Ad terrain in sylvulis Ilicinis circa Monspelium. — *A. cortinatus* DC. fl.
fr. 5. p. 51.

101. *A. CYLINDRACEUS* (DC. fl. fr. 5. p. 51.) cespitosus, pileo convexo-hemi-
sphærico fusco, lamellis albis angustis vix adnexis, stipite tereti albo apice
subfistuloso subsquamuloso, annulo albo. — Ad truncos annosos Salicium
circa Monspelium. — Stipes sœpè incurvus 12-15 lin. longus 2-4 lin. crassus;
annulus erectus. Edulis.

102. *A. ATTENUATUS* (DC. fl. fr. 5. p. 51.) solitarius, pileo convexo carnoso
sicco squalide rufescente sœpè excentrico, lamellis fusco-squalidis hinc de-
currentibus, stipite ab apice ad basin attenuato subtorto albido pleno, annulo
reflexo fusco. — Ad radices Salicum Monspelii, oct. — Stipes 2-4 unc. altus,
basi 2 apice 6-9 lin. crassus; caro alba. Edulis. — Hos 3 posteriores varia-
temque cortinatam unius speciei meras formas esse suspicatur cl. Fries.

103. *A. SQUARROSUS* (Fl. dan. t. 491.) cespitosus, pileo carnoso secco croceo-
ferrugineo, squamis confertis revolutis, margine subciliato, lamellis olivaceo-
pallidis dein ferrugineis, stipite squarroso deorsum attenuato. — Ad radices
truncorum in sylvis, aut. — Pers. syn. 268. Fries. Desmaz. er. exs. n. 320.
A. squamosus Bull. t. 266. Fl. fr. 2. p. 201. *A. floccosus* Schæff. t. 6r. Curt.
lond. I. t. 264. Grev. crypt. fl. t. 2. — Magnitudine varius. Stipes velo integro
vel floccoso-radiato; pileus obtuse umbonatus; caro flava; lamellæ dente
deurrentes.

104. *A. AURIVELLUS* (Batsch. el. cont. I. f. 115.) compactus, pileo hemisphæ-
rico dein explanato luteo, squamis sparsis adpressis, lamellis adnexis rotun-
datis latissimis olivaceo-pallidis, stipite solidi fibrilloso radicato. — Ad
truncos in sylva St.-Quentin propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Fries syst.
myc. I. p. 242. *A. filamentosus* Schæff. t. 209. — Pierumque solitarius;
stipes durus incurvus albidus; velum annulatum vel floccoso-radiatum;
pileus 2-3-unc. dein 4-unc et ultrà; lamellæ demum ferrugineæ.

105. *A. RADICOSUS* (Bull. champ. t. 160.) submagnus compactus durus, pileo
plano-convexo obtuse umbonato glabro pallido maculis sordidè rufis dein
variegato, lamellis congestis rotundatis rufescens, stipite solidi concen-
trice squamoso basi incrassato radicato. — Ad truncos in sylvis umbrosis,
aut. — Fl. fr. 2. p. 204. Fries syst. myc. I. p. 242. — Gregarius; stipes 3-4
unc. longus ½ unc. crassus albus infra annulum distantem erectiusculum
squamis erectis floccosis vestitus; pilens 3-5-unc.; lamellæ subliberæ 3 lin.
ferè latæ.

814 ACOTYL. seu CELLULARES. ACANTHUS.

106. A. *roccularia* (Bull. champ. t. 595. f. 2.) pileo carnoso glabro subargillaceo seu dilatè ferrugineo, lamellis rotundatis subventricosis demum liberis, stipite longiusculo cavo glabro, annulo reflexo. — Ad terram, aest. — Pers. syn. 262. Fl. fr. 2. p. 206. — Stipes 3 unc. longus, 3 lin. crassus pallidus, annulo albo; pileus mox planus 3-unc. caro tenuis mollis alba.

107. A. *ruficulus* (Bull. herb. t. 597. f. 2.) solitarius, pileo albo aut fusco carnoso rotundato globuloso dein convexo-plano, lamellis arcuatis liberis concoloribus, stipite flavo-maculato, annulo lato sèpè striato. — Ad terram in sylvis, aest., aut. — Fl. fr. 2. p. 205. A. *caperatus* Fries? — Stipes firmus 1 $\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ unc. longus; annulus integer patulus vel reflexus; pileus 2-4 unc. latus.

108. A. *auratus* (Mattusch. sil. p. 331.) aureo-fuscus, pileo carnoso globuloso dein convexo, squamis rarioribus pilosis nigris variegato, lamellis adnexis angustis candidis, stipite farcto glabro, annulo parvo. — In sylvis umbrosis, aest. — Bull. t. 92. Sow. t. 77. — Magnus subcespitosus; stipes 4-6 unc. longus sèpè ascendens; pileus 2-4 unc. latus carne sulphurea amaricante, annulus patulus striatus; lamellæ ex Fries olivaceo-pallidæ dein ferragineæ.

XIV. *Inocybe* (Fries syst. myc. i. p. 254; syst. orb. veg. i. p. 73.

— Cortinariae et Gymnopi sp. Pers.). *Velut e fibrillis pilei longitudinaliter innatis ortum fugacissimum; stipes firmus squamulis vel fibrillis vestitus; a pileo discretus; pileus plus minus carnosus e campanulato-converxus dein expansus subumbonatus, siccus firmus totus e fibrillis longitudinalibus innatis sericeus vel squamosus; caro alba; lamellæ decolorantes; sporulæ ochraceo-ferrugineæ.*

* *Stipite fibroso vel fibrilloso-squamoso.*

109. A. *REPANDUS* (Bull. t. 423. f. 2.) pileo subcarnoso obtusè umbonato lèvi pallescenti-lateritio margine infracto flexuoso, lamellis liberis latis pallidis rotundatis, stipite longo solido albido apice fibroso-squamoso. — Ad terram in sylvis, vere, aest. — Fl. fr. 2. p. 192. Fries syst. myc. i. p. 255. — Solitarius; stipes 2-unc. et ultrà 3 lin. crassus striatus; pileus sericens sordidus 3 unc. latus; lamellæ 2-3 lin. latè pallidæ. Odor nauseosus.

110. A. *PYRIFORMIS* (Pers. syn. 300.) pileo carnoso umbonato pulverulentolutescente fibrilloso subsquamoso, margine subsinnato, lamellis adnexis primò albidis dein flavicantibus, stipite fibroso candido. — Ad terram, aest. — A. *furfuraceus* Bull. t. 532. f. 1. Fl. fr. 2. p. 190. non Pers. Fries. — Stipes 2 unc. longus 4 lin. crassus; pileus primò hemisphæricus dein campanulatus demum plano-umbonatus.

111. A. *LANUGINOSUS* (Bull. t. 370.) pileo subcarnoso convexo brunneo tomento lanato-squamoso concolore sensim rarescente tecto, lamellis liberis badiis, stipite pleno brunneo striato. — Ad caudices et terram in sylvis, vere, aut. — Fl. fr. 2. p. 199. — Vaill. bot. t. 13. f. 4.-6. — Solitarius geminatusve; stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus.

** *Stipite apice squamulis albis farinaceo.*

112. A. *RIMOSUS* (Bull. t. 388, 599.) pileo subcarnoso campanulato demum planiusculo, expanso longitudinaliter rimoso fusco-lutescente, lamellis adnexis latiusculis olivaceo-argillaceis margine albidis, stipite solido pallescente apice albo-farinaceo basi subtuberoso. — Ad terram in sylvis, vere, aest. — Sow. t. 323. Fl. fr. 2. p. 192. Grev. crypt. fl. t. 128. A. *aurivenus* Batsch. el. t. 20. f. 107. — Stipes 1-2 unc. longus 2 lin. circiter crassus; pileus 1-2 unc. latus. Var. lèvis et squamosus, lutescens rufescens et spadiceus. Occurrit etiam major.

113. A. *GROPHUS* (Bull. t. 522. f. 2.) pileo subcarnoso conico dein expanso umbonato sericeo albo lutescente vel lilacino, margine sinuoso interdum lacero, lamellis adnexis latiusculis argillaceo-fuscescentibus, stipite farcto tenui albo-pulverulento. — Ad terram in sylvis, jul.-oct. — Fl. fr. 2.

p. 194. *A. auricomus* Batsch. el. f. 21. — *A. inodorus* Bull. t. 524. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 193. *A. argillaceus* Pers. — *A. affinis* Pers. ic. pict. t. 1. f. 1. *A. geophilus* Sow. t. 124. *A. ileopodius* Bull. t. 158. f. L. — *Solitarius* vel *gregarius*; stipes 2 unc. longus 1-2 lin. crassus subæqualis; pileus $\frac{1}{2}$ -unc. et ultrà demùm rimosus. Variat pileo albo (*A. inodorus*, etc.), lilacino (*A. affinis*, etc.), lutescente (*A. geophilus* Bull. DC., etc.).

114. *A. RUFIPES* (Pers. ic. pict. t. 1. f. 5.) pileo subcarnoso convexo rufo-fuscescente cano-sericeo, lamellis liberis confertis ciliatis flavis, stipite farcto rufo pulveralento. — Ad terram in sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-oct. — *A. petiginosus* Fries syst. myc. I. p. 259. — Gregarius; stipes deorsum subattenuatus albido-villosus 1-2 unc. latus 1 lin. crassus; pileus 4-8 lin. latus demùm rimosus; lamellæ juniores subadnexæ pallidæ demùm spadiceæ.

Sect. IV. *CORTINARIUS* Fries syst. myc. I. p. 10; syst. orb. veg. I. p. 69.

Velum araneosum; lamellæ decolorantes arescentes; sporulæ ochraceæ. (1)

XV. *Dermocybe* (Fries syst. myc. I. p. 217. excl. sect. tertia, — *Cortinariæ et Gymnopi* sp. Pers.). *Velum siccum araneosum fugacissimum*; stipes subæqualis fibrillosus firmus; pileus plus minus carnosus imò submembranaceus e convexo vel conico expansus fibrillis vestitus; lamellæ inæquales latiusculæ subconfertæ.

1. *Lysiophylli* (Fries l. c. p. 237.). Stipes subcavus; pileus subcarnosus obtusus viscosus vel villosus; lamellæ liberae ventricosæ confertæ. Odor nullus.

115. *A. EPHEBEUS* (Fries obs. 2. p. 187; syst. myc. I. p. 238.) pileo viloso purpureo-violaceo, lamellis rotundatis ochraceis, stipite cylindrico farcto candido. — Ad ramos patrescentes delapsos, aut. — *A. villosus* Bull. champ. t. 214. DC. fl. fr. 2. p. 189. non Scop. nec Bolt. — Stipes 2 unc. longus 2-3 lin. crassus incurvus; pileus campanulatus expansus 1-2 unc. latus.

116. *A. CROCEO-CÆRULEUS* (Pers. ic. pict. t. 1. f. 2; syn. 341.) subparvus, pileo laevi dilutè violaceo, lamellis convexis emarginatis incarnato-croceis seu ochraceis, stipite glabro albo. — In sylvis umbrosis circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. I. p. 238. — Stipes 2 unc. longus 2-3 lin. crassus; pileus convexo-planus subviscosus.

2. *Leucopodii* (Fries syst. myc. I. p. 233.). *Velum sericeum album*; stipes albus raro violascens; pileus glaber sed fibrillis superficialibus secedentibus passim obductus.

117. *A. LEUCOPODIUS* (Bull. t. 533. f. 2.) pileo tenui subcarnoso demùm acute umberato subrepando helvolo, sicco alutaceo, lamellis subliberis latiusculis cinnamomeis, stipite cavo æquali nitido albo. — In sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 193. *A. leucopus* Pers. DC. — *Solitarius*; stipes uncialis et ultrà; pileus conicus dein expansus subuncialis.

118. *A. CASTANEUS* (Bull. herb. t. 268 et 537. f. 2.) gregarius subparvus, pileo subcarnoso convexo dein obtuse umberato castaneo, lamellis adnexis confertis e violascenti-testaceis, stipite brevi firmo fibrilloso albido. — In Fagetis, Quercetis, etc., aut. — Fl. fr. 2. p. 199. *A. leucopesns* Holmsk ot. 2. t. 37. — Gregarius; stipes rigidus 1-2 unc. longus 3-4 lin. crassus albus subviolascens; pileus coloris intensitate varius. *Inodorus*. *Edulis*.

119. *A. NITIDULUS* (DC. fl. fr. 5. p. 50.) solitarius, pileo carnoso convexo dein plano rufo-fulvo nitido, lamellis liberis arcuatæ rufo-fuscis, stipite tereti piano ex albido fuscescente. — Ad terram in sylvis Ilicinis circa Monspe-

(1) In hac sectione quum in charactere specifico coloris sit mentio, fungus in statu juniori consideratur.

816 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

1 mm. — Stipes 1-3 unc. altus 4 lin. crassus; caro alba. An a seq. diversus?

120. A. LAMPROCEPHALUS (Bull. t. 544. f. 2.) ferruginens, pileo carnoso obtuse umberato nitente, lamellis latiusculis decurrentibus obscurioribus, stipite farcto subincurvo. — Ad terram, vere et aut. — Fl. fr. 2. p. 199. A. lucidus Pers. Fries. — Cespitosus; stipes 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus 3-4 lin. crassus; pileus 2-3 unc. latus.

121. A. ARMENIACUS (Schäff. t. 81.) pileo subcarnoso dein obtuse cinnamomeo fulvo-cinnamomeo expallente, lamellis distinctis confertis cinnamomeis, stipite farcto sursùm attenuato albo. — In sylvis, locis graminosis, viis, jul.-nov. — Pers. syn. 299. A. helveolus Bull. t. 531. Fl. fr. 2. p. 203. non Sw. nec Pers. nec Schäff. — Gregarius multiformis; stipes fibrillosus 2-3 unc. longus apice subinde violascens; pileus 2-4 unc. latus; lamellæ 2-3 lin. latæ. Subolidus.

3. Raphanoidei (Fries l. c. p. 228.). Vellum sericeum album; stipes pileo canicolor vel dilutior; pileus squamulis vel fibrillis innatis obductus. Odor et sapor plerumque Raphani.

122? A. SIDEROIDES (Bull. t. 588.) pileo subexsucce rufo primò convexo demum plano glabro, lamellis adnatis rufo-rubentibus basi subangustatis, stipite laevi glabro tereti albido-rufo. — Ad margines viarum super terram; in lignis quoque occurrens? — Fl. fr. 5. p. 46. A. acutus Pers. syn. 316? — Stipes uncialis; pileus 1 unc. latus.

123. A. URENS (Bull. t. 528. f. 1.) gregarius, pileo hemisphærico subcarnoso obtuso glabriusculo, lamellis angustis adnexis cinnamomeis, stipite longissimo solido pallido basi villoso striis rufescensibus maculato. — Ad folia mortua. — Pers. syn. 333. DC. fl. fr. 2. p. 185. — Stipes 4-5 unc. longus 2 lin. crassus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus; lamellæ confertæ 1 $\frac{1}{2}$ lin. latæ.

124. A. ILEOPODIUS (Bull. t. 572. excl. f. L. 592.) proteiformis fuscescens, pileo subcarnoso campanulato dein conico-elongato acuto demum convexo vel plano umberato, lamellis adnatis latis ex rubro-aurantiacis, stipite tenui æquali. — In Quercetis, Fagetis, etc., jul.-nov. — Fl. fr. 2. p. 196. A. dulcamarus et cervicolor Pers. syn. 324, 325. — Gregarius vel solitarius; stipes 2-4 unc. longus 1-2 lin. crassus basi præcipue fibrilloso-squamosus, siccus pallidus raro fuscus lilacinus, etc.; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus sericeus var. fuscescens cervinus, etc. Otidus.

125. A. CUCUMIS (Pers. obs. 1. p. 45; syn. 316.) pileo subcarnoso dein umberato glabriusculo purpureo-fusco, lamellis adfixis ventricosis ferrugineo-croceis, stipite subtenui fusco. — In sylvis circà Beauvais ex cl. Graves, aug.-oct. — A. nigripes Sow. t. 344. — Stipes 2-3 unc. longus 1-2 lin. crassus; pileus nuncialis et ultrà. Var. major.

126. A. CINNAMOMIUS (Linn. sicc. 1205.) pileo subcarnoso primò convexo demum obtuse umberato sericeo subcinnamomeo, lamellis adfixis confertis, stipite tenui æquali lutescente. — In sylvis, locis paludosis, etc., jun.-dec. — Fries syst. myc. 2. p. 229. Bolt. t. 150. Sow. t. 205. A. croceus Schäff. t. 3. non Bull. DC. nec Bolt. A. squamulosus Batsch. f. 117. A. ileopodius Bull. t. 586. fig. inf. — Mich. gen. t. 75. f. 4. — Vaill. t. 12. f. 12-14. — Stipes 3 unc. longus 2-3 lin. crassus fibrillosus; pileus obsoletè squamosus 1-3 unc. latus cinnamomeus lateus olivascens; lamellæ latæ nitidæ sanguineæ, cinnamomeæ, flavæ.

127. A. RAPHANOIDES (Pers. syn. 324.) sublivaceus, pileo subcarnoso obtuse umberato sericeo, lamellis adfixis angustis minus confertis, stipite farcto basi incrassato. — In sylvâ Carlepont propè Noyon ex cl. Graves, jul.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 230. — Mich. gen. t. 75. f. 2. — Stipes 3 unc. longus 4 lin. crassus subascendens fibrillosus basi villosus; pileus 2 unc. latus. Præcedenti affinis.

128. A. RUFPUERUS (Bull. herb. t. 593. f. 1.) gregarius coccineo-ruber, pileo carnoso obtuse umberato squamuloso margine subsericeo interdum subflavescente, lamellis adnatis obscurioribus, stipite brevi æquali. — Ad terram in

sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 197. — *Stipes* $\frac{1}{2}$ -2 unc. *longus* 3-4 lin. *crassus* *fimus* intus *flavescens*; *pileus* 2-unc. et ultrà; *lamellæ* 3 lin. *latae*, *detrite* *obscure* *purpureæ*.

XVI. *Inoloma* (Fries syst. myc. I. p. 216. — *Cortinariæ* sp. Pers.

— A. *araneosus* DC. fl. fr. 2. p. 198.). *Velum in fila libera araneosa solutum marginale fugax*; *stipes solidus bulbosus fibrillosus in pileum subdiffusus*; *pileus carnosus junior convexus dein explanatus fibrillosus vel viscosus*; *lamellæ emarginato-adnexæ decolorantes*.

* *Pileo semper sicco squamuloso vel sub lente fibrilloso obtuso vel umbonato nunquam depresso.*

129. A. *VIOLACEUS* (Linn. suec. 448.) *obscure violaceus*, *pileo villoso-squamoso*, *lamellis distantibus connexis*, *stipite spongioso intus violaceo-cinereo*. — In *nemoribus frondosis major*, in *pinetis minor*, aug.-oct. — Hedw. obs. t. 4. A. *araneosus violaceus* Bull. t. 250, 598. f. 2. A. DC. fl. fr. 2. p. 198. — Bocc. ious. t. 301. f. 5. — Speciosus magnus; *stipes junior subtomentosus* 4-unc.; *pileus explanatus* 3-6 unc. *latus*; *lamellæ juniores* ferè *atro-violaceæ*.

130. A. *VIOLACEO-CINEREUS* (Pers. syn. 279.) *pileo umbrino-violaceo squamulis punctiformibus cinereis ruguloso*, *lamellis distantibus purpurascenti-umbribus*, *stipite bulboso concolore*. — In *sylvis*, aug.-oct. — A. *violaceus* Schæff. t. 3. — Bocc. mus. t. 301. f. 4. — *Stipes* 2-3-unc. ferè *glaber*; *pileus* 2-3-unc. *exsiccatus subumbrinus et interdùm ferè nigrescens*; *lamellæ ad latera cinnamomeæ*.

131. A. *ARGENTATUS* (Pers. syn. 286.) *pileo convexo sericeo-nitente lilacino-argentato*, *lamellis confertis cinnamomeis*, *stipite bulboso extus intusque pileo concolori*. — In *sylvâ Ermenonville ex cl. Graves*, aut. — *Stipes* 1-2 unc. *longus* $\frac{1}{2}$ -1 unc. *crassus*; *pileus* $\frac{1}{2}$ -2 unc. *latus obtusus expallens*; *lamellæ* 3-4 lin. *latae*. *Sapor subamaricans*; *odor subfortis*.

132. A. *ALBO-VIOLACEUS* (Pers. l. c.) *pileo demùm latè et obtuse umbonato sericeo-fibroso violaceo-exalbicante*, *lamellis subconfertis dilutè violaceis demùm aquose cinnamomeis*, *stipite longo obverse clavato*. — In *sylvis*, aug.-oct. — Fries syst. myc. I. p. 218. — *Stipes* 2 unc. *longus extus intusque violaceo-albidus*; *pileus* 1-3 unc. *latus argenteo-pallens*; *lamellæ serrulatae* 2-3 lin. *latae*. *Odor nullus*.

133. A. *PSAMMOCEPHALUS* (Bull. herb. t. 586. f. 1. 531. f. 2.) *pileo crasso umbonato cervino squamis pilosis fuligineis squarroso*, *lamellis confertis violaceis ex argillaceo cinnamomeis*, *stipite transversim nigricante squamoso apice laevi*. — In *sylvis*, aug.-oct. — Fl. fr. 2. p. 196. A. *arenatus* Pers. syn. 293. A. *lepidomyces* Alb. et Schw. t. 12. f. 1. A. *pholideus* Fries. — *Stipes* 2-4 unc. *longus supra velum fuscum subannulatum violaceus*; *pileus* 1-4 unc. *latus*; *lam. 2-4 lin. latae*.

134. A. *EUMORPHUS* (Pers. syn. 342.) *pileo obtuso glabriusculo canescenti-fuligineo dein fuligineo-fulvo*, *lamellis confertis cæsio-purpurascenibus*, *stipite tenui squamuloso basi incrassato*. — In *sylvis*, aug.-oct. — A. *anomalus* α *proteus* Fries syst. myc. I. p. 220. — *Stipes* 3-5 unc. *longus*, 1-3 lin. *crassus subascendens* *albido-violaceus expallens* *dein albido-lutescens*; *pileus junior convexus* *dein planus* 1-4 unc. *latus*; *lam. serratae* *demùm argillaceo cinnamomeæ*.

β . *incurvus* (Fries) *pileo subumbonato lilacino-expallente*, *lamellis lilacinis dein ochraceis*, *stipite caudato-tomentoso*. — A. *incurvus* Pers. ic. pict. t. 7. f. 5.

γ . *tabularis* (Fries) *firmior*, *pileo lato demùm plano argillaceo-pallido alutaceo testaceo-livido*, *lamellis fugacissime cæsis mox argillaceo-cinnamomeis*, *stipite pallido*. — A. *aran. helveolus* Bull. t. 431. f. 5. Fl. fr. l. c.

δ . *diabolicus* (Fries) *pileo fibrilloso subrimoso fuscescenti dein olivaceo*,

818 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

siccо ferruginascenti, lamellis minus confertis fugacissimè cassiis. — A. aran. rimosus Bull. t. 431. f. 4?

a. *maninus* (Fries) robustus, pileo piano lateritio-rufescente, lamellis purpurascientibus, stipite bulboso pallido. — Bull. t. 544. f. 1. — Olijus.

135. A. BULLIARDI (Pers. obs. 2. p. 43; syn. 289.) pileo siccо glabriuscо rufescente, lamellis distantibus cinnamomeis, stipite firmo bulboso, bulbo ovato cinnabarino. — In sylvis, aug.-oct. — A. aran. cinnabarinus Bull. herb. t. 431. f. 3. DC. l. c. — Stipes 2-4 unc. longus, $\frac{1}{2}$ unc. crassus albidus sanguineo-maculatus; pileus convexus obtusus 2-3-unc.

** *Pileo glabro, humido viscoso, semper obtuso demum depresso.*

136. A. INFRACTUS (Pers. obs. myc. 2. p. 42; syn. 283.) pileo carnosо compacto inaequali subviscosо olivaceo-fuligineo aut umbrino, margine infractо inflexo, lamellis confertis olivaceo-umbrinis, stipite solidо bulboso pileo subconcolore aut pallescenti-ceruleo. — In umbrosis sylvæ Chantilly ex el. Graves, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 223. — Stipes 2-3 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus convexo-planus circiter 3-unc. Americans.

137. A. CALLOCHROUS (Pers. syn. 282.) pileo aequali laevi viscosо, lamellis confertis violaceo-purpureis, stipite bulboso e violaceo albido. — In sylvis et pratis circa Parisios ex Chevall., aut. — Fries syst. myc. 1. p. 224. — Stipes solidus longus; pileus planiusculus 1-3-unc., var. pallidus luteus lilacinus purpureus badius lividus; lamellæ demum cinnamomeæ. Inodorus, insipidus.

a. *subpurpurascens*, carne fracta stipiteque subtenui purpureo-violaceis.

— A. subpurpurascens Batsch. el. cont. 1. f. 74.

β. *decolorans*, carne stipiteque albidis. — A. decolorans Pers.

138. A. GLAUCOPUS (Schäff. t. 53.) compactus, pileo subolivaceo-fuligineo, juniori viscosо, demum rivaloso-inaequabili, lamellis cærulecenti-argillaceis, stipite crasso cærulecenti. — In sylvis, ericetis, etc., aug.-oct. — Sow. t. 223. A. araneosus ♂ crassipes Bull. t. 96. — Magnus insipidus plerumque gregarius; stipes 2-3 unc. longus 1 unc. circiter crassus junior sublanatus e cæruleo-albus; pileus 2-5 unc. latus margine saepius cærulecente-villoso; lam. serrulatae demum cinnamomeæ.

139. A. VARIUS (Schäff. t. 42.) firmus, pileo luteo subsquamoso humido viscosо, lamellis confertis serratis albido-caesiis, stipite attenuato albo. — In sylvis, ericetis, aug.-oct. — A. turbinatus Sow. t. 102 non Bull. A. pachypus Holmsk. 11. t. 39. — Magnitudine valde variabilis; lamellæ juniores pallidæ albæ dilutè argillaceo-cinnamomeæ.

140. A. TURBINATUS (Bull. t. 110 non Sow.) mollis, pileo viscosо laevi flavo vel fulvo, lamellis adnatis confertis integerrimis e flavescenti-cinnamomeis, stipite bulboso albo. — In Quercetis, Fagetis, etc., aut. — Fl. fr. 2. p. 196. — Bulbus saepе marginatus; stipes 3-4 uncias longus; pileus demum depresso 2-3-unc., siccus nitidus.

XVII. *Phlegmacium* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 70. — Phlegm. et Myxarium Fr. syst. myc. 1. p. 218 et 247.). *Velum viscosum tenue fugacissimum in fila arachnoidea solutum; stipes solidus subsquamatus; pileus plus minus carnosus e campanulato vel convexo-expansus subviscosus; caro succulenta; lamellæ adnatæ subdecurrentes.*

141. A. COLLINITUS (Sow. t. 9.) pileo carnosо laevi aurantio-fulvo valde glutinosо, lamellis purpurascientibus dein ferrugineis, stipite transversim in squamas cærulecentes cartilagineo-gelatinosas rupto. — In sylvaticis, jul.-nov. — Pers. syn. 281. A. mucosus Bull. t. 596. f. 1. Fl. fr. 2. p. 200. — Buxb. cent. 4. t. 9. — Stipes 4-8 unc. longus 4 lin. crassus et ultra tomento adglutinato viscosо dein in squamas adpressas rarius albidas vel ferrugineas rupto; pileus 2-4 unc. latus; lam. serrulatae subconfertæ 3-5 lin. latæ.

P. mucosus (Fries) robustior, lamellis albidis dein ferrugineis, stipite firme lœvi albo subsericeo. — Bull. t. 549. f. D. E. F.

142. *A. LONGICAUDUS* (Pers. syn. 332.) solitarius, pileo subcarnoso lœvi planisculo subviscoso subalutaceo, lamellis confertis planis cinnamomeis subliberis, stipite longo sublœvi albicante. — In sylvis circa Ermenonville, ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. I. p. 248. — Stipes 4 unc. longus 3-4 lin. crassus vix squamosus; pileus margine ferè membranaceus convexus mox planus 1/2 unc. latus viscosus.

XVIII. *Telamonia* (Fries syst. myc. I. p. 210. — Lepiotæ et Cortinariæ sp. Pers.). *Velum e fibrillis araneosis in annulum obsoletum contextum; stipes solidus firmus subæqualis fibrillosus; pileus subcarnosus margine tenuis demùm expansus siccus squamosus vel fibrillosus; caro sicca; lamellæ latæ subadnatae vel emarginatae.*

* *Pileo carnoso obtuso fibrilloso, velo stipiteque albis, lamellis emarginatis subconfertis.*

143. *A. BIVELUS* (Fries obs. 2. p. 58; syst. myc. I. p. 215.) pileo obtuso fulvo vel testaceo, lamellis emarginatis subdistantibus fulvis subuitidis, stipite brevi subbulboso, annulo fugaci. — In ericetis et sylvis, jul.-oct. — *A. araneosus* var. Bull. t. 598. f. 2. B. — Gregarius; stipes 2 unc. longus albidus; annulus albus; pileus 2-5 unc. latus fibrillis margine adflatus; lam. 2-5 lin. latæ.

* * *Pileo disco præcipue carnoso innato-fibrilloso, velo colorato zone instar stipitem saepius cingente, lamellis adnexis distantibus.*

144. *A. SUBLANATUS* (Sow. t. 224.) pileo squamuoso testaceo-olivaceo, lamellis adnatis emarginatis e lutescente cinnamomeis, stipite bulboso squamuoso, velo fusco. — In sylvis, aug.-oct. — Fries obs. 2. p. 77. *A. notatus* Pers. syn. 296. — Stipes 3 unc. longus lutescenti-pallidus interdùm apice violaceus; pileus 3 unc. latus, squamulis subfuscis vel canis interdùm sericeo-adpressis. Odor Raphani.

145. *A. AIMATOCHELIS* (Bull. herb. t. 596. f. I.) pileo squamuoso testaceo-rubro, lamellis emarginatis pallide cinnamomeis dein ferrugineis, stipite oblongo bulboso rufescente, velo contexto rubro. — In Faginetis, aut. — Fl. fr. 2. p. 198 ex cl. var. *P. A. armillatus* Fries syst. myc. I. p. 214. — Stipes 3-6 unc. longus apice 3-4 lin. crassus; pileus junior campanulatus dein explanatus 2-5 unc. latus.

146. *A. CROCEO-FULVUS* (DC. fl. fr. 5. p. 49.) pileo plano lœvi aurantio-fulvo, lamellis adnatis pallide rufis, stipite æquali basi rufo-flavo apice pallido, velo contexto aurantiaco. — Ad terram in sylvis circa Monspelium. — Stipes 3-4 unc. longus, 4 lin. crassus; pileus 4 unc. latus.

* * * *Pileo carnoso squamuoso aut fibrilloso, velo obliquo, lamellis adnatis crassis, junioribus obscuris.*

147. *A. GENTILIS* (Fries syst. myc. I. p. 211.) pileo subcarnoso umbonato subcinnamomeo albidove, lamellis distantibus adnatis cinnamomeis, stipite longo tenui cavo æquali substricto candido. — In sylvis circa Beauvais ex cl. Graves, jul.-dec. — *A. helvolus* et *spurius* Pers. syn. 273, 283. — Stipes 3 unc. et ultra longus 2-3 lin. crassus, annulo contexto obliquo distante; pileus junior conicus dein explanatus obsoletè fibrillosus 1/3 unc. latus.

148. *A. UMBRINUS* (Pers. syn. 280 nec Roehl. nec Schum.) pileo obtuso fibrilloso canescenti-testaceo, lamellis adnatis distantibus purpureis dein umbrinis, annulo stipitem apice violaceo-cortinatum vaginante. — Ad humum sylvarum, jul.-oct. — *A. araneosus* Bull. t. 600. *A. torvus* Fries. — Stipes junior brevis subbulbosus dein elongatus 3-5 unc. longus 1/4 unc. crassus violaceus, sed ad medium usque ab annulo albo infero vaginatus; pileus 3-unc. et ultra; lamellæ deinceps ambrino-cinnamomeæ.

820 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

Sect. v. HYPORHODIUS Fries syst. myc. I. p. 10; syst. orb. veg. I. p. 68.

Velutin nullum; lamellæ decolorantes; sporumæ roseæ.

XIX. Nola. — Nolanea Fries syst. myc. I. p. 204. — Pratellæ sp.

Pers. *Stipes a pileo discretus; pileus membranaceus campanulatus*
dein expansus absque squamis fibrillosis, humidus striatus subpel-
lucidus siccus expallens; lamellæ liberæ vel leviter adnexæ.

149. A. PLEOPODIUS (Bull. t. 556. f. 2.) pileo flavo-pallescidente lævi campanulato
tandem subconcavo vix carnosø, lamellis liberis arcuatæ rufis, stipite tenuiore
albido farcto stricto glabro. — In sylvis, vere-aut. — Fl. fr. 2. p. 194. —
Solitarius; stipes 1-2 unc. longus; pileus 8-12 lin. latus.

150. A. SERICRUS (Bull. t. 413. f. 2. 526 non Pers. nec Schæff.) pileo campanu-
lato expanso nigrescenti-fuligineo sicco expallente nitido piloso-squamoso,
lamellis subliberis griseis latescentibusve, stipite fistuloso tenui substricto.
— In sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 189. A. pascuus Pers. Fries. A. pyramidatus
Schæff. t. 229. A. fissus Bolt. t. 35. — Batt. t. 21. f. 1. — Stipes 1-3 unc.
longus 1-2 lin. crassus griseus subsibrillous; pileus $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ unc. latus humidus
striatus; lamellæ confertæ. Admodum varians.

XX. Leptonia (Fries syst. myc. I. p. 201; syst. orb. veg. I. p. 68.

— Gymnopi sp. Pers.). *Stipes a pileo discretus cartilagineus*
cyanescens; pileus carnosø-membranaceus convexo-planus siccus
superficie fibrillosa vel squamulosa; caro tenuissima; lamellæ
posticè subobtusæ non decurrentes.

151. A. COLUMBIUS (Bull. herb. t. 413.) cæruleo-violacens aut chalybæus,
pileo campanulato dein convexo nigro-striato, margine sinnato sericeo
striato, lamellis liberis basi arcuatæ, stipite elongato glabro subtenui ad
apicem fistuloso. — Ad terram, in sylvis. — Fl. fr. 2. p. 190 excl. syn. Pers.
A. serrulatus & columbarius Fries syst. myc. I. p. 204. — Stipes 1-2 unc.
longus; pileus interdum planiusculus semiuncinalis et ultrà.

& serrulatus, pileo umbilicato subsquamoso nigrescente dein fuliginoso,
lamellis adnatis nigro-marginatis. — A. serrulatus Pers. Fries. A. cyanipes
Fl. dan. t. 1071. f. 3. — Stipes basi albicans; lamellæ cæsio-incarnatae.
An potius sp. distincta?

152. A. GLAUCUS (Bull. t. 521. f. 1.) pileo squamoso cyaneo, lamellis adnatis
cæsio-albis dein purpurascens, stipite farcto crasso glabro cyaneo. —
Inter gramina, jul.-sept. — Fl. fr. 2. p. 179. A. chalybæus Pers. ic. pict.
t. 4. f. 3. 4. Fries. A. columbarius Sow. t. 161. — Solitarius; stipes 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc.
longus 1 lin. crassus; pileus uncialis; caro concolor tenuis; lamellæ sub-
serrulatae.

153. A. SALICINUS (Pers. ic. I. p. 9; syn. 344.) pileo subcarnoso cæsio-cinereo,
disco ruguloso, lamellis liberis roseis, stipite farcto fibrilloso albido-cæruleo.
— Ad træncos Salicum circa Parisios ex cl. Chevall., sept. — Fries syst.
myc. I. p. 202. — Stipes tenuis 1-2 unc. longus 1 lin. crassus; pileus con-
vexus subumbonatus uncialis et ultrà.

154. A. GRISKO-CYANEUS (Fries syst. myc. I. p. 202.) pileo campanulato-convexo
squamuloso lilacino-griseo, lamellis liberis purpurascens, stipite cavo
fibrilloso cæsio. — In graminosis sylvarum, aug., sept. — A. purpureus
Bolt. t. 41. A. atro-cyaneus Pers. non Batsch. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 2-3
lin. crassus; junior etiam albidus cæsio-fumatus; pileus unciam haud
superans.

XXI. Eccilia (Fries syst. myc. I. p. 207. — Omphaliæ sp. Pers.).
Stipes tenuis in pileum leviter diffusus non cærulescens; pileus

*tenuis membranaceus e convexo-planus umbilicatus striatus glaber
vel minute squamulosus; lamellæ adnatæ subdecurrentes latæ
subdistantes.*

155. A. POLITUS (Pers. syn. 465.) pileo hemisphærico obsolete umbilicato glabro margine striato nitente stipiteque fistuloso rigido cæsio-lividis, lamellis decurrentibus albidis dein incarnatis. — In herbosis et humidis sylvarum circâ Parisios vulgaris ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 209. A. lividus Pers. disp. p. 22. — Gregarius; stipes 2-3 unc. longus apice subindè albo-pruinosis; pileus submembranaceus 1-1½ unc. latus profundè umbilicatus siccus expallens; lam. medio 2 lin. et ultrà latæ.

156. A. JUNCEUS (Fries syst. myc. 1. p. 208.) pileo tenni conico dein convexo striato squamuloso fuligineo, lamellis adnatis stipiteque fistuloso longo dilatioribus. — Ad Sphagna in palndibus ad Belloy propè Beauvais ex cl. Graves, aug. — Stipes 3 unc. longus tenax laevis glaber fascus; pileus umbilico profundo e squamulis obscurioribus nigrescente, siccus convolutus.

XXII. *Clitopilus* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 68. — Clitop. et Mouteron Fr. syst. myc. 1. p. 193 et 194. — Gymnopi sp. Pers.). *Stipes carnosus subæqualis; pileus carnosus convexus dein planiusculus siccus haud umbilicatus; lamellæ inæquales plus minus decurrentes.*

157. A. UMBROSUS (Pers. ic. pict. t. 2. f. 5. 6.) pileo carnosso-membranaceo planiusculo rugoso squamuloso nigrescenti-umbrino margine ciliato-fimbriato, lamellis confertis latissimis liberis roseis, stipite solido albido villososquamoso. — In sylvâ Chantilly ex cl. Graves, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 200. — Stipes 2 unc. et ultrà longus 3-4 lin. crassus incurvus; pileus 2-3 unc. latus.

158. A. PLUTEUS (Batsch. el. cont. 1. f. 76.) pileo carnoso glabro nigrescenti-fuligineo nitido zonis concentricis aliquando zonato, lamellis confertis liberis primò albis dein roseis, stipite firmo solido albo nigro-fibrilloso. — Ad terram, maio-nov. — Pers. Fries. Nees syst. f. 201. A. lividus Bull. t. 382. Fl. fr. 2. p. 188. A. latus Bolt. t. 2. Sow. t. 108. A. cervinus Schæff. t. 10. — Buxb. cent. 4. t. 5. f. 2. — Stipes circiter 3-unc.; pileus 3-5 unc. latus; caro mollis alba. Var. lutescens, viscosus pallidus, siccus albidus.

159. A. LEONINUS (Schæff. t. 48.) fragilis, pileo submembranaceo glabro fusco-luteo nigro-maculato, lamellis albis dein rufis aurantiacis, stipite pleno solido striato albido vel flavescente. — In Fagetis umbrosis, ad ligna mucida, aug.-oct. — Pers. ic. pict. t. 7. f. 3. 4. A. pyrrospermus Bull. t. 547. f. 3. Fl. fr. 2. p. 192. — Stipes 3 unc. circiter longus 2-4 lin. crassus sæpè basi incrassatus; pileus 1½-3 unc. latus marginè substriato; lamellæ marginè plerumque flavescunt.

β. *chrysophæus*, minor firmior, pileo obscuriori subrugoso, lamellis carneis. — A. chrysophæns Schæff. t. 253.

160. A. ARDOSTACEUS (Bull. herb. t. 348.) pileo glabro demùm subdepresso plumbeo, lamellis subliberis confertis latis subferrugineis, stipite cavo glabro longo plumbeo. — In pratis humidis, aut. — Pers. syn. 466. Fl. fr. 2. p. 167. — Stipes 4-5 unc. longus 2-3 lin. crassus; pileus 3 unc. latus marginè subsinuatus; lam. 4 lin. latæ.

161. A. SINUATUS (Bull. t. 579. f. 1.) amplius, pileo glabro lato sinuato dein depresso albo-lutescente, lamellis confertissimis subadnexis latissimis rufescientibus, stipite crasso solidò æquali candido. — Ad terram, aut. — Fl. fr. 2. p. 182. Fries syst. myc. 1. p. 198. — Solitarius; stipes 3-5 unc. longus 1 unc. crassus durus subfibrillosus; pileus 6 unc. et ultrà latus; lam. 6-9 lin. latæ.

162. A. PHOMOSPERMUS (Bull. t. 534, 547. f. 1. 590.) magnus, pileo subumbonato glabro livido-pallescens, lamellis adnexis distinctis incarnatis, stipite pleno glabro albescente subbulboso. — Ad sepes, prata, sylvarum loca aperta, aut. — Fl. fr. 2. p. 187. A. fertilis Pers. Fries. — Buxb. cent. 4. t. 6. — Gregarius

822 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

subcespitosus; stipes 3 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. fere crassus; pileus 3-unc.; caro haud crassa; lam. emarginatae serrulatae 4-6 lin. latæ.

P. intybaceus (Fries) pileo griseo virgato, lam. stipiteque griseo-pallidis.

— Bull. t. 534. f. G. H.

163. *A. RHODOROLIUS* (Fries obs. 2. p. 103; syst. myc. 1. p. 197.) pileo subumbonato subsericeo livido, lamellis adnatis albido-roseis, stipite cavo glabro. — In locis humidis sylvarum, jul.-nov. — *A. hydrogrammus* Bull. t. 564. f. C. D. E. A. repandus Bolt. t. 6. — Stipes 2-4 unc. longus interdum sursum attenuatus fragilis; pileus in majoribus undulatus.

164. *A. ATROPUNCTUS* (Pers. syn. 353.) parvus, pileo subbarnoso dilutè cinereo, lamellis decurrentibus distantibus incarnato-cinereis pallidisve, stipite nitido, squamulis punctiformibus nigris. — In sylvâ Compiègne ex cl. Graves. — Gregarius; stipes subtenax 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 1 lin. crassus livescens; pileus 4-6 lin. latus; lamellæ paucæ.

165. *A. HORTENSIS* (Pers. syn. 362.) pileo subumbonato fuligineo subnigrescente, lamellis plano-decurrentibus subcontortis albidis, stipite cavo deorsum incrassato. — Ad terram in hortis et sylvis circa Parisios ex cl. Chevall. — Cespidosus, stipes 2 $\frac{1}{2}$ unc. longus 2-3 lin. crassus; pileus 2 unc. latus nunc nigrescens nunc fuligineo-lividus nunc subrafescens; lam. 3 lin. fere latæ.

166. *A. PRUNULUS* (Pers. syn. 457.) pileo compacto planiusculo albo margine angulato vel undulato, lamellis confertissimis inæqualibus longè decurrentibus posticè acuminatis albis dein incarnatis, stipite solido plerumque basi incrassato subhirsuto. — Ad terram in sylvis, jun.-oct. — *A. albellus* Schæff. t. 78. Fl. fr. 2. p. 176. non Sow. *A. Mousseron* Bull. herb. t. 142. *A. pallidus* Sow. t. 143. *Prunulus* Cæs. p. 617. — Stipes 3-6 lin. crassus, unc. 1 et ultra longus, pileus 2-unc. latus sèpè excentricus. Edulis. Odor farinæ recentis. Magnitudine et formâ valde varius.

Sect. vi. LEUCOSPORUS Fries syst. myc. 1. p. 9.

Lamellæ immutabiles persistentes; velum varium vel nullum; sporulæ albidæ.

a. *Stipes excentricus nullusve.*

XXIII. *Pleurotus* (Fries l. c. 1. p. 178. — *Pleuropi* sp. Pers.).

Pileus inæqualis excentricus vel lateralis; lamellæ inæquales exsuccæ. Statura admodum varia. — Fungi persistentes plerumque lignicolæ.

1. *Mycenaria* (Fries l. c. p. 190.) *Velum nullum; pileus membranaceus; lamellæ adnatæ vel in puncto excentrico concurrentes.*

167. *A. APPLICATUS* (Batsch. fung. 2. t. 24. f. 125.) pileo subsessili e resupinato-reflexo pruinato basi villoso obscure cinereo, lamellis primò purpurascens tandem nigris. — Ad trunctos putridos, aut.-vere. — Sow. t. 301. Nees syst. f. 183. *A. epixylon* Bull. t. 581. f. 2. Fl. fr. 2. p. 135. — Junior cupulæformis 2-4 lin. latus; lamellæ distantes radiantes etiam margine albidiores.

168. *A. PERPUSILLUS* (Lumn. pos. p. 523.) tenuis albus, pileo subsessili e resupinato-reflexo lævi glabro, lamellis distinctis. — Ad ramos, truncos, etc., sept.-dec. — Fries syst. myc. 1. p. 192. *A. applicatus* Fl. dan. t. 1295. f. 1. — Buzb. cent. 5. t. 7. f. 3. — Admodum parvus tenuis junior obcampanulatus $\frac{1}{2}$ unc. latus; demum verò reflexus; stipes brevis vel nullus.

169. *A. DICTIONIZUS* (DC. fl. fr. 2. p. 594) candidus, pileo subsessili semiorbiculari horizontali margine sinuato, basi fibrilloso fibrillis radiciformibus tomentosis anastomosantibus, lamellis inæqualibus concoloribus. — Ad ar- gillam humidam. — Gregarius tenuis fragilis.

170. *A. TREMULUS* (Schæff. t. 224.) grisens, pileo reniformi diaphano, lamellis linearibus distantibus, stipite marginali ascendentè villoso. — Ad terram et muscos circa Savignies propè Beauvais ex cl. Graves, circa Lille ex cl. Desmaz., ang.-dec. — Sow. t. 242. *A. glaucus* Batsch. cont. 1. f. 123. *A. te-*

phromelas Pers. obs. 2. p. 47. — *Pileus* 3-4 lin. *latus expallens subinde subsessilis*, disco viloso.

2. *Omphalaria* (Fries l. c. p. 189.) *Velum nullum; pileus carnosus junior resupinatus dein reflexus horizontalis sessilis; lamellæ primum in punto excentrico concurrentes. — Lignatiles.*

171. *A. ALCIDUS* (Fries syst. myc. 1. p. 190.) *pileo carnosus laevi glabro umbrino, strato superiori gelatinoso, lamellis pallidis dein lutescentibus. — Ad trunco Betulæ propè Parisios ex cl. Chevall. — A. lateralis Fl. dan. t. 1556. f. 2. A. subsessilis Fl. dan. t. 1552. f. 1. — Sæpè imbricatus subreniformis 2 unc. latus dein repandus; lam. confertæ.*

172. *A. NIDULANS* (Pers. ic. pict. t. 6. f. 4.) *pileo carnosus reniformi tomentoso lutescente primò resupinato, lamellis confertis aurantio-luteis. — Ad trunco prostratos in sylvâ Compiègne, oct.-dec. — Fries syst. myc. 1. p. 189. — Gregarius subinde imbricatus, junior cupularis; pileus 1-2 unc. latus margine involutus; lamellæ simplicissimæ 1-2 lin. latæ.*

3. *Ægeritaria* (Fries l. c. p. 186.) *Velum nullum; stipes raro obsoletus; pileus carnosus tenax junior horizontalis; lamellæ non decurrentes sed determinato-desinentes.*

173. *A. FLUXILIS* (Fries syst. myc. 1. p. 189.) *subsessilis, pileo gelatinoso fluxili reniformi umbrino, lamellis distantibus albido, paucissimis integris. — Ad trunco dejectos muscosos in sylvâ Chantilly ex cl. Graves, aut. — Solitarius inodorus substantiâ tenui viscidâ mollissimâ griseâ diaphanâ; pileus unico punto laterali leviter adfixus membranâ tenella fugaci rugulosa junior tectus, dein glutinosus uncialis; lam. posticè rotundata 1 lin. latæ.*

174. *A. STYPTICUS* (Bull. t. 140, 507. f. 1.) *cespitosus, pileo coriaceo-carnoso reniformi subalutaceo, epidermide in squamulas furfuraceas secedente, lamellis subcinnamomeis venoso-connexis, stipite lateralí pruinoso. — Ad trunco exsiccatos, aut., hyeme. — Fl. dan. t. 1292. f. 1. Fl. fr. 2. p. 136. A. betulinus Bolt. t. 72. f. 1. A. flabelliformis Sow. t. 109. — Buxb. cent. 5. t. 10. f. 1. — Gregarius; stipes brevis sursùm dilatatus; lamellæ eleganter reticulato-connexæ. Sapor stypticus.*

175. *A. SEROTINUS* (Pers. syn. 479.) *pileo compacto carnoso subviscoso olivaceo-viridi, lamellis adnatis confertis pallidis, stipite brevi sublateralí fuligineo-squamoso. — Ad trunco Fagi, Betulæ, Alni, etc., circa Parisios ex cl. Chevallier, oct.-jan. — A. stypticus var. Fl. dan. t. 1293. f. 2. — Buxb. cent. 5. t. 2. f. 2. — Stipes unc. hand superans; pileus laevis crassus; lam. simplices plerumque flavæ variant albidae et incarnatae.*

176. *A. PALMATUS* (Bull. t. 216.) *pileo laevi glabro rufescente, lamellis adnatis concoloribus, stipite excentrico glabro albido. — Ad trunco et ligna, aut. — Sow. t. 62. Fl. fr. 2. p. 137. — Barr. ic. t. 1269. — Cespitosus; stipes 1-2 unc. longi, $\frac{1}{2}$ unc. crassi albidi vel rufescentes; pileus 2-4-unc.; caro alba; lam. latæ.*

177. *A. TESSULATUS* (Bull. t. 513. f. 1.) *pileo convexo tenaci subobliquo dilatè ferrugineo tessellato, tessellis ferè hexagonis, lamellis adnatis albis, stipite tereti brevi subexcentrico. — Ad trunco Quercus aut Mali. — Fl. fr. 2. p. 138. — Stipes subincurvus albus; pileus 2-3 unc. latus; lam. confertæ.*

178. *A. ULMARIUS* (Bull. t. 510.) *pileo carnoso compacto glabro latissimo unicolo pallescente aut maculato, lamellis latissimis emarginatis albis, stipite valido ascendentè subtomentoso. — Ad trunco arborum, oct.-dec. — Sow. t. 67. Fl. fr. 2. p. 138. — Batt. p. 44. t. 9. — Solitarius vel cespitosus; stipes radicatus subbulbosus 2-3 unc. longus 1 unc. circiter crassus; pileus 3-3 unc. et ultra latus, saepè maculis lividioribus rotundis eleganter marmoratus.*

824 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

4. Concharia (Fries l. c. p. 180.) *Velum nullum; pileus carnosus tenax epidermide contiguā; lamellæ decurrentes subindē divisæ.*

179. *A. LAMELLIRUGUS* (DC. fl. fr. 2. p. 44.) pileo oblongo horizontali piano subinvoluto sordidè albo, lamellis croceis aut pallidè aurantiaceis decurrentibus anastomosantibus transversè venosis, stipite brevi lateralī aut subunullo. — Ad radices arborum in pinetis ad Fontfroide propè Monspeliū, aut.

180. *A. PETALOIDES* (Bull. t. 226, 557. f. 2.) ascendens, pileo spathulato albido-fuscescente, disco stipiteque marginali semi-cylindrico supra canaliculato subvillosis, lamellis confertis linearibus albis. — Ad truncos Fagi, Abietis, etc., aut. — Fl. fr. 2. p. 136. — Batt. t. 9. f. E. — Gregarius staturā varius; stipes ½ unc. circiter longus etiam subnillus; pileus carnosus planiusculus uncialis; lam. 1 lin. latæ.

β. spathulatus (Pers.) erectus spathulæformis, pileo alutaceo pallido, disco spongioso-squamuloso, stipite canaliculato. — Ad terram in umbrōsis. — *A. anomalus* Pers. obs. 1. t. 4. f. 1. *A. spathulatus* Pers. syn. 479. Nees syst. f. 178. — Major; stipes tomentosus; pileus margine reflexus striatus.

181. *A. AVELLANUS* (Thore chl. land. 479.) pileo oblongo glabro avellano nitido, lamellis inæqualibns albidis decurrentibus, stipite brevi pleno lateralī viloso. — Ad truncos prostratos Populi circa Dax ex cl. Thore, aut. — Fl. fr. 5. p. 44. — Imbricatus, pileus 6-8 unc. latus. Recens violam redolens. An potius seq. var?

182. *A. SALIGNUS* (Pers. syn. 478.) gregarius, pileo horizontali dilatato fuligineo albo aut ochraceo, basi depresso substrigoso, lamellis subramosis albidis, stipite tenaci lateralī albo-tomentoso. — Ad truncos Fagi, Salicis, Alni, etc., oct.-jan. — Tratt. oest. schw. t. 4. f. 8. Fries syst. myc. 1. p. 183. — Stipes subindē nullus; pileus convexus 4-6 unc. latus.

183. *A. OSTREATUS* (Jacq. aust. t. 288.) cespitosus, pileo carnoso glabro e nigri-canti-cinereo expallente, lamellis posticè anastomosantibus eglandulosis albis, stipite sublateralī. — Ad candices arborum, vere, aut. — Curt. lond. t. 116. Sow. t. 241. *A. dimidiatus* Bull. t. 508. — Imbricatus; pileus junior nigrescens mox fuscus vel cinereus deinde expallidus; stipes breves etiam nulli. Edalis.

β. flavo-cinereus (Pers.) pileo cinereo-subrufescente, lamellis margine flavis. — Ad truncos Quercūs.

184. *A. GLANDULOSUS* (Bull. t. 426.) cespitosus, pileo compacto sublaterali dilutè badio, lamellis candidis decurrentibus ad latera glandulosis, stipite glabro brevi. — Ad truncos in sylvaticis, oct.-dec. — Fl. fr. 2. p. 136. — Magnus horizontalis raro verticalis; stipes crassus subindē nullus; pileus 4-6 unc. latus; lam. latæ basi etiam anastomosantes.

185. *A. CONCHATUS* (Bull. herb. t. 298.) pileo tenaci disformi cinnamomeo-incarnato, lamellis integerrimis stipiteque brevi irregulari basi pubescente pallidis. — Ad truncos vetustos, jul.-sept. — Fries obs. 2. p. 224. *A. inconstans* β Pers. DC. fl. fr. 2. p. 137. — Gregarius; stipes haud uncialis subindē nullus; lamellæ laxæ basi non anastomosantes. Var. colore ochraceo.

186. *A. INCONSTANS* (Pers. syn. 475; excl. var. β.) pileo tenaci depresso subintegro flexuoso subrufescente, lamellis subramosis basi crispis pallidis, stipite brevi fuligineo. — Ad truncos arborum. — Fl. fr. 2. p. 137, excl. var. β. *A. dimidiatus* Bull. t. 517. f. O. *A. labelliformis* Schäff. t. 43, 44. — Stipes radicatus vix uncialis ½ unc. usque crassus subindē lateralis; pileus substriatus 3-4 unc. latus.

187. *A. TORULOSUS* (Pers. syn. 475.) pileo tenaci depresso alutaceo-rufescente, lamellis decurrentibus suberispatis pallidioribus, stipite brevi griseo-tomentoso. — Ad truncos Betulæ circa Beauvais ex cl. Graves, jul.-oct. — *A. carneo-tomentosus* Batsch el. f. 33. Nees syst. f. 176. — Substantia tenacissima; stipes crassus; pileus demum ferè infundibuliformis colore varius subindē maculatus, 2-3 unc. latus.

188. A. ORCELLUS (Bull. t. 573. f. 1. 591.) pallidus, pileo depresso elliptico aut orbiculari subexcentrico maculato, lamellis confertis integerrimis incarnatis, stipite glabro deorsum attenuato albo. — Ad truncos et terram, aest., aut. — Fl. fr. 2. p. 138. — Gregarius; stipes 1-2 unc. longus levissimus etiam omnino centralis; pileus 2-4 unc. latus; color alutaceus vel incarnatus.

5. *Lepiotaria* (Fries l. c. p. 179.) *Velum simplex subuniversale concretum fugax*; *stipes durus excentricus lateralis*; *pileus carnosus compactus epidermide siccâ in squamas secedente e convexo-explanatus*; *lamellæ decurrentes*.

189. A. DRYINUS (Pers. syn. 478.) solitarius durus, pileo obliquo subglabro albido; squamis fuscescentibus, velo fugaci, lamellis subdistantibus, stipite albo subsquamuloso. — Ad truncos Quercus, Mali, etc., ang.-nov. — Nées syst. f. 177. — Stipes uncialis; pileus circiter 2-unc.; lam. angustæ albæ vel exsiccatæ flavescentes.

β. Stipes centralis nudus.

XXIV. *Lentinus* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 77. — *Omphaliæ lentiscyphæ* Fries syst. myc. 1. p. 174. — *Omphaliæ* sp. Pers.). *Substantia carnosæ coriacea lenta*; *stipes solidus firmus in pileum diffusus*; *pileus subinfundibuliformis sœpè inæqualis et squamosus duriusculus*; *lamellæ simplices cum pileo concretæ aut dentato-laceræ*. Sp. lignatiles.

190. A. COCHLEATUS (Pers. syn. 450.) cespitosus, pileo tenaci sublobato contorto glabro laevi rufescente, lamellis dentatis pallidis, stipite firme sulcato rufescente. — Ad truncos vetustos circa Parisios ex cl. Chevall., vere et aut. — A. confluens Sow. t. 168. — Stipes 1-3 unc. longus et ultra; pileus uncialis et ultra albidus flavescente; lam. albidæ subincarnatae. Odor gratus aniseus persistens.

β. minor, pileo excentrico. — A. dentatus Pers.

191. A. TIGRINUS (Bull. t. 70.) pileo regulari umbilicato albido, squamis pilosis nigricantibus, lamellis denticulatis albis, stipite tenui minute squamoso. — Ad truncos seniores in sylvis, aest. — Sow. t. 68. Fl. fr. 2. p. 169. — Gregarius; stipes 1-2 unc. longus; pileus tenuis 2 unc. circiter latus demum margine fissus.

192. A. DUNALII (DC. fl. fr. 2. p. 47.) cespitosus, pileo irregulari infundibuliformi laevi helvolo sœpè excentrico, marginibus subrevolutis, squamis nigriscentibus, lamellis decurrentibus albidis, stipite pleno cylindraceo albido basi nigro-squamuloso. — Ad vetustas Salices Monspelii, Aginni ex St.-Am. — Odor gratus.

XXV. *Mycena* (Fries syst. myc. 1. p. 126. — *Mycenæ* sp. Pers.). *Stipes fistulosus gracilis a pileo discretus basi villosus*; *pileus membranaceus campanulatus raro magis expansus substriatus plerumque glaber, absque squamis*; *lamellæ inæquales subexsuccæ posticæ acutæ*. — Sp. minores graciles.

* Sp. siccæ, pileo demum depresso, lamellis decurrentibus.

193. A. INTEGRELLUS (Pers. ic. pict. t. 13. f. 6; syn. 393.) minutus candidus, pileo hemisphaerico margine striato, lamellis rugæformibus decurrentibus distantibus, stipite deorsum piloso. — Ad terram, folia, ligna, etc., in umbris circa Parisios ex cl. Chevall., jul.-sept. — Fries syst. myc. 1. p. 161. — Rai syn. p. 19. t. 1. f. 2. — Subfascicularis; stipes circiter uncialis; pileus 1-3 lin. latus.

194. A. CAPILLARIS (Schum. säll. p. 268.) albus, pileo campanulato tenerimo, lamellis aduatibus distantibus, stipite capillari apice subfuscante. — Ad folia decidua in sylva Compiègne ex cl. Graves, sept.-nov. — Fries-syst. myc. 1.

826 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

- p. 161. *A. acicularis* Hoffm. t. 5. f. 2. — Mich. gen. t. 80. f. 10 et 11. — Stipes sat tenax flaccidus uncialis circiter; pilea junior capitulum aciculæ refert dein umbilicatus $\frac{1}{2}$ -lin. latus; lam. simplices subinæquales.
- 195. *A. PTERIGENUS* (Fries obs. 2. p. 43.) tenuis roseus, pileo campanulato lœvi, lamellis latis distantibus, stipite capillari, bulbillo strigoso. — Ad stipites Filicum et inter muscos in locis nudis circa Parisios ex cl. Chevall., propè Beauvais ex cl. Graves, aug.-oct. — Stipes 1-3 unc. longus basi tomento stri-goso radicato-patentissimo plerumque insidenz; pileus dein umbilicatus 1-3 lin. altus; lam. 6-8 adnato-decurrentes.
- 196. *A. CORTICALIS* (Bull. t. 519. f. 1.) pusillus, pileo tenui hemisphaerico dein umbilicato striato fuscescente aut albido, lamellis uncinato-decurrentibus distantibus albidis, stipite brevi incurvo glabro. — Ad cortices et rimos arborum lichenosas, oct.-febr. — Sow. t. 243. Fl. fr. 2. p. 165. *A. corticola* Pers. Fries. *A. clavularis* Batsch cont. 1. f. 81. — Mich. t. 74. f. 8. — Stipes 3-7 lin. longus; pileus 2-4 lin. latus. Variat colore incarnato, rufescenti, cyaneo, etc.
- 197. *A. VARIEGATUS* (Pers. syn. 391.) pileo campanulato lœvi aut papillato striis rufescens variegato, lamellis uncinato-decurrentibus stipiteque longo glabro albis. — Ad terram in graminosis. — Fl. fr. 2. p. 164. — Bull. herb. t. 560. f. 3. — Gregarius; stipes 2-3 unc. longus vix 1 lin. crassus; pileus 4-6 lin. latus umbonatus vel depresso; lam. 1-2 lin. latæ.
- 198. *A. UMBRATILIS* (Fries syst. myc. 1. p. 157.) pileo convexo dein umbilicato nigro-fusco, lamellis adnato-decurrentibus confertis albo-fuscescentibus, stipite flocculoso farcto glabro. — Ad margines fossarum in sylvis circa Parisios ex Vaill. et Chevall. — Vaill. n. 39. p. 66. ex Fries l. c. — Gregarius subaquosus; stipes tenax 1-2 unc. longus 1 lin. crassus; pileus circiter uncialis margine substriatus.
- 199. *A. PELLUCIDUS* (Bull. t. 550. f. 2.) rufescens, pileo submembranaceo campanulato margine striato, lamellis decurrentibus latissimis, stipite farcto longiusculo tenui. — Ad terram in sylvis, æst., aut. — Fl. fr. 2. p. 172. *A. biconus* Pers. syn. 317. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 1 lin. crassus; pileus semiunc. ferè latus.

** *Pileo stipiteve viscosis; lamellis adnatis vel decurrentibus.*

- 200. *A. CITRINELLUS* (Pers. ic. pict. t. 11. f. 3; syn. 384.) pileo striato hemisphaerico umbonato stipiteque brevi subviscoso basi piloso citrinis, lamellis uncinatis albidis. — Inter folia Pinorum in sylvâ Boloniensi propè Parisios ex cl. Chevall., aut. — Fries obs. 1. p. 44. Fl. dan. t. 1614. f. 1. *A. tenellus* Batsch el. cont. 1. t. 18. f. 88. — Gregarius minutus; stipes uncialis filiformis; pileus 2-3 lin. latus.
- 201. *A. EPIPTERYGIUS* (Scop. carn. p. 455.) pileo lœviusculo obtuso aut subumbonato striato cinereo-cæsio stipiteque elongato sulphureo viscosis, lamellis uncinatis distantibus albis. — Ad terram muscosam, aug.-nov. — Fl. fr. 5. p. 46. *A. flavipes* Schæff. t. 31. *A. nutans* Sow. t. 92. — Pilens $\frac{1}{2}$ -1-unc. nunquam depresso. Color variat albus, cinereus, cæsius, flavus, rufus, etc.; lamellarum albidus cæsius subcarneus, etc.

*** *Sp. siccae, pileo sæpè umbonato non depresso; lamellis liberis vel adnatis nec decurrentibus.*

- 202. *A. MUCOR* (Batsch el. cont. 1. f. 82.) minimus griseus, pileo glabro pliato, lamellis adnatis paucis distantibus, stipite glabro basi dilatato. — Ad folia decidua in sylvâ Carlepont propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 155. *A. integrillus* Nees syst. f. 187. — Magna cum *A. capillari*, integrello, etc., affinitas.
- 203. *A. STYLOVATA* (Pers. syn. 390. t. 5. f. 4.) tener, pileo membranaceo convexo obtuso striato subpiloso candido aut albido-cinerascente, lamellis libe-ris distinctis, stipite basi in membranulam orbicularem striatam dilatato. — Ad folia, ligna, etc., jul.-oct. — Dittm. ap. Sturm deuts. t. 29. Nees syst.

- f. 189. Fries syst. myc. I. p. 153. — *Solitarius*; stipes 1-2 unc. longus; pileus 2-3 lin. latus et altus; lamellæ distantes late.
- 204. *A. TORQUATUS* (Fries syst. myc. I. p. 153.) albus, pileo obtuso campanulato plicato glabro, lamellis longioribus in annulum adnatis, stipite basi in membranulam orbicularem planam dilatato. — Ad stipites et ramulos dejectos, aut. — *A. nanus* Bull. t. 563. f. R. S. T. A. *stylobates* Fl. fr. 2. p. 158. non Pers. — Stipes $\frac{1}{2}$ -2 unc. altus; pileus tenax 4-6 lin. latus; lam. inæquales.
205. *A. LACTEUS* (Pers. syn. 394.) pileo campanulato subumbonato striatulo albo-flavescens, lamellis adfixis distinctis stipiteque rigidulo lævi longiusculo basi hirsuto albis. — Ad terram in ericetis, ad ramulos et folia in Pinetis, jul.-nov. — *A. nanus* Bull. t. 563. excl. R. S. T. *A. papillatus* Hoffm. nom. t. 3. f. 2. — *Buxb. cent.* 4. t. 31. f. 1. — *Gregarius*; stipes 1- $\frac{1}{2}$ unc. longus vix lin. crassus; pileus 3-7 lin. latus; lam. subdistantes.
- f. *pumilus* (Fries) pileo flavo, lamellis liberis, stipite brevi arhizo. — *A. pumilus* Bull. t. 260. DC. fl. fr. 2. p. 166.
206. *A. LINEATUS* (Bull. t. 522. f. 3.) siccus, pileo obtuso lineato-striato flavo, lamellis distantibus adfixis albidis, stipite basi albo-villoso. — In Fagetis inter muscos, aug., sept. — Fl. fr. 2. p. 162. — *Solitarius*; stipes 2 unc. longus tenuis flavescens basi tomentulo niveo subvelutino obductus; pileus 3-5 lin. latus et altus.
207. *A. CHLORANTHUS* (Fries obs. I. p. 156, t. 5. f. 2.) pileo obtuso striato viridi, lamellis adnexis albis, stipite lævi glabro vidente. — In nemoribus graminosis circa Parisios ex cl. Chevall., aug., sept. — Fl. dan. t. 1614. f. 2. — Parvus; stipes uncialis; pileus subcencullatus 3-4 lin. altus.
208. *A. ADONIS* (Bull. t. 560. f. 2.) pileo lævi campanulato obtuso albido roseo ant viridi vario, lamellis subuncinatis adnatis albis, stipite lævi glabro filiformi albido arhizo. — In sylvaticis, sept.-nov. — Pers. syn. 391. Fl. fr. 2. p. 164. — *Gregarius*; stipes 2-unc. et ultrà; pileus campanulatus 3-4 lin. altus et latus; lam. non decurrentes.
209. *A. PURUS* (Pers. syn. 339.) varie coloratus, pileo conico campanulato vel prorsus plano carnoso-membranaceo obtuso subroseo, lamellis adnexis rotundatis ventricosis pallidioribus, stipite lævi fistuloso basi villoso. — In sylvis, jun.-nov. — Fl. fr. 2. p. 180. *A. roseus* Bull. t. 162, 507. Sow. t. 72. Fl. dan. t. 1673. — *Gregarius*; stipes 2-4 unc. longus; pileus obtusè umbo-natus margine striatus 1-3 unc. latus. Color pilei stipitisque purpurens roseus lilacinus fuscescens pallescens et etiam disco flavus. Subolens.
210. *A. ROSEUS* (Pers. syn. 393. t. 5. f. 3, non Bull. nec Scop. nec Schäff.) roseus, pileo campanulato obtusè umbonato striato, lamellis adnatis albidis margine obscuriori, stipite exsucce filiformi pallescente basi albo-villoso. — Ad ramulos, aug.-nov. — Fl. fr. 2. p. 165. *A. fistulosus* Bull. t. 518. f. P. — *Gregarius*; stipes 1-1½ unc. longus; pileus membranacens 2 lin. latus. Maxime sequenti cognatus.
211. *A. STROBILINUS* (Pers. syn. 393.) coccineus, pileo acute umbonato margine striato, lamellis adnatis rubellis margine obscuriori, stipite exsucce firmo basi albo-strigoso. — Ad ramulos et strobilos in Pinetis, Fagetis, etc., aug.-nov. — Fries syst. myc. I. p. 150. *A. coccineus* Sow. t. 197. — *Gregarius* subfascicularis; stipes 2 unc. longus rigidulus; pileus campanulatus 3-6 lin. latus; lam. dente tenui decurrente distantes margine obscure sanguineo.
212. *A. GALOPUS* (Pers. obs. 2, p. 56; syn. 379.) pileo campanulato striato nigriscente-glaucio, lamellis subdistantibus adfixis albido-cinereis, stipite succo albo referto. — In sylvaticis circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-nov. — Fl. dan. t. 1550. f. 2. *A. lactescens* Schrad. — *Subsolitarius*; stipes gracilis inter muscos valde elongatus; pileus var. nudus et pruinosis, colore plus minus obscuriore.
- 213. *A. CROCATUS* (Schrad. spic. 127.) pileo campanulato obsolettè striato cine-

- reus, lamellis attenuato-adnexis albis stipiteque succo crocato refertis. — In nemoribus humidis præcipue inter folia dejecta Fagi, circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-oct. — Fl. dan. t. 1550. f. 1. — Stipes 2-3 unc. longus croceo-sanguineus apice albidus; pileus umbonatus colore varius 4 lin. latus; lam. remotæ. Inodorus.
- 214. *A. PRASIOSMUS* (Fries obs. 2. p. 153; syst. myc. 1. p. 148.) pileo hemisphærico ciuereo disco olivaceo-umbrino, lamellis subliberis, stipite elongato succo croceo referto. — Ad folia decidua circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — *A. alliaceus* Scop. non auct. — Odor alliaceus; lamellæ flavescentes.
- 215. *A. ATRO-CYANEUS* (Batsch. el. cont. 1. f. 87.) pileo obtuso stipiteque brevi subpruinatis striatis nigricantibus margine lamellisque subadnexis albidiobus. — Ad terram in umbrosis circa Parisios ex cl. Chevall., Lugdunum ex cl. Balbis, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 147. *A. Batschii* Fries obs. — Stipes 1-2 unc. longus vix radicatus; pileus dein expallens cinerascens 3 lin. circiter altus et latus.
- 216. *A. POLYGRAMMUS* (Bull. t. 395.) pileo campanulato umbonato obsoletè striato subcinereo, lamellis attenuato-adnexis albis, stipite longo rigido striato argenteo-cæsio. — Ad truncos cavos et folia decidua, aut. — Fl. fr. 2. p. 161. Fl. dan. t. 1615. f. 1. *A. fistulosus* Bull. t. 518. f. H. — Plerumque gregarius et interdùm cespitosus; stipes sæpè spithamæus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus margine sæpè dentatus.
- 217. *A. PLEXIPES* (Fries syst. myc. 1. p. 146.) pileo umbonato striatulo fuligineo, lamellis attenuatis albis, stipite e fibris implexis sericeo-striato livido. — In Fagetis, graminosis et ad truncos circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aut. — *A. fuliginarius* Batsch el. f. 40. — Mich. gen. t. 79. f. 8. — Inodorus; stipes 3 unc. circiter longus 1-2 lin. crassus; pileus 1-2 unc. latus; lamellæ subliberæ subconfertæ candidæ vel glaucescentes.
- 218. *A. MUSCIGENUS* (Schüm. scell. p. 307.) tenellus albus, pileo hemisphærico lævi, lamellis adnatis subconfertis linearibus, stipite setaceo flaccido. — Ad truncos muscosos arborum circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 145. *A. trichopus* Scop. — Solitarius vel gregarius; stipes uncialis; pileus junior globosus demùm convexo-planus 1 lin. circiter latus.
- 219. *A. GALLERICULATUS* (Schæff. fung. t. 52.) pileo subrugoso plus minus striato fuscescente, lamellis albidis adnatis dente decurrente, stipite lævi tenaci basi radicato strigoso. — Ad truncos aut radices arborum frequens. — Sow. t. 165. *A. fistulosus* Bull. t. 518. excl. H. P. Fl. fr. 2. p. 160. *A. campanulatus* Linn. suec. ed. I non ed. II. — Vaill. t. 12. f. 3. 4. Mich. gen. t. 79. f. 5; t. 75. f. 9. — Maximè variabilis inodorus insipidus exsuccus tenax; lamellæ subdistantes demùm cinerascentes vel incarnatae. Color varius plerumque cinereus spadicetus, etc.
- $\beta.$ *præmorsus* (Pers.) solitarius major terrestris, pileo carnoso-membranaceo rugoso, stipite rigido. — Schæff. l. c. f. 7-9. *A. æstivus* Pers. syn. 378.
- $\gamma.$ *gracilis* (DC.) solitarius gracilis terrestris, pileo subhemisphærico papillato, stipite filiformi prælongo flaccido. — Bull. t. 518. f. P. *A. tenuis* auct. *A. pilosus* Pers.
- 220. *A. ALCALINUS* (Fries obs. 2. p. 153; syst. myc. 1. p. 142.) olidus, pileo obtuso striato cinereo, lamellis adnatis ex albo-glaucis, stipite lævi firme basi villoso. — Ad terram et truncos, maio-oct. — *A. sulphureus* Scop. — Vaill. bot. t. 12. f. 1. 2. — Odor fortis nitrosus. Color pilei nigricans rufus flavo-lividus aut pallidus, stipitis luteus cinereus.
- $\beta.$ *leptocephalus* (Fries) cinerens, pileo umbonato tenni, lamellis crassis, stipite glabro brevi. — *A. leptocephalus* Pers. ic. pict. t. 14. f. 4. — Lam. subsinuatae.
- 221. *A. GRISGUS* (Fl. dan. t. 1551. f. 2. non Fries, nec Batsch, nec Schæff., nec Pers.) parvus, pileo obtuso striato griseo, lamellis subliberis ventricosis stipiteque brevi inérvio glabro albis. — Ad truncos vetustos circa Parisios ex

cl. Chevall., in sylva Compiègne ex cl. Graves, aut. — *A. supinus* Fries syst. myc. 1. p. 142. *A. pusillus* Hoffm. nom. fung. t. 6. f. 3. — *Gregarius persistens*; stipes uncialis; pileus campanulatus 2 lin. latus; lam. latæ.

222. *A. FILOPES* (Bull. t. 320.) pileo obtuso striato livido-fusco, lamellis liberis ventricosis albis, stipite longo tenuissimo ad apicem attenuato basi hirsutissimo. — Inter muscos in sylvaticis, aug.-oct. — Fl. fr. 2. p. 161. *A. membranaceus* Hoffm. l. c. t. 6. f. 1. *A. pilosus* Batsch el. f. 1. — Stipes 3 unc. longus et ultrà albo-lividus vel fuscus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. circiter latus.

223. *A. ALLIACEUS* (Jacq. aust. t. 82 non Bull., nec Willd., nec *All.*) olidus, pileo lento albo-fuscescente, lamellis liberis albidis, stipite procerò pruinato-velutino nigrescente. — In sylvis humidis inter folia rarius ad ligna, jul.-nov. — Pers. syn. 375. Fl. dan. t. 125 t. — Mich. gen. t. 98. f. 4. — *Odor alliacetus* persistens; stipes spithameus subcorneus; pileus dein planiusculus laevis vel obsoletè striatus expallens, uncialis et ultrà.

XXVI. Collybia (Fries syst. orb. veg. 1. p. 71. — *Collybia* et *Clytocybes* sp. Fr. syst. myc. — *Gymnopi Mycenæ* et *Omphaliae* sp. Pers.). *Velum nullum*; stipes subcorneus fistulosus raro floccoso-farctus tenacissimus; pileus coriaceo-carnosus vel membranaceus convexo-planiusculus demùm subinde depresso; lamellæ cum pileo concretae distantes posticè obtusæ et sèpè connexæ. — Sp. minores aridæ.

1. *Rotulæ* (DC. fl. fr. 2. p. 158. Fries l. c.). *Pileus lento-membranaceus*; lamellæ adnatae; stipes gracilis subcorneus nigrescens.

224. *A. HUDSONI* (Pers. syn. 390.) pileo convexo-explanato albido substrato stipiteque rufo fistuloso pilis strictis nigro-rubescensibus obsessis, lamellis albidis inæqualibus. — Super folia Aquifolii mortua, aut. — Fl. fr. 2. p. 164. Brond. in ann. soc. linn. 1826. t. 6. *A. pilosus* Huds. Sow. t. 164. — Stipes ferè uncialis gracilis nigrescens; pileus 1-3 lin. latus. Gregarius.

225. *A. EPIPHYLLUS* (Pers. syn. 468. excl. var. non Bull., DC.) pileo planiusculo rugoso lamellisque adnatis paucis venosis albis, stipite fistuloso subtiliter velutino deorsum spadiceo. — Ad folia decidua, sept.-dec. — Fries syst. myc. 1. p. 139. *A. rugatus* Fl. dan. t. 1194. f. 1. *A. squamula* Batsch. Sow. t. 93. *Helotium melanopus* Pers. ic. pict. t. 9. f. 7, 8. — *Inodorus gregarius* tenax; stipes $\frac{1}{2}$ -1 unc. longus apice albidus; pileus dein umbilicatus 2-5 lin. latus; lamellæ raræ 6-10.

226. *A. PERFORANS* (Hoffm. nom. fung. t. 4. f. 2.) pileo planiusculo ruguloso pallescente, lamellis adnatis simplicibus pluribus dimidiatis, stipite fistuloso laevi velutino nigro-badio. — Ad aciculos Abietis pectinatæ in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.). — Fries syst. myc. 1. p. 138. *A. androsaceus* Schæff. t. 239. Pers. Sow. t. 94. non Linn. — Stipes uncialis; pileus vix plicatus raro depresso 4 lin. latns; lam. numerosæ. Odor ingratus.

227. *A. FÄTIDUS* (Fries syst. myc. 1. p. 138.) pileo convexo-plano umbilicato plicato badio-fulvo, lamellis annulato-adnatis pallidioribus, stipite fistuloso spadiceo velutino. — Ad ramos dejectos circà Parisios ex cl. Chevall., aut. — *A. venosus* Pers. Merulius fætidus Sow. t. 21. — Odor ingratus. Gregarius; stipes uncialis basi membranulæ radiatæ sèpè innatus; pileus membranaceus $\frac{1}{2}$ unc. circiter latus.

228. *A. CAULICINATIS* (Bull. herb. t. 522. f. 2.) pileo subconvexo interdum umbonato glabro albido-rufescente maculis rufis centro variegato, lamellis albis liberis basi intùs emarginatis, stipite tenui rufo farcto sursùm glabro infernè velutino. — Ad stipites Equisetorum mortuorum, folia dejecta, etc. — Fl. fr. 2. p. 192. *A. stipitarius* / Fries syst. myc. 1. p. 138. — Stipes 2 unc. et ultrà longus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. latus.

229. *A. ANDROSACEUS* (Linn. suec. 1193. non Pers.) pileo convexo plicato ex albido-rufescente, lamellis stipiti adnatis simplicibus distinctis, stipite tenuis-

830 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

simo fistuloso sulcato glaberrimo nigro. — Ad folia decidua, in sylvis frequens. — Bolt. t. 32. Fl. dan. t. 1551. f. 1. A. epiphyllus Bull. herb. t. 569. f. 3. Fl. fr. 2. p. 164. — Bocc. mus. t. 104. non Pers. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus tenacissimus exsiccatus tortus; pileus 2-3 lin. latus.

230. A. ROTULA (Scop. carn. 2. p. 1569.) pileo convexulo umbilicato plicato albo, lamellis omnibus in annulum stipitem libere cingentem adnatis albis, stipite fistuloso striato glabro nigrescente. — In sylvis, ad stipites, folia et truncos. — Sow. t. 95. Fl. fr. 2. p. 158. A. androsaceus Bull. t. 64, 569. f. 3. non Linn. A. nigripes Schrad. Fl. dan. t. 1134. f. 1. — Mich. gen. t. 74. f. 5. — Gregarius; stipes circiter uncialis; pileus 3-4 lin. latus margine crenulatus. Variat colore albo et flavo-pallescidente.

231. A. VAILLANTII (Fries syst. myc. 1. p. 136.) pileo plano plicato lamellisque postice latissimis adnatis distantibus candidis, stipite solido glabro spadiceo sursum incrassato pallidiori. — In sylvis, ad ramulos et folia decidua, aug.-sept. — A. nitidus Gunn. — Vaill. bot. t. 11. f. 21-24. — Stipes 1 unc. longus tenacissimus basi splendens niger medio badius apice albidus; pileus striato-rugosus $\frac{1}{2}$ unc. latus; lam. simplices.

2. Eucollybice. — *Calopodes et Stipitarii* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 72.) Pileus subcarnosus laevis vix umbilicatus; lamellae adnatæ rarius liberæ; stipes cavò vel obsoletè fistulosus.

232. A. PARASITICUS (Bull. t. 574. f. 2.) pileo subcarnoso convexo mox piano pruinoso griseo-pallescidente, lamellis adnatis crassis distantibus obscurioribus, stipite incurvo fistuloso villosa. — Parasiticus in Agaricis putrescentibus, aug.-oct. — Sow. t. 343. DC. fl. fr. 2. p. 184. — Gregarius ut plurimum cespitosus; stipes subtiliter fistulosus longitudine varius 1-2 lin. crassus; pileus unc. haud attingens.

233. A. AMADELPHUS (Bull. t. 550. f. 3.) pileo subcarnoso primùm concavo dein depresso flavo-pallescidente, lamellis adnatis rufescens, stipite pleno albido incurvato adscendente basi subhirsuto. — Ad corticem arborum. — Fl. fr. 2. p. 169. — Gregarius parvulus; stipes brevis; pileus 3 lin. circiter latus sæpe excentricus; lamellæ subdecurrentes.

234. A. RAMEALIS (Bull. t. 336.) pileo subcarnoso planiusculo albido-subrufescente, lamellis angustis adnatis confertis albis, stipite farcto brevi pulvraceo. — Ad ramos aridos, aut. — Fl. fr. 2. p. 193. Desmaz. cr. exs. n. 318. A. candidus Bolt. t. 39. f. D. — Mich. gen. t. 74. f. 7. — Stipes 3-5 lin. longus vix lineam crassus tenax albidus vel rufescens; pileus 3-4 lin. latus, vetustus rugulosus et depressus. Gregarius.

235. A. CLAVUS (Bull. t. 148.) pileo subcarnoso planiusculo aurantio-rubente, lamellis adfixis latiusculis stipiteque farcto brevi glabro albidis. — Ad ramulos, folia aut truncos putrescentes, aug.-oct. — Bolt. t. 39. DC. fl. fr. 2. p. 165 pro parte. — Vaill. bot. t. 11. f. 19-20. — Gregarius parvus; stipes vix uncialis filiformis; pileus 1-2 lin. latus.

236. A. OCCELLATUS (Fries obs. 1. p. 83.) pileo subcarnoso piano albo dein umbilico obscuriore, lamellis adnatis albis, stipite fistuloso subpulverulento rufescente basi fibrilloso-radicato. — Ad terram, inter folia, aug.-nov. — A. clavus Bull. t. 569. f. 1. — Stipes obsoletè fistulosus 1-3 unc. longus subfiliiformis; pileus laevis subinde repandus; discus variat flavus fuscus et rufus; lamellæ confertæ.

237. A. TUBEROSUS (Bull. t. 256, 522. f. 4.) parvus albidus, pileo subcarnoso dein umbonato, lamellis adnatis confertis, stipite brevi fistuloso subrufescente Sclerotis innato. — Ad Sclerotia varia super fungos pileatos putridos et inter muscos, aug.-nov. — Fl. fr. 2. p. 178. Fl. dan. t. 1613. Grev. crypt. fl. t. 23. A. Amanitæ Batsch. el. cont. 1. f. 93. A. alumnus Bolt. t. 155. — Gregarius parvus; stipes obsoletè fistulosus, variat flexuosus et rufescens; pileus laevis 1-2 lin. latus. — Cel. Greville ad tuberem fulcientem ut partem plantæ habendum pronus videtur.

238. A. CONGENUS (Pers. syn. 388.) pileo subcarnoso tenui subumbonato de-

mùm piano inæquali fuligineo-livido, lamellis liberis linearibus albidis, stipite fistuloso pulverulento basi radicato strigoso. — Ad conos Pini et etiam inter folia decidua, sept.-dec. — Buxb. cent. 1. t. 67. f. 2. — Plerumque gregarius; stipes tenax pileo concolor filiformis longitudine varius; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -8 lin. latus sèpè angulatus et demùm depresso; lam. confertæ.

239. A. ESCULENTUS (Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 14. f. 4.) pileo subcarnoso obtuso argillaceo, lamellis adnexis laxis albis, stipite fistuloso tenui radicato glabro flavescente. — In ericetis, pascuis, faginetis, exeunte hyeme, vere. — A. perpendicularis Bull. t. 422. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 163. A. clavus Schæff. t. 59. — Vaill. bot. t. 11. f. 16-18. — Pileus $\frac{1}{2}$ unc. et ultrà latns subinde striatus; lamellæ subconfertæ. Edulis.

240. A. CARNEUS (Bull. t. 533. f. 1.) pileo subcarnoso lèvi subflexuoso carneo-rubo, lamellis confertis adnexis candidis, stipite subfarcito brevi squamuoso pileo concolore. — In pinetis locisque graminosis, aug.-sept. — DC. fl. fr. 2. p. 183. — Stipes firmus 1 unc. longus 1 lin. et ultrà crassus; pileus e convexo-planus $\frac{1}{2}$ unc. et parum ultrà.

241. A. ALLIATUS (Schæff. t. 99.) graveolens, pileo subcarnoso piano ruguloso lamellisque adnatis crispis albidis, stipite fistuloso brevi glabro rubo. — In ericetis collibus apricis etc., circà Parisios ex Chevall., aug.-oct. — Pers. syn. 373. A. Schæfferi Pers. obs. 2. p. 55. A. scorodonius Fries. — Mich. gen. t. 77. f. 2. — Odor Allii fortis; stipes 1 unc. et ultrà longus vix lin. crassus; pileus $\frac{1}{2}$ unc. et ultrà. Edulis.

3. Scortei (Fries syst. myc. 1. p. 126; syst. orb. veg. 1. p. 72.) Pileus carnoso-coriaceus convexulus; lamellæ posticè truncatæ secedenti-liberæ; stipes longiusculus basi villosus.

242. A. RUSCO-PURPUREUS (Pers. ic. pict. t. 4. f. 1.) pileo subcarnoso umbilicato ruguloso atro-purpureo expallente, lamellis liberis rufescentibus, stipite fistuloso rubiginoso basi caudato strigoso. — Inter folia demortua circà Parisios ex cl. Chevall., jul.-sept. — Fries syst. myc. 1. p. 129. — Solitarius vel cespitosus; stipes 1-3 unc. longus 2 lin. ferè erassis pilis rubiginosis; pileus hemisphæricus dein planus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus; lam. distantes.

243. A. PORREUS (Fries obs. 2. p. 152; syst. myc. 1. p. 128.) graveolens, pileo subcarnoso ex-albido rufescente, lamellis concoloribus subliberis, stipite fistuloso longo subrubello ad apicem attenuato basi tomentoso. — In sylvis et nemoribus, aut. — A. alliaceus Bull. t. 158, 524. f. 1. Sow. t. 81. DC. fl. fr. 2. p. 160 non Jacq. nec All. nec Willd. — Odor fortis alliaceus; stipes 3 unc. longus 1-2 lin. crassus junior pallidus adultus rufus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 unc. et ultrà latus.

244. A. OREADES (Bolt. t. 151.) pileo carnoso tenaci subumbonato albido-rufescente aut fulvo, lamellis distantibus stipiteque solido tereti viloso-corticato pallidis. — In graminosis, versuris, pascuis, maio-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 127. A. tortilis DC. fl. fr. 2. p. 194. A. pseudo-monsseron Bull. herb. t. 144, 528. f. 2. A. cariophyllæus Schæff. t. 77. A. pratensis Sow. t. 247. — Pileus $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus demùm ferè albidus; stipes 2-3 unc. longus. Gregarius, odore debili sed grato. Edulis.

245. A. PERONATUS (Bolt. t. 58.) pileo carnoso convexo dein subcoriaceo explanato, lamellis distantibus flavis pallescentibusve, stipite solido albido radicato deorsum flavo-strigoso. — In sylvulis propè Parisios inter folia decidua, jul.-nov. — Sow. t. 37. DC. fl. fr. 5. p. 48. — Stipes 2-3 unc. longus basi incurvus; pileus 1-2 unc. demùm tenuior rugulosus; lam. plus minus remotæ.

246. A. CHRYSENTERUS (Bull. t. 556. f. 1.) pileo carnoso hemisphærico subumbonato lamellisque liberis flavo-cerinis, stipite solido subincurvo basi albido hirto pilis erectis. — Ad lignum et folia mortua, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 183. — Subgregarius; stipes 2 unc. et ultrà longus 2-3 lin. crassus flavus; pileus demùm planus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus.

XXVII. *Omphalia* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 69. — *Omphalia* et

832 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

Clitocybes sp. *Fries syst. myc. I. p. 162 et 80.* — *Omphaliæ* sp. *Pers.*) *Velum plane nullum; stipes farctus dein plerumque cavus fibroso-corticatus; pileus subcarnosus vel submembranaceus umbilicatus vel infundibuliformis; caro tenuis; lamellæ a pileo discretæ adnatæ.*

1. *Fibulæformes* (*Fries orb. veg. I. p. 71.*) *Pileus submembranaceus vere umbilicatus; lamellæ vere decurrentes distantes.*

247. A. *FIBULA* (*Bull. t. 186, 550. f. 11.*) *tenellus, pileo convexo glabro lœvi ochraceo-rubcente, lamellæ albidioribus distantibus, stipite longiusculo subluteo.* — *Inter muscos, gramina, ad terram, maio-oct.* — *Sow. t. 45. DC. fl. fr. 2. p. 169.* — *Stipes junior farctus dein cavus uncialis et ultrà; pileus 2-5 lin. latus senescens albicans; lam. longissime decurrentes.*

248. A. *pyxidatus* (*Bull. t. 568. f. 2.*) *testaceo-rufescens expallens, pileo cupulari seu infundibuliformi striato subspadiceo, disco lœvi, lamellæ angustis intescentibus, stipite firmo elongato pallido.* — *Ad terram, maio-nov.* — *DC. fl. fr. 2. p. 171.* *Nees syst. f. 192.* A. *subhepaticus* *Batsch f. 211.* — *Stipes junior farctus dein cavus basi albido-villosus; lam. longè decurrentes. Magnitudine, colore incarnato testaceo sordide fulvo etc., valde variis.* *Gregarius.*

249. A. *UMBELLIFERUS* (*Linn. suec. 1192.*) *membranaceus, pileo subturbinato piano umbilicato striato, lamellæ distantibus posticè latissimis albis, stipite brevi basi pubescente.* — *In ericetis et sylvis arenosis, ad terram, maio-nov.* — *A. pseudo-androsaceus* *Bull. herb. t. 276. DC. fl. fr. 2. p. 168.* A. *nivens* *Fl. dan. t. 1015. f. 1.* A. *ericorum* *Pers. obs. I. t. 4. f. 12.* *Fries.* — *Color plerumque albus vel stramineus aut griseus; stipes unciam haud superans; pileus 4 lin. et ultrà latus.* *Gregarius.*

250. A. *EPICHYSIUM* (*Pérs. ic. pict. t. 13. f. 1; syn. 462.*) *tener cinereo-nigricans, pileo infundibuliformi striato, lamellæ angustis linearibus albido-cinereis, stipite subfarcto tenaci basi villosa.* — *Ad truncos madidos Salicis, Fagi, etc., circà Parisios ex Chevall., aut.* — *Fries syst. myc. I. p. 169.* — *Exsiccatus expallens; stipes 1 unc. longus et ultrà; pileus 1-1 unc. latus margine deflexo.* *Occurrit etiam multò major.*

β. icmadophilus (*Pers.*) *tenerrimus fragilis lamellæque plano-decurrentes obscure cinereæ.* — *Inter Sphagna circà Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves.*

2. *Umbilicati* (*Fries l. c.*) *Pileus tenuis centro depresso; lamellæ leviter decurrentes subconfertæ; stipes rigidus.*

251. A. *MUSCORUM* (*Hoffm. nom. fung. t. 5. f. 3.*) *pileo convexo-plano umbilicato striato stipiteque brevi basi incrassato flavo-fuscis, lamellæ pallidioribus.* — *Ad radices arborum inter muscos in sylvâ Rienz propè Beauvais ex cl. Graves, aut.* — *Fries syst. myc. I. p. 167.* — *Stipes arcuato-descendens; pileus 1 unc. ferè latus.*

252. A. *CAMPANELLA* (*Batsch el. fung. 74.*) *pileo convexo umbilicato striato ferragineo, lamellæ flavescensibus decurrentibus, stipite fistuloso spadiceo deorsum villoso.* — *Ad truncos Pini, in Jurasso (cl. Chaillet), maio-oct.* — *Nees syst. f. 191. DC. fl. fr. 5. p. 47.* — *Gregarinus subcespitosus; stipes radiatus firmus 2 unc. ferè longus; pileus 3-7 lin. latus tenax.*

253. A. *UMBILICATUS* (*Bull. t. 411. f. 2. nec Scop. nec Hook. nec Leyss.*) *minor albo-nitens, pileo lœvi convexo dein umbilicato margine reflexo, lamellæ adnatis flavis latis dein decurrentibus, stipite fistuloso lœvi.* — *Inter folia decidua in sylvis, aug.-nov.* — *DC. fl. fr. 2. p. 167.* A. *candidans* *Pers. Fries. Bolt. t. 17.* — *Stipes radicatus villosus 1-2 unc. longus 1-2 lin. crassus; pileus vix uncialis.*

3. *Cyathiformes* (*Fries l. c.*) *Pileus carnosò-membranaceus convexo-depressus demum cyathiformis; lamellæ adnatæ.*

254. A. *FIMBRIATUS* (*Bolt. t. 61.*) *sordide albidos, pileo demum infundibuli-*

- formi lœvi margine crispato sinnato lobatoque tenui semipellacido, lamellis adnatis longissimis angustis tenerrimis, stipite farcto gracili brevi. — Ad terram, in ligno e carie madido, circa Parisios ex Chevall., in sylva Compiègne ex Graves, aug.-sept. — Fries syst. myc. 1. p. 94. — Gregarius imo cespitosus difformis; stipes vix uncialis; pileus subcarnosus junior plano-convexus 3 unc. latus, lamellæ confertissimæ sœpè furcatæ.
255. A. FRAGRANS (Sow. t. 10.) pileo planiusculo sordidè pallido sicco albo, lamellis distinctis stipiteque cavo attenuato longo albis. — In graminosis, muscosis, arvis, propè Parisios ex cl. Chevall., Noyon ex cl. Graves, aug.-dec. — Pers. syn. 455. Fries syst. myc. 1. p. 171. — Gregarius; stipes 2-3 lin. crassus basi villosus; pileus 1-2 unc. latus subflaccidus, humidus margine striatus; lam. subconfertæ. Odor gratus ariseus.
256. A. METACHROUS (Fries syst. myc. 1. p. 172.) pileo subconvexo glabro lœvi dein planiusculo cinereo demùm albescente, lamellis confertis albidis, stipite basi obscure cinereo dein cavo æquali sursum pruinato. — Ad terram, sept.-dec. — A. cyathiformis Bull. t. 248. A. dicolor Pers. syn. 462. — Stipes tenax 1 $\frac{1}{2}$ unc. et ultra longus, nunc teres 2 lin., nunc compressus 3-4 lin. crassus; pileus uncialis et ultra. Inodorus.
257. A. EXPALLENS (Pers. syn. 461.) pileo subcarnoso umbilicato livido-cinereo humido striato, lamellis distantibus cinereis, stipite farcto æquali tenaci pallido. — In sylvis ad terram et inter muscos, aug.-oct. — Pers. syn. 461. — Buxb. cent. 4. t. 3. f. 2. — Pileus expallens planiusculus; lamellæ subdecurrentes. Sequenti minor et tenior.
258. A. CYATHIFORMIS (Bull. t. 575, 568. f. 1.) pileo subcarnoso infundibuliformi lœvi glabro nigrescenti-umbrino margine reflexo lœvi, lamellis distantibus cinerascentibus, stipite elasticо sursum attenuato. — In umbrosis inter muscos et trunco mucidos, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 170. A. sordidas Dicks. er. 16. t. 3. f. 1. Bolt. t. 59. — Vaill. bot. t. 14. f. 1-3. — Stipes 2-4 unc. longus basi villosus umbrinus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -3 unc. latus. Admodum varians.
4. *Infundibuliformes* (Fries l. c.) *Pileus junior convexulus* *dein infundibuliformis*; *lamellæ vere decurrentes confertæ*.
259. A. OBLIQUUS (Pers. ic. pict. t. 13. f. 3.) tenuis pallidè cinerens, pileo sub-infundibuliformi glabro obliquo, stipite crasso subfarcto. — Ad terram circa Parisios ex cl. Chevall. — Pileus obliquus 8 circ. lineas latns. Solitarius.
260. A. PHYLIOPHILUS (Pers. syn. 457.) albus, pileo lœvi umbilicato demùm infundibuliformi, lamellis subdecurrentibus, stipite cavo basi incurvo villoso. — Inter folia decidua in nemoribus circa Parisios ex Chevall., in sylva Compiègne ex cl. Graves, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 83. — Stipes 2-3 unc. longus; pileus 2-3 unc. latus. Gregarius subcespitosus plerumque odorus.
261. A. HYDROGRAMMUS (Bull. t. 564. f. A.) lividus exalbicansve, pileo glabro margine striato, lamellis confertis, stipite fistuloso subcompresso basi radiato strigoso. — Inter folia decidua, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 168. Fries syst. myc. 1. p. 169. — Gregarius vel cespitosus, siccus albidus; stipes subundulatus tenax 2-3 unc. longus; pileus profundè umbilicatus flaccidus 2 unc. latus.
262. A. CHRYSOLEUCUS (Fries obs. 1. p. 77; syst. myc. 1. p. 167.) pileo profundè umbilicato mollissimo glabro albido, margine reflexo striato, lamellis confertis angustissimis inæqualibus luteis, stipite farcto lutescenti-albo. — Ad trunco putridos, aug.-sept. — A. mollis Bull. t. 38. DC. fl. fr. 2. p. 170 non Schæff., nec Batsch, nec Bolt. — Gregarius; stipes uncialis et ultra; pileus 1-2 unc. latus.
263. A. CERVINUS (Hoffm. nom. p. 119. t. 2. f. 2.) pileo infundibuliformi oblique reflexo obtuso lœvi cervino, lamellis angustissimis decurrentibus albis, stipite farcto basi tuberoso tomentoso. — In sylvaticis circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — Pers. syn. 451. Nees syst. f. 174. — Stipes 3 unc. ferè longus 4 lin. crassus; pileus 1 unc. latus cum stipite contiguus; lam. 1 $\frac{1}{2}$ lin. latæ.

834 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

264. *A. squamulosus* (Pers. syn. 449.) pileo furfuraceo-squamuloso obtuso sordide alutaceo dein infundibuliformi, lamellis decurrentibus albis, stipite farcto subbulboso. — Ad terram, post pluvias, jun.-aug. — Fries obs. 2. p. 199. — Stipes tenax elasticus 1- $\frac{1}{2}$ unc. longus; pileus subflaccidus 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. latus.

265. *A. gibbus* (Pers. syn. 449.) pileo subtenui pallido umbonato glabro demum infundibuliformi, lamellis decurrentibus candidis, stipite farcto elastico sursum attenuato. — In campis et sylvis muscosis, jun.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 81. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. longus tenax basi albo-lanatus; pileus 1-2 unc. latus, margine subinvoluto. Odor gratus.

f. geotropus, albidus vel flavo-pallescens, pileo firme planiusculo late et obtuse umbonato. — *A. geotropus* Bull. t. 573. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 172. — Stipes 3 unc. longus 1 unc. erassus; pileus 3-4 unc. latus. — Ad *A. gilvum* refert cel. Greville.

266. *A. infundibuliformis* (Bull. herb. t. 286 et 553.) flavo-ferrugineus nitidus, pileo infundibuliformi nitido margine reflexo, lamellis angustis inaequalibus, stipite pleno crasso subtuberoso. — Ad folia dejecta in sylvis, aut. — Fl. fr. 2. p. 170 excl. syn. *A. flaccidus* Fries syst. myc. 1. p. 81. pro parte. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. altus; pileus 3-4 unc. latus. Gregarius.

267. *A. gilvus* (Pers. syn. 448.) magnus, pileo convexo obtuso dein infundibuliformi laevi rigido, lamellis decurrentibus e pallido-gilvis, stipite farcto subradicato basi viloso. — Inter muscos et folia, aug.-nov. — Fl. dan. t. 1606. Fries syst. myc. 1. p. 81. Grev. crypt. fl. t. 41. *A. pileolarius* Sow. t. 61. *A. cinnamomeus* Bolt. t. 22. — Gregarius; stipes variat longus et per brevevis $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus 3-4 unc. latus; lamellæ confertissimæ sèpè ramosæ. Pileus variat cinnamomeus testaceus alutaceus incarnatus, etc.

268. *A. giganteus* (Sow. t. 244.) prægrandis albidus, pileo demum infundibuliformi, lamellis decurrentibus confertis dein rufescens, stipite solido obeso. — In dumetis et pinetis Delphinatûs ex Vill., aut. — Vill. dauph. p. 1017. — Stipes 2 $\frac{1}{2}$ unc. latus et altus; pileus 3-6 unc. latus subtenuis.

XXVIII. *Clitocybe* (Fries syst. myc. 1. p. 78. excl. *Omphalariis* et *Scorteis*, — *Gymnopi* et *Omphaliæ* sp. Pers.). *Velum nullum*; *stipes æqualis* vel sursum attenuatus; *pilcus plus minus carnosus*, *junior campanulatus* vel convexus dein expansus; *lamellæ discretæ inæquales* exsuccæ immutabiles tenaces varie adfixæ vel liberæ.

1. *Chondropodes* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 69. — *Chondrop.* et *Rhizop.* Fries syst. myc. 1. p. 120 et 148.) *Stipes radicatus epidermide cartilagineâ corticatus fistulosus* aut *junior floccis farctus*, *pileus carnosus tenax glaber planiusculus*; *lamellæ subconfertæ subliberæ posticæ æquales obtusæ*.

269. *A. hirtolorum* (Bull. t. 585. f. 2.) pileo subcarnoso planiusculo laevi alutaceo-pallido, lamellis liberis confertis angustis subconcoloribus, stipite subfistuloso toto hirsuto deorsum incrassato. — In sylvis super folia putrida. — DC. fl. fr. 2. p. 182. *A. sagaram* Pers. syn. 331. — Stipes 2-3 unc. longus; pileus uncialis et ultra siccus. Sapor gratus. Cespitosus.

270. *A. aquosus* (Bull. champ. t. 17.) pileo planiusculo subcarnoso molli aquoso albo-lutescente, margine striato, lamellis liberis subserratis, stipite fistuloso fulvo fibrillas radiculosas emitente. — In sylvis umbrosis, inter muscos, aestatis fine. — DC. fl. fr. 2. p. 154. *A. melleus* Schæff. t. 45. — Stipes æqualis 2-3 unc. altus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus; lamellæ inæquales fragiles.

271. *A. briophilus* (Bull. t. 434.) pileo subcarnoso explanato laevi pallido interdum depresso, lamellis subliberis confertis albis, stipite fistuloso glabro lutescenti basi incrassato. — In sylvis et pinetis, maio-oct. — Sow. t. 127. DC. fl. fr. 2. p. 166. *A. ochraceus* Schæff. t. 255. — Var. *solitarius* et *cespitosus*; major et minor; pileus albidus alutaceus flavescens testaceus rufescens lividus. Odor vel sapor nullus.

272. *A. collinus* (Scop. carn. 432, non Pers.) pileo subcarnoso campanulato

expanso umbonato pallescenti-rubo striato, lamellis distantibus liberis, stipite fistuloso laevi glabro basi subpubescente elongato pallido. — Ad terram graminosam, aut. — Schæff. t. 220. Fries syst. myc. 1. p. 124. *A. arundinaceus* Bull. t. 403. f. A. DC. fl. fr. 2. p. 159. *A. praeensis* Batsch. f. 5. — Stipes 3-4 unc. longus rigidus; pileus uncialis et ultrà. Nunc solitarius nunc cespitosus.

273. *A. REPENS* (Bull. herb. t. 90.) caudice ramosâ rubescente repente stipites simplices vel ramosos cylindricos vix fistulosos emittente, pileis sulfureis orbicularibus dein irregulariter sinuosus, lamellis liberis concoloribus ad stipitem subdilatatis. — In sylvis super folia putrida, aut. — Fl. fr. 2. p. 185. *A. erythropus* & Fries syst. myc. 1. p. 123. — Stipes 2-4 unc. alti; pilei 8-10 fin. lati.

274. *A. ERYTHROPUS* (Pers. syn. 367.) pileo subcarnoso hemisphaerico pallescenti, lamellis liberis connexis concoloribus, stipite fistuloso elongato glabro atro-rubente basi villoso incrassato. — Inter folia decidua, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 122. — Stipes 2 unc. et ultrà longus tenax; pileus rugulosus uncialis circiter. Subcespitosus.

275. *A. ACERVATUS* (Fries syst. myc. 1. p. 122.) fasciculatus, pileo subcarnoso convexo dein explanato incarnato, lamellis liberis, stipite fistuloso rubro sursum attenuato glabro basi tomentoso. — Ad arborum radices circa Parisios ex cl. Chevall., sept. — Stipes 2-4 unc. longi laeves; pileus margine inflexus; lam. latiusculæ.

276. *A. PELIANTHINUS* (Fries syst. myc. 1. p. 112.) pileo convexo livido-purpurascente margine striato, lamellis arcuato-adnexis purpureis margine denticulis nigris appendiculatis, stipite fistuloso æquale pallente. — Ad radices Quercùs in umbrosis sylvarum circa Parisios ex Chevall., Beauvais ex Graves, aug.-sept. — *A. denticulatus* Pers. syn. 423 von Schum. — Stipes 2-3 unc. longus; pileus 1-2 unc. latus, caro alba; lamellæ reticulato-connexæ.

277. *A. CONTORTUS* (Bull. t. 36.) candice nigra subconica stipites flexuosos glabros farctos fusco-nigrescentes plurimos emittente, pileo carnoso concolor convexo obtuse umbonato, lamellis liberis caudidis. — In sylvis, ad radices arborum. — DC. fl. fr. 2. p. 185. — Stipes 4 unc. longus deñum cavus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus.

278. *A. PHATORODIUS* (Bull. t. 532. f. 2.) brunneo-fuscus, pileo carnoso umbonato margine sinnato, lamellis candidis basi arcuatis inæqualibus subliberis, stipite farcto utrinque incrassato glabro atro-fusco. — Ad terram. — DC. fl. fr. 2. p. 184. — Solitarius; stipes 2-3 unc. longus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus.

279. *A. BUTYRACEUS* (Bull. herb. t. 572.) pileo carnoso convexo dein umbonato glabro rufo-badio, lamellis subliberis crenulatis albidis, stipite farcto cartilagineo-corticato striato rufescente basi incrassato tomentoso. — Inter folia decidua, in sylvis, jun.-act. — DC. fl. fr. 2. p. 181. *A. leucophyllus* et *tricopus* Pers. — Buxb. cent. 4. t. 5. f. 1. — Stipes 2-3 unc. longus; pileus 2-3 unc. latus siccus, variat albus fuscus etc. Caro alba.

280? *A. Vinosus* (Bull. t. 54.) pileo convexo dein planiusculo deñum subumbilicato tandem situato vel lobato rufo-nigrescente tomento tenui obtecto, lamellis rufis numerosis decurrentibus, stipite pleno subcylindrico rufescente. — In arenosis, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 173. *Am. vinosa* Lam. dict. 1. p. 107. — Stipes circiter 2-unc.; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus siccus. Sapor vinoso-salsus. An ut vult cl. Steudel prioris var?

281. *A. FUSIPES* (Bull. t. 516. f. 2.) pileo carnoso subtenaci rufescenti-brunneo, lamellis subliberis distantibus serratis albido-rufescensibus, stipite cavo ventricoso sulcato albido radicato. — In sylvis, ad truncos patrescentes, jul.-nov. — DC. fl. fr. 2. p. 176. *A. crassipes* Schæff. t. 87, 88. Sow. t. 129. — Gregarius; stipes magnitudine varius; pileus 1-5 unc. latus margine inflexus variat pallidus albus et flavus. Sapor acidus. Edulis.

282. *A. VELUTIPES* (Curt. lond. 4. t. 70.) pileo subcarnoso inæquali fulvo glu-

836 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

tinoso; lamellis ventricosis albo-lutescentibus, stipite incurvo velutino nigrescente badio. — Ad truncos, aut.-hyeme. — Bolt. t. 135. Sow. t. 384. f. 3. A. nigripes Bull. t. 344, 519. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 159. — Vaill. bot. t. 12. f. 8, 9. — Cespitosus; stipes $\frac{1}{2}$ -2 unc. longus apice pallidus; pileus tenuis mollis margine striatus; lam. juniores albæ dein luteæ plus minus adnexæ.

283. A. RADICATUS (Reh. cant. 1040.) pileo umbonato rugoso glutinoso, lamellis adfixis candidis, stipite longissimo rigido basi dilatato, radice fusiformi. — In sylvis ad truncos putrescentes et arborum radices quibus radix infixus, jun.-sept. — Sow. t. 48. Pers. syn. 313. Grev. crypt. fl. t. 217. A. longipes Bull. t. 515. Fl. fr. 2. p. 184. A. umbraculum Batsch. f. 4. — Stipes spithameus; pileus 3-4 unc. latus; lamellæ non decurrentes. Color candidus vel pileo cinereo fusco fuligineo vaecino olivaceo, stipite dilatiore.

2. *Thrausti* (Fries syst. myc. 1. p. 114.). Fragiles; stipes carnosus; pileus tenuis siccus; lamellæ adnexæ emarginatæ sèpè ventricosæ margine concolori hand appendiculato.

284. A. PLATYPHYLLUS (Pers. obs. 1. p. 47; syn. 302.) pileo subcarnoso plano subvirgato cinereo-albido, lamellis latissimis distantibus basi truncatis dilutè flavis, stipite farcto æquali striato radicato lutescente. — Ad truncos, jul.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 117. A. gramocephalus Bull. t. 594. DC. fl. fr. 2. p. 186. — Buxb. cent. 4. t. 18. — Solitarius magnus; stipes 3-4 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus 3-4 unc. margine membranaceus; lamellæ $\frac{1}{2}$ unc. et ultra latæ.

285. A. CUNEIFOLIUS (Fries obs. 2. p. 99.) pileo subcarnoso glabro fuligineo-livido demùm rimoso, lamellis ventricosis albis, stipite cavo deorsum attenuato apice pruinato. — Ad terram in locis graminosis sterilibus, aug.-oct. — A. cinereo-rimosus Batsch. cont. 2. f. 206. A. ovinus Bull. t. 580. A. B. — Solitarius; stipes 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 1-2 lin. crassus pallidus; pileus convexo-planus $\frac{1}{2}$ -1 unc. latus; lam. latissimæ simplices subdecurrentes. Odor farinæ recentis.

286. A. MURINACRUS (Bull. t. 520.) pileo subcarnoso difformi rimoso-squamulosso cinereo nigro-striato, lamellis collinitis distantibus latissimis basi intus emarginatis albidis dein cinereis, stipite difformi sulcato griseo striis nigrescentibus notato demùni cavo. — In pratis et faginetis, aug.-oct. — DC. fl. fr. 2. p. 188. Sow. t. 106. A. nitratus Pers. — Rigidus magnitudine varius; stipes lacunoso-compressus; pileus primò campanulatus dein planus 1-4-uncialis. Solitarius. Odor nitrosus.

287. A. MELALEUCUS (Pers. syn. 355.) pileo carnoso molli planiusculo lœvi obtuso umbonato nigrescenti-fuligineo, lamellis consertis subadnexis subventricosis candidis, stipite subcavo longo tenui basi incrassato. — In sylvis humidis circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aug.-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 114. — Stipes 2-3 unc. longus 1-2 lin. crassus striatus lividus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -3 unc. latus siccus expallens griseus; lam. 2 lin. latæ.

3. *OEsypii* (Fries syst. myc. 1. p. 106.). Rigidì exsucci; pileus siccus minutè squamulosus aut sericeus; lamellæ latæ posticè inæquales plerumque arcuato-decurrentes raro adnatae.

288. A. LASCIVUS (Fries syst. myc. 1. p. 110.) pileo carnoso obtuso leviter sericeo alutaceo-pallido, lamellis arcuato-adfixis consertis stipiteque solido æquali basi radicato tomentoso albis. — Ad terram in sylvis, circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — Stipes rigidus apice subpruinatus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latus planus demùm depresso pallescens raro albus; lam. 3 lin. latæ. Odor fætidus.

289. A. SULPHUREUS (Bull. t. 168, 545. f. 2.) pileo carnoso subumbonato subsericeo testaceo-luteo, lamellis arcuato-adnatis subdistantibus stipiteque farcto longo flexuoso æquali sulphureis. — In sylvaticis ad terram et truncos, aut. — Sow. t. 44. DC. fl. fr. 2. p. 183. — Solitarius gregariusve; stipes 2-4 unc. longus; pileus e globoso-explanatus demùm depresso. Odor fætidus.

290. *A. OVINUS* (Bull. t. 580. excl. A. B.) pileo carnoso e convexo-planō subsquamuloso fuscescente, margine sāpius inciso, lamellis arcuato-adfixis connexis albidis, stipite farcto brevi firmo cinerascente. — In pascuis, aug.-oct. — DC. fl. fr. 2. p. 177. *A. metapodium* Fries obs. 2. p. 110. — Gregarius; stipes 1-2 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. et ultrā crassus; pileus $1\frac{1}{2}$ -2 $\frac{1}{2}$ unc. latus, variat umbrinus rufescens griseus; substantia alba fracta rubescens; lamellæ albidō-griseæ vel rufescentes. Odor farinæ recentis.
291. *A. ARCUATUS* (Bull. t. 443, 589. f. 1.) pileo campanulato demūm depresso carnoso subrufescente, disco squamuloso, lamellis latiusculis arcuato-decurrentibus subconfertis pallidis, stipite farcto striato basi incrassato. — Ad terram, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 181. — Magnitudine colore et formā maximē varius. Stipes 1 $\frac{1}{2}$ -3 unc. longus albido sāpè rufo-virgatus; pileus 2-4 unc. latus.
292. *A. IONIDES* (Bull. t. 533. f. 3.) pileo carnoso e campanulato plano demūm subdepresso humido rubro sicco alutaceo, lamellis arcuato-adnatis albidis vel lutescentibus, stipite solido sursūm attenuato glabro roseo. — In sylvis ad terram et folia putrida, aest., aut. — Pers. syn. 338. DC. fl. fr. 2. p. 182. — Stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. crassus; pileus 2 unc. serè latus; lam. 3 lin. latæ. Solitarius.
293. *A. LACCATUS* (Schäff. t. 13.) gregarius, pileo subcarnoso tenaci squamu-
loso expallente dein disco depresso, lamellis subdecurrentibus distinctis distantibus stipiteque tenaci elongato fistuloso carneo-roseis aut obscurè vio-
laceis. — Ad terram præsertim humosam, jun.-nov. — Fries syst. myc. 1.
p. 107. Grev. crypt. fl. t. 249. *A. amethysteus* Bull. t. 570. f. 1. — Humidus
unicolor; lamellæ latæ demūm albo-farinaceæ; pileus valdè varius, raro
unciam superans. Gregarius.
- a. *subcarneus*, pileo rufo vel carneo, sicco subochraceo. — Desmaz. crypt.
exs. n. 316. *A. farinaceus* Bolt. t. 64. Sow. t. 208. Fl. dan. t. 1249. *A.*
subcarnes et rosellus Batsch. cont. 1. f. 99, 100. — Schäff. t. 303, 304.
- b. *amethysteus*, pileo amethystino, sicco canescente. — Desmaz. crypt.
exs. n. 317. *A. amethysteus* Bull. t. 198. DC. fl. fr. 2. p. 172. Bolt. t. 63.
Sow. t. 187.
4. *Hygrocybi* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 68.). *Stipes nudus arhizus epidermide*
similari; pileus subcarnosus glaber subhumidus vel viscidulus e campanulato
vel convexo-expansus; lamellæ variæ, posticè æqualiter attenuatæ acutæ.
294. *A. FLAMMEUS* (Scop. carn. 443.) pileo lævi convexo sicco demūm umbili-
cato stipiteque subsarcto æquali tereti miniatis, lamellis latis adnatis distan-
tibus lutescentibus. — In sylvis graminosis et humidis. — Circè Parisios ex
cl. Chevall., aut. — *A. glutinosus* Fl. dan. t. 1009. f. 2. sinist. *A. miniatus*
Fries syst. myc. 1. p. 105. — Stipes 2 unc. circiter longus 1 lin. crassus; pi-
leus $\frac{1}{2}$ -1 unc. vix ultrā; lam. flavo-miniatæ sāpè luteæ.
295. *A. COCCINEUS* (Wulf. in Jacq. coll. 2. p. 106. non DC.) pileo convexo
expanso viscoso demūm depresso, lamellis adnatis dente decurrente con-
nexis versicoloribus, stipite cavo compresso coccineo. — In pratis et collibus
siccis, aut. — Pers. syn. 334. *A. scarlatinus* Bull. t. 570. f. 2. *A. Kermesinus*
Fl. dan. t. 715. *A. miniatus* Scop. non Fries. — Magnitudine valdè varius; ple-
rumque stipes 2 unc. circiter longus 3-4 lin. crassus striatus infernè sāpè fla-
vescens; pileus primo viscosus læte coccineus dein expallens siccus, uncialis
et ultrā.
296. *A. PUNICEUS* (Fries syst. myc. 1. p. 104 non With.) pileo campanulato
obtuso lobato aurantio-coccineo, lamellis adfixis ascendentibus flavis, stipite
crasso ventricoso basi albo. — In pratis, ang.-oct. — *A. aurantius* Auct. *A.*
coccineus Bull. t. 202 ad part. DC. fl. fr. 2. p. 186 non Wulf. Pers. — Stipes
junior farctus dein cavus 3 unc. longus $\frac{1}{2}$ -1 unc. crassus utrinque attenuatus
flavescens vel pileo concolor; pileus 2-4 unc. latus, humidus subviscosus
sanguineus dein siccus expallens; lam. 2-4 lin. latæ, variant albo-flavæ et
basi purpurascentes.

838 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

297. *A. DENTATUS* (Linn. sp. 2. p. 1641.) pileo conico acuto umbonato sublobato, margine striato, lamellis ascendentibus confertis ventricosis attenuato-liberis, stipite cylindrico striato. — In pratis muscosis, maio-oct. — *A. conicus* Schæff. t. 2. f. 9. Fries syst. myc. 1. p. 103. *A. croceus* Bull. t. 50, 524. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 191. *A. aurantiacus* Sow. t. 381. — Tourn. inst. t. 327. f. A. B. — Stipes 3-4 unc. longus 2-4 lin. crassus sèpè tortilis; pileus humidus viscosus. Variat citrinus flavusve (*A. hyacinthus* Batsch f. 28.), demum nigrescens (*A. tristis* Pers.), fuligineus (*A. inamoenus* Pers.), aurantius (*A. aurantius* Curt. lond. 2. t. 208); fractus nigrescit. Substantia aquosa.
298. *A. CHLOROPHANUS* (Fries syst. myc. 1. p. 103.) pileo submembranaceo convexo striato viscoso stipiteque æquali lœvi flavis, lamellis adnexis albidioribus. — Inter muscos in sylvis circa Parisios ex cl. Chevall. — Fragilis; stipes 2-3 unc. longus 2 lin. crassus nitidus; pileus uncialis; lam. subdistantes flavidæ. Nunquam viréns vel nigrescens.
299. *A. CERACEUS* (Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 15. f. 2.) pileo convexo-plano viscoso substriato luteo, lamellis adnato-decurrentibus distantibus stipiteque tenui subinæquali flavis. — In pratis et pascais, aug.-nov. — Sow. t. 20. Pers. syn. 337. Fries l. c. — Buxb. cent. 4. t. 28. f. 3. — Gregarius; pileus nitens $\frac{1}{2}$ -1 uncialis et ultrà; lam. latæ plus mindæ decurrentes.
300. *A. PRATTACINUS* (Schæff. t. 301.) viscosus e viridi fulvoque varius, pileo campanulato expanso subumbonato, humido striato, lamellis adnatis subdistantibus aureis, stipite æquali lœvi. — In pratis, aut. — Sow. t. 82. Pers. syn. 335. Grev. crypt. fl. t. 74. *A. chamæleo* Bull. t. 545. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 180. — Gregarius; stipes $1\frac{1}{2}$ -2 unc. altus; pileus uncialis coloris intensitate varius.
301. *A. VIRGINEUS* (Wulf. in Jacq. coll. 2. t. 15. f. 1.) candidus, pileo tenui humido convexo dein umbilicato margine subinflexo striato, lamellis decurrentibus distantibus venoso-connexis, stipite fistuloso tenui deorsum attenuato. — In ericetis, pratis, collibus graminosis, aut. — Sow. t. 32. DC. fl. fr. 2. p. 168. Grev. er. fl. t. 166. *A. ericeus* Bull. t. 188. *A. niveus* Schæff. t. 232. — Gregarius; stipes 2 unc. circiter longus 1-2 lin. crassus; pileus subuncialis. Edulis.
302. *A. FICOIDES* (Bull. herb. t. 587. f. 1.) firmus fulvo-rufescens albusve, pileo subcompacto convexo-expanso glabro, lamellis crassis decurrentibus subdistantibus, stipite farcto brevi deorsum attenuato. — In pratis, ang.-nov. — DC. fl. fr. 2. p. 173. *A. pratensis* Pers. Fries. Grev. crypt. fl. t. 91. *A. fuscovinosus* Bolt. t. 56. *A. clavæformis* Schæff. t. 307. — Gregarius; stipes $1\frac{1}{2}$ unc. longus pallescens; pileus uncialis et ultrà; lam. basi venis connexæ.
303. *A. NEMOREUS* (Pers. syn. 305.) pileo compacto carnoso latè umbo-gato planinsculo fulvo-rubescente, lamellis decurrentibus albis subdecurrentibus, stipite longissimo solido basi lanato. — Ad terram inter muscos circa Lugdunum ex cl. Balbis, oct. — Stipes 3-4 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus pallescens; pileus 3 unc. fere latus; lam. 2-3 lin. latæ. Solitarius.
5. *Dasyphylli* (Fries syst. orb. veg. 1. p. 67.). *Stipes carnosus subsolidus firmus, epidermide similari; pileus vere carnosus siccus glaber convexo-explanatus; lamellæ posticæ æqualiter attenuatae acutæ confertæ.*
304. *A. OEDEMATORUS* (Schæff. t. 259.) pileo conico pulverulento raflo, lamellis decurrentibus stipiteque solido pulverulento medio ventricoso rufescens. — In sylvis, vere et aut. — *A. fusiformis* Bull. t. 76. DC. fl. fr. 2. p. 177. — Subcespitosus; stipes 2-3 unc. altus; pileus uncialis.
305. *A. RAMOSUS* (Bull. t. 102.) lacteus, pileo hemisphærico dein convexo orbiculari glabro, lamellis adnatis angustis, stipitibus solidis glabris basi longè connatis et ramos simulantibus. — Ad truncos vetustos, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 178. — Stipes circiter 4 unc. alti; pileus 2 unc. latus siccus. Cespitosus.
306. *A. LIGNATILIS* (Pers. syn. 368?) pileo irregulari subextento villosulo albido, lamellis adnatis confertis candidis, stipite farcto flexuoso basi vil-

loso. — In ligno putrido Fagi circa Parisios ex cl. Chevall., ang.-dec. — Fries syst. myc. I. p. 95. — Cespitosus; stipes varie tortus 2 unc. longus 1-3 lin. crassus; pileus 1-2 unc. latus; caro alba tenax. Odor farinæ recentis.

307. A. GRAMMOPODIUS (Bull. herb. t. 548 et 585. f. I.) spadiceus, pileo campanulato disco dilatato obtuse umbonato piloso-squamoso, lamellis confertis adnatis subdecurrentibus albis lutescentibusve, stipite solido sulcato glabro flexuoso connato. — Ad terram, aut. — Fl. fr. 2. p. 178. Fries syst. myc. I. p. 93. — Stipes 3 unc. circiter longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus colore pilei; pileus 3-5 unc. latus albus aut rufescens.

308. A. DEALBATUS (Fries syst. myc. I. p. 92.) albidus, pileo planiusculo saepè depresso subinæquali tenui lævi, lamellis angustis adnatis confertis, stipite tenui farcto æquali glabro. — In arvis circa Liancourt ex cl. Graves, aug.-nov. — Inodorus, subgregarius; stipes brevis, pileus 1-2 unc. latus. Variat colore fuscescente incarnato, etc.

309. A. ODORUS (Bull. t. 176, 556. f. 3.) fragrans ex albo sordide virens, pileo carnoso planiusculo lævi, lamellis confertiis decurrenti-adnatis, stipite farcto subflexuoso inæquali glabro. — In sylvis, aug.-nov. — Sow. t. 42. DC. fl. fr. 2. p. 175. Fl. dan. t. 1611. Grev. crypt. fl. t. 28. A. anisatus Pers. — Odor anisens; statura admodum mutabilis; stipes nunc longus tenuis unc. brevis tuberosus; pileus 1-3 unc. latus depresso vel umbonatus. Var. glauco-aerugineus, pileo viridi lamellis albidis, pileo albo lamellis viridibus. Edulis.

310. A. PALOMET (Thore chl. land. 477.) pileo tenui suborbiculato margine albo centro virescente demù rufescente, lamellis albis confertis non decurrentibus, stipite pleno tereti basi subtumido. — In sylvis et umbrosis agri Syrtici propè Dax, aest., aut. — DC. fl. fr. 5. p. 49. — Odor gratus. Edulis. Cum A. virente Scop. conjugit cl. Fries.

311. A. FUMOSUS (Pers. syn. 348.) rigidus, pileo carnoso glabro planiusculo fuligineo-livido, lamellis adnatis confertis stipiteque farcto lævi sordide albis. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aug.-oct. — Fries syst. myc. I. p. 88. — Gregarius; stipes 2-3 unc. longus, 2-3 lin. et ultra crassus; pileus 1-3 unc. junior fuligineo-nigricans dein cinereo-lividus.

312. A. PULLUS (Pers. syn. 349.) durus, pileo carnoso convexo-explanato obtuso subfusco, margine albicante, lamellis decurrentibus confertis albis, stipite farcto striato basi-incrassato albo-cinerascente. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aut. — A. Schumacheri Fries syst. myc. I. p. 87. — Stipes 3-4 unc. longus subinde squamulosus; pileus 3-6 unc. latus; lam. 2-3 lin. latæ. Edulis.

313. A. NEBULARIS (Batsch. cont. 2. f. 193.) pileo compacto primum hemisphærico dein convexo margine reflexo lævi cinerascente, lamellis leviter decurrentibus confertis griseo-albis, stipite farcto albido fibrilloso basi ventricoso striato. — In sylvaticis, aut. — Fries syst. myc. I. p. 86. A. pileolarius Bull. t. 400. DC. fl. fr. 2. p. 173. A. mollis Bolt. t. 40. — Gregarius solitariusve; stipes 3 unc. et ultra longus; pileus pulvinatus 2-5 unc. latus. Leviter odor. Edulis. — Hunc ab A. gilvo non diversum censem cel. Gréville.

314. A. AURICULA (DC. fl. fr. 5. p. 48.) pileo suborbiculari griseo margine involuto, lamellis decurrentibus albis, stipite brevi solido æquali albescente. — In graminosis circa Aurelium, aut. — Am. auricula Dub. fl. orl. p. 168. — Edulis.

315. A. ERYNGII (DC. fl. fr. 5. p. 47.) pileo subirregulari convexo-plano sordidè raso, marginibus revolutis, lamellis decurrentibus stipiteque solido brevi tereti albis. — Ad collum Eryngii campestris parasiticus, aut. — Mich. gen. t. 73. f. 2. — Stipes saepè etiam excentricus. Edulis.

XXIX. *Galorrhœus* (Fries syst. myc. I. p. 61; syst. orb. veg. I. p. 75.). *Velum nullum*; *stipes firmus in pileum diffusus*; *pileus vere carnosus firmus plano-depressus umbilicatus*; *lamellæ simplices inæquales lactescentes posticè attenuatae adnato-deurrentes*.

840 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

316. *A. VELLEREUS* (Fries syst. myc. I. p. 76.) albus, pileo umbilicato tomentoso rigido, lamellis angustis distantibus, lacte albo, stipite solido obeso. — In fagetis, dumetis, etc., aug.-nov. — *A. Listeri* Sow. t. 104. *A. piperatus* var. Pers. etc. — Gregarius; stipes pubescens; pileus subconvexus. Odor ingratius. Venenatus.

β. exsuccus (Pers. syn. 429.) exsiccens, pileo infundibuliformi, tomento depresso, lamellis latis crassis pallescentibus. — Buxb. cent. 4. t. 1.

317. *A. PIPERATUS* (Scop. carn. 449.) pileo infundibuliformi rigido glabro albo, lamellis angustissimis confertis repetito-dichotomis, lacte acri stipiteque solido obeso albis. — In sylvis, aut. — Bolt. t. 21. Fl. dan. t. 1132. *A. acris* Bull. t. 200. DC. fl. fr. 2. p. 141 non Bolt. *A. amarus* Schäff. t. 83. — Firmus; stipes 1-2 unc. longus et ferè crassus; pileus 4-6 unc. latus subinde flavesiens, margine deflexo, juniori involuto. Edulis. Lacte copioso et valde acri scatet.

318. *A. PARGAMENUS* (Swartz in vet. ac. handl. 1809. p. 90.) pileo planiusculo lento glabro albido, lamellis confertis angustis, lacte albo, stipite farcto longiusculo obscuriori. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., Compiègne ex cl. Graves, aug.-sept. — Fries syst. myc. I. p. 76. *A. piperatus* Batsch. cont. I. f. 59. non Scop. — Stipes 2-3-unc. demum cærulescens vel fuscescens; pileus elasticus convexus dein depresso 2-unc. et ultra. Priori similis ex Fries.

319. *A. DYCNOGALUS* (Bull. herb. t. 584.) glaber, pileo convexo demum planiusculo depresso testaceo aut aurantiaco interdum zonis griseis notato, lamellis inæqualibus subdecurrentibus albescientibus ochraceisve, lacte insipido stipiteque solido albis. — In sylvis. — DC. fl. fr. 2. p. 141. — Subsolitarius; stipes 2-unc.; pileus 2-3 unc. latus.

320. *A. SERIFLUUS* (DC. fl. fr. 5. p. 45.) totus fusco-subfulvus siccus firmulus, pileo plano marginibus subrevoluto demum concavo, lamellis subdecurrentibus dilutioribus, lacte seroso acri, stipite æquali solido. — In sylvis Ilicinis et ericetis circa Monspelium. — Stipes 1-2 unc. altus 2-3 lin. crassus; pileus 2-3 unc. latus.

321. *A. ZONARIUS* (Bull. herb. t. 104.) pileo convexo demum planiusculo-concavo incarnato-vitellino zonato, lamellis subdecurrentibus albis, lacte acri, stipite farcto brevi albido. — In graminosis et sylvis ad terram, jul.-oct. — DC. fl. fr. 2. p. 141. *A. flexuosus* Pers. syn. 430. *A. flexuosa* β Fries. — Vaill. bot. t. 12. f. 7. — Gregarius; compactus; stipes vix uncialis; sæpe excentricus; pileus 2-4 unc. latus; lamellæ crassæ ligneæ distantes.

322. *A. AZONITES* (Bull. t. 559. f. 1.) pileo convexo demum concavo flexuoso umbrino azonato, lamellis decurrentibus flavis, lacte albo, stipite farcto brevi cinerascente. — In sylvis passim. — DC. fl. fr. 2. p. 142. *A. umbrinus* Pers. syn. 435. *A. flexuosus* α Fries syst. myc. I. p. 74. — Solitarius compactus; stipes 2 circ. uncias longus; pileus 2-3 unc. latus; lam. crassæ ligneæ distantes. An ut vult cl. Fries cum priori conjugendus?

323. *A. PYROGALUS* (Bull. t. 529. f. 1.) pileo sicco glabro planiusculo plumbeolivido zonato, lamellis distantibus flavo-rubescientibus, lacte primùm sub dulci demum acerrimo, stipite cavo cinerascente. — In nemoribus et pratis inter gramina, aug.-oct. — DC. fl. fr. 2. p. 142. *A. rusticanus* Scop. Krapf. t. 4. f. 8. — Stipes primò farctus 1-½ unc. et ultra longus 3-5 lin. crassus; pileus planus 2-3 unc. firmus demum sordide lutescens.

324. *A. FULGINOSUS* (Fries syst. myc. I. p. 73.) pileo azono sicco umbrino e convexo plano demum depresso fuligine fuscâ consperso, lamellis ochraceis, lacte ex albo-crocato, stipite demum cavo fuligineo. — In sylvis umbrosis, aug.-oct. — *A. azonites* Bull. t. 567. f. 3. — Krapf. t. 4. f. 5-7. — Stipes demum cavus 2-3 unc. longus 3-5 lin. crassus fragilis; pileus 1-3 unc. latus; caro alba dein crocato rubra; lamellæ juniores albae.

325. *A. FLUMBEUS* (Bull. t. 282. 559. f. 2.) pileo latissimo infundibuliformi sicco

- azono nigro-fusco fuliginoso, lamellis flavescentibus, lacte albo acerrimo, stipite intescenti-fuligineo demum cavo.* — In sylvis, aug.-sept. — DC. fl. fr. 2. p. 144. A. Listeri Sow. t. 245. — Stipes 2 unc. circiter altus demum cavus; pileus perlatus saepè spithamæns; caro compacta alba.
326. A. GLYCOSMUS (Fries obs. 2. p. 194; syst. myc. 1. p. 72.) oolidus, pileo tenui squamuoso sicco opaco sublurido, lamellis lutescentibus confertis, lacte albo demum acri, stipite glabro. — Ad terram circa Parisios ex cl. Chevall., jul.-oct. — Fragilis; pileus planiusculus saepè umbonatus 3-unc. et ultra; stipes cavus fistulosus 1-3-unc. Variat luridus, fusco-testaceus, incarnatus, rufescens.
327. A. RURUS (Scop. carn. 451. non Pers.) acerrimus, pileo umbonato demum infundibuliformi sicco polito badio-rubro, lamellis rufescentibus, lacte albo, stipite farcto rufescente. — Ad terram, jul.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 72. — Vaill. par. p. 61. — Inodorus; stipes 2 unc. longus basi pubescens; pileus 2-4 unc. latus, caro albida; lam. juniores albo-incarnatae.
328. A. TITHYMALINUS (Scop. carn. p. 452.) acris, pileo sicco glabro demum depresso obsoletè zonato pallide luteo, lamellis incarnato-pallidis, lacte albo, stipite solido pallido. — In nemorosis sylvaram ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves. — Fries syst. myc. 1. p. 71. A. ichoratus Batsch. cont. 1. f. 60. A. testaceus & Pers. syn. 431. — Stipes 3 unc. longus; pileus centro saepè rubescens 2-3 unc. latus rugulosus.
329. A. THEIOGALUS (Bull. t. 567. f. 2.) subacris, pileo convexo obsoletè umbonato dein depresso sicco glabro subzonato rufo-fulvo, lamellis sublutescentibus, lacte flavo, stipite solido rufo. — In sylvis nemorosis, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 142. Pers. syn. 431. — Stipes demum pileo obscurior; pileus 2 unc. latus; caro alba demum flavescentis.
330. A. SUBDULCIS (Pers. syn. 433.) pileo depresso saepè umbonato glabro polito sicco rufescente, lamellis incarnatis demum ferrugineis, lacte immutabili albo subdulci, stipite dein cavo glabro. — In sylvis, graminosis, etc., aest. aut. — DC. fl. fr. 2. p. 144. A. dulcis Bull. t. 224. A. B. A. lactifluus Bolt. t. 3. Sow. t. 204. — Stipes 2 unc. circiter altus; pileus 2-3 unc. latus. Sapor mitis demum nauseosus.
- β. camphoratus (Fries) oolidus, pileo obsoletè zonato, lamellis lutescentibus. — A. camphoratus Bull. t. 567. f. 1. A. cimicarius Batsch. cont. 1. f. 69. — Sapor ingratus. An potius suadente cl. Bull. species propria?
331. A. QUIETUS (Fries syst. myc. 1. p. 69.) dulcis, pileo obtuso laevi sicco opaco margine deflexo, lamellis testaceo-rufescentibus, stipite solido firme rufescente. — In sylvis circa Parisios ex Chevall., aut. — A. rubescens Fl. dan. t. 1069. f. 2. A. lactescens Linn. — Stipes 2-3 unc. longus 1 unc. et ultra crassus; pileus 3 unc. latus junior obscure cinnamomeus, demum expallens. Odor nullus.
332. A. MITISSIMUS (Fries syst. myc. 1. p. 69.) dulcis, pileo depresso papillato sicco laevi aurantiaco, lamellis confertissimis dilutioribus, lacte albo, stipite cavo longo aurantiaco. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-nov. — A. testaceus & Pers. syn. 432. — Stipes 2-3 unc. longus 3-4 lin. crassus; pileus leviter carnosus 1-2 unc. latus; lam. 1 lin. latæ.
333. A. AURANTIACUS (Fries syst. myc. 1. p. 69.) pileo planiusculo subviscoso azono aurantiaco, lamellis confertis lutescentibus, lacte albo, stipite elongato laevi. — In sylvis muscosis, aug.-oct. — A. testaceus var. aurantiacus Pers. A. hybridus Scop. — Batt. t. 16. f. A. — Stipes 3 unc. longus; lac acre.
334. A. DELICIOSUS (Linn. sp. 1641.) pileo convexo margine reflexo demum plano-depresso viscoso obsoletè zonato aurantio-expallente, lamellis lacteaque aurantiacis, stipite cavo glabro scrobiculato. — In Pinetis, jul.-nov. — Sow. t. 202. DC. fl. fr. 2. p. 143. A. zonarius Bolt. t. 141. — Buxb. cent. 5. t. 45. f. 1. — Stipes 1-2 unc. longus; pileus primò glaber demum subtomentosus

2-3 unc. latus; vulnera lamellarum eleganter saepe virent. Gregarius. Edulis ex Pers.

335. A. PALLIDUS (Pers. syn. 431.) pileo convexo margine revoluto demum planiusculo umbilicato viscoso laevi azono stipiteque brevi cavo firmo pallide lutescentibus, lamellis lacteaque albidis. — In sylvis circa Parisios ex Chevall., Lille ex cl. Desmazieres, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 67. A. subinvolutus Batsch. t. 37. f. 204 ex Desmaz. — Gregarius; stipes 1-2 unc. longus $\frac{1}{2}$ -1 unc. crassus laevis; pileus 2-3 unc. latus; lam. 2 lin. latæ.

336. A. BLENNIUS (Fries obs. 1. p. 60; syst. myc. 1. p. 67.) pileo firmo demum depresso viscoso subguttato azono virescente, lamellis lacteaque acerrimo albis, stipite farcto brevi cinerascenti-viridi. — Ad terram circa Parisios ex cl. Chevall., in sylvâ Chantilly ex cl. Graves, aut. — A. viridis Schrad. non With. Huds. A. xylophilus & viscosus Pers. syn. 438. — Krapf. schw. t. 4. f. 11-13. — Stipes subindè cavus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus margine juniori inflexo.

337. A. ACRIS (Bolt. t. 60 non Bull.) pileo planiusculo subobliquo viscoso cinnereo-fuligineo, lamellis subdistantibus primò albidis dein flavis, lacte ex albo rubescente, stipite farcto albido. — In Fagetis et nemoribus frondosis, aug.-nov. — Pers. syn. 437. A. deliciosus var. Batsch. cont. 1. f. 68. Krapf. schw. t. 4. f. 4. — Buxb. cent. 4. t. 17. f. 1. — Stipes deorsum attenuatus brevis; pileus emarginatus; lac acerrimum albidum mox roseum dein flaves- cens.

338. A. LURIDUS (Pers. syn. 436.) pileo planiusculo margine deflexo obsoletè zonato viscoso-larido, lamellis albis abbreviatis, lacte rubescente, stipite cavo pallido. — In ericetis, locis graminosis circa Parisios ex cl. Chevall., Beauvais ex cl. Graves, aut. — A. zonarius With. Sow. t. 203. A. fuscus Schäff. t. 235. — Buxb. cent. 4. t. 17. f. 2. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. et ultrà longus; pileus 2-3 unc. latus, zonis fuscis; lac primò album.

339. A. NECATOR (Bull. t. 14.) pileo demum plano-disciformi glabro zonato olivaceo-umbrino margine villosi involuto demum evoluto, lamellis albidis subincarnatisve, lacte albo, stipite brevi farcto pileo dilutiori. — In sylvis et nemoribus, aug.-oct. — Pers. syn. 435. A. necator & DC. — Krapf. schw. t. 5. f. 1-4. — Stipes intùs albus; pileus viscosus firmus; lamellæ interdum lutescentes. Valde venenatus.

340. A. TORMINOSUS (Schäff. t. 12.) pileo umbilicato glabro zonato pallido, margine revoluto barbato, lamellis albis, lacte albo acerrimo, stipite cavo laevi. — In ericetis, versuris et locis apricis, jun.-oct. — Sow. t. 103. Fl. dan. t. 1068. A. necator Bull. t. 529. f. 1. — Buxb. cent. 4. t. 16. — Stipes 2-4 unc. altus; pileus rubescens vel pallidè ochraceus 3-4 unc. latus. Venenatus.

341. A. SCROBICULATUS (Scop. carn. 450.) pileo perlato adglutinato-villoso demum evoluto rigido azono flavo, margine barbato, lamellis albidis, lacte albo mox sulphureo, stipite cavo maculato. — In sylvis montosis Abietinis, aug.-oct. — Schäff. t. 227, 228. Fries syst. myc. 1. p. 62. A. torminosus Vill. dauph. p. 1018 non Schäff. — Magnus; stipes apice scrobiculato-maculatus flavus.

342. A. CONTROVERsus (Pers. syn. 430.) albus, pileo planiusculo villoso maculis zonisque sanguineis variegato margine revoluto, lamellis confertis pallidis incarnatisve, stipite solido subviloso. — In sylvis, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 62. A. sanguineus Batsch. cont. 2. f. 201. — Gregarius subcespitosus; stipes 2 unc. longus; lam. tenues.

XXX. Russula (Pers. obs. 1. p. 100-105. Nees syst. p. 199. Fries syst. myc. 1. p. 54; syst. orb. veg. 1. p. 76.). *Velum nullum; stipes æqualis glaber; pileus disco carnosus margine tenuis; junior campanulatus demum planus centro depresso, margine nunquam involuto; lamellæ æquales subæqualesve exsuccæ; sporulæ albæ vel lutescentes.*

* *Lamellis furcatis pluribusque dimidiatis; sporulis albis. Venenati.*

343. A. NIGRICANS (Bull. t. 212, 370. f. 2. 579.) pileo depresso olivaceo demum nigrescente adusto, margine laevi, lamellis crassis distantibus inaequalibus albis, stipite solido obeso breviusculo cinereo nudo. — In sylvis et ericetis, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 156. A. adnatus Pers. Fries. — Compactus; pileus 3-6 unc. latus demum diffractus; caro alba, fracta aut immutabilis aut passim rubescens vel nigrescens; stipes 1-2 unc. altus. Odor debilis subdulcis.

344. A. FURCATUS (Pers. syn. 446.) inodorus, pileo planiusculo margine deflexo demum subfundibuliformi subviridi, margine laevi, lamellis furcatis candidis, stipite farcto albo. — In sylvis cæsis, aug.-sept. — Fl. fr. 2. p. 140. A. bifidus Bull. t. 26. — Stipes 1-2 unc. altus demum cavus spongiosus; pileus 3-4 unc. latus. Sapor nauseosus demum amaricauus.

β. heterophyllus (Fries) mitis, pileo planiusculo albido sordide virescente aut livido, margine laevi, lamellis furcatis dimidiatisque. — A. pectinaceus a Bull. t. 509. f. L. M. N. DC. fl. fr. 2. p. 139. A. lacteus, virescens et lividus Pers. syn. 439, 446 et 447. A. livescens Batsch. f. 67.

345. A. FÆTENS (Pers. syn. 443.) acris fætidus, pileo convexo-depresso viscoso flavo margine tuberculato-sulcato juniori fornicato, lamellis connexis stipite que cavo albis. — In sylvis, aug.-sept. — DC. fl. fr. 2. p. 139. A. piperatus Bull. t. 292 non alior. — Admodum rigidus; pileus plus minus pallidus 4-unc. et ultra; lam. plures dimidiatae aliae basi furcatæ.

346. A. RUBER (DC. fl. fr. 2. p. 140.) acerrimus, pileo compacto sicco roseo-sanguineo margine laevi, lamellis subdecurrentibus 2-3 furcatis candidis, stipite pleno dein spongioso. — In sylvis, jul.-sept. — A. sanguineus Bull. t. 42. — Amarissimus; stipes firmus a unc. longus, saepè roseo-tinctus; pileus 3-4 unc. latus; lamellæ confertæ.

** *Lamellis subæqualibus; sporulis albis. Noxii.*

347. A. FRAGILIS (Pers. syn. 440.) minor, pileo tenui depresso flexuoso margine sulcato, lamellis latis simplicibus candidis, stipite farcto fragili albo. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 57. A. niveus Pers. syn. 438. — Valde acris; stipes uncialis vel parvum ultra; pileus subirregularis saepè undulato-difformis margine tuberculatus. Variat pileo rubro, purpurascente, flavo, viridi, albo, etc.

348. A. PECTINACEUS (DC. fl. fr. 2. p. 139 excl. var. α.) major, pileo compacto campanulato demum subdepresso margine demum sulcato, lamellis latis subæqualibus candidis, stipite firmo pleno cylindrico albido. — In sylvis frequentissimus, æst. aut. — A. integer Bolt. t. 1. Sow. t. 201. A. emeticus Fries syst. myc. 1. p. 56. — Tourn. inst. t. 327. — Stipes 1-1½ unc. longus; pileus 2-6-unc.; lamellæ venoso-connexæ, breviores perpaucæ. Sapor acris.

α. fulvus (Bull. t. 509. f. O. P. Q. V.) pileo roseo sanguineo rubro. — A. emeticus Schæff. t. 15. Fl. dan. t. 1009. A. sanguineus Batsch. el. f. 13. — Buxb. cent. 5. t. 47 f. 1.

β. cyanoxanthus, pileo livido cæsio cæruleo. — A. cyanoxanthus Schæff. t. 93. Pers. syn. 445.

γ. virescens, pileo fusco olivaceo viridi. — A. virescens Schæff. t. 94.

δ. ochroleucus (Bull. t. 509. f. R.) pileo flavo ochrolenco. — A. ochroleucus Pers. — Buxb. cent. 5. t. 45. f. 2.

*** *Lamellis omnibus æqualibus; sporulis lutescentibus.*

349. A. NITIDUS (Pers. syn. 444.) fragilis, pileo tenui planiusculo demum depresso tenui margine sulcato, lamellis latis subdistantibus æqualibus flavis, stipite tenui spongioso farcto albo vel flavescente. — In sylvis, aug.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 55. A. purpureus Schæff. t. 254. A. nauseosus et vitellinus Pers. syn. 446. 442. A. risigallinus Batsch. cont. 1. f. 72. — Minor; stipes 1 unc. longus; pileus 1-1½ unc. latus purpurascens, rufus, subolivaceus, luteus; lam. venoso-connexæ nitidae. Sapor nauseosus.

844 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

350. A. LUTBUS (Huds. ed. 2. p. 611.) pileo subviscoso umbilicato flavo-expallente, margine lœvi, lamellis angustis confertis æqualibus vitellinis, stipite longiusculo albo. — In sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., in sylvâ Belloy propè Beauvais ex cl. Graves, aug.-sept. — Pers. syn. 442. — Stipes subcavus 1- $\frac{1}{2}$ unc. longus; pileus plano-depressus 1-2 unc. latus flavus expallens raro albns; lamellæ venoso-connexæ. Sapor mitis.

351. A. ALUTACEUS (Pers. syn. 441.) pileo subcompacto campanulato demum planiusculo, margine demum sulcato, lamellis latis æqualibus alutaceis, stipite farcto firmo crasso albo. — In sylvis nemorosis, aug.-sept. — Fries syst. myc. 1. p. 55. A. campanulatus, griseus, cœruleus, olivaceus, ochraceus Pers. syn. 440, 445, 447 et 443. — Pilens sæpè viscosus 2-6-unc.; lam. $\frac{1}{2}$ unc. usque latæ venoso-con junctæ juniores confertæ. Quovis colore occurrit. Sapor mitis edulis.

γ Stipes centralis velatus.

XXXI. *Tricholoma* (Fries syst. myc. 1. p. 36. — Cortinarii et Gymnopi sp. Pers.). *Velum fibrillosum marginale fugacissimum*; *stipes firmus squamosus vel e fibrillis concretis striatus*; *pileus carnosus margine tenui*, júniori inflexo cum velo contigo; *lamellæ inæquales exsuccæ emarginatæ vel rotundatæ*.

* *Pileo semper sicco lœvi glaberrimo margine tenui inflexo flocculoso-pruinoso, lamellis subrotundatis confertis; stipite in pileum diffuso.*

352. A. NUDUS (Bull. t. 439.) pileo tenui in centro tantum carnosò hemisphærico dein regulariter convexo tandem irregulariter concavo vel situato glabro lilacino-rufescente, lamellis rotundatis dilatè violaceis, stipite solidò æquali nudo. — In sylvis, aut. — Pers. syn. 277. DC. fl. fr. 2. p. 195. — Buxb. cent. 4. t. 12. f. 1. — Gregarius. Stipes 2 unc. longus 3-4 lin. crassus lœvis; pileus 2-unc. et ultrà; lam. latiusculæ confertæ. Variat magnitudine, colore ochraceo-violaceo rufescente violaceo-fuscescente.

353? A. BREVIPES (Bull. herb. t. 521. f. 2.) pileo carnosò conico demum planiusculo umbonato aut lœviusculo cinereo, disco nigricante, lamellis confertis emarginatis griseo-cinereis, stipite solidò nudo brevissimo concolore. — Ad terram. — Pers. syn. 360. DC. fl. fr. 2. p. 179. — Stipes unc. 1 vix longus intus rubescens; pileus 3 unc. latns subemarginatus. Solitarius aut subgregarius.

354. A. HUMILIS (Pers. syn. 360.) pileo carnosò latissimo planiusculo molli fuscescente, disco obsoletè squamuoso, lamellis confertis rotundatis albidis, stipite farcto brevi cinerascente pulverulento-villoso. — In arvis et pratis propè Compiègne ex cl. Graves, aut. — Fries syst. myc. 1. p. 51. — Buxb. cent. 4. t. 31. f. 1. — Gregarius sæpè cespitosus; stipes 1-2 unc. longus 4-6 lin. crassus; pileus 2-5-uncialis nunc umbonatus nunc depresso-nigricans fuscus lividus pallidus. lam. confertæ.

355. A. BULBOSUS (Huds. ed. 2. p. 611. non Sow. Pers. nec Bull.) pileo obtuso subcompacto glabro, margine villoso-pruinoso, lamellis rotundatis liberis stipiteque solidò subbulbosò villoso subviolaceis. — In nemoribus, hortis, graminosis, aut. — Bolt. t. 147. A. violaceus Vill. dauph. p. 1020. Fl. dan. t. 1133. Sow. t. 209. A. personatus Fries. A. bicolor Pers. — Buxb. cent. t. 4. f. 11. — Stipes 1-3 unc. longus 1 unc. ferè crassus, junior totus squamuoso-villosum dein nudus fibrillosus; pilens 2-6-unc., variat violaceus purpureo-lilacinus hepaticus lividus albidus; lam. confertæ.

356. A. DASYPUS (Pers. syn. 348.) pileo carnosò compacto glabro convexo murino, lamellis stipiteque solidò tomentoso candidis. — Ad trancos Quercinos circa Parisios raro ex cl. Chevall. — Subcespitosus; stipes tenax 2 unc. longus; pileus durus 3 unc. latns; lamellæ emarginato-adnexæ 3 lin. latæ. Odor et sapor fortis ingratus americans.

357. A. CINERASCENS (Bull.-herb. t. 428.) totus cinerascens fragilis firmus, pi-

leo convexo demum coneavo umbonato margine sinuato, lamellis latis densis inaequalibus, stipite pleno aequali. — In sylvaticis, aut. — DC. fl. fr. 2, p. 187. A. decastes Fries syst. myc. I. p. 49? — Solitarius subcespitosus: stipes 2-3 unc. longus; pileus 2-3 unc. latns.

358. A. ACERBUS (Bull. t. 571. f. 2.) pileo convexo carnoso obtuso glabro helvolo margine involuto, lamellis confertis emarginatis angustis pallidis, stipite solido subbulboso punctato-squamuloso pileo concolore. — Ad terram. — Pers. syn. 328. DC. fl. fr. 2, p. 175. — Stipes 2 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. et ultra crassus flavescens squamulis nigris; pileus 4 unc. latus; lam. conferta. Subcespitosus.

359. A. MOLYBDODCEPHALUS (Bull. t. 523.) pileo subearnoso subumbonato glabro fusco-aeneo, lamellis rotundatis latissimis stipiteque solido apice squamuloso griseo pallidis. — Ad terram. — DC. fl. fr. 2, p. 181. A. aeneus Pers. syn. 302. A. molybdinus Fries syst. myc. I. p. 49. — Stipes 4-6 unc. longus 1 unc. crassus; pileus 5-6 unc. latus; lamellæ unc. 1 ferè latæ. Subcespitosus.

* * * *Pileo semper sicco laevi saepè virgato vel fibrilloso, margine nudo mox evoluto, stipite solido glabro striato a pileo discreto.*

360. A. TUMIDUS (Pers. syn. 350.) pileo carnoso convexo-plano laevi sicco cinereo, lamellis distantibus latis stipiteque longo solido tumido striato candidis. — In sylvis circa Parisios raro ex cl. Chevall., sept. — Fries syst. myc. I. p. 48. — Stipes subventricosus substriatus 3-unc. et ultra; pileus 3-4 unc. latus; lam. $\frac{1}{2}$ unc. latæ. Sapor mitis.

361. A. PHAIODCEPHALUS (Bull. t. 555. f. 1.) pileo carnoso campanulato umbonato subrepando badio fibrilloso, lamellis liberis lutescentibus, stipite longo solido tuberoso fuligineo rufo-variegato. — Ad terram. — Pers. syn. 302. DC. fl. fr. 2, p. 186. — Stipes 4 unc. longus basi albicans; pileus late umbonatus 3 unc. usque latus leviter sericeus; lamellæ unc. 1 ferè latæ.

362. A. FRUMENTACEUS (Bull. t. 571. f. 1.) pileo convexo-obtuso demum subdepresso glabro helvolo-rubescenti rufescenti variegato, lamellis liberis lutescentibus, stipite solido aequali rufo-striato. — In sylvis, ad finem aest. — DC. fl. fr. 2, p. 187. — Gregarius; stipes 2 unc. altus crassus; pileus 2-3 unc. latus.

363. A. CARTILAGINEUS (Bull. t. 589. f. 2.) pileo carnoso subdifformi undulato glabro nigrescente, lamellis rotundatis confertis subliberis alutaceis, stipite solido aequali subcinereo striis rufescientibus variegato. — Ad terram. — Pers. syn. 356. DC. fl. fr. 2, p. 188. — Solitarius compactus; stipes 2-3 unc. longus basi albicans; pileus 2-3 unc. latus; lam. 3 lin. latæ.

364. A. GRAVEOLENS (Pers. syn. 361.) pileo carnoso crasso subhemisphaeric glabro fuligineo-cinereo, lamellis confertis emarginato-adnexis sordide albis, stipite solido subrivilioso albido. — In graminosis circa Parisios ex Chevall. Pileus 2 unc. ferè latus 3-4 lin. crassus. Sapor et odor fortis.

* * * *Pileo semper sicco squamoso, margine juniori involuto tomentoso vel villosus, stipite subsquamoso a pileo subdiscreto.*

365. A. LEUCOCEPHALUS (Bull. t. 428. f. 1. p. 536.) candidus, pileo primum sphærico-campanulato dein plano irregulari demum saepè rimoso-squamoso, lamellis emarginatis confertis, stipite solido obeso glabro dein nigro-maculato. — In sylvis, aug.-oct. — DC. fl. fr. 2, p. 189. A. albus Pers. A. Columbetta Fries syst. myc. I. p. 44. — Solitarius aut subgregarius, stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus 9-12 lin. crassus; pileus 2-3 unc. latus; lamellæ 3 lin. latæ. Inodorus; edulis.

366. A. TERREUS (Schæff. t. 64.)olidus firmus, pileo subirregulari convexo-explanato sicco glabro subsquamuloso fusco-livido, lamellis emarginatis subdistantibus albidis, stipite solido inaequali. — In Pinetis et Fagetis, aut. — Sow. t. 76. A. madreporeus Batsch. cont. 2. f. 203. A. myomices Pers? Fries syst. myc. I. p. 44. — Stipes compactus 2-3 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus intus

846 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

albus, fibrillosus subinde squamosus; pileus 2-4 unc. Var. lœvis et squamu-

losus. Odor mürinus.

A. argyraceus, pileo albido, squamis obscurioribus. — *A. argyraceus* Bull.

t. 423. f. t. 513. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 190.

367. *A. ATRO-VIRENS* (Pers. syn. 319.) pileo tenui obscure viridi squamulis mi-

nutis scabro, lamellis pallidis, stipite solido longo nigricante. — In sylvâ

Chantilly ex cl. Graves. — Pilens flexuosus demum subfasciens 3-4 unc. la-

tus; stipes 4 unc. longus, unc. 1 crassus.

368? *A. POLYPHYLLUS* (DC. fl. fr. 2. p. 50.) pileo convexo deinde plano demum de-

presso squamulis nigrescentibus, margine revoluto, lamellis numerosissimis inæqualibus albis, stipite pleno tereti albo basi subsquamuloso apice striato.

— Monspelii super corticem vaporarium. — Stipes 1-1 1/2 unc. longus 3-4 lin.

crassus; pileus 2-3 unc. latus.

369. *A. VACCINUS* (Schæff. t. 25.) pileo carnoso hemisphærico umbonato rufo,

epidermide in squamas pilosas lacerata, margine tomentoso, lamellis adfixis albido-rutilis, stipite cavo longo fibrilloso. — In sylvâ Houdainville propè

Mouy ex cl. Graves, aut. — Pers. syn. 293. *A. impuber* Batsch cont. 1. f. 116.

A. rufus Pers. ic. pict. t. 2. f. 1-4. — Stipes 3 unc. longus 1/2 unc. crassus rufus,

velo lanuginoso; pileus 1-2 unc. latus; caro tenuior; lamellæ subdistantes.

370. *A. RUTILANS* (Schæff. t. 219.) pileo carnoso planiusculo obtuso sicco flavo

villo squamuloso rubello tecto, lamellis rotundatis confertis luteis, stipite longo solido variegato deorsum incrassato pileo concolore. — In sylvis, locis

cæduis, circâ truncorum radices, etc., aug.-oct. — Pers. syn. 320. *A. xerampelinus* Sow. t. 31. — Buxb. cent. 5. t. 46. — Stipes firmus 2-3 unc. longus 1/2 unc. crassus; pileus 2-4 unc. latus junior purpureus, caro flava; lam. latæ

liberæ.

371. *A. EQUESTRIS* (Linn. suec. 1219.) pileo carnoso compacto flexuoso subsqua-

moso flavo-rufescente, squamis minutis suboboletis nigrescentibus, lamellis emarginatis confertis stipiteque solido inæquali squamuloso-sulphureis. — In

sylvis, ad viarum margines circâ Parisios ex cl. Chevall., Senlis ex cl. Graves,

sept.-dec. — *A. luteus* Batsch. *A. aureus* Schæff. t. 41. *A. flavo-virens* Pers.

Fries. — Buxb. cent. 4. t. 10. — Stipes brevis uncialis et ultrà intùs albus;

pileus disformis demum depresso 3-5 unc. latus tempestate hyemali vires-

cens.

* * * * Pileo vere carnoso humido viscoso margine involuto pubescente; stipite ves-

tito a pileo subdiscreto.

372. *A. RUSSULA* (Schæff. t. 58.) pileo carnoso subconvexo demum subdepresso

viscoso granuloso stipiteque brevi solido æquali apice squamuloso roseis, la-

mallis subliberis inæqualibus candidis. — In sylvis circâ Parisios ex cl. Che-

vall., aut. — Pers. syn. 338. Fries syst. myc. 1. p. 38. *A. roseus* Schæff. t. 75.

— Solitarius, magnus; lamellæ sublaxæ 3 lin. latæ. Edulis.

373. *A. FULVUS* (Bull. t. 555. f. 2. et t. 574. f. 1.) pileo viscoso virgato rufo-fulvo

discoideo, lamellis adnexis flavis basi truncatis, stipite cavo æquali fibrilloso.

— Ad terram, aug., sept. — DC. fl. fr. 2. p. 186. *A. incertus* Schæff. t. 62.

— Subsolitarius; stipes 3-4 unc. longus rufescens intùs flavus; pileus subsqua-

mulosus 3-6 unc. latus passim latè umbonatus; lam. latæ sæpè rufo-maculatæ.

374. *A. GLUTINOSUS* (Bull. t. 258, 539, 587. f. 1.) pileo convexo-plano lœvi viscoso

umbrino, lamellis adnexis albis, stipite farcto glabro basi ciunamomeo subin-

crassato apice albo viscoso nigro-squamuloso. — Ad terram, aug.-oct. —

DC. fl. fr. 2. p. 195. *A. albo-brunneus* Pers. Fries. *A. striatus* Schæff. t. 38.

— Stipes demum cavus 2-3 unc. longus 1/2 unc. crassus et ultrà; pileus 3 unc.

latus etiam rufus.

XXXII. *Limacium* (Fries syst. myc. 1. p. 31. — *Gymnopi* sp.

Pers.). Volum viscosum tenue fugacissimum universale; stipes

squamulosus vel maculatus non lœvis; pileus carnosus convexus

explanatus firmus; caro alba; lamellæ adnato-decurrentes inæquales distantes.

375. *A. OLIVACEO-ALBUS* (Fries syst. myc. I. p. 35.) pileo demum depresso umbonato glabro olivaceo-fusco, lamellis connexis candidis, stipite solido fusco maculato. — Ad terram, in sylvis montosis circa Parisios ex cl. Chevall., jul.-oct. — *A. limacinus* Schæff. t. 312. — *Solitarius*; stipes 2-5 unc. longus 3 lin. ferè crassus albido et velo maculatus et viscidus; pileus 1-2 unc. latus margine substriatus.

376. *A. RUSTULATUS* (Pers. syn. 354.) pileo subflexuoso viscoso obtusè umbonato cinereo-livido papillis discoideis viscosis albidis obsito, lamellis subdecurrentibus stipiteque tenui squamuoso albis. — In sylvis montosis circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — Fries syst. myc. I. p. 34. — *Gregarius*; stipes 1-3 unc. longus 1-2 lin. crassus subflexuosus; pileus $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{2}$ unc. latus.

β. brevis (Pers.) *solitarius* glaber, pileo nigrescente, stipite brevi albo. — Stipes vix uncialis.

377. *A. DISCOIDEUS* (Pers. syn. 365.) pileo lavi viscido planiusculo albescente, disco flavescente ant subferrugineo, lamellis tenuibus stipiteque solido squamuoso albidis. — In sylvis arenosis circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — Fries syst. myc. I. p. 33. — *Gregarius*; stipes uncialis et ultra 2 lin. crassus; pileus uncialis albo-flavus; lamellæ subconfertæ.

378. *A. EBURNEUS* (Bull. t. 11⁹, 551. f. 2.) candidus, pileo viscoso convexo-plano lavi, lamellis lati, stipite farcto longo albo-squamuloso. — In sylvis, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 174. *A. virgineus* Batsch. f. 12. *A. nitens* Sow. t. 71. *A. lacteus* Schæff. t. 31. *A. cossus* Sow. t. 121. — *Buxb. cent.* 4. t. 30. f. 2. — *Gregarius*; stipes demum cavus 2-4 unc. longus; pileus 2-3 unc., exsiccatus nitens.

? *ericetorum*, pileo convexo flavescente, stipite apice nudo. — *A. ericetorum* Bull. t. 551. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 175. non Pers.

379. *A. CARNOSUS* (Sow. t. 246.) pileo planiusculo lavi albo-rubescente, margine revoluto tomentoso, lamellis strictis distantibus, stipite sursum incrassato squamuoso pileo concolore. — In fagetis, nemoribus graminosis, aut. — Cart. 5. t. 71. *A. rubescens* Pers. syn. 366. non 254. *A. erubescens* Fries syst. myc. I. p. 32. — Stipes 2-3 unc. longus, unc. crassus et ultra subviscidus; pileus 3 unc. et ultra latus.

380. *A. CHRYSONODON* (Batsch. cont. 2. f. 212.) pileo demum subdepresso albido, margine involuto floccoso discoque flavidis, lamellis crispis albidis, stipite solido longo apice villo flavo annulari squamuoso. — Ad terram inter folia putrescentia, aut. — Pers. syn. 365. Fries syst. myc. I. p. 32. — Stipes 2 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus flavo-maculatus; pileus 1 $\frac{1}{2}$ unc. latus; lamellæ variant incarnatae margineque floccosæ.

XXXIII. *Armillaria* (Fries syst. myc. I. p. 26. — *Lepiotæ* sp. Pers.). *Velum partiale simplex, discretum annuliforme, subpersistens; stipes solidus firmus; pileus carnosus convexus expansus obtusus; caro alba firma; lamellæ latæ inæquales posticè subacute.*

381. *A. ANNULARIUS* (Bull. t. 377, 540. f. 3.) cespitosus congestus, pileo umbonato sordidè inteo squamis pilosis nigricantibus echinato, lamellis adnato-decurrentibus distantibus pallescentibus, stipite fibrilloso conico olivaceo-cinereo, annulo tumido patulo. — In sylvis ad arborum truncos, aug.-oct. — DC. fl. fr. 2. p. 203. *A. melleus* Fl. dan. t. 1013. Bolt. t. 141. Fries syst. myc. I. p. 30. *A. stipitis* Sow. t. 101. *A. polymyces* Pers. — Mich. gen. t. 81. f. 2. — Stipites firmi juniores pallidi; annulus amplius; pileus 2-5 unc. latus; lamellæ demum rubiginoso-maculatae. Valde venenatus ex Pers.

382. *A. DENIGRATUS* (Pers. syn. 267.) cespitosus, pileo campanulato nigrescenti-umbrino maculis latiusculis obscurioribus notato, lamellis albido-fuligineis, stipite tenui subincurvo, annulo albicante subfuscaci. — Ad truncos putridos.

848 ACOTYL. SEU CELLULARES. AGARICUS.

arborum circa Parisios ex Chevall., sept. — Stipes 3 unc. ferè longus 1-2 lin. crassus; pileus 9 lin. latus.

383. A. GRISEO-FUSCUS (DC. fl. fr. 5. p. 52.) subcespitosus, pileo lævi convexo griseo centro fusco, lamellis albis decurrentibus, stipite tereti farcto squamido griseo apice albido, annulo albido. — Ad truncos putridos in sylvulis circa Monspelium. — Stipes 3-5 unc. longus; pileus 2 unc. latus.

384. A. MUCIDUS (Schrad. spic. 116.) subcespitosus, pileo tenni lævi glutinoso candido aut fuligineo, lamellis adnexis distantibus, stipite bulboso albo basi saepè fuligineo-squamoso, annulo reflexo iterumque erecto sulcato. — Ad truncos vetustos apprime Fagi, jul.-dec. — Pers. syn. 266. Fr. syst. myc. 1. p. 28. — Fl. dan. t. 773, 1130, 1372. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ -3 unc. longus; pileus plerumque 2 unc. latus; lamellæ e sporalis albis farinaceæ putrescentes luteo maculatæ.

XXXIV. *Lepiota* (Fries syst. myc. 1. p. 19. — Lepiotæ sp. Pers.).

Velum simplex universale, concretum annuliforme subpersistens; stipes cavus intus floccis plus minus contextis farctus; pileus subcarnosus junior ovatus mox campanulatus dein expansus umbo-natus; caro alba mollis; lam. inæquales.

385. A. RAMENTACEUS (Bull. t. 595. f. 2.) pileo planiusculo obtusè umbonato argillaceo disco squamulisque nigrescentibus, margine flavescente, lamellis subadnexis dilutè fuligineis, stipite farcto æquali albido infra annulum erectum squamuloso. — Ad terram. — DC. fl. fr. 2. p. 205. — Solitarius; stipes 2 unc. longus 3-4 lin. crassus albidus vel flavo-maculatus, annulo angusto; pileus 2-unc. et ultrà; lamellæ 2 lin. latæ.

386. A. GRANULOSUS (Batsch. el. t. 6. f. 24.) pileo umbonato furfuraceo granuloso luteo aut ferrugineo, lamellis confertis plerumque pallidis, stipite subcavo pileo concolore infra annulum patulum squamoso. — In ericetis et pinetis, jul.-dec. — Pers. syn. 264. Grev. crypt. fl. t. 104. A. ochraceus Bull. t. 362, 530. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 204. A. croceus Bolt. t. 51. f. 2. Sow. t. 19. A. muricatus Fl. dan. t. 1015. — Stipes 2 unc. longus 2-3 lin. crassus ad medium usque ab annulo vaginatus; pileus 2-unc.; lam. 1 $\frac{1}{2}$ lin. latæ. Subgregarius.

f. carcharias, pileo incarnato aut cinnabarino. — A. carcharias Pers. ic. pict. t. 5. f. 1-3.

387. A. MESOMORPHUS (Bull. t. 506. f. 1.) pileo submembranaceo acutè umbonato sicco lævi stipiteque tenui glabro flavescentibus, lamellis liberis latissimis candidis, annulo erecto. — Ad terram in locis graminosis. — Pers. syn. 262. DC. fl. fr. 2. p. 205. Nees syst. f. 169. — Gregarius; stipes 2 unc. longus 1 lin. crassus; pileus 9 lin. latus; lamellæ antice latissimæ.

388. A. PILULIFORMIS (Bull. t. 112.) cespitosus parvus rufescens, pileo subsphaerico sicco, margine integro albo, lamellis albis liberis velo persistente obtectis, stipite albo fistuloso cylindrico glabro. — Inter muscos ad pedes arborum, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 201. — Stipes subuncialis; pileus 4-5 lin. latus; caro firma.

389. A. CRISTATUS (Bolt. fung. t. 7.) graveolens, pileo campanulato demum explanato umbonato albido disco ferrugineo, epidermide in squamulas ferragineas secedente, lamellis liberis candidis, stipite cavo subrufescente glabro, annulo fugaci. — In graminosis et muscosis sylvæ Froissereux propè Beauvais ex cl. Graves, aug.-nov. — Fries syst. myc. 1. p. 22. Grev. crypt. fl. t. 176. A. subantiquatus Batsch. cont. 2. t. 37. f. 206. a-d. A. colubrinus. — Pers. — Mich. gen. t. 78. f. 7, 8. — Stipes 1 $\frac{1}{2}$ unc. longus argentatus vel rubescens; pileus circiter uncialis squamis minutis subinde granuliformibus. Odor saporque fortis ingratus.

390. A. CRYPTOLARIUS (Bull. t. 405, 506. f. 2.) inodorus, pileo campanulato pallescente epidermide in squamas sparsas majusculas rufescentes rupta, lamellis

approximatis albidis liberis, stipite longis eni floccoso squamoso molli, annulo fugaci. — In sylvis, aug.-oct. — Sow. t. 14. var. DC. fl. fr. 2. p. 206. A. columbrinus & Pers. — Stipes 2 unc. longus 2 lin. crassus albidus; pileus umbonatus 2 unc. latus. Magnitudine variat. Odor saporce nullus.

390. A. EXCORIATUS (Schæff. t. 18, 19.) pileo laevi obsoletè umbonato epidermide contiguâ nudâ, lamellis remotis ventricosis albis, annulo mobili crasso, stipite æquali laevi submaculato. — In arvis, campestribus, aest. — Fries syst. myc. 1. p. 21. A. procerus γ Pers. — Sequente constanter minor; stipes brevior; pilei umbo fuscescens; lam. latæ. Edulis.

391. A. PROCRERUS (Scop. carn. p. 418.) elatus, pileo umbonato rufesceni-cinereo epidermide in squamas secedente, lamellis remotis albidis, stipite longissimo cylindrico basi bulboso, annulo cartilagineo mobili. — In hortis, sepibus et sylvis, aug.-nov. — Schæff. t. 22, 23. Sow. t. 190. DC. fl. fr. 2. p. 207. A. colubrinus Bull. t. 78, 583. — Bocc. mus. p. 305. f. 3. — Stipes 8-12 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus 3-7 unc. latus disco et squamis fuscis, versus marginem fibrillosus albidus. Edulis.

XXXVI. *Amanita* (Fries syst. myc. 1. p. 12. — Amanitæ sp.* Pers. DC.). *Velum duplex; universale (volva) a pileo discretum; par-tiale annuliforme membranaceum reflexum subpersistens; pileus e campanulato planus subverrucosus; caro alba; lamellæ liberæ confertæ.*

* *Volvâ obliteratâ, pilei margine laevi.* Noxii.

392. A. ASPER (DC. fl. fr. 2. p. 207.) pileo compacto umbonato rubescenti-fuligineo verrucis acutis scabro, lamellis confertis candidis, stipite longo farcto attenuato squamuoso subbulboso. — In sylvis, jul.-oct. — A. myodes Bolt. t. 139. A. verrucosus Bull. t. 316. *Amanita aspera* Pers. — Buxb. cent. 5. t. 48. f. 1. — Subolidus; stipes 2-3 unc. longus furfuraceus; pileus 2 unc. latus; verrucæ confertæ sordidè albæ.

393. A. EXCELSUS (Fries syst. myc. 1. p. 17.) pileo latissimo subviscoso griseo-fusco inæqualiter verrucoso, margine laevi, carne immutabili, stipite solido squamuoso-bulboso. — In sylvâ Compiègne ex cl. Graves et probabiliter in variis prov., aug., sept. — *Amanita ampla* Pers. syn. 255. — Solitarins, stipes 4-6 unc. longus 1 unc. ferè crassus, volvâ crassâ subterraneâ; annulus amplius striatus subtus villosus; pileus 4 unc. et ultrâ latus; verrucæ angulatae facile secedentes.

** *Volvâ obliteratâ, pilei margine striato.* Venenati.

394. A. SOLITARIUS (Bull. t. 48, 593.) sordidè albus, pileo plano medio subdepresso verrucoso aspero margine substriato, lamellis latis liberis, stipite solido erecto squamuoso-bulboso. — In umbrosis, aug., sept. — DC. fl. fr. 2. p. 208. A. albellus Scop. — Stipes firmus spithameus usque $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus 3-unc. et ultrâ nunc nudus subviscosus nunc squamis sparsis floccosis inæqualibus.

395. A. PANTHERINUS (DC. fl. fr. 5. p. 52.) pileo hemisphærico demùm plano olivaceo-fuscescente verrucis albidis æqualibus onusto, lamellis albis vix adnatis, stipite albo subfarcto æquali, volvâ ochreato-adnatâ. — In sylvis-montosis, aug.-oct. — A. maculatus Schæff. t. 90. *Aman. umbrina* Pers. syn. 254. — Stipes 2-3 unc. longus $\frac{1}{2}$ unc. crassus; pileus 2-3 unc. latus olivaceus fuscus lividusve; verrucæ minutæ subinnatæ.

396. A. MUSCARIUS (Linn. suec. 1235.) pileo aurantio-rubro nitido planiusculo, lamellis stipite subfarcto bulboso volvâque squamosâ candidis. — In sylvis, aug.-oct. — Schæff. t. 27, 28. DC. fl. fr. 2. p. 208. Grev. crypt. fl. t. 54. A. pseudo-aurantiacus Bull. t. 122. — Mich. t. 78. f. 2. — Verrucæ albæ angulatae regulariter dispositæ subindè nullæ. Variat pileo sanguineo, miniato, aurantiaco, luteo, albido, hepatico.

850 ACOTYL. SEU CELLULARES.

*** *Volvā completā laxā, pilei margine striato. Edulis.*

397. A. CESAREUS (Schæff. t. 258.) pileo campanulato aurantio-rubro, lamellis ventricosis aureis, annulo flavescente, stipite farcto albo. — In sylvis, jul.-oct. — Fries syst. myc. 1. p. 15. A. aurantiacus Bull. t. 120. DC. fl. fr. 2. p. 209. excl. var. γ . Amanita aurantiaca Pers. champ. com. t. 1. — Mich. gen. t. 77. f. 1. — Pileus 4-5 unc. latus non maculatus; verrucæ nullæ aut inæquales. Edulis.

398. A. OVOIDEUS (Bull. t. 364.) totus albus, pileo convexo margine vix striato, lamellis ventricosis, stipite farcto æquali. — In sylvis imprimis Galliae austriacæ, aut. — DC. fl. fr. 5. p. 53. Aman. alba Pers. — Stipes palmaris externe villosus. Edulis.

399. A. VAGINATUS (Bull. t. 98, 512.) pileo umbonato planiusculo margine sulcato, lamellis albis, stipite fistuloso attenuato subnudo volvā vaginato. — Ad margines nemorum imprimis Pinetorum, vere, æst., aut. — DC. fl. fr. 2. p. 211. Fries syst. myc. 1. p. 14. — Mich. gen. t. 76. f. 1. — Buxb. cent. 4. t. 19. — Stipes 4-7 unc. longus sericeo-squamulosus; pileus variat albidus (A. fungites Batsch. f. 79.), grisens lividusve (A. plumbeus Schæff. t. 85, 86.), cæsius (A. hyalinus Schæff. t. 244.), spadiceus (A. badius Schæff. t. 245.), fulvus (Schæff. t. 95.) et etiam viridis. Vix edulis.

**** *Volvā completā laxā, pilei margine lœvi. Venenati.*

400. A. PHALLOIDES (Bull. champ. t. 2, 577.) pileo convexo irregulariter squamoso albo flavo aut viridi, margine lœvi, lamellis albis, stipite apice cavo basi volvā connatâ bulboso, annulo crasso. — In umbrosis et sylvaticis, jul.-oct. — A. bulbosus et verrucosus DC. fl. fr. 2. p. 210. A. vernalis Bolt. t. 48. — Vaill. bot. t. 14. f. 5. — Stipes 3 unc. longus; pileus 2-unc. et ultrà. Valde venenatus.

α . *albus* (Pers. champ. com. t. 2. f. 1.) pileo albo. — A. bulbosus Schæff. t. 241.

β . *citrinus* (Pers. l. c. t. 2. f. 2.) pileo annuloque citrinis. — A. citrinus Schæff. t. 20.

γ . *viridis* (Pers. l. c. t. 2. f. 3.) pileo plerumque lœvi viridi aut olivaceo. — A. virescens Fl. dan. t. 1246.

401. A. VENANS (Bull. t. 108.) candidus, acris, pileo juniori ovato demùm subdepresso subsquamoso, margine lœvi, stipite farcto longo subæquali volvā liberè vaginato. — In sylvis, vere et æst. — DC. fl. fr. 2. p. 210. Aman. verna Pers. — Stipes 3-6 unc. longus; pileus 2-4 unc. latus.

Trib. III. CHLATHRACEÆ Ad. Brong. in dict. class. t. 4. p. 190; class. champ. p. 91. — Phalloideæ Fries syst. myc. 2. p. 281.

Fungi e volvâ sessili radicata apice rumpente elastice prorrascentes, formâ varii. Sporulæ nidulantes in strato mucoso heterogeneo nudo cum quo colliquescendo diffluunt.

XLVI. PHALLUS Mich. gen. p. 201. Pers. syn. 242. — Phalli sp. Linn.

Volvâ rotundata e membranâ duplice gelatinâ distentâ composita lobato-rumpens; receptaculum volvâ ruptâ elastice pronascens campanulatum conicumve stipite suffultum integerrimum superne muco sporulifero tenaci mox vero diffluente tectum. — Stipes fistulosus celluloso-cribrosus a volvâ discretus; thecæ nullæ. Fungi majores solitarii venenati.

Sect. 1. ITYPHALLUS Fries syst. myc. 2. p. 283.

Capitulum liberum reticulatum pervium inferne nudum.

1. *P. IMPUDICUS* (Linn. sp. 1648.) capitulo libero conico reticulato pervio, stipite cribroso subobliquo. — In sylvis, aest. aut. — Schæff. t. 196-198. Bull. t. 182. Bolt. t. 92. DC. fl. fr. 2. p. 214. *Phallus fætidus* Sow. fung. t. 329. Grev. crypt. fl. t. 213 et 214. — Mich. gen. t. 83. — Lob. ic. 309. — Totus spithameus usque, albus; capitolum primò gelatinā tenaci obscure olivacea tectum. Fætor cadaverinus.

Sect. II. *LEIOPHALLUS* Fries l. c. p. 284.

Capitulum liberum lève perviam infernè nudum.

2. *P. HADRIANI* (Vent. mem. inst. 1. p. 517.) capitulo ovato libero lèvi pervio, stipite tereti maculis cineraceis distincto. — Ad ripas Ligeris propè Blois olim reperiit Clusius, sed ex eo nulli recentiorum obvius. — DC. fl. fr. 2. p. 214. *Hymenophallus Hadriani* Nees syst. f. 258. B. — Lob. ic. 2. p. 275. Barr. ic. 1258. — Stipes bipalmaris; volva alba dein fusco-flavescens. Fætidus.

Sect. III. *CYNOPHALLUS* Fries l. c.

Capitulum stipiti contiguum tuberculosum impervium nudum.

3. *P. CANINUS* (Huds. ang. ed. 2. p. 630.) capitulo tuberculoso rubescente, stipite flaccido celluloso deorsum attenuato. — Ad trancos putrescentes Fagi in sylvâ Laigne propè Beauvais ex cl. Graves, aug.-sept. — Schæff. fung. t. 330. Fl. dan. t. 1259. Nees syst. f. 260. — Volva vaginata pallida; pileus primò muco olivaceo tectus. Inodorus minor.

XLVII. *CHLATHRUS* Mich. gen. 214. Fries syst. myc. 2. p. 287.

Volva sessilis globosa laciniato-dehiscens; receptaculum sessile e ramis pluribus anastomosantibus cancellatus includens gelatinam et massam farinaceo-uvidam sporidiifera deinde diffuentem, demum cavum. — Fungi majores venenati.

1. *C. CANCELLATUS* (L. sp. 1648.) obovatus, ramis oblique anastomosantibus. — In Galliâ meridionali. — DC. fl. fr. 2. p. 215. Bull. t. 441. Mich. gen. t. 93. — Barr. ic. 1263, 1265. — Variat ruber flavescens et albus; volva laciniata pallidior. Fætidissimus.

Ordo CXXII. LYCOPERDACEÆ Ad. Brongn. cl. champ. p. 60; dict. class. 9. p. 554. — *Angiocarpi* Pers. — *Gastromyci* Linck. — *Gasteromycetes* Fries syst. orb. veg. 1. p. 125. excl. *Phalloideis*.

Crusta aut frons nulla. Receptaculum (*peridium*) fibrosum filamentis intertextis subbyssoides formatum, interdum duplex, primò clausum demum irregulariter rumpens aut apice dehiscens, sporulas aut sporidia (conceptacula sporulas plurimas liberas aut irregulariter dispositas includentia) tenuissima filamentis plus minus numerosis immixta fovens, intus primâ ætate fluxile vel molle, dein induratum rigescens, demum fibroso-pulverulentum.

852 ACOTYL. seu CELLULARES.

Trib. I. LYCOPERDEÆ Ad. Brongn. l. c. — Trichospermi
Fries syst. orb. veg. 1. p. 133.

Peridium distinctum figuræ determinatæ sæpè pedicellatum, regulariter dehiscens, sporulis (sporidiis?) intrà peridium nudis filamentis inspersis pulverulentis.

Subtrib. I. LYCOPERDINEÆ Ad. Brongn. l. c. — Sclerodermei Lycoperdinei et Pilocrinorum pars Fries l. c.

Peridium crassum primò carnosò-molle dein firmum suberosum coriaceumve persistens sæpè duplex, exteriùs plerumque in corticem squamosum verrucosum vel pulverulentum abiens. Filamenta copiosa varie conjuncta. Sporulæ æqualiter aggregatæ aut hinc indè congregatæ filamentis impositæ. — Terrestres majores.

I. POLYSACCUM DC. rapp. 1. p. 8. fl. fr. 5. p. 103. Fries syst. orb. veg. 1. p. 135. — Pisolithus Alb. et Schw. — Pisocarpium Linck.

Peridium crassum suberosum radicans subglobosum demùm vertice rumpens includens peridiola numerosa aggregata internè filamentis obducta et sporulis referta.

1. P. CRASSIPES (DC. l. c.) peridio subgloboso pallide-rufo demùm rufo-fusco stipiti compacto carnosò crasso subterraneo radicato insidens. — In ericetis arenosis circa Cænomanum detexit cl. Desportes. — Scleroderma tinctorium Pers. syn. 152. — Mich. gen. t. 92. f. 1. — Stipes 4-8 unc. longus.
2. P. ACAULE (DC. rapp. voy. 2. p. 80; fl. fr. 5. p. 103.) peridio globoso rufo-fusco lævi sessili radicato. — In pinetis arenosis agri Syrtici det. cel. DC. — Pisolithus arenarius Alb. et Schw. t. 1. f. 3. — Mich. gen. t. 99. f. 2. — Peridium unc. 2-3-latum.

II. SCLERODERMA Pers. syn. p. 150. Nees syst. p. 132. Ad. Brongn. cl. champ. 71. — Lycoperdonis sp. DC.

Peridium globosum sessile stipitatumve simplex suberosum corticato-verrucosum radicans irregulariter rumpens intùs filamentosum; sporulæ coacervatæ in glomerulos ad superficiem filamentorum sparsos.

1. S. IRREGULARE (Dub. mss.) stipitatum, stipite crasso carnosò irregulariter lobato lacunoso radicato, peridiis 1-3 rotundis irregularibus depresso griseo-rufescens areolato-squamulosis. — In graminosis circa Monspelium detexit cel. DC. — Lycop. irregulare DC. fl. fr. 2. p. 102.
2. S. AURANTIMUM (Pers. syn. 153.) peridio globoso areolato-squamuloso lutescenti-fusco intùs rufescente, stipite brevi radicato. — In sylvis ad terram aut truncos muscosos, aut. — Lycop. aurantium Linn. Bull. champ. t. 270. DC. fl. fr. 2. p. 266 excl. syn. Pers. et Vaill. — L. citrinum Pers. L. spadiceum Schæff. t. 188. — Vaill. bot. t. 16. f. 8.
3. S. VERRUCOSUM (Pers. syn. 154.) peridio subgloboso verrucoso fusco-luteo intùs lilacino, stipite crasso radicato, squamulis confertis minoribus. — In sylvis et locis montosis. — Grev. crypt. scot. fl. t. 48. Lycop. verrucosum Bull. champ. t. 24. DC. fl. fr. 2. p. 265. — Vaill. bot. t. 16. f. 7, 9, 10.
4. S. CERA (Pers. syn. 155.) peridio depresso subgloboso lævi vel verruculoso nitido badio subsessili radicato intùs nigricante. — In sylvis, aest. — Grev. crypt. fl. t. 66. — Vaill. bot. t. 16. f. 5, 6.
5. S. CORIUM (Graves in litt.) magnum rotundum aut subreniforme læve umbraum, cortice crasso coriaceo persistente, stipite crasso. — In arvis circa

Rothomagum ex cl. Guersent, in sylva Belloy propè Beauvais ex cl. Graves.
— Lycop. Corium Guers. in DC. fl. fr. 2. p. 598. — Unc. 4 et ultra latum.

6. *S. CERVINUM* (Pers. syn. 156.) sparsum aut confertum subterraneum arhizum subrotundum durum granulosum intus ex albo-purpurascens demum pulveraceum nigrum. — In sylvis Abietinis montium, aut in arenosis montosis. — *Lyc. cervinum* Linn. DC. fl. fr. 5. p. 102. *Elaphomyces cervinum* Nees. *Phymatium fulvum* Chevall. fl. par. 1. p. 361. t. 10. f. 6. — Mich. gen. t. 99. f. 4.

III. *GEASTRUM* Pers. syn. 131. DC. fl. fr. 2. p. 266. *Ad. Brongn. in dict. class. 7.*
p. 175. — Geastrum et Plecostoma Desv.

Peridium globosum duplex, exterius discretum coriaceum in lacinias plures radiantes patentibus rumpens; interius membranaceum apice plus minus irregulariter ostiolatum; sporulae sparsae floccis impositæ.

* *Peridio sessili.*

1. *G. HYGROMETRICUM* (Pers. syn. 135.) badio-rufescens, peridio externo multifido crasso coriaceo siccitate peridium internum globosum reticulatum sessile ore non striato amplectente. — In sylvis sabulosis. — DC. fl. fr. 2. p. 268. *Lycop. stellatum* Bull. champ. t. 238 et 471. f. M. N. — Schmid. ic. t. 26. f. 27.

2. *G. RUFESCENS* (Pers. disp. meth. p. 6; syn. 134.) magnum, peridio externo multifido rufescente, interno sphærico sessili pallescente lævi, ore non striato. — In sabulosis ad terram. — DC. fl. fr. 2. p. 268. Schæff. fung. t. 182. *Lyc. stellatum* Bull. champ. t. 471. f. L. — Schmid. ic. t. 43 et t. 50. f. 1-3.

** *Peridia stipitato.*

3. *G. STRIATUM* (DC. fl. fr. 2. p. 267.) minimum albido-rufescens, peridio externo tenui membranaceo multifido, interno sphærico substipitato, ore elongato-striato acuminato. — Ad terram in siccis. — *G. coronatum* Pers. syn. 132. *G. minimum* Chevall. fl. par. 1. t. 10. f. 3. — Lin. 4-6 altum.

β. badium (Chevall.) stipite nullo. — *G. badium* Pers. in Desv. journ. bot. 1809. t. 9. p. 27.

4. *G. QUADRIFIDUM* (Pers. syn. 133.) peridio externo subquadrifido testaceo revoluto-fornicato, interno globoso stipitato rufescente, ore conico pectinato canescente. — In Abietinis. — DC. fl. fr. 2. p. 267. *L. fornicatum* Schæff. fung. t. 183. — Schmid. ic. t. 37. f. 1.

5. *G. MULTIFIDUM* (Pers. disp. 6.) majus, peridio externo multifido subreflexo testaceo, interno globoso stipitato umbrino-nigricante, ore magno conico subfimbriato. — Ad terram in Abietinis. — DC. fl. fr. 2. p. 267. *Grev. cr. fl.* t. 306. *G. pectinatum* Pers. syn. 132. — Schmid. t. 37. f. 11-14. — Peridium externum 2-2 $\frac{1}{2}$ unc. latum.

IV. *MYRIOSTOMA* Desv. journ. bot. 1809. t. 2. *Ad. Brongn. in dict. class. 11. p. 385. — Geastri sp. Pers.*

Peridium globosum duplex, exterius discretum coriaceum in lacinias plures inæquales radiantes rumpens, interius tenue membranaceum stipitibus pluribus distinctis brevibus suffultum, apice osculis pluribus rotundis dehiscens.

1. *M. COLIFORME* (Desv. l. c.) peridio externo multifido reflexo, interno fusco-argenteo depresso sphærico. — In arenosis circa Burdigalam ex cel. Bory de Saint-Vincent. — *G. coliforme* Pers. *Lyc. coliforme* Dicks. crypt. t. 3. f. 4.

854 ACOTYL. SEU CELLULARES.

V. BOVISTA Pers. syn. 136. Ad. Brongn. cl. champ. p. 69. — *Lycoperdonis* sp.
Bull. DC.

Peridium globosum duplex, exterius adnatum cellulosum squamoso-ruptum secedens, interius membranaceum apice irregulariter rumpens; sporulae pedicellatae filamentis infixae.

1. *B. GIGANTEA* (Nees syst. p. 132.) maxima subsessilis subgloboso-deformis levigata albido-ochracea superne rimosa, squamulis sparsis subobsoletis, filamentis sporulisque flavo-virentibus. — Ad terram in pratis et sylvis, aut. — *Lycop. giganteum* Batsch. el. t. 20. f. 165. DC. fl. fr. 2. p. 264. L. Bovista Bull. champ. t. 447. — Pedes 1 $\frac{1}{2}$ -2 interdùm lata.
2. *B. PLUMBEA* (Pers. obs. myc. 1. p. 5.) minor sessilis subglobosa plumbeo-livida glabra subtus plicata, carne firmâ rubrâ, sporulis subnigris. — Ad terram, in pratis et locis graminosis montosis. — *Lycoperdon ardosiacum*. Bull. champ. t. 192. DC. fl. fr. 2. p. 263. — Peridium exterius candidum.

VI. LYCOPERDON Mich. gen. Pers. syn. 140. Nees syst. p. 133. — *Lycoperdonis* sp. DC.

Peridium stipiti plus minus longo insidens duplex, exterius connatum surfuraceum saepè in verrucas abiens, interius membranaceum apice irregulariter rumpens; sporulae agglomeratae filamentis inspersæ.

1. *L. PUSILLUM* (Batsch. el. fung. t. 41. f. 228.) globosum minutum umbrinofuscum squamulis farfuraceis onustum, orificio erecto angusto. — In siccis et sylvis montosis rarius, aut. — *Bovista pusilla* Pers. syn. 138. — Vix tres lineas magnum.
2. *L. GOSSYRINUM* (Bull. champ. t. 435. f. 1.) gregarium minutum globoso-turbinatum lanuginosum albidum demùm dilutè fuligineum. — Ad truncos putridos, aut., rarum. — Pers. syn. 150. DC. fl. fr. 2. p. 263. — Tres lineas ferè magnum.
3. *L. MOLLE* (Pers. obs. myc. 2. p. 70; syn. 150.) subparvum sapienter solitarium turbinato-pyriforme molle rufescens, superne papillis caducis farfuraceis minutis acutisque confertissimis pulverulentum, in parte infimâ glabriuscum. — Ad terram in Quercetis et pratis umbrosis non frequens, aut. — Chevall. fl. par. 1. t. 10. f. 2. — Unc. 2 circiter altum 12-14. lin. latum.
4. *L. HYEMALE* (Bull. champ. t. 72 et 475. f. E.) medium subsphaericum regulare candidum aut dilutè fuligineum, verrucis minutis confertis demùm sparsioribus subfuraceis caducis junius obsitum demùm lave, in stipitem crassum plicatum decurrens. — In pratis montosis aut sylvaticis graminosis, sero aut. — *L. proteus* ♂ DC. fl. fr. 2. p. 265. *L. plicatum* Pers. in journ. bot. t. 2. — Unc. 1 $\frac{1}{2}$ -2 latum.
5. *L. EXCIPULIFORME* (Scop. carn. 2. p. 1631.) magnum subglobosum albidum intescens verrucis spinulosis sparsis hirtum, in stipitem distinctum elongatum plicatum squamulis hispidum productum. — Ad terram in pinetis, aut. — Schæff. fung. t. 187 et 292. DC. fl. fr. 2. p. 263. *L. proteus* ♂ Bull. champ. t. 450. f. 2. — Stipes 2-3 unc. longus 1-1 $\frac{1}{2}$ crassus; peridium 1 $\frac{1}{2}$ -2 unc. latum.
6. *L. MAMMÆFORME* (Pers. syn. 145.) grande umbonatum incarnatum farinaceum basi plicatum, verrucis majoribns depresso-glebulosis deciduis. — Inter folia decidua in sylvis circa Parisios ex cl. Chevall., aut. — Mich. gen. t. 97. f. 2. — Duas uncias ferè altum; peridium 1-1 $\frac{1}{2}$ unc. latum.
7. *L. PYRIFORME* (Bull. champ. t. 32.) cespitosum pyriforme umbonatum ad stipitem subplicatum fuligineo-pallidum squamulis tenuissimis subrotundatis asperum, radiculis fibrosis longis. — Ad truncos putridos. — Schæff. t. 185 Pers. syn. 148. Grev. crypt. fl. t. 304. *L. proteus* ♂, ♀ DC. fl. fr. 2. p. 265. — Bull. champ. 435. f. 3 et 475 f. N.

8. *L. TURBINATUM* (Pers. in journ. bot. 1809. t. 2.) turbinatum basi crassâ productum brunneum nitidum, verrucis exquis persistentibus. — In sylvis.
— *L. lividum et spadiceum* Pers. l. c.
9. *L. ECHINATUM* (Pers. syn. 147.) turbinatum primò ochraceum dein faligineum, verrucis compactis spinosis distantibus persistentibus rarius demum deciduis, stipite longiusculo subcylindrico subdenudato, radiculis albis elongatis. — In sylvis, aut. — *L. perlatum* Pers. syn. 145. *L. gemmatum* Fl. dan. t. 1140. *L. proteus* et ζ DC. fl. fr. 2. p. 265. — Bull. ch. t. 52, 340 et 375 excl. E et N. — *Vaill. bot. t. 12. f. 15, 16.* — Unc. 2 latum; stipes 1-1½ unc. altus.
10. *L. UTRIFORME* (Bull. champ. t. 450. f. 1.) majuscum ex obovato-cylindricum laeviusculum subluteum demùm dilatè faligineum, peridio cum stipite confluente. — Ad terram. — DC. fl. fr. 2. p. 263. — Unc. 3 et ultra altum 2-3 unc. latum.
11. *L. PRATENSE* (Pers. disp. meth. 7; syn. 142.) subparvum hemisphaericum candidum nitidum molle laeviusculum verrucis rarissimis, stipite brevissimo aut nullo. — In pratis, collibus graminosis. — *L. papillatum* Schäff. 4. t. 184. *L. proteus* et Bull. champ. t. 435. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 265. — Peridium 1 ½ unc. latum convexo-planum.
12. *L. CÆLATUM* (Bull. champ. t. 430.) magnum pallescens obconico-turbinatum subtùs plicatum, squamis latiusculis tessellatum rimosum, radice cespitosâ. — Ad terram in collibus graminosis. — DC. fl. fr. 2. p. 264. *L. Bovista* Pers. *L. gemmatum* et *areolatum* Schäff. t. 189 et 190. — Unc. 2-5 altum 2-6 latum.
13. *L. CANDIDUM* (Pers. ic. pict. t. 13. f. 4. a. b. c.) gregarium candidum junius teres demùm obovato-turbinatum, verrucis aculeatis majusculis in disco spinulosis distantibus. — Ad terram in Quercetis, aut. — Unc. 1 et ultra longum.
14. *L. MACRORHIZON* (Pers. in journ. bot. 1809. t. 2.) grande album subcylindricum crassum, squamis spinulosis, radicibus firmis ramosis. — In sylvâ Vincennes propè Parisios ex cl. Pers., propè Beauvais ex cl. Graves.

VII. TULOSTOMA Pers. disp. 2; syn. 139. DC. fl. fr. 2. p. 268.

Peridium globosum stipitatum duplex, exterius connatum in pulverem secedens, interius membranaceum apice ostiolo rotundo marginato dehiscens; sporulae agglomeratae filamentis inspersae.

1. *T. BRUMALE* (Pers. l. c.) albidum depresso-globosum, stipite fistuloso glabro interdùm squamuoso, peridii ore elongato. — In arenosis, hyeme et inenunte vere. — DC. fl. fr. 2. p. 269. *Lycoperdon pedunculatum* Linn. Bull. champ. t. 294 et t. 271. f. 2. Batsch. el. fung. 3. t. 29. f. 167. — Stipes circiter 2-unc.

VIII. ASTEROPHORA Dittmar in Schrad. journ. 3. p. 56 et in Surm. deutsch. t. 26. Brongn. in dict. class. 2. p. 40. — Merulius sp. DC.

Peridium simplex rotundatum subtùs lamellatum et circumcircà a stipite secedens, e filamentis contextum, apice irregulariter rumpens, sporulas angulatas emittens. — Fungi minores in Agaricis putrescentibus nascentes.

1. *A. LYCOPERDOIDES* (Ditm. l. c. non Fries.) peridio tomentoso cervino subtùs lamellis radiantibus subgelatinosis crassis cæsio-nigrescentibus instructo, stipite fibrilloso striato cinerascente. — In Agaricis putrescentibus. — *A. agaricoides* Fries. *Agaricus lycoperdooides* Pers. Bull. t. 166 et 516. f. 1. *Merulius lycoperdooides* DC. fl. fr. 3. p. 128. — Unc. 1-2 alta; peridium primò album demùm brunneum.

856 ACOTYL. seu CELLULARES.

Subtrib. II. TRICHIACEÆ Ad. Brongn. l. c. — Physarei Trichiacei et Pilocrinorum pars Fries l. c.

Peridium tenué primò pulposum aut mucilaginosum déin membranaceum plus minus fugax irregulariter rumpens. Sporulæ coacervatæ filamentis inspersæ. — Substantiis variis parasiticæ, minores.

IX. ONYGENA Pers. obs. myc. 2. p. 71; syn. 204.

Peridium rotundatum simplex e filamentis contextis crustosum apice tandem ruptum; sporulæ conglobatæ. — Fungi parvi stipitati vel subsessiles in animalium mortuorum reliquiis et imprimis in ungulis et cornibus nascentes.

1. *O. EQUINA* (Pers. l. c.) gregaria, peridio globoso stramineo, spornis majoribus ellipticis, stipite brevi squamuloso. — Ad ungulas equorum et cornua ovium et boum in sylvaticis umbrosis dejecta. — Pers. obs. 2. t. 6. f. 3. a. b. c. Chevall. fl. par. 1. t. 8. f. 8. Moug. et Nestl. vog. n. 775. Lycoperdon equinum Willd. fl. ber. f. 20. — Tres circiter lin. longa.

O. cespitosa (Chevall.) peridiis confertissimis laeviusculis. — *O. cespitosa* Pers. in Desv. journ. bot. 2. t. 2. f. 5.

X. CRIBRARIA Schrad. nov. gen. p. 3. Ad. Brongn. class. champ. p. 66.

Peridium subglobosum simplex membranaceum faticendo dimidiatum; filaments innata supernè reticulum liberum sporulas agglomeratas continens constituentia. — Fungilli minuti elegantes gregarii in foliis et lignis mortuis nascentes.

1. *C. ARGILLACEA* (Pers. obs. myc. 1. p. 90; syn. 193.) gregaria, peridio globoso argillaceo, stipite brevi nigrescente. — Ad lignum mortuum et præsertim annosas Salices. — Chevall. fl. par. 1. t. 9. f. 25. *C. micropus* Schrad. nov. gen. t. 2. f. 1. 2.
2. *C. VULGARIS* (Schrad. nov. gen. p. 6. t. 1. f. 5.) gregaria, peridio globoso cernuo flavo basi striato, stipite elongato rufescente flexuoso. — Ad truncos putridos et muscos in sylvaticis. — *C. aurantiaca* Schrad. l. c. t. 1. f. 3. 4. *Trichia semi-cancellata* DC. fl. fr. 2. p. 255. *Sphaerocarpus semi-trichoides* Bull. champ. t. 387. f. 1.

XI. DICTYDIUM Schrad. l. c. Ad. Brongn. cl. champ. p. 67. Fries syst. orb. veg. 143. — Cibrariæ sp. Pers. — Trichiæ sp. DC.

Peridium globosum simplex membranaceum e filamentis innatis reticulatum et venosum, faticendo totum sæpius cancellatum; sporulæ agglomeratae capillito innato cinctæ. — Fungilli minuti stipitati epiphyti.

1. *D. UMBILICATUM* (Schrad. nov. gen. p. 11. t. 4. f. 6.) fusco-purpureum, peridio globoso umbilicato, denudato cernuo, stipite elongato flexuoso incurvato, sporalis fusco-purpureis. — Ad truncos putridos. — *D. cernuum* Nees syst. f. 117. Grev. crypt. fl. t. 153. *Cibraria cernua* Pers. *Mueor cancellatus* Batsch. el. fung. t. 42. f. 232. — *Gregarium*, filaments persistentia valida.
2. *D. TRICHOIDES* (Chevall. fl. par. 1. p. 327.) rubellum, peridio globoso, denudato erecto extùs cancellatum nervoso, stipite simplici subbrevi crassissimo. — Ad lignum mortuum. — *Trichia reticulata* DC. fl. fr. 2. p. 256. *Sphaerocarpus trichoides* Bull. champ. t. 387. f. 2. *Cibraria coccinea* Pers.

XII. ARCYRIA Pers. syn. 182. Nees syst. p. 117. — Trichia sp. DC.

Peridium membranaceum simplex subcylindricum circumscissum, parte superiori fugacissimam, inferiori persistente cupuliforme; sporulae sparsae in filamentis e basi ascendentibus reticulatim contextis elasticè sese expandentibus deciduis; columella nulla.

1. A. FLAVA (Pers. obs. 1. p. 58; syn. 184.) aggregata sordide flava, stipite brevi conico, peridio subtereti, capillitio elongato nutante. — Ad lignum mortuum et terram. — Nees syst. t. 10. f. 115. Grev. crypt. fl. t. 309. Trichia nutans Bull. champ. t. 502. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 254. Sow. fung. t. 260.
2. A. CINerea (Pers. disp. p. 10. t. 1. f. 2.) gregaria sordide albida, stipite brevi filiformi apice subattenuato, peridio ovato primùm albo molli, capillitio elongato. — Ad truncos putridos in sylvis. — Trichia cinerea Bull. champ. t. 477. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 254.
3. A. INCARNATA (Pers. obs. 1. t. 5. f. 5.) congesta sordide carneæ, stipite breviusculo, capillitio oblongo deciduo. — Ad ligna exsiccata præcipue Quercina ad terram dejecta, aut. — Stemonitis incarnata Gmel.
4. A. FUNICEA (Pers. disp. meth. p. 10; syn. p. 185.) congesta croceo-punicea, stipite brevi, peridio ovato globoso, capillitio oblongo demùm obscure fuscus, sporulis cinnabarinis. — Ad truncos putrescentes. — Fl. dan. t. 1364. f. 2. Grev. crypt. fl. t. 130. Trichia cinnabarinæ Bull. t. 501. f. 1. b. c. DC. fl. fr. 2. p. 255. Chlathrus denudatus Linn. Jacq. misc. aust. 1. t. 6.
5. A. COCCINEA (Dub. mss.) gregaria coccinea, stipite simplici cylindrico lœvi, peridio sphærico, capillitio deciduo. — Ad lignum mortuum. — Trichia coccinea DC. fl. fr. 2. p. 255. Sphaerocarpus coccinens Bull. champ. t. 368. f. 1. — Hall. helv. t. 48. f. 6. — An potius suadente cl. Sprengel eum priori conjugenda?

XIII. STEMONITIS Gmel. Pers. syn. 186. DC. fl. fr. 2. p. 255.

Peridium globosum aut elongatum subcylindricum simplex membranaceum totum evanescens fugacissimum; stipes in columellam longissimè prominentem axiformem productus; filaments ex columellâ orta reticulatim connexa; sporulae sparsæ.

* Peridio elongato.

1. S. FASCICULATA (Pers. obs. myc. 1. p. 56.) cespitosa majuscula, subiculo compacto fuscus, peridio oblongo fugacissimo, capillitio elongato, sporulis fusco-ferrugineis, stipite nigro. — Super truncos mortuos et muscos, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 256. Grev. crypt. fl. t. 170. Trichia axisera Bull. t. 477. f. 1. Chlathrus nudus Linn. Bolt. fung. t. 93. Sow. t. 50. — Peridium albicans.
2. S. TYPHINA (Pers. obs. 1. p. 37; syn. 187.) sparsa minutula, stipite nigro, peridio cylindrico subincurvo per partes remanente, capillitio cylindrico obtuso, sporulis fuscis. — Ad truncos. — Schäff. fung. t. 217. S. typhoides DC. l. c. Trichia typhoides Bull. champ. t. 477. f. 2. Embolus pertusus Batsch. el. 1. t. 3. f. 176.
3. S. LEUCOPODIA (DC. fl. fr. 2. p. 257.) gregaria, subiculo crustaceo stipite candidis, peridio ovato violaceo persistente, capillitio albo. — Ad ramulos et folia decidua, aut. — Brongn. cl. champ. t. 3. f. 5. S. leucostyla Pers. Trichia leucopodia Bull. champ. t. 502. f. 2.

** Peridio rotundato.

4. S. OVATA (Pers. syn. 189.) conferta, peridio laxo subovato fuscus, stipite subulato atro ad dimidium fere penetrante. — Ad ramos corties orbatis. — Brongn. cl. champ. t. 3. f. 6.

858 ACOTYL. SEU CELLULARES.

XIV. LEANGIUM *Fries syst. orb. veg. 1. p. 141.* — Leangium et Leocarpus Linck. Nees. — Didermatis sp. Pers. DC.

Peridium determinatum globosum aut irregulare simplex membranose crustaceum fragile ad apicem rumpens; filamenta vaga versus basin adnata; columella nulla aut subprominens; sporulæ agglomeratæ.

1. L. FLORIFORME (Linck in berl. mag. t. 3. p. 26.) gregarium subcoriacenm, peridiis globosis stramineis demum stellatim fissis segmentis reflexis, stipite gracili elongato, columellâ magnâ obconicâ. — Ad lignum mortuum. — Diderma floriforme Pers. DC. fl. fr. 2. p. 257. Sphær. florif. Bull. champ. t. 371.

2. L. STELLARE (Linck l. c.) confertum, peridiis lenticularibus fuscescentibus demum stellatim fissis reflexis, stipite brevissimo incrassato, columellâ rufescente. — Ad lignum mortuum. — Diderma stellare Pers. Didymium stellare Schrad. nov. gen. t. 5. f. 3. 4.

3. L. VERNICOSUM (Dab. mss.) congestum, peridio obovato-oblongo fulvo spadiceo nitido, stipite gracili albido basi membranaceo dilatato, filamentis albidis, sporulis atris. — Ad muscos, herbas, folia, ramulos in sylvis, aut. — Leocarpus vernicosus Linck. Grev. crypt. fl. t. 111. Diderma vernicosum Pers. obs. myc. 1. t. 3, f. 7. a.-g. Lycoperdon fragile Dicks. crypt. 1. t. 3. f. 5.

XV. CRATERIUM *Trentepohl in Roth catal. 1. p. 224.* Ad. Brongn. in dict. class. 5. p. 38.

Peridium ellipticum papyraceum simplex lave apice truncatum et epiphragmate plano clausum; filamenta tenuissima cum sporulis excreta. — Fungilli minutissimi in lignis aut foliis mortuis viventes.

1. C. VULGARE (Dittm. in Sturm. fung. t. 9.) peridio campanulato castaneo, operculo firmo albo, stipite croceo, sporalis nigrescentibus. — In foliis aridis, muscis, ligno putrido, aut. — C. leucocephalum Desmaz. cat. p. 27 non Dittm. Cyathus minutus Sow. t. 239. fig. inf.

2. C. LEUCOCEPHALUM (Dittm. l. c. t. 11.) peridio cyathiformi stipiteque badiis, operculo convexo albescente tenuissimo evanido, filamentis sporulisque albis. — In foliis aridis, muscis, caulinis, aut. — Grev. crypt. fl. t. 65. Arcyria leucocephala Hoffm. germ. 2. t. 6. f. 1. Pers. syn. 183.

XVI. DIDYMIUM Schrad. nov. pl. gen. p. 25. *Fries syst. orb. veg. 1. p. 141.*
— Didymium et Diderma Nees.

Peridium determinatum globosum aut irregulare duplex, utrumque membranose crustaceum rumpens, externum subindè squamulosum; filamenta versus basin adnata; columella prominens aut nulla; sporulæ agglomeratæ.

1. D. CONTEXTUM (Dub. mss.) peridiis sessilibus congestis adnatis flexuosis contortis ut plurimum subcompressis, membranâ externâ citrinâ internâ pallidâ, filamentis albis, sporulis fuligineis. — Ad muscos et folia humi delapsa circâ Parisios ex el. Chevall., aut. — Diderma contextum Dittm. in Sturm fung. t. 39. Physarum contextum Pers.

2. D. DIFFORME (Dub. mss.) peridiis convexis oblongis sessilibus lœvibus difformibus adnatis, membranâ externâ candidâ interiori cærulecente, sporulis fascis. — Ad caules herbarum putrescentes. — Diderma difforme Pers. ic. pict. t. 12. f. 3-5. Physarum difforme Linck.

3. D. GLOBOSUM (Linck. diss. 2.) gregarium, peridiis globoso-hemisphaericis sessilibus lœvibus, membranâ externâ cinereo-rufescente, internâ nigricante, columellâ magnâ, sporulis globulosis nigricantibus. — Ad folia dejecta. —

Diderma globosum Pers. disp. t. 4. f. 4-5. *Chevall. fl. par. i. t. 9. f. 28.* Grev. crypt. fl. t. 122.

4. *D. TESTACKUM* (Schrad. nov. gen. i. t. 5. f. 1. 2.) *gregarium*, peridiis hemisphaericis sessilibus, membranâ externâ albido-incarnatâ, internâ rufescenti-carneâ, columellâ minimâ, sporulis atris. — Ad folia et ramos dejectos. — *Diderma testaceum* Pers. *Cionium testaceum* Spreng.
5. *D? RAMOSUM* (Dub. mss.) minimum perenne, peridiis rotundatis turbinatisve primo albis dein flavis demùmque griseo-nigrescentibus, stipitibus basi ramosis. — In trunko arborum emortuarum vel languentium. — *Diderma?* *ramosum* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 258. *Reticularia stipitata* Bull. champ. t. 380. f. 3.

XVII. TRICHIA Hall. Pers. disp. meth. p. 9; syn. 176. — *Trichiæ* sp. DC.

Peridium globosum aut irregulare simplex membranaceum persistens apice irregulariter rumpens; sporulæ sparsæ ad superficiem filamentorum versus basin adnatorum intortorum et demùm post peridii rupturam elasticè sese expandentium. — Fungilli stipitati vel sessiles.

* *Turbinatæ obovatæ.*

1. *T. BOTRYTIS* (Pers. disp. meth. 9 et 54; ic. pict. t. 12. f. 1.) *sordide rubens*, peridiis ovatis fasciculatis opacis, stipitibus elongatis connatis subracemosis. — Ad trunco putridos, vere-aut. — DC. fl. fr. 2. p. 598. *T. pyriformis* Hoffm. veg. crypt. 2. t. 1. f. 1. — Hall. helv. t. 48. f. 5.
2. *T. RUBIFORMIS* (Pers. disp. t. 4. f. 3 et t. 1. f. 3.) *rubiginosa*, peridiis turbinatis fasciculatis nitidis, stipitibus abbreviatis connatis, subiculo concolori. — Ad trunco putridos in sylvaticis. — *Lycoperdon vesparium* Batsch. el. t. 30. f. 172. — Hall. helv. t. 40. f. 2.
3. *T. FALLAX* (Pers. obs. myc. 1. t. 3. f. 4. 5.) *simplex* primò rabra dein argillacea aut fusco-nigricans, peridiis pyriformibus infernè cum stipite plicatis. — In truncis humidis, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 251. *Sphærocarpus ficoides* Bull. champ. t. 417. f. 3. *Chlathrus stipitatus* Schmid. ic. t. 33. f. 1-18. *Mucor miniatus* Jacq. aust. t. 299.
4. *T. ANTIADES* (DC. fl. fr. 2. p. 252.) *gregaria*, peridiis globosis fulvo-ferrugineis lineis flexuosis notatis, stipitibus sæpius ramosis nigrescentibus, sporulis nigrescentibus, subiculo membranaceo albescente. — Ad lignum mortuum. — *Sphær. antiades* Bull. champ. t. 368. f. 2. — An potius prioris var.?
5. *T. CLAVATA* (Pers. disp. 10; syn. 178.) *gregaria*, peridiis flavis nitidis clavatis, stipite rugoso tenui longiusculo rufescenti-flavo deorsùm attenuato, sporulis flavis. — Ad trunco putridos in montosis. — DC. fl. fr. 5. p. 101. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 284.
6. *T. TURBINATA* (DC. fl. fr. 2. p. 252.) peridiis aurantiacis vel rubiginosis turbinatis demùm truncatis, stipite simplici elongato lævi, sporulis griseo-rufescentibus, subiculo membranaceo albescente. — Ad lignum mortuum. — *Sphær. turbinatus* Bull. champ. t. 484. f. 1.
7. *T. NIGRIPES* (Pers. obs. myc. 2. p. 33; syn. 178.) *gregaria* subsparsa parva lutea vernicosa, peridiis pyriformibus obtusis, stipite breviusculo nigrescente, subiculo albescente. — Ad trunco mortuos. — *T. pyriformis* DC. fl. fr. 2. p. 251. *Sphær. pyriformis* Bull. champ. t. 417. f. 2.
8. *T. OVATA* (Pers. obs. 1. p. 61.) *congesta* sessilis obovata opaca ex ochraceo-citrina. — In sylvis super lignum putridum aut strata muscorum. — DC. fl. fr. 2. p. 597. *Chlathrus turbinatus* Bolt. fung. t. 94. f. 3. — Hall. helv. t. 48. f. 7.
- β. *cordata* (Pers.) subsessilis, peridiis subcompressis obcordatis.
- γ. *cylindrica* (Pers. ic. pict. 2. t. 14. f. 3.) peridiis cylindricis ovatisve medio constrictis, stipite vix illo.

860 ACOTYL. SEU CELLULARES.

9. *T. OLIVACEA* (Pers. obs. 1. p. 62; syn. 180.) sparsa sessilis subrotunda aut obovata olivacea basi truncata, capillito compacto flavescente. — Ad annosas Salices circa Lugdunum ex cl. Balbis.

** Subglobosæ.

10. *T. NITENS* (Pers. obs. 1. p. 62; syn. 180.) conferta sessilis rotunda flavo-aurantiaca nitida. — Ad truncos putridos. — *T. chrysosperma* DC. fl. fr. 2. p. 250. *Sphærocarpus chrysospermus* Bull. champ. t. 417. f. 4. *Lycoperdon ferrugineum* Batsch. el. 1. f. 173.

11. *T. VARIA* (Pers. obs. 2. p. 32.) sparsa flavescente subrotundo-reniformis decumbens. — Ad truncos. — *Stemonitis varia* Gmel.

*** Filiformes elongatæ aut venose anastomosantes.

12. *T. SERPULA* (Pers. disp. 10; syn. 181.) longissima simplex flava subflexuosa prostrata, filamentis fulvis reticulatis. — Ad cortices arborum et ramorum dejectorum in sylvis. — *T. spongoides* Vill. *Mucor Serpula* Scop. carn. ed. II. p. 493. ic. — Sporulæ flavae.

13. *T. RETICULATA* (Pers. ic. pict. 2. t. 12. f. 1, non DC.) effusa reticulata ramosa flava aut pallidè brunnea, filamentis sporulisque flavis. — Ad truncos et arborum cortices muscosos, aut. — *Nees* syst. t. 10. f. 111. *Grev. crypt.* fl. t. 266. *Lycoperdon lumbricale* Batsch. el. 1. f. 174.

XVIII. PHYSARUM Pers. obs. myc. 1. p. 5; syn. 168. Linck diss. 2. Fries syst. orb. veg. 1. p. 140. — *Physarum* et *Cionium* Linck. Ad. Brongn. — *Trichia* et *Reticularia* sp. DC.

Peridium determinatum globosum aut irregulare simplex membranaceum apice rumpens et demum squamulatim fatiscens; filaments imo peridio intus adnata; columella prominens aut nulla; sporulæ agglomeratæ.

* Stipitata.

1. *P. HYALINUM* (Pers. disp. meth. t. 2. f. 4.) peridio globoso lœvi albido, stipite flaccido rufescente brevi subdecumbente subiculo ferrugineo evanescenti imposito. — Ad lignum mortuum. — *Trichia utricularis* DC. fl. fr. 2. p. 251. *Sphærocarpus utricul.* Bull. champ. t. 417. f. 1.

2. *P. NUTANS* (Pers. obs. p. 6.) peridio lenticulari glabro ruguloso albido-cinerascente nutante, stipite sordidè albo, filamentis fuscis. — In truncis et foliis mortuis humidis. — *Trichia alba* DC. fl. fr. 2. p. 251. *Sphæroc. albus* Bull. champ. t. 407. f. 3. et 470. f. 1.

3. *P. CLAVUS* (Alb. et Schw. nisk. t. 2. f. 2.) peridio globoso-pileiformi supra farinoso-villoso griseo subtus nigro, stipite stricto subelongato fusco-nigro glabro, filamentis sporulisque fuscis. — Ad ligna demorta circa Mimatem (cl. Prost.).

4. *P. FARINACEUM* (Pers. syn. 174.) peridio globoso nigrescente farinoso-villoso, stipite abbreviato tenui, filamentis fusco-violaceis. — Ad folia, ramulos aut muscos in sylvis. — *Didymium farinaceum* Schrad. nov. gen. t. 5. f. 6. *Cionium farinaceum* Linck.

5. *P. CAPITATUM* (Linck in berl. mag. v. 3. p. 27.) peridio globoso basi cordato griseo, stipite fusco, filamentis albis. — Ad lignum mortuum circa Lugdunum ex cl. Balbis. — Stipites basi dilatati.

6. *P. LUTÆUM* (Pers. syn. 172.) peridio lenticulari granuloso albo, stipite elongato cylindraceo gracili, filamentis flavis, sporulis flavis aut fuscis. — In ligno mortuo. — *Trichia lutea* DC. fl. fr. 2. p. 253. *Sphæroc. luteus* Bull. champ. t. 407. f. 2.

7. *P. COLUMBINUM* (Pers. obs. myc. 1. p. 5; syn. 173.) peridio globoso nitido primùm flavescente dein violaceo versicolore, stipite nigro. — Ad truncos

putridos, circa Parisios ex cl. Chevall., in sylvis propè Beauvais ex cl. Graves.
— Subgregarium; subiculum expansum pellucidum badium.

8. *P. viride* (Pers. obs. myc. 1. p. 6.) peridio lenticulari granuloso viridi, stipite elongato gracili lateritio, filamentis sporulisque fuscoc-nigrescentibus. — Ad terram et in truncis mortuis. — *Trichia viridis* DC. l. c. *Sphæroc. viridis* Bull. champ. t. 481. f. 1. — Gregarium; subiculum griseum evanescens.
9. *P. AURANTIIUM* (Pers. syn. 173.) peridio subrotundo lutescente, stipite nigro striato deorsum incrassato, sporulis fuscoc-nigrescentibus. — In ligno mortuo. — *Trichia aurantia* DC. l. c. *Sphærocarpus aurantius* Bull. champ. t. 484. f. 2. — Gregarium; subiculum albescens.
10. *P. GLOBULIFERUM* (Pers. syn. 175.) peridio sphærico ex albo-flavescente, stipite brevi flavo aut rubro, sporulis nigris globulis luteis intermixtis. — In ligno putrido. — *Trichia globulifera* DC. l. c. *Sphærocarpus globulifer* Bull. t. 484. f. 3. — Subiculum albescens.
11. *P. LICEOIDES* (Dub. mss.) confertum, peridiis sphæricis membranaceis griseis subrugulosis, stipitibus rectis rigidis albis basi subattenuatis, sporulis nigris copiosis. — Ad paginam inferiorem foliorum Brunellæ laciniatæ vivæ. — *Licea stipitata* DC. fl. fr. 5. p. 101. *Diderma squamułosum* Alb. et Schw. t. 4. f. 5?

* * *Sessilia.*

12. *P. BIVALVE* (Pers. obs. 1. t. 1. f. 2, 3; syn. 169.) compressum flexuosum cinereo-albidum elongato-sinuosum bivalve, sporulis concoloribus. — Ad muscos, folia exsiccata et ramulos deciduos in sylvaticis umbrosis. — *Reticularia sinuosa* Bull. champ. t. 446. f. 3. DC. fl. fr. 2. p. 259. Sow. fung. t. 6. *Angioridium sinuosum* Grev. crypt. fl. t. 310.
13. *P. CINEREUM* (Pers. disp. p. 9; syn. 170.) subglobosum cinereum, filamentis albis reticulatis, sporulis atris. — Ad trunco arborum. — Desmaz. crypt. exs. n. 272. *Lycoperdon cinereum* Batsch. el. fung. t. 29. f. 169. a-d. — Subiculum sordidè album vel pallidum.
14. *P. CAPSULIFERUM* (Dub. mss.) substipitatum subovoideum primò nigrocæsum dein albidum, filamentis sporulisque nigrescentibus. — Super muscos. — *Trichia capsulifer* DC. fl. fr. 2. p. 254. *Sphæroc. capsulifer* Bull. champ. t. 470. f. 2. — An potius ut vult cl. Desmaz. prioris var.?

XIX. *LICEA* Schrad. nov. pl. gen. 16. *Ad. Brongn. cl. champ.* 64. — *Licea* et *Tubulina* Pers. DC. — *Licea* et *Perichæna* Fries.

Peridium papyraceum determinatum simplex persistens læve globosum cylindricumve demum circumscissum aut irregulariter ruptum; sporulæ opacæ congestæ filamentis rarís aut nullis intermixtæ. — Fungi subsessiles sessilesve.

Sect. I. *PERICHÆNA* Fries syst. orb. veg. 1. p. 141.

Peridium demum circumscissum; flocci rari immixtis liberis. — Subsessiles, subhemisphæricæ.

1. *L. STROBILINA* (Alb. et Schw. t. 6. f. 3.) densè aggregata, peridiis subrotundo-oblongis fuscis subcircumscisis, sporulis sordidè flavidis. — In squamis strobilorum Abietis. — DC. fl. fr. 5. p. 100. Nees syst. t. 8. f. 101. *Perichæna strobilina* Fr. Grev. cr. fl. t. 275.
2. *L. CIRCUMSCISSA* (Pers. syn. 196.) gregaria globosa depressa spadicea nitida circumscissa, sporulis flavidis. — Ad lignum mortuum, aut. — Fl. fr. 2. p. 249. *Perichæna populina* Fries. Grev. crypt. fl. t. 252. *Trichia gymnosperma* Pers. obs. myc. 1. t. 6. f. 1-2. — Bull. champ. t. 417. f. 5.

Sect. II. *LICELLA*. — *Licea* Fries. — *Tubulinæ* sp. Pers.

Peridium demum irregulariter ruptum; flocci nulli. — Sessiles.

* Subrotundæ.

3. *L. BICOLOR* (Pers. syn. 195.) gregaria, peridiis olivaceo-nigricantibus subglobosis, sporulis sulphureis. — Ad muros in cellis et locis suffocatis propè Lille ex cl. Desmaz. — Pers. ic. pict. t. 3, f. 4, 5. *Didymium parietinum* Schrad. gen. 1. t. 6. f. 1. — Peridium primò intuitu nigrescens internè unâ cum sporulis lète flavum.

** Tubulosæ.

4. *L. FLEXUOSA* (Pers. syn. 197.) decumbens serpens flexuosa spadicea subnitida hinc incisa, sporulis concoloribus. — Ad ligna Pinea denudata et semi-purpurea. — Fl. fr. 5. p. 100.
5. *L. CYLINDRICA* (Dub. mss.) peridiis subiculo albido impositis rectis subconico-cylindraceis aggregatis apice albidis obtusis demùm subdentatis unicoloribus ferrugineis, sporulis fuscis. — Ad lignum mortuum et humidum. — *Tubulina cylindrica* DC. fl. fr. 2. p. 249. *Sphærocarpus cylindricus* Bull. champ. t. 470. f. 3.
6. *L. FRAGIFORMIS* (Nees syst. t. 8. f. 102.) peridiis subiculo albido impositis curvatis cylindricis congestis basi attenuatis apice dentatis primò rubris posticè rubiginosis persistentibus, sporulis fuscescentibus. — Ad lignum mortuum humidum, aut. — Grev. crypt. fl. t. 308. *Tubulina fragiformis* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 250. *Sphærocarpus fragiformis* Bull. t. 384. *Stemonitis ferruginosa* Batsch. el. t. 175. — Jacq. misc. 1. t. 15.

XX. LYCOGALA Pers. obs. myc. 2. p. 26; syn. 157. DC. fl. fr. 2. p. 261.

Peridium subrotundum duplex, exterius in verrucas abiens interius persistens papyraceum apice dehiscens, immaturum massâ pulposâ liquecente maturum sporulis filis capillaribus vagis raris intertextis refertum. — Fungi minores sessiles.

1. *L. PUNCTATA* (Pers. syn. 158.) gregaria globosa cinereo-badia resinoso-punctata, sporulis concoloribus. — Ad trunco putridos, aut. — DC. fl. fr. 2. p. 261. Nees syst. t. 8. f. 96. *Reticularia Lycoperdon* var. 4. Bull. champ. t. 476. f. 3.
2. *L. MINIATA* (Pers. syn. 158.) gregaria globosa primò miniata dein fusca punctulata, sporulis roseis. — Ad lignum mortuum, aest. — Fl. fr. 2. p. 261. Grev. cr. fl. t. 38. *Lycoperdon Epidendrum* Bull. champ. t. 503. Sow. t. 52.
3. *L. MINUTA* (Grev. crypt. fl. t. 40.) sparsa convexa alba lavis minuta, sporulis nigris. — Ad culmos exsiccatos et cortices arborum circâ Lugdunum ex cl. Balbis fl. lyonn. t. 2. p. 219. — *Gregaria interdùm confluens*.

Trib. II. FULIGINEÆ Ad. Brongn. l. c. — Trichodermacei
Fries syst. orb. veg. 1. p. 144.

Peridium sessile irregulare e filamentis laxe contextum vel membranose cellulare fugax figuræ indeterminatæ, sporulis (sporidiis?) nudis coacervatis raro filamentis intertextis.

XXI. RETICULARIA Bull. champ. p. 85. DC. fl. fr. 2. p. 258. Fries syst. orb. veg. 1. p. 147.

Peridium indeterminatum simplex membranaceum rumpens; sporulae coacervatae floccis basi adnatis ramosis intertextæ. — Habitus Fuliginis.

1. *R. FULIGINOIDES* (Fries l. c.) magnum subglobosum villosum albicans, sporulis rutilis filis fasciculatis intertextis. — Ad trunco Abietinos putrescentes, aut. — *Trichoderma fuliginoides* Pers. syn. 231. *Strongylium Dittm.* Linck.

- Reticularia *Lycoperdon* var. 1. Bull. champ. t. 446. f. 4. *Lycogala argentea* γ DC. fl. fr. 2. p. 262. — Unc. 1-2 lata.
2. *R. ROSEA* (DC. in Bull. phil. n. 14. f. 8. A. B. C.) lætè rosea palposa primò irregulariter papillata demùm confluens in maculam albo-reticulatam breviter stipitatum. — In rimis truncorum cæsorum et humidorum. — Fl. fr. 2. p. 259.
3. *R. SPHÆROIDALIS* (Bull. champ. t. 446. f. 2.) sparsa alba demùm rosea, peridiis globosis sessilibus confertis demùm compactis. — In ramis et foliis mortuis. — DC. fl. fr. 2. p. 259. — Mich. gen. t. 95. f. 3. — Peridia ova insectorum referunt.
4. *R? NIGRA* (Bull. champ. t. 380. f. 2.) minima primò pellucida cinerea demùm nigra. — In ramis biennibus cortice instructis. — DC. fl. fr. 2. p. 259.
5. *R. HEMISPHERICA* (Bull. champ. t. 446. f. 1.) primò alba mollis subspumosa dein compacto-grisea demùm nigra, peridio convexo demùm suborbiculari stipite subbrevi simplici striato basi incrassato instructo, sporulis nigrescentibus. — In foliis mortuis. — Fl. fr. 2. p. 258.
6. *R. ARGENTEA* (Fries l. c.) magna subhemisphærica lævis argentea fragillissima substipitata, sporulis umbrino-nigrescentibus. — Ad trunco putridos, aut. — *R. Lycoperdon* var. 2, 3. Bull. champ. t. 476. f. 1. a-d., f. 2. *Lycogala argentea* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 262. excl. var. γ. Grev. crypt. scot. t. 106. *Mucor Lycogala* Bolt. t. 133. f. 2.

XXII. FULIGO Pers. syn. 159. — *Æthalium Linck. Fries syst. orb. veg.* 1. p. 147.
— Reticulariæ sp. *Bull. DC.*

Peridium dissorme duplex, exterius fibrosum evanescens, interius membranaceo-cellulare fatiscens; sporulae confertæ stratis membranaceis interseptæ. — Plantæ primò pulposæ molles demùm in pulverem tenuissimum abeentes, membranæ communis nunquam hospites.

1. *F. FLAVA* (Pers. l. c.) effusa subrotundaque flava primò spumam lævem referens, demùm solidior superficie subtomentosâ, sporulis fusco-nigricantibus congregatis. — Ad terram, muscos, folia, caules mortuos aut vivos, aut. — *Reticularia lutea* Bull. champ. t. 380. DC. fl. fr. 2. p. 260. Sow. t. 399. f. 2. *Æthalium flavum* Linck. Nees syst. t. 8. f. 92. Grev. crypt. fl. t. 272. *Mucor ovatus* Schæff. t. 194. — Bolt. t. 134.
2. *F. HORTENSIS* (Dub. mss.) primò venosa, repens aut spumosa filamento gossypino obvelata, demùm confluens late effusa crassa flavo-cinnamomea aut fuscescens fragilis extùs pulverulenta intùs celluloso-fibrosa. — Ad pulverem coriarium. — *F. vaporaria* Pers. *Reticularia hortensis* Bull. t. 424. f. 2. Sow. fung. t. 399. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 260. — Ultrà pedem sæpè effusa. Cum priori a cel. *Grevillea conjuncta*.
3. *F. CEREBRINA* (Brondeau in mem. soc. linn. paris. 1824. p. 74. t. 3. f. 1-4.) cerebriformis primò mollis pulposa dein duriuscula, peridio externo tenui deciduo vitellino demùm viridescente-cinereo, intùs fibroso-cellulosa, sporulis fuligineo-fuscescentibus. — Ad terram et vegetabilia putrida circâ Aginnum ex-cl. Brond., junio.
4. *F. CARNOSA* (Dub. mss.) parva subrotunda albida vel flava duriuscula persistens gossypina, intùs cellulosa dein compacta, sporulis nigris. — Ad terram. — *Reticularia carnosa* Bull. champ. t. 424. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 260.

XXIII. SPUMARIA Pers. syn. 162. DC. fl. fr. 2. p. 260.

Peridium irregulare simplex membranaceum celluloso-floccosum in medio fatiscens; sporulae in plicis peridii interioribus ascendentibus coacervatae.

1. *S. ALBA* (DC. l. c.) gregaria conferta, peridiis magnis cæsio-albidis plerumque

864 ACOTYL. SEU CELLULARES.

pendulis, sporulis nigris. — Ad folia, caules aut ramos deciduos, aut. — Chevall. fl. par. t. 5. f. 30. S. mucilago Pers. Nees syst. t. 8. f. 94. Grev. crypt. fl. t. 267. Reticularia alba Bull. champ. t. 126. — Mich. gen. t. 96. f. 2.

2. S. PHYSAROIDES (Pers. syn. 163.) gregarium confertum minutum, pulvere externo albo deciduo, peridiis subrotundis oblongisque nigrescentibus. — Ad ramos vivos mortuosve et ad ipsos graminum cespites in Alpibus ad nives aternas ex cel. DC. — Fl. fr. 5. p. 101. Dichosporium aggregatum Nees?

XXIV. TRICHODERMA Linck. Ad. Brongn. class. champ. p. 61. — Trichoderma sp. Pers.

Peridium irregulare simplex e filamentis laxis distinctis ad centrum demum evanescentibus conflatum; sporulae minimae globosae conglobatae semper pulverulentae. — Fungilli epiphyti pelliculam tomentosam primò referentes.

1. T. VIRIDE (Pers. disp. 12; syn. 231.) subrotundum effusumque pulvere vi-ridi, villo albido fugaci. — Ad ramos deciduos aut caules herbarm majorum, aut. post pluvias. — Nees. syst. t. 6. f. 74. Grev. crypt. fl. t. 271. Pyrenium lignorum & vulgare Tode meck. 1. t. 3. f. 29. — Substantia mollissimum 2-3 lin. longum.

2. T. intermedium (Desmaz. crypt. exs. p. 122.) globalosum, villo subpersis-tente.

2. T. NIGRESCENS (Pers. l. c.) subeffusum planiusculum, pulvere nigrecente fuliginoso, villo tenuissimo cæsio. — Ad trunco cæsos et ramos mortuos, hyeme et veris initio. — Semiunciam ferè latum lin. 1 crassum mox nigrescens.

3. T. LÆVE (Pers. obs. 1. p. 12; syn. p. 233.) ex albido-pallescens, superficie lœvi, pulvere flavescente. — Ad terram argillosam, aut., hyeme. — Subper-sistens 1-1 ½ unc. latum, primò albidum dein flavescens.

Trib. III. ANGIOGASTRES Fries syst. myc. 2. p. 277. (excl. Phalloideis.) Ad. Brongn. ll. cc.

Peridium distinctum rotundatum apice rumpens peridiola (sporidia?) solitaria vel plura determinata sporulis globosis per-exiguis fæta fovens; filamenta nulla.

Subtrib. I. CARPOBOLI Fries syst. myc. 2. p. 305 (excl. Pilobolo). Ad. Br. l. c.

Peridium rotundatum urceolatum protrudens peridiolum solitarium. — Pusilli peridiolum vesiculæforme sæpiùs elasticè ejientes.

XXV. THELEBOLUS Tode meck. 1. p. 41. Fries syst. myc. 2. p. 306.

Peridium sessile subrotundum urceolato-ventricosum protrudens peridiolum vesiculatum globosum papillæforme ore excutiens sporulas mucosas primò inclusas. — Fungilli carnosò-gelatinosj simum aut terram incolentes.

1. T. TERRESTRIS (Alb. et Schw. t. 2. f. 4.) hemisphæricus croceus congestus, subiculo tomentoso dense complexo insidens. — In opacis sylvarum circa Parisios ex cl. Chevall., ad terram, muscos, folia, stipites putridos, aut.-vere. — Nees syst. f. 364. — Subiculum flavicans 4-6 unc. longum.

2. T. STERCOREUS (Tode meck. 1. t. 7. f. 46.) subglobosus croceus gregarious basi pilis solitariis radiantibus adfixus. — Ad simum, aut. — Nees syst. f. 363.

XXVI. CARPOBOLUS Mich. gen. 221. Willd. fl. ber. 419. Desmaz. cat. p. 28.
obs. bot. p. 9. — *Sphaerobolus* Tode meck. 1. p. 43. Fries syst. myc. 2. p. 309.

Peridium globosum duplex, exterius immerso-sessile rotundatum
dein stellatim fissum apertum; interius membranaceum demum elasticè
inversum tenue fugacissimum projiciens peridiolum globosum solidum,
sporulis in medio coacervatis. — Fungilli epiphyti.

1. *C. CYCLOPHORUS* (Desmaz. l. c. obs. p. 9. t. 1. f. 1.) globosus fulvus ore regulari stellatim fisso, peridio interno albo circulo croceo zonato. — Ad paleas humidas in sylvis circa Lille det. cl. Desmaz.
2. *C. STELLATUS* (Desmaz. l. c. t. 1. f. 2.) oblongo-globosus flavescens ore regulari stellato-dentato, peridio interno pellucido albicante. — Ad trunco, ligna, quisquilia, aest., aut. — *Sphaerob. stellatus* Tode. Fries. Grev. crypt. fl. t. 158. *Lycop. Carpobolus* Linn. Fl. dan. t. 865. Sow. t. 22. — Mich. gen. t. 101. f. 1, 2.

Subtrib. II. *NIDULARIEÆ* Fries l. c. p. 296.

Peridium varium demum regulariter apertum intus peridiola plura li-
bera distincta clausa colligens.

XXVII. CYATHUS Hall. helv. p. 3. p. 127. Pers. syn. 236. DC. fl. fr. 2. p. 269. —
Nidularia Bull. champ. p. 69. Linck. diss. 1. f. 53. Fries syst. myc. 2. p. 297.
— *Cyathus et Nidularia* Ad. Brongn. cl. champ. p. 73.

Peridium coriaceum extus subfilamentosum subrotundum aut cupu-
læforme, intus junius refertum pulpâ gelatinosâ cui immixta peridiola
immatura, dein rumpens intus e gelatinâ absorptâ vernicosum; peri-
diola numerosa primo rotundata mollia demum sicca porosa lenticularia
sessilia aut pedicellata sporulas in centro agglomeratas foventia. —
Fungi minores gregarii epiphyti.

Sect. I. *CYATHIA* Brown jam. Fries l. c. — *Cyathus* Ad. Brongn. l. c.

Peridium coriaceum cyathiforme epiphragmate orbiculari dehiscente tectum;
peridiola subtus umbilicata pedicellata.

1. *C. STRIATUS* (Hoffm. veg. cr. 2. t. 8. f. 3.) obconicus extus lanatus ferrugineo-
umbrinus internè longitudinaliter striatus plumbeus. — Ad terram et ligna pu-
trida, aug.-nov. — DC. fl. fr. 2. p. 269. Nees syst. f. 132. *Nidul. striata* Bull.
champ. t. 40. f. 1. — Vail. bot. t. 11. f. 4, 5. — Mich. gen. t. 102. f. 2. —
Epiphragma membranaceum albidum; peridiola pallida.
2. *C. VERNICOSUS* (DC. fl. fr. 2. p. 270.) campanulatus extus flavo-ferruginens
subtomentosus, intus laevis plumbeo-nitidus. — Ad ramenta lignea, in hortis,
arvis, etc., aest., aut. — C. olla Pers. syn. 237. C. laevis Hoffm. veg. cr. t. 8. f. 2.
non DC. *Nidularia campanulata* Sow. t. 28. Fries. N. vernicosa Bull. t. 40. f. 2.
t. 488. f. 1. — Vail. bot. t. 11. f. 6, 7. Mich. gen. t. 102. f. 1. — Epiphragma
tentue album filamentosum; peridiola matura spadicea.
3. *C. CRUCIBULUM* (Hoffm. veg. 2. p. 29. t. 8. f. 1.) campanulato-cylindricus
trinque truncatus glabrusculus aut subtomentosus ex ochraceo-ferrugineus
intus laevis luteo-pallescens. — Ad lignum mortuum, aest., aut. — Nees syst.
f. 133. Grev. crypt. fl. t. 34. C. laevis DC. fl. fr. 2. p. 269. non Hoffm. *Nid.*
laevis Bull. champ. t. 40. f. 3. t. 488. f. 2. — Schäff. t. 179. — Mich. gen.
t. 102. f. 3. — Minore, peridiola laevia alba demum pallescentia.
4. *C. COMPLANATUS* (DC. fl. fr. 2. p. 270.) hemisphæricus extus subsquamulosus
cinereo-ferrugineus intus laevis albus peridiolis repletus. — Ad lignum pu-
tridum detexit cel. L. Dufour, vere. — Peridiola alba demum grisea.
5. *C. FIMETARIUS* (DC. fl. fr. 5. p. 104.) hemisphæricus totus rufo-fulvus extus

866 ACOTYL. SEU CELLULARES.

velutinus intus glaber, peridiolis concoloribus lenticularibus subpunctulatis.
— In stercore vaccino reperiit cel. Chaillet, aut. — Interdum confluens.

Sect. II. NIDULARIA Fries symb. gast. p. 2. Ad. Brongn. l. c.

Peridium globosum vel diffforme coriaceo-membranaceum irregulariter rumpens epiphragmate destitutum; peridiola margine adfixa.

6. C. FARCTUS (Roth. cat. 1. t. 7. f. 2.) subretundus tuberculosus tomentosus griseus irregulariter rumpens, radice fibrillosa longissima, peridiolis orbiculatis corrugatis brunneis. — Ad ligna madida propè Beauvais ex cl. Graves, aut. — Nid. farcta Fries l. c. — Rai syn. t. 1. f. 2. — Solitarius passim confertus confluens.

7. C. GLOBOSUS (Ehrenb. sylv. ber. p. 28. f. 8. A.-H.) globosus tuberculosus irregulariter rumpens albidos, peridiolis subglobosis flavidis. — Ad terram sabulosam propè Beauvais ex cl. Graves. — Nid. globosa Fries syst. myc. 2. p. 302. — Solitarius 2-3 lin. magnus.

Subtrib. III. TUBERÆ Fries syst. myc. 2. p. 289.

Peridium crassum sessile rotundatum arhizum clausum irregulariter dehiscens intus carnosum sèpè venoso-cancellatum. Peridiola minuta membranacea vix distincta inspersa.

XXVIII. RHIZOPOGON Fries symb. gast. p. 5; syst. myc. 2. p. 293. — Tuberis sp. Auct.

Peridium sessile rotundo-diffforme filamentosum demum irregulariter rumpens intus carnosum venis frequentissime anastomosantibus variegatum; peridiola membranacea globosa sessiliæ venis inspersa sporulis distinctis repleta, primò pulposa demum evacuata cava. — Fungi majores vel medii e terrâ emersi herbâ fibrillosa radicati.

1. R. ALBUS (Fries l. c.) rotundus subrugosus primò intus et extus albus demum sordide rufescens basi leviter fibrillosus. — Ad vias et sylvas arenosas, aut. — Tuber album Bull. champ. t. 404. DC. fl. fr. 2. p. 279. — Minor.

XXIX. TUBER Fries syst. myc. 2. p. 289. — Tuberis sp. Auct.

Peridium subglobosum arhizum semper clausum intus venoso-marmoratum; peridiola minuta globosa membranacea pedicellata venis inspersa. — Fungi majores vel medii subterranei.

1. T. GRISUM (Pers. syn. 127.) rotundo-diffforme lave griseum Allii odorem fragrans. — In Gallia australi rarius ex cl. Pers. — DC. fl. fr. 2. p. 279. — De Borek. lett. sur tr. piem. p. 7. t. 1. 2.

2. T. MOSCHATUM (Bull. champ. t. 479.) lave subrotundum eradicatum intus et extus nigrescens, recens odorem moschi valde redolens, carne molli siccatione rugosâ. — Circâ Aginnum. — DC. fl. fr. 2. p. 279.

3. T. ALBIDUM (Cæs. 616.) globosum, verrucis exasperatum albidum. — In arenosis rarius, aest. aut. v. g. circâ Parisios ex Chevall. — Fries syst. myc. 2. p. 291. — Sequente minus sapidum et odorum, magnitudine nucis Juglandis.

4. T. CIBARIUM (Bull. champ. t. 356.) globosum, verrucis exasperatum nigrescens. — In arenosis, hyeme. — DC. fl. fr. 2. p. 278. Nees syst. f. 147. — Mich. gen. t. 102. — Tourn. inst. r. h. t. 333. — Odor fragrans, sapor gratus.

Trib. IV. *SCLEROTIACEÆ* Ad. Brongn. cl. champ. p. 76.
Fries syst. orb. veg. I. p. 153.

Peridium indehiscens contiguum compactum confusum cellulosum et cum internâ massâ persistente sporidia fovente conatum. Sporidia plus minus oblitterata nunquam pulverulenta.

Subtrib. I. *SCLEROTIEÆ*. — Rhizogonei Sclerotii et Perisporii Fries syst. orb. I. p. 153.

Peridium confusum oblitteratumque semper clausum intus obscure cellulosum aut vesiculosum et sporidiferum.

XXX. *RHIZOCTONIA* DC. fl. fr. 5. p. 110; mem. mus. 2. p. 216. — *Thanatophytum* Nees syst. p. 148. — *Sclerotii* sp. Pers. Spreng.

Tuberculi difformes varii concrescentes cartilagineo-carnosi intus similares, cortice tenuissimo membranaceo inseparabili persistente, fibris radiciformibus byssoides ex angulis fasciculatim emissis plura individua inter se et cum plantarum radicibus conjungentibus. Fructificatio ignota. — Fungi subterranei super radices plantarum vivarum viventes easque enecantes.

1. R. *CROCORUM* (DC. I. c.) rufa, filis parcis apice super bulbos in discum expansis. — Ad bulbos Croci sativi circâ Aureliam. — *Sclerotium Crocorum* Pers. syn. 119. DC. fl. fr. 2. p. 271. *Tuber parasiticum* Bull. champ. t. 456.
2. R. *ALLII* (Graves in litt.) cinnabarina, filamentis albis tenuissimis subreticulatis. — In Allio Ascalonico culto circâ Beauvais ex cl. Graves.
3. R. *MEDICAGINIS* (DC. I. c. mem. mus. 2. t. 8.) purpureo-violacea, filamentis tenuissimis super radices arctè incumbentibus. — Ad radices Medicaginis sativæ.
4. R? *MALI* (DC. mem. mus. I. c.) alba, filamentis tennissimis super radices arctè incumbentibus. — Ad radices Mali junioris. — *Tubercula* ignota.

XXXI? *RHIZOMORPHA* Roth. cat. bot. I. p. 231. DC. fl. fr. 2. p. 281. Pers. myc. eur. I. p. 54.

Peridia subglobosa bicuspidata demum utroque apice poro dehiscencia, fibris rigidis crustaceo-corticatis elongatis radiciformibus medullâ villosâ farctis adnata, intus primò compacta dein pulverulenta. Fructificatio ignota. — Genus valde aberrans Lichenibus Fungis Byssaceisve relatum.

1. R. *FRAGILIS* (Roth. cat. I. p. 232.) longissima sublibera compressa, fibris primariis parallelis subcanaliculatis latere fibrillas transversales inter se cohaerentes exserentibus. — Sub cortice variarum arborum præsertim Quercum. — Fl. fr. 2. p. 281. R. *subcorticalis* Pers. R. *hybrida* Sow. fung. t. 392. — Mich. gen. t. 66. f. 3.
2. R. *teres* (DC.) crassiuscula fragilis teres, ramulis breviusculis subliberis aggregatis. — R. *scandens* Pers. myc. I. p. 55.
2. R. *MOLINARIS* (Pers. myc. eur. I. p. 56.) flexilis lævis subnitida teretiuscula ramosa, ramulis præsertim superioribus oppositis verticillatisque passim fasciculatis, fibrillis subintertextis. — In Vogesis, ad palos humidos molas chartaceas sustentantes det. cl. Maugeot ex Persoon.
3. R. *SUBTERRANEA* (Pers. syn. 705.) nigra ramosissima teres, ramis glabris filiformibus patulis confertis attenuatis liberis. — In fodinis metallicis ad

868 ACOTYL. SEU CELLULARES.

ligua subputrida. — Usnea radiciformis Scop. diss. 1. t. 8. Lichen radiciformis L.

4. *R. fusca* (Pers. in Moug. et Nestl. vog. n. 558.) flaccida mollis subintertexta rufo badia nitida, ramis pleruinque dilatato-palmatis, inferis in massam informem confluentibus. — In Vogesorum coriariis officinis ad parietes cuparum coriis vacuarum (cl. Moug. et Nestl.). — a Radices Solani Dulcamarae in rimis cisternarum natas a speciminibus originalibus R. fuscae distinguere non valeo. — Fries syst. orb. 1. p. 216.
5. *R. intestina* (DC. fl. fr. 5. p. 115.) tenuissima compressa serpentina nigra hinc inde tubercula lateralia subaggregata gerens. — Inter strata lignea annosarum Quercuum.
6. *R. setiformis* (Roth. catal. 1. p. 235.) teres gracillima filiformis nigra nitida rigida subsimplex, apicibus breviter ramosis. — In cryptis super trabes, in arboribus cavis et in foliis delapsis. — Fl. fr. 2. p. 281. Ceratonema hippotrichoides Pers. myc. eur. — Dill. musc. t. 13. f. 11. B. — Hanc speciem ut radices Agarici androsacei Linn. habet cl. Fries syst. myc. 1. p. 137, negat verò cl. Persoon.
7. *R. terrestris* (Pers. myc. 1. p. 59.) cespitosa parvula opaca nigra sicca rugulosa, fibrillis intertextis subangustis brevibus. — Ad terram in locis suffocatis ex Persoon. — Duas ferè uncias lata terræ arctè adhærens.
8. *R. byssoidæ* (DC. fl. fr. 2. p. 116.) tenuis byssoidæ subteres junior albida demùm fusco-nigra ramosissima, apicibus acutis divaricatis albescens. — Ad trabes in cryptis.

XXXII. ERYSIPHE Hedw. fil. in DC. fl. fr. 2. p. 272. Ad. Brongn. class. des champ. 94. — Erysibe Ehrenb. Linck. — Alphitomorpha Wallr. — Podosphæra Kunze.

Peridium carnosum globulare liberum primò luteum dein rufum tandem nigrum, irregulariter dehiscens, sporidiis solitariis vel pluribus refertum, filamentis decumbentibus radiantibus articulatis simplicibus aut ramosis intricatis impositum; sporidia sporulis farcta. — Fungilli libere evoluti superficiales super folia et caules plantarum vivarum nascentes. — Filamenta cuibus imponitur peridium duo generis sunt, illa rigidiora divergentia plerumque plus minus erecta colore interdùm magis obscuro ferrugineo aut nigrescente *capillitium* vocata, alia decumbentia plerumque longiora *hyphasma* formant plerumque album rarius fuscescens.

1. *E. Humuli* (DC. fl. fr. 5. p. 106.) hypophylla, hyphasmate limitato tandem effuso filamentis longis dense intricatis, capillitii filamentis crispatis longis fascis tandem sursùm flexis receptaculum obtegentibus, receptaculis dense aggregatis globosis demùm depressis. — Ad folia Humuli Lupuli, æstate, autumno. — Fl. fr. 5. p. 106. Desmaz. cr. exs. n. 165. — Capillitii filamenta initio hyphasmati incumbentia, demùm sursùm flexa; interdàm in utrâque folii paginâ crescit.
2. *E. Sanguisorbae* (DC. fl. fr. 5. p. 108.) bifrons, hyphasmate primùm/limitato dein confluente filamentis laxè intricatis sordide albis demùm sordide fuscescentibus, capillitii filamentis fuscis inæqualibus deorsùm flexis, receptaculis orbiculatim confertis. — Ad folia Sanguisorbae officinalis (et Veronicæ spicatae in Germaniâ ex Linck). — E. fuliginea Linck spec. 6. p. 103. Alphitomorpha fuliginea Wallr.
3. *E. Poterii* (Linck sp. 6. p. 103.) bifrons, hyphasmate effuso, filamentis longis laxè intricatis ferrugineis, capillitii filamentis apice simplicibus acutis longis ferrugineis, receptaculis minutis fuscis sparsis. — Ad folia Poterii Sanguisorbae. — Alphitomorpha ferruginea Schlecht.
4. *E. Oxyacanthæ* (DC. fl. fr. 5. p. 106.) bifrons, hyphasmate effuso filamentis

tenuissimis laxè intricatis, capillitii filamentis apice bifurcatis ramulis ultimis geminis nodosis demùm sursum versis, receptaculis minutissimis sparsis raris subglobosis. — Ad folia Crataegi Oxyacanthæ. — E. clandestina Linck. Alphitom. clandestina Wallr. — Filamenta tenerima ita ut hyphasma oculo nudo vix dignoscatur.

5. E. MALI (Dub. mss.) hypophylla, hyphasmate latè effuso, filamentis tenuissimis arachnoideis intertextis, capillitii filamentis paucis deciduis simplicibus tortuosis obtusis, receptaculis sparsis raris subglobosis rugulosis nigris. — In foliis Mali, Cerasi, etc. — Hyphasma mox laxè mox dense intertextum; capillitium valde deciduum unde receptacula sèpè capillitio destituta apparent.
6. E. PANNOSA (Linck sp. 6. p. 104.) hyphasmate effuso demùm pulvihato, filamentis subtilibus sericeis nitidis brevibus densè intricatis fuscescentibus, capillitio nullo, receptaculis densè aggregatis minutissimis rugulosis demùm fusco-nigris. — In ramis junioribus calycibus et fructibus Rosæ villosæ et caninæ. — Alphit. pannosa Wallr. — Receptacula filamentis innata a superioribus minus contextis obiecta nec nisi ætate et terendo denudata conspicua.
7. E. COMMUNIS (Linck sp. 6. p. 105.) hyphasmate subrotundo demùm effuso, filamentis arachnoideis albido, cinereisve, capillitii filamentis simplicibus albis hyphasmati affixis, receptaculis sphæricis sparsis numerosissimis tandem nigro-fuscis. — In variis plantis. — Alphit. communis Wallr. — Quum nullis characteribus varias sub hoc titulo conjunctas plantas distinguere valeam, clarissimos Wallroth et Linck secutus sum, existimans tamen quod in futurum forsan novi reperientur characteres quibus sicut fecerat summos De Candolle illi fungilli ut species distinctæ haberi poterunt.
 - a. *Leguminosarum* (Linck). — In foliis variarum Leguminosarum v. g. Pisi, Trifolii, Viciae, etc. — E. Pisi DC. fl. fr. 2. p. 274. Grev. crypt. II. t. 134.
 - b. *Umbelliferarum* (Linck). — In variis Umbelliferis v. g. Pimpinellæ, Heracleo, Scandice, Chærophyllo, etc., non solum herbam sed semina quoque interdum obducens. — Desmaz. crypt. exs. n. 166. E. Heraclei et E. Scandicis DC. fl. fr. 5. p. 107.
 - c. *Graminum* (Linck). — Ad folia graminum v. g. Tritici sativi. — E. graminis DC. fl. fr. 5. p. 106.
 - d. *Labiatarum* (Linck). — In variis Labiatis, v. g. Lamio, Menthæ, Glechomate, Marrubio, etc.
 - e. *Cichoracearum* (Linck). — In variis Cichoraceis v. g. Scorzonera Hispanica, Tragopogo porrifolio, Soncho arvensi, etc. — E. Cichoracearum DC. fl. fr. 2. p. 274. — Hyphasma totum folium tegit sèpè sterile; receptacula subdepressa.
 - f. *Ranunculacearum* (Linck). — In pluribus Ranunculaceis, v. g. Aquilegia, Ranunculo, Anemone ranunculoide, etc. — Desmaz. cr. exs. n. 265. E. Aquilegiæ DC. fl. fr. 5. p. 105.
 - g. *Polygonorum* (Linck). — In Polygonis v. g. P. aviculari. — E. Polygoni DC. fl. fr. 2. p. 273.
 - h. *Convolvulacearum* (Linck). — Ad paginam superiorem foliorum Convolvuli præsertim C. arvensis. — E. Convolvuli DC. fl. fr. 2. p. 274.
 8. E. LAMPROCARPA (Linck sp. 6. p. 108.) hyphasmate effuso, filamentis brevisimis dense intertextis, capillitii longissimis tortuosis fuscescentibus, receptaculis sphæricis nitidis demùm nigro-fuscis. — In variis Labiatis. — Alphitom. lamprocarpa Wallr. — Receptacula majora quam in sp. præcedente.
 - a. *Galeopsidis* (Linck). — In Galeopside tetrahit. — E. Galeopsidis DC. fl. fr. 5. p. 108.
 - b. *Plantaginis* (Linck). — In utrâque paginâ foliorum Plantaginis majoris et lanceolatæ.

870 ACOTYL. SEU CELLULARES. ERYSIPHE.

9. E. DORONICI (Dub. mss.) bifronsque, hyphasmate tenuissimo filamentis paucis subtilissimis laxè intertextis, capillitii numerosis longissimis contortis flexuosisque dilutè ferrugineis tenuissimis receptaculum demum sublevantibus, receptaculis numerosissimis aggregatis parvis subglobosis fuscis demum nigris. — In Doronico Austriaco circa Mimatem (cl. Prost). — An var. E. circumfusæ Linck?
10. E. KNAUTIÆ (Dub. mss.) bifrons, hyphasmate effuso tenui, filamentis intertextis albis, capillitii paucis deflexis tenuissimis purpureis, receptaculis sphæricis rugulosis nitidis aggregatis. — In foliis Knautiæ arvensis (cl. Prost). — Capillitii filamenta difficile dignoscenda.
11. E. ALCHEMILLÆ (Dub. mss.) bifrons, hyphasmate effuso tenuissimo, filamentis laxè intertextis albis, capillitii elongatis deflexis tenuissimis purpurascenscentibus, receptaculis subsphæricis opacis aggregatis. — In foliis Alchemillæ vulgaris. — Capillitii filamenta difficile dignoscenda. Priori valde atfinis an diversa?
12. E. COMPOSITARUM (Dub. mss.) hyphasmate effuso filamentis laxè intertextis, capillitii tenerrimis demum nigro-fuscis, receptaculis sphæricis demum nigro-fuscis concaviusculis marginatis. — Ad folia Corymbiferarum variorum. — E. depressa (Compositarum) Linck. Alphitom. depressa Wallr.
 - a. Lappæ. — In foliis Lappæ. — E. depressa & Bardanæ Linck.
 - b. Artemisiæ (Linck). — In foliis Artemisiæ vulgaris et A. campestris.
 - c. Cirsii. — Ad paginam superiorem foliorum Cirsii Eriophori, propè Mimatem (cl. Prost).
 - d. Cynaræ. — Ad paginam inferiorem Cynaræ circa Mimatem (cl. Prost).
13. E. DAPHNES (Dub. mss.) bifrons, hyphasmate effuso crasso, filamentis candidis dense intertextis, capillitii brevibus albis tortuosis sursum versis deflexive receptacula nitida minuta subglobosa alba demum lutea tandem fusco-rubra obtegentibus demum deciduis. — Ad folia Daphnes Alpinæ circa Mimatem (cl. Prost).
14. E. CORNI, hypophylla, hyphasmate effuso parvo, filamentis laxè irregulariterque intertextis, capillitii longissimis fuscis ad apicem tortuosis sursum versis receptacula minutissima obtegentibus. — Ad folia Corni sanguineæ, in Galliâ boreali, aut. — E. tortilis (Corni) Linck sp. 6. p. 111. Desmaz. crypt. exs. n. 266.
15. E. BETULÆ (DC. fl. fr. 5. p. 107.) hypophylla, hyphasmate effuso filamentis tenuissimis rufescenscentibus, capillitii simplicibus subulatis basi dilatatis, receptaculis sparsis demum depressis nigro-fuscis. — Ad folia Betulæ albæ.
16. E. ADUNCA (Linck sp. 6. p. 111.) hyphasmate effuso maculari, filamentis brevibus subtilissimis dense intertextis, capillitii densis inflexis longissimis niveis apice incurvato-aduncis, receptaculis sparsis globosis fusco-nigris. — Ad folia variorum fruticum et arborum. — Grev. crypt. fl. t. 296. Alphit. adunca Wallr.
 - a. Populi (Linck). — Ad folia Populi nigræ, P. canescens et P. Tremulæ. — E. Populi DC. fl. fr. 5. p. 104.
 - b. Prunastri (Linck). — Ad folia Pruni spinosæ. — E. Prunastri DC. fl. fr. 5. p. 108. — Hyphasma ferè obsoletum.
17. E. ACERIS (DC. fl. fr. 5. p. 104.) hyphasmate effuso, filamentis intertextis contignis cinereo-albis, capillitii brevissimis albis apice furcatis nodosis, receptaculis sphæricis demum depressis fuscis. — Ad folia Aceris campestris. — E. bicornis (Acerum) Linck. Alphitomorpha bicornis Wallr. — Totam superficiem præsertim superiorem folii induit quasi pellicula tenuis a folio tandem soluta.
18. E. DIVARICATA (Linck sp. 6. p. 112.) hyphasmate effuso, filamentis dense intertextis griseo-albis, capillitii tandem sursum flexis contortis bifurcatis, ramulis divaricatis ultimis floccosis, receptaculis minutis sphæricis nigro-fuscis. — Ad variorum fruticum folia. — Alphit. divaricata Wallr.
 - a. Frangulæ (Linck). — Ad folia Rhamni Frangulæ. — Hyphasma initio

- stellulare tum diffusum totam paginam occupat; capillitii filaments longa receptaculum demùm involvunt.
- β. Lonicerae* (Linck). — Ad folia Lonicerae Caprifolii. — E. Lonicerae DC. fl. fr. 5. p. 107. — Capillitii filaments parum breviora.
19. E. PENICILLATA (Linck sp. 6. p. 113.) hyphasmate effuso, filamentis subtilissimis dense intertextis griseo-albis, capillitii rectis apice penicillatis, receptaculis minutissimis globosis demùm depressis fusco-nigris. — Ad folia variorum fruticum et arborum. — Alphit. penicillata Wallr.
- α. Alni* (Linck). — Ad utramque paginam foliorum Alni glutinosæ et A. incanae. — E. Alni DC. fl. fr. 5. p. 104. — Receptacula nudo oculo vix conspicua.
- β. Grossulariae* (Linck). — In foliis Ribis Grossulariae. — Hyphasma magis griseum et pulverulentum.
- γ. Berberidis* (Linck). — Ad folia Berberidis vulgaris. — E. Berberidis DC. fl. fr. 2. p. 275.
20. E. EVONYMI (DC. fl. fr. 5. p. 105.) hyphasmate effuso filamentis crispatis dense intertextis, capillitii longissimis densis apice flocculosis tandem versus hyphasma inflexis, receptaculis globosis demùm depressis nigro-fuscis sparsis. — Ad folia Evonymi Europæi, præsertim in paginâ inferiore. — E. comata (Evonymi) Linck. Alphit. comata Wallr. — Capillitii filaments densa nitida argentea demùm versus hyphasma inflexi receptaculum ab hyphasmate solventes et elevantes.
21. E. ASTRAGALI (DC. fl. fr. 5. p. 105.) hyphasmate effuso, filamentis dense intertextis albescensibus, capillitii longissimis candidissimis tortuosis acutis, receptaculis globosis demùm depressis nitidis nigro-fuscis. — Ad folia Astragali glycyphyllei, præsertim in paginâ inferiore. — E. holosericea (Astragali) Linck. Alphit. holosericea Wallr. — Capillitii filaments primò exorrecta tum sursum versa apicibus implicatis tomentum efficiunt.
22. E. FAGI (Dub. mss.) hyphasmate limitato, filamentis dense intricatis albis, capillitii bulbosis acutis inæqualibus, receptaculis sparsis subglobosis demùm nigro-fuscis. — Ad folia delapsa Fagi sylvaticæ. — E. orbicularis Ehr. nov. act. ac. leop. car. 10. t. 12. f. 1, 5. Alphit. guttata γ Wallr.
23. E. ABNORMALIS (Duby mss.) epiphylla, hyphasmate nullo, capillitii filaments basi bulbosis rectis acutis apice interdum subaduncis demùm genuflexis receptaculum elevantibus, receptaculis globosis nigris. — In foliis Lonicerae Xylostei, Rhamni-Alpini, Rubi, Cratægi, Fragariae, Mercurialis, etc., etc.
24. E. GUTTATA (Linck sp. 6. p. 116.) hyphasmate tenui, filamentis dense intricatis albis, capillitii bulbosis rectis demùm genuflexis receptaculum elevantibus, receptaculis globosis demùm fusco-nigris. — Ad paginam inferiorem foliorum variarum arborum. — Alphit. guttata Wallr.
- α. Coryli* (Linck). — Ad folia Coryli. — E. Coryli DC. fl. fr. 2. p. 273. E. vagans Bern. sicul. 3. t. 4. f. 3.
- β. Fraxini* (Linck). — Ad folia Fraxini excelsioris. — E. Fraxini DC. fl. fr. 2. p. 273.
- γ. Ulmorum* (Linck). — Ad folia Ulmorum.
25. E. SALICIS (DC. fl. fr. 2. p. 273.) hyphasmate effuso, filamentis dense intricatis albis, capillitii brevibus albis rectis æquatis demùm inflexis et receptaculum elevantibus, receptaculis sphæricis demùm nigro-fuscis. — Ad folia variarum Salicis. — E. obtusata (Salicis) Linck. Desmaz. crypt. exs. n. 268. Alphit. guttata ♀ Wallr.
26. E. CAPREÆ (DC. herb.) epi-rarus hypophylla, hyphasmate effuso, filamentis tenuissimis dense intertextis pulverulentis, capillitii brevibus albis basi dilatatis connatisque calyculum tenuissime fimbriatum mentientibus, receptaculis confertis nigro-fuscis. — Ad folia Salicis Capreæ.
27. E? ILCIS (DC. fl. fr. 5. p. 109.) filamentis brevissimis pulverem album simulantibus, receptaculis minimis nigris depressis orbiculatum confertis. —

872 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Ad paginam inferiorem foliorum Quercus Ilicis in Occitanâ observavit cel.
De Candolle.

28. E. VIBURNI (Dub. mss.) hypophylla, hyphamate effuso, filamentis tenuissi-
mis arachnoideis laxè intertextis, capillito nullo, receptaculis nitidis minu-
tissimis sparsis paucis sphæricis. — In foliis Viburni Opuli culti circâ Mima-
tem (cl. Prost). — Receptacula nodo oculo vix perspicienda.

XXXIII. SCLEROTIUM Tode meck. 1. p. 2. Nees syst. p. 148. DC. mem. mus. 2.
p. 411. — Sclerotii sp. Pers. — Sclerotium et Spermoëdia Fries syst. myc. 1.
p. 246 et 268.

Peridium subrotundum aut irregulare cartilagineo-carnosum intus
similare, cortice tenuissimo membranaceo persistente inseparabili, in
siccis subrugosum; sporulæ subinde pruinæ instar emergentia. — Fun-
gilli minores gregarii in plantis mortuis vivisve parasitici imò lignatiles et
fimicola.

I. Libera (Fries l. c.). Undique demùm libera modo adhærentia.

* Nuda subregularia glabra

1. S. CLAVUS (DC. fl. fr. 5. p. 113.) corniforme cylindricum sulco longitudinali
interdùm notatum extùs subpruinosum purpureo-nigrum intùs album. —
Intrà glumas Graminum ferè omnium et imprimis Secalis cerealis loco seminis
et extrà florem cornu ad instar assurgens. — Mem. mus. l. c. t. 14. f. 8.
Spermoëdia clavus Fries. — Bull. herb. t. 3.
2. S. MAYDIS (Dub. mss.) ovatum elongatum globosumve extùs rugulosum
albo et nigro variegatum demùm nigrum, intùs albidum durum. — Ad ra-
chidem spicæ Maydis Zeæ déxit cl. Guépin.
3. S. COMPLANATUM (Tode meck. 1. t. 1. f. 9.) erectum substipitatum obovatum
compressum ex albido-fuscens intùs glabrum. — Ad folia obtecta, culmos
putrescentes, etc., circâ Parisios ex cl. Chevall., Lille ex cl. Desmaz., hyeme,
vere. — DC. mem. l. c. p. 413. Nees syst. f. 140. — Primò molle lacteum dein
indurescens flavidum, siccum fuscens.
4. S. SCUTELLATUM (Alb. et Schw. p. 74. t. 3. f. 6.) horizontale substipitatum
orbiculare depresso-fuscum intùs album. — Ad ramulos et folia putrida in
sylvis Galliæ borealis ex cl. Desmaz. — Nees syst. f. 139. Desmaz. cat. pl. om.
p. 29. Grev. crypt. fl. t. 144. f. 1. — Appianatum glabrum lave primò can-
didum demùm rugulosum nigrescens 2-3 lin. latum.

5. S. SEMEN (Tode meck. 1. t. 1. f. 6.) liberum sphæricum ex albido-lutescens
spadiceum demùm corrugatum nigrescens intùs album. — Ad folia putres-
centia, caules mortuos et semiputridos imprimis Solani tuberosi, hyeme, vere.
— DC. fl. fr. 5. p. 113. Nees syst. f. 138. Grev. crypt. fl. t. 144. f. 2. — Ple-
rumque exactè globosum mobile 1-2 lin. latum, siccum valde durum.

β. Brassicæ (Fries) confertum sphærico-lenticulare primò album demùm
spadiceum atrumve corrugatum. — Ad caules et folia Brassicarum hyeme
asservatarum. — Sphæria Brassicæ Bolt. t. 119. f. 2. Sow. t. 393. f. 3.

6. S. VULGATUM (Fries obs. 1. p. 204; syst. myc. 2. p. 249.) liberum globosum
vel disforme lèvissimum flavum intùs album. — In fimo aliisque quisquiliis
putrescentibus circâ Parisios ex cl. Chevall. — Solitarium parcum.

7. S. ELONGATUM (Chevall. fl. par. 1. p. 369. t. 10. f. 7.) subimmerso-liberum
primò globosum album demùm nigricans interdùm elongatum incurvum,
superficie squarroso nec rugoso, intùs album compactum. — Ad radices
coacervatas Dauci Carotæ jam putrescentes, aut. - vere. — Pisi primò mag-
nitudine et formâ, demùm 4-5 lin. æquans.

** Subterranea vel obtecta glaberrima difformia.

8. S. PNEUMONANTHES (Duby mss.) rotundum lobatum aut disforme supra con-
vexum subtilius concavum nigrum ruguloso-striatum intùs albidum corneum.

- Ad partem inferiorem caulinum Gentianæ Pneumonanthes circa Mimatem detexit cl. Prost. — Lin. 1-4 longum.
9. *S. STERCORARIUM* (DC. fl. fr. 2. p. 250; mem. mus. 2. t. 14. f. 4.) subrotundum aut difforme nigrescens siccum subrugosum intus album carnosum solidum. — Ad terram, sub fimo vaccino, æst.-ant. — Piso majus.
10. *S. ATRATUM* (Desv. journ. bot. 1809. t. 2. p. 313.) majnsculum difforme nigrum rugoso-tuberosum. — Inter muscos supra rupes Pictaviæ superioris ex cl. Desvaux. — Longitudo interdum pollicaris, diameter $\frac{1}{2}$ pollic.
11. *S. FUNGORUM* (Pers. syn. 120.) difforme lobatum glabrum pallidum dein sulvum intus albidum. — Intrâ lamellas et stipitem Agaricorum putrescentiam A. tuberosum aleans, aut. — Forma valde varia sed etiam subrotunda; color demùm badio-fuscus nigrescens.
- β. lacunosum* (Fries syst. myc. 2. p. 252.) durum lacunosum nigrum. — *S. lacunosum* Pers. disp. t. 3. f. 7. Sow. t. 287. Nees syst. f. 137.
12. *S. TRUNCORUM* (Fries syst. myc. 2. p. 252.) varium subcompressum tuberosum vel lacunosum glabrum flavum intus album. — In truncis putridis Fagi circa Parisios ex Chevall., in sylvâ Compiègne ex Graves. — *S. subterraneum* & *truncorum* Tode meck. t. 1. f. 5. c. d. DC. mem. l. c. p. 412. — Lin. 3-6 longum; junius obsoletè sericeum.
13. *S. MUSCORUM* (Pers. syn. 121.) gregarium spongiosum rotundatum aut difforme aliquandoque lobatum glabrum tuberosum, extus intusque aureum. — Circâ Muscorum radiculas propè Parisios ex cl. Chevall., aut. - vere. — *S. subterraneum* et *muscorum* Tode l. c. t. 3. f. 5. a. b. *S. subterraneum* Grev. cr. fl. t. 101. — Præcedente magis aggregato-conglomeratum.
- * * * *Adfixa basi flocculoso-villosâ.*
14. *S. RUBESCENS* (Pers. syn. 123.) liberum gregarium globosum pallidum basi villoso-radiculatum. — Ad lamellas Agaricorum propè Parisios ex cl. Chevall., sero aut. — Fries l. c. p. 253. — Globosum ovatum acutiusculum, i lin. latum medio excavatum.
15. *S. PROSTII* (Dub. mss.) liberum erectum oblongum difforme substipitatum compressum basi villoso-radiculatum extus luteo-aurantiacum intus concolor subdilatius. — In axillis foliorum Hypnorum coacervatorum propè Mimatem (cl. Prost). — Lineam vix altum.
- II. *Erumpentia* (Fries l. c. p. 254.). *Primò inclusa dein erumpentia sublibera globosa vel depressa glabra.*
16. *S. CONII* (Dnb. mss.) erumpens subhemisphaericum minutum rugulosum subdepressum roseo-luteum intus concolor. — Ad caules exsiccatos Conii maculati circa Mimatem det. cl. Prost. — Tubercula punctiformia; epidermis antè tuberculi eruptionem amæne rosea.
17. *S. IMMERSUM* (Tode meck. p. 2. t. 1. f. 3. var. α .) erumpens ovale aut subglobosum decumbens glabrum æquale flavescens. — In superficie ramulorum emortuorum Pini sylvestris, vere. — DC. fl. fr. 5. p. 111. — Lin. $\frac{1}{2}$ -1 latum stramineum semper læve intus album.
18. *S. SANGUINEUM* (Fries syst. myc. 2. p. 255.) erumpens liberum pusillum globulare læve obscurè sanguineum. — Ad folia exsiccata Convallariæ maialis propè Beauvais ex cl. Graves, hyeme. — Junius in foliis substantiâ nidulat dein superficiale et liberum magnitudine seminis Brassicæ, primò pallidum dein rufo-fuscum.
19. *S. BETULINUM* (Fries syst. myc. 2. p. 262.) gregarium confertum innatum orbiculare aut confluens convexum dein depresso pallens aut rufescens deinde fuscum. — Ad folia vetusta Betulæ, hyeme, vere. — Peziza betulina Alb. et Schw. t. 12. f. 5. Pers. myc. eur. 1. p. 300. — Minutum punctiforme.
20. *S. CYPARISSIAE* (DC. fl. fr. 5. p. 114.) erumpens subglobosum carnosum durum extus violaceum intus nigrescens. — Ad paginam inferiorem foliorum

874 ACOTYL. SEU CELLULARES. SCLEROTUM.

Euphorbiæ Cyparissiæ. — Mém. du mus. t. 1. t. 14. f. 2. — Vix lineam latum, primò concavum pallidum dein planum tandem convexum.

21. *S? ALBUM* (DC. fl. fr. 5. p. 112.) ovale decumbens glabrum album carnosum extùs subfarinaceum. — In ligno putrido Aceris pseudo-platani intrà cavitates parvulas immersum. — S. immersum γ clandestinum Tode meck. 1. p. 3. f. 4? — Longitudo bilinearis. Ad Ægeritas amandandum censem cl. Fries.
22. *S? ANOMALUM* (Duby mss.) rotundum ovatumve decumbens convexum demùm depresso album intùs compactum extùs subfarinaceum interdùm tomento densissimè intertexto obtectum. — Ad partem exteriores caulis Helianthi anni detexit cel. Prost. — Lin. 2-4 longum interdùm confluens.
23. *S. ROSEUM* (Kneiff in Moug. et Nestl. vog. exs. n. 884.) cylindricum elongatum nigrum subpruinatum longitudinaliter striatum, intùs dilutè et amoenissimè roseum. — In culmis marcescentibus Scirpi lacustris circa Argentoratum. — Lin. 4-6 lin. longum ad utramque extremitatem truncatum, demùm culmi corticem longitudinaliter disrumpens.
24. *S. GLOBULARE* (DC. fl. fr. 2. p. 278.) globulosum nigrum nitidum subdurum carne gelatinosâ flavidâ intùs farctum. — Circa Parisios in ligno putrido ad dimidium usque demersum.

III. *Subadnata* (Fries l. c.). *Superficialia dura solida glaberrima basi adnata nuda vel epidermide secedente tecta.*

25. *S. VARIUM* (Pers. syn. 122.) subrotundum oblongumque sublobatum varium subadnatum rugosum album dein fuscens tandem nigrum. — Ad caules et nervos foliorum Brassicæ, aut ad radices putrescentes Carottæ, hyemeæ. — Reb. neom. t. 4. f. 16. DC. fl. fr. 5. p. 112. Nees syst. f. 138. Elvela Brassicæ Hoffm. crypt. 2. t. 5. f. 2. — Gregarium confluens $\frac{1}{2}$ -2 unc. latum, saepius verò multò minus.
26. *S. PYRINUM* (Fries syst. myc. 2. p. 258.) oblongum flexuosum lobatum molle nigricans intùs pallidum. — Super fructus carnosos semi-putrescentes v. g. Poma Citros, etc. — *S. fructuum* Grev. Tremella ustulata Bull. champ. t. 420. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 90. — Præcedenti mollins subcontortum magis innato-adnatum.
27. *S. COMPACTUM* (DC. fl. fr. 5. p. 113; mem. mus. 2. t. 14. f. 5.) ovatum aut reticulato-connexum varium crassum subrugulosum nigrescens intùs album. — Inter pedunculos suprà receptacula et semina Helianthi anni aut intrà Cucurbitas maturas.
28. *S. BULLATUM* (DC. fl. fr. 5. p. 113; mem. l. c. t. 14. f. 5.) orbiculatum ovatumque confluens granulatum atrum intùs albidum subcorneum, suprà convexum subtùs concavum. — Suprà corticem Cucurbitæ Lagenariæ.
29. *S. DURUM* (Pers. syn. 121.) adnatum oblongum subdifforme durum tenax depresso sub stratum nigrum intùs albidum. — Ad caules plantarum exsiccatarum præcipue Umbelliferarum, Gentianæ luteæ, etc., hyeme, vere. — DC. fl. fr. 2. p. 277; mem. t. 14. f. 3. Grev. crypt. fl. t. 1. Sphaeria solida Sow. fung. t. 314. — Tubercula 2-3 lin. sed etiam $\frac{1}{2}$ -1 unc. longa lataque primò epidermide tecta dein nuda.
30. *S. BRASSICÆ* (Pers. syn. 122.) oblongum depresso tenui nigrum intùs album dein nigro-punctatum tandemque nigrum. — Intrà petiolos et folia putrescentia Brassicæ oleraceæ circa Beauvais ex cl. Graves, Parisios ex cl. Chevall., hyeme. — DC. mem. mus. 2. p. 417. — Sparsum formâ varium applanatum submarginatum 2-4 lin. longum primò epidermide tectum.
31. *S. HYACINTHI* (Guépin ined. in litt.) lenticulare ovato-oblongum minutum convexiusculum sparsum tenui nigrum subrugulosum intùs album. — Ad scapos et pericarpia exsiccatæ Hyacinthi detexit cel. Guépin. — Vix acùs capitulum æquans.
32. *S. NERVALE* (Fries syst. myc. 2. p. 260.) nervisequum semiteres lineariter elongatum crassinuscum subrugosum nigrum intùs album. — Ad folia de-

jecta Betulæ, Alni, etc., circa Parisios ex cl. Chevall., vere. — *Xyloma nervale* Alb. et Schw. p. 64. t. 7. f. 7. — Unc. 1-2 ferè longum lineam crassum durum hypophyllum nervos præcipue occupans.

33. *S. PUSTULA* (DC. fl. fr. 5. p. 113; mem. l. c. t. 14. f. 7.) hypophyllum hemisphæricum prominens junius lave sordide pallidum demùm rugulosum nigrescens intùs cornuum album demùm nigricans. — Ad folia exsiccata Fagi, Carpini, Castaneæ, etc., vere, æst. — *S. Quercinum* Pers. syn. 124. ic. piet. 3. t. 17. f. 2. Grev. crypt. fl. t. 77. — Sparsum durum 1 $\frac{1}{2}$ -2 lin. latum.

34. *S. AMBIGUUM* (Dub. mss.) ovatum orbiculatumve minutum appланatum, margine subelevato crispo, sparsum tenuē nigrum subrugulosum intùs griseo-nigricans. — Ad squamas bulborum Allii circa Angers (cl. Guépin). — Primo adspectu Patellariæ minutissimæ apothecium referens.

35. *S? SPEIREUM* (Fries syst. myc. 2. p. 261.) hypophyllum sparsum punctiforme orbiculatum planiusculum opacum nigrum. — In variis plantis vivis et languescentibus speciatim in foliis Ægopodii Podagrariæ circa Beauvais ex cl. Graves, aut. — Superficiale adnatum folio subimpressum. Dubii generis vegetabile.

? *strobilinum*, sparsum atrum planiusculum demùm concaviusculum. — Ad squamas strobilinas in Vogesis det. cel. Mougeot.

XXXIV. *XYLOMA* Linck diss. 1. p. 35. Ad. Brongn. cl. champ. p. 77. — *Xylo-*
matis sp. DC. — Sclerotii sp., *Xyloma* et *Ectostroma* Fries syst. myc. 2. p.
261 et 601.

Substantia homogenea carnosa aut suberosa compacta innata sub epidermide plantarum vivarum naescens et supernè cum hâc nunquam ruptâ subconcreta basi appланata, sporulas distinctas nunquam fovens. — Difformia bullata fuscescentia caules et folia incolentia. — Genus valdè incertum et ambiguum; species illæ forsitan propria sunt vegetabilia sed nondùm rite explicata, aliae probabiliter aliorum sunt fungorum incunabula, aliae denique nil sunt forsitan nisi status morbidus parenchymatis plantarum.

1. *X. POPULINUM* (Dub. mss. nec Pers. nec Schum.) innatum confertum subrotundum vel angulato-confluens varium convexo-planum gilvo-rufum demùm nigrescens. — In utrâque paginâ præsertim inferiore foliorum languescentium et emortuorum Populi Tremulæ, P. nigræ, etc., aut.-vere. — Sclerotium Populinum Pers. DC. fl. fr. 5. p. 114. Moug. et Nestl. vog. n. 385.

2. *X. SALICINUM* (Dub. mss. non Pers.) innatum sparsum vel confertum subrotundum vel angulatum varium rugosum demùm lave planum incarnato-rufum demùm nigrescens. — Ad folia semiviva vel emortua Salicis Capreæ, viminalis, etc., aut.-vere. — Sclerotium Salicinum Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 386. DC. fl. fr. 5. p. 114; mem. mus. 2. t. 14. f. 8. Fries syst. myc. 2. p. 263.

3. *X. AREOLATUM* (Fries obs. myc. 2. p. 358. t. 7. f. 5.) confertum subrotundum confluens planiusculum opacum nigro-fuscum eleganter angulato-areolatum. — Ad folia subemortua Pruni Padi, Virginianæ, aut. — Sclerotium areolatum Fries syst. myc. 2. p. 263. Moug. et Nestl. vog. n. 883. — Foliorum plagæ bullatae secundum areolas venarum folii regulariter et tetraëdro-diffractæ.

4. *X. HERBARUM* (Dub. mss. non Alb. et Schw.) innatum subrotundum vel oblongum confluens convexum e rufescente fusco-nigrum. — In caulis et soliis herbarum vivarum et languescentium v. g. Potentillæ, Lini, Cerastii, Epilobii, etc., aut.-vere. — Sclerotium herbarum Fries syst. myc. 2. p. 263. — Formæ innumeræ.

5. *X. ALLII* (DC. fl. fr. 5. p. 156; mem. mus. 3. p. 321.) hypo- et epiphyllum carnosum compactum rotundum ovatumve interdùm confluens convexum

876 ACOTYL. SEU CELLULARES.

læve extus griseum nigrumve intus fusco-nigrum. — Ad folia et scapula Allii multiflori in Gallo-provinciâ et Occitanâ detexit cel. DC.

6. X. ROSÆ (DC. fl. fr. 5. p. 161.) rameale confertum sæpè confluens compactum orbiculatum convexum læve griseo-nigrescens intus fascum aut nigrum epidermide ruptâ demum subnudum et Sphæriam simulans. — Ad corticem Rosarum sylvestrium. — Non confundendum cum Sphæriâ clypeata & Rosarum Fries.
7. X. SEDI (Dub. mss.) latè effusum difforme atro-piceum nitens minutissime striato-punctulatum. — In caulinis Sedi Telephiæ in Vogesis (cl. Mongeot). — Ectostroma Sedi Fries scl. suec. exs. n. 217.
8. X. BISTORTÆ (DC. fl. fr. 5. p. 153.) epiphyllum maculæforme tenui irregulare sublæve opacum nigrum in ambitu flavescens panno tenuissimo cinerascente hinc inde tectum. — In Polygono Bistortæ. — Moug. et Nestl. vog. p. 652. Ectostroma Bistortæ Fries syst. myc. 2. p. 602.
9. X. PEDICULARIS (DC. fl. fr. 5. p. 153.) epiphyllum tenui orbiculatum confluensve maculæforme parvulum læve nigrum. — Ad folia Pedicularis incarnatæ nervis mediis approximatum. — Ectostroma Pedicularis Fries.
10. X. LAURI (DC. fl. fr. 5. p. 156.) epiphyllum pustulatum planum subrotundum nigrum medio submillosum, folio circâ decolorato. — Ad folia Lauri nobilis in Galloprovinciâ. — Ectostroma Lauri Fries.
11. X. MESPILI (DC. fl. fr. 5. p. 157.) epiphyllum convexiusculum sparsum annulatumve sæpè confluens nigrum, folio circâ rubro-fuscescente. — Ad folia Mespili eriocarpæ in Jurasso.

? Subtrib. II. APIOSPOREÆ Fries syst. orb. veg. 1. p. 155.

Peridium libere evolutum extus villosum vel pulverulentum, intus subgelatinosum. Sporulæ? in centro collectæ immersæ.

XXXV. CHÆTOMIUM Kunze myc. heft. 1. p. 15. Fries syst. orb. veg. 1. p. 156.
— Conopleæ sp. Pers.

Peridium subglobosum membranaceum pilis opacis undique vestitum demum in medio dehicens; sporulæ pellucidæ massæ gelatinosæ immixtæ. — Fungilli nigri sparsi in ligno et herbis exsiccatis viventes.

1. C. ELATUM (Kunze exs. n. 184.) peridio subturbinato, pilis basi breviusculis simplicibus supernè ramosis implexis longissimis, sporulis ellipticis. — Ad caules exsiccatos herbarum, culmos Graminum, etc. — Grev. crypt. fl. t. 230. Desmaz. crypt. exs. n. 237 et ex eo Conoplea cylindrica Pers. — Vix lin. altum atrum.
2. C. ATRUM (Linck sp. pl. 6. 1. p. 46 in not.) peridiis mollissimis subconfertis rotundis atris, sporulis numerosissimis. — Ad ligna in locis suffocatis. — Conoplea atra Pers. syn. 235. — Lin. 2-3 magna.

XXXVI. ILLOSPORIUM Mart. fl. crypt. erlang. p. 325. Fries syst. orb. veg. 1. p. 156. — Tuberculariae sp. DC.

Peridia erumpenti-libera intus mollia subgelatinosa sporulis minimis globosis pellucidis farcta, demum fatiscentia. — Fungilli minuti colorati aggregati in thallo Lichenum viventes.

1. I. ROSEUM (Mart. 1. c.) sparsum orbiculare sublobatumve, læte roseum. — Ad thallum Lichenum. — Tubercularia rosea Pers. DC. fl. fr. 2. p. 277.
2. I? COCCINEUM (Fries 1. c.) gregarium punctiforme minutissimum ovatum coccineum. — In thallo Lichenum Neustriæ detexit cl. Le Prévost. — Vix hujus generis et potius ut videtur genus novum inter Sclerotriaceas constitutendum; species prima melius cognita probabiliter inter Uredineas permanebit.

Ordo CXXIII. UREDINEÆ. — Uredinearum et Mucedinearum gen. Ad. Brongn. l. c. — Gymnomycetes Linck sp. pl. 6. pars 2. — Coniomycetum ordo I et IV. Fries syst. orb. veg. 1. p. 169 et 188.

Sporidia brevia simplicia rariū septata, stromati (receptaculo) solido persistenti superficiali aut liberato, horizontali aut stipitiformi capitatoe, vero aut spurio id est ex epidermide plantarum subjacente formato, imposita aut innata, sporulas minutissimas foventia.

Trib. I. TUBERCULARIEÆ Fries syst. orb. veg. 1. p. 169.

Sporidia simplicia receptaculo solido persistenti superficiali aut liberato imposta.

Subtrib. I. CEPHALOTRICHEÆ Fries l. c. — Isaricarum gen. Ad. Brongn. cl. champ. p. 57.

Receptaculum capitatum aut ramosum clavæforme verticaliter elongatum contextu vesiculoso filamentoso, filamentis vel furfure sporidiifero obducum.

I. CEPHALOTRICHUM Linck in mag. naturf. gesellsch. 1809. p. 20. f. 34; syst. pl. vol. 6. p. 2. p. 111.

Receptaculum stipitiforme cylindricum conicumve simplex rigidum persistens, terminatum capitulo discreto ovato aut cylindrico filamentis contortis sporulis globosis intermixtis composito. — Fungilli ad truncos putrescentes foliaque semiputrida nascentes.

1. C. RIGESCENS (Linck obs. l. c. p. 18.) stipite nudo superne attenuato diviso subfibrilloso fusco capitulo fuscum non transeunte. — Ad truncos cæsos circâ Parisios ex cl. Chevall., vere. — Nees fung. f. 87. A. Chevall. fl. par. t. 4. f. 21. — Stipes lin. longus.
2. C. FLAVO-VIRENS (Nees fung. p. 87. t. 7. f. 87.) stipite filiformi fusco, capitulo flavo-virente caduco. — Ad folia semiputrida propè Parisios ex Chevall. — Periconia flavo-virens Alb. et Schw. t. 4. f. 7. — Stipes basi incrassatus striatus.
3. C. MONILIOIDES (Linck syst. pl. 2. pars 2. p. 112.) stipite albo seu lutescente et rufescente, capitulo concolore. — Ad ligna et cortices. — Isaria monilioides Alb. et Schw. t. 12. f. 8. DC. fl. fr. 5. p. 12. — Species pusilla vix lin. longa nitidula nunc sparsa nunc longe lateque gregaria.

II. PERICONIA Tode meck. 2. p. 2. Pers. syn. 686. Linck sp. pl. 2. p. 2. p. 109.

Receptaculum stipitiforme firmum siccum subulatum terminatum capitulo rotundo sporulis tecto. — Fungilli gregarii herbarni et ramorum emortuorum incolæ.

1. P. LICHENOIDES (Tode meck. 2. t. 8. f. 68.) stipite capillari recto rigidiusculo demùm argenteo, capitulo globoso vesiculari. — Ad caules plantarum emortuarum, æst. — DC. fl. fr. 5. p. 16. — Nudo oculo vix perceptibilis e maculâ atrâ crustæformi oriens. Hanc habet cl. Linck ut Mucorem a Todio male descriptum ac pictum.

878 ACOTYL. SEU CELLULARES.

2. *P. STEMONITIS* (Pers. syn. 687.) gregaria elongata cinerea, stipite subulato rigido inferne nigro apice sporulis canescens cincto. — Ad caules plantarum, ramulos, quisquilias, etc. — *P. subulata* Nees nov. act. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 8. — Lin. 1-2 longa. Nudo oculo apex nebulâ quâdam cinerascente obvolutus clavulam parvam sistit quæ lenti subjecta sporulis numerosis globosis composita appetet.
3. *P. BYSSOIDES* (Pers. syn. 686.) stipite nigro, sporulis concoloribus in capitulum globosum collectis. — Caules herbarum præsertim Malvacearum emortuos longè latèque investiens. — DC. fl. fr. 5. p. 17. Nees in nov. act. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 9. — Maculæ irregulariter confluentes cinerascenti-nigræ; stipites vix octavam lineæ partem alti.

III. ISARIA Pers. comm. 99; syn. 687. DC. fl. fr. 5. p. 12. Linck sp. pl. 6. pars 2. p. 112.

Receptaculum elongatum continuum simplex aut ramosum persistens ad extremitates clavatum fibrosum carnosumve filamentis obductum; sporulæ minutissimæ globosæ numerosæ filamentis inspersæ. — Fungilli fugaces albi grisei aut lutescentes in insectorum cadaveribus rarius in lignis mortuis viventes.

1. I? *FELINA* (Chevall. journ. phys. feb. 1822. t. 1. f. 5.) cespitosa albo-nivea elongata filiformis ramosa, ramis subcylindricis simplicibus aut furcatis intricatis mollibus, intùs solida filamentosa strato sporulifero laxe farinaceo corticata. — Ad stercore felina, in cryptis. — Clavaria? felina DC. fl. fr. 5. p. 30. *Fibrillaria felina* Pers. myc. eur. 1. p. 53. *Amphicorda* Fries syst. orb. veg. 1. p. 170. — An genus distinctum ut vult cl. Fries?
2. I. *CRASSA* (Pers. syn. 687.) alba demùm ramosa, ramis truncatis incisulis, basi demùm distincta glabra. — Ad larvas et chrysalides insectorum emortuas. — Linck. sp. pl. 6. p. 2. p. 112. *I. velutipes* Linck. obs. 1. p. 18. f. 32. Nees fung. f. 85. *I. truncata* Pers. — Variabilis planta, junior vix poll. longa clavata simplex filamentis obtecta (*I. velutipes*), dein basi glabra apice compressa (*I. crassa*), tandemque apice compressa ramulosa.
3. I. *ELEUTHERATORUM* (Nees fung. p. 86. t. 7. f. 84.) stipite filiformi torto subcompresso filamentoso albo ramoso, ramulis patentibus lateralibus minutis. — Suprà Carabos aut Cerambyces emortuos circà Parisios ex cl. Chevall., aut.-hyeme. — Vix 3 lin. longa.
4. I? *SPHECOPHILA* (Ditm. in Sturm. fl. 4. t. 57.) fasciculata, stipite simplici longissimo subulato medio nodoso dilutè umbrino apicibus sporuliferis cinereis. — Ad Vespas subputridas, æst. — *Ceratonema Crabronis* Pers. myc. enr. 1. p. 48. — Unc. 4 longa flexuosa $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ lin. lata. — An potius *Sphaeria* nondùm evoluta?
5. I. *AGARICINA* (Pers. syn. 688; myc. 1. p. 47.) conferta alba rigida, stipite ramosissimo albo toto filamentoso, ramis filiformibus patentibus. — In Agaricis exsiccatis semiputridis. — *Clavaria brachiata* Batsch. cl. fung. 1. f. 163. — Lin. 3 circiter alta.
6. I. *EPIPHYLLA* (Pers. syn. 688; myc. 1. p. 46.) cespitosa, stipite simplici elongato clavato filamentoso albo. — Ad folia exsiccate Faginea aut Populnea. — DC. fl. fr. 5. p. 12. — Clavulæ basi dense approximatâ cespitulum efformant, singula 3 lin. fere longa $\frac{1}{2}$ lin. crassa.
7. I. *HYDNOIDES* (Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 116.) niveo-pallens, stipitibus conicis confertiusculis subsimplicibus totis filamentosis. — Ad ligna Pineæ putrida Jurassi, ant. — *Hydnium calvum* Alb. et Schw. t. 10. f. 8. DC. fl. fr. 5. p. 36. — Stipites sparsi minutissimi vix lin. longi.
8. I. *UMBRA* (Pers. ic. pict. 4. t. 21. f. 4.) stipitibus basi connatis partitisque totis filamentosis umbrinis. — Ad ramos dejectos et truncos patridos. — Linck l. c. p. 117. — Ad 3-4-vel lin. alta.

g. I. CARNEA (Pers. syn. 689; obs. myc. 1. t. 2. f. 6. 7.) effusa subevanescens primò albida dein carnea, stipite flaccido albido. — Super muscos et folia sicca. — DC. fl. fr. 5. p. 12. — « Quamvis picta et descripta attamen secundum structuram ignota. » (Linck.)

10. I. SACCHARINA (Pers. syn. 689.) effusa candida filamentis parcis intertextis, pulvere denso dispergibili obtecta. — Ad Boletum cyanescentem propè Beauvais ex cl. Graves. — An a Sporotricho Agaricino Linck cum quo a cel. auctore sub nomine Aleurismatis saccharini olim conjuncta fuerat revera distincta?

Subtrib. II. SCORIADEÆ Fries syst. orb. 1. p. 171.

Receptaculum varium e filamentis contextum effiguratum plus minus distincte horizontaliter expansum.

IV. CERATIUM Alb. et Schw. nisk. p. 358. DC. fl. fr. 5. p. 11. Fries syst. orb. 1. p. 121. — Isariæ sp. Pers. syn.

Receptaculum membranaceo-plicatum ramulosum fluxile contextum e filamentis apice prominulis et sporulas solitarias gerentibus. — Fungilli truncorum putrescentium incolaæ Hydna resupinata primo adspectu omnino referentes.

1. C. HYDNOIDES (Alb. et Schw. l. c. t. 2. f. 7.) stipitibus aggregatis connatis ramosis albis. — Ad trunco putrescentes Fagineos, aest. post pluvias. — Nees fung. t. 6. f. 82. DC. fl. fr. 5. p. 11. Grev. crypt. fl. t. 168. Isaria mucida Pers. syn. 688. Clavaria byssoides Bull. champ. t. 415. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 99. Tremella hydnoidea Jacq. misc. 1. t. 16. — Mich. gen. t. 92. f. 2. — Stipites ita aggregati ut saepè in series sat longas confluant.

2. C. PYXIDATUM (Alb. et Schw. nisk. p. 359. t. 12. f. 9.) stipitibus aggregatis basi simplicibus apice radiatim partitis albis-cinereis. — Ad ligna semiputrida circè Lugdunum ex cl. Balb. — Linck sp. pl. 6. 2. p. 119. Isaria pyxidata Spreng. syst. veg. 4. p. 545. Balb. fl. lugd. 2. p. 312. — Semilineam vix altum.

Subtrib. III. FUSARIEÆ. — Dermosporii et Tubercularei Fries l. c. p. 172.

Receptaculum rotundatum vel effusum liberum aut primò innatum dein erumpens liberatum sporidiis tectum.

V. ÆGERITA Pers. syn. 684. Nees fung. p. 30. Linck. sp. pl. 6. 2. p. 108. Fries syst. orb. veg. 1. p. 172.

Sporidia globosa sparsa ad superficiem stromatis liberi rotundati gruinosi. — Fungilli corti-aut lignicolaæ.

1. Æ. CANDIDA (Pers. l. c.) stromatibus globosis sparsis candidis, sporidiis inaequalibus. — In corticibus arborum emortuis. — Nees fung. t. 2. f. 24. Grev. crypt. fl. t. 268. f. 1. Sclerotium Ægerita Hoffm. germ. 2. t. 9. f. 1. — Granula sistit candida magnitudine grani pulveris-pyri demum in squamulas secedentia.

2. Æ? EPIXYLON (DC. fl. fr. 2. p. 72.) stromatibus convexis primò griseis demum nigrescentibus intus filamentosis, sporidiis oblongis. — In ligno putrido. — Reticularia epixylon Bull. champ. t. 472. f. 1. — Grana laevia molles demum in pulverem fatiscentia, filamenta articulata elastica.

VI. TUBERCULARIA Tode meck. 1. p. 18. Pers. syn. p. 111. DC. fl. fr. 2. p. 273.

Receptaculum tuberculatum compactum carnosum sessile saepè basi in collum subangustatum, e sporidiis globosis minimis et numerosis-

880 ACOTYL. SEU CELLULARES.

simis strato composito corticatum. — Corticis arborum fruticumque rariūs herbarum hospites sāpiūs rubræ.

1. *T. VULGARIS* (Tode meck. 1. p. 18.) *gregaria*, receptaculis majoribus immersis rubris supernè albis, sporidiis ruberrimis, strato sporidiorum convexo lævi dein tuberculo demū diffluente. — Ad truncos juniores ramosque arborum et fruticum emortuarum. — Fl. fr. 2. p. 275. Desmaz. crypt. exs. n. 170. *Tremella purpurea* Linn. Hoffm. veg. cr. 1. t. 6. f. 2. *Sphæria miniata* Bolt. t. 127. f. 1. — Semilineam et ultrā lata.
2. *T. CONFLUENS* (Pers. syn. 113.) *gregaria confluens*, receptaculis minoribus immersis incarnato-lateritiis albive subrotundis oblongis angulatisque, sporidiorum strato planiusculo ruberrimo lævi diffluente. — In ramulis emortuis arborum imprimis Fagi, Castaneæ, Aceris, etc. — DC. fl. fr. 2. p. 276. Mong. et Nestl. vog. exs. n. 576. *T. Castaneæ* Pers. DC. fl. fr. 5. p. 109. *T. minor* Linck. sp. 6. p. 2. p. 100. Desmaz. cr. exs. n. 171. — Vix $\frac{1}{4}$ lin. partem sequans.
3. *T. MAGNOLIÆ* (Pers. ined. ex cel. Graves in litt.) *gregaria*, receptaculis minoribus immersis albis subrotundis, sporidiorum strato planiusculo carneo-rubro demū fusco-nigrescente primò lævi dein tuberculo. — Ad ramos emortuos Magnoliæ grandifloræ propè Beauvais (cl. Graves).
4. *T. GRANULATA* (Pers. syn. 113.) receptaculis immersis albis subrotundis brevissimè stipitatis, strato sporidiorum convexo sordide rubro demū nigrescente primò lævi dein rugoso-tuberculo. — Ad ramos emortuos Aceris, Tiliæ, etc. — DC. fl. fr. 5. p. 109. Grev. crypt. fl. t. 187.
5. *T. VELUTIPES* (Nees syst. fung. p. 35. t. 2. f. 27.) receptaculis minutis primò filamentis albis immersis et iisdem tectis demū emersis hemisphæricis depressis cinnabarinis substipitatis, stipite brevi crasso filamentis albis vestito. — Ad corticem Ulmi prope Beauvais (cl. Graves). — *T. floccosa* Linck. obs. 2. p. 35; syst. pl. 6. pars 2. p. 102.
6. *T. NIGRICANS* (Gmel. syst. 1482.) receptaculis majusculis immersis rubris filamentis primò tectis iisque immersis demū emergentibus hemisphæricis lævibus tandem nigris. — Ad ramos emortuos. — DC. fl. fr. 2. p. 276. *Tremella nigricans* Bull. champ. t. 455. f. 1.
7. *T? CINNABARINA* (DC. fl. fr. 2. p. 276.) minima subgelatinosa carnoso-bullata miniato-subpurpurea, superficie granulosâ. — Ad muscos et varias herbas parasitica. — Ex habitu Agyrii speciem haberet cel. Fries syst. myc. 2. p. 233.

VII. FUSARIUM Linck sp. pl. 6. 2. p. 104. — Fusarium et Atractium Linck obs. 1. p. 8. Nees syst. p. 35 et 36.

Sporidia fusiformia diffluentia instrata stromati carnoso sessili aut stipitato-rotundato aut effuso. — Fungilli miniuti in plantis mortuis viventes.

1. *F. PALLENS* (Nees in nov. act. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 7.) stromate subcapitato immerso albicante, sporidiis concoloribus septatis. — In ramis dejectis fruticum. — Fusidium obtusatum et pulvinatum Linck obs. 2. p. 31 et 32. — Stroma ex cinereo-rufescens epidermide cinctum supernè in capitulum globosum parùm incrassatum; sporidiorum septa magis minusve distincta.
2. *F. ROSEUM* (Linck obs. 1. p. 8; sp. pl. 6. 2. p. 105) stromate minuto vix immerso subgloboso roseo, sporidiis fusiformibus pallidioribus. — In caulinis foliisque plantarum siccarum præsertim Malvacearum. — Grana minuta refert autumno gregatim et magnâ copiâ provenientia.
3. *F. CILIATUM* (Linck sp. l. e.) stromate minuto vix immerso subgloboso basi attenuato rubescenti longe piloso, sporidiis fusiformibus septatis. — Ad caules dejectos Solani tuberosi, et ad ramos dejectos, etc. — *Atractium ciliatum* Linck obs. *Tubicularia ciliata* Alb. et Schw. t. 5. f. 6. DC. fl. fr. 5. p. 110.

4. *F. STILBASTER* (Linck sp. l. c.) stromate emerso capitato lutescente, sporidiis fusiformibus concoloribus. — In truncis Fagorum cæsis. — Atractium stilbaster Linck obs. 1. p. 8. Nees fung. f. 34. — Vix $\frac{1}{2}$ lin. longum fugax, stipite facile evanescente et capitulo ferè toto in sporidia diffluente.
5. *F. LATERITIUM* (Nees fung. t. 2. f. 26.) stromate semigloboso deplanato et irregulariter expanso subgelatinoso lutescenti-rubro, sporidiis globosis et fusiformibus crassiusculis curviusculis. — In truncis emortuis asseribusque humidis. — Stromata interdùm 8-10 linearum spatium occupantia.

Trib. II. *MELANCONIEÆ*. — Entophyti Fries syst. orb.
veg. 1. p. 188.

Sporidia sub epidermide plantarum nascentia demùm erumpentia stromati semper innato spurio aut obsoleto insidentia.

Subtrib. I. *SPORIDESMIEÆ* Fries l. c.

Sporidia filamentiformia septata receptaculo genuino juncta.

VIII. *GYMNOSPORANGIUM* Linck obs. 1. p. 7. Nees fung. p. 37. Fries syst. orb.
veg. 1. p. 190. — Gymnosporangii sp. DC.

Sporidia uniseptata pedicellata adnata stromati erumpenti vesiculosogelatinoso subeffuso. — Fungilli per epidermidem vivam erumpentes. — In statu primario Pucciniis simillimum, tantem sub pluviis turgescit stroma.

1. *G. JUNIPERI* (Linck obs. 1. p. 7; sp. pl. 6. 2. p. 127.) stromate simplici primùm conico demùm effuso aurantiaco. — In truncis Juniperi communis et Sabinæ. — Nees fung. t. 2. f. 23. a. G. conicum DC. fl. fr. 2. p. 216. Tremella Juniperina Linn. Hoff. veg. crypt. 1. t. 6. f. 4.

IX. *PODISOMA* Linck obs. 1. p. 7. Nees fung. p. 18. Fries syst. orb. veg. 1.
p. 190. — Gymnosporangii sp. DC.

Sporidia uniseptata pedicellata, stipitibus longissimis basi in stroma clavatum erumpens gelatinosum junctis. — Fungilli per epidermidem vivam erumpentes. — Praecedenti valdè affine.

1. *P. FUSCUM* (Dub. mss.) stromate globoso demùm conico rufo-spadiceo demùm fulvo, sporidiis utrinque obtusis. — In cortice Juniperi Sabinæ et J. Virginianæ. — P. Juniperi Linck. Nees fung. t. 1. f. 15. Gymnosporangium fuscum DC. fl. fr. 2. p. 217. Puccinia Juniperi Pers. disp. meth. t. 2. f. 1. a. c. — Mich. gen. t. 92. f. 1.

2. *P. CLAVARIAFORME* (Dub. mss.) stromate cylindrico aut subcompresso simplici aut bifurcato aurantiaco, sporidiis utrinque acutis. — In cortice Juniperi communis. — Tremella clavariformis Jacq. coll. 2. p. 274. T. digitata Vill. dauph. t. 56. T. ligularis Bull. champ. t. 427. f. 1.

X. *PHRAGMOTRICHUM* Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 84. t. 2. f. 4.

Sporidia rhombea septata opaca isthmis cylindricis septatis pellucidis primò in fibras erectas concatenata et stromati fibroso-gelatinoso innata, dein epidermide ruptâ soluta libera. — Fungilli minuti primo aspectu Hysteria referentes.

1. *P. CHAILLETII* (Kunze et Schm. l. c.) stromate oblongo atro, sporidiis concoloribus. — In strobilis Abietis Jurassi ex cl. Chaillet, et probabiliter in monrosis Abietinis. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 126. — Stroma initio parvum semi-

882 ACOTYL. SEU CELLULARES.

lineam longum demum majus, epidermide longitudinaliter rupta emersum, compositum e massa fibroso-gelatinosa filamentis in sporidia abeuntibus.

XI. SPORIDESMIUM Linck obs. 1. p. 39. Nees fung. p. 22.

Sporidia fusiformia opaca septata pedicellata opaca superficiali-adnata stromati innato effuso. — Fungilli gregatim in asseribus putridis nascentes.

1. *S. ATRUM* (Linck l. c. f. 64.) stromate effuso atro, sporidiis dense aggregatis clavatis demum fusiformibus et tortuosis concoloribus. — In asseribus putridis. — Nees fung. f. 18. (Janus), *S. fusiforme* Nees in nov. act. acad. leop. t. 9. t. 5. f. 1. (aestate proiectum), *S. vagum* Nees l. c. t. 5. f. 2. — Longè latèque asseres incrustans stromate crassissculo atro, primâ aëtate acervos parvos oblongos tum lineares formans.

XII. CORYNEUM Nees syst. p. 34. Linck sp. pl. 6. 2. p. 125.

Sporidia fusiformia septata opaca erecta pedicellata stromati verrucæformi plano innato-erumpenti innata. — Fungilli miniati sub epidermide ramulorum dejectorum nascentes demum erumpentes quibusdam Dottideis in statu juvenili valde similes.

1. *C. UMBONATUM* (Nees l. c. t. 2. f. 31.) stromate subrotundo supra planiusculo sèpè umbonato nigro, sporidiis subcylindricis, pedicellis elongatis. — In ramis dejectis. — *C. disciforme* Kunze et Schm. myc. heft. 1. t. 2. f. 18. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 537. — Stroma 2 lin. latum; sporidia subpellucida recta aut curvata.
2. *C. PULVINATUM* (Kunze et Schm. myc. heft. 1. p. 78. t. 2. f. 19.) stromate subrotundo convexo atro non umbonato, sporidiis ovalibus obtusis, pedicellis cylindricis elongatis. — In ramulis dejectis. — Moug. et Nestl. vog. exs. n. 574. — Stroma vix lineam longum subglobosum aut ellipsoideum.

XIII. EXOSPORIUM Linck obs. 1. p. 8; sp. pl. 6. 2. p. 120. — Vermicularia et Exosporium Fries syst. orb. veg. 1. p. 111 et 191. — Conopleæ sp. Pers.

Sporidia oblonga aut linearia septata opaca sessilia stromati innato verrucæformi effusoque adnata. — Fungilli sub epidermide nascentes et demum erumpentes facillimè primo aspectu pro Sphaeriis habendi.

1. *E. TILIAE* (Linck obs. 1. t. 1. f. 8.) stromatibus gregariis atris minutis convexis, sporidiis elongatis obtusis concoloribus. — In truncis emortuis Tiliae. — Nees syst. t. 2. f. 30. Grev. crypt. fl. t. 208. — Sporidia sub 5-septata, septis demum evanescentibus.
2. *E. HYPODERMII* (Linck sp. pl. 6. 2. p. 121.) stromatibus oblongis sèpè confluentibus epidermide rupta cinctis atris, sporidiis elongatis distantibus filiformibus concoloribus. — Ad caules siccos Umbelliferarum. — *Conoplea hypodermia* Linck obs. 2. p. 32. Pers. myc. 1. p. 12. — Acervi miniati nudo oculo striolas atras efficientes.
3. *E. ERYNGII* (Chevall. fl. par. 1. p. 39. t. 3. f. 7. c.) stromatibus gregariis punctiformibus atris, sporidiis elongatis clavæformibus acutis distinctis concoloribus. — Ad caules aridos Eryngii campestris. — *Conoplea Eryngii* Pers. myc. 1. p. 11.
4. *E. HISPIDULUM* (Linck sp. pl. 6. 2. p. 122.) stromatibus oblongis aggregatis epidermide rupta cinctis atris, sporidiis longissimis filiformibus concoloribus. — In foliis glamisque exsiccatis Graminum. — *Conoplea hispidula* Linck obs. 2. p. 32 non Pers.
5. *E. DEMATIUM* (Linck sp. l. c.) stromatibus oblongis plano-depressis aggregatis et confluentibus innatis atris, sporidiis brevibus filiformibus sparsis concoloribus. — Vulgatissima in caulis exsiccatis herbarum omnium.

hyeme, vere. — *Sphaeria Dematum* Pers. syn. 88. excl. var. *f.* Fries syst. myc. 2. p. 505. *S. pilifera* DC. fl. fr. 2. p. 300. — *Staturā admodum variat*, subinde adeò pusilla ut nudo oculo vix distingui queat.

6. *E. MINUTUM* (Linck sp. l. c.) stromatibus oblongis aggregatis et confluentibus innatis atris, sporidiis elongatis filiformibus densis concoloribus. — In caulinis herbarum exsiccatis, aut. — Desmaz. crypt. exs. n. 231. *Sphaeria Dematum* *f. minor* Fries l. c. — *Minutissimum*, nudis oculis vix distinguendum.
7. *E. TRICHELLUM* (Linck, l. c.) stromatibus minutis globosis innatis sparsis atris, sporidiis elongatis filiformibus densis divergentibus concoloribus oliveaceisve. — Ad folia Hederæ, Salicūm, etc., scapos exsiccatos Allii Cepæ propè Beauvais ex cl. Graves. — *Sphaeria trichella* Fries syst. myc. 2. p. 515. — Stromata demùm collabentia interdùm maculæ exaridæ insidentia.
8. *E. RUBI* (Nees in nov. act. leop. 9. t. 5. f. 6.) stromatibus subglobosis vertice depresso maculis nigris rotundis innatis, sporidiis brevissimis filiformibus concoloribus. — Ad folia Rubi. — Linck sp. pl. 6. 2. l. c. — Stromata magnitudine varia, sporidiis nudo oculo non conspicuis.

Subtrib. II. *STILBOSPOREÆ* Ad. Brongn. class. champ. p. 37. Fries l. c.

Sporidia oblongata septata libera coacervata suprà stroma spurium. — Per epidermidem mortuam erumpentes raro tecta.

XIV. *ASTEROSPORIUM* Kunze in bot. zeit. 1819. p. 225. Ad. Brongn. class. champ. p. 36. Fries syst. orb. veg. 1. p. 192.

Sporidia stellata farcta septata suprà stroma floccoso-grumosum coacervata. — Fungilli irregulariter acervulati sub vegetabilium mortuorum epidermide erumpentes. — Genus a sequenti vix diversum ex cl. Brongn.

1. *A. HOFFMANNI* (Kunze l. c.). — In ramulis exsiccatis Fagi sylvaticæ. — Mong. et Nestl. vog. exs. Stilbospora asterosperma Hoffm. deutsch. fl. 2. t. 13. f. 3. Pers. syn. 96. DC. fl. fr. 5. p. 150. — *Stroma nigrum rotundatum subconvexum*.

XV. *STILBOSPORA* Nees syst. p. 21. Linck sp. pl. 6. 2. p. 193. — *Stilbospora* sp. Pers. DC.

Sporidia septata ovalia aut oblonga non pedicellata in acervos irregulares coacervata. — Fungilli minuti per epidermidem plantarum mortuarum erumpentes.

1. *S. MACROSPERMA* (Pers. disp. t. 3. f. 13.) acervis elevatis in ambitu effusis epidermide tectis, sporidiis cylindricis biseptatis pellucidis atris. — In cortice arborum emortuarum præsertim Carpini. — DC. fl. fr. 5. p. 151. Nees fung. t. 1. f. 17. Desmaz. exs. n. 136.
2. *S. ANGUSTATA* (Pers. syn. 96.) acervis subrotundis papillatis epidermide tectis, sporidiis cylindricis obscure septatis pellucidis atris. — In ramis dejectis arborum præsertim Fagi. — DC. fl. fr. 5. p. 151.
3. *S. PYRIFORMIS* (Hoffm. germ. t. 13. f. 4.) acervis elevatis epidermide tectis, sporidiis inæqualibus pyriformibus 4-7-septatis atris. — In cortice Aceris platanoidis. — Desmaz. crypt. exs. n. 137. obs. bot. et zool. t. 2. f. 1.

XVI. *DIDYMOSSPORIUM* Nees fung. p. 33. Linck sp. pl. 6. 2. p. 93.

Sporidia didyma aut uniseptata non pedicellata oblonga suprà stroma spurium coacervata. — Fungilli minuti sub epidermide ramorum emor-

884 ACOTYL. seu CELLULARES.

tuorum erumpentes. — Melanconio valdè affine, septum sporidiorum sèpè inconspicuum (Fries).

1. *D. BETULINUM* (Grev. crypt. fl. 5. t. 273.) acervis subconicis irregularibus, stromate depresso-conico basi latè effuso sulphureo, sporidiis compactis ovalibus atris uniseptatis. — Ad cortices emortuos Betulæ et Fagi. — *D. elevatum* Linck l. c. p. 94. *Melanconium betulinum* Kunze deutsch. schw. exs. n. 208. Moug. et Nestl. exs. n. 670. *Stilbospora spermatodes* Linck obs. 2. p. 30. — Acervi interdùm quasi papillati.
2. *D. COMPLANATUM* (Nees fung. t. 1. f. 29.) acervis subrotundis ellipticis supra planis, stromate spurio obliterato, sporidiis minutis subcompactis subglobosis atris didymis. — In ramis dejectis arborum. — *Stilbospora didyma* et *conglutinata* Linck obs. 2. p. 30 et 31. — Acervi parvi epidermide cincti.

XVII. MELANCONIUM Nees syst. p. 32. Linck obs. 1. p. 3; sp. pl. 6. p. 89. — Stilbosporæ sp. Pers. DC.

Sporidia libera rotundata simplicia non septata nec pedicellata supra stroma spurium coacervata. — Fungilli miniati sub epidermide plantarum mortuarum aut ex ipsâ erumpentes.

1. *M. CONGLOMERATUM* (Linck sp. pl. 6. 2. p. 92.) acervis sporidiorum initio subrotundis demùm effusis, sporidiis compactis minutis subglobosis atris opacis. — In ramis arborum emortuis. — Desmaz. crypt. exs. n. 228. *M. atrum* Linck obs. 1. t. 1. f. 7. *Stilbospora conglomerata* et *microsperma* Linck obs. 2. p. 30 et 31. — Acervi primo epidermide tecti demùm cincti, tandem effusi.
2. *M. BICOLOR* (Nees fung. p. 32. t. 2. f. 27.) acervis subrotundis elevatis, stromate spurio elevato albo, sporidiis subglobosis oblongisque minutis atris. — In ramis dejectis variarum arborum circà Parisios ex Chevall. — *M. discolor* Schmidt et Kunze exs. n. 157. — Acervi ferè semper epidermide tecti, stromate interdùm prominente.
3. *M. SPHÆROIDEUM* (Linck sp. l. c.) acervis semiglobosis circumcircà effusis epidermide inclusis, sporidiis compactis ovoideis minutis atris pellucidis. — In ramis emortuis Rhamni Frangulæ aliarumque arborum. — Desmaz. crypt. exs. n. 227. *Stilbospora microsperma* Pers. obs. 1. t. 2. f. 3. DC. fl. fr. 5. p. 150. Moug. et Nestl. vog. n. 384. — *Habitus Sphæriæ*.
4. *M. SPHÆROSPERMUM* (Linck sp. l. c.) acervis sporidiorum ellipticis epidermide tectis tandem effusis, sporidiis minutis globosis atris pellucidis. — In culmis graminum siccis. — *Stilbospora sphærosperma* Pers. obs. 1. t. 1. f. 6. DC. fl. fr. 5. p. 150.
5. *M. DISSEMINATUM* (Linck l. c.) sporidiis inspersis conglomeratis subglobosis minutis atris pellucidis. — In asseribus semiputridis circà Parisios ex cl. Chevall. — Stratum magis minusve densum et continuum latam plagam occupans.
6. *M. OVATUM* (Linck l. c. excl. syn. Hoffm.) acervis sporidiorum elevatis irregulariter effusis, sporidiis maximis compactis ovalibus et pyriformibus atris pellucidis. — In cortice arborum emortuarum. — Desmaz. crypt. exs. n. 226. *Stilbospora ovata* Pers. obs. 1. t. 2. f. 6. DC. fl. fr. 5. p. 150. Grev. crypt. fl. t. 212. f. 2. *M. apiocarpum* Linck l. c.

Subtrib. III. NEMASPOREÆ Fries syst. orb. veg. I. p. 194.

Sporidia minuta cum stromate conglutinata. — Sub epidermide planarum plerumque mortuarum nascentia.

XVIII. SCHIZODERMA Fries syst. orb. veg. 1. p. 194. non Ehrenb. — Hypoder-
mum Linck sp. pl. 6. 2. p. 88. non obs.

Sporidia minuta globosa simplicia non pedicellata cum stromate granuloso conglutinata discoideo-erumpentia. — Fungilli minutissimi sub epidermide foliorum Pini et Abietis primò nascentes dein erumpentes. — Habitus Phacidiorum.

1. S. SPARSUM (Dub. mss.) acervis oblongis parvis sparsis amphigenis. — In foliis Abietis et Pini sylvestris. — Hypodermium sparsum Linck l. c. — Oculo nudo conspicuntur puncta minuta atra.
2. S. SULCIGENUM (Dub. mss.) acervis linearibus oblongisque primo epidermide elevata tectis, tum epidermide ruptâ in sulcos degentibus, plerumque epi- genis. — In foliis siccis et delapsis Pini sylvestris. — Hypodermium sulcige- num Linck l. c. — Acervos primâ àtate formans fuscos epidermide tectos, demùm epidermide ruptâ sovea oritur tandem ad 6-10 lin. extensa intus sporidia conglomerata continens.
3. S. NERVISEQUUM (Dub. mss.) acervis binis linearibus nervisequis hypogenis. — In foliis emortuis Abietis ut præced. species in Alsatiâ detexit cl. Nestler ex cel. Linck. — Hypodermium nervisequum Linck l. c. — Acervi prime epidermide nitente tecti.

XIX. BLENNORIA Fries syst. orb. veg. 1. p. 366.

Sporidia elongata cylindrica utrinque truncata diaphana simplicia minutissima cum stromate gelatinoso in tuberculum erumpens conglu- tinata. — Sub epidermide foliorum perennium nascens.

1. B. BUXI (Fries l. c.). — In foliis Buxi amphigenam in Andegaviâ detexit cl. Guépin, propè Vire cl. Lenormand. — Moug. et Nestl. veg. exs. n. 882. — Acervi fusco-nigricantes convexi epidermide ruptâ cincti; sporidia numero- siSSIMA.

XX. NEMASPORA Ehrenb. sylv. ber. Fries syst. orb. veg. 1. p. 194. — Myxo-
sporium Linck sp. 6. 2. p. 98. — Næmasporæ sp. Pers. DC.

Sporidia globosa minima simplicia non pedicellata cum stromate gelatinoso subcellulari conglutinata cirrhose profluentia. — Fungilli sub epidermide plantarum mortuarum protrusi et effusi.

1. N. CROCEA (Pers. syn. 109.) sporidiis minutis globosis aurantiacis. — Ad truncos Fagineos cæsos. — DC. fl. fr. 2. p. 302. Myxosporium croceum Linck.

XXI? SEPTARIA Fries nov. fl. suec. cont. 5. p. 78. Kunze myc. heft. 2. p. 107.

Sporidia cylindrica pellucida non pedicellata septata materiâ gelati- nosâ juncta cirrhose profluentia. — Fungilli miniuti sub epidermide foliorum erumpentes. — Hocce genus ad Hypoxyla refert cel. Greville et describit acervulos ut sphærulas substantiæ foliorum immersas sub- globosas ostiolo brevi instructas.

1. S. ULMI (Fries l. c.) acervis parvis dispersis albo-roseis demùm effusis irre- gularibus, sporidiis compactis rectis hyalinis utrinque obtusis 4-5-septatis. — In foliis Ulmi campestris hypogena. — Moug. et Nestl. veg. exs. n. 893. Desmaz. crypt. exs. n. 229. Grev. cr. fl. t. 112. Stilbospora? Uredo DC. fl. fr. 5. p. 152; mem. mus. 3. t. 4. f. 9. — Initio epidermide tecta dura fragili ita secedente ut vestigium nullum remaneat.
2. S. OXYACANTHÆ (Kunze myc. heft. 2. p. 109.) acervis minutis sparsis, sporidiis albo-flavis longissimis curvatissimis 8-12-septatis. — In foliis Cratægi

886 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Oxyacanthæ. — Desmaz. crypt. exs. n. 230. — Maculæ in pagina oppositâ purpurascentes circulo albo cinctæ.

XXII. BULLARIA DC. fl. fr. 2. p. 226. Fries syst. orb. veg. 1. p. 195. — Uredinis sp. Pers. — Pucciniæ sp. Linck.

Sporidia oblonga didyma medio constricta pedicello destituta in acervulos coacervata. — Fungilli sub epidermide plantarum emortuarum nascentes demumque erumpentes. — Hoc genus cum Didymosporio conjungit cel. Ad. Brongniart.

1. B. UMBELLIFERARUM (DC. l. c.) acervis subrotundis oblongisque epidermide bullatâ semper tectis, sporidiis fuscis. — In caulis Umbelliferarum siccis. — Uredo bullata Pers. obs. myc. 1. t. 2. f. 5. Puccinia Bullaria Linck sp. pl. 6. 2. p. 78.

Subtrib. IV. AECIDINEÆ Fries l. c. p. 196.

Sporidia varia suprà ipsum parenchyma plantarum vivarum enata, per epidermidem erumpentia, stromate nullo.

XXIII. PHRAGMIDIUM Linck sp. pl. 6. 2. p. 84. Ad. Brongn. cl. champ. p. 3. Fries syst. orb. veg. 1. p. 196. — Aregma Fries obs. 1. p. 225. — Pucciniæ sp. auct.

Sporidia 3-∞-septata clausa cylindrica pedicellata. — Fungilli minutissimi acervatim crescentes et epidermidi innati (negante tamen cel. Fries qui illos ex epidermide erumpentes credit).

1. P. OSTRUM (Schmidt et Kunze exs. n. 120.) cespitulis nigris rufo-fuscisve, stipite albo filiformi æquato, sporidius obtusus. — In foliis Potentillarum variarum hypo-rariis epigenam. — Puccinia Potentillæ Pers. DC. fl. fr. 5. p. 54. Grev. crypt. fl. t. 57. P. Fragariastræ DC. fl. fr. 5. p. 55.

2. P. ULMI (Dub. mss.) cespitulis maculas punctiformes fusco-nigricantes simulantibus, stipite albo filiformi æquato, sporidius ovalibus obtusus. — In foliis Ulmi. — Puccinia Ulmi DC. fl. fr. 2. p. 219. Biv. sic. 3. t. 3. f. 4. — An sp. satis distincta?

3. P. INTERMEDUM (Linck l. c.) cespitulis nigris nigro-fuscisve hypophyllis, stipite albo filiformi æquato, sporidiis apiculatis. — In foliis Sangisorbæ, etc. — Pucc. Sanguisorbæ DC. fl. fr. 5. p. 54.

4. P. INCRASSATUM (Linck l. c.) cespitulis nigris hypophyllis, stipite albo filiformi basi incrassato, sporidiis apiculatis.

a. mucronatum (Linck) stipite sensim incrassato, sporidiis mucronato-acuminatis. — In foliis Rosarum freqnens. — Pucc. Rosæ Schum. DC. fl. fr. 2. p. 218. Grev. crypt. fl. t. 15. P. mucronata & Pers. syn. 230. Nees syst. t. 1. f. 11.

b. bulbosum (Linck) stipite subito incrassato, sporidiis brevissimè mucronulatis. — In foliis Ruborum. — P. Rubi Schum. DC. fl. fr. 2. p. 218. P. Rubi-Idæi DC. fl. fr. 5. p. 54.

XXIV. TRIPHAGMIUM Linck sp. pl. 6. 2. p. 84. Fries syst. orb. veg. 1. p. 366. — Pucciniæ sp. DC.

Sporidia subglobosa septo transversali et perpendiculari in locula-menta tria divisa pedicellata. — Fungilli minutissimi acervatim crescentes et ex epidermide plantarum vivarum erumpentes.

1. T. ULMARIA (Linck l. c.) maculis obliteratis, acervulis hypophyllis parvis fascis primò subrotundis epidermide tectis mox epidermide evanescente effusis, stipite albo filiformi brevi. — In foliis Spireæ Ulmariae. — Che-

vall. fl. par. t. 11. f. 8; C. Moug. et Nestl. vog. n. 891. Pacc. Ulmariae DC. fl. fr. 5. p. 56.

2. T. ISOPYRI (Moug. in Fries I. c.; vog. exs. n. 892.) maculis decolorantibus, acervulis hypo-rariis epiphyllis nigro-fuscis primò subrotundis epidermide tectis mox erumpentibus effusis epidermide albâ cinctis demum confluentibus, stipite albo brevi filiformi. — In foliis petiolisque Isopyri thalictroidis in Andegaviâ detexit cl. Guépin.

XXV. PUCCINIA Linck obs. 2. p. 29; sp. pl. 6. 2. p. 67. Ad. Brongn. cl. champ. p. 32. Pucciniae sp. Pers. DC.

Sporidia pedicellata oblonga uni-rariis 2-septata septis transversalibus. — Fungilli minutissimi nigro-fusci aut violacei acervatim crescentes per epidermidem vivam ruptam erumpentes. — Septum interdùm non solum in junioribus sed quoque in effuetis difficile dignoscitur.

* Stipite elongato.

1. P. LYCHNIDEARUM (Linck obs. 2. p. 29; sp. pl. 6. 2. p. 80.) maculis supra lutescentibus, acervulis rufo-fuscis hypophyllis caulinisve compactis orbiculatis solitariis aut concentrica dispositis rariis confluentibus, stipite rigido longo, sporidiis elongatis subcylindricis medio constrictis, articulis oblongis supremo apice subattenuato rariis obtuso. — In Lychnide dioicâ, Diantho carthusianorum, hortensi, Spergulâ arvensi, etc. — P. Dianthi DC. fl. fr. 2. p. 220. P. Lychnidis DC. fl. fr. 5. p. 57. P. Spergulæ DC. fl. fr. 2. p. 219 et 5. p. 55. P. crassa Linck obs. 2. p. 30. — Articulus tertius interdùm additur.
2. P. STELLARÆ (Dub. mss.) maculis supra obliteratis, acervulis fuscis hypophyllis caulinisve compactis ovatis ellipticis plus minus confertis rariis confluentibus, stipite albo filiformi longo, sporidiis ovato-globosis medio paulum constrictis, articulis rotundis supremo apice subattenuato. — In Stellariâ mediâ.
3. P. SAGINÆ (Schmidt et Kunze exs. n. 221.) maculis obliteratis, acervulis rufo-fuscis hypophyllis caulinisve compactis orbicularibus ellipticis sâpe confluentibus, stipitis albis longissimis, sporidiis medio constrictis, articulo inferiore pyriformi supremo minore truncato. — In Saginâ procumbente et apetalâ. — Cum priori conj. a cel. Linck.
4. P. CIRCEÆ (Pers. disp. t. 3. f. 4. syn. 228.) maculis obliteratis, cespitulis rufescens minutis semi-globosis in acervulos subrotundos hinc inde confluentes congestis hypophyllis, sâpè epidermide tectis, stipite longo, sporidiis utrinque acutis medio subconstrictis. — In foliis petiolis et caule Circeæ Lutetianæ et Alpinæ. — DC. fl. fr. 2. p. 220.
5. P. IBERIDIS (Dub. mss.) bifrons, cespitulis fuscis minutis convexis orbicularibus annulatim digestis confertis confluentibus in acervulos sparsos aggregatosque epidermide ruptâ demum obliterata cinctis, stipite filiformi elongato, sporidiis oblongo-ellipticis medio constrictis, articulo inferiore turbinato-globoso superiore obtuso. — Ad folia Iberidis sempervirentis in Pyrenæis (cl. Requier).
6. T. THLASPEOS (Dub. mss.) hypophylla, acervulis fusco-luteis convexis parvis orbicularibus confertis non confluentibus compactis, stipite albo filiformi elongato, sporidiis oblongo-ellipticis oblongis utrinque obtusis non constrictis. — Ad folia Thlaspeos montani circa Mimatem (cl. Prost). — Paginam totam occupat. Caules infesti steriles remanent.
7. P. CORRIGIOLÆ (Chevall. fl. par. 1. p. 420. t. 71. f. 7. k.) acervulis minutis sparsis rotundato-ovatis compactis denudatis fuscis hypophyllis caulinisque, stipite longiusculo, sporidiis elongatis angustis obtusis medio constrictis. — In Corrigiolâ littorali.
8. P. GLOBULARÆ (DC. fl. fr. 5. p. 55.) maculis nullis, acervulis rufis subrotundis semiglobosis compactis in circulum sâpè confluentibus epidermide la-

888 ACOTYL. SEU CELLULARES. PUCCINIA.

cerâ cinctis hypophyllis, stipite filiformi elongato, sporidiis griseo-fasciis oblongis utrinque attenuatis. — In Globulariâ vulgari. — Sporidia valde compacta minima interdùm biseptata.

9. P. BUXXI (DC. fl. fr. 5. p. 60.) maculis nullis, acervulis subrotundis convexis sparsis bifrontibus obscurè fuscis compactis epidermide ruptâ cinctis tectisve, stipite albo filiformi longo rigido, sporidiis obtusis articulo inferiore oblongo-turbinato superiore oblongo. — In Buxo semperfidente. — Sow. eng. fung. t. 439. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 676. Grev. crypt. fl. t. 17.
10. P. JASMINI (DC. fl. fr. 2. p. 219.) maculis suprà luteis, cespitulis rufo-fuscis minutis semi-globosis compactis epidermide sàpè cinctis in acervulos latos effusos paginam totam interdùm occupantibus confluentibus hypophyllis et interdùm caulinis, stipite albo filiformi longissimo rigidulo, sporidiis medio subconstrictis articulo inferiore turbinato superiore ovato-rotundo obtuso. — In Jasmino fruticante. — Interdùm articulus tertius additur.
11. P. SCORODONIÆ (Linck sp. pl. 6. 2. p. 72.) maculis obliteratis, cespitulis minutis in acervulos subrotundos magnos compactos convexos hypophyllos cinnamomeos confluentibus, stipite longo sporidiisque elongatis medio constrictis pellucidis, articulo inferiore turbinato-pyriformi, superiore obtuso ovato-elliptico. — In Teucro Scorodoniam, T. Chamædry Melittide melisophyllo et aliis Labiatis. — Uredo annularis Strauss.
12. P. CLINOPODII (DC. fl. fr. 5. p. 57.) maculis obliteratis, acervulis parvis subrotundis sparsis planiusculis fusco-nigris hypophyllis, stipite elongato flexuoso filiformi albo valde pellucido, sporidiis subglobosis opacis non constrictis punctato-tuberculosis. — In Clinopodium vulgari.
13. P. MENTHÆ (Pers. syn. 727.) maculis obliteratis, acervulis parvis subrotundis sparsis planiusculis fusco-nigricantibus hypophyllis, stipite elongato albo filiformi fragillimo valde pellucido, sporidiis subopacis lèvibus subglobosis obtusis medio non constrictis. — In Menthâ aquatica, M. sylvestri, etc. DC. fl. fr. 2. p. 222.
14. P. STACHYDIS (Linck sp. pl. 6. 2. p. 73.) caulina epi- et rariùs hypophylla, acervulis fusco-nigris magnitudine variis rotundatis oblongis seu sinuatis confertis et interdùm confluentibus convexis, epidermide bullatâ demum rumpente persistente, stipitibus inæqualibus mox brevibus mox sporidium æquantiibus, sporidiis ovatis ovato-oblongisque non constrictis. — In variis Gentianis. — Uredo Gentianæ DC. fl. fr. 5. p. 64.
15. P. ARTEMISIARUM (Schmidt et Kunze exs. n. 93.) maculis nullis, acervulis orbiculatis sparsis fusco-nigris hypo-rariùs epiphyllis epidermide ruptâ cinctis planiusculis, stipite albo longo filiformi, sporidiis ovato-oblongis obtusis non constrictis. — In Artemisiâ Absinthio et paniculatâ, Chrysanthemo cymboso propè Mimatem (cl. Prost). — P. Absinthii DC. fl. fr. 5. p. 56. P. discoidearum Linck sp. pro parte.
16. P. TANACETI (DC. fl. fr. 2. p. 222.) maculis nullis, acervulis fusco-nigris orbiculatis seu irregularibus sparsis bifrontibus epidermide ruptâ cinctis, stipite albo filiformi elongato, sporidiis obtusis teretibus medio subconstrictis. — In Tanaceto vulgari et Balsamitâ. — Uredo Tanaci et Balsamitæ Strass. P. discoidearum Linck pro parte.
17. P. ASTERIS (Dub. mss.) maculis suprà lutescentibus, acervulis magnis fuscis orbicularibus elongatisque convexis compactis pulvinatisque sparsis hypophyllis epidermide ruptâ cinetis, stipite albo filiformi sporidium elongato-ellipticum medio constrictum subæquante, articulo inferiori elongato-turbinato, superiori obtuso elliptico aut ovato-globoso. — Ad Asterem Salignum in agro Lezurenzi detexit cel. Prost.
18. P. STELLATARUM (Dub. mss.) maculis nullis, acervulis minutis fuscis orbicularibus ellipticisve convexis compactis sparsis epidermide bullatâ teotis demum

ruptâ cinctis, stipite albo sporidiis teretibus elongatis medio constrictis subminore, articulo inferiore elongato-turbanato, superiore oblongo ovatoe obtuso. — In caule foliis bracteisque Galiorum variorum, Crucianellæ angustifoliae (cl. Prost).

19. P. GLECHOMÆ (DC. fl. fr. 5. p. 56.) maculis fuscescentibus, acervulis rufis subrotundis sparsis convexis hypophyllis, stipite albo filiformi, sporidiis obtusis ovato-oblongis non constrictis. — In Glechomâ hederacea. — P. verrucosa Linck obs. 2. p. 27. Dicæoma verrucosum Nees fung. t. 1. f. 12.
20. P. AVICULARIÆ (Pers. syn. 227.) maculis nullis, acervulis fuscis caulinis oblongis hypophyllis subrotundis convexis epidermide ruptâ primâ cinctis, stipite filiformi longissimo incurvo, sporidiis ovoides obtusis vix constrictis. — In Polygono aviculari. — DC. fl. fr. 2. p. 221. P. vaginalium Linck sp. pl. 6, 2. p. 69.
21. P. THESII (Chaillet in herb. DC.) caulina bifronsque, acervulis fusco-nigricantibus parvis orbicularibus ovatisve convexis sparsis aggregatisque epidermide ruptâ cinctis, stipite albo elongato, sporidiis ovatis obtusis non aut vix constrictis. — In Thesio linophyllo Jurassi (cl. Chaillet).
22. P. GRAMINIS (Pers. syn. 228.) maculis pallidis diffusis, acervulis e luteo-fuscis demum nigris linearibus confluentibus convexis bifrontibus caulinisque epidermide cinctis, stipite albo filiformi brevinsculo, sporidiis elongato-clavatis subcylindricisve obtusis non constrictis. — In variis Graminibus. — DC. fl. fr. 2. p. 223, et 5. p. 59. var. α . Desmaz. crypt. exs. n. 130.
23. P. ARUNDINACEA (Hedw. fil. fung. ined. t. 7. in DC. fl. fr. 1. c.) maculis pallidis diffusis oblitteratis, acervulis nigris elongato-linearibus sparsis convexis bifrontibus caulinisque epidermide cinctis, stipite albo filiformi longissimo, sporidiis elongato-oblongis sublinearibus oblongisve obtusis medio constrictis. — In Arundine Phragmite, Calamagrostidibus, etc. — Desmaz. crypt. exs. n. 131. P. Graminis & DC. 1. c.
24. P. CARICIS (DC. fl. fr. 5. p. 60.) maculis pallidis, acervulis nigris epiphyllis ovatis seriatis confertis epidermide marginatis, stipite albo filiformi elongato, sporidiis elongato-clavatis subcylindricis medio constrictis, articulo superiore obtuso majore. — In Caricibus variis. — P. Striola Linck sp. pl. 6. 2. p. 67. pro parte.
25. P. ASPARAGI (DC. fl. fr. 2. p. 595.) maculis nullis, acervulis rufo-fuscis caulinis rariis epiphyllis sparsis confertisque ovato-oblongis pulvinatis epidermide longitudinaliter ruptâ cinctis, stipite albo filiformi longo, sporidiis oblongis obtusis medio constrictis. — In Asparago officinali.
26. P. VERONICARUM (DC. fl. fr. 2. p. 594.) maculis fuscis lutescentibusve, acervulis fuscis hypophyllis orbicularibus plerisque parvis aggregatis sèpè orbiculatim digestis et demum confluentibus, stipitibus inæqualibus illis longiusculis illis brevibus, sporidiis elongatis medio constrictis, articulis ovatis ellipticis superiori obtuso aut ad apicem subattenuato. — In Veronica Ponæ, urticifoliâ, Chamædry, etc. — Linck sp. 6. 2. p. 71.
27. P. POLYGONI-CONVOLVULI (Hedw. fil. ined. in DC. fl. fr. 5. p. 61.) maculis oblitteratis, acervulis fuscis demum nigris hypophyllis orbicularibus caulinis elongatis confertis non confluentibus epidermide ruptâ cinctis, stipite albo sporidium clavatum non constrictum æquante, articulo inferiore turbinato superiore globoso obtuso. — In Polygono Convolvulo. — P. Polygonorum Linck sp. 6. 2. p. 69. pro parte.
- ** Stipite abbreviato.
28. P. POLYGONORUM (Linck sp. pl. 6. 2. p. 69. excl. P. Pol. conv.) maculis flavescensibus, acervulis minutis rufo-fuscis hypophyllis orbiculatis planiusculis confertis hinc indè confluentibus epidermide ruptâ cinctis, stipite brevissimo, sporidiis ovatis utrinque obtusis non constrictis. — In Polygono amphibio, Bistorta, etc. — P. Polygoni amphibii Pers. DC. fl. fr. 2. p. 223. P. Bistortæ DC. fl. fr. 5. p. 61.

890 ACOTYL. SEU CELLULARES. Puccinia.

29. *P. VERATRI* (Dub. mss.) maculis supra fusciscentibus, acervulis fusco-brunneis minutis suborbicularibus planiusculis sparsis hinc indè aggregatis epidermide ruptâ cinctis, stipite brevi, sporidiis ovato-oblongis valde constrictis articulo utroque globoso obtuso. — *Ad Veratrum album*. — *Uredo Veratri* DC. herb.
30. *P. COMPOSITARUM* (Schlecht. ber. 2. p. 133.) maculis obliteratis albisve, acervulis subrotundis parvis caulinis confluentibus elongato-linearibus epidermide ruptâ cinctis subconvexis plerumque hypophyllis, stipite brevissimo, sporidiis ovato-ellipticis utrinque obtusis medio subconstrictis. — In foliis rariis caule petiolisque variarum Compositarum. — Linck sp. 6. 2. p. 73. *P. Calcitrapæ* DC. fl. fr. 2. p. 221. *P. Centaureæ* DC. fl. fr. 5. p. 59. *P. Podospermi* DC. fl. fr. 2. p. 595. *P. Echinopis* DC. fl. fr. 5. p. 57. *Uredo Arnicæ* DC. fl. fr. 5. p. 65. *U. Cyani* DC. l. e. p. 74.
31. *P. ERYNGII* (DC. fl. fr. 5. p. 58.) maculis obliteratis, acervulis nigris bifrontibus crassis irregularibus epidermide ballata primò tectis demùm ruptâ cinctis, stipite brevissimo, sporidiis oblongis obtusis non constrictis. — In *Eryngio campestri*. — Folia superiora sèpè obtegit interstitia nervorum impressa repleta.
32. *P. UMBELLIFERARUM* (DC. fl. fr. 5. p. 58.) maculis latescentibus obliteratisve, acervulis parvis fusco-nigris rufo-fuscisve subrotundis hinc indè confluentibus planiusculis epidermide bullata tectis demùm ruptâ cinctis hypophyllis, sporidiis ovatis ovato-globosisve utrinque obtusis non constrictis. — In foliis rariis caule variarum Umbelliferarum. — *P. Ægopodii* et *P. Pimpinellæ* Strauss wett. ann. 2. p. 101 et 102. *P. Æthusæ* Linck sp. 6. 2. p. 77. *P. Heraclæi* Grev. crypt. fl. t. 42. *Uredo Athamanthæ* DC. fl. fr. 2. p. 228.
33. *P. UMBILICI* (Guépin in litt.) maculis obliteratis, cespitulis rotundis convexis compactis epidermide primò tectis in maculas rotundas confertis demùm in acervulos orbiculares maximos bifrontes fuscos confluentibus, stipite brevissimo, sporidiis subglobosis aut subdepressis non constrictis. — In foliis Umbilici pendulini propè Angers detexit cl. Guépin, propè Vire cl. Lenormand.
34. *P. GALII-CRUCIATÆ* (Dub. mss.) maculis obliteratis, acervulis nigris parvis rotundis convexis sparsis confertisque, epidermide evanescente, stipite brevi, sporidiis clavatis medio subconstrictis, articulo inferiore turbinato superiore globoso obtuso plerumque latiore. — In paginâ inferiore foliorum Galii-Cruciatæ propè Beauvais (cl. Graves). — *P. Valantiæ* Pers. syn. 107. Linck sp. *P. punctata* Linck obs. 2. p. 30.
35. *P. PRUNI* (DC. fl. fr. 2. p. 222.) maculis obliteratis, acervulis subrotundis dilutè fuscis planis sparsis confertisque et demùm confluentibus hypophyllis, stipite brevissimo, sporidiis ovato-cylindricis obtusis medio constrictis. — In *Pruno spinosâ* et *domesticâ*. — *P. Pruni spinosæ* Pers. syn. 226. — Acervuli paginæ magnam partem totamque demùm occupant, epidermidi nudæ ut videtur inspersi.
36. *P. RIBIS* (DC. fl. fr. 2. p. 221.) maculis lutescentibus, acervulis fuscis epiphyllis orbicularibus planiusculis sparsis aut circinnatim congestis et demùm confluentibus epidermide ruptâ plerumque cinctis, stipite brevissimo, sporidiis ovato-cylindricis obtusis non constrictis. — In *Ribe rubro* et *petræo*.
37. *P. ASARI* (Kunze et Schmidt myc. heft. 1. p. 70. exs. n. 148.) bifrons, cespitulis fuscis parvis orbicularibus in acervulos globosos elevatos orbiculares sparsos orbiculatim et subcircinnatim confertis confluentibusve, epidermide bullata serò rampente, sporidiis dilutè fuscis pellucidis oblongo-ovoideis subovoideisve non constrictis difformibus interdum subapiculatis brevissimè pedicellatis. — In *Asaro Europæo Jurassi* (cl. Chaillet).
38. *P. ADOXÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 220.) maculis nullis, acervulis rufo-fuscis caulinis et hypo-rariis epiphyllis orbicularibus sparsis confertis confluentibusque epidermide ruptâ cinctis, stipite brevissimo, sporidiis obtusis subconstrictis. — In *Adoxâ moschatellinâ*. — *P. Saxifragarum* Linck sp. 6. 2. p. 81. pro parte.

39. P. SAXIFRAGARUM (Schlecht. ber. 2. p. 134.) bifrons, maculis lutescentibus, acervulis dilutè rufis orbicularibus oblongisve convexis sparsis hinc indè confertis epidermide bullatâ serò rumpente tectis, stipite brevi, sporidiis medio constrictis dissimilibus, articulo inferiore turbinato-globoso, superiore ovato-oblongo aut mitræformi lato aut angusto. — In Saxifragâ granulatâ cum Uredine Saxifragarum mixtam reperiit cl. Prost.
40. P. CALTHÆ (Linck sp. pl. 6. 2. p. 79.) hypo- et rariùs epiphylla, maculis suprà fuscescentibus, acervulis fusco-nigricantibus subrotundis convexiusculis sparsis aut circinnatim digestis epidermide ruptâ cinctis, stipite brevi, sporidiis grossis subopacis ovato-oblongis utrinque obtusis vix constrictis. — In Calthâ palustri cum Uredine Calthæ mixtam reperiit cl. Requien.
41. P. ANEMONÆ (Pers. obs. 2. t. 6. f. 5.) maculis oblitteratis, acervulis subrotundis convexis fascis hypo- et epiphyllis confertis epidermide ruptâ cinctis, stipite brevissimo, sporidiis oblongis utrinque obtusis medio constrictis. — In variis Anemones speciebus. — DC. fl. fr. 2. p. 222. Uredo quincunx Strauss. Æcidium fuscum Sow. fung. t. 43. — Paginam inferiorem foliorum plane obtegens acervulis sèpè in series digestis sèpè sparsis hinc indè aggregatis confluentibns.
42. P. THALICTRI (Chevall. fl. par. 1. p. 417.) maculis lutescentibus, acervulis convexis fascis hypophyllis subrotundis confertis et sèpè confluentibus irregularibus, stipite brevissimo et subnullo, sporidiis oblongis obtusis punctato-tuberculosis medio constrictis, articulis globosis. — In Thalictrœ pubescente propè Mimatem (cl. Prost.), T. flavo, propè Parisios ex Chevall.
43. P. ASPHODELI (Dub. mss.) bifrons, maculis circà violaceo-fuscis, acervulis prominulis rufo-fuscis orbicularibus ovatisve sparsis solitariis aut hinc indè aggregatis epidermide ruptâ cinctis, stipite brevissimo aut nullo, sporidiis grossis ovato-sphæricis ovatisve obtusis tenuissimè punctulatis medio vix constrictis. — In Asphodelo ramoso. — Uredo Asphodeli DC. fl. fr. 5. p. 70. — Acervuli post sporidiornum lapsum concavi.
44. P. PROSTII (Moug. in litt.) maculis nullis, acervulis oblongis subconvexis fascis bifrontibus sparsis confertisque epidermide tectis demùm rimose ruptâ subobtectis, stipite minimo vel nullo, sporidiis fascis opacis aculeato-tuberculosis oblongis medio constrictis, articulis globosis. — In foliis Tulipæ Celsianæ circà Mimatem observavit cel. Prost.
45. P. LILIACEARUM (Dub. mss.) maculis lutescentibus, acervulis orbicularibus convexis fascis bifrontibus confertis epidermide rimose ruptâ subobtectis, stipite minimo, sporidiis dilutè fascis pellucidis ovato-oblongis non constrictis utrinque obtusis aut subretusis. — In folio Liliaceæ cujusdam reperiit D. Monnier, Ornithogali umbellati cl. Prost. — Interdùm sporidia sine septo reperiuntur.
46. P. EPILOBII (DC. fl. fr. 5. p. 61.) maculis pallidis, acervulis cinnamomeis hypophyllis prominulis orbiculatim confertis, epidermide oblitterata, stipite brevissimo, sporidiis oblongis obtusis medio constrictis, articulis globoso-depressis. — In Epilobio origanifolio in Pyrenæis detexit cel. DC., in E. palustri circà Vire cl. Lenormand.
47. P. VIOLEÆ (DC. fl. fr. 5. p. 62.) maculis lutescentibus, acervulis fascis sparsis confertis parvis orbicularibus epidermide bullatâ tectis demùm ruptâ cinctis plerumque hypophyllis, stipite brevissimo, sporidiis ovoideis. — In variis Violæ speciebus.
48. P. PRIMULÆ (Dub. mss.) hypophylla, maculis flavescentibus, acervulis rufo-fuscis minutis annulatim seu circinnatim confertis orbicularibus ovatisve convexis, epidermide bullatâ serò vix rumpente, stipite brevissimo, sporidiis minutissimis ovoideis non constrictis. — In Primula grandiflora. — Uredo Primulæ DC. fl. fr. 5. p. 68. Cæoma Primularum Linck.
49. P. BETONICÆ (DC. fl. fr. 5. p. 57.) maculis oblitteratis, acervulis parvis subrotundis aggregatis rufescentibus convexis hypo- et rariùs epiphyllis, epider-

892 ACOTYL. SEU CELLULARES.

mide annulari post sporidiorum lapsnum in cupulae formam regulariter rupta, stipite brevissimo, sporidiis ovatis obtusis non constrictis. — In Betonicâ officinali. — Linck sp. 6. 2. p. 72. Dicæoma Betonicæ Nees fung. t. 1. f. 11.

50. P. SCRIPPI (DC. fl. fr. 2. p. 223.) maculis pallidis, acervulis nigrescentibus caulinis compactis subrotundis epidermide elevata et rimatim rupta subocultis, stipite brevi, sporidiis elongato-clavatis, loculo superiore majori globoso. — In culmis subemortuis Scirpi lacustris aliorumque. — Linck sp. 6. 2. p. 68.

XXVI. UREDO Pers. syn. 214. DC. fl. fr. 2. p. 227. Ad. Brong. cl. champ. p. 31.
— Cæomatis sp. Linck.

Sporidia unilocularia non septata libera minutissima, rariùs pedicellata, in acervulos congesta, epidermide primò obiecta et demùm illâ irreguliter rupta in pseudoperidium non extensâ subnuda. — Fungilli in plantis vivis parasitici.

* *Sporidiis albis.*

1. U. CANDIDA (Pers. syn. 223.) maculis pallidis obliteratisve, acervulis subrotundis ovalibusque sparsis confluentibusque epidermide bullatâ rariùs rumpente tectis, sporidiis copiosissimis globosis albis. — In foliis petiolis caulinis fractibusque variarum plantarum v. g. Cruciferarum, Cichoracearum, Cynarocephalorum, Umbelliferarum, etc. — DC. fl. fr. 5. p. 86. Grev. crypt. fl. t. 251. U. Cruciferarum DC. fl. fr. 2. p. 596. U. Tragopogi et inaperta DC. fl. fr. 2. p. 237. U. Thlaspi Sow. fung. t. 340. Cæoma candidam Nees syst. t. 1. f. 8.
2. U. PORTULACÆ (DC. fl. fr. 5. p. 86.) acervulis subrotundis confluentibus epiphyllis epidermide bullatâ demùm rumpente tectis, sporidiis albis copiosis. — In Portulacâ oleracea sylvestri et cultâ. — Desmaz. crypt. exs. n. 277. — An ut suspicatur cel. Candollius prioris var.?

* * *Sporidiis flavis omnibus conformibus.*

3. U. ORCHIDIS (Mart. mosq. p. 229.) maculis rubescensibus, acervulis subrotundis elongatisque compressis planis confluentibus epidermide bullatâ demum rumpente tectis, sporidiis subglobosis aureis. — In utrâque paginâ foliorum Orchidis maculatæ propè Mimatem (cl. Prost). — U. confluens y Orchidis Alb. et Schw. Cæoma Orchidum Linck.
4. U. ALLIORUM (DC. fl. fr. 5. p. 82.) maculis obliteratis, acervulis linearibus oblongis ovalibusque convexis flavescentibus pallidisve bifrontibus caulinisve epidermide longitudinaliter rumpente primò tectis dein cinctis, sporidiis ovoideis subglobosis flavis albidisve. — In variis Allii speciebus. — Cæoma Alliorum Linck.
5. U. PROSTII (Dub. mss.) hypo-rariùs epiphylla, maculis circâ aurantiaco-lutescentibus, acervulis orbicularibus ovato-oblongisque epidermide bullatâ aurantiacâ luteâ centro rumpente persistente tectis, in annulos aut tuberculos orbicularis sparsos aggregatosve confluentibus, sporidiis pallidè luteis sessilibus globosis oblongis pyriformibusque. — In Asphodelo ramoso circâ Mimatem (cl. Prost). — Species epidermidis sporidia tegentis colore et crassitie valde distincta.
6. U. EMPETRI (Pers. in Mong. et Nestl. vog. n. 391.) hypophylla, acervulis magnis sparsis ovalibus epidermide ruptâ et elevata cinctis, sporidiis ovoideis flavis. — Ad Empetrum nigrum in Vogenesis (cl. Moug. et Nestl.). — DC. fl. fr. 5. p. 87.
7. U. PYROLÆ (Strauss. wett. ann. 2. p. 97.) hypophylla, maculis supra fusco-lutescentibus, acervulis pallidè luteis sparsis minutis orbicularibus prominentibus convexis, epidermide lacerâ demùm obliterata, sporidiis ovoideis sessilibus demùm effusis. — Ad Pyrolam secundam. — Ecidium? Pyrolæ DC. fl. fr. 5. p. 99. Cæoma Pyrolæ Linck.

8. U. RHODODENDRI (DC. fl. fr. 5. p. 86.) maculis suprà fuscis, acervulis minimis planis subcarnosis subconfertis subrotundis hypophyllis et epicarpis, epidermide rumpente, sporidiis subglobosis effusis flavis. — Ad Rhododendron ferrugineum in Alpibus. — Acervi initio latentes sub squamulis, dein elevati squamulis cincti.
9. U. SOLDANELLEÆ (DC. fl. fr. 5. p. 85.) hypophylla, acervulis numerosis subrotundis distinctis approximatis pallidè flavis, epidermide poro regulari centrali demùm dehiscente, sporidiis globosis minutis pallidè flavis. — In Alpibus.
10. U. LINEARIS (Pers. syn. 216 a.) maculis flavo-fuscis, acervulis ellipticis demùm elongatis linearibus pallidè luteis sæpius hypophyllis, epidermide longitudinaliter disrumpente, sporidiis oblongis flavis. — In foliis et vaginis Graminum præsentim Cerealium. — DC. fl. fr. 2. p. 233 excl. syn. Sow. 5. p. 84. Desmaz. cr. exs. n. 126. — Acervuli sequuntur nervos foliorum.
11. U. POLYPODII (DC. fl. fr. 5. p. 81.) bifrons, acervulis pallidè luteis minutis orbicularibus ovatisve sparsis aggregatisque convexis, epidermide diù clausâ demùm longitudinaliter disrumpente, sporidiis pellucidis ovatis ovato-elongatis subpyriformibusque. — In Aspidiis et Polypodiis variis. — U. linearis Polypodii Pers. Cæoma Filicum Linck. — Acervuli sporidiis elapsis concavi.
12. U. OVATA (Strauss. in wett. ann. 2. p. 92. t. 11. f. 6. var. a.) hypophylla, maculis pallidis demùm fuscescentibus, cespitulis parvis orbicularibus convexis primò aurantiacis demùm fuscescentibus sparsis aut in acervulos suborbicularis aggregatis demùm confluentibus epidermide ruptâ cinctis, sporidiis ovato-globosis conglutinatis aurantiacis demùm fuscis. — In Populo Tremulâ. — Grev. fl. edin. p. 442 excl. var. β. Cæoma allochroum Linck sp. pl. 6. a. p. 36.
13. U. QUERCUS (Brondeau in litt.) hypophylla, cespitulis luteis dein aurantiacis minutis ovatis orbicularibusque prominulis sparsis solitariis aut in acervulos parvos agglomeratis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis pellucidis non cohærentibus. — In foliis Quercum circâ Aginum (cl. Brond.). — Cespituli post sporidiorum lapsum concavi.
14. U. SENECIONIS (DC. fl. fr. 2. p. 231.) hypophylla, maculis obliteratis, acervulis sparsis confertisque demùm confluentibus subrotundis ovalibusque croceo-aureis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis. — In Senecione vulgari, sylvatico et viscoso. — Cæoma Senecionis Schlecht. Linck.
15. U. TUSSILAGINIS (Pers. syn. 218.) hypophylla, maculis subpallidis, acervulis minutis subrotundis sparsis plerumque in circulum aggregatis interdùm confluentibus aurantiaco-flavis demùm obliteratis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subovatis primò cohærentibus. — In Tussilagine Farfarâ. — DC. fl. fr. 2. p. 231. — An ut volunt cl. Schlechtendal et Linck cum sequenti conjungenda?
16. U. SONCHI (Pers. syn. 217.) hypophylla, maculis suprà flavo-fuscis, acervulis flavo-fulvis planis orbiculatis irregularibusve sparsis interdùm confluentibus epidermide cinctis demùm obliteratis, sporidiis subglobosis fulvis. — In Soncho oleraceo, arvensi et palustri. — DC. fl. fr. 5. p. 86. U. Rubigo β DC. fl. fr. 2. p. 234.
17. U. PETASITIS (DC. fl. fr. 2. p. 236.) hypophylla, acervulis flavo-aurantiacis minutis depressis sparsis subaggregatisve interdùm confluentibus epidermide prominulâ granulosâ nequaquam ruptâ cinctis, sporidiis ovatis. — In Tussilagine Petasite. — Frequenter totam occupat paginam.
18. U. ERIGERONIS (Requier in herb. DC.) hypo- et rariis epiphylla, acervulis luteis minutis suborbicularibus subdepressis sparsis demùm obliteratis, epidermide primò bullatâ demùm rumpente, sporidiis ovoideis sessilibus. — In Erigerone viscoso circâ Avenionein (cl. Req.).
19. U. ROSÆ (Pers. syn. 215.) hypophylla, maculis suprà flavis, cespitulis subrotundis minutis pallidè flavis distinctis epidermide cinctis in acervulos

894 ACOTYL. seu CELLULARES. URBO.

parvos subrotundos irregularesve congestis, sporidiis subglobosis aurantiacis. — In Rosæ centifolia, aliisque. — DC. fl. fr. 2. p. 232. excl. var. *A.* Cæoma Rosæ Linck sp. pl. 6. 2. p. 30 excl. var. *B.*

20. U. PINGUIS (DC. fl. fr. 2. p. 235.) petiolina nervalis epicarpicave, acervulis latè effusis crassis convexis miniatò-aurantiacis ruptâ epidermide cinctis, sporidiis copiosis subovatis subglobosisque. — In Spiræa Ulmaria, Rosæ Austriacæ et Alpinæ. — U. Rosæ DC. fl. fr. 2. p. 232. U. effusa Strauss. Grev. crypt. fl. t. 19. U. Spireæ Sow. fung. t. 398. f. 7. Cæoma pingue et C. Rosæ Linck l. c. U. miniata & Pers. syn. 216?

21. U. RUBORUM (DC. fl. fr. 2. p. 234 et 596.) hypo- et rariùs epiphylla, maculis supra fuscis, acervulis aurantio-flavis orbiculatis aut oblongis aggregatis, sporidiis subglobosis aurantiacis. — In foliis Rubi fruticosi, cæsii, Idæi, etc. — Desmaz. cr. exs. n. 225. U. Rubifruticosi Pers. Æcidium Rubi Sow. fung. t. 398.

22. U. POTENTILLARUM (DC. fl. fr. 5. p. 81.) hypophylla et petiolina, maculis fuscis obliteratisve, acervulis flavo-aurantiacis subrotundis ovalibusque bullatis aggregatis sæpè confluentibus, sporidiis subglobosis subcohærentibus subaurantiacis. — In Potentillæ, Alchemillæ et variis Rosaceis herbaceis. — U. Potentillæ DC. fl. fr. 2. p. 232. U. Alchemillæ Pers. syn. 215. Cæoma Potentillarum Linck sp. pl. 6. 2. p. 31 excl. 2 ult. syn. — Paginam totam interdùm obtegens.

23. U. SAXIFRAGARUM (DC. fl. fr. 5. p. 87.) hypophylla, maculis pallidis, acervulis pallidè flavo-fulvis paucis subrotundis ovalibusque subelevatis sparsis aggregatisque, epidermide ruptâ persistente, sporidiis subglobosis flavis. — In variis Saxifragis. — Cæoma Saxifragarum Linck. — Acervuli emissis sporidiis concavi.

24. U. VINCETOXICI (DC. fl. fr. 5. p. 85.) hypophylla, acervulis pallidè flavis sparsis minimis convexis poro centrali dehiscentibus, sporidiis subsphæricis. — In Cynancho Vincetoxicico.

25. U. PUSTULATA (Pers. syn. 219.) hypo-rariùs epiphylla, maculis flavescentibus flavo-fuscisve, acervulis subrotundis minutis pallidè flavis convexis sparsis aut confertis confluentibusque, epidermide clausâ rariùs rompente, sporidiis subovoideis globosisque flavescentibus. — In variis plantis e Caryophyllacearum, Onagrarum Vacciniorumve familiâ. — DC. fl. fr. 5. p. 85.

a. *Epilobiorum* (Pers.) maculis flavescentibus, acervulis minoribus subrotundis sæpè regulariter positis et confluentibus. — In variis Epilobiis. — Cæoma Onagrarium Linck sp. pl. 6. 2. p. 29.

b. *Caryophyllacearum*, maculis flavescentibus, acervulis subglobosis plerumque distinctis. — In Cerastiis Stellariisque. — U. pustulata Cerastii Pers. DC. Cæoma Caryophyllacearum Linck l. c. p. 26.

γ. *Vacciniorum* (DC.) maculis flavo-fuscis, acervulis subrotundis plerumque distinctis. — In variis Vacciniis. — Cæoma Vacciniorum Linck l. c. p. 15.

26. U. PUNCTATA (DC. fl. fr. 2. p. 235.) hypophylla maculis flavescentibus, acervulis rotundis minaptis convexis sparsis circinnatimque confluentibus clausis flavidis demùm nigro-punctatis, sporidiis cohærentibus subglobosis. — In variis Euphorbiæ speciebus. — Cæoma punctosum Linck. — Species singularis Sphaeræ faciem demùm induens; puncta oriuntur convessa dein in acervum planiusculum expanduntur, tandem superficies tuberculosa et nigra evadit.

27. U. CAMPANULÆ (Pers. syn. 217.) hypophylla caulinave, maculis supra pallescentibus, acervulis irregularibus sparsis subconvexis interdùm confluentibus tremelloideis croceis flavis demùm pallidis epidermide tandem rompente cinctis, sporidiis subglobosis cohærentibus flavis tandem pallidis. — In variis Campanulæ speciebus. — DC. fl. fr. 5. p. 87. Desmaz. crypt. exs. n. 224.

28. U. HYPERICORUM (DC. fl. fr. 5. p. 81.) hypophylla, maculis supra croceo-flavis, acervulis aurantiacis sparsis aut aggregatis distinctis rarissimè confluentibus orbiculatis, epidermide primum bullatâ seriùs ruptâ, sporidiis subglobosis cohærentibus aurantiacis. — In Androsæmo, Hypericis variis. — U. Androsæmi DC. enc. bot. 8. p. 230.
29. U. SYMPHYTI (DC. fl. fr. 5. p. 87.) hypophylla, maculis supra nullis aut fuscis, acervulis subrotundis minutis numerosissimis confertis sæpè confluentibus flavo-rubiginosis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis globosis flavis. — In Symphyto officinali. — Acervuli plerumque totum discum obtengunt.
30. U. RHINANTHACEARUM (DC. rapp. 1. p. 10; fl. fr. 5. p. 80.) hypo-rariūs epiphylla, maculis nullis subferrugineisve, acervulis flavo-croceis subrotundis irregularibusve confertis confluentibusque planis, epidermide seriùs ruptâ persistente, sporidiis subglobosis compactis areis. — In Euphrasiâ, Melampyro, Rhinanthon, etc. — Desmaz. crypt. exs. p. 223. U. Euphrasiæ Schum. U. Melampyri Rebent. Cæoma Rhinanthacearum Linck. — Acervuli sporidiis dilapsis concavi.
31. U. CONFLUENS (DC. fl. fr. 2. p. 233.) hypophylla caulinave, maculis supra pallidè luteis, cespitulis minutis aurantiacis epidermide ruptâ cinctis in foliis subrotundis et in acervulos orbicularis circinnatim digestis, in caulibus et petiolis elongatis et in acervulos elongatos effusos dispositis plerumque confluentibus, sporidiis globosis luteis. — In Mercuriali perenni. — U. confluens Mercurialis DC. fl. fr. 5. p. 86. Cæoma Mercurialis Linck sp. pl. 6. 2. p. 35. — Sporidia non cohærentia.

*** *Sporidiis flavis dissimilibus.*

32. U. GYROSA (Rebent. neom. p. 355. t. 3. f. 13. a. b.) epiphylla, maculis ob-literatis, acervulis minutis flavis distantibus in annulum parvum confluentibus centro depresso, epidermide rumpente, sporidiis aliis subglobosis flavis aliis pyriformibus decoloribus. — In foliis Rubi Idæi. — U. Rubi Idæi Pers. syn. 218. DC. fl. fr. 2. p. 236.
33. U. PULSATILLÆ (Stend. nom. bot. 2. p. 433?) hypophylla, maculis nullis, acervulis pallidè flavis dein intensioribus minutis sparsis tremellosis orbicularibus ovatisve convexis epidermide bullatâ indehiscente tectis, sporidiis sessilibus plerumque opacis aliis subglobosis ovoideisve aliis elongatis utrinque obtusis. — In Anemone Pulsatilla circâ Mimatem (cl. Prost). — U. tremellosa Pulsatillæ Strauss. ann. wett. 2. p. 89.
34. U. LONGICAPSULA (DC. fl. fr. 2. p. 233; 5. p. 85.) hypophylla, maculis luteis, acervulis flavis subrotundis parvis hinc indè confluentibus, epidermide tandem poro rumpente, sporidiis aurantiacis aliis subglobosis pedicellatis, aliis oblongis cylindricis utrinque obtusis. — In Populo nigrâ, Betulâ albâ et pubescente. — U. populina Pers. syn. 219. U. cylindrica Strauss. Cæoma cylindricum Linck. Lycoperdon populinum Jacq. coll. 5. t. 9. f. 23. — Acervi parvi initio rariores demùm inferiore foliorum paginam subobtegentes; sporidia cylindrica interdum curva apparent.
- B. Betulina* (DC.) acervulis subhemisphæricis minutissimis, epidermide rariūs dehiscente, sporidiis ovoideis cylindricis subclavatisve, pedicellatis rarioribus. — In foliis Betulæ.
35. U. ACIDIORIDES (DC. fl. fr. 2. p. 236.) bifrons, maculis luteis, acervulis pallidè aurantiacis subrotundis oblongisve sparsis ant confertis numerosissimis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis aliis clavatis obtusis aliis subglobosis. — In foliis Populi albæ. — U. Acherois Spreng. Cæoma ægirinum Schlecht. Linck. — Acervuli elevati medio depresso; sporidia dein pallescentia.
36. U. MIXTA (Steud. nom. bot. 2. p. 432.) maculis supra lutescentibus, acervulis subrotundis confluentibus effusis luteis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis aliis subrotundis breviter pedicellatis aliis oblongo-ovoideis utrinque obtusis. — In paginâ inferiore rariūs superiore foliorum, in petiolis, ramis

junioribus capsulisque variarum Salicis specierum. — *Cæoma mixtam* Linck
obs. 2. p. 528; sp. pl. 6. 2. p. 40. excl. syn. Cand.

37. *U. VITELLINÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 231.) plerumque hypophylla, maculis supra
lutescentibus, acervulis solitariis sparsive luteis epidermide ruptâ cinctis,
sporidiis aliis globosis subglobosisque, aliis multò rarioribus globoso-pyri-
formibus pedicellatis. — In foliis Salicis albæ fragilis aliarumque. — *U. Salicis*
£ DC. fl. fr. 5. p. 79. *Cæoma Saliceti* Schlecht. Linck.

38. *U. SALICIS* (DC. fl. fr. 2. p. 231.) maculis supra flavis, acervulis subrotundis
parvis sparsis flavis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis aliis elongato-pyrifor-
mibus subpedicellatis aliis rarioribus globosis longè pedicellatis. — In pa-
ginâ foliorum inferiore, in petiolis capsulisque Salicis triandræ, viminalis, etc.
— *U. epitea* Kunze? *Cæoma epiteum* Schlecht? Linck?

39. *U. CAPREARUM* (DC. syn. gall. p. 48; fl. fr. 5. p. 80.) hypophylla, maculis
supra flavis, acervulis variis flavidis hinc indè confluentibus prominulis
epidermide ruptâ cinctis, sporidiis aliis subglobosis aliis rarioribus pyrifor-
mibus subpedicellatis aliis multò rarioribus oblongo-ovatis. — In foliis rarij
ramis junioribus Salicis Capreæ, auritæ, cinereæ, etc. — *U. farinosa* £ Pers.
syn. 217. *Cæoma Caprearum* Schlecht? Linck?

40. *U. EUPHORBIÆ* (Rebent. neom. p. 354.) maculis supra oblitteratis fusco-fla-
vescentibusve, acervulis subrotundis sparsis planiusculis aurantiaco-flavis
epidermide ruptâ cinctis, sporidiis aliis pyriformibus plus minus elongatis,
aliis subglobosis, aliisque globosis pedicellatis. — In foliis et capsulis varia-
rum Euphorbiarum. — *U. Helioscopiæ* DC. fl. fr. 2. p. 232. *Cæoma Euphor-
biarum* Linck sp. pl. 6. 2. p. 39.

41. *U. POTERII* (Spreng. syst. veg. 4. p. 576.) maculis supra rufescensibus, acer-
vulis subrotundis sparsis minutis hypophyllis, epidermide rumpente, spori-
diis aliis subrotundis aurantiacis, aliis majoribus cylindricis curviusculis
utrinque rotundatis decoloribus. — In Poterio Sanguisorbæ. — *U. Potentilla-
rum* £ DC. fl. fr. 5. p. 80. *Cæoma Poterii* Schlecht. Linck.

42. *U. LINI* (DC. fl. fr. 2. p. 234.) maculis supra suboblitteratis, acervulis con-
vexis subrotundis sparsis flavo-aurantiacis epidermide ruptâ cinctis, spo-
ridiis aliis subglobosis aliis pyriformibus aliis subrotundis breviter pedicella-
tis. — In foliis, caule etc. Lini cathartici et usitatissimi. — *U. miniata* £ Pers.
Cæoma Lini Linck.

**** *Sporidiis fusco-brunneis omnibus aut pluribus stipitatis.*

43. *U. GALII* (Dub. mss.) hypophylla, acervulis dilutè fuscis minutis sparsis
solitariis aut hinc indè aggregatis et confluentibus orbicularibus ovatisve epi-
dermide ruptâ cinctis, sporidiis exactè globosis pellucidis tenuissimè punctu-
latis breviter pedicellatis. — In Galio Mollagine (cl. Chaillet). — *Cæoma*
Galii Linck?

44. *U. PROEMINENS* (DC. fl. fr. 2. p. 235.) bifrons, acervulis orbicularibus con-
vexo-planis sparsis rufo-fuscis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis minutis
subglobosis pedicello brevissimo instructis. — In Euphorbiâ Chamæsyce.

45. *U. SCUTELLATA* (Pers. syn. 220.) hypo-rarijs epiphylla, maculis supra nullis,
acervulis subrotundis aggregatis seriatisque fusco-unbrinis epidermide ruptâ
elevatâ cinctis, sporidiis subglobosis fuscis pedicello brevi instructis. — In
Euphorbiis variis præsertim in E. Cyprissiâ cuius folia indè deformantur. —
DC. fl. fr. 2. p. 227. *Cæoma scutellosum* Linck.

46. *U. EXCAVATA* (DC. fl. fr. 2. p. 227; 5. p. 69.) hypophylla, acervulis fuscis
parvulis numerosis orbiculatis sparsis subimmersis nempè epidermide sub-
inflatâ cinctis, sporidiis subovoideis aliis sessilibns aliis breviter pedicellatis.
— Ad Euphorbias varias præsertim in provinciis australibus. — Acervuli fre-
quenter totam paginam occupant sed non deformant.

47. *U. EPILOBII* (DC. fl. fr. 5. p. 73.) hypo-rarijs epiphylla, acervulis rufo-fuscis
sparsis distantibus orbiculatis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis globosis

- ovoideisve breviter pedicellatis sessilibusque. — In Epilobio tetragono et montano. — U. vagans a DC. fl. fr. 2. p. 228.
48. U. PHYTEUMARUM (DC. enc. meth. 8. p. 222; fl. fr. 5. p. 65.) maculis supra nullis, acervulis fusco-brunneis orbicularibus hypophyllis demum confluentibus epidermide bullata primò tectis demum rupta cinctis, sporidiis ovato-pyriformibus pedicellatis pedicello mox brevi mox longiore. — In Phytemis variis. — Puccinia Phytemarum DC. fl. fr. 2. p. 225. — Hanc cum sequentibus (nos 49-52) sub nomine Cæomatis apiculosi conjungit cl. Linck.
49. U. CICHORACEARUM (DC. fl. fr. 2. p. 229; 5. p. 74.) maculis supra obliteratis aut minutissimis fuscis, acervulis fuscis bifrontibus caulinisque sparsis minimis orbicularibus rariis confluentibus epidermide rupta saepius cinctis, sporidiis globosis oblongisve utrinque obtusis aliis sessilibus aliis pedicello brevi instructis. — In Cichoraceis et Centaureis variis. — U. Gyani DC. fl. fr. 5. p. 74. U. Ephialtes Spreng.
50. U. CACALIZÆ (DC. enc. bot. 8. p. 223; fl. fr. 5. p. 65.) maculis supra rutilo-flavescensibus, cespitulis hypophyllis orbicularibus subplanis epidermide rupta demum obliterata cinctis in acervulos magnos orbiculares confluentibus, sporidiis breviter pedicellatis rariis orbicularibus plerumque oblongo-ovatis obtusis aut subapiculatis. — In Cacalia Petasite in Alpibus, montibus Lezurenibus, etc.
51. U. HEDYSARI-OBSCURI (DC. enc. meth. 8. p. 222; fl. fr. 5. p. 64.) epiphylla, acervulis orbicularibus fusco-nigris minutis vix epidermide rupta cinctis, sporidiis ellipsoideis utrinque attenuatis, stipite brevissimo. — Ad Hedysarum obscurum in Alpibus.
52. U. FABÆ (Pers. disp. 13.) maculis supra obliteratis, acervulis subrotundis ovalibusque bullatis sparsis aggregatisque demum confluentibus fuscis aut fusco-brunneis epidermide rupta cinctis, sporidiis subglobosis ovoideisve aliis sessilibus aliis breviter pedicellatis. — In caulibus, petiolis, foliorum utrâque paginâ Fabæ, Cytisi et plurium aliarum Leguminosarum. — DC. fl. fr. 2. p. 596; 5. p. 69. Grev. crypt. fl. t. 95. U. Trifolii DC. fl. fr. 5. p. 66. Desmaz. crypt. exs. n. 276. U. Cytisi DC. fl. fr. 5. p. 63. U. Laburni DC. l. c.
53. U. APPENDICULATA (Pers. syn. 221.) maculis supra obliteratis, acervulis subrotundis ovalibusque sparsis aggregatisque interdum confluentibus fusco-nigrisve epidermide bullata primò tectis dein cinctis, sporidiis subglobosis ovoideisve longè pedicellatis fuscis. — In utrâque paginâ Fabæ, Pisi, Orobi, Phaseoli, etc. — U. Pisi DC. fl. fr. 2. p. 224; 5. p. 64. U. Orobi DC. fl. fr. 5. p. 66. U. Phaseolorum DC. fl. fr. 2. p. 224; 5. p. 63. Cæoma appendiculatum Linck sp. pl. 6. 2. p. 33. C. Phaseoli Nees fung. t. 1. f. 10. Puccinia Fabæ Grev. cr. fl. t. 29.
54. U. LIMONII (Dub. mss.) maculis nullis, acervulis rufo-fuscis convexis oblongo-rotundis sparsis aggregatisque, epidermide bullata demum longitudinaliter rumpente et persistente, stipite tenui albo longo sporidiis oblongo-ovoideis aut ovato-rotundis subduplo longiore. — In caule petiolis et utrâque paginâ foliorum Statices Limonii. — Puccinia Limonii DC. fl. fr. 2. p. 596.
55. U. BEHENIS (DC. fl. fr. 5. p. 63.) hypo-rariis epiphylla, acervulis atris orbiculatis sparsis convexis compactis epidermide rupta cinctis, sporidiis ovoideis, stipite albo filiformi longissimo rigido. — In foliis Silenes inflatæ.
56. U. AMBIGUA (DC. fl. fr. 5. p. 64.) maculis nullis, bifrons, acervulis rufo-fuscis subrotundis oblongo-ovatisve sparsis aggregatis confluentibusve, epidermide griseâ demum longitudinaliter rumpente persistente, sporidiis pyriformibus longè stipitatis. — In Allio Victoriali aliisque speciebus. — Cæoma ambiguum Linck.
57. U. ARISTOLOCHEÆ (DC. fl. fr. 5. p. 67.) hypophylla, acervulis fuscis orbiculatis sparsis confertis minutis planinseulis epidermide rupta cinctis, sporidiis subglobosis breviter pedicellatis. — In Aristolochia rotunda.

58. U. ERYTHRONII (DC. fl. fr. 5. p. 67.) bifrons petiolarisque, maculis oblique ratis, acervulis rufo-fuscis ovato-rotundis sparsis saepius annulatim congestis, epidermide longitudinaliter rumpente persistente, sporidiis oblongis saepius subglobosis apiculatis breviter pedicellatis. — In Erythronio dente-canis.
59. U. MUSCARI (Duby mss.) bifrons, acervulis rufo-fuscis minutis ovatis confertis epidermide longitudinaliter rupta cinctis in maculas magnas orbicularares oblongasque confluentibus, sporidiis minutissimis globosis ovato-elongatis pyriformibus pedicellatis. — In Muscari comoso circa Mimatem reperiit cl. Prost. — Maculae 6-12 lin. longae et interdum folium totum occupantes.
60. U. INTRUSA (Grev. flor. edin. p. 436.) hypophylla, maculis nullis, acervulis fuscocubris orbicularibus oblongisve sparsis confertis minutis, epidermide longitudinaliter rumpente persistente, sporidiis subglobosis reticulatis aliis sessilibus aliis breviter pedicellatis. — In variis Alchemillis.
61. U. GERANII (DC. fl. fr. 5. p. 73.) hypophylla, maculis supra fuscis, acervulis rufo-fuscis orbicularibus sparsis confertis numerosissimis, epidermide bullata demum longitudinaliter rumpente persistente, sporidiis globosis aliis sessilibus aliis breviter pedicellatis. — In variis Geranii speciebus. — Grev. crypt. fl. t. 8.
62. U. SILENES (Req. in herb. DC.) bifrons caulinaque, maculis nullis, acervulis fuscis ovalibus subrotundisque sparsis solitariis immersis epidermide tandem disrupente tectis, sporidiis ovoideis globosisve pellucidis brevissime stipitatis. — In Silene conica circa Avenionem (cl. Req.). — Cæoma Silenes Schlecht? Linck sp. pl. 6. 2. p. 27?
63. U. VALERIANÆ (DC. fl. fr. 5. p. 68.) bifrons, maculis flavescensibus, acervulis parvis rufo-cinnamomeis subrotundis confluentibusve sparsis confertis aut circinnatim dispositis, epidermide tandem centro rumpente persistente, sporidiis aliis subglobosis sessilibus aut breviter pedicellatis, aliis oblongis clavatisve sessilibus aut breviter pedicellatis. — In variis Valerianis. — Acer- vuli reperiantur in quibus omnia ferè sporidia subglobosa, alii in quibus omnia ferè clavata, alii tandem in quibus numerus sporidiorum clavatorum numerum globosorum subæquat.
- ***** *Sporidiis fusco-brunneis omnibus sessilibus.*
64. U. IRIDI (Dub. mss. an Desmaz. crypt. exs. n. 127 ??) hypo-rarius epiphylla, maculis circa lutescentibus, acervulis parvis pallide rufis oblongis linearibusque sparsis aggregatisve vix convexis, epidermide bullata vix longitudinaliter disrupente, sporidiis exacte globosis sessilibus dilute fuscis pellucidis. — Ad Iridem fætidissimam circa Cherbourg (cl. Lenormand), Narbonam (cl. Requien). — Acer- vuli interdum lineolatae circumseribuntur.
65. U. RUBIGO-VERA (DC. fl. fr. 5. p. 83.) caulinæ epi- et rarius hypophylla, acervulis primò flavis dein rufis ovato-elongatis sparsis minimis epidermide bullata primò tectis dein roptâ cinctis, sporidiis subglobosis minimis sessilibus. — In Cerealibus saepè cum Puccinia Graminum et Uredine lineari mixta.
66. U. FESTUCÆ (DC. fl. fr. 5. p. 82.) epiphylla intrà plicaturam folii latitans, acervulis primò flavis dein fuscis ovatis minimis, sporidiis ovoideis subpyriformibusve. — In Festucâ glaucâ Jurassi (cl. Chaillet). — Folia infesta apicibus exsiccantur.
67. U. PRUNASTRI (DC. fl. fr. 5. p. 85.) hypophylla, acervulis ferrugineis parvis orbiculatis saepè confluentibus, epidermide vix rumpente, sporidiis ovoideis sessilibus. — Ad Prunum spinosam in Jurasso (cl. Chaillet). — Cæoma porphyrogeneta Linck sp. pl. 6. 2. p. 31?
68. U. RIBIS (Chevall. fl. par. 1. p. 400.) acervulis fuscis subrotundis ovalibusque saepè confluentibus epidermide ruptâ cinctis, sporidiis ovoideis subcohærentibus. — Ad folia Ribis Alpini. — U. confluens & Ribis Alpini DC. fl. fr. 5. p. 86. U. Evonymi Mart. ex Linck. Cæoma Ribesii Linck sp. pl. 6. 2. p. 29.
69. U. GENISTARUM (Dub. mss.) bifrons, acervulis pallide fuscis sparsis orbicula-

- ribus oblongisque minutis prominulis, epidermide demum longitudinaliter rumpente, sporidiis ovoideis fuscis pellucidis. — In variis Genistæ speciebus.
— An cum U. Fabæ conjugenda? pedicellos tamen nonquam vidi.
70. U. PRIMULÆ-INTEGRIFOLIÆ (DC. fl. fr. 5. p. 69.) epi-rariüs hypophylla, acervulis fuscis orbicularibus ovatisque sparsis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis globosis. — Ad Primulam integrifoliam in Pyrenæis reperiit cel. DC.
71. U. THESII (Dub. mss.) hypophylla, acervulis dilatè fuscis sparsis orbicularibus ovatisque epidermide bullatâ tectis demum ruptâ cinctis, sporidiis exactè globosis pellucidis. — In Thesio linophyllo cum Aecidio Thesii mixta.
72. U. PLANTAGINIS (Dub. mss.) bifrons, acervulis fusco-brunneis sparsis orbicularibus oblongisque prominulis supra planiusculis epidermide longitudinaliter ruptâ cinctis, sporidiis exactè globosis pellucidis. — In Plantagine lanceolatâ circa Mimatem (cel. Prost).
73. U. POLYGONORUM (DC. fl. fr. 5. p. 71.) sæpiüs hypophylla, acervulis rufis subrotundis sparsis inordinatis interdum confluentibus epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis. — In variis Polygoni speciebus cum Pucciniis sæpè mixta. — Fl. dan. t. 1318. Grev. crypt. fl. t. 80.
74. U. RUMICUM (DC. fl. fr. 5. p. 65.) bifrons, acervulis rufo-subfuscis minutis orbicularibus convexis sparsis sæpè confluentibus, epidermide bullatâ griseâ tandem centro rumpente persistente, sporidiis globosis ovoideis utrinque obtusis interdum brevissimè pedicellatis. — In Rumicibus variis. — U. bifrons DC. fl. fr. 2. p. 229. Cæoma apiculosum (pro parte) Linck.
75. U. BETÆ (Pers. syn. 220.) acervulis subrotundis ovalibusque rufis prominulis sparsis concentricisque epidermide ruptâ cinctis, sporidiis ovato-globosis. — In foliorum utrâque paginâ, petiolis, caulis variarum Betæ specierum. — DC. fl. fr. 5. p. 70. — Cespituli concentrici cespitulo centrali contigui sunt et demum confluant.
76. U. CHENOPODII (Dub. mss.) bifrons, acervulis dilatè fuscis sparsis confertisve orbicularibus compactis subglobosis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis ovoideis fuscis subpellucidis sessilibus. — In Chenopodio maritimo propè Perpignan (cl. Requier).
77. U. VINCÆ (DC. fl. fr. 5. p. 70.) acervulis rufo-subfuscis numerosis ovatis rotundisve epidermide ruptâ cinctis et etiam subtectis, sporidiis subovoideis. — In petiolis et utrâque paginâ foliorum Vincæ majoris.
78. U. TEREBINTHI (DC. fl. fr. 5. p. 71.) hypo-rariüs epiphylla, maculis supra rufo-fuscis, acervulis rufis sparsis orbicularibus latissimis planis pulverulentis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis paucis. — Ad Pistaciam Terebinthum in provinciis australibus. — Acervuli 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. lati.
79. U. SEDI (DC. fl. 2. p. 227; 6. p. 69.) bifrons, acervulis e luteo-fuscis subrotundis verrucæformibus sparsis rariüs aggregatis clausis epidermide rariüs ore minuto depresso rumpente, sporidiis subglobosis. — In foliis variorum Sedorum et Semper vivorum. — U. Semper vivi Alb. et Schw. nisk. p. 126. Cæoma Semper vivi Linck.
80. U. VIOLARUM (DC. fl. fr. 5. p. 73.) hypo-rariüs epiphylla, acervulis rufis sparsis orbiculatis, epidermide bullatâ demum ruptâ persistente, sporidiis parvis subglobosis. — In Violâ caninâ, Ruppii, etc. — Cæoma nivosum Linck obs. 2. p. 27. C. Violaram Linck sp. 6. 2. p. 25.
81. U. ARMERIAE (Dub. mss.) acervulis rufis sparsis mox effusis, mox brevibus subrotundis, epidermide bullatâ clausâ primâ tectis demum ruptâ cinctis, sporidiis globosis. — In scapis et utrâque paginâ foliorum Statices Armeriae. — Cæoma Armeriae Schlecht. ber. 2. p. 126. Linck sp. pl. 6. 2. p. 11. U. Statices Desmaz. crypt. exs. n. 128.
82. U. ARI-ITALICI (Req. in herb. DC.) hypophylla, maculis latis lutescenti-albidis sparsis, acervulis rufis annulatum digestis orbiculatis ovatisque

900 ACOTYL. SEU CELLULARES. URADO

compactis planis epidermide ruptâ cinctis, sporidiis dilutè rufis grossis pellicidis subglobosis. — In Aro-italico circâ Avenionem (cl. Req.).

83. U. CYNAPII (DC. fl. fr. 5. p. 72.) hypophylla caulinata petiolarisque, acervulis pallidè rufis oblongis orbicularibus sparsis planis epidermide bullatâ primò tectis dein ruptâ cinctis, sporidiis ovoideis. — In Æthusâ Cynapio Apio graveolente aliisque Umbelliferis. — Cæoma Umbellatarum Linck.

84. U. SUAVEOLENS (Pers. syn. 221.) hypophylla, acervulis rufo-fuscis planiusculis subrotundis numerosis sparsis dein confluentibus epidermide ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis. — In Serratulâ arvensi. — DC. fl. fr. 2. p. 229. Cæoma obtegens Linck obs. 2. p. 27. C. suaveolens Linck sp. pl. 6. 2. p. 19. — Folia tantâ copiâ obtigit ut inde marinorata videntur.

85. U. ARTEMISIAE (Chevall. fl. par. 1. p. 399.) bifrons, maculis oppositis fuscis, acervulis fuscis subglobosis ovalibusque parvis sparsis, epidermide citò rumpente, sporidiis subglobosis. — In foliis Artemisiae vulgaris ex cl. Nestler et Chevall. — Cæoma Artemisiae Linck sp. pl. 6. 2. p. 19. — In paginâ inferiore sub tomento erumpit ita ut epidermis non conspiatur.

86. U. CYANI (DC. fl. fr. 5. p. 74 excl. var. 2.) bifrons, acervulis fuscis ovatis oblongisve sparsis planis vix epidermide ruptâ cinctis, sporidiis exactè globosis pellucidis sessilibus. — In Centaureâ Cyano facile cum Pucciniâ confundenda.

87. U. CARICINA (DC. fl. fr. 5. p. 83.) epiphylla, maculis circa rufescensibus, acervulis rufo-fuscis sparsis ovalibus minutis epidermide longitudinaliter ruptâ cinctis, sporidiis subglobosis. — In Carice pseudo-cypero. — Cæoma pseudo-cyperi Linck.

88. U. OBLONGATA (Grev. crypt. fl. t. 12. pro parte.) bifrons, maculis oblongis sèpè confluentibus flavo-fuscis, acervulis fuscis rotundis ellipticisque sparsis minutis, epidermide clausâ rariùs longitudinaliter rumpente, sporidiis pellucidis ovoideis oblongo-ovatis subpyriformibusqne. — In foliis Luzulæ maximæ circâ Beauvais (cl. Graves). — Cæoma oblongatum Linck.

89. U. CICHORII (DC. fl. fr. 5. p. 74.) bifrons caulinaque, acervulis dilutè fuscis numerosissimis minutissimis aut rariùs in maiores confluentibus confertis orbicularibus planiusculis, epidermide bullatâ demùm centro rumpente cinctis, sporidiis ovato-globosis pellucidis sessilibus in quoque acervulo paucis. — Ad Cichorium Intybum in Armoraciâ detexit cl. DC.

90. U. LABIATARUM (DC. fl. fr. 5. p. 72.) hypophylla, maculis supra flavescentibus fuscisqne, acervulis pallidè rufis sparsis subaggregatis orbicularibus convexis, epidermide tandem rumpente, sporidiis subglobosis. — In variis Labiatis præsertim Menthis, Clinopodio, Thymo, etc. — U. Menthæ Pers. U. Menthastræ Linck obs. 2. p. 27. Æcidium Menthæ Sow. fung. t. 398. f. 3. — Acervuli parvi; sporidia tandem nigrescunt.

91. U. GUEPINII (Dub. mss.) caulinata bifronsque, acervulis dilutè fuscis dein fuscis tandem nigris confertis sparsisque orbicularibus convexis tremellosis, epidermide bullatâ non rumpente tectis, sporidiis grossis exactè globosis pellucidis dilutè fuscis. — Ad Melampyram in Andegaviâ (cl. Guépin).

92. U. CALTHÆ (Requier in herb. DC.) hypophylla, acervulis fuscis sparsis hinc inde confertis orbicularibus ovatisve epidermide ruptâ cinctis, sporidiis grossis globosis ovoideisve pellucidis sessilibus aut interdum breviter pedicellatis. — In Calthâ palustri (cl. Requier).

93. U. FICARIAE (Alb. et Schw. nisk. p. 128.) petiolaris bifronsque, cespitulifuscis orbicularibus convexis epidermide bullatâ tectis dein ruptâ cinctis in acervulos orbicularis ellipticos elongatosque primò confertis dein confluentibus, sporidiis ovoideis ellipticisque utrinque apiculatis. — In Ficariâ. — DC. fl. fr. 5. p. 65. Puccinia Ficariae Fl. fr. 2. p. 225. Cæoma Ranunculacearum Linck sp. pl. 6. 2. p. 23. excl. syn. DC. Pers. aliorumque.

***** *Sporidiis violaceis nigris nigro-fuscisque.*

94. U. RANUNCULACEARUM (DC. fl. fr. 5. p. 75.) petiolaris bifronsque, acervulis nigris latis orbicularibus elongatis irregularibusque convexis sparsis confluentibusque epidermide fuscâ bullatâ tectis, dein crispata irregulariter cinctis, sporidiis subovoideis sessilibus reticulo-pellucido obvolutis. — In Ficariâ, Hepaticâ, Anemone aliisque Ranunculaceis. — U. Anemones Pers. syn. 223. DC. fl. fr. 2. p. 229.
95. U. VESICARIA (Kaulf. in Kunze et Schm. myc. heft. 1. p. 67.) petiolaris bifronsque, acervulis nigris elongatis subcylindricis sparsis epidermide bullatâ nigrescente clausâ crispata tectis, sporidiis subglobosis inæqualibus sessilibus tenuiter reticulatis. — In Violâ odorata cultâ. — Petiolos foliaque deformans.
96. U. GLADIORI (Requien in herb. DC.) bifrons, maculis circâ lutescentibus, acervulis nigris suborbicularibus sparsis confertisque convexis epidermide bullatâ clausâ tectis, sporidiis subglobosis sessilibus reticulo pellucido tenuissimo obvolutis. — In Gladiolo circâ Avenionem (cl. Req.).
97. U. LONGISSIMA (Sow. fung. t. 139.) acervulis linearibus longissimis parallelis sordidè olivaceis, epidermide longitudinaliter rumpente, sporidiis minutis exactè globosis olivaceis demùm nigris. — Ad folia et culmos Poæ aquaticæ circâ Parisios ex Chevall. — Cæoma longissimum Schlecht. Linck.
98. U. MELANOGRAMMA (DC. fl. fr. 5. p. 75.) bifrons, acervulis ovatis vel elongato-linearibus atris aggregatis epidermide atrâ planâ lævi clausâ demùm rariùs longitudinaliter rumpente tectis, sporidiis subglobosis minutissimis opacis. — Ad folia Caricis montanæ et digitatæ, in Jurasso detexit cl. Chaillet.
99. U. BISTORTARUM (DC. fl. fr. 5. p. 76 excl. var. γ.) bifrons, maculis circâ rubris, acervulis nigris magnis orbicularibus sparsis aggregatisque subconvexis epidermide lacerâ cinctis, sporidiis minutis globosis. — In Polygono Bistortæ et viviparo. — Cæoma Bistortarum et marginale Linck sp. pl. 6. 2. p. 10.
100. U. UTRICULOSA (Dub. mss.) acervulis expansis vagis florem impletibus, sporidiis globosis minutissimis demùm effusis nigris. — In Polygonis variis. — U. Bistortarum γ ustilaginea DC. fl. fr. 5. p. 76. Cæoma utriculosum Nees fung. t. 1. f. 6. Linck sp. pl. 6. 2. p. 10. — Exedit perigonum et in ovario erumpit.
101. U. SEMINIS-CONVOLVULI (Desmaz. crypt. exs. n. 274.) acervulis expansis vagis capsulam demùm impletibus, sporidiis subglobosis minutissimis subinæqualibus opacis agglomeratis fusco-nigris. — Ad semina Convolvuli arvensis circâ Lille (cl. Desmazières). — Semina crescentia invadit et demùm exedit.
102. U. CARBO (DC. fl. fr. 5. p. 76.) acervulis vagis effusis glumas grana rachi demque occupantibus, sporidiis exactè globosis minutissimis nigris inodoris. — In Graminibus et Cerealibus permultis præsentim in Avenis. — Desmaz. crypt. exs. n. 123. U. segetum Pers. Ustilago segetum Dittm. in Sturm. deutsch. 3. t. 33. Reticularia segetum Bull. herb. t. 472. f. 1.
103. U. MAYDIS (DC. fl. fr. 5. p. 77.) acervulis maximis inclusis caulinis aut intrâ semina latitantibus epidermidem dilatantibus, sporidiis copiosissimis inodoris exactè globosis minutissimis nigris. — In Mayde Zeâ. — Cæoma Zeæ Linck. — Ovarium Uredinem continens intumescit et epidermis inflata percussione facilimè rumpitur.
104. U. DESTRUENS (Dub. mss.) acervulis effusis vagis ovarium et glumas occupantibus, sporidiis irregularibus oblongiusculis nigris inodoris. — In Panico miliaceo culto. — Cæoma destruens Schlecht. Linck. U. segetum ♂ Pers. U. carbo ♂ DC. fl. fr. 5. p. 76.
105. U. CRIES (DC. fl. fr. 5. p. 78.) acervulis intrâ semina inclusis et ea non dilatantibus, sporidiis exactè globosis majoribus nigris fastidis. — In Triticeo

902 ACOTYL. SEU CELLULARES.

- Desmaz. cr. exs. 124. *U. sitophila* Dittm. in Sturm. deutsch. 3. t. 34.
Cæoma segetum Nees fung. t. 1. f. 7.
- 106. *U. vacuolorum* (DC. fl. fr. 5. p. 78.) acervulis vagis atris compactis urceolos extra occupantibus, sporidiis effusis majoribus ovoideis subglobosisve confertissimis. — Ad *Caricis* varias. — *U. Caricis* & Pers. syn. 225. fl. dan. t. 1437. *Cæoma Caricis* Linck.
- 107. *U. OLIVACEA* (DC. fl. fr. 5. p. 78.) acervulis intra semina ortis et ex iis erumpentibus fusco-olivaceis, sporidiis globosis minimis. — In *Carice ripariâ*.
— *Cæoma olivaceum* Linck.
- 108. *U. RECEPTACULORUM* (DC. fl. fr. 5. p. 79.) acervulis vagis effusis in receptaculis inclusis, sporidiis copiosis globosis nigro-fuscis. — In *receptaculis Tragopoginis*, *Scorzonerae* et *aliarum Cichoracearum*. — *U. Tragopogi* Pers.
- 109. *U. FLOSCULORUM* (DC. fl. fr. 5. p. 79.) acervulis vagis effusis in flosculis inclusis, sporidiis copiosis globosis fusco-purpureis. — In *flosculis Knautiae arvensis*. — *Cæoma floseniorum* Linck.
- 110. *U. ANTERARUM* (DC. fl. fr. 5. p. 79.) acervulis vase confluentibus antheras occupantibus, sporidiis subglobosis effusis purpureo-violaceis. — In *antheris variarum Caryophyllacearum*. — *U. violacea* Pers. syn. 225. *Cæoma anterarum* Nees fung. t. 1. f. 5.

XXVII. ÆCIDIUM Pers. syn. 204. DC. fl. fr. 2. p. 237. Ad. Brongn. cl. champ. p. 31. — *Cæomatis* sp. Linck.

Sporidia unilocularia globosa aut ovoidea libera minutissima non septata in acervulos regulares congesta et epidermide in pseudo-peridium (peridium Pers. DC. Grev.) tubulosum vel cyathiforme extensa regulariter disrupente cincta. — Fungilli in plantis vivis parasitici.

Sect. I. ROESTELIA Rebent. neom. p. 350. — *Cancellaria* Ad. Brongn. l. c.

Epidermis in tuberculos elevata e quibus orientur pseudo-peridia lateraliter in innumeris rimulas fissilia apice vero non dehiscentia.

1. *Æ. CANCELLATUM* (Pers. syn. 205.) maculis flavo-rubris, tuberculis flavo-brunneis squamulosis hypophyllis, pseudo-peridiis elongatis albicantibus, sporidiis ferrugineo-fuscis. — In foliis *Pyri communis vulgatissimum*. — DC. fl. fr. 2. p. 247. Nees fung. t. 1. f. 1. *Rœstelia cancellata* Reb. *Cæoma rœstelites* Linck sp. 6. 2. p. 64. excl. syn. Sow. *Lycoperdon cancellatum* Linn. Jacq. aust. t. 17.

Sect. II. CERATITES Linck sp. pl. 6. 2. p. 64. — *Rœstelia* Ad. Brongn. l. c.

Epidermis in pseudo-peridium tubulosum apice laciniatum laciniis divaricatis elevata.

2. *Æ. LACERATUM* (Sow. fung. t. 318.) maculis flavis, tuberculis parvis fuscis hypophyllis canlinis calycinis, pseudo-peridiis densissime aggregatis elongatis brunneo-albicantibus cylindraceis saepè curvulis irregulariter in setas rectas subdivergentesve fissis, sporidiis fuscis orbicularibus. — In *Crataego Oxyacanthæ*, *C. azarolo*, *Pruno sylvestri*, *Pyro chamæspilo*, etc. — DC. fl. fr. 2. p. 247. et 5. p. 98. Grev. crypt. fl. t. 209. A. *Oxyacanthæ* Pers. syn. 206. DC. fl. fr. 5. p. 98.

β. Ariæ (DC.) tuberculis hypophyllis, pseudo-peridiis albicantibus in setas capillares convolutas fissis. — In *Pyro Ariæ*.

3. *Æ. CORNUTUM* (Pers. obs. myc. 2. t. 4. f. 2. 3.) hypophyllum, macula granulosa rubro-lutea, tuberculis luteo-aurantiacis, pseudo-peridiis paucis longisaimis cylindrico-nodulosis erectis subcurvatisque griseo-flavis ore laceris,

- sporidiis subglobosis griseo-rufescens. — In Sorbo Aucupariæ. — DC. fl. fr. 2. p. 247. Sow. t. 319. Grev. crypt. fl. t. 180.
4. *Æ. AMELANCHIERIS* (DC. fl. fr. 5. p. 97.) hypophyllum, macula granulosa purpurea, tuberculis luteis mammilosis, pseudo-peridiis paucis (3-8) longissimis cornuto-cylindricis suberectis griseis apice acutis demum sublaceris, sporidiis rufo-fuscis subsphaericis. — In Amelanchier vulgaris.
5. *Æ. MESPILI* (DC. fl. fr. 5. p. 98.) hypo-rarius epiphyllum, maculis purpureis granulosis, tuberculis vix nullis, pseudo-peridiis densissime aggregatis numerosis (10-20) cylindricis apice in setas rectas laceris, sporidiis fuscis. — In Mespilo Germanicæ. — Hanc speciem cum tribus precedentibus sub nomine Cæomatis cylindritis conjungit cl. Linck.
6. *Æ. BERBERIDIS* (Gmel. syst. p. 1473.) maculis purpureis fuscescentibus subrotundis, tuberculis subrotundis ovalibusque convexis hypophyllis, pseudo-peridiis confertis cylindricis luteis aurantiacis, ore dentibus deciduis instructo, sporidiis globosis luteis reticulatis. — In foliis, rarius baccis Berberidis vulgaris. — DC. fl. fr. 2. p. 246. Grev. crypt. fl. t. 97. Lycoperdon puliforme Jacq. coll. aust. t. 1. f. 4. Cæoma Berberidatum Linck sp. pl. 6. 2. p. 57.
7. *Æ. THALICTRI* (Grev. crypt. fl. t. 4.) hypophyllum, maculis parvis fuscescentibus, tuberculis nullis, pseudo-peridiis paucis in glomerulos parvos rotundos aggregatis tubulosis luteis, ore lacero-dentato primum contracto demum subdilatato. — In Thalictrum minori circâ Thionville (cl. Soleiro). — Pseudo-peridia in plantâ Grevilliana aurantiaca, in nostrâ Intea, an sp. dist.?
8. *Æ. CYDONIAE* (Lenormand in litt.) hypophyllum, maculis supra luteis centro fuscescentibus, tuberculis nullis, pseudo-peridiis paucis in glomerulos parvos suborbicularares aggregatis campanulato-tubulosis albido-luteis, ore inæqualiter lacero-erecto, sporidiis globosis luteis. — In Cydonia vulgari circâ Vire reperiit cl. Lenormand.

Sect. III. PERIDERMIUM Linck sp. pl. 6. 2. p. 66. — Sphærotheca Desv.

Epidermis in pseudo-peridium utriculæforme medio rumpens elevata.

9. *Æ. PINI* (Pers. in Gmel. syst. nat. p. 1473.) sparsum exsertum, pseudo-peridiis pallide flavis oblongo-compressis versus basin irregulariter rumpentibus, sporidiis sphæricis aurantiacis. — In ramis et foliis Pinus sylvestris. — DC. fl. fr. 2. p. 237. Moug. et Nestl. exs. n. 186. Grev. crypt. fl. t. 7. Lycoperdon Pini Willd. in bot. mag. n. 14. t. 4. f. 12.
10. *Æ. ELATINUM* (Alb. et Schw. t. 5. f. 3.) hypophyllum, pseudo-peridiis ellipsoideis depressis circumscisis seriatis albidis, sporidiis aureis ovoideis. — In foliis Abietis pectinatae. — Mong. et Nestl. vog. n. 285. DC. fl. fr. 5. p. 88.

Sect. IV. CÆOMA. — Cæomatis subgenus Æcidium Linck l. c.

Epidermis circâ sporidiorum acervos in pseudo-peridium cyathiforme ruptum.

* *Pseudo-peridiis in acervos irregulares conglomeratis.*

11. *Æ. ERYTHRONII* (DC. fl. fr. 2. p. 246.) bifrons, maculis rotundo-oblongis albidis, pseudo-peridiis orbicularibus flavis confertis seriatisque ore subintegro, sporidiis aurantiacis. — In Erythronio dente-canis.
12. *Æ. RANUNCULARUM* (DC. fl. fr. 5. p. 97.) maculis flavescentibus fuscescentibusve, pseudo-peridiis in acervos irregulares dense congestis pallide aurantiacis breviter tubulosis ore lacero patulo et reflexo, sporidiis aurantiacis. — In paginâ inferiore rarius superiore foliorum Ranuncularum variorum, Aconiti Napelli et Lycocloni, Thalictri flavi et pubescens, Aquilegiæ, Ficariæ, etc. — A. Ranunculi acris Pers. A. Ranunculi Sow. sang. t. 397. f. 4. A. crassum Ficariæ Pers. Nees fung. t. 1. f. 2. A. confertum &

Ficariæ DC. fl. fr. 2. p. 245. A. bifrons DC. fl. fr. 2. p. 246. A. Aquilegiæ Pers. ic. pict. t. 23. f. 4.

13. *Æ. UNILATERALE* (DC. fl. fr. 2. p. 245.) *hypophyllum, folio circa fuscescente, pseudo-peridiis flavo-aurantiacis in acervulos oblongos laxè digestis breviter tubulosis, ore crasso integro.* — In Alpibus ad folia et petiolos *Anemones narcissifloræ.* — An ut vult cl. Linck ad prius referendum?
14. *Æ. BUNII* (DC. fl. fr. 5. p. 97.) *maculis obliteratis fascisve, fronde bullatâ difformi, pseudo-peridiis in acervos longos irregularares digestis numerosis subdistinctis breviter ovatis demum campanulatis flavo-aurantiacis, ore subintegro, sporidiis aurantiacis.* — In petiolis et foliis variarum Umbelliferarum. — *Cæoma buniatum* Linck.
15. *Æ. CRASSUM* (Pers. ic. pict. 2. t. 3. f. 1. 2.) *maculis fuscis, subiculo crasso effuso convexo, pseudo-peridiis in acervulos rotundos aut irregulares magnos densissimè areolato-congestis pallidè aurantiacis primò concavis demum cupulæformibus ore subdenticulato, sporidiis globosis aurantiacis.* — In foliis, petiolis et pedunculis *Rhamni frangulæ.* — DC. fl. fr. 2. p. 244. *Cæoma crassatum* Link.
16. *Æ. IRREGULARE* (DC. fl. fr. 2. p. 245.) *maculis lutescentibus, subiculo subnullo, pseudo-peridiis in acervulos in foliis subrotundos parvos in ramulis irregularis effusos laxè congestis pallidè flavis primò campanulato-tubulosis ore denticulato demum subevanidis, sporidiis globosis aurantiacis.* — In ramulis et paginâ inferiore foliorum *Rhamni cathartici.*

Æ. Rhamni-Alpini, *hypophyllum, acervulis paucis, pseudo-peridiis campanulatis.* — *A. Rhamni-Alpini* DC. fl. fr. 2. p. 242.
17. *Æ. PARNASSIÆ* (Graves in litt.) *hypophyllum, maculis pallidis, pseudo-peridiis in acervos subrotundos laxè dispositis luteo-fuscis urceolato-concavis, margine crasso subintegro, sporidiis pallidis.* — In Parnassiâ propè Beauvais (cl. Graves). — *Cæoma Parnassiæ* Schlecht. ber. 2. p. 113.
18. *Æ. HIPPOCREPIDIS* (DC. fl. fr. 5. p. 96.) *hypophyllum, subiculo crasso effuso, pseudo-peridiis primò sparsis demum confertis albidis cupulæformibus, margine crasso subdentato, sporidiis flavidis.* — In Hippocrepide umbellatâ. — Hanc cum sequente conjungit cl. Linck.
19. *Æ. LIMONII* (Duby mss.) *hypophyllum et petiolare, maculis purpurascens nigrescentibus, pseudo-peridiis paucis in acervos irregularares glomeratis rufo-nigrescentibus, ore integro, sporidiis albis.* — In foliis *Statices Limonii* detexit cl. Requien. — *Æcidium Statices Desmaz. crypt. exs. n. 132 quantum ex descriptione videre licet, diversa videtur species.*
20. *Æ. MELEAGRIS* (Dub. mss.) *caulinum bifronsque, subiculo crasso convexo, pseudo-peridiis in acervos irregularares glomeratis rufo-flavescentibus confertis confluentibusque, ore integro rotundo aut oblongo, sporidiis concoloribus.* — In *Fritillariâ Meleagri.*
21. *Æ. OROBI* (Pers. syn. 210.) *maculis lutescentibus, subiculo subnullo, pseudo-peridiis paucis (6-10) in acervulos parvos orbiculares ovatosve congestis albidis urceolato-cupulatis ore denticulato reflexo, sporidiis albescensibus.* — In paginâ inferiore rariùs superiore *Orobi tuberosi, verni, Trifolii repentinis, Phaseoli, etc.* — DC. fl. fr. 5. p. 95.
22. *Æ. PHYLLIREÆ* (DC. fl. fr. 5. p. 96.) *maculis obliteratis, subiculo crasso irregulari nigricante, pseudo-peridiis numerosis confertis subimmersis ore subintegro inflexo, sporidiis aurantiacis.* — In foliis, nervis, petiolis ramulisque *Phyllireæ latifoliae* circa *Monspelium.*
23. *Æ. PEDICULARIS* (Leboschütz mem. de moscou, 5. p. 76. t. 5. f. 1.) *maculis obliteratis, caulinum petiolare bifronsque, subiculo incrassato, pseudo-peridiis dense et irregulariter congestis subimmersis fuscis cupulæformibus, margine tenui reflexo subdenticulato, sporidiis sordidè et pallidè aurantiacis.* — In *Pediculari palustri.* — *Cæoma Pedicularis* Schlecht. ber. 2. p. 113.
24. *Æ. MENTHA* (DC. enc. 8. p. 239; fl. fr. 5. p. 95.) *maculis fuscis, subiculo*

rubro-fusco plus minus incrassato effuso, pseudo-peridiis fusco-flavocantibus sparsis submersis subrotundis, aut aggregatis immersis subovalibus, margine sublacero, sporidiis ovali-oblongis flavo-aurantiacis. — In foliis et præserim caulinis *Menthæ sylvestris* in Jurasso (cl. Chaillet), agro Mimatisi (cl. Prost). — Cæoma *Menthatum* Linck.

25. AE. *REHENIS* (DC. enc. bot. 8. p. 239; fl. fr. 5. p. 94.) maculis fuscis, folio circa acervos lutescente, pseudo-peridiis in acervos subrotundos subcircinatimve laxè digestis albidis cylindraceis ore dentatis demùm basi circumscissis, sporidiis flavidis. — In pagina inferiore rariùs superiore *Silenes inflatae*, nutantis, etc. — Cæoma *Lychideatum* Linck?

26. AE. *PRENANTHIS* (Pers. syn. 208.) maculis suprà vix lutescentibus, pseudo-peridiis paucis (4-20) in acervulos irregulariter elongatos hypophyllos laxè congestis pallidè aurantiacis urceolato-depressis, ore crasso integro incurvo, sporidiis pallidè aurantiacis. — In *Chondrilla murali* et *Prenanthe purpurea*. — DC. fl. fr. 2. p. 244. — Cum AE. *Tussilaginis* subnomine AE. compositati conjungit cl. Linck.

27. AE. *LEUCANTHEMI* (DC. fl. fr. 5. p. 94.) bifrons, maculis fuscis, pseudo-peridiis in acervulos rotundos elongatosque subsparsos irregulariter seu circinatim digestis orbicularibus, ore albido crenulato basi demùm circumscisso, sporidiis flavis demùm fuscis. — In *Chrysanthemo Lencanthemo*. — Sequentis varietatem suspicatur cel. Candollii.

28. AE. *BARBAREÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 244.) bifrons, maculis rufescensibus, pseudo-peridiis in acervulos magnos irregulares aggregatis magnis cupulæformibus, ore albido crenulato, sporidiis aurantiacis. — In foliis et petiolis *Barbareæ vulgaris*. — Cæoma *Crociferatum* Linck sp. pl. 6. 2. p. 56. — Pseudo-peridia totam paginam sèpè occupant folium incurvantia.

29. AE. *URTICÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 243.) bifrons caulinumque, maculis suprà fuscescentibus, subiculo incrassato, pseudo-peridiis in acervulos rotundos elongatosque dense congestis flavis urceolato-campanulatis, ore primùm contracto demùm reflexo denticulato, sporidiis primò flavis demùm rufis. — In *Urtica dioica*. — Acervuli in foliis interdùm $\frac{1}{2}$, in caule 1-2-pollicares.

* * *Pseudo-peridiis plerumque circinatim digestis.*

30. AE. *CIRSI* (DC. fl. fr. 5. p. 94.) hypo- et rariùs epiphyllum, maculis suprà flavis, pseudo-peridiis primò annulatim dein orbiculatim confertis albidis cupulæformibus vix apertis ore subdentatis, sporidiis flavidis demùm fuscis. — Ad *Cirsium oleraceum* in Jurasso (cl. Chaillet), propè Parisios ex Chevall.

31. AE. *ALLII* (Pers. syn. p. 210.) hypophyllum, maculis suprà pallidis, pseudo-peridiis primò orbiculatim demùm subcircinatim digestis paucis haud contiguis albicantibus tubuloso-campanulatis, ore tenui reflexo lacinulato, sporidiis aurantiacis. — In *Allio Victoriali* circa Mimatem (cl. Prost), in *Allio ursino* circa Parisios ex cl. Chevall. — Cæoma *alliatum* Linck sp. pl. 6. 2. p. 43.

32. AE. *CONVALLARIEÆ* (Schum. sæll. 2. p. 224.) hypophyllum, maculis suprà flavo-viridescentibus granulosis, pseudo-peridiis in acervulos orbiculares annulatim circinatimve congestis pallidè flavis crateriformibus subimmersis ore denticulatis demùm integris, sporidiis albo-flavis. — In variis *Convallariis*. — Fl. dan. t. 1435. Cæoma *elegans* Schlecht. ber. 2. p. 115.

33. AE. *ARI* (Desmaz. catal. pl. om. p. 26.) hypo-rariùs epiphyllum, maculis obliteratis intescentibusve, pseudo-peridiis in acervulos suborbicularares annulatim circinatimve digestis fuscescentibus urceolato-cupulatis ore denticulatis demùm integris, sporidiis luteis. — In *Aro vulgari* circa Beauvais (cl. Graves), Lille ex cl. Desmaz.

34. AE. *NYMPHOIDIS* (DC. fl. fr. 2. p. 597; 5. p. 93.) epiphyllum, maculis obliteratis, pseudo-peridiis confluentibus immersis in zonas concentricas subregulares dispositis cupulæformibus, ore integro, sporidiis aurantiacis

demum confluentibus. — In Villarsiā nymphoide. — Cæoma Nymphoidatum Linck.

35. *Æ. CLEMATIDIS* (DC. fl. fr. 2. p. 243.) mænlis flavo-fuscis, subiculo crasso convexo, pseudo-peridiis in acervos in foliis orbiculares in petiolis ramulisque elongatos subcircinatim digestis albido-flavis cupulæformibus, ore subdente demum evanescente, sporidiis flavicantibus. — In foliis, petiolis, pedunculis fructibusque Clematidis Vitalbæ. — Cæoma Vitalbatum Linck.

36. *Æ. ARUNCI* (DC. fl. fr. 2. p. 243.) hypophyllum rarius petiolare, maculis supra fuscō-flavescentibus, pseudo-peridiis in acervos circinatim aut irregulariter digestis pallidè flavis demum cylindricis ore recto vix denticulato, sporidiis sphæricis flavo-aurantiacis. — In Spiræâ Aranco.

37. *Æ. ASPERIFOLII* (Pers. syn. 208.) hypophyllum, maculis fusco-luteis, pseudo-peridiis in acervos orbiculares circinatim elongatos irregulariter digestis flavis cyathiformibus, ore denticulato reflexo demum evanescente, sporidiis aurantiacis. — In foliis et caule variarum Borraginearum. — DC. fl. fr. 2. p. 242; 5. p. 93. A. Lycopsis Desv. Cæoma Borragineatum Linck.

38. *Æ. GERANII* (DC. fl. fr. 5. p. 93.) hypophyllum, maculis flavis purpureisque, pseudo-peridiis in acervos subrotundos i-regularesque circinatim irregulatiterque digestis urceolatis albido-flavis demum fuscescentibus, ore incurvo subdenticulato, sporidiis flavidis demum fuscis. — In variis Geraniorum speciebus. — Cæoma Geraniatum Linck.

39. *Æ. ZONALE* (de Brébisson in litt.) hypophyllum, maculis purpureo fuscō et luteo zonatis, pseudo-peridiis in acervos suborbicularis annulatim circinatimque dispositis pallidè luteis crateriformibus, ore subdenticulato subreflexo, sporidiis pallidè luteis. — In Inulâ dysentericâ propè Vire (cl. do Bréb.).

40. *Æ. GROSSULARIE* (DC. fl. fr. 5. p. 92.) hypophyllum, macula supra purpureo nigro-punctulata, subiculo crasso convexo, pseudo-peridiis in acervos subrotundos circinatim dense congestis campanulatis pallidè flavis demum fuscis, ore reflexo lacero, sporidiis albidis aut pallidè aurantiacis. — In Ribe Grossulariâ, petræo, etc. — Grev. crypt. fl. t. 62. *Æ. RUMICIS* Pers. Mong. et Nestl. cr. exs. n. 287.

41. *Æ. RUBELLUM* (DC. fl. fr. 2. p. 241.) hypophyllum, maculis purpureis, pseudo-peridiis in acervos orbiculares circinatim annulatimve digestis confertis pallidè flavis minutis vix cyathiformibus, ore minuto subdenticulato, sporidiis lutescentibus. — In variis Rumaticum et Rhei speciebus et in Centaureâ. — Hoffm. germ. 2. t. 2. f. 2. *Æ. RHEI* Sow. fung. t. 398. f. 6.

42. *Æ. LONICERÆ* (Dub. mss.) hypophyllum, maculis circa acervos albis supra fuscis, pseudo-peridiis in acervos suborbicularis subcircinatim digestis albissimis cupulæformibus compressis demum circumscisis, ore tenuissimo involuto vix denticulato, sporidiis fuscescentibus. — In Lonicera Xysteo, nigrâ, etc. — *Æ. Periclymeni* Schum. sell. 2. p. 225 non DC. Cæoma Xysteatum Linck sp. 6. 2. p. 53.

43. *Æ. ORCHIDEARUM* (Desmaz. cat. pl. om. p. 26.) hypophyllum, maculis supra pallidis aut pururascentibus, pseudo-peridiis in acervos orbiculares annulatim dispositis albido-rufescentibus subimmersis cupulæformibus, ore inflexo integrusculo, sporidiis aurantiacis. — In foliis Orchidearum variarum.

44. *Æ. TUSSILAGINIS* (Pers. syn. 209.) hypophyllum, maculis luteo-purpurascenscentibus, pseudo-peridiis in acervos rotundos dense circinatim congestis subimmersis campanulato-cupulatis albido-fuscis, ore brevissimo reflexo, sporidiis aurantiacis. — In Tussilagine Farfarâ. — DC. fl. fr. 2. p. 241.

* * * *Pseudo-peridiis distinctis nec glomeratim nec circinatim dispositis.*

45. *Æ. SALICORNIAE* (DC. fl. fr. 5. p. 92.) hypo- et epiphyllum, pseudo-peridiis solitariis sparsis seu subcircinatis brevibus albidis, margine erecto subden-

- tato, sporidiis flavidis. — Ad Salicorniam annuam in agro Syrtico (cl. Grateloup). — Cæoma Salicorniatum Linck.
46. *Æ. Chenopodiæ-fruticosi* (DC. fl. fr. 2. p. 92.) hypo- et epiphyllum, pseudo-peridiis per totam superficiem sparsis hinc indè consertis cylindraceis margine lacinulatis basi demùm circumscisis, sporidiis roseo-aurantiacis exsiccatione albidis. — In Chenopodio fruticoso ad littora propè Monspelium detexit cel. DC.
47. *Æ. Euphorbiarum* (DC. fl. fr. 5. p. 91.) hypo-rariūs epiphyllum, foliis supra decolorantibus, pseudo-peridiis totum folium occupantibus sparsis consertisque distinctis pallidè flavis cupulæformibus, margine crenulato reflexo, sporidiis aurantiacis demùm fuscis. — In Euphorbiâ Cyparissiâ, verrucosâ et sylvaticâ. — *Æ. Euphorbiæ* Pers. *Æ. Cyparissiæ* DC. fl. fr. 2. p. 249. *Æ. Euphorbiæ sylvaticæ* DC. fl. fr. 2. p. 241. Nees fung. t. 1. f. 3.
- Æ. Chamæsyces*, hypophyllum, folio subtus fusco-purpureo, pseudo-peridiis sparsis extus purpurascensibus intus margineque tenui reflexo albidis. — In Euphorbiâ Chamæsyce in agro Mimatensi (cl. Prost).
48. *Æ. Scrophulariæ* (DC. fl. fr. 5. p. 91.) maculis subblitteratis, pseudo-peridiis sparsis aut in acervos suborbicularis laxè dispositis albidis demùm fuscescentibus cupulatis complanatis, margine subinvoluto crasso subintegro, sporidiis albidis demùm fuscis. — Ad caules et paginam inferiorem foliorum Scrophulariæ aquaticaæ, in Jurasso (cl. Chaillet), propè Vire (cl. Lenormand), S. Scorodonæ propè Falaise (cl. de Brébisson).
49. *Æ. Periclymenti* (DC. fl. fr. 2. p. 597.) hypophyllum, maculis ex lutescenti et fuscescenti variis, subiculo crassiusculo, pseudo-peridiis numerosis in acervulos subrotundos aut effusos digestis subconicis, margine erecto denticulato, sporidiis aurantiacis. — In Lonicera Periclymeno. — *Æ. Xylostei* DC. fl. fr. 2. p. 240. Cæoma Lonicerae Schlecht. ber. 2. p. 115. C. Periclymenatum Linck sp. pl. 6. 2. p. 52.
50. *Æ. Violarum* (DC. fl. fr. 2. p. 240.) maculis supra subblitteratis lutescentibusve, pseudo-peridiis numerosis sparsis aut in acervulos magnos suborbicularis effusos approximatis cupulæformibus albido-flavescentibus, margine reflexo lacinulato, sporidiis aurantiacis demùm fuscis. — In petiolis et paginâ inferiore rariūs superiore foliorum Violæ tricoloris, odoratæ, calcaratæ, etc. — *Æ. Violæ* Schum. säll. Alb. et Schw. t. 10. f. 2. *Æ. confertum* ß DC. fl. fr. 2. p. 245.
- Æ. urceolatum*, pseudo-peridiis urceolato-concavis subimmersis flavo-rufescensibus, margine crasso erecto integro. — In Violâ odoratâ. — An *Æ. Violarum* status junior aut forsitan species propria?
51. *Æ. Falcariæ* (DC. fl. fr. 5. p. 91.) hypophyllum, foliis supra subdecoloratis, pseudo-peridiis numerosis totam superficiem occupantibus pallidè flavis cupulæformibus, margine lacinulato patulo, sporidiis albanticibus. — In Drepanophyllo Falcariâ, Bupleuro falcato aliisque Umbelliferis foliis simplicibus minusve dissectis. — *Æ. Siu-Falcariae* Pers. syn. 202.
52. *Æ. Cichoracearum* (DC. fl. fr. 2. p. 239.) maculis oblitteratis, pseudo-peridiis sparsis numerosis paginam et interdum plantam totam occupantibus albanticibus cupulæformibus, margine inæquali lacero lacinulis paucis latis subpatulis, sporidiis flavis. — In caule, foliis, receptaculis variorum Tragopogonum Podospermorum, Scorzonerarum, etc. — *Æ. Tragopogonis* Pers. syn. 211. Sow. fung. t. 397. f. 2. Cæoma Tragopogonatum Linck.
53. *Æ. Leucospermum* (DC. fl. fr. 2. p. 239; 5. p. 90.) hypophyllum, folio supra subflavescente, pseudo-peridiis sparsis totam paginam plerumque occupantibus cylindrico-cupulatis prominulis albidis, ore subinvoluto subdenticulato, sporidiis ovoideis albis. — In Anemone nemorosâ. — *Æ. Anemones* Pers. syn. p. 212. — Non solùm folia tota ferè occupat, sed ea quoque mutat et stirpem sterilem reddit.
54. *Æ. quadrifidum* (DC. fl. fr. 5. p. 90.) hypo-rariūs epiphyllum, folio supra

subfuscescente, pseudo-peridiis sparsis confertis totam paginam occupantibus urceolato-campanulatis albicantibus, ore 4-5-fido lobis revolutis latis demum circumscisso, sporidiis subglobosis fuscis. — In Anemone coronaria rarius A. nemorosa. — Desmaz. crypt. exs. n. 133. — Folia saepissime incrassantur et stirps sterilis fit.

55. *Æ. PUNCTATUM* (Pers. syn. 212.) hypophyllum, folio supra vix decolorato, pseudo-peridiis sparsis laxis totam paginam occupantibus urceolatis subimmersis albido-viridescentibus, ore constricto crasso integro, sporidiis fuscis. — In Anemone ranunculoide. — DC. fl. fr. 2. p. 239.

56. *Æ. RUBI* (DC. fl. fr. 2. p. 238.) hypophyllum, maculis obliteratis, pseudo-peridiis sparsis distantibus planinsculis, margine albido orbiculari subinvoluto prominulo integro vel subdentato, sporidiis flavo-fuscis. — In Rubo fruticoso.

57. *Æ. Adoxæ* (Graves in litt.) caulinum bifrousque, maculis nullis, pseudo-peridiis sparsis laxis pallidè luteis urceolato-cupulatis, margine erecto aut subpatulo lacinulato deciduo, sporidiis globosis pallidè luteis. — Ad Adoxam in Galliâ boreali.

58. *Æ. CYANI* (DC. fl. fr. 5. p. 90.) hypophyllum, maculis flavis, pseudo-peridiis sparsis numerosis confertis paginam totam saepè occupantibus albidis primò clausis dein poro dehiscentibus, margine demum reflexo dentibus 5-6 latis tandem obliteratis, sporidiis albidis demum rufis. — Ad Centauream Cyanum in Jurasso detexit cl. Chaillet, propè Parisios ex Chevall.

59. *Æ. VALERIANEARUM* (Dub. mss.) hypophyllum rarius caulinum, pseudo-peridiis sparsis plus minus confertis cupuliformibus fulvis, margine erecto denticulato, sporidiis flavidis. — In Valerianâ dioicâ et Valerianellis plurimis. — *Æ. Valerianellæ* Biv.? Uredo Fediarum Spreng.?

60. *Æ. PRIMULÆ* (DC. fl. fr. 5. p. 90.) hypophyllum, pseudo-peridiis sparsis numerosis crateriformibus albidis, margine erecto subdenticulato, sporidiis helveolis. — Ad Primulam integrifoliam in Pyrenæis observavit cl. DC. — Pseudo-peridia discum folii ferè obtegunt.

61. *Æ. CRESSÆ* (DC. fl. fr. 5. p. 89.) hypophyllum, pseudo-peridiis sparsis helveolis totam paginam occupantibus hemisphærico-cupulatis margine patulo denticulato demum circumscisso, sporidiis flavis demum fuscis. — Ad Cressam Creticam in littoribus Mediterranei.

62. *Æ. THESIR* (Desv. journ. bot. 2. p. 311.) caulinum hypo-rarius epiphyllum, pseudo-peridiis sparsis confertis cylindrico-cupulatis plus minus elongatis albis basi demum circumscisis, margine erecto dilatato subpatulo lacerato, sporidiis helvolis demum fuscis. — In Thesio linophyllo. — DC. fl. fr. 5. p. 89.

63. *Æ. EPILOBIÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 238.) hypo- et rarius epiphyllum, maculis lutescentibus, pseudo-peridiis sparsis flavescentibus laxis cupuliformibus, ore reflexo lacinulato demum caduco, sporidiis aurantiacis demum fuscis. — In variis Epilobiis. — Pseudo-peridia saepius ovalia.

Ordo CXXIV. MUCEDINEÆ *Ad. Brongn. class. champ. p. 39.*
et dict. class. t. 11. p. 270 excl. trib. V. — Hyphomycetes
Linck sp. pl. 6. pars 1. excl. nonnullis gen. — Conyomycetum
ordo 2 et 3, Byssacearum trib. 3 et 4. Fries syst. orb. veg.

Filamenta tubulosa aut apice capitata plus minus elongata simplicia ramosave continua aut septata, sterilia aut sporulas nudas simplices gerentia vel intus foventia et tunc sporidia 1-aut rarius oö-spora exhibitia. — In vegetabilibus mortuis rarius vivis aut substantiis putrescentibus nascentes liberæ rarius erumpentes.

Trib. I. PHYLLERIEÆ *Ad. Brongn. ll. cc.*

Filamenta simplicia continua in foliis vivis nascentia intus sporulas foventia.

I. ? CRONARTIUM *Fries obs. myc. 1. p. 220. Kunze et Schm. myc. heft. 2. p. 98.*
t. 2. f. 7. — Erinei sp. Willd. Funcke.

Filamenta (pseudo-peridia?) rigida colorata simplicia non septata cylindrica apice subattenuata basi in tuberculum dilatata. — Gregarium in foliis vivis parasiticum.

i. C. VINCETOXI (Fic. et Schub. fl. dresd. p. 282.) filamentis elongatis incurvatis dilute fuscis, tuberculo minimo. — Ad folia Cynanchi Vincetoxici. — C. asclepiadeum Fries l. c. Erineum asclepiadeum Funcke crypt. exs. n. 145. Cœoma cronartites Linck sp. pl. 6. 2. p. 65. — Genus forsitan inter Uredineas ut vult cel. Kunze referendum sed ab Aecidio tamen diversum.

II. ERINEUM Pers. syn. 699. DC. fl. fr. 2. p. 73. Greville in edinb. phil. journ. vol. 6. p. 71. Kunze in myc. heft. 2. p. 133. Linck sp. pl. 6. 1. p. 146. — Phylleterium Taphria et Erineum Fries.

Filamenta (peridia?) subdiaphana cylindrica vel compressa clavata aut turbinata subsimplicia in cespitos latos aggregata. — Fungilli in foliis vivis parasitici. — Sporulas nullas ait cl. Kunze, minutissimas aliquando vidisse testatur cel. Greville. — Morbosos esse plantarum pilos (Phylleria), aut cellulas intumescentes et deformatas (Grumarias), melliginem (Taphriam nunc Taphrinam), affirmat cel. Fries syst. orb. veg. 1. p. 315.

Sect. I. PHYLLERIUM *Fries obs. myc. 1. p. 218.*

Filamenta simplicia filiformia aut æquata contorta.

1. E. RUBI (Pers. myc. 1. p. 2.) cespitus effossis hand immersis, filamentis subintricatis rectis cylindricis ad apicem attenuatis ex albo griseo-viridulis. — In foliis Ruborum amphigenum et saepius hypogenum. — Phyll. Rubi Fries obs. 2. p. 371.
2. E. TILIACEUM (Pers. obs. 1. p. 25.) cespitus saepè limitatis confluentibus immersis pulvinatis, filamentis densis intricatis apice incurvatis obtusis pallidis plus minus fuscescensibus. — In foliis Tiliarum amphigenum plerumque hypophyllum. — DC. fl. fr. 2. p. 74. Nees fung. t. 5. f. 62. Grev. in edinb.

910 ACOTYL. & RU CELLULARES. ERINEUM.

phil. journ. 6. p. 74. t. 3. f. 3. Ph. tiliaceum Fries. — Filamenta teretia apice torta diaphana.

3. E. JUGLANDIS (DC. fl. fr. 5. p. 15.) cespitibus limitatis subquadratis profunde immersis, filamentis densis intricatis suberectis tenuibus cylindricis apice attenuatis albidis. — Ad folia Juglandis hypogenum. — Grev. crypt. fl. t. 263. f. 2. E. subulatum Greville edinb. phil. l. c. t. 2. f. 4. Ph. juglandinum Fries. — Filamenta varie flexa sicca flavescensia.
4. E. ILCINUM (DC. fl. fr. 5. p. 14.) cespitibus effusis subconfluentibus haud immersis, filamentis intricatis cylindricis flexuosis apice subattenuatis primò albidis demùm ex rufo-spadiceis. — In foliis Quercus Ilicis in prov. australibus hypogenum rarius epigenum. — Grev. in edinb. l. c. t. 2. f. 5. Phyll. drynum Schlecht. — Filamenta juniora subclavata demùm a basi ad apicem seu sim de crescentia.
5. E. PYRINUM (Pers. disp. t. 3. f. 2; myc. 1. p. 4.) cespitibus effusis limitatisque crassiusculis haud immersis, filamentis primò pallidis sen rubellis demùm spadiceo-ferrugineis laxè intricatis compressis linearibus varie flexis apice obtusis aut truncatis. — Ad folia et petiolas Pyri, Mali, Pruni spinosæ, amphigenum rarius epigenum. — Greville crypt. fl. 1. t. 22. E. Malinum DC. enc. bot. 8. p. 217. Ph. pyrinum Fries. — Filamenta longiuscula dia phana.
6. E. ACERINUM (Pers. disp. 48; syn. 700. non DC. fl. nec enc.) cespitibus effusis crassis subimmersis, filamentis primò albo-cinereis demùm rubiginosis densè intricatis cylindricis apice subaduncis. — Ad folia Aceris platanoidis et pseudo-Platani amphigenum. — Kunze myc. heft. 2. p. 163. E. platanoidis Pers. myc. 1. p. 5. Ph. Acerinum Fries.
7. E. PURPUREUM (DC. enc. meth. 8. p. 218; fl. fr. 5. p. 15.) cespitibus limitatis, filamentis primò ex albido-violaceis demùm purpurascensibus intricatis cylindricis varie tortis apice obtusis attenuatis. — In foliis Betulae albae epigenum. — E. semydophilum Linck sp. 6. 1. p. 150. Ph. semydophilum Schlecht. — Cespituli non valde elevati parvi gregarii; filam. diaphana.
8. E. PSEUDO-PLATANI (Pers. myc. 1. p. 5.) cespitibus limitatis profundè immersis, filamentis primò albis demùm spadiceo-unbrinis intertextis flexuosis clavato-cylindricis. — In foliis præsertim dejectis Aceris pseudo-Platani. — Kunze myc. heft. 2. p. 165. E. Acerinum DC. in enc. meth. 8. p. 217 pro parte. Grev. in edinb. l. c. t. 2. f. 8. (junius). Moog. et Nestl. vog. n. 198. — Cespituli 2-3 lin. lati; filam. juniora sèpè capitata primùm albo-lutea dein aurea demùm ferruginea.
9. E. VITIS (DC. fl. fr. 2. p. 74.) cespitibus effusis subconfluentibus crassius culis profundè immersis, filamentis primò ex albido-rubellis demùm spadiceis intricatis cylindricis flaccidis simplicibus subramosisque apice obtusis. — In foliis Vitis hypogenum rarius epigenum. — Grev. edinb. l. c. t. 2. f. 3. Phyll. Vitis Fries. — Filam. longiuscula diaphana interdùm hinc indè consticta ferè septata aut simplicia aut irregulariter ramosa.
10. E. ATRIPLICINUM (Nestl. exs. Linck sp. pl. 6. 1. p. 152.) cespitibus subrotundis immersis limitatis, filamentis septatis æquatis obtusis albidis. — Hypogenum in foliis Atriplicis hortensis. — Filam. diaphana rarius ramosa.
11. E. POTERII (Req. in herb. DC.) cespitibus effusis hifrontibus subconfluentibus crassis non immersis, filamentis ex luteo-fulvis intricatis filiformibus simplicissimis cylindricis non septatis subulatis. — In Poterio Sanguisorbæ circa Avenionem (cl. Requier). — Filam. longiuscula diaphana.
12. E. MENTHÆ (Requier in herb. DC.) cespitibus latè effusis confluentibus crassis non immersis, filamentis ex albo-lutescentibus intricatis filiformibus simplicibus septatis mox dilatatis mox constrictis subulatis. — Ad Menthæ circa Arles reperiit cl. Requier. — Plantam ferè omnem invadens.
13. E? PETROSELINI (Lenormand in litt.) cespitibus latè effusis haud immersis laxis, filamentis laxis cylindricis ramosissimis ramis divaricatis aut contractis

apice subincerassatis albidis. — In foliis Petroselini hypogenum circà Vire det. cl. Lenorm. — Foliū in alterā paginā suscens sed macula non limitata. Valdè singularis species!

14. E. TORTUOSUM (Grev. in edinb. phil. journ. v. 6. t. 2. f. 2; crypt. fl. t. 94.) cespitibus effusis irregularibus subimmersis, filamentis cylindricis diaphanis tortuosis apicibus rotundatis albo-ferrugineis. — In foliis Betulæ amphigenum propè Vire (cl. Lenormand). — Filam. longa tenuia intricata raro apice parùm incrassata.
15. E. SORBEUM (Pers. myc. 1. p. 4. excl. syn. Fries.) cespitibus subeffusis hand immersis, filamentis intricatis cylindricis apice subincurvis obtusis primò rubellis demùm fulvo-ferrugineis. — In foliis Sorbi Aucupariæ amphigenum propè Beauvais (cl. Graves). — E. Sorbi Kunze Grev. crypt. fl. t. 263. f. 1. — Filam. laxè intricata.
16. E. RHAMNI (Kunze in myc. heft. 2. p. 172.) cespitibus effusis tenuibus hand immersis, filamentis laxis compressis curvatis apice obtusis. — Hypogenum in foliis Rhamni cathartici in Helvetiâ Galliæ finitimâ et probabiliter in Galliâ orientali. — Filam. diaphana.
17. E. MESPILINUM (DC. fl. fr. 5. p. 13.) cespitibus ovalibus effusis immersis, filamentis compressis membranaceis sublucidis e rufesceni-olivaceis. — In Mespilo Germanicâ hypophyllum.

Sect. II. GRUMARIA Kunze myc. heft. 2. p. 133 et 137.

Filamenta (pleraque) capitata aut clavata vertice sèpè impressa.

18. E. ROSEUM (Schult. starg. 506.) cespitibus effusis hand immersis pulvinatis grumosis, filamentis clavatis apice sèpè truncatis aut depressis rariis subemarginatis primò roseis demùm fusco-purpureis. — In foliis Betulæ albæ et pubescentis epigenum. — E. Betulæ DC. syn. gall. p. 15; fl. fr. 5. p. 14. Grev. in edinb. l. c. t. 3. f. 1; crypt. fl. t. 21. E. purpureum Fries obs. — Filam. stipite tenui brevi.
19. E. BETULINUM (Schum. sèll. 2. p. 445 non DC.) cespitibus limitatis pulvinatis subimmersis, filam. clavatis turbinatis infundibuliformibusque interdum subbicornibus primò albidis demùm subferrugineis, stipite cylindrico crassiusculo longo. — In Betulâ albâ hypophyllum. — Grev. in edinb. phil. journ. l. c. t. 3. f. 2. Rubigo betulina Linck.
20. E. PLATANOIDEUM (Fries obs. 1. p. 224.) cespitibus latissimè effusis tenuibus hand immersis, filamentis primò pallidis tum intensius flavis denique rubiginosis globoso-cyathiformibus cupulatisve, stipite brevissimo. — In foliis Aceris platanoidis hypogenum. — E. curtum Grev. l. c. t. 3. f. 14.
21. E. POPULINUM (Pers. obs. 1. p. 100; myc. 1. p. 7.) cespitibus limitatis conglomeratisque immersis, filamentis minutis crassis irregularibus apice subramosis erosis primò pallidis dein rufescensibus demùm sordide spadiceis, stipite brevi crasso. — In foliis Populi præsertim P. tremulæ hypogenum nec non amphigenum. — DC. fl. fr. 5. p. 14. Moug. et Nestl. exs. n. 100. Grev. in edinb. l. c. t. 3. f. 11; crypt. fl. t. 250. f. 2. — Cespites parvi subrotundi.
22. E. ALNINUM (Pers. syn. 701.) cespitibus subeffusis sèpè confluentibus crassiusculis subimmersis, filamentis simplicibus ramosisve ramis brevibus apice tuberculis capituliformibus terminatis primò ex albo-flavescentibus demùm fulvo-ferrugineis, stipite tenui longiusculo. — In foliis Alni glutinosæ hypogenum. — DC. fl. fr. 2. p. 592. Moug. et Nestl. vog. exs. n. 99. Greville in edinb. phil. journ. 6. t. 2. f. 7; crypt. fl. t. 157. f. 2. Macror ferruginens Bull. t. 514. f. 12. excl. syn.
23. E. FAGINEUM (Pers. obs. 2. p. 102.) cespitibus limitatis granulosis subimmersis, filamentis densis turbinato-aut pyriformi-clavatis albidis demùm ferrugineo-spadiceis purpureisve, stipite brevi crassiusculo. — In foliis Fagi sylvaticæ hypogenum. — DC. fl. fr. 2. p. 592. Greville in edinb. t. 3. f. 70;

912 ACOTYL. seu CELLULARES.

- crypt. fl. t. 250. f. 1. E. lactenum Fries obs. Rubigo saginea Nees fung. p. 64.
f. 63. — Cespites subrotundi aut elliptici sèpè confluentes.
24. E. NEAVISEQUUM (Kunze fung. exs. n. 175.) cespitibus linearibus parallelis nervisequis haud immersis gramoso-farinaceis, filamentis clavatis pallide roseis exsiccatis sordidè luteis. — In foliis junioribus Fagi sylvaticæ. — Linck. sp. pl. 6. 1. p. 159.
25. E. PYRACANTHÆ (DC. fl. fr. 5. p. 13.) cespitibus rotundis demùm confluentibus effusis, filamentis purpureis difformibus capitatis dense aggregatis. — In foliis Cratægi Pyracanthæ in Galliâ meridiouali detexit cl. DC.
26. E. AMYGDALI (Duby mss.) cespitibus rotundis effusisque pulvinatis haud immersis, filamentis densis oblongo-clavatis aut pyriformi-clavatis primò pallidis demùm intense purpureis, stipite tenui longiusculo. — In foliis Amygdali hypogenum rarius epigenum propè Mimatem detexit cel. Prost.
27. E. CLANDESTINUM (Grev. in edinb. p. 76. t. 2. f. 8.) cespitibus sublinearibus effusisque confluentibus plerumque margine folii involuto obtectis, filamentis laxis brevibus breviter ovato-capitatis clavatisque primò albo-roseis demùm dilutè ferrugineis. — In foliis Cratægi Oxyacanthæ hypogenum. — Grev. crypt. fl. t. 141. f. 2. E. Oxyacanthæ Pers. myc. eur. 1. p. 7.
28. E. PURPURASCENS (Gærtn. in Röhl. deutsch. 3. p. 357.) cespitibus latè effusis subimmersis, filamentis infundibuliformibus primò albidos demùm purpurascenti-tabacinis, margine erecto aut reflexo, stipite crasso brevi. — In foliis vivis posteà delapsis Aceris campestris et platanoidis. — Kunze myc. heft. 2. p. 137. E. Acerinum Schum. DC. fl. fr. 2. p. 73 non Pers. E. agariciforme Grev. in edinb. l. c. t. 13. f. 14. Rubigo acerina Linck obs. 1. f. 36.

Sect. III. TAPHRIA Fries obs. myc. 1. p. 217. Kunze myc. heft. 2.
p. 133.

Filamenta minutissima ovoidea granuliformia.

29. E. GRISEUM (Pers. myc. eur. 1. p. 8.) cespitibus latè effusis impressis sericeis, filamentis minutissimis numerosissimis globoso-clavatis purpurascenti-griseis. — Ad folia Quercùs hypogenum. — Grev. crypt. fl. t. 141. f. 1. E. minutissimum Grev. in edinb. l. c. t. 3. f. 15.
30. E. AUREUM (Pers. syn. 700; myc. eur. 1. p. 8.) cespitibus latè impressis effusis sericeis aureis, filamentis flavis simplicibus minutissimis ovato-clavatis. — In foliis Populi hypo-rariüs epigenum. — DC. syn. gall. 15; fl. fr. 5. p. 14. Grev. in edinb. phil. journ. 6. t. 3. f. 15; crypt. fl. t. 33. Taphria populina Fries obs. 2. t. 8. f. 3. Desmaz. cr. exs. n. 301.
- β. cinereum (Pers. myc. 8.) cespitulis minoribus cinerascentibus.

Trib. II. MUCOREÆ Ad. Brongn. l. c.

Filamenta pellucida septata fugacia apice in peridiolum vesiculatum membranaceum sporulas includens capitata.

III. PILOBOLUS Tode mech. 1. p. 41. DC. fl. fr. 2. p. 271. Linck sp. pl. 6. 1. p. 95. Fries syst. myc. 2. p. 308.

Filamenta erecta sparsa simplicia continua rorida supernè ventricoso-bullata coronata peridiolo globoso membranaceo demùm elasticè explosò; sporulæ distinctæ globosæ. — Fungilli gregarii fugaces fimicolæ. — De hoc genere aliter censem cl. Fries qui hoc inter Angiogastres carpolobos amandat et filamenta ut uterus (volvam) stipitiformem tubulosum describit.

1. P. CRYSTALLINUS (Tode l. c.) filamentis fluorescentibus supernè obovatis, peridiolo hemisphaericò nigro. — In fimo equino, vere, aut. — Pers. obs. myc.

t. t. 4. f. 9. 10. DC. l. c. *Mucor urceolatus* Dick. veg. cr. 1. t. 3. f. 1. Bull. champ. t. 480. f. 1.

IV. STILBUM Tode meck. 1. p. 11. Pers. syn. 680; myc. eur. 1. p. 347. DC. fl. fr. 2. p. 593.

Filamenta erecta carnosa æqualia solida, capitulo rotundo molli gelatinoso nudo diffluente ex sporulis minutissimis farcto terminata. — Fungilli gregarii fugaces locorum humidorum incolæ.

1. S. BYSSISEDUM (Pers. myc. eur. 1. p. 347.) congestum majuscum, capitulo subrotundo pallescente, stipibus basi byssoidæ connexis. — Ad ligna Pineæ mucida in Vogesis ex cl. Pers. — Junius totum albidum et subuliforme; stipes crassiusculus albidus.
2. S. RIGIDUM (Pers. in Ust. ann. bot. 1. p. 32. t. 2. f. 2.) gregarium, stipite subulato rigido nigro persistente, capitulo primùm aquoso lacteo, demùm compacto griseo deciduo. — Ad truncos putridos, vere. — DC. fl. fr. 2. p. 593.
3. S. NIGRUM (Schrad. ex Schleich. cent. exs. n. 99.) totum nigrum durum, capitulo etiam maturo persistente. — Ad corticem Juniperi.
4. S. TURBINATUM (Tode meck. p. 12. t. 2. f. 20.) capitulo turbinato ochraceo, stipite cylindrico gelatinoso superne albo pulverulento inferne glabro subpellucido dilutè ochraceo. — Ad truncos Fagineos putridos, circa Parisios ex cl. Chevall., vere. — Pers. syn. 685. — Fungillus delicatissimus lin. circiter longus.
5. S. VULGARE (Tode meck. 1. t. 2. f. 16.) gregarium, capitulo globoso albido demùn lutescente, stipite cylindrico crassiusculo sursùm subattenuato albido-ochraceo. — Ad herbas mortuas frequens, aut. — DC. fl. fr. 5. p. 16. Dittm. fung. germ. t. 58. — Plerumque minutissimum et nudo oculo vix perspicendum; capitulum pulvisculo albo conspersum.
6. S. CITRINUM (Pers. ic. pict. 4. t. 22. f. 1; syn. 681.) subfasciculare molle glabrum pallescenti-citrinum, capitulo globoso. — Ad truncos putridos arborum propè Beauvais ex cl. Graves. — Lin. 2 longum; stipites nunc liberi nunc subcoaliti.
7. S. TOMENTOSUM (Schrad. journ. bot. 2. p. 65. t. 3. f. 2.) cespitosum subfimbratum glabrum, capitulo globoso albo passim citrino, stipite glandulosò subieulo byssideo saepius insidente. — Ad muscos aut truncos super Trichias corruptas, aest. post pluvias. — DC. fl. fr. 5. p. 15. Grev. crypt. fl. t. 281. S. parasiticum Dittm. fung. t. 46. Pers. myc. eur. 1. p. 351. — Vix semi-lineam altum.
8. S. MYCOPHILUM (Pers. myc. eur. 1. p. 351.) sparsum album subpellucidum, stipite cylindrico subrigido, capitulo ex rotundo-subturbanato. — In Agaricis exsiccatis putrescentibus, propè Beauvais ex cl. Graves, sero aut. — Semi-lineam aut ultra longum.
9. S. VILLOSUM (Merat fl. par. ed. II. t. 1. p. 18.) confertum, stipite crassiusculo persistente lutescente apice quasi tomentoso, capitulo subrotundo-turbanato diaphano albido evanescente. — Ad finum Capreoli et Cervi in sylvis circa Parisios. — S. simetarium Pers. myc. eur. 1. p. 352. *Mucor villosus* Bull. champ. t. 504. f. 15.
10. S. PILIFORME (Pers. syn. 581.) confertum subfasciculare minutum, stipite tenuissimo subulato nigro persistente, capitulo subrotundo aquoso albido fugacissimo. — Ad herbas et truncos mortuos, vere. — DC. fl. fr. 5. p. 16. — Vix semi-lineam altum.
11. S. PELLUCIDUM (Schrad. journ. bot. 2. p. 65.) confertum pellucidum paleaceum, stipite subulato, capitulo subrotundo. — Ad ramulos demortuos et Agaricos putrescentes. — Stipes subrigidus vix semilineam altus.

914 ACOTYL. seu CELLULARES.

V. MUCOR Linck sp. pl. 6. p. 80. Fries syst. orb. veg. 1. p. 177. — Ascophora Tode. — Mucoris sp. Pers. DC.

Filamenta sterilia decumbentia sæpè lanæformia; filamenta fertilia erecta septata simplicia aut ramosa terminata peridiolis solitariis subglobosis rumpentibus aut persistentibus; sporulæ simplices globosæ.

1. M. RIMETARIUS (Linck obs. 1. p. 29.) lanæformis, filamentis albis fertilibus ramosissimis, peridiolis globosis indurantibus deplanatis subtùs umbilicatis nigris. — In stercore vaccino. — Cespites lati 1-2 lin. alti lanam candidissimam referentes.
2. M. TRUNCORUM (Linck obs. 1. p. 28.) lanæformis, filamentis albis fertilibus ramosis, peridiolis globosis indurantibus deplanatis subtùs umbilicatis fuscis. — In truncis putrescentibus. — Cespites sat magni, filamentis laxè dispositis.
3. M. RAMOSUS (Bull. champ. t. 480. f. 3.) lanæformis, filamentis albis fertilibus ramosis, peridiolis globosis primò albidis dein rufo-fuscescentibus nigrisve. — In fungis putrescentibus aliisque corporibus putridis. — DC. fl. fr. 2. p. 248. M. rufus Pers. Linck. — Cespites sat expansi; oculo nudo peridiola et filamentorum divisiones conspicuantur.
4. M. JUGLANDIS (Linck. l. c.) lanæformis, filamentis albis fertilibus ramosis brevibus, peridiolis globosis flavis demùm verrucosis. — In nucibus Juglandum rancidis. — Cespites haud longè effusi breves vix lin. alti.
5. M. FLAVIDUS (Pers. syn. 199.) lanæformis, filam. albis fertilibus ramosis, peridiolis globosis lutescentibus dein griseis. — In Fungis putrescentibus propè Parisios ex cl. Chevall. — Pers. obs. t. 6. f. 5. Nees fung. f. 76. — Schmied. ic. pl. 3. t. 52. f. 2. — Fungos superne nonnunquam obtegens.
6. M. FODINUS (Linck sp. pl. 6. 1. p. 84.) stupæformis effusus crassissimus, filamentis fuscis fertilibus vix ramosis, peridiolis concoloribus. — In cellis et cryptis muris adhærens. — Byssus fodinus DC. fl. fr. 5. p. 10. Racodium fodinum Pers. myc. 1. p. 68. Dematium fodinum Chevall. — Tomentum molle fuscum infrà album.
7. M. MUCEDO (Bolt. fung. t. 3. t. 132. f. 1. h. v. l. non Pers.) effusus, filamentis intricatis albis fertilibus simplicibus, peridiolis sporulisque globosis concoloribus demùm nigrescentibus. — In variis corporibus putrescentibus v. g. pane cocto. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 85. — Corpora putrescentia lana crassâ gossypinâ tegit, filamentis fertilibus eminentibus.
8. M. ASCOPHORUS (Linck sp. 6. 1. p. 85.) lanæformis, filamentis albis fertilibus erectis simplicibus, peridiolo demùm nigrescente deplanato convexo. — In variis corporibus putrescentibus. — M. Mucedo Pers. DC. fl. fr. 2. p. 240. M. sphærocephalus Bull. champ. t. 480. f. 2. Ascophora mucedo Tode meck. 1. t. 3. f. 22. Nees fung. f. 80. Grev. crypt. fl. t. 269. — Genus Ascophoram denuo restituit cel. Greyille et ad hoc speciem præcedentem refert; affirmat peridiola vacua esse et sporidia non continere, sed sporidia sporalis globosis minimis fæta in capitulo inflato externe coacervata esse.
9. M. HYDROPHORA (Pers. syn. 202.) filamentis sterilibus obsoletis, fertilibus simplicibus aggregatis rigidiusculis lutescentibus, peridiolo crystallino. — In ramulis dejectis et exsiccatis præcipue Fagi. — Nees fung. 2. f. 77. M. minimus Linck. Hydrophora minima Tode meck. 2. t. 8. f. 65. — Nudo oculo vix conspiciendus.
10. M. AQUOSUS (Mart. erlang. 362.) filamentis sterilibus obsoletis, fertilibus simplicibus aggregatis albis, peridiolis globosis aquosis pallidè ochraceis. — Ad corticem lignorum in aquâ demersorum circa Lugdunum ex cl. Balbis fl. lugd. 2. p. 227. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 88. — Filamentorum pars inferior aquæ immersa, peridiola verò emersa.
11. M. CANINUS (Pers. syn. 201; obs. myc. 1. t. 6. f. 3. 4.) filam. sterilibus obsoletis, fertilibus albis erectis simplicibus, peridiolis minutis lutescenti-

bus. — In stercore canino tempore hyemali pluvioso. — Nees fung. f. 79.
Grev. crypt. fl. t. 305. — Filamenta longa laxa.

VI. SPORODINIA Linck sp. pl. 6. t. p. 94. — Monilia sp. Pers.

Filamenta decumbentia effusa, fertilia erecta apice clavata et peridio collapso sporas sustinentia. — Fungilli in fungis putrescentibus viventes.

1. S. GRANDIS (Linck l. c.) filamentis laxis flavo-fuscis fertilibus ramosis, ramis divaricatis apice clavatis. — In fungis putrescentibus Galliae ex cl. Pers. — Monilia spongiosa Pers. myc. 1. p. 30. Aspergillus globosus Linck obs. 1. f. 15. — Cespites crassi diu persistentes, filamentis crassioribus quam in plerisque Mucedineis.

VII. THAMNIDIUM Linck obs. 1. p. 45. Nees fung. p. 81. Ad. Brongn. cl. champ. p. 43. t. 2. f. 1.

Filamenta sterilia obsoleta; filamenta fertilia sparsa septata simplicia erecta apice peridiolum sphæricum sporulis factum gerentia, ad basin vagè ramosa ramulis sporidiis solitariis terminatis.

1. T. ELEGANS (Linck l. c.) filamentis candidis supernè simplicissimis, peridiolis globosis concoloribus. — In collâ exsiccatâ et subcoruptâ. — Nees fung. f. 75. — Filamenta 2-3 lin. alta infernè ramosissima, ramulis brevibus divaricatis.

VIII. ASPERGILLUS Mich. gen. p. 212. Linck obs. 1. p. 14. Fries syst. orb. veg. 1. p. 133. — Monilia Pers. DC.

Filamenta septata libera sterilia decumbentia, fertilia erectâ simplicia ramosa aut apice divisa clavata; sporulae simplices globosæ ex apibus erumpentes seriatæ. — Fungilli minutissimi in variis corporibus putrescentibus siccis viventes.

1. A. CANDIDUS (Linck obs. 1. p. 14.) sparsus aut cespitosus tenuis candidus, filamentis fertilibus simplicibus, peridiolis globosis. — In plantis siccis loco humido depositis, fungis exsiccatis, etc. — Monilia candida Pers. syn. 692. — Mich. gen. t. 91. f. 2.
2. A. MYCOBANCHE (Linck sp. pl. 6. 1. p. 65.) crassus candidus, filamentis densis fertilibus simplicibus parùm elevatis, peridiolis globosis. — In fungis putridis præsertim Pezizis et Clavariis majoribus. — Racodium? Mycobanche Pers. myc. 1. p. 74. — Séminélinea ferè crassus.
3. A. OOSPERMUS (Linck obs. 2. p. 37.) crassus albus, filamentis densis fertilibus simplicibus parùm elevatis, peridiolis ovalibus. — In pomis putridis.
4. A. FLAVUS (Linck obs. 1. p. 14.) tenuis, filamentis albis fertilibus simplicibus demùm flavis, peridiolis globosis. — In plantis siccis herbariorum, sub cortice secedente truncorum. — Nees fung. t. 4. f. 60. Monilia flava Pers.
5. A. LANEUS (Linck sp. pl. 6. 1. p. 66.) lanæformis-luteo-albus, filamentis fertilibus ramosis, peridiolis globosis lutescentibus. — In fungis putridis circa Parisios ex Chevall. — Cespites magni, filamentis ultrà lin. altis.
6. A. GLAUCUS (Linck obs. 1. p. 14 et l. c.) tenuis, filamentis albis fertilibus simplicibus, peridiolis globosis demùm glaucis. — In variis corporibus putrescentibus siccis. — Monilia glauca Pers. DC. fl. fr. 2. p. 69. Macror Aspergillus Bull. champ. t. 504. f. 10. — Mich. gen. t. 91. f. 1.
7. A. VIRENS (Linck ll. cc.) lanæformis, filamentis densis albis fertilibus ramosis, peridiolis globosis demùm virescentibus. — In corporibus putrescentibus v. g. sebo Parisiis ex Chevall. — Cespites latè extensi, filamentis densis intricatis.

916 ACOTYL. seu CELLULARES.

8. *A. roseus* (Linck l. c.) tenuis, filamentis albis fertilibus simplicibus, peridiolis globosis roseis. — In tapetibus, charta, linteo, humidis inclusis. — *Monilia rosea* Pers. syn. 697. Batsch. el. t. 12. f. 58. *Botrytis glomerulosa* DC. fl. fr. 2. p. 71. *Mucor glomerulosus* Bull. champ. t. 504. f. 3.

IX. EUROTIUM Linck obs. 1. p. 29. Nees fung. p. 95. f. 97. — *Mucoris* sp. DC.

Filamenta decumbentia ramosa septata effusa raro oblitterata; peridiola (vesiculæ) solitaria sessilia sphærica adnata dehiscentia; sporulae agglomeratae.

1. *E. HERBARIORUM* (Linck obs. 1. f. 44.) gregarium punctiforme, filamentis albidis ramosis, peridiolis flavis. — In vegetabilibus siccis putrescentibus, frequens in herbariis loco humido depositis. — Nees fung. f. 97. Grev. crypt. fl. t. 164. f. 1. *Mucor herbariorum* Wigg. DC. fl. fr. 5. p. 100. — Tomentum laxum lanæforme varie serpens et latas subinde plagas occupans.

Trib. III. BOTRYTIDEÆ. — Mucedineæ veræ Ad. Brongn. l. c. — Mucedines et Mucorinorum trib. 3 et 4. Fries syst. orb. 1. p. 177.

Filamenta distincta aut laxè intertexta pellucida fugacia sæpè septata; sporidia inspersa aut ex ultimis articulis filamentorum demùm secedentibus formata.

X. STACHYLIIDIUM Linck obs. 1. p. 13; sp. pl. 6. 1. p. 77. Ad. Brongn. cl. champ. 46. Fries syst. orb. veg. 1. p. 178. — *Botrytidis* sp. Pers.

Filamenta sterilia decumbentia, fertilia erecta tota septata ramosa ramis (sporidiis Linck) lateralibus oppositis aut verticillatis oblongis, sporidiis minimis globulosis (granulis Linck) demùm adspersis. — Fungilli fugaces minutissimi terram aut caules exsiccatos herbarum incolentes.

1. *S. TERRESTRE* (Linck obs. 1. p. 73. f. 21.) tenui album, filamentis ramosis fertilibus albis breviter ramosis ramulis verticillatis oblongis, sporidiis albis. — Ad terram humidam in cellis, ericetis, vaporariis. — *Botrytis terrestris* Pers. myc. 1. p. 38. — Instar telæ araneæ terram latè obducens, filamentis versùs apicem ramosis.

2. *S. BICOLOR* (Linck obs. 1. p. 13.) crassiusculum, filamentis complicatis densis griseis fertilibus ad apicem ramosis ramis oppositis verticillatisque, sporidiis albis. — Ad caules exsiccatos herbárum præsertim Rhei undulati in hortis. — *Botrytis bicolor* Pers. — Longè latèque caules investiens.

XI. VERTICILLIUM Nees fung. p. 57. Linck sp. pl. 6. 1. p. 75. Ad. Brongn. cl. champ. p. 46. Fries syst. orb. veg. 1. p. 178. — *Botrytidis* sp. Pers.

Filamenta sterilia decumbentia sæpè obsoleta; fertilia erecta tota septata ramosa ramis verticillatis, sporidia simplicia globosa solitaria ramulos terminantia. — Fungilli minutissimi in caulibus exsiccatis plantarum nascentes.

3. *V. TENERUM* (Nees fung. p. 57. f. 55.) tenerum, filamentis fertilibus aggregatis rubro-griseis, ramis ternis patentibus, sporidiis globosis ternis. — In caulibus plantarum exsiccatis v. g. Alceæ roseæ, sero aut. — *Botrytis tenera* Pers. myc. 1. p. 38.

XII. SPONDYLOCLADIUM Mart. erlang. p. 354. Linck sp. pl. 6. 1. p. 58. — Dematii sp. Pers.

Filamenta erecta rigida simplicia aut subramosa opaca submoniliformia ; rami (sporidia) laterales oppositi aut verticillati. — Genus e fungillis lignatilibus conflatum cum Stachyldio conjungendum suspicatur cel. Fries.

1. S. FUMOSUM (Mart. l. c.) filamentis aggregatis fusco-nigricantibus, ramulis oblongis. — Ad ligna putrida vel exsiccatâ Jurassi (cl. Chaillet). — Dematinum verticillatum Hoffm. germ. 2. t. 13. Pers. syn. 694. — Filamenta minuta sæpè ligna vetusta obtegentia.

XIII. ACREMONIUM Linck obs. 1. p. 13; sp. pl. 6. 1. p. 74.

Filamenta vix ramosa decumbentia laxa libera tota septata ; sporidia solitaria simplicia non septata globosa persistentia æqualiter stipitata. — Fungilli minuti in truncis putridis aut foliis dejectis nascentes.

1. A. VERTICILLATUM (Linck obs. 1. p. 13. t. 1. f. 20.) tenue effusum, filamentis densè intricatis albis, ramulis sporidiiferis verticillatis, sporidiis ovatis concoloribus. — Ad truncos putridos. — Nees syst. f. 39. Grèv. crypt. fl. t. 124. f. 2. — Truncos latè sæpè investiens.
2. A. ALTERNATUM (Linck l. c.) effusum tenuissimum, filamentis laxè intricatis albis, ramulis sporidiiferis alternis, sporidiis globosis. — In foliis dejectis. — Dittm. in Sturm. fang. t. 3. — Folia dejecta sæpè tota subiculo tenuissimo instar telæ araneæ obducens.

XIV. MYCOGONE Linck obs. 1. p. 16. Nees syst. p. 44. Fries syst. orb. veg. 1. p. 178.

Filamenta decumbentia intricata ramosa tota septata ; sporidia numerosissima appendiculo globoso et filiformi, non septata. — Fungilli minutissimi fungos majores putrescentes incolentes.

1. M. ROSEA (Linck l. c.) effusa tenuis, filamentis lanæformibus albis, sporidiis rubris. — In fungis putrescentibus. — M. incarnata Pers. myc. 1. p. 26. — Agaricos denso villo obvolvens eosque penetrans fætidissima.
2. M. CERVINA (Dittm. in Sturm. deutsch. pilz. 4. p. 107. t. 53.) effusa tenuis, filamentis lanæformibus albis, sporidiis flavo-fuscis. — In fungis putridis Parisiorum ex cl. Chevall. — Fungos integros pulvere pellis cervinæ colore obducens.

XV. BACTRIDIUM Kunze et Schmidt. myc. heft. 1. p. 5. Linck sp. pl. 6. 1. p. 34.

Sporidia solitaria elongata extremitatibus hyalinis medio materiâ grumosâ (sporulis?) referta aggregata, filamentis ramosis articulatis apice truncatis adnata dein incumbentia. — Fungilli corticolæ.

1. B. FLAVUM (Kunze et Schmidt l. c. t. 1. f. 2.) subiculo tenuissimo, filamentis rarissimis albis, sporidiis aggregatis oblongis utrinque obtusis flavis. — In cortice arborum circa Beauvais (cl. Graves). — Nees in nov. act. caes.-leop. 9. t. 1. f. 3. Tremella mucoroides Bull. champ. t. 490. f. 4. — Cespites parvi 1-2 lin. lati raro confluentes.

XVI. COREMIUM Nees syst. p. 86. Linck sp. pl. 6. 1. p. 71. Fries syst. orb. veg. 1. p. 182.

Filamenta fertilia septata erecta deorsum in stipitem confluentia apice libera penicillata formantia capitulum cui inspersa sporidia simplicia.

918 ACOTYL. seu CELLULARES.

— Fungilli minutissimi in fructibus et leguminibus corruptis aut in muscerdis nascentes.

1. *C. GLAUCUM* (Linck obs. 1. p. 19. f. 31.) cespite effuso, stipite brevi lutescente, sporidiis globosis demum glaucis. — In fructibus corruptis. — Latè serpens hinc inde stipites crassiusculos proferens.
2. *C. LEUCOPUS* (Pers. myc. 1. p. 42.) gregarium grumosum, capitulis glaucis, stipitibus albis subglabris. — In legumiibus putrescentibus Fabæ reperiit el. Pers., sero aut. — Stipites plerumque uniti passim solitarii floccosi vel glabri.
3. *C. CANDIDUM* (Nees fung. f. 86.) cespite effuso, stipite candido, sporidiis globosis concoloribus. — In fructibus corruptis. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 71. — An conjectante cl. Linck *C. glauci* status junior?
4. *C. CITRINUM* (Pers. myc. 1. p. 43) cespite effuso, stipite tomentoso citrino, sporidiis concoloribus. — In muscerdis circà Parisios ex Chevall. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 72. *Monilia Penicillus* Pers. obs. 2. t. 4. f. 2.

XVII. PENICILLIUM Linck obs. 1. p. 15. Nees syst. p. 58. Ad. Brongn. cl. champ. p. 46. — *Moniliæ* sp. Pers.

Filamenta sterilia decumbentia septata libera simplicia aut ramosa, fertilia erecta apice penicillata; sporidia simplicia in penicillis collecta.

— Fungilli minutissimi in fungis et herbis putrescentibus nascentes.

1. *P. CANDIDUM* (Linck obs. 1. p. 15; sp. pl. 6. 1. p. 69.) cespite rotundo effusoque tenui albo, filamentis fertilibus ramosis, sporidiis albis. — In fungis herbisque putridis. — Instar telæ araneæ corpora putrescentia obducens filamentis fertilibus vix lin. altis.
2. *P. ROSEUM* (Linck obs. 2. p. 37 et l. c.) effusum tenue album, filamentis fertilibus subramosis, sporidiis roseis. — In caulinis plantarum siccis v. g. Solani tuberosi. — Filamenta denum collabescunt et sporidia pallescunt.
3. *P. GLAUCUM* (Linck obs. 1. p. 15 et l. c.) plus minusve crassum album, filamentis fertilibus subramosis, sporidiis globosis albis demum glaucis. — In corporibus putrescentibus mollibus. — Grev. cr. fl. t. 58. f. 1. Desmaz. cr. exs. n. 302. *P. expansum* Linck obs. Nees fung. f. 59. *Monilia digitata* Pers. DC. fl. fr. 2. p. 69. *Mucor penicillatus* Bull. champ. t. 504. f. XI. II. — Facile collabescit et corrumpitur et denum pulverem nigrum format.
4. *P. RACEMOSUM* (Pers. myc. 1. p. 41.) plus minus crassum albicans, filamentis fertilibus a basi ramulos digitatos emitentibus. — In viridariis, junio. — *Aspergillus racemosus* Pers. disp. *Monilia racemosa* Pers. syn. DC. fl. fr. 2. p. 70. *Mucor penicillatus* Bull. champ. t. 504. f. XI. 12. — Mich. gen. t. 90. f. 4. — Denuò observandum.

XVIII. BOTRYTIS Fries syst. orb. veg. 1. p. 183. — *Botrytis*, *Spicularia*, *Hapalaria* Pers. myc. 1. p. 32, 38 et 28. — *Haplotrichum*, *Hapalaria*, *Botrytis*, *Polyactis* Linck sp. pl. 6. pars 1. p. 52—62.

Filamenta simplicia aut ramosa sparsa aut aggregata septata libera, fertilia erecta apicibus simplicibus; sporidia simplicia (non septata) globosa oblongave circà filamentorum ramos apicesve collecta. — Fungilli minutissimi in variis substantiis nascentes.

* *Albae, filamentis sporidiisque albis.*

1. *B. RAMULOSA* (Linck obs. 1. p. 12; sp. pl. 6. 1. p. 53.) denum effusa, filamentorum fertilium ramulis subramosis brevissimis, sporidiis globosis. — In caulinis siccis interdum vivis plantarum. — Pers. myc. 1. p. 35. *B. parasitica* Pers. obs. 1. t. 5. f. 6. et myc. l. c. *Mucor Botrytis* Sow. fung. t. 359. — Cespites formans stuposos aut lanatos; sporidia majuscula conglomerata.

2. *B. GEOTRICA* (Linck sp. pl. l. c.) effusum, filamentis fertilibus subramosis brevissimis, sporidiis oblongis utrinque truncatis. — Ad terram sterilem sylvarum et ericetorum circa Parisios ex cl. Chevall. — Geotrichum candidum Linck obs. 1. f. 26. Pers. myc. 1. p. 26. — Tenuis tomenti instar terram obducens maculam albam nudo oculo granulosam refert; sporidia faciliter decidunt et tunc filamenta decumbunt.
3. *B. ELEGANS* (Linck obs. 1. p. 13.) effusa tenuissima, filamentis fertilibus longiusculis corymbosè ramosis demum flavescentibus, sporidiis globosis. — In stercore vaccino. — Pers. myc. 1. p. 34. — Filamenta fertilia arbusculas elegantes formant.
4. *B. DENDROIDES* (DC. fl. fr. 2. p. 70.) effusa cespitosa, filamentis fertilibus ramosissimis, ramis divaricatis, sporidiis subovalibus magnis. — In fungis putridis. — *B. agaricina* Linck. Dittm. in Sturm. deutsch. fl. fung. t. 51. Grev. crypt. fl. t. 126. f. 1. *Mucor dendroides* Bull. champ. t. 504. f. 9. — Fungos lanâ albâ lin. altâ obducens.
5. *B. CAPITATA* (Dub. mss.) cespitosa effusa, filamentis simplicibus, sporidiis ovalibus capitatis. — In truncis putrescentibus. — *Acladium capitatum* Linck obs. 1. p. 10. f. 13. a. Nees fung. f. 51. *Haplotrichum capitatum* Linck sp. pl. 6. 1. p. 32. *Sporocephalum capitatum* Chevall. fl. par. 1. p. 60. t. 4. f. 6. — Filamenta tenerrima fugacia; sporidia tandem decidua.

** *Filamentis virentibus et olivaceis.*

6. *B. OLIVACEA* (Linck obs. 1. p. 12.) limitata tenuis, filamentis fertilibus subramosis brevissimis olivaceis, sporidiis globosis parvis. — In truncis arborum putrescentibus ex cl. Chevall. — Maculæ unciales, filamentis oculo nudo vix conspicuis.
7. *B. PULVINATA* (Linck sp. pl. 6. 1. p. 55.) crassiuscula effusa, filamentis densis aggregatis erectiusculis nigro-olivaceis, fertilibus subramosis brevissimis, sporidiis globosis. — In fungis Galliae ex cl. Pers. — Fungos denso strato investiens hinc indè in pulvinulos velutinos elevato, filamentis parvis nudo oculo vix conspicuis. An *Aspergillus* ex cl. Linck?
8. *B. POLYSPORA* (Linck l. c.) elevata expansa cespitosa ex olivaceo grisea, filamentis fertilibus ramosissimis, sporidiis globosis copiosissimis. — In ramis dejectis. — Dittm. in Sturm. l. c. 3. t. 35. — Letas plagas occupans, filamentis ad 2 lin. longis.
9. *B. LIGNIFRAGA* (DC. fl. fr. 2. p. 70.) elevata limitata, filamentis ramosis intricatis albo-virentibus, sporidiis minutissimis globosis circa filamentorum apices collectis. — In cortice arborum præsertim Betulæ albæ. — Linck. sp. pl. 6. 1. p. 56. *Trichoderma æruginosum* Linck. Desmaz. cr. exs. n. 121. — Cespites parvi e medio cortice erumpentes epidermidem removentes initio albi demum virides.

*** *Filamentis partim roseis.*

10. *B. LINCKII* (Dub. mss.) elevata effusa laxa rosea, filamentis fertilibus ramosis virgatis, sporidiis globosis minutis in apicibus ramorum collectis. — In ramis dejectis circa Parisios ex cl. Chevall. — *B. rosea* Linck obs. 2. p. 36 non DC. — Cespitos parvos roseos filamentis laxis instar lanæ ramis incumbentibus format.
11. *B. MACROSPORA* (Linck obs. 1. p. 13.) subelevata effusa, filamentis albis hinc indè roseis sterilibus decumbentibus, fertilibus erectis apice ramosis ramis verticillatis, sporidiis maximis subcylindricis. — In foliis dejectis. — Dittm. in Sturm. deutsch. fung. 4. t. 50. *Cladobotrys macrospora* Chevall. — Folia latè obducens et connectens.
12. *B. VARIA* (Dub. mss.) elevata effusa, filamentis albis hinc indè roseis, fertilibus erectis vase ramosis, sporidiis oblongis majoribus et minoribus. — Ad ramos dejectos circa Parisios ex cl. Chevall. — *B. variosperma* Linck.

920 ACOTYL. seu CELLULARES. BOTRYTIS.

Cladobotryum varium Nees fung. f. 54. — Praecedenti affinis et forsitan ab illa non diversa ex ipso Linck.

* * * * * *Filamentis totis partimque flavis, fulvis, aurantiacis, aut miniatis.*

13. *B. FULVA* (Linck sp. pl. 6. t. p. 58.) crassiuscula effusa subfulva, filamentis fertilibus vage ramosis, sporidiis globosis arcte filamentorum apicibus adhaerentibus. — In vaporariis terram ollarum investiens. — Dematium ollare Pers. syn. 697.
14. *B. ALLOCHROA* (Linck obs. 1. p. 12.) elevata limitata alba demum flava, filamentis fertilibus superne ramosis, ramis corymbiferis, sporidiis globosis majusculis. — In ramis herbarum siccis. — Nees fung. f. 53. — Cespituli rotundi seu oblongi demum confluentes ultra lin. crassi, filamentis lanæ instar elevatis; sporidia alba.
15. *B. AURANTIACA* (Linck obs. 1. p. 12. f. 18.) subelevata effusa aurantiaca, filamentis fertilibus ramosissimis, sporidiis globosis. — In caulinis siccis plantarum præsertim Umbelliferarum et in corticibus arborum. — Cespites latè effusi ad plures pollices extensi ad lin. crassi.
16. *B. ROSEA* (DC. fl. fr. 2. p. 71 non Linck.) elevata rotunda alba demum effusa miniata, filamentis fertilibus erectis simplicibus sterilibus angulo recto insertis, sporidiis paucis (2-5) ovatis ad apicem filamentorum aggregatis. — Ad corticem arborum imprimis Alni. — *Mucor roseus* Bull. champ. t. 504. f. 4. *Sporocephalium roseum* Chevall.

* * * * * *Filamentis sporidiisque griseis.*

17. *B. POLYACTIS* (Linck sp. pl. 6. t. p. 59.) elevata effusa, filamentis griseis fertilibus vage ramosis apice divisis, sporidiis globosis glaucis. — In caulinis herbarum putrescentium. — *Polyactis vulgaris* Linck obs. 1. f. 22. Nees fung. f. 55. *Monilia vulgaris* Pers. myc. 1. p. 31. *Penicillium racemosum* Pers. l. c. p. 41. — Mich. gen. t. 91. f. 4. — Cespites a lin. ad unc. alti longè latèque expansi; filamenta laniformia laxa.
18. *B. RACEMOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 70 excl. syn. Pers.) latè effusa cinerea congesta, filamentis fertilibus erectis ramosissimis, sporidiis oblongo-ovatis albis demum cinereis secus filamentorum ramulos spicato-racemosis. — In oleribus putrescentibus. — *Mucor racemosus* Bull. champ. t. 504. f. 7. *Spicularia racemosa* Pers. — Cum priore a cel. Linck conjuncta sed ut videtur immerito.
19. *B. CINerea* (Pers. syn. 690; myc. 1. p. 32.) elevata effusa, filamentis fuligineo-cinereis subramosis, fertilibus simplicibus parum elevatis, sporidiis globosis concoloribus. — Ad fungos putridos, caules corruptos et ramulos parvos Sclerotio duro sèpè insidens. — Linck sp. pl. 6. t. p. 60. — Filamenta vix lin. alta simplicia hinc indè ramosa articulis alternatis valde constrictis.
20. *B. GRISEA* (Dub. mss.) filamentis griseis simplicibus aut subramosis omnibus erectis segregatis, sporidiis globosis concoloribus ad apices et latera hinc indè coacervatis. — In foliis siccis Sparganii, Arundinis. — *Haplaria grisea* Linck obs. 1. f. 12. Nees fung. f. 49. — Filamenta ad $\frac{1}{2}$ lin. longa; sporidia facillimè delabuntur et filamenta nuda supersunt.
21. *B. MURINA* (Dittm. in Sturm. deutsch. piltz. 3. t. 36.) elevata effusa, filamentis cinereis virgate ramosis rigidis, sporidiis coacervatis globosis concoloribus. — In ramis dejectis semiputridis sylvarum Galliæ borealis ex cl. Desmaz. — Linck sp. pl. 6. t. p. 61. — Cespites 3-4 lin. effusi, filamentis densè aggregatis ad lin. elevatis ramisque acutis.
22. *B. RAMOSA* (Pers. syn. 690.) elevata effusa grisea, filamentis griseis fertilibus erectis apice quadrifidis, sporidiis globosis glaucis. — In caulinis plantarum putrescentium. — *Spicularia ramosa* Pers. myc. 1. p. 39. *Monilia quadrifida* Pers. l. c. p. 31. *Polyactis quadrifida* Linck sp. pl. 6. t. p. 62. — Mich. gen. t. 91. f. 3. — Cespites 2 lin. et ultra alti latè expansi; filamenta fert. apice subclavata.

23. *B. UMBELLATA* (DC. fl. 2. p. 71.) elevata effusa, filamentis primò albis dein griseo-nigrescentibus, fertilibus erectis apice umbellatim multifidis, sporidiis globosis secùs ramulos sessilibus. — In fructibus saccharo conditis ferè corruptis. — *Spicularia umbellata* Pers. *Polyactis umbellata* Linck. *Mucor umbellatus* Bull. champ. t. 504. f. 8.
24. *B. SIMPLEX* (Pers. syn. 690.) filamentis fertilibus sparsis erectis simplicibus griseis, apicibus umbellatim 3-5-fidis. — Ad ligna putrescentia et graminum culmos. — *Spicularia simplex* Pers. *Polyactis simplex* Linck. — Mich. gen. t. 91. f. 1.

***** *Filamentis sporidiisque nigris.*

25. *B. NIGRA* (Linck obs. 1. p. 12; sp. pl. 6. 1. p. 62.) subelevata effusa nigra, filamentis fertilibus vagè ramosis ramis paucioribus virgatis, sporidiis minutis globosis hinc indè conglomeratis. — In truncis ramisque arborum dejectis. — *Virgaria nigra* Nees fung. f. 52. — Cespites longè latèque expansi velutini, filamentis densis.

XIX. SPOROTRICHUM Linck in jahrb. der gew. 1. p. 163; sp. pl. 6. 1. p. 1. Fries syst. orb. veg. 1. p. 185. — Sporotrichum, Asporotrichum, Aleurisma et Collarium Linck obs.

Filamenta ramosa subdecumbentia libera intricata septata; sporidia inappendiculata simplicia subglobosa liberè inspersa. — Fungilli minutissimi arboribus aut plantis putridis et etiam vitris innati. — Plures species dubiae et observationi rursus subjiciendæ ut dignoscatur an sint fungi proprii aut initia alterius fungi.

Sect. 1. SPOROTHRYX.

Filamenta intricata, sporidia non rarissima. (Linck l. c.)

* *Sporidiis semper albis.*

1. *S. LAXUM* (Nees syst. p. 49. f. 45.) tenuissimum demùm effusum, filamentis adpressiusculis laxis vagis, sporidiis oblongis. — In truncis putrescentibus nemorum umbrosorum. — Tenui tomento instar telæ araneæ obducit trancos ad 2 poll. et ultrà; filamenta fugacia.
2. *S. CANDIDUM* (Linck obs. 1. p. 9.) tenuë tandem effusum, filamentis adpressiusculis laxis vagis, sporidiis globosis. — In truncis cæsis et putridis nemorum umbrosorum. — Nees fung. f. 45. B. — Præcedenti valde simile.
3. *S. POLYSPORUM* (Linck obs. 2. p. 34.) crassiusculum limitatum, filamentis densis, sporidiis copiosis globosis minutis. — In corticibus arborum circà Parisios ex Chevall. — Cespites initio parvi 1-2 lin. lati demùm confluentes, pulvinulos elasticos sat crassos firmos et persistentes formantes; color parùm latescens.
4. *S. NITENS* (Linck sp. pl. 6. 1. p. 3.) effusum subtilissimum, filamentis densissimè intricatis albis, sporidiis globosis minutis. — In foliis dejectis et caulinis exsiccatis herbarum. — *S. pellicula* Linck l. c. *Himantia nitens* Pers. 1. p. 91. — Folia et caules exsiccatos obducens instar pelliculæ tenerimæ albæ, filamentis nudo oculo vix distinguendis.
5. *S. STROMATÆUM* (Linck l. c.) crassiusculum subeffusum, filamentis densissimè intricatis, sporidiis globosis minutis. — In ramulis fruticum circà Parisios ex cel. Pers. — Filamenta tam densè intricata ut oculos fugiant. An potius prioris status adultior?
6. *S. FRUCTIGENUM* (Linck jahrb. der gew. 1. p. 169.) crassum convexum limitatum confluentis, filamentis densis, sporidiis globosis magnis. — Ad fructus aquosos putrescentes. — Pers. myc. 1. p. 74. *Aleurisma macrosporum* Linck obs. 2. p. 38. *Acrosporium fructigenum* Pers. myc. 1. p. 24. *Torula fructigena* Pers. obs. 1. t. 1. f. 7. — Cespites parvi 1-2 lin. lati, lin. ferè crassi dein confluentes.

922 ACOTYL. S. CELLULARES. SPOROTRICHUM.

7. *S. FUNCOAUM* (Linck jahrb. I. c.) tenue effusum, filamentis lanæformibus, sporidiis globosis minutis. — In Agaricis putrescentibus. — Fungos obtegens instar lanæ subtilissimæ.
8. *S. DENSUM* (Linck obs. I. p. 11.) crassum limitatum, filamentis densis, sporidiis globosis minutis. — In insectis mortuis. — Nees fung. f. 45. Pers. myc. I. p. 75. Racodium entomogena Pers. myc. I. p. 72. — Cespites 2-3 lin. lati firmi et elasticæ, colore albo in flavescentem vergente.
9. *S. BRYOPHILUM* (Pers. myc. I. p. 78.) crassiusculum effusum, filamentis intricatis laxiusculis, sporidiis conglomeratis copiosis globosis. — Ad Hypna majora. — Linck sp. pl. 6. I. p. 6. — Cespites caulinos et folia Muscorum obducentes fuscescentes aut rubiginosi demumque obscuriores; sporidia farinæ instar instrata.
10. *S. SPORULOSUM* (Linck jahrb. I. c.) crassiusculum densum limitatum filamentis rarissimis, sporidiis globosis minutis albis rubentibusve. — In variis substantiis putrescentibus etiam in terrâ turfosâ. — Linck sp. I. c. Pers. myc. I. p. 74. *S. rhodochroum* Linck jahrb. I. c. Pers. myc. I. p. 81. Aleurisma sporulosum Linck obs. I. f. 25. *A. inspersum*, bulbosorum, roseum Linck. *A. erubescens* Nees fung. f. 48. — Cespites parvi vix lin. lati; color sporidiorum ex albo in roseum transiens.
11. *S. AGARICINUM* (Linck jahrb. I. c.) tenuissimum effusum, filamentis obsoletis, sporidiis globosis albis. — In Fungis majoribus putrescentibus. — Aleurisma saccharinum Linck obs. 2. p. 38. excl. syn. — Acervulos parvos formans demum in crustam effusam confluentes. — An potius ut suspicatur cl. Linck alias fungi sporidia?

** *Sporidiis griseis.*

12. *S. GRISEUM* (Linck obs. I. p. 11.) tenue effusum griseum, filamentis dense implicatis, sporidiis crebris globosis. — In caulis herbarum exsiccatis, in locis humidis. — Caules longè latèque investiens filamentis teneris.
13. *S. MURINUM* (Linck jahrb. et sp. II. cc.) tenuissimum effusum griseum, filamentis divaricatis, sporidiis globosis minutis creberrimis. — In terrâ humidâ umbrosâ. — Terram longè latèque obtegens, filamentis elongatis tenerrimis facile evanescentibus.

*** *Sporidiis flavicantibus flavisve.*

14. *S. LUTEO-ALBUM* (Linck II. cc.) effusum tenue, filamentis laxis, sporidiis globosis parvis flavescentibus. — Ad caules exsiccatos plantarum iuprimis Umbelliferarum. — Filam. telæ araneæ instar caules investiunt sed non obtengunt et facile evanescunt.
15. *S. FLAVISSIMUM* (Linck obs. 2. p. 34 et II. cc.) crassum longè effusum, filamentis densis stuposis, sporidiis minutissimis globosis flavissimis. — In asseribus putridis. — Asseres longè latèque investiens et ob crassitatem facile sejungendum.
16. *S. vitellinum*, sporidiis copiosissimis globosis flavo-pallescens. — In asseribus putridis.

17. *S. SPARSUM* (Linck II. cc.) minutum crassiusculum limitatum, filamentis rarissimis, sporidiis globosis minutis flavis. — Ad ramos et cortices dejectos circâ Parisios ex Chevall. — Aleurisma flavissimum Linck obs. 2. p. 38. — Granula minuta vix magnitudine capitis aciculæ constituens.

**** *Sporidiis fuscis.*

18. *S. FUSCO-ALBUM* (Linck I. c.) crassiusculum effusum, filamentis lanæformibus laxis, sporidiis crebris subglobosis magnis. — In corticibus arborum putrescentium. — Pers. myc. I. p. 77. *S. oosporum* Ehrenb. Pers. I. c. — Cespites format longè effusos medio fuscos, ambitu albo.
19. *S. FUSCUM* (Linck obs. I. p. 10, 2. p. 35.) crassiusculum effusum, filamentis densis effusis, sporidiis subglobosis minutis. — In corticibus arborum. —

S. badium et stuposum Linck obs. *Alytosprium fuscum* Linck sp. pl. 6. 1. p. 23. Desmaz. er. exs. n. 306. *Thelephora vinosa* Pers. syn. 578. — Tomenti instar sat densi truncos emortuos longè latèque investiens.

19. *S. PUNCTIFORME* (Linck sp. pl. 6. 1. p. 11.) limitatum parvum, filamentis implexis, sporidiis globosis copiosis e cærnleo-fuscis. — In bulbis immersis *Hyacinthi Orientalis*. — *Ægerita punctiformis* DC. fl. fr. 2. p. 72. — Acervulos parvos magnitudine capitis aciculæ formans.

***** *Sporidiis roseis.*

20. *S. OLLARE* (Pers. myc. 1. p. 81.) tenue effusum, filamentis lanæformibus elevatis, sporidiis versus discum coacervatis globosis. — Ad muros et ollas in quibus plantæ vegetant. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 12. *S. roseum* Linck obs. 2. p. 35. — Ollas murosque lanâ albâ longissimè effusâ facile evanescenti investit.

£. vesicarum, filamentis depressiusculis. — In vesicis in locis humidis acervatis aut quibus orificio lagenarum clauduntur. — *S. vesicarum* Linck. Pers. — Acervi sporidiorum primò albi dein rubri demùm iterum albi.

21. *S. STERCORARIUM* (Linck ll. cc.) crassiusculum limitatum, filamentis raris, sporidiis copiosissimis globosis roseis. — In stercoribus exsiccatis propè Parisios ex cl. Chevall.

***** *Sporidiis rubris et aurantiacis.*

22. *S. AUREUM* (Linck obs. 1. p. 11 et ll. cc.) crassiusculum limitatum, filamentis crispis, sporidiis copiosis globosis croceis. — In corticibus arborum putrescentium. — *Mucor aurantius* Bull. champ. t. 504. f. 5. *Ægerita aurantia* DC. fl. fr. 2. p. 72. — In corticibus longè serpens ruberrimum in ambitu album; filaments evanescentia.

23. *S. CROCEUM* (Kunze myc. heft. 1. p. 81.) crassiusculum, filamentis parcè ramosis croceis, sporidiis ovalibus creberrimis minutis concoloribus. — In quisquiliis, ad radices herbarum, muscorum. — *Ozonium croceum* Pers. myc. 1. p. 86. *Alytosprium croceum* Linck sp. pl. 6. 1. p. 24. *Himantia sulphurea* Pers. syn. 703. *Status degener* *Thelephoræ sulphureæ* ex cl. Fries.

24. *S. MYCOPHILUM* (Linck ll. cc.) tenue subeffusum margine album, filamentis crispis, sporidiis copiosissimis globosis rubris. — Ad fungos maiores exsiccatos. — Acervulos format demùm confluentes.

25. *S. LATERITIUM* (Ehrenb. sylv. ber. p. 11. 22.) tenue effusum demùm confluens, filamentis laxis, sporidiis copiosis minimis suboblongis lateritiis. — In ramulis foliisque Tiliaceis coacervatis et in Urticæ Carduique caule. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 15. — Cespites non longè effusi margine albi facile evanescentes Valdè affine *S. aureo* et forte ex ipso Linck non diversum?

26. *S. SCOTOPHILUM* (Linck ll. cc.) crassiusculum limitatum, filamentis implexatis laxiusculis, sporidiis globosis rubris. — Ad stercora exsiccatæ. — *Ægerita cinnabarina* DC. fl. fr. 5. p. 13?

***** *Sporidiis virescentibus.*

27. *S. VIRESCENTIS* (Linck ll. cc.) effusum tenue, filamentis raris, sporidiis copiosissimis globosis obscure viridibus. — In corticibus arborum putrescentium. — *Cladosporium virescens* Pers. myc. 1. p. 14. — Longè latèque serpens ligno firmiter adhærens.

28. *S. CHLORINUM* (Linck obs. 2. p. 35.) effusum crassiusculum, filamentis densis mollissimis, sporidiis copiosis glomeratis globosis flavo-viridibus. — In foliis dejectis et quisquiliis putrescentibus in sylvis et cellis circa Parisios ex cl. Chevall. — Folia dejecta tomento denso investiens et connectens.

***** *Sporidiis nigris.*

29. *S. PARIETUM* (Linck obs. 2. p. 81 et ll. cc.) effusum tenue, filamentis laxis vagis, sporidiis versus discum collectis globosis. — Ad parietes nuper calce

924 ACOTYL. seu CELLULARES.

inductos. — Lanæ mollis instar latæ investiens parietes humidos, filamentis facile evanescens.

30. *S. CALCIGENUM* (Linck ll. cc.) tenue effusum nigrum, filamentis undique tectis sporidiis minutis globosis. — Ad parietes humidos calce illitos. — Latas plagas occupans muros totos nigros reddit.

31. *S. LYOCOCCON* (Ehr. sylv. ber. p. 11. 22.) effusum crassiusculum, filamentis implicatis tenuibus longis albis, sporidiis in acervos raros collectis in aquâ diffluentibus globosis nigris. — In fructibus putrescentibus præsertim Armeniacis. — Cespes stuposæ griseo-sordidæ lutescenti-albus.

32. *S. COLLÆ* (Linck ll. cc.) crassum effusum, filamentis implicatis stuposis, acervis sporidiorum nigris, sporidiis globosis. — Super collam sicciam. — Collarium nigrispernum Linck obs. 1. p. 15. Nees fung. f. 42.

Sect. II. BYSSOCLADIUM Linck obs. 2. p. 36. Agardh syst. alg. p. 31.

Filamenta expansa.

33. *S. FENESTRALE* (Dittm. in Sturm. fl. 1. t. 1.) tenuissimum effusum, filamentis adpressis minutissimis brevibus radiantibus arachnoides ramosis sinuoso-flexuosis albis, sporidiis globosis demùm griseis. — Ad fenestraram vitra impura in locis humidis. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 19. Byssocladium fenestrale Nees fung. f. 47. Conferva fenestralis Roth. Dillw. conf. t. 94. Fl. dan. t. 1668. f. 1. — Filamenta alba et diaphana oculo nudo vix conspicienda vitro arctè adhærentia et maculas exhibentia demùm fuscescenti-griseas centro obscuriores.

34. *S. BYSSINUM* (Linck sp. pl. 6. 1. p. 20.) tenuissimum effusum, filamentis centrifugis apicem versus expansis sæpè penicilliformibus albis, sporidiis globosis minutis concoloribus. — Ad folia dejecta. — Byssocladium candidum Linck obs. 2. p. 36. Himantia plumosa Pers. — Folia eleganti tela investiens; sporidia inspersa instar pulveris albi conglobata.

35. *S. TELA* (Linck l. c.) effusum tenuissimum, filamentis sese decussantibus expansis albis, sporidiis globosis minutis concoloribus. — In foliis dejectis. — Himantia Tela Pers. myc. 1. p. 91. — Filamenta telam araneæ optimè sistentia non versus apices in penicillos abeuntia. Valde præcedenti affine et forsitan varietas?

36. *S. PULCHELLUM* (Dub. mss.) effusum tenuissimum, filamentis ad basin usque distinctis radiato-divergentibus albis, sporidiis globosis minutis concoloribus. — Suprà folia adhuc viridia Rosæ circâ Parisios. — *S. macularum* Linck l. c. Himantia pulchella Pers. myc. 1. p. 91. — Cespites parvi tam tenues ut nudo oculo vix nisi folii dealbatio appareat.

37. *S. DENDRITICUM* (Dub. mss.) minutissimum æruginosum, filamentis radianibus flexuosis irregulärer ramosis, sporidiis globosis minimis. — In libris vetustis. — Byssocladium dendriticum Agardh syst. alg. p. 31. — Maculæ-forme; filamenta tenuissima. arctè adglutinata picturam dendriticam sistentia.

XX. TRICOTHECIUM Linck obs. 1. p. 16; sp. pl. 6. 1. p. 28. — Trichodermatis sp. Pers. DC.

Filamenta ramosa decumbentia intricata tota septata; sporidia inappendiculata ovoidea septo transversali didyma ad superficiem filamentorum inspersa. — Fungilli pulvinati.

1. *T. ROSEUM* (Linck ll. cc.) crassiusculum limitatum, filamentis intricatis densis albis, sporidiis oblongis roseis. — In plantis mortuis, lignis et asseribus putrescentibus, in humo, etc. — Linck obs. 1. f. 27. Nees fung. f. 47. Grev. crypt. fl. t. 172. Trichoderma roseum Hoffm. germ. 2. t. 10. f. 1. Pers. DC. fl. fr. 5. p. 13. — Cespites formans pulvini instare elevatos 1-2 lineas latos demùm confluentes et majores.

XXI. SEPEDONIUM Linck obs. 1. p. 16; sp. pl. 6. 1. p. 28. — Uredinis sp. DC.

Filamenta ramosa contexta decumbentia tota septata demum evanescentia; sporidia numerosissima inappendiculata globosa non septata, in medio cespitis coacervata demum effusa. — Fungilli minutissimi fungis putrescentibus innati.

1. S. MYCOPHILUM (Linck ll. cc.) effusum crassiusculum, filamentis lanæformibus albis, sporidiis copiosissimis subglobosis flavis. — In fungis putrescentibus. — Nees fung. f. 38. Grev. crypt. fl. t. 198. Uredo mycophila Pers. DC. fl. fr. 2. p. 230. Mycobanche chrysosperma Pers. champ. com. 133. Reticularia chrysosperma Bull. champ. t. 476. f. 4. Mucor chrysospermus Bull. champ. t. 504. f. 1. Sow. fung. t. 378. f. 13. — Primâ ætate filamenta alba superficie fungorum incumbunt; demum sporidia fungum totum pulvere flavo replent et tunc filamenta evanescunt.

XXII. SPORENDONEMA Desmaz. mem.; crypt. exs. n. 161. — Sepedonii sp. Linck. — Ägeritæ sp. DC.

Filamenta brevia simplicia aut ramosa continua erecta in cespitulos agglomerata sporidia magna rotunda lineatim coacervata rubra foventia. — Fungilli minutissimi caseis innati. — Sporidia sæpè conferta et compressa ita ut filamenta septis confertissimis donata videantur.

1. S. CASEI (Desmaz. l. c. t. 3. f. 1-4.) effusum tenuissimum, filamentis hyalinis, sporidiis subglobosis rubris. — In caseis salsis. — Mucor crustaceus Bull. champ. t. 504. f. 2. Ägerita crustacea DC. fl. fr. 2. p. 72. Oidium rubens Linck obs. 2. p. 37. Sepedonium caseorum Linck sp. pl. 6. 1. p. 29. — Filamenta primâ ætate tantum conspicienda; sporidia aliquando caseos totos pulvere rubro inficiunt.

XXIII. FUSISPORIUM. — Fusisporium et Epochnium Fries syst. orb. veg. 1. p. 186. — Fusisporium, Fusidium et Epochnium Linck obs. 1. p. 17. p. 6, et p. 16. Ad. Brongn. cl. champ. p. 48, 34 et 50.

Filamenta ramosa in cespitulos aggregata implexa decumbentia septata sæpius fugacissima; sporidia fusiformia coacervata simplicia vel obscurè septata. — Ad fructûs carnosos, culmos, folia arida nascentia. — Filamenta in junioribus adsunt et mox persistunt mox evanescunt.

1. F. AURANTIACUM (Linck obs. 1. p. 17.) effusum tenue, filamentis lanæformibus albis, sporidiis aurantiacis congregatis. — In caulinis herbarum, et fructibus duris v. g. Cucurbitacearum. — Nees fung. f. 40 B. — Latè serpens hinc inde acervos parvos rubros sporidiorum efficiens, filamentis demum evanescientibus.
2. F. BETÆ (Desmaz. crypt. exs. n. 305.) latissimè effusum tremellosum, filamentis brevibus ramosis hyalinis, sporidiis numerosissimis plerisque subarcuatis. — Ad râdices putrescentes Betæ circà Lille ex cl. Desmaz., vere. — Uncias multas latum.
3. F. ROSEUM (Linck sp. pl. 6. 1. p. 30.) effusum tenue, filamentis lanæformibus albis, sporidiis sparsis roseis. — In culmis Graminum majorum exsiccatis. — Lanam formans tenuem latè expansam; sporidia copiosissima tenuia utrinque acuta.
4. F. CANDIDUM (Linck l. c.) effusum crassiusculum, filamentis lanæformibus albis, sporidiis sparsis albis utrinque obtusatis. — In amentis dejectis variarum arborum circà Parisios ex cl. Cheval., vere. — Fasciculos formans parvos sparsos albissimos hinc inde parùm expansos.
5. F. MONILIOIDES (Dub. mss.) effusum tenuissimum, filamentis tenuerrimis laxis albis, sporidiis oblongis nigris septatis. — Ad epidermidem fructuum carnosorum et imprimis pytorum. — Epochnium monilioides Linck obs. 1. p. 26.

926 ACOTYL. seu CELLULARES.

- f. 28. Nees fung. f. 40. *Monilia fructigena* Schum. non Pers. — Instar telæ araneæ filamentis tenuissimis fractum obducens.
6. *F. GRISEUM* (Dub. mss.) latè effusum tenue, filamentis minutissimis brevibus, sporidiis fusiformibus griseis. — In foliis aridis *Quercus*. — *Fusidium griseum* Linck. Dittm. in Sturm deutsch. schw. t. 17. Grev. crypt. fl. t. 102. f. 1. Moug. et Nestl. vog. n. 894. — Maculæ irregulares molles 1-5 lin. latae.
7. *F. FLAVO-VIRENS* (Dub. mss.) effusum tenuissimum, filamentis minutissimis brevibus, sporidiis fusiformibus flavo-virentibus. — In foliis aridis *Quercus*. — *Fusidium flavo-virens* Dittm. l. c. t. 18. Grev. l. c. f. 2. *F. æruginosum* Linck obs. 1. p. 6. — Maculæ planæ 1-5 lin. et ultrà latae.
8. *F? SULPHUREUM* (Dub. mss.) effusum, sporidiis parvis compactis fusiformibus crassiusculis curvinsculis sulphureo-pallentibus. — In tuberibus putridis *Solani tuberosi* in cellis *Parisiorum* ex cl. Chevall. — *Fusarium sulphureum* Schlecht. *Fusidium sulphureum* Linck. — Acervi in recentibus sulphurei in siccis pallentes.

XXIV. *PSILONIA* Fries nov. suec. 5. p. 78; syst. orb. veg. 1. p. 187.

Filamenta erecta simplicia pellucida septata basi stromate juncta, cingentia sporidia simplicia globosa aut ovoidea pellucida acervatim conglobata profluentia. — Fungilli minutì ad superficiem epidermidis plantarum nascentes, colore lato.

1. *P. BUXI* (Fries l. c.) parvula, filamentis fasciculatis albis brevibus, sporidiis roseis globosis. — In paginâ inferiore foliorum aridorum Buxi. — *Tubercularia Buxi* DC. fl. fr. 5. p. 110. — Acervuli primò distincti demùm confluentes et totam ferè paginam occupantes.
2. *P. ARUNDINIS* (Duby mss.) parvula, filamentis dense fasciculatis roseis, sporidiis concoloribus ovoideis. — Ad vaginas *Arundinis Phragmitis* circa Lille detexit cel. Desmazières et ad genus retulit. — Acervuli elliptici aut rotundi distincti non confluentes.

XXV. *ARTHRINIUM* Kunze et Schmidt myc. heft. 2. p. 103. Ad. Brongn. cl. champ. p. 49. Fries syst. orb. veg. 1. p. 187. — *Arthrinium*, *Camptoum*, *Goniosporum* et *Sporophleum* Link sp. pl. 6. 1. p. 43-46.

Filamenta simplicia suberecta cespitosa septata, septulis crassiusculis opacis; sporidia copiosè immixta obscura farcta. — Fungilli minutissimi foliis Glumacearum innati.

1. *A. CARICICOLA* (Schm. et Kunze myc. heft. 1. p. 9. t. 1. f. 4.) filamentis dense cespitosis pellucidis, sporidiis fuscis obscuris fusiformibus filamentis multò crassioribus transversim et longitudinaliter obscurè septatis. — In foliis siccis *Caricis montanæ* et ciliatæ. — Linck sp. pl. 6. 1. p. 43 excl. syn. Fries. — Fasciculos parvos fuscos formans granorum milii magnitudine in quibus filaments nudo oculo non conspicere licet.
2. *A. CURVATUM* (Kunze et Schmidt l. c. 2. p. 103.) filamentis parvistenuissimis fuscis, sporidiis creberrimis minutissimis concoloribus ovatis curvatis. — In foliis aridis *Scirpi sylvatici* in Galliâ boreali ex cl. Desmaz. — *Camptoum curvatum* Linck l. c. p. 44. — Cespituli præcedentis sed frequentiores et interdum confluentes.
3. *A. PUCCINOIDES* (Kunze et Schm. l. c.) filamentis elongatis tenuibus fuscis, sporidiis copiosis minutis angulatis concoloribus. — In foliis aridis *Caricum*. — *Conoplea puccinoides* DC. fl. fr. 2. p. 75. *Goniosporum curvatum* Linck l. c. excl. syn. Fries. — Cespituli magnitudine varii plerumque $\frac{1}{2}$ lin. diametro non raro confluentes.
4. *A. SPOROPHLEUM* (K. et Schm. l. c.) filamentis tenuibus brevinsculis fuscis, sporidiis minutis copiosissimis concoloribus oblongis utrinque acutis. — In

foliis aridis Graminum variorum. — Sporophleum gramineum Linck l. c. — Cespituli oblongi convexi 1-1 $\frac{1}{2}$ lin. longi.

XXVI. POLYTHRYNCIUM Kunze et Schmidt myc. heft. 1. p. 13. Linck sp. pl. 6.
1. p. 43.

Filamenta erecta simplicia cespitosa moniliformia, articulis confertis numerosissimis; sporidia inspersa septo transversali didyma. — Fungilli minutissimi fusco-nigri foliis vivis nascentes.

1. P. TRIFOLII (Schm. et Kunze l. c. t. 1. f. 8.) filamentis fasciculatis fusco-nigris, fasciculis aggregatis, sporidiis ovalibus concoloribus. — In foliis Trifoliorum variorum præsertim pratensis. — Desm. cr. exs. n. 162. Grev. crypt. fl. t. 216. — In paginâ inferiore fol. apparent maculæ nigrae margine flavo e cespitulis parvis non confluentibus constantes; filamenta superne crassiora.

XXVII. ACLADIUM Linck obs. 1. p. 9; sp. pl. 6. 1. p. 37. Ad. Brongn. cl. champ. p. 47. — Acladii sp. Pers.

Filamenta simplicia aut subramosa omnia erecta cespitosa tota septata; sporidia ovalia aut oblonga filamentis adspersa. — Fungilli minutissimi e luteo-albi in truncis putrescentibus viventes.

1. A. CONSPERSUM (Linck obs. 1. p. 9. f. 13.) cespitulis confluentibus, filamentis e luteo-albis sporidiis ovalibus hinc indè adspersis. — In truncis putrescentibus. — Nees fung. f. 50. — Cespites primò parvi demùm latè expansi.
2. A. MICROSPERMUM (Linck obs. 1. p. 10; sp. pl. 6. 1. p. 37.) cespitulis effusis, filamentis albis, sporidiis globosis minutis ubique inspersis. — In truncis putrescentibus circè Parisios ex cl. Chevall. — Cespituli parvi, filamentis minutis tenerrimis facillimè evanescentibus.

Trib. IV. BYSSACEÆ Ad. Brongn. ll. co.

Filamenta distincta sed sæpè dense intertexta opaca continua aut rariùs septata. Sporidia ad superficiem filamentorum inspersa aut articulis superioribus formata.

Subtrib. I. CHLORIDEÆ Brongn. ll. cc.

Filamenta continua aut rariùs septata. Sporidia sparsa externa.

XXVIII. CHLORIDIUM Linck obs. 1. p. 11; sp. pl. 6. 1. p. 38. — Dematii sp. Pers.

Filamenta simplicia aut vix ramosa aggregata erecta opaca continua; sporidia numerosa globosa simplicia vagè inspersa. — Fungilli minutissimi in ligno putrescente nascentes.

1. C. VIRIDE (Linck ll. cc.) effusum tenuissimum, filamentis latè viridibus, sporidiis globosis concoloribus. — In ligno putrescente. — C. dispersum Nees fung. f. 64. Dematium asserculorum Pers. — Latè expansum; filamenta nudis oculis inconspicua.
2. C. GRISEUM (Ehr. sylv. myc. p. 17. 23.) effusum, filamentis nigro-fuscis, sporidiis copiosissimis cylindricis albo-griseis. — In truncis putridis Alni glutinosæ circè Parisios ex Chevall. — Dematium griseum Pers. — Lignum tenuissime investiens.

928 ACOTYL. seu CELLULARES.

XXIX. CONOPLEA Ehrenb. sylv. ber. p. 23. Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 46. — Conoplea sp. Pers.

Filamenta erecta rigida simplicia aut vix ramosa in cespites rotundos fasciculata obscurè septata; sporidia globosa simplicia circà filamentorum bases in globos collecta. — Fungilli minutissimi in foliis exsiccatis nascentes.

1. C. HISPIDULA (Pers. syn. 235; myc. 1. p. 10.) parvula, filamentis fasciculatis nigris longiusculis, sporidiis concoloribus. — In foliis graminum aridis. — Desmazières crypt. exs. n. 163. — Fasciculos parvos formans, filamentis nudo oculo conspicuis folio arctè adnatis.
2. C? SPHERICA (Pers. ll. cc.) gregaria subconfluens nigrescenti-olivacea globulosa recens granulosa. — Ad ramos exsiccatos Fagi.
3. C? CINerea (Pers. myc. eur. 1. p. 12.) subrotunda confusa cinerea. — Ad ramos aridos propè Parisios ex cl. Pers. — Lin. 3-4 lata.
4. C? GILVA (Pers. l. c.) sparsa subcompacta ex gilvo-subrufescens. — Ad caules herbarum majorum. — Desmaz. crypt. exs. n. 164. — Aceruli longè inter se distant, sporidiis minus confertis.

XXX. CAMPTOSPORIUM Ehrenb. sylv. ber. p. 11. — Menispora Pers. myc. — Macrosporium Fries.

Filamenta intricata ramosa enodia nuda subcontinua; sporidia longissima simplicia cylindrica incurva inspersa. — Fungilli corticolæ.

1. C. GLAUCUM (Ehrenb. l. c.) subiculo effuso lanæformi, filamentis griseo-glaucis. — In cortice arborum putrescentium. — Menispora glauca Pers. myc. 1. p. 32. Linck. — In parte interiore corticis efficiens tomentum non latè effusum nec densum, filamentis laxiusculè intertextis recentibus glaucis, siccatis nigrescentibus; sporidia tenuissima pellucida.

XXXI. CIRCINOTRICHUM Nees syst. 2. p. 19. Pers. myc. eur. 1. p. 19.

• Filamenta decumbentia tenuia circinnato-intricata continua; sporidia fusiformia pellucida simplicia inspersa et filamentis intermixta. — Fungilli minutissimi epiphylli maculæformes atro-olivacei.

1. C. MACULÆFORME (Nees l. c. t. 5. f. 66. a.) olivaceo-nigrum tenuie, filamentis sericeo-floccosis. — In foliis dejectis circà Parisios ex cl. Chevall., hyeme. — Tomentum tenuie latè expansum formans.

XXXII. RACODIUM Linck obs. 1. p. 18; sp. pl. 6. 1. p. 26. Fries syst. orb. veg. 1. p. 304. — Racodii sp. Pers.

Filamenta ramosa decumbentia continua persistentia in subiculum laxè contexta conspersa filamentis moniliformibus in globulos complicatis e quibus delabunt sporulæ simplices nudæ opacæ. — Fungilli cryptophili tomentum plus minus densum referentes.

1. R. CELLARE (Pers. syn. 701.) latè expansum, filamentis mollissimis primò flavescentibus dein ex olivaceo-nigris tandemque atris, sporulis globosis concoloribus. — In cellis dolia vinaria vetusta longè latèque obducens. — Nees fung. p. 20. f. 70. Mong. et Nestl. exs. n. 790. Grev. crypt. fl. t. 259. Byssus cryptarum DC. fl. fr. 2. p. 67. — Dill. musc. t. 1. f. 12.
2. R. VULGARE (Fries obs. myc. 1. p. 215.) expansum molle laxè contextum nigrum, filamentis æqualibus. — Ad lignum et ramos Betulæ, Fagi, Pini in sylvâ Compiègne ex cl. Graves. — Hanc speciem quam cl. Linck nunc (sp. pl. 6. 1. p. 119.) Antennariæ pinophilæ, nunc (l. c. p. 131.) Dematio

nigro refert, ab utrâque diversam denuò affirmat cl. Fries et fructificantem vidisse asserit.

XXXIII. HELMISPORIUM Linck obs. 1. p. 8 et 2. p. 38. Fries syst. orb. veg. 1. p. 305. — *Helminthosporium Pers. myc. eur.* 1. p. 17. Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 47 et *Cælosporium Linck l. c.*

Filamenta erecta rigida simplicia aut ramosa opaca continua aggregata sparsave; sporidia septata pellucida filamentis inspersa decidua. — Fungilli ligni aut corticis ramulorum dejectorum rarius Graminum incolæ. — An potius, suadente cl. Ad. Brongniart, apices filamentorum septati et caduci ut ramuli sporulas includentes et demùm secedentes habendi.

1. *H. VELUTINUM* (Linck obs. 1. p. 8.) filamentis densè aggregatis ramosis obtusis nigris, sporidiis cylindricis. — In ramulis dejectis. — Nees fung. f. 65. B. Desmaz. cr. exs. n. 211. Gréville scott. cr. fl. t. 148. f. 2. Dematum ciliare Pers. syn. Hypoxylon ciliare Bull. champ. t. 468. f. 1. Sphaeria ciliaris DC. fl. fr. 5. p. 131. — Sporidia versus basin filamentis adnata cylindrica basi parùm attenuata apice obtusata subdiaphana.
2. *H. SUBULATUM* (Nees in nov. act. ac. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 13.) filamentis laxè aggregatis subsimplicibus subciliatis nigris, sporidiis clavatis pellucidis. — Ad ramulos Quercinos putrescentes, circa Parisios ex cl. Chevall., vere. — Maculæ suborbiculari nigricauti innascuntur filaments longitudine ferè lineæ; sporidia arctè juxta basin adhærentia.
3. *H. NANUM* (Nees syst. p. 67. f. 65.) effusum atrum, filamentis sparsis simplicibus furcatisque subnodosis, sporidiis subcylindricis filamentis pañlo brevioribus. — In ligno putrescente circa Parisios ex Chevall. — Nees in nov. act. ac. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 13. B. — Maculæ longitudinaliter effusæ atro-nitidæ; sporidia arctè juxta apicem adhærentia.
4. *H. SIMPLEX* (Nees in nov. act. ac. cæs.-leop. 9. t. 5. f. 11.) dense cespitosum effusum, filamentis simplicibus et subramosis atris, sporidiis fusiformibus pellucidis septis evanescientibus. — Ad lignum internum annosarum Salicum, æst. — Ligna arida tomenti instar densi nigri investiens, filamentis nudo oculo vix conspicuis.
5. *H. TENUISSIMUM* (Nees l. c.) laxè cespitosum, filamentis erectis simplicibus olivaceo-nigris, sporidiis ad basin eoacervatis olivaceo-clavatis. — Ad canes herbarum exsiccatos et petala florum in Galliâ boreali ex cl. Desmaz., aut. — Desm. crypt. exs. n. 212. — Filamenta tenuissima nudo oculo vix observabilia maculas irregulares formantia; sporidia densis stratis filamentorum basin obtegunt.
6. *H. CHERANTHI* (Libert in Desmaz. crypt. exs. n. 213.) filamentis ramosis griseis pellucidis septatis fugacibus, sporidiis crebris magnis pyriformibus substipitatis nigris septatis. — Ad Cheiranthum Cheiri in Galliâ boreali ex cl. Desmaz., æst. — Puccinia Cheiri Lestib. bot. belg.
7. *H. CÆLOSPERIUM* (Linck obs. 2. p. 38.) limitatum confluens, filamentis dense aggregatis ramosis atris, sporidiis globosis orificio subrotundo debiscentibus demùm cavis. — In graminum præsertim majorum culmis foliisque siccis circa Parisios ex Chevall. — Dematum articulatum Pers. *Cælosporium fruticulosum* Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 46. *Erineum articulatum* DC. fl. fr. 2. p. 74. — Cespitosos globosos efficiens filamentis longiusculis oculo nudo facile distinguendis.

XXXIV. HELICOSPORIUM Nees fung. p. 68. Pers. myc. eur. 1. p. 18. Fries syst. orb. veg. 1. p. 305. — *Helicotrichum Nees l. c.* Linck sp. 6. 1. p. 1. p. 33.

Filamenta erecta rigida subsimplicia opaca subcontinua; sporidia spiraliter involuta septata decidua et filamentis inspersa. — Fungilli minutissimi lignicolæ subolivacei.

930 ACOTYL. SEU CELLULARES.

1. *H. VEGETUM* (Nees fung. p. 68. f. 69.) filamentis dense aggregatis nigris, sporidiis ad basin inspersis e viridi-griseis. — In ligno putrescente circa Parisios ex Chevall. — Maculas efficiens sat latè effusas, filamentis nudo oculo non conspicuis.

XXXV. DACTYLIUM Nees fung. f. 58. Pers. myc. 1. p. 40. Linck sp. pl. 6. 1. p. 77.

Filamenta simplicia erecta ad apicem sporidia oblonga aut fusiformia transversim septata gerentia. — Fungilli minutissimi in ligno putrido aut cortice viventes.

2. *D. CANDIDUM* (Nees l. c.) filamentis aggregatis simplicibus albis septatis, sporidiis 2-3 oblongis concoloribus. — Ad superficiem internam cortieis secedentis Quercùs propè Parisios ex cl. Chevall. — Nudo oculo cortex videtur pulvisculo albo instratus; sporidia magna.

Subtrib. II. *CLADOSPORIEÆ*. — Monilieæ Ad. Brongn. ll. cc.

Filamenta tota aut ad apicem tantum moniliformia, articulis demùm in sporidia secedentibus.

XXXVI. CLADOSPORIUM Linck obs. 2. p. 37; sp. pl. 6. p. 1. p. 39. Ad. Brongn. cl. champ. p. 54. — Dematii sp. Pers.

Filamenta erecta et suberecta aggregata simplicia et subramosa apicibus tantum septatis, articulis demùm in sporidia secedentibus. — Fungilli epiphyti.

1. *C. HERBARUM* (Linck obs. 2. p. 37.) effusum, filamentis dense aggregatis oliveo-viridibus arctè adnatis, sporidiis globosis. — In caulinis foliisque plantarum exsiccati, in asseribus antiquis, in fungis etc., pluviae humorique diù expositis. — Nees fung. f. 64 B. Desmaz. crypt. exs. n. 115. Dematium herbarum Pers. Byssus herbarum DC. fl. fr. 5. p. 11. — Recens tomentum, vetustum maculam efficiens. Color plus minus obscurus interdum subniger.

2. *C. ATRUM* (Linck obs. 2. p. 38; sp. pl. 6. p. 1. p. 40.) effusum, filamentis dense aggregatis atris, sporidiis globosis rariusculis. — In caulinis plantarum exsiccati. — Filamenta stricta apice inflexa quasi ramosa.

3. *C. FUMAGO* (Linck sp. l. c.) effusum, filamentis aggregatis atris hinc inde ramosis, sporidiis globosis conglomeratis concoloribus. — In paginâ superiore foliorum morbosorum variarum plantarum. — Torula Fumago Chevall. fl. par. 1. t. 3. f. 4. — Tomentum tenerum aternum efficiens. — Ex hoc et priore ex cl. Linck, filamentis pluviae decumbentibus collabescientibus et in massam grumosam mutatis, oritur Fumago Pers.

4. *C? EPİPHYLLUM* (Linck sp. l. c. p. 42.) filamentis aggregatis, acervulis distantibus in orbem dispositis nigrescentibus. — In variarum arborum foliis siccis præsertim populneis. — Desmaz. cr. exs. n. 214. Dematium epiphyllum Pers.

5. *C? GRAMINUM* (Linck l. c.) sparsum fasciculatum minutum griseo-nigrescens, filamentis distinctis laeviusculis. — In foliis et culmis aridis Graminum, aut. — Dematium graminum Pers. myc. 1. p. 16.

XXXVII. ANTENNARIA Linck in Schrad. neu. journ. bot. 2. p. 16. f. 27; sp. pl. 6 p. 1. p. 166. — Törulæ sp. Pers.

Filamenta ramosa decumbentia densè intricata moniliformia; sporidia intrà basin filamentorum nascentia granuliformia facile dilabentia atque sporulas in articulos divisos effundentia. — Fungilli nigricantes rameales. — Genus cum Torulis ex cl. Pers. commixtum huc inter Muced-

neas relatum ad Uredineas refert cl. Ad. Brongniart, ad Hypoxyla cl. Nees.

1. *A. PINOPHILA* (Nees fung. f. 298.) filamentis atris in thallum crassum contextis, corpusculis sporidiiformibus majoribus. — Ad ramos Pini præsertim P. Piceæ. — Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 116 excl. syn. Schum. et Fries. *Torula fuliginosa* Pers. myc. eur. 1. p. 21. Chevall. fl. par. t. 3. f. 5. — *Corpuscula sporidiiformia* diametro ferè lineæ.

XXXVIII. ALTERNARIA Nees fung. p. 72. f. 68. Pers. myc. eur. 1. p. 20.

Filamenta erecta simplicia sparsa opaca articulis ovalibus remotis parte filiformi distinctis constantia. — Fungi minutissimi in ramulis aut ad truncos Pineos viventes.

1. *A. TENUIS* (l. c.) filamentis dense aggregatis nigris, articulis oblongis. — In caulinibus herbarum exsiccatis. — Chevall. fl. par. 1. t. 5. f. 12. — Cespites format latè expansos canles denigrantes oculo nudo pubescitam teneram sistentes.

XXXIX. TORULA Pers. myc. eur. 1. p. 20. — *Torula* et *Monilia* Linck. — *Hormiscium* Kunze.

Filamenta simplicia erecta aut decumbentia subintertexta moniliformia seu articulata articulis contiguis opacis interdùm deciduis. — Fungilli atri aut atro-fusci cespitosi effusi subincurstantes in vegetabilibus mortuis viventes.

1. *T. ANTENNATA* (Pers. myc. eur. 1. p. 21.) filamentis dense aggregatis atris, articulis ovatis. — In asseribus, truncis resectis, etc., aere expositis in sylvie. — *Monilia antennata* Hoffm. deutsch. fl. t. 13. f. 1. Nees fung. f. 67. — *Aspergillus lignaque* longè latèque obtigit et denigrat; filamenta nudo oculo vix conspicua; articuli facile secedentes.

2. *T. SOLEIROLI* (Dub. mss.) filamentis dense aggregatis atris ramosis, ramis axi perpendicularibus, articulis subglobosis. — In Corsicâ circâ Calvi in *Cisto salvisolio* quem a basi primò invadit denùm obtigit et enecat. — Filamenta sub lente facilè perceptibilia; articuli non secedentes.

3. *T. HERBARUM* (Linck obs. 1. p. 19.) filamentis densissime implicatis ramosissimis atris fragillimis, articulis globosis subcontiguis. — In asseribus et caulinibus plantarum exsiccatis. — *Monilia herbarum* Pers. syn. 693. — Longè latèque effusa; articuli parvi facilè dilabentes.

4. *T. GRAMINIS* (Desmaz. crypt. exs. p. 169.) acervulis subrotundis atris, filamentis simplicibus decumbentibus opacis, articulis globosis. — Ad folia sicca Graminum in Galliâ boreali detexit cl. Desmaz., mart. apr. — Articuli facile secedentes.

5. *T. TENERA* (Linck obs. 2. p. 40.) acervulis subrotundis confluentibus, filamentis fragilibus, articulis globosis pellucidis. — In ramis dejectis, truncis resectis propè Parisios ex cl. Chevall. — Nees fung. p. 69. — Articuli inæquales sèpè latiores quam longi.

XL. OIDIUM Linck obs. 1. p. 16; sp. pl. 6. p. 121. Ad. Brongn. in dict. class. 12. p. 146. — *Acrosporium* Nees syst. p. 53. Pers. myc. eur. 1. p. 23. — *Alysidium* Kunze.

Filamenta simplicia aut subramosa tenuissima decumbentia aut erecta distincta aut cespitosos formantia vix intertexta septata, articulis pellucidis in sporidia dilabentibus. — Fungilli minutissimi in foliis, lignis putridis aut fructibus putrescentibus nascentes.

1. *O. AUREUM* (Nees syst. 2. t. 3. f. 44.) filamentis suberectis simplicibus et

932 ACOTYL. SEU CELLULARES.

ramosis dense aggregatis flavis, articulis ovalibus. — In truncis arborum putrescentium. — Linck obs. 1. p. 16. f. 29; sp. pl. 6. 1. p. 121. — Cespitos parvos efficiens quae lauam flavescentem aut flavam sistunt.

2. O. FRUCTIGENUM (Kunze et Schmidt myc. heft. 1. p. 80. t. 2. f. 22.) subrotundum elevatum, filamentis suberectis simplicibus intricatis ochraceis, articulis ovalibus concoloribus. — In Pyris et Persicis putridis. — Cespites demum expansi, filamentis in tomentum intricatis.

3. O. MONILIOIDES (Linck sp. pl. 6. 1. p. 122.) filamentis erectis simplicibus laxè aggregatis albis flavisque, articulis ovalibus. — In foliis graminum, aut. vere. — Acerosporium monilioides Nees syst. 2. t. 4. f. 49. B. Grev. crypt. fl. t. 73. Monilia hyalina Fries obs. 1. t. 3. f. 4. — In paginâ foliorum infiore maculas formans elongatas albas in quibus nudis oculis filaments vix conspiciuntur.

Æ Rosæ, filamentis decumbentibus fugacibus. — In foliis, ramis, et circa aculeos Rosæ, aut. — O. leuconium var. Rosæ Desmaz. cr. exs. n. 303.

4. O. LAXUM (Ehrenb. sylv. ber. p. 10. 22.) filamentis erectiusculis ramosis dense aggregatis griseis, articulis ovalibus. — In Armeniacis putrescentibus. — Acerosporium laxum Pers. myc. 1. p. 25. — Cespites primò rotundi demum confluentes et expansi tomentum breve nudis oculis sistentes.

5. O. CHARTARUM (Linck sp. l. c.) filamentis decumbentibus subramosis atris, articulis ovalibus. — In chartâ locis humidis repositâ. — Sporotrichum chartaceum Pers. myc. 1. p. 83. — Maculas atras dispersas efficiens quae nudis oculis pulverem atrum sistunt.

Subtrib. III. BYSSINEÆ Ad. Brongn. ll. cc.

Filamenta continua aut septata decumbentia intertexta sporidiis externis destituta et in articulos non solventia.

XLI. ACROTHAMNIUM Nees syst. fung. 2. p. 20. Linck sp. pl. 6. pars 1. p. 27.

Filamenta ramosa decumbentia continua in parte inferiori opaca laxè implexa ramulis extremis subpellucidis erectis septatis; sporulæ e cellulæ dilapsis exortæ. — Fungorum perfectiorum status juvenilis ex cel. Fries.

1. A. VIOLENCEUM (Nees fung. t. 5. f. 71.) effusum crassiusculum, filamentis violaceis apice ascendentibus incrassatis sporuligeris. — Ad radices arborum inter muscos circa Parisios ex cl. Chevall. — Sporotrichum muscorum Linck obs. 2. p. 35.

XLII. ATHELIA Pers. champ. com. p. 66; myc. eur. 1. p. 83. Ad. Brongn. cl. champ. p. 57.

Filamenta intertexta radiantia medio in pelliculam tenuem lœvem depresso-applanatam fibrillis sporulis intermixtis obductam condensata, radio libera. — Fungilli plus minus effusi ramorum corticum culmorumque hospites Thelephoras resupinatas referentes. — Hoc genus a cel. Fries habitum ut complexum fungorum valde diversorum sed externâ facie similiūm, hinc ut observationi rursus evolutio ejus subjicietur, insero.

1. A. STRIGOSA (Pers. myc. eur. 1. p. 83.) obscurè lutescens opaca crassiuscula irregularis dense strigoso-villosa. — Ad Salicam cortices in fissuris. — Unc. 1-2 lata, membranula sporulifera brevis colore paululum dilutiore distincta.

Æ. muscigena (Pers.) irregularis sordidè lutescens opaca mollis filamentis subfuniculatis densis. — Præsertim in Pinetis supra et inter muscos quos una cum ramulis siccis coadunat. — Thelephora byssoidæ DC. fl. fr. 5. p. 33. Fries syst. myc. 1. p. 452.

2. *A. EPIPHYLLA* (Pers. champ. com. 67; myc. eur. 1. p. 84.) tenuissima glabra cinerascens irregulariter effusa. — Ad folia Quercina exsiccata. — Unc. 1. lata.
3. *A. LANUGINOSA* (Pers. myc. 1. p. 85.) latè effusa lanuginosa albida, pellicula sporulifera brevi. — Ad muscos, folia putrida, et sub cortice ramorum dejectorum in Gallia boreali ex cl. Desmazières. — Margo latus hyssinus etiam subfibrillosus.
4. *A. VELUTINA* (Pers. l. c.) longitudinaliter effusa pulverulento-velutina disco carneo-rufa, margine hyssino albo-fibrillis rectis ant subdivergentibus. — Ad ligna exsiccata Quercina. — Thelephora velutina DC. fl. fr. 5. p. 33. — Ultra 2 unc. longa $\frac{1}{2}$ unc. lata.
5. *A. SERICEA* (Pers. l. c.) suborbicularis disco reticulato contexto pallido fuscescente, fibrillis marginalibus sericeis rectis subdivergentibus sulphureis. — Ad trunco Arietinos et terram. — Thelephora sulphurea Pers. syn. 579. DC. fl. fr. 5. p. 34. — Hanc cum Sporotricho croceo conjungit cl. Fries forsitan non immerito.
6. *A. CITRINA* (Pers. champ. comest. p. 67.) terrestris fulvo-sulphurea primò subfibrillosa. — Suprà terram et muscos ad pedes arborum. — Gregaria sed vix ultra $\frac{1}{2}$ unc. lata et lin. crassa.
7. *A. FLAVESCENS* (Dub. mss.) flavescens tenera adpressa, fibrillis marginalibus cylindricis tenuissimis. — Ad trunco humidos et folia delapsa in sylvis. — Byssus flavescens DC. fl. fr. 2. p. 67. — An a prioribus distincta?

XLI. DEMATIUM Link obs. 1. p. 19; sp. pl. 6. p. 1: p. 131. Ad. Brongn. cl. champ. p. 55 non Pers. — Racodium et Xylostromatis sp. Pers.

Filamenta ramosa decumbentia intertexta non septata opaca persistenta. — Fungi effusi tomentum referentes. — Plerasque hujus generis species habet cl. Fries et merito, ut variorum generum status steriles aut imperfectos.

1. *D. RUPESTRE* (Linck obs. 1. p. 19.) effusum crassum, filamentis dense intricatis aterrimis crassitie inaequalibus. — Ad rupes terrâ humidâ instratas. — Nees fung. f. 73. Racodium rupestre Pers. Byssus rupestris DC. fl. fr. 2. p. 592.
2. *D. ALUTA* (Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 134.) latè expansum densius contextum cinnamomeum nitidum. — Intrà arbores cavas et ad trabes cryptarum. — Racodium Aluta Pers. syn. 702; myc. 1. p. 69. Byssus aluta DC. fl. fr. 5. p. 10.
3. *D. GIGANTEUM* (Chevall. fl. par. 1. p. 79.) diffusum latissimum coriaceo-suberosum pallide alutaceum flexile. — In arborum fissuris internis. — Xylostroma giganteum Tode meck. 1. f. 6. f. 51; Sow. fung. t. 358. X. corium Pers. myc. Byssus gigantea DC. fl. fr. 2. p. 67. — Nunc ligno arctè adnatum nunc liberum ad longitudinem nonnunquam insignem extensum.
4. *D. SUBCORTICALE* (Linck l. c.) latè effusum subtenue interruptum ferrugineum superficie subunita demum canescente. — Inter corticem et lignum. — Racodium subcorticale Pers. myc. 1. p. 69. — Substantia interna lanuginosa; demum in pulverem parùm soluta.
5. *D. BADIUM* (Dub. mss. non Linck.) longitudinaliter effusum filis densis parallelis contextum. — Ad ramos exsiccatos propè Parisios ex cl. Pers., Beauvais ex cl. Graves. — *D. castaneum* Linck l. c. Racodium badium Pers. — Ferrugineo-badium; filamenta ad marginem sèpè in superficiem unitam condensantur.
6. *D. FUSCUM* (Dub. mss. non Linck.) sublate effusum tenuissimum dense contextum opacum fusco-badium. — Ad muros in cellis Parisiorum ex Pers. — *D. fusco-badium* Linck l. c. Racodium fuscum Pers. myc. 1. p. 70. — 2 unc. latum, 4 unc. longum, filamentis non distinctis.

934 ACOTYL. SEU CELLULARES.

7. *D. LINTACEUM* (Linck sp. pl. 6. p. 1. p. 136.) dilatatum subimembranaceum liberum amane pallidum. — In Gallia ex cl. Pers. sed locus natalis proprius ignotus. — *Textura linteae* ferè.
8. *D. PAPYRACEUM* (Linck l. c.) subtenue latè effusum ligno arctè adhærens. — Suprà et intrà ligna cariosa circa Beauvais (cl. Graves). — *Racodium papyraceum* Pers. Sow. eng. fung. t. 387. f. 10. — Primo tenuissime araneosum dein papyraceo-pannosum.
9. *D? CINNABARINUM* (Pers. syn. 697?) cinnabarinum, filamentis longis tenuibus subintertextis. — Ad ligna semipatrida. — *Byssus rubra* DC. fl. fr. 2. p. 68. †

XLIV. BYSSUS Humb. frib. p. 65. Linck obs. Ad. Brongn. in dict. cl. 2. p. 596.
— *Hypha* Pers. Linck sp. pl. — *Byssi* sp. L. DC.

Filamenta ramosa decumbentia intertexta tenuissima non septata semipellucida ad tactum diffluentia fugacissima. — Fungi subterranei aut in locis suffocatis et cryptis viventes, plerumque albi. — Genus obscurum.

1. *B. floccosa* (Mart. erlang. p. 345.) subrotunda indeterminata niveo-ramosissima, filis simplicissimis confertis parallelis. — In cellis et fodinis. — *Hypha bombycina* Pers. myc. 1. p. 63. — Dill. musc. t. 1. f. 9.
2. *B. elongata* (DC. fl. fr. 2. p. 67.) alba, filamentis tenuissimis in fasciculos subcylindricos ramosos contextis. — In cryptis. — *Hypha elongata* Pers. l. c. — Interdum 1-2-pedalis.
3. *B. ARGENTEA* (Dub. mss.) alba fibroso-membranacea arachnoidea, filamentis e centro radiantibus in ramos tenuissimos divisis. — In domibus ad parietes in locis humidis et suffocatis. — *B. parietina* & *argentea* DC. fl. fr. 2. p. 66. — *Hypha argentea* Pers. — Vaill. bot. t. 8. f. 1. — Elegans, latitudine palmari.
4. *B. SULPHUREA* (Dub. mss.) mollissima dilatata indeterminata citrino-sulphurea, exsiccata membranacea sordidè carne. — In locis humidis et suffocatis Bellovaci (cl. Graves). — *Hypha sulphurea* Pers. ined. ex cl. Graves in litt.

XLV. OZONIUM Linck obs. 1. p. 19; sp. pl. 6. p. 1. p. 137. — *Ozonii* sp. Pers.
— *Byssi* sp. DC.

Filamenta ramosa decumbentia in ramos majores minoresque apposita; majores crassiores teretes non septati; minores tenuiores septati. — Fungilli plus minus effusi tomentum referentes flavi aut fulvi in locis obscuris nascentes. — Fungorum perfectiorum status juvenilis aut degener ex cl. Fries.

1. *O. AURICOMUM* (Linck ll. cc.) densum effusum incumbens nitidum, filamentis ramosissimis vitellinis subrigidis divergentibus extimis tenuissimis. — In arboribus cæsis putrescentibus sub cortice ad radicem. — Grev. crypt. fl. t. 260. *O. fulvum* Pers. myc. 1. p. 87. *Rhizomorpha capillaris* Roth in Ust. ann. bot. 1. t. 1. f. 3. *Ceratonema capillare* Pers. myc. 1. p. 48. *Byssus barbata* eng. bot. t. 701. *B. aurantiaca* DC. fl. fr. 2. p. 68. — Stratum valde expansum plus minus densum.
2. *O. AUREUM* (Dub. mss.) pulvinatum rotundum convexum molle subconfluens pulverulentum, filamentis flexosis ramosis primo aureis dein flavescientibus, ramis elongatis patentibus rigidiusculis. — Ad muscos et lapides præsertim calcarios. — *Byssus aurea* Linn. DC. fl. fr. 2. p. 68. *Dematium petræum* Pers. *Trentepohlia aurea* Mart. Agardh. *Amphiconium petræum* Nees. — Dill. musc. t. 1. f. 16. — Mich. t. 89. f. 2.
3. *O. STUPOSUM* (Pers. myc. eur. 1. p. 87.) magnum subimplexum descendens, filamentis ramosis umbrinis hinc inde fulvis glabris extimis tenuioribus. — Ad trabes putrescentes in locis subterraneis. — *Dematium stuposum* Pers. syn. 696. *Byssus intertexta* DC. fl. fr. 2. p. 68. — Lougè latèque in rimis trabinum descendens, hinc inde in aurantiacum vergens.

4. *O. CANDIDUM* (Mart. erlang. p. 358.) *incumbens candidum tenerum, filamentis radiatim expansis ramosissimis albis.* — *Ad folia et ramos deciduos.* — *Himantia candida* Pers. syn. 703. *Grev. cr. fl. t. 228. Byssus candida* Huds. DC. fl. fr. 2. p. 66. — *Dill. muse. t. 1. f. 15. A.* — *Eleganter expansum in ramos ramulosque stellatum et penicillatim expansos, ligna tegens.*

XLVI. HIMANTIA Pers. syn. 703; myc. eur. 1. p. 88. Ad. Brongn. in dict. class. 8. p. 199.

Filamenta repentina corporibus subjacentibus arctè adpressa, divergenti-rámosa vix intertexta non septata opaca persistentia; sporulæ ignota. — Genus valdè artificiale complectens species quæ probabiliter nihil sunt nisi status imperfectus aut degener aliorum Generum, in futurum monentibus jàm pluribus Mycologis paulisper delendum et hîc ut observationum ope celerius evanescat expositum.

1. *H. CELLARIS* (Pers. myc. eur. 1. p. 89.) magna ramosissima villosa nigrescenti-umbrina. — *Ad muros in cellis Galliæ borealis ex cl. Desmaz.* — *Aliquando bipedalis; rami divergentes in individuis majoribus in membranam coaliti.*
2. *H. SUBCORTICALIS* (Pers. myc. eur. 1. p. 92.) primò villosa divergenti-radians demùm in membranam latam glabram coalescens. — *Inter corticem et lignum ramorum putridorum in locis humidis jacentium circa Beauvais ex cl. Graves.*
3. *H. ORNITHOGALA* (Pers. l. c.) sublatè incrustans farinosa fibrillas nonnullas liberas exserens. — *Ad arundines in sylvâ Chantilly (cl. Graves).* — *Vix vegetabile.*

Ordo CXXV. ALGÆ DC. fl. fr. 2. p. 2. Agardh syst. alg. 1824 excl. plur. gen. — Thalassiphyta Lamour. ann. mus. hist. nat. t. 20. — Hydrophyta Lamour. Bory de St.-Vincent in dict. class. t. 8. p. 435.

Plantæ aquaticæ rariùs terrestres, gelatinosæ membranaceæ vel coriaceæ, filamentosæ laminosæ aut frondosæ, colore virides purpureæ vel olivaceæ, articulatæ vel continuæ, contextu cellulozo aut vasculari-cellulozo constantes poris corticalibus vasis lymphaticis spiralibus et propriis carentes, organis radicibus caulis et foliis vascularium analogis et insuper vesiculis ad decompositionem aeris aut aquæ inservientibus sæpè instructæ, gongylos aut conceptaculis nunc externis nunc inclusis involutos aut superficie iinspersos foventes. — Potius, jàm monentibus cl. Agardh plerisque aliis botanicis, classis quam ordo.

§. I. FRONDOSÆ.

Trib. I. FUCACEÆ Lamour. ess. thalass. in ann. mus. t. 20. p. 35. dict. class. t. 7. p. 66. excl. gen.

Frondes olivaceæ aut olivaceo-virides, exsiccatione plerumque nigrescentes, coriaceæ aut cartagineæ, vasculari-cellulares

936 ACOTYL. seu CELLULARES.

longitudinaliter laceratae structuram fibrosam simulantes, continuæ, cylindricæ aut compressæ in ramos ramulosve expansæ. Conceptacula inflata formâ varia, plerumque ad extremitatem frondis aut ramorum sita. — Omnes marinæ.

I. SARGASSUM Agardh syst. alg. p. 293. Gaillon res. thalass. p. 7. et in dict. sc. nat. t. 47. p. 370. — Fuci sp. Auct.

Frondes ramosæ cylindricæ aut compressæ in ramulos compressos foliiformes distinctos sessiles aut petiolatos nervis mediis instructas divisæ; vesiculæ axillares petiolatæ; conceptacula tuberculiformia in racemos axillares disposita apice pertusa.

1. S. VULGARE (Ag. syst. alg. 293.) fronde compressa, ramulis foliiformibus linear-lanceolatis serratis, vesiculis sphæricis muticis, conceptaculis cylindraceis racemosis. — In Oceano natans. — Fucus natans Turn. fuc. t. 46. DC. fl. fr. 2. p. 26. F. salicifolius Poir. Lam. ess. thalass. in ann. mus. hist. nat. t. 20. t. 1. f. 2. — Barr. ic. t. 1122. (v. v.)
2. S. BACCIFERUM (Ag. l. c. p. 294.) fronde tereti ramosissimâ, ramulis foliiformibus linearibus serratis, vesiculis sphæricis mucronatis, petiolis teretibus. — Ad littora Oceani propè Dieppe a fluctibus depulsum legit cl. Gaillon ex cl. Lenormand. — Desmaz. crypt. exs. n. 157. Fucus bacciferus. Turn. fuc. t. 47. F. natans Esper. t. 23. — Petiv. op. 2. t. 19. f. 257. (v. s.)
3. S. LINIFOLIUM (Ag. l. c. 300.) fronde teretiusculâ muricata, ramulis foliiformibus linearibus angustis subintegerrimis, vesiculis sphæricis petiolo plano suffultis, conceptaculis elongatis cylindraceis bifurcatis. — Ad littora maris Mediterranei propè Massiliam (cl. Solier). — Fucus linifolius Turn. t. 168. F. acinarius Esp. t. 65. (v. s.)

II. CYSTOSCIRA Ag. sp. alg. p. 60. syst. alg. 281. Gaillon res. thalass. p. 8. — Fuci sp. Auct.

Frondes ramosæ cylindricæ aut rariū compressæ in ramulos sessiles minutos lineares aut filiformes divisæ; vesiculæ ramis aut ramulis innatæ; conceptacula terminalia subglobosa granulosa apicibus attenuata mucronata aut denticulata.

1. C. FIBROSA (Ag. syst. alg. 285.) fronde lignosâ tereti ramosâ, ramis in ramulos filiformes ramosissimos inermes obtusos divis, vesiculis innatis magnis ovato-ellipticis subconcrenatis, conceptaculis filiformibus terminibus. — Ad littora Oceani. — Chauv. alg. norm. n. 50. Fucus fibrosus Stackh. ner. Brit. t. 14. Turn. fuc. t. 209. eng. bot. t. 1969. F. abrotanoides Gmel. Esp. fuc. t. 29. A. (v. v.)
2. C. CRINITA (Dub. mss.) stipite tuberibus nodoso glabro, fronde ramosissimâ ramis intertextis filiformibus teretibus in ramulos divaricatos tereti-compressos decomposito-dichotomos abenutibus, vesiculis minimis globosis aut lanceolato-globosis moniliformibus, conceptaculis linear-lanceolatis solitariis. — Ad littora Corsicæ (cl. Soleiro), Niceæ (cl. Stire). — Fucus crinitus Desf. atl. 2. p. 425. Lam. in ann. mus. 20. p. 38. non Gmel. t. 18. f. 2. (v. s.)
3. C. BARBATA (Ag. syst. 283.) stipite glabro basi nodoso, fronde ramosissimâ, ramis filiformibus dichotomis in ramulos decomposite pinnatos inermes divis, vesiculis lanceolatis concatenatis, conceptaculis terminalibus lanceolatis mucronatis. — In mari Mediterraneo ad littora Armoraciæ. — F. barbatus Stack. ner. t. 14. Turn. t. 250. eng. bot. t. 2179. F. abies E. Bartol. am. t. 4. f. 2. 6. F. séniculacens Gmel. t. 2. A. f. 2. non Linu. — Barr. ic. t. 1290. f. 1. (v. s.)
4. C. GRANULATA (Ag. sp. alg. 55.) stipite basi tuberibus nodoso glabro, fronde

ramosissimâ, ramis distinctis basi subteretibus in ramulos erectos compressos decomposito-pinnatos abeuntibus, vesiculis lanceolatis moniliformibus, conceptaculis linearisubulatis sparsis aut congestis. — Ad littora Neustriæ (cl. Chauvin et Lenorm.), Rupellæ (cl. d'Orbigny). Chav. alg. norm. n. 25. — F. granulatus Linn. sp. 1629. Turn. t. 131. F. concatenatus Linn. Cyst. concatenata Ag. (v. s.)

5. C. ERICOIDES (Ag. syst. alg. 281.) fronde lignosâ tereti apice obsitâ ramis cartilagineis elongatis varie divisis apices versus vesiculiferis fructiferisque undique vestitis ramulis subulatis simplicinseculis erecto-patentibus imbri-catis, vesiculis ellipticis subterminalibus coronatis solitariis, conceptaculis cylindraceis basi ramulorum ad ramorum apices innatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. ericooides trans. Linn. 3. p. 130. DC. fl. fr. 2. p. 24. Turn. t. 191. eng. bot. t. 1968. F. tamariscifolius Stackh. t. 11. — Gmel. t. 11. f. 2. (v. v.)
£. selaginoides (Turn.) fronde tenui abbreviatâ, ramulis remotiusculis, vesiculis nullis. — F. selaginoides Linn. Lam. (v. v.)
6. C. SEDOIDES (Ag. l. c.) fronde lignosâ tereti erectâ, ramis cartilagineis tenuibus alternis ramosis simplicibusve, undique vestitis ramulis subulatis geminatis furcatisve subimbricatis aut patentibus basi internâ biglandulosis, vesiculis parvis ovatis basi aut medio ramulorum innatis. — In mari Mediterraneo ad littora Galloprovinciæ. — F. sedoides Desf. atl. t. 260. DC. fl. fr. 2. p. 24. (v. v.)
7. C. THESIOPHYLLA (Dub. mss.) fronde lignosâ erectâ ramoso-dichotomâ basi tereti-augulatâ, ramis erectis fastigiatis elongatis basi subcompressis dein usque ad apicem vesiculis parvis subglobosis interrupte concatenatis moniliformibus ramulis anguste linearibus compressis obtusis hinc indè obsitis. — Ad littora Oceani circâ Bayonne (cl. Lamouroux). — C. scoparia Bory ex cl. Lenorm. F. thesiophyllus Lamour. (v. s.)
8. C. DISCORS (Ag. syst. 284.) stipite exasperato; fronde ramosissimâ, ramis distichis basi compressis dilatatis subpellucidis serrato-crenatis in ramulos erectos basi dilatatos apice filiformes teretes acutos decomposito-pinnatos abeuntibus, ramulis extremis vesiculosâ, vesiculis lanceolatis subsolitariis emittentibus receptacula linearis-lanceolata. — In mari Mediterraneo et Oceano. — F. discors Linn. DC. fl. fr. 2. p. 25. Esp. t. 26. Stackh. t. 17. eng. bot. t. 2131. F. fæniculaceus Turn. α et γ excl. syn. Lam. (v. v.)
9. C. ABROTANIFOLIA (Ag. syst. 284.) stipite glabro, fronde ramosissimâ, ramis distichis basi compresso-dilatatis subpellucidis integerrimis in ramulos erectos filiformes obtusos decomposito-pinnatos subteretes abeuntibus, ramulis extremis vesiculosâ, vesiculis ellipticis solitariis emittentibus receptacula spiniformia conglomerata. — In mari Atlantico, Mediterraneo. — F. abrotanifolius Linn. sp. 1629. Stackh. t. 14. DC. fl. fr. 2. p. 25. eng. bot. t. 2130. F. fæniculaceus £. Turn. F. fimbriatus Desf. atl. 2. t. 259. Lamour. DC. fl. fr. 2. p. 33. (v. v.)

III. FUCUS Grev. fl. edin. 2. p. 283. — Halidrys et Fucus Lyngb. Gaillon. — Sili-quaria Fucus et Nodularia Lamour. in dict. class. — Fuci sp. Linn. DC. Ag. etc.

Frondes ramosæ mox compressæ et hinc indè dilatatae, mox alatae; vesiculae nullæ aut ramis innatae; conceptacula granulosa simplicia aut rarius basi confluentia compressa terminalia.

Sect. I. HALIDRYS Lyngb. tent. p. 37. Gaillon, res. thalass. p. 8.

Frondes compressæ hinc indè in ramulos distinctos enerves dilatatae; vesiculae siliquose aut ovato-elongatae; conceptacula pedunculata.

1. F. SILIQUOSUS (Linn. sp. 1629.) fronde compressâ, ramis distichis alternis, ramulis planis linearibus integris, vesiculis pedunculatis oblongis articulato-nodosis, conceptaculis pedunculatis lanceolatis terminalibus. — In Oceano. — Gmel. fuc. t. 2. B. DC. fl. fr. 2. p. 21. Turn. t. 159. Halidrys siliquosa

938 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Lyngh. hydr. t. 8. C. Cystoscira siliquosa Ag. Chauvin alg. norm. n. 73.
(v. v.)

2. F. nodosus (Linn. sp. 1628.) fronde compressâ subdichotomâ vesiculis maximis innatis ovato-oblongis hinc inde inflatâ, ramulis planis alato-dilatatis serratis, conceptaculis lateralibus distichis pedunculatis pyriformibus. — In Oceano. — Gmel. suc. t. 1. B. f. r. DC. fl. fr. 2. p. 22. Stackh. t. 10. Turn. t. 91. Halidrys nodosa Lyngh. t. 8. B. (v. v.)

Sect. II. FUGASTRUM. — *Fucus Lyngh. Lamour. Gaill.*

Frondes compressæ aut alato-dilatatae in ramulos non dilatatae, vesiculæ nullæ aut globosæ, conceptacula sessilia.

3. F. TUBERCULATUS (Huds. ang. p. 588.) fronde coriaceo-cartilagineâ subdichotomâ tereti-compressâ ecostatâ, angulis ramificationum obtusis, vesiculis nullis, conceptaculis terminalibus cylindraceis obtusis. — In Oceano, ad littora Armoraciæ Neustriæ. — Stackh. ner. t. 9. Esp. t. 124. Turn. t. 7. eng. bot. t. 726. F. bifurcatus With. brit. 4. t. 7. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 23. excl. syn. Gmel. (v. s.)

4. F. CANALICULATUS (Linn. syst. nat. p. 812.) fronde cartilagineâ dichotomâ compressâ ecostatâ linearî canaliculatâ, vesiculis nullis, conceptaculis terminalibus oblongis obtusis tuberculatis plerumque basi confluentibus. — In Oceano. — Gmel. suc. t. 1. A. f. 2. eng. bot. t. 823. DC. fl. fr. 2. p. 21. Turn. t. 3. Desmaz. crypt. exs. n. 14. (v. v.)

5. F. CERANOÏDES (Linn. sp. 1626.) fronde cartilagineâ planâ alato-dilatata linearî costatâ dichotomâ integrâ, vesiculis nullis, conceptaculis ovalibus tumidis tuberculatis ad apicem acutis aut subattenuatis basi plerumque confluentibus. — Ad rupes Oceani. — Stackh. ner. t. 13. DC. fl. fr. 2. p. 19. Turn. t. 89. eng. bot. t. 2115. Ag. syst. 277. excl. var. γ . F. distichus Esp. t. 139. — An a sequenti satis distinctus? (v. v.)

6. F. VESICULOSUS (Linn. sp. 1626.) fronde cartilagineâ planâ alato-dilatata linearî costatâ dichotomâ integerrimâ, vesiculis sphæricis frondi lateraliter innatis geminis, conceptaculis ovalibus tumidis tuberculatis obtusis plerumque confluentibus. — Ad rupes submarinas frequentissimus. — Stackh. ner. t. 2. Esp. t. 12-13. Turn. t. 88. DC. fl. fr. 2. p. 18. Desmaz. crypt. exs. n. 158. — Moris. t. 15. t. 8. f. 5. (v. v.)

β . spiralis (Turn.) fronde spiraliter tortâ, vesiculis nullis, conceptaculis subrotundis. — F. spiralis Linn. sp. 1627. DC. fl. 2. p. 19. Stackh. t. 5. — Moris. s. 15. t. 8. f. 10. (v. v.)

γ . acutus (Turn.) fronde angustâ vesicalifera, apicibus productis lanceolatis. — F. spiralis Esp. t. 14 et 72. (v. s.)

δ . angustifolius (Turn.) fronde angustâ, vesiculis plerumque nullis, conceptaculis subpedunculatis elongatis linearî-lanceolatis acuminatis. — F. longifructus DC. fl. fr. 2. p. 19. (v. s.)

ϵ . Sherardi (Turn.) fronde angustâ humili, vesiculis nullis, conceptaculis brevibus oblongis. — F. Sherardi Stack. t. 13. — Gm. t. 20. f. 39 et 40. (v. s.)

7. F. SERRATUS (Linn. sp. 1626.) fronde cartilagineâ planâ alato-dilatata linearî costatâ dichotomâ serrato-dentatâ punetata, vesiculis nullis, conceptaculis planis tuberculatis obtusis serratis. — In maribus frequens. — Stackh. ner. t. 1. DC. fl. fr. 2. p. 20. Turn. t. 90. eng. bot. t. 1221. Desmaz. crypt. exs. n. 159. (v. v.)

IV^e? DESMARETIA Lamour. ess. l. c. p. 43. Gaillon res. thalass. p. 11 et in dict. sc. nat. t. 13. p. 104. — Desmia Lyngh. — Sphorochui sp. Ag.

Frondes sessiles angustæ lineares planæ ramosissimæ, ramis ramulisque in petiolum quasi angustatis spinulis (oculo armato) septatis marginatis; conceptacula ignota.

1. *D. DRESNAGI* (Lamour. in dict. sc. nat. ic.) fronde subcoriacea latiori plana membranacea obsoleta costata dentata bipinnata, ramis ramulisque oppositis ellipticis obtusis basi attenuatis. — Ad littora Armoraciæ ex cl. Chauvin. — *Fuci herbacei* Turn. t. 99. varietatem censem cl. Agardh et Chauvin.
2. *D. LIGULATA* (Lamour. ess. l. c.) fronde plana membranacea enervi subtriplicato-pinnata, ramis ramulisque oppositis distichis linear-lanceolatis basi attenuatis. — In Oceano. — *Desmia ligulata* Lyngb. t. 7. *F. ligulatus* Lightf. scot. 2. t. 29. DC. fl. fr. 2. p. 34. Turn. t. 98. *Sporochnus lignatus* Ag. *F. herbaceus* Huds. non Turn. (v. v.)
3. *D. ACULEATA* (Lamour. l. c.) fronde cartilaginea subcompressa linearis angustissima ramosissimus ramis sparsis alternis elongatis compressis acutis, ramis extremis margine primum penicilliferis mox spinulosis, spinis approximatis subulatis erectis. — In Oceano. — *Sporochnus aculeatus* Ag. Chauvin alg. norm. n. 46. *Fucus aculeatus* Fl. dan. t. 355. Stackh. ner. t. 8. DC. fl. fr. 2. p. 34. Turn. t. 187. *G. muscoides* Linn. sp. 1630. Gmel. t. 12. — *Moris. s. 15. t. 9. f. 4.* (v. s.)
4. *D. VIRIDIS* (Lamour. ess. l. c.) fronde filiformi multoties pinnata, ramis numerosissimis oppositis capillaceis extremis tenuissimis. — In Oceano ad littora Armoriciæ Calvadosii. — *F. viridis* fl. dan. t. 86. Turn. t. 97. Stackh. t. 17. eng. bot. t. 1669. *Sporochnus viridis* Ag. syst. 259. (v. s.)

V. FURCELLARIA Lamour. ess. p. 45. Agardh. syst. p. xxxvii. — *Fuci* sp. Auct.

Frondes radicibus fibrosis donatae cylindricaæ dichotomæ; rami apice in conceptacula siliquiformia subulata simplicia aut ramosa tumescentes.

1. *F. LUMBRICALIS* (Lamour. l. c.) fronde cartilaginea tereti dichotoma fastigiatæ, angulis ramificationum acutis, apiceibus bifurcatis elongatis teretibus obtusis. — In Oceano. — *Fucus lumbricalis* Gmel. fac. t. 6. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 22. Turn. t. 6. *Fucus furcellatus* Linn. — *Moris. s. 15. t. 9. f. 4.* (v. v.)
f. fastigiata (Turn. t. 6. f. b.) apiceibus compressis ovato-lanceolatis abbreviatis acutis diaphanis. — *Furc. fastigiata* Lamour. l. c. *Fucus fastigiatus* Stackh. t. 14. DC. fl. fr. 2. p. 35. — *Moris sect. 15. t. 9. f. 9.* (v. s.)

Trib. II. *LAMINARIEÆ* Bory dict. cl. t. 9. p. 190. — *Fucacearum* gen. Lamour.

Frondes caulescentes olivaceæ aut olivaceo-virides exsiccatione plerumque nigrescentes, coriaceæ aut membranaceæ, vasculari-cellulares continuæ, compressæ aut in laminam expansæ, simplices aut ramosæ. Conceptacula parva per totum frondem sparsa. — Omnes marinæ:

VI. HIMANTHALIA Lyngb. tent. p. 36. t. 8. Gaill. res. thal. p. 9.

Frons compressa dichotoma e basi cyathiformi erumpens, ramis erectis linearibus elongatis obtusis; vesiculae nullæ; conceptacula parva tuberculiformia numerosa per totam frondem sparsa.

1. *H. LOREA* (Lyngb. l. c.) — In Oceano. — *F. loreus* Linn. syst. nat. 813. Stackh. t. 10. DC. fl. fr. 2. p. 23. eng. bot. t. 569. Turn. t. 196. Chauv. alg. norm. n. 74. (v. v.)

VII. LAMINARIA Lamour. ess. thal. p. 40. — *Orgya* et *Laminaria* Bory.

Frondes stipitatæ radicibus ramosis et fibrosis rupibus adnatae dein in formam laminæ dilatatae membranaceæ aut coriaceæ; conceptacula granulosa immersa in laminâ frondis soros irregulares formantia.

940 ACOTYL. SUE CELLULARES. LAMINARIA.

Sect. I. ORGYA Stackh. ner. brit. t. 20, Bory in dict. class. 12, p. 352.
— Agarum Bory l. c. 9. p. 153.

Nervi exserti frondem usque ad apicem percurrentes.

1. L. ESCULENTA (Lamour. in herb. Dub. Ag. syst. p. 269.) fronde membranacea plana costata simplici lato-lineari integerrimâ stipitatâ, stipite abbreviato tereti pinnato, piunis carnosis distichis oblongis enervis. — In Oceano ad oras Armoricae. — F. esculentus Linn. eng. bot. t. 1759. Turn. t. 114. Lightf. scot. t. 88. F. fimbriatus Gmel. t. 29. f. 1. Orgya esculenta Bory. (v. s. D.)

Sect. II. LAMINASTRUM Dub. mss. — Laminaria Bory dict. cl. 9.
p. 187.

Frondes enerves.

* Saccharinæ Bory. Radice fibrosa ramosa.

2. L. SACCHARINA (Lamour. ess. l. c. p. 42.) stipite tereti fronde membranacea coriacea oblongo-lanceolata longissimâ acutâ margine undulata aut crispâ basi abbreviatâ interdum subcordata. — In Oceano. — Lyngb. t. 5. F. saccharinus Linn. Gmel. t. 27 et 28. Turn. t. 163. Ulva saccharina DC. fl. fr. 2. p. 15. (v. v.)

β. cornea, fronde cornea breviori vix undulata. — L. cornea Bory. (v. v.)
γ. longipes (Chauv.) fronde angustiori pergamenea, basi elongata attenuata. — Ad littora Oceani rarius. — L. longipes Bory. (v. s.)

δ. viridissima (Chanvin) fronde membranacea tenui viridi, basi cuneato-attenuata. — L. viridissima Bory. (v. s. in herb. Chauv.)

3. L. PHYLLITIS (Lamour. ess. l. c. ex specim. ab ipso acceptis non Turn.) radice fibrosa elongata, stipite compresso, fronde tenerrima membranacea oblongo-lanceolata undulata (oculo-armato) reticulata basi abrupte attenuata. — In Oceano. — Chauv. alg. norm. n. 71. F. Phyllitis Stackh. ner. t. 9. Ulva Phyllitis DC. fl. fr. 2. p. 13. Lam. papyrina Bory. — Fusco-viridis. (v. v.)

4. L. DEBILIS (Ag. syst. alg. p. 273.) radice minimâ tuberculata, stipite compresso subnullo, fronde tenerrima membranacea linearis-lanceolata vix undulata non reticulata basi acuminato-attenuata. — In mari Mediterraneo et Oceano rarius. — Grev. crypt. fl. t. 277. F. Phyllitis Turn. t. 164 non Stackh. Lam. Iorea Bory? — Læte viridis. (v. v.)

β. dictyotoides, fronde punctata apice obtusa aut in 2-4 segmenta divisâ.
— Ad littora Oceani circa Cherbourg (cl. Chauvin). — Zonaria plantaginea Ag. Ulva plantaginea eng. bot. (v. s.)

5. L. DIGITATA (Lamour. l. c.) stipite tereti, fronde cornea coriacea palmato-digitata basi rotundata aut subcordata. — Ad littora Oceani. — F. digitatus Linn. Stackh. t. 3. Turn. t. 162. eng. bot. t. 2274. Ulva digitata DC. fl. fr. 2. p. 16. Lam. conica Bory. (v. v.)

β. palmata, fronde cornea coriacea in segmenta numerosa palmata basi cordata. — L. palmata Bory. (v. s.)

** Cepoideæ (Bory). Radice bulbosa.

6. L. BULBOSA (Lamour. l. c.) stipite compresso crasso elongato simplici, fronde cornea coriacea flabelliformi in segmenta linearia longissima palmata basi conica. — In Oceano. — F. bulbosus Linn. Ulva bulbosa DC. fl. fr. 2. p. 16. excl. syn. nonn. (v. v.)

β. Turneri, stipite compresso abbreviato dilatato difformiter alato, fronde in segmenta lanceolato-linearia palmata basi cordata. — Ad littora Oceani propè Cherbourg. — L. Turneri Bory. F. bulbosus Turn. t. 161. eng. bot. t. 1760. Stackh. t. 4. (v. s.)

γ. punctata, bulbo parvo, stipite brevissimo compresso basi dilatato, fronde membranacea-papyracea pellucida punctata ovato-aut lanceolato-oblonga utrinque attenuata simplici aut apice in 2-3 segmenta divisâ,

— Ad littora Nicaeæ (Stire), Vasconia propè Royan (cl. Desmodulins), Vindilis ex cl. Bory. — L. punctata Bory. — Viridi-flavescens. (v. s.)

Trib. III. FLORIDÆ Lamour. ess. thal. l. c. p. 125. dict. class. 6. p. 547.

Frondes coloratæ purpureæ rubræ rosæ rariùs fuscæ aut virides exsiccatione colorem subservantes, coriaceæ, membranaceæ aut subgelatinosæ, e contextu cellulari minimo æquali conflatæ, continuæ, cylindricæ compressæ aut in laminam foliiformem expansæ. Conceptacula frondi adnata aut innata biformalia, illa rotunda tuberculiformia, hæc punctiformia innata rariùs in extremitate ramorum dilatatâ et clavulas aut racemos globulosos formante congesta. — Omnes marinæ.

VIII. DUMONTIA Lamouroux. ess. l. c. p. 133. dict. class. 5. p. 642. Gaillon res. thalass. p. 16. — Halymenia sp. Ag.

Contextus cellularis fugacissimus; frons subgelatinosa fistulosa ramosa enervis; conceptacula punctiformia solitaria sparsa innata.

1. D. SOBOLIFERA (Lamour. l. c.) fronde membranacea filiformi tubulosâ undique proliferâ, ramulis horizontalibus tubulosis confertis. — In Oceano ad littora Galliæ ex Lamour. — Ulva sobolifera fl. dan. t. 356. Fucus ramentaceus Turn. t. 149. Halymenia ramentacea Agard. syst. 245. †.
2. D. CALVADOSII (Lamour. dict. cl. t. 5. p. 643. dict. class. alg. ic.) fronde gelatinosâ cylindrica ramosâ, ramis elongatis patentibus vagis subsimplicibus undulatis linearibus obtusis. — Ad littora Calvadosii (cl. Lamouroux). — Rubro-fusca. (v. s. D.)
3. D. VENTRICOSA (Lamour. ess. thalass. t. 4. f. 6.) fronde tubulosâ membranacea sparse ramosâ, ramis erectis ramosis, ramulis ventricosis abbreviatis obtusis. — In mari Mediterraneo ad littora Galliæ ex cl. Lamour. (Albert in herb. Lamour. ex cl. Chauvin.) †.
4. D. INCRASSATA (Lamour. l. c.) fronde membranacea filiformi tubulosâ sub-pinnatâ, pinnis alternis elongatis fastigiatis simpliciusculis basi attenuatis. — Ad littora provinc. boreali-occidentalium. — Ulva incrassata fl. dan. t. 653 et 1664. Ulva contorta DC. fl. fr. 2. p. 10. Fucus contortus Gmel. fuc. t. 22. f. 1. Gastridium filiforme Lyngb. t. 17. Halymenia filiformis Ag. syst. 245. H. purpurascens Ag. Grev. crypt. fl. t. 240. — Viridis aut fusco-rubra. (v. v.)
5. D. INTERRUPTA (Lamour. in dict. class. 5. p. 642.) fronde gelatinoso-coriacea dichotoma, ramis filiformibus extremis furcato-forcepatis, segmentis membranaceis dilatatis elliptico-lanceolatis obtusis. — In Oceano mari Mediterraneo propè Massiliam (cl. Solier). — Dum. triquetra Lamour. ess. Ulva interrupta Poir. DC. fl. fr. 5. p. 3. U. furcellata eng. Bot. t. 1881. Halymenia furcellata Ag. (v. s.)

IX. HALYMENTIA. — Delesseriæ sp. Lamour. ess. — Halymenia, Erinacea et Dawsonia Lamour. dict. class. — Grateloupia, Halymenia, Delesseriæ, Sphaerococci sp. Ag. — Halymenia, Dawsonia et Grateloupia Gaill.

Stipes coriaceus aut submembranaceus plus minus ramosus rarius sub-simplex dilatatus in laminam foliiformem enervim aut basi obsolete nervosam plerumque ciliatam aut appendiculatam; fructificatio uniformis, rarius biforis, conceptaculis aut punctiformibus laminae aut processibus frondis immersis aut rotundatis tuberculiformibus sessilibus.

Sect. I. GRATELOUPIA Ag. syst. alg. p. 241.

Frons cartilaginea ramosissima linearis angusta pinnata, ramis basi in petiolum quasi angustatis.

1. H. FILICINA (Lamour. in dict. cl. 5. p. 387.) fronde cartilaginea subgelatinosa plana enervi linearis pinnata, ramulis distichis linearis-lanceolatis elongatis sparsis planis integris aut medio pinnaulis filiformibus brevibus utrinque obsitis. — In mari Mediterraneo ad littorae Galloprovinciae (cl. Solier), rassisima. — Grateloupia filicina Agardh. F. filicinus Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 15. f. 2. Esp. t. 67. Turn. t. 150. — Color amoenissime purpureo-violaceus interdum ad dilatè viridem vergens. (v. s. D.)

Sect. II. ERINACEA Lamour. in dict. class. 6. p. 258.

Frondes membranaceo-gelatinosae subsimplices linearis-lanceolatae appendicibus spiniformibus simplicibus ramosisve margine onustae.

2. H. VERRUCULOSA (Dub. mss.) fronde membranaceo-gelatinosa sublanceolata subspirali, margine denticulato-spinosa, dentibus rigidis. — In mari Mediterraneo. — Sphaerococcus verruculosus Ag. Erinacea verruculosa Lamour. Fucus verruculosus Bertol. amoen. t. 6. f. 4. a. b. F. Rissoanus Turn. t. 253. — Color fusco-viridis. In aqua dulci citò in gelatinam solubilis. (v. v. D.)

Sect. III. HALIMIA. — Halymeniae et Dawsoniae sp. Lamour. Gaill. — Halymeniae et Sphaerococci sp. Ag.

Frondes membranaceae palmatae lineares lato-lanceolatae margine integerim aut appendicibus ciliis aut foliiformibus instructae.

* Stipite angustata tereti sublignosa.

3. H. SPERMOPHORA (Lamour. in dict. class. 5. p. 387.) fronde filiformi gracile in ramos planos angustissimos lineares dilatata, ramulis linearis cuneiformibus nunc elongatis angustissimis nunc abbreviatis ramosissimis ultimis subcymosis fimbriatis. — In Oceano ad littora Armoraciæ (cl. Chauvin), mari Mediterraneo, propè Massiliam (cl. Solier). — Fucus spermophorus Lian. syst. nat. 2. p. 719. Turn. t. 76. Sphaerococcus heredia Ag. (v. s. D.)
4. H. IMPLEXA (Dub. mss.) fronde compressa cartilaginea linearis plures dichotoma, ramis numerosis implexis rigidulis apice bifidis forcipatisve sensimque attenuatis. — Ad littora Oceani propè Quimper (cl. Lamour.), Cherbourg ex cl. Lenormand. — Fucus implexus DC. fl. fr. 2. p. 34 an. Desf.? Gigartina glandulosa Lamour. in herb. DC. F. glandulosus Turn. t. 38. — Color intense rosens, structura ocellato-reticulata nec minime zonata. (v. s. sine concept.)
5. H. BRODII (Lamour. l. c.) stipite tereti filiformi fronde palmato-ramosa subdichotoma, ramis in laminas membranaceo-cartilagineas oblongas bifurcas subproliferas abeuntibus, conceptaculis sphaericis pedicellatis terminalibus. — In Oceano ad Galliae littora rarius ex cl. Lamour. — F. Brodii Turn. t. 72. fl. dan. t. 1476. Sphaerococcus Brodii Lyngb. t. 3. Agardh. F. membranifolius Lamour. diss. t. 21. f. 1. 2. — Color intense sanguineus fusco-purpureus. (v. s. ex Mari septentrionali.)
6. H. NICÆENSIS (Lamour. ined.) fronde nanâ cartilaginea stipite tereti filiformi dein in laminas 1-2 aut 3 planas enerves elongato-cuneatas semel bis aut ter dichotomas apice obtusas bidentatasve integerrimas aut subciliatas expansa. — In mari Mediterraneo ad littora Niceæ (Stire), Massiliae (cl. Solier), Corsicæ (Ph. Thomas). (v. s. D.)
7. H. HETEROCARPA (Chauvin ined.) stipite filiformi crassiori tereti ramoso, fronde basi obsolete nervosa palmato-dichotoma valde crispata et contorta margine integerrima, ramis cuneatis aut bifidis ramulis apice rotundatis, conceptaculis subcarnosis rotundatis ad apices ramorum sitis. — Ad littora Calvadosii detexit cel. Chauvin. — Sub lente conceptacula emittere nubeculam

granularum minutissimarum observavit ocul. Chauvin. Substantia tenuis dilutè purpurascens insigniter reticulata (v. s. D. in herb. Chauv.)

8. *H. DISCOCARPA* (Chauv. ined.) stipite tereti filiformi subsimplici aut parum ramoso, in laminam membranaceo-coriaceam planam enervim cu-neato-dilatatam palmato-dichotomam expanso, marginibus integerimis, segmentis subtriangularibus obtusis, conceptaculis ad extremitatem segmentorum coadunatis maculam suborbiculatam efficientibus. — Ad littora Cal-vadosii raro (cl. Chauvin). — *Fucus palmetta* Lamour. diss. t. 29. f. 1. 2. — Dilutè purpurascens. (v. s. in herb. Chauvin.)

9. *H. PALMETTA* (Lamour. in dict. class. 5. p. 387.) stipite filiformi subsimplici in laminam membranaceam planam enervim subcuneiformem palmatam expanso, margine integro, segmentis ligulæformibus, conceptaculis hemi-sphæricis in disco sessilibus. — In Oceano. — Desmaz. crypt. exs. n. 108. F. palmetta Esp. t. 40. Stackh. t. 16. Turn. t. 73. eng. bot. t. 1120. F. pal-metta β Lam. diss. t. 19. f. 3. 4. F. pseudopalmatus Lam. diss. t. 23. f. 2. Sphærococcus Palmetta Ag. Chauv. alg. norm. n. 95. — *Subdiaphana lätè rubra*. (v. v. D.)

β . *Ellisiæ* (Chauvin alg. norm. n. 16.) laminis linearis elongatis dichotomis fastigiatis, segmentis angustis ad apicem subattenuatis interdùm acumi-natis. — Ad littora Calvadosii. (v. s.)

10. *H. RUBENS* (Dub. mss.) stipite tereti ramoso brevi subcorneo, ramis in laminae membranaceas elongato-cuneatas palmato-bifurcas basi obsolete costatas expansis, segmentis superioribus basi angustatis et cum inferioribus quasi concatenatis, extremis subrotundis obtusissimis, conceptaculis rugosis in disco frondis sessilibus. — In Oceano ad littora Neustriæ Armoraciæ. — F. rubens Linn. Turn. t. 42. eng. bot. t. 1053. Stackh. t. 19. F. prolifer Lightf. scot. 2. t. 30. DC. fl. fr. 2. p. 29. Sphærococcus rubens Ag. Dawsonia rubens Lamour. (v. s.)

11. *H. NERVOSA* (Dub. mss.) stipite brevi ramosissimo basi tereti dein subcompresso subcorneo, ramis in laminae submembranaceas lineares undulatas palmatas basi nervosas e superficie proleras expansis, segmentis linearibus linearis-lanceolatis obtusis, conceptaculis sphæricis sessilibus. — In mari Mediterraneo. — *Fucus nervosus* DC. fl. fr. 2. p. 29. Turn. t. 43. Sphærococcus nervosus Ag. Dawsonia nervosa Lam. — Amænissimè purpurea. (v. s.)

12. *H. MEMBRANIFOLIA* (Lamour. l. c.) stipite elongato ramosissimo tereti corneo, ramis elongatis dichotomis demum in laminae membranaceo-cartilagineas cuneiformes multifidas enerves expansis, segmentis extremis angustis obtusis denticulatis, conceptaculis pedicellatis ovatis caulinis. — In Oceano. — Desmaz. crypt. exs. n. 209. Sphærococcus membranifolius Ag. Chauv. alg. norm. n. 94. F. membranifolius Turn. t. 74. Esp. t. 115. Lamour. diss. t. 20 et t. 21. f. 3. Stackh. t. 20. — Moris. s. 15. t. 9. f. 2. — Purpurascen-tifusca. (v. v. D.)

β . *latifolia* (Agardh.) segmentis extremis dilatatis subrotundatis obtusissimis. (v. s.)

γ . *lomatia*, segmentis extremis valde dilatatis ovato-cuneatis crispatis. — In mari Mediterraneo. — *Fucus lomatia* Bertol. t. 4. f. 3. F. palmetta Gmel. t. 22. f. 3 et t. 23. Sphærococcus lactuca Ag. (v. s. in herb. Chauvin.)

** *Stipite compresso membranaceo.*

13. *H. RENIFORMIS* (Agardh. syst. 241.) stipite teretiusculo aut compresso abbreviato ramoso in laminae cartilagineas reniformes vel orbiculatas integerimas aut lacero-sinuatas expanso, conceptaculis hemisphæricis sessilibus per frondes superficiem sparsis. — In mari Mediterraneo ad littora Corsicae (Ph. Thomas), Monspelii (cl. Bouchet.), Oceano propè Cherbourg (cl. Lenormand). — F. reniformis Turn. t. 113. eng. bot. t. 2116. — *Purpurea*. (v. s.)

944 ACOTYL. SEU CELLULARES. HALYMENTIA.

14. *H. EDULIS* (Ag. syst. p. 242.) stipite brevissimo tereti compresso aut plano sensim dilatato in laminas carnosò-cartilagineas planas dilatatas simplices aut subpalmatas, segmentis oblongis integris apice rotundatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Desmaz. crypt. exs. n. 109. Chauvin alg. n. 68. F. edulis Stackh. t. 12. Turn. t. 114. eng. bot. t. 1307. Iridea edulis Bory. Ulva edulis DC. fl. fr. 2. p. 12. — Atro-purpurea. (v. v.)
15. *H. DUBYI* (Chauvin ined.) stipite vix ullo aut brevissimo piano sensim in laminam planam membranaceo-carnosam ovato-oblongam vel cuneiformem apice primum rotundatam et integrum dein laciniatam fissam expanso; conceptaculis punctiformibus distinctis ubique substantiae frondis sparsim immersis. — Ad saxa maritima circa Cherbourg (cl. Chauvin). — Marginis hand raro subdentatae leviterque undulato-plicatae; structura insigniter fibrosa; color sanguineus (Ch.). (v. s. D.)
16. *H. PALMATA* (Ag. syst. 242.) stipite brevi compresso aut subceaniculato ramoso dilatato, ramis compresso-filiformibus palmatim expansis in laminas coriaceas membranaceo-pellucidas dilatatas planas simplices palmatasve integerrimas, segmentis lanceolatis oblongo-lanceolatisve simpliciusculis obtusis. — In Oceano. — Desmaz. cr. exs. n. 210. Chauvin alg. n. 20. Iridea palmata Bory. Ulva palmata DC. fl. fr. 2. p. 12. F. palmatus Linn. Turn. t. 115. eng. bot. t. 1306. — Moris. ox. s. 15. t. 8. f. 1. — Amænè purpurea. (v. v.)
f. marginifera (Stackh. t. 12.) marginibus extremitatibusque unidue segmentis lanceolatis obtusis simplicibus bifurcisque in stipitem attenuatis ornatis. — Ad littora Oceani propè Cherbourg (cl. Chauvin et Lenormand). (v. s.)
17. *H. CILIATA* (Lamour. in dict. class. t. 5. p. 387.) stipite brevi piano compresso basi angustato sensim dilatato in laminas membranaceo-coriaceas planas enerves sublanceolatas pinnato-ramosas margine superficieque ciliatas expanso, ciliis simpliciusculis patentibus subulatis apice conceptaculiferis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Desmaz. crypt. n. 110. Chauvin alg. n. 17. Sphaerococcus ciliatus Ag. Lyngb. t. 4. F. ciliatus Stackh. nar. t. 15. eng. bot. t. 1069. Esp. t. 136. Turn. t. 70. F. ligulatus et holosetaceus Gmel. t. 21. f. 2 et 3. Ulva ciliata DC. fl. fr. 2. p. 13. (v. v.)
f. palmata (Turn.) fronde lanceolata indivisa palmatave, marginibus subnudis. (v. s.)
g. jubata (Turn. l. c. fig. f.) fronde margine superficieque ciliata, ciliis plurimis elongatis tenuissimis filiformibus cylindricis ramosis. — F. jubatus trans. linn. 3. t. 17. f. 2. Stackh. t. 11. (v. s.)
δ. linearis (Turn. l. c. f. g. h.) fronde linearis angustata ramosissimata. — Stackh. t. 15. (v. s.)
18. *H. SARNIENSIS* (Gaillon res. thalass. p. 13.) stipite elongato basi filiformi compresso sensim dilatato piano in frondem planam enervim palmato-multifidam expanso, segmentis linearis-lanceolatis elongatis obtusis sinnato-dentatulis, conceptaculis in processibus marginalibus immersis. — In Oceano propè Granville (cl. Lenormand), Barfleur (ex cl. Gaillon). — Desmaz. cr. exs. n. 111. H. lacera Lamour. in dict. cl. Fucus Sarniensis Mert. in Roth. cat. 3. t. 1. Turn. t. 44. F. lacerus Lamour. diss. t. 35. f. 1. 2. H. palmata Sarniensis Ag. (v. s.)
19. *H. SOBOLIFERA* (Chauv. ined.) stipite elongata piano angusto ramoso sensim paululum dilatato et expanso in frondem planam enervim palmato-laciniatam, laciniis sursùm dilatatis elongato-cuneiformibus, segmentis extremis linearibus apice multifido-incisis aut dentatis, conceptaculis subepidermide in maculas latas informes ubique dispositis. — Ad insulas Chausey propè Granville (cl. Lenormand in herb. Chauv.). — Delesseria sobolifera Lamour. ess. in ann. mus. t. 20. p. 115. F. soboliferus fl. dan. t. 1066. Turn. t. 45. — Substantia delicatula, sublente maculis ocellatis ornata (Ch.). Color dilute purpurascent. (v. s. in herb. Chauv.)
20. *H. LACERATA* (Dub. miss.) stipite vix ullo, fronde membranacea tenerimata

planâ aveniâ aut rarius basi nervosâ; nervis evanescentibus, ramosissimâ vage fissâ, ramis sublinearibus apice rotundatis margine criso laciniatis undulatis, conceptaculis in processibus marginalibus subhemisphæricis immersis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Fucus laceratus* Gmel. t. 21. f. 4 Turn. t. 68. eng. bot. t. 1067. DC. fl. fr. 2. p. 28. excl. syn. Stackh. et var. γ . et δ . F. endiviæfolius Lightf. scot. 2. t. 32. Delesseria lacerata Ag. Chauv. alg. n. 45. *Dawsonia lacerata* Lamour. (v. v.)

21. *H. LACINIATA* (Dub. mss.) stipite nullo, fronde cartilagineo-membranacea planâ enervi ramosâ dichotomâ aut palmatâ, laciniis cuneato-dilatatis apice palmatis obtusis marginibus planis crenatis proliferisque, conceptaculis hemisphæricis in processibus minutis inequalibus immersis. — In Oceano. — *F. laciniatus* Turn. t. 69. Esp. t. 140. eng. bot. t. 1068. Stackh. ed. 2. t. 15. *F. crispatus* Stackh. ed. 1. t. 15. *F. ciliatus* Gmel. t. 21. f. 1. *F. laceratus* DC. fl. fr. 2. p. 28. var. γ . et δ . *Sphaerococcus laciniatus* Lyngb. t. 4. Agardh. *Delessaria ciliaris* Lamour. (v. v.)

22. *H. BIFIDA* (Lamour. in dict. class. I. c.) stipite vix ullo, fronde membranacea tenerimâ planâ enervi subdichotomâ, laciniis linearis-cuneiformibus apice bifidis, segmentis abbreviatis patentibus obtusis, conceptaculis sphæricis marginalibus sessilibus. — Ad littora Oceani et maris Mediterranei. — *F. bifidus* Linn. trans. 3. t. 17. f. 1. eng. bot. t. 773. Turn. t. 154. *Sphaerococcus bifidus* Ag. Chauv. alg. n. 19. *F. laceratus* DC. fl. fr. 2. p. 28. var. ϵ . — *Amœnissimè rosea*. (v. v.)

23. *H. OCCELLATA* (Lamour. l. c.) stipite nullo, fronde membranacea tenerimâ planâ enervi dichotomâ, laciniis lato-cuneiformibus, segmentis obtusis regularibus margine integris, conceptaculis punetiformibns annulatim dispositis et maculas ocellatas in utrâque in frondis pagina sparsas efficientibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Delesseria ocellata* Agardh. syst. 252. *F. ocellatus* Lamour. diss. t. 32. *F. granatus* Lamour. t. 33. f. 3. 4. *Ulva ocellata* DC. fl. fr. 2. p. 12. — *Viridescens* aut *rosea*; ocelli purpurei. (v. s.)

24. *H. PUNCTATA* (Dub. mss.) stipite brevi pleno-compresso angusto expanso in laminam membranaceam tenerimam planam basi obsoletè venosam aut enervim valde dilatato-cuneatam vage fissam margine subundulatam aut suberoso-denticulatam, laciniis lato-lanceolatis obtusis, conceptaculis biformibus, his punctiformibus in ocellos parvos numerosissimæ per omnem frondis discum sparsos congestis, aliis paucioribus tuberculiformibus hiuc inde dispositis. — Ad littora Oceani propè Cherbourg (el. Lenorm. Despreaux, Chauvin). — *Fucus punctatus* Turn. t. 71? *Delesseria punctata* Ag? (v. s.)

25. *H. GMELINI* (Dub. mss.) stipite brevi pleno-compresso expanso in laminam membranaceam planam enervim aut basi obsoletè nervosam dilatato-cuneatam vage fissam margine integrum, laciniis subcuneatis subpalmatis, segmentis obtusis 1-3-fidis 1-3-dentatisve, conceptaculis biformibus his punctiformibus in lineolas angustas continuas interruptasve segmenta aut sinus submarginaltes digestis, illis paucioribus tuberculæformibus hinc inde dispositis. — Ad littora Calvadosii. — *Delesseria Gmelini*, Lamour. ess. excl. syn. Gmel. D. Bonnemaisonii Agardh. syst. 252. Chanvin alg. norm. n. 22. *Dawsonia*, *Gmelini*, Lamour. Gaill. (v. s.)

X. DELESSERIA Lamour. in dict. class. 5. p. 387. Gaillon res. thal. p. 11. —
Delesseriæ sp. Ag.

Stipes basi subcorneus sublignosus ramosus demum dilatatus in laminae foliiformes usque ad apicem nervo longitudinali percursas; fructificatio biformis, conceptaculis illis punctiformibus et in maculas parvas aggregatis, aliis rotundatis tuberculæformibus.

1. *D. HYPOGLOSSUM* (Lamour. ess. in ann. mus. t. 20. p. 124.) stipite angustissimo subtereti basi nudo sensim alato et sic dilatato in frondem linearem angustum usque ad apicem nervosam aveniam reticulatam e costâ proliferantem.

946 ACOTYL. seu CELLULARES.

apice obtusiusculam, conceptaculis biformibus illis punctiformibus in lineolas 2 parallelas interruptas ad utrumque costæ latus dispositas digestis, aliis tuberculæformibus paucis costæ insidentibus. — In Oceano. — Chanvin alg. norm. n. 21 et 43. F. hypoglossum Woodw. in Linn. trans. 2. t. 7. eng. bot. t. 1396. Turn. t. 14. non DC. F. hypoglossoides Stach. t. 13. (v. v.)

2. D. LINGULATA (Dub. mss.) stipite angustissimo ramoso subtereti sensim alato, segmentis lanceolato-ovatis planis simplicibus integrerrimis reticulatis e costâ proliferis apice rotundatis conceptacula punctiformia in centro aggregata gerentibus. — In Oceano ad littora Calvadosii (herb. DC.). — Amœne rosea. (v. v.)

3. D. ALATA (Lamour. l. c.) stipite tereti - compresso subcorneo basi nudo demum ramosissimo alato, ramis alatis expansis in laminas lineares angustas dichotomas nervosas versus apicem alternatim pinnatifidas pionis sublignatis subbifidis, conceptaculis biformibus nunc pinnorum apicibus nunc processibus oblongis e costâ ortis insidentibus, aliis tuberculæformibus sessilibus, aliis punctiformibus in lineolas angustas parallelas ad utrumque nervi latus dispositas digestis. — In Oceano. — Lyngb. tent. t. 2. Chauvin alg. norm. n. 44. F. alatus Linn. Stach. t. 13. Turn. t. 160. eng. bot. t. 1387 — Amœne roseus aut purpureus rarius viridescens. (v. v.)

4. D. RUSCIFOLIA (Lamour. l. c.) stipite corneo compresso ramosissimo alato, ramis alatis expansis in laminas simplices aut e costâ proliferas nervosas obtusissimas margine subundulatas subsessiles linearis oblongas subparallelas, conceptaculis biformibus, illis tuberculæformibus costæ insidentibus, illis punctiformibus in lineolas parallelas ad utrumque costæ latus ex basi ad apicem laminæ dispositas digestis. — Ad littora Calvadosii. — F. ruscifolius Woodw. in Linn. trans. 6. t. 8. f. 1. Turn. t. 15. eng. bot. t. 1395. F. hypoglossum DC. fl. fr. 2. p. 7 excl. syn. (v. s.)

5. D. SINUOSA (Lamour. l. c.) stipite subcorneo subtereti ramoso, laminis membranaceis oblongis sinuato-pinnatifidis costatis pinnatum bipinnatumve nervosis nervis parallelis, marginibus undulato-crenatis costâque mediâ appendiculato-ciliatis, conceptaculis biformibus his tuberculæformibus, raris hinc inde in frondis disco immersis, illis punctiformibus in ciliis sparsis. — In Oceano. — Lyngb. hyd. t. 2. B. F. sinuosus Turn. t. 35. F. rubens Stackh. t. 7. F. tenuatus Gmel. fac. t. 24. f. 1. (v. s.)

6. D. SANGUINEA (Lamour. l. c.) stipite corneo tereti sublignoso ramoso, laminis membranaceo foliaceis elongato-lanceolatis in petiolum angustatis simplicibus integrerrimis undulatis obtusis costatis pinnatum nervosis nervis parallelis, conceptaculis biformibus his tuberculæformibus sphæricis petiolatis e costâ denudatâ emergentibus, illis punctiformibus in costæ processibus foliaceis oblongis congestis. — In Oceano. — Lyngb. hydroph. t. 2. A. F. sanguineus Linn. Gmel. t. 24. f. 2. Turn. t. 36. eng. bot. t. 1041. DC. fl. fr. 2. p. 27. — Moris. s. 15. t. 8. f. 6. (v. s.)

XI. VOLUBILARIA Lamour. in dict. class. 5. p. 387. — Delesseriæ sp. Lamour. ess. — Rhodomelæ sp. Agardh.

Stipes brevissimus compressus simplex alato-dilatatus in laminam membranaceo-coriaceam costatam spiraliter contortam e costâ proliferam proliferationibus extremis enerviis denticulatam; conceptacula ad apicem dentium sita.

1. V. MEDITERRANEA (Lamour. l. c.) fronde lato-lineari denticulatâ fusca, proliferationibus ovatis obtusis. — In mari Mediterraneo. — Desmaz. crypt. exs. n. 268. — F. volubilis Linn. sp. 1627. Turn. t. 2. Rhodomela volubilis Ag. — Giun. t. 27. f. 62. (v. s.)

XII. *CHONDRUS* Lamour. *ess. thal. in mus. 20.* p. 126; *dict. class. 4.* p. 58. —
Sphærococci sp. Ag.

Stipes brevis tereti compressus dilatatus in laminam planam coriacem enervim ramoso-dichotomam; conceptacula tuberculiformia hemisphaerica aut ovalia disco frondis sparsa.

1. *C. AGATHOCUS* (Lamour. *ess. thalass.* t. 3. f. 3. 4. 5.) *fronde cartilagineâ planâ enervi dichotomâ punctatâ, segmentis margine sparsim dentatis linearicuneatis apice incisis acuminatis, conceptaculis apiculatis hemisphaericis in disco frondis sessilibus.* — *Ad littora Armoraciæ* (ill. Lamouroux). — *F. granateus* Turn. t. 215. *Sphærococcus multipartitus* Ag. — *Color roseo-fuscus.* (v. s.)
2. *C. MAMMILLOSUS* (Gaillon *res. thalass.* p. 14.) *fronde cartilagineâ subcanaliculatâ dichotomâ, segmentis elongato-cuneiformibus nigrinque mamilllosis tuberculiformibus proliferis, conceptaculis sphæricis in disco frondis sparsis brevissimè pedunculatis.* — *In Oceano et mari Mediterraneo.* — *Sphærococcus mammillosus* Lyngb. t. 5. Ag. Desmaz. *crypt.* n. 11. *F. mammillosus* Turn. t. 218. *eng. bot.* t. 1054. *F. polymorphus* var. 4°. Lamour. *diss.* t. 17. f. 37; t. 18. f. 38. *Ulva crispa* var. δ ; DC. *fl. fr.* 2. p. 13. — *Moris s. 15.* t. 8. f. 13. (v. s.)
 - β . *linearis* (Turn. t. 218. f. d.) *fronde angustâ linearî, apicibus obtusiusculis emarginatis.* (v. s.)
 - γ . *prolifer* (Turn. t. 218. fig. e.) *fronde disco margineque proliferâ, ligulis numerosissimis confertis oblongis mammilloso-tuberculiformibus.* — Lam. t. 18. f. 40. (v. s.)
 - δ . *echinatus* (Turn. t. 218. fig. h.) *ramis sursùm versus dilatatis hinc inde nudis.* — Lam. t. 18. f. 39. (v. s.)
3. *C. CRISPUS* (Dub. *mss.*) *fronde cartilagineâ planâ dichotomâ integerrimâ criso-undulatâ, segmentis cuneiformibus, conceptaculis subrotundis solitariis sparsis in disco frondis immersis hinc concavis deciduis.* — *In Oceano.* — *C. polymorphus* Lamour. *F. polym.* Lamour. *diss.* t. 1-4. 6. 7. 9-14, 16. 17. f. 37. *F. crispus* Linn. Stackh. t. 12. *F. ceranoides* Gmel. *fuc.* t. 7. f. 1. *Ulva crispa* DC. *fl. fr.* 2. p. 13. — *Variat e violaceo ad viridem* (v. v.)
- β . *virens* (Turn.) *fronde membranacea ramis sursùm versus dilatatis planiusculis laciniis extremis longiusculis acuminatis.* — Lam. *diss.* t. 16. f. 35. (v. v.)
- γ . *aqualis* (Turn.) *fronde cartilagineâ crassâ, ramis omnibus æquilibus linearibus, laciniis extremis obtusis.* — Lamour. t. 8. f. 16. et t. 9. f. 22. — Moris. s. 15. t. 8. f. 11. (v. v.)
- δ . *filiformis* (Turn. t. 217. fig. d.) *fronde cartilagineâ teretiusculâ, ramis sublinearibus, laciniis extremis elongatis longe acuminatis.* — Gmel. *fuc.* t. 7. f. 3. (v. s.)
- ϵ . *patens* (Turn. t. 217. fig. a.) *fronde subcartilagineâ hinc canaliculatâ dichotomâ, dichotomis patentibus.* — Lamour. *diss.* t. 6. f. 12. 13; t. 8. p. 17; t. 12. f. 28. (v. v.)
- ζ . *lacerus* (Turn.) *fronde cartilagineâ compressâ apice angustâ elongata ramosissimâ.* — Lamour. *diss.* t. 13. f. 29 et 30; t. 14. f. 31; t. 15. f. 33. (v. s.)
- η . *Sarniensis* (Turn. t. 217. f. b.) *fronde coriaceo-cartilagineâ, ramis sursùm versus dilatatis apice rotundis emarginatis.* — Lam. *diss.* t. 1. f. 1. 2; t. 2. f. 3. 4; t. 3. f. 5. 6. 7; t. 8. f. 20; t. 12. f. 27. (v. v.)
- ϑ . *planus* (Turn.) *fronde subcoriacea planâ latâ, ramis linearibus apice obtusis.* — Lam. t. 10. f. 23 et 24. (v. v.)

4. *C. NORVEGICUS* (Lamour. l. c.) *fronde subcoriacea planâ dichotoma, segmentis integerimis apice rotundatis obtusis, conceptaculis hemisphaericis disco insidentibus.* — *In Oceano, mari Mediterraneo* (cl. Solier). — *Sphærococcus norvegicus* Agard. *F. norvegicus* Gunn. t. 3. f. 4. Stackh. t. 18.

948 ACOTYI. SEU CELLULARES.

Turn. t. 41. DC. fl. fr. 5. p. 5. F. polymorphus var. Lamour. diss. t. 8. f. 16.
(v. s.)

5. C[?] PYGMÆUS (Lamour. ess. thal. in ann. mus. 20. p. 128.) fronde pygmæa coriaceo-cartilaginea plana angustissimā palmato-dichotomā, lacinis extremitis subcuneatis bifidis, segmentis brevibus obtusis aut subelongatis subteretibus hinc inde basi vesiculis sphæricis axillaribus terminalibusve instructis. — In Oceano. — Lichina pygmæa Ag. spec. p. 105. Chatwin alg. norm. n. 72. Grev. crypt. fl. t. 219. Fucus pygmæus Lightf. t. 32. Turn. t. 204. f. a-h. eng. bot. t. 1332. DC. fl. fr. 5. p. 5. — Vesicularum natura nondum bene cognita, has habent cl. Agardh. Hook Grev. et alii ut conceptacula tuberculiformia poro pertusa, sed analogia repugnata videtur. (v. v.)

6. *minor* (Turn. t. 204. f. 1-0.) fronde teretinscula minutissimā, vesiculis ellipticis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Lichen confinis fl. dan. t. 879. f. 2. Sm. eng. bot. t. 2575. Lichina confinis Agardh. Grev. crypt. fl. t. 221. (v. v.)

XIII. GELIDIUM Lamour. ess. thal. in ann. mus. t. 20. p. 128; dict. class. 7 p. 190. non Lyngb. — Sphaerococci sp. Agardh.

Frons linearis angustissima ramosa enervis corneo-cartilaginea plana aut valde compressa; conceptacula tuberculiformia subopaca, oblonga compressa ad apicem aut rarius per omnem longitudinem ramorum aut ramulorum sita.

1. G. CLAVATUM (Lamour. ess. l. c.) pusillum, fronde vase ramosa filiformi compressa membranaceo-cartilaginea, ramulis sterilibus dilatatis, fertilibus filiformibus, conceptaculis clavatis terminatis. — In Oceano ad littora provinc. borealium. — Desmaz. crypt. n. 207. F. pusillus Stackh. t. 6. Turn. t. 108. F. cespitosus DC. fl. fr. 2. p. 22. excl. syn. Stackh. F. elavatus Lamour. diss. t. 22. f. 12. Ulva filiformis fl. dan. t. 949. Sphaerococcus corneus & clavatus Agardh. Chondria pusilla Hook. Grev. crypt. fl. t. 79. (v. v.)

2. G. CRINALE (Lamour. dict. class. l. c.) fronde cartilaginea capillacea compressa vase ramosa apice 2-3-furca, ramis simplicibus subsecundis summis sœpe fasciculatis ramulis sterilibus filiformibus, fertilibus in conceptacula oblonga utrinque acuminata intumescentibus. — In Oceano. — Desmaz. crypt. exs. n. 208. Chatwin alg. norm. n. 18. G. setaceum Lamour. ess. F. crinalis Turn. t. 198. F. tenuissimus Esp. t. 111. Sphaerococcus corneus & crinalis Agardh. (v. s.)

3. G. CORNEUM (Lamour. ess. l. c.) fronde compressa cartilagineo-cornea disticha ramosissimā, ramis compresso-planis linearibus utrinque attenuatis bipinnatis pinnis oppositis patentibus obtusis, ramulis fertilibus lateralibus in conceptacula elliptico-clavata intumescentibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. cornuta Huds. Stackh. t. 12. DC. fl. fr. 2. p. 32. Turn. t. 257. Sphaerococcus cornutus Ag. Sph. brachiatus Bonnemais. — Buxb. cent. 3. t. 65. f. 4. (v. v.)

β. filicinum (Turn.) fronde setacea, pinnis horizontalibus dilatatis obtusissimis. — Fucus filicinus Huds. (v. v.)

γ. pinnatum (Turn. t. 257. f. d.) fronde angusta 3-pinnata, pinnis patentibus sublinearibus obtusiusculis. — F. sericeus Gmel. t. 15. f. 3. F. hypnoides Desf. DC. fl. fr. 2. p. 32. (v. v.)

4. G. CARTILAGINEUM (Gaill. resum. thalass. p. 15.) fronde cartilagineo-cornea angusta linearis compressa inferne nudā superne decomposito-pinnata, pinnis horizontalibus alternis brevissimis obtusis apice in conceptacula elliptica mucronata intumescentibus. — In mari Nicæensi ex Ali., Massiliensi undè unicum specimen habui; in Oceano ad littora Gallica ex Lamour. — F. cartilagineus Linn. eng. bot. t. 1477. Turn. t. 124. F. capensis et F. versicolor Gmel. t. 17. f. 1 et 2. Gelidium concatenatum Lamour. (v. s.)

5. G. CORONOPIFOLIUM (Lamour. ess. l. c.) fronde cartilaginea angusta linearis

compressâ ramosissimâ dichotomâ, ramis dichotomo-pinnatis sensim attenuatis, inferioribus compresso-ancipitibus, ramulis extremis furcatis aenatis, conceptaculis sphæricis mucronulatis lateralibus pedicellatis sessilibusve. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *F. coronopifolius* Stackh. t. 14. DC. fl. fr. 2. p. 33. Turn. t. 122. eng. bot. t. 1478. *Sphærococcus coronopifolias* Ag. syst. 229. (v. v.)

XIV. PLOCAMIUM Lamour. ess. thalass. in ann. mus. 20. p. 137. — *Plocarium*, Bonnemaisonie et Ptilota Agardh. Gaillon.

Frons plano-compressa angustissima cartilaginea disticha ramosissima, ramis extremis pectinatis uncinatisve; conceptacula biformia, illa punctiformia ad apices ramulorum sita, alia globosa tuberculæformia lateralia sessilia aut pedunculata.

1. *P. VULGARE* (Lamour. l. c.) fronde erectâ compressâ ramosissimâ dichotomâ pinnatâ, ramulis subulatis secundis ultimis intus falcatis et pectinatis, conceptaculis tuberculæformibus globosis lateralibus subsessilibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *F. Plocarium* Gmel. fuc. t. 16. f. 1. fl. dan. t. 1593. DC. fl. fr. 2. p. 31. *F. coccineus* Stackh. t. 26. Turn. t. 59. eng. bot. t. 1242. Delesseria *Plocarium* Ag. syst. 250. — *Amenissimè roseum* (v. v.)
2. *P. CRISTATUM* (Lamour. l. c. t. 5. f. 1. 2. 3.) fronde cartilagineâ compressâ erectâ lineolis transversalibus atris interdum obsoletis in articulos obsoletos divisâ ramosissimâ, ramulis setaceis distichis simplicibus ant subramosis utrinque tenuissimè pectinatis. — In Oceano ad littora Bayonæ propè Biarritz (cl. Lamour. Gratel.), Armoraciæ (cl. Lenorm.). — *F. cristatus* eng. bot. t. 1925. Turn. t. 23. f. h. excl. aliis variet. *Sphærococcus cristatus* Ag. Grev. crypt. fl. t. 85. — Color nigricans aut fusco-nigricans. (v. s. sine concept.)
3. *P. ASPARAGOIDES* (Lamour. l. c.) fronde angustissimâ compressâ ramosissimâ, ramis ramulis setaceis æqualibus distichis simplicibus subulato-setaceis utrinque pectinatis, conceptaculis subglobosis lateralibus breviter pedicellatis. — In Oceano ad littora Calvadosii (cel. Lamour.) Saint-Pol de Léon (cel. DC.), mari Mediterraneo propè Massiliam (cl. Solier). — *Fucus asparagoides* Woodw. in linn. trans. 2. t. 6. eng. bot. t. 571. Turn. t. 101. DC. fl. fr. 2. p. 7. *Bonnemaisonie asparagoides* Agardh. — *Amenissimè rosea*. (v. s.)
4. *P. PLUMOSUM* (Lamour. l. c.) fronde compressâ subcartilagineâ obsolete articulatâ ramosissimâ, ramis patentibus ramulis distichis æqualibus simplicibus compressis acuminatis tenuissimè serratis pectinatis, conceptaculis nudis punctiformibus nigris ad apicem ramulorum abbreviatorum in massam ovoidam extremitate ramulorum quadrifidâ involueratam congestis. — In Oceano ad littora Neustriæ. — *F. plumosus* Linn. fl. dan. t. 350. Turn. t. 60. eng. bot. t. 1308. DC. fl. fr. 2. p. 31. *Ptilota plumosa* Ag. — Color rubro-fuscus. (v. s.)
f. tenuissima (Agardh) ramulis tenuissimè setaceo-pectinatis. (v. s.)
5. *P. AMPHIBIUM* (Lam. l. c.) fronde filiformi compressâ cartilagineâ attenuatâ flexuosa ramosissimâ, ramis setaceis, flexuosis 1-2-pinnatis suumvis involutis, ramulis tenuissimis simplicibus furcatisve conceptaculis globosis minutissimis terminatis. — In Oceano ex Armoraciâ ad Hispaniam. — *F. amphibius* Woodw. Stackh. t. 14. Esp. t. 151. Turn. t. 109. eng. bot. t. 1428. DC. fl. fr. 5. p. 6. *F. scorpioides* Gmel. Ray syn. t. 2. f. 6. *Rhodomela scorpioides* Agardh. — *Pluckn. phyt.* t. 47. f. 13. — Color viridi-fuscus aut nigrescens. (v. v.)

XV. LOMENTARIA Gaillon rés. thalass. p. 19. — *Gigartinae* sp. Lamour. — *Chondriae* et *Halymeniae* sp. Agardh.

Frondes tubulosæ subgelatinosæ tereti compressæ hinc indè externa contractæ aut attenuatæ in ramulos breves expansos subfoliiformes dilatatae; conceptacula globosa sessilia gigartina ramis aut ramulis adnata.

950 ACOTYL. SEU CELLULARES. LOMENTARIA.

1. *L. CLAVELLOSA* (Gaillon l. c.) fronde angustâ decompositâ pinnatâ ramis siliformibus erectis, ramulis linear-lanceolatis angustis obtusis distichis basi attenuatis, conceptaculis in ramulis sparsis biformibus his punctiformibus aliis tuberculæformibus ovatis sessilibus. — In Oceano. — F. clavellosus Turn. in linn. trans. 6. t. 9; hist. t. 30; eng. bot. t. 1203. *Gastridium clavellosum* Lyngb. t. 17. *Chondria clavellosa* Ag. Chauvin alg. norm. n. 41. (v. v.)
2. *L. TENUISSIMA* (Gaill. l. c.) fronde subgelatinosâ filiformi tereti ramosâ, ramis alternis patulis simpliciusculis, ramulis cylindraceis capillarihus utrinque attenuatis, conceptaculis in ramulis sparsis his punctiformibus illis tuberculæformibus ovatis. — In Oceano Armoraciæ, Neustriæ. — F. tenuissima Turn. in Linn. trans. 3. t. 19; hist. t. 100; eng. bot. t. 1882. *Chondria tenuissima* Ag. Chauv. alg. n. 14. *Frons diaphana* dilutè rubella. (v. v.)
3. *L. DASYPHYLLA* (Gaill. l. c.) fronde tereti angustâ ramosâ ramis alternis suberectis simpliciusculis, ramulis cylindricis clavatis truncato-obtusis basi maximè attenuatis sparsis, conceptaculis in ramulis sparsis his punctiformibus, illis tuberculæformibus ovatis sessilibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. dasypyllus Woodw. in Linn. trans. 2. t. 21. f. 1-3. Turn. t. 22. eng. bot. t. 847. DC. fl. fr. 5. p. 8. *Gastridium purpurascens* Lyngb. *Chondria dasypylla* Ag. *Laurencia pyramidalis* Bory. — *Purpurea*. (v. v.)
4. *L. KALIFORMIS* (Gaillon l. c.) fronde tereti crassâ tubulosâ subgelatinosâ articulato-constrictâ ramosissimâ, ramis oppositis patentibus, ramulis cylindricis subfusiformibus utrinque attenuatis obtusinsculis verticillatis, conceptaculis in ramulis sparsis, his punctiformibus illis tuberculæformibus rotundis sessilibus. — In Oceano. — F. kaliformis linn. trans. 3. t. 18. Turn. hist. ed. 2. t. 29. Lam. diss. t. 29. DC. fl. fr. 5. p. 8. F. verticillatus Lightf. scot. t. 31. *Chondria verticillata* Ag. Chauvin alg. norm. n. 15. — *Viridescens* aut *viridi-purpurascens*. (v. v.)
5. *L. ARTICULATA* (Lyngb. t. 30. A.) fronde tereti angustâ tubulosâ subgelatinosâ articulato-concatenatâ ramosissimâ dichotomâ, articulis ovato-ellipticis elongato-lanceolatis utrinque attenuatis, ramis fastigiatis dichotomis verticillatis conceptaculis in ramis sparsis his punctiformibus illis tuberculæformibus conico-truncatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. articulatus Stackh. t. 8. Turn. t. 106. eng. bot. t. 1574. *Chondria articulata* Ag. *Ulva articulata* DC. fl. fr. 2. p. 7. — *Moris*. s. 15. t. 8. f. 14. — *Amœne purpurea* demum *viridescens*. (v. v.)
6. *L. INTERTEXTA* (Chauvin in litt.) fronde tereti angustâ tubulosâ obsoletè articulato-concatenatâ ramosâ, ramis alternis oppositis intertextis flexuosis subpatentibus ramulisque elongatis cylindricis articulato-concatenatis, articulis ovato-globosis parùm attenuatis, conceptaculis in ramis ramulisque sparsis his punctiformibus illis tuberculæformibus hemisphæricis. — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), Rupellæ (cl. d'Arbigny). — *Dilutè purpurea* aut *purpureo-viridescens*. (v. s. D.)
7. *L. OPUNTIA* (Gaill. l. c.) pusilla cespitosa dense implicato-pulvinata, fronde tereti filiformi solidâ hic illuc articulato-contractâ, articulis dilatato-lanceolatis obtusis, ramosâ ramis acuminatis, ramulis horizontalibus clavatis obtusis basi sensim et valde attenuatis, conceptaculis tuberculæformibus globosis minutissimis sessilibus sparsis. — In Oceano. — F. Opuntia Turn. t. 107 excl. F. cespitosa et Rivularia Opuntia eng. bot. t. 1868. *Halymenia*? *Opuntia* Ag. *Gigartina Opuntia* et *G. pilosa* excl. syn. Lamour. ess. — *Obscurè purpurascens* aut *viridescens*. (v. v. D.)
8. *L. PYGMÆA* (Gaillon l. c.) nana cespitosa-pulvinata reptans, fronde tereti filiformi erectâ hinc indè dilatata vagè ramosâ, ramis subsimplicibus elongatis divaricatis utrinque attenuatis torulo-so-subarticulatis, articulis brevibus ovato-moniliformibus, conceptaculis tuberculæformibus globosis minutis sessilibus sparsis. — Ad littora Calvadosii fibrillis tenuissimis radiciformibus axis adfixa (cl. Chauvin). — *Gigartina pygmæa* Lamour. ess. t. 4. f. 12,

13. *Fucus Opuntia* Stackh. t. 16 excl. syn. *obscure purpurascens*. (v. s. in herb. Chauvin.)
9. *L. VERMICULARIS* (Gaill. l. c.) fronde erectâ teretinsculâ ramosissimâ, ramis subpateutibus ramosis subdichotomis, extremis ramulis cylindricis ellipticis elliptico-elongatisve obtusis basi maximè attenuatis confertis obtectis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *F. vermicularis* Gmel. t. 18. f. 4. DC. fl. fr. 2. p. 27. Esp. t. 96. f. 3. 4. *F. ovalis* Huds. eng. bot. t. 711. Turn. t. 81. *Chondria ovalis* a Ag. *Obscurè purpurascens*; ramuli concolores aut viridescentes. (v. s. sine concept.)
- f. fasciculata*, ramulis elongatis fasciculatis. — In mari Mediterraneo. — *Ulva fasciculata* DC. fl. fr. 5. p. 2. (v. s.)
10. *L. UVARIA* (Dub. mss.) fronde erectâ teretinsculâ brevi parùm ramosâ dichotomâ, ramis erectis subsimplicibus, extremis ramulis pyriformi-globosis ad basin attenuatis confertis obtectis. — In mari Mediterraneo. — *F. uvaria* Esp. t. 78. DC. fl. fr. 2. p. 26. *F. botryoides* Wulf. in Jacq. coll. 3. t. 13. f. 1. *Chondria uvaria* Ag. syst. 204. (v. s.)

XVI. LAURENCIA Lamour. ess. l. c. p. 130. Gaillon in dict. sc. nat. t. 25. p. 325.
— *Chondriæ* sp. Agardh.

Frons angustissima filiformis ramosa enervis gelatinosa sicca cornea teres aut compressa; conceptacula globulosa gigartina innata in extremitate ramorum aut ramorum dilatata aut in clavulas aut racemos globulosos intumescente.

1. *L. PINNATIFIDA* (Lamour. l. c.) fronde compressâ cartilagineo-gelatinosa 2-3-pinnatâ, pinnis patentibus, ramulis obtusis callosis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *F. pinnatifidus* Huds. Stackh. t. 11. DC. fl. fr. 2. p. 30. Esp. t. 132. Turn. t. 20. eng. bot. t. 1202. *Chondria pinnatifida* Agardh. Chauv. alg. norm. n. 67. — *Moris*. s. 15. t. 8. f. 2. (v. v.)
- f. Osmunda* (Turn.) fronde planâ dilatata, ramulis brevibus multifidis. — *F. Osmunda* Linn. Gmel. t. 16. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 31. — *Buxb.* t. 59. f. 3. (v. v.)
2. *L. HYBRIDA* (Lenormand in litt.) fronde cartilagineâ teretinsculâ filiformi basi plerumque denudata simplici apice ramosâ ramis suboppositis, ramulis cylindraceis confertis abbreviatis patulis apice incrassatis callosis truncatis. Ad littora Calvadosii. — *L. cespitosa* Lam. ess. *Fucus hybridus* DC. fl. fr. 2. p. 30. *F. pinnatif. angustus* Turn. *Chondria pinnatifida* γ *angusta* Agardh? *Chondria hybrida* Chauv. alg. norm. n. 40. (v. v. DC.)
3. *L. OBTRUSA* (Lamour. l. c.) fronde compressâ cartilagineâ ramosissimâ angustissimè linearis, ramis suboppositis elongatis erectiusculis, ramulis oppositis cylindraceis patentibus clavatis truncatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Fucus obtusus* Huds. DC. fl. fr. 2. p. 32. Turn. t. 21. eng. bot. t. 1201. — *Chartæ strictæ adhærens*. (v. v.)
4. *L. GELATINOSA* (Lamour. l. c.) fronde tereti gelatinoso-corneâ ramosissimâ filiformi, ramis suboppositis elongatis patentibus, ramulis oppositis verticillatisve patentibus ovato-ellipticis obtusis. — In mari Mediterraneo. — *Fucus gelatinosus* Desf. atl. — *Chartæ vix adhærens*. (v. v. D.)

XVII. HYPNÆA Lamour. ess. l. c. p. 131; dict. class. t. 8. p. 469. Gaillon in dict. sc. nat. t. 22. p. 350. — *Sphærococci* et *Chætosporæ* sp. Agardh.

Frons angustissima filiformis ramosa enervis membranaceo-cartilaginea cylindrica obsita ramillis seu filamentis minutis setaceis sparsis spinulaeformibus interdùm in conceptacula minuta fusiformia aut subulata subopaca intumescientibus.

1. *H. WIECHII* (Lamour. l. c.) fronde filiformi tenerâ ramosissimâ ubique ob-

952 ACOTYL. SEU CELLULARES.

sitā ramulis numerosis confertis brevissimis, aliis sterilibus, aliis conceptaculo lanceolato-subulato terminatis. — In Oceano propè Saint-Pol de Léon excl. DC. ad littora Calvadosii (cl. Chauvin). — Fucus Wigghii Turn. in Linu. trans. 6. t. 10; hist. t. 102. eng. bot. t. 1165. DC. fl. fr. 5. p. 7. Chætospora Wigghii Agardh. syst. p. 146. (v. s.)

2. *H. spinulosa* (Lamour. l. c.) fronde subcartilaginea filiformi flaccidâ tereti gracili ramosissimâ, ramis flexuosis ramulis setaceis spinuliformibus approximatis patentibus obsitis apice uncinatis nudiusculis, conceptaculis sphæricis in ramulis sessilibus. — In mari Mediterraneo, Oceano ad littora Neustriæ ex Esper. — F. spinulosus Esper t. 34. Delile egypt. t. 57. Sphærococcus musciformis Agardh. syst. 238 excl. syn. plur. (v. s.)

XVIII. GIGARTINA Gaillon res. thalass. p. 16. — Gigartinæ sp. Lamour. — Sphærococci Chordariæ et Halymeniæ sp. Ag.

Frons cylindrica rarius plana linearis aut filiformis angustissima ramosa enervis gelatinoso-cartilaginea continua; conceptacula globosa opaca sessilia gigartina ramis et ramulis adnata aut innata.

1. *G. ? TEEDII* (Lamour. ess. thal. t. 4. f. 11.) fronde membranaceo-cartilaginea planâ linearî medium versùs dilatatâ ramosissimâ vage pinnatisidâ ciliatâ ciliis horizontalibus subulatis simplicibus ramosisve conceptaculiferis, conceptaculis axillaribus lateralibus solitariis aut binis. — In mari Mediterraneo; ad littora Armoricae ex cl. Lenormand. — F. Teedii Turn. t. 208. Ceramium Teedii Roth. cat. bot. 3. t. 4. Sphærococcus Teedii Agardh. — Frons diaphana viridi et purpureo fusco amoenè variegata. (v. s.)

2. *G. CONSERVOIDES* (Lamour. l. c.) fronde cartilaginea tereti filiformi ramosissimâ, ramis elongatis subdistichis simplicibus aut parùm ramosis setaceis, ramulis patentibus, conceptaculis lateralibus hemisphæricis sessilibus sparsis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. conservoides Linn. DC. fl. fr. 2. p. 36. excl. syn. Lightf. F. longissimus Gmel. fuc. t. 13. F. verrucosus Stackh. t. 8. DC. fl. fr. 2. p. 36. Sphæroboccus conservoides Agardh. (v. v.)

β. procerrima (Turn.) ramis in longum protensis subsimplicibus subnudis. — F. longissimus Stackh. t. 16. F. procerrimus Esp. t. 92. Ceramium longissimum Roth. Sphær. conservoides procerrimus Ag. Chauv. alg. norm. n. 97. (v. v.)

γ. divaricata (Lenorm. ined.) ramis flexuosis divaricatis obsitis ramulis patentibus subulatis. — In mari Mediterraneo. (v. s.)

δ. cirrhosa (Chauvin ined.) ramis elongatis, ramulis 2-3-furcatis cirrhosis hinc inde ciliatis. — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin). (v. s.)

3. *G. FLAGELLIFORMIS* (Lamour. l. c.) fronde cartilaginea lubricâ tereti filiformi ramosissimâ, ramis elongatis, ramulis virgatis subdistichis elongatis simpliciunculis basi patentibus, conceptaculis hemisphærico-depressis sessilibus sparsis aut hinc inde agglomeratis lateralibus terminalibusque. — Ad littora Oceani rarius. — F. flagelliformis Lightf. scot. 928. fl. dan. t. 650. Turn. t. 85. Stackh. t. 16. eng. bot. t. 1222. Chordaria flagelliformis Ag. syst. 256. (v. s.)

4. *G. PURPURASCENS* (Lamour. ess. 136.) fronde cartilaginea compresso-tereti filiformi ramosissimâ, ramulis ramosissimis setaceis vagis erectis, conceptaculis sphaericis ellipticisve sparsis aut hinc inde agglomeratis ramulis innatis. — In Oceano. — F. purpurascens Huds. Turn. t. 9. eng. bot. t. 1243. F. corallinus fl. dan. t. 709. Sphæroboccus purpurascens Ag. (v. v.)

5. *G. PLICATA* (Lamour. l. c.) fronde filiformi corneâ rigidâ æquali ramosissimâ dichotomâ, ramis implexis subsecundis horizontalibus apice compressis furcatis, conceptaculis lateralibus hemisphærico-depressis sessilibus sparsis aut hinc inde agglomeratis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. plicatus Gmel. fuc. t. 14. f. 2. Stackh. t. 7. DC. fl. fr. 2. p. 37. Turn. t. 180. eng. bot. t. 1089. Sphæroboccus plicatus Ag. Ceramium plicatum Roth. (v. v.)

6. *G. DURA* (Desmaz. crypt. exs. n. 262.) fronde cartilaginea tereti filiformi

ramosissimâ dichotomâ fastigiâtâ, ramis sensim attenuatis apice complanatis et trifurcatis. — In Oceano et mari Mediterraneo ex cl. Desmaz. — Sphærococcus durus Ag. syst. 234. — An prioris varietas?

7. G. HELMINTHOCORTON (Lamour. l. c.) fronde filiformi cartilagineâ tereti cespitosâ implicatâ minutâ ramosâ, ramis setaceis subdichotomis acutis obsoletè transversim striatis. — In mari Mediterraneo ad littora Corsicæ. — F. helminthocorton Latour. in journ. phys. 1782. sept. t. 1. f. 10. DC. fl. fr. 2. p. 37. Turn. t. 233. Sphærococcus helminthocorton Ag. (v. s.)
8. G. MINTATA (Lamour. l. c.) fronde minutâ densè cespitosâ tereti-compressâ corneo-cartilagineâ implicatâ inordinate 2-3 pinnatâ, ramulis horizontalibus extremis brevibus subacutis. — In mari Mediterraneo. — F. miniatus Drap. DC. fl. fr. 5. p. 6. Rubro-purpurea aut viridescens. (v. s.)
9. G. PISTILLATA (Lamour. l. c.) fronde cartilagineâ compressâ angustâ linearis subdichotomâ ramis ramulisque extremis pinnatâ, pinulis distichis æquilibus horizontalibus parallelis apice aut lateraliter conceptaculiferis, conceptaculis sessilibus hemisphæricis globosisve. — Ad littora Oceani rarius. — F. gigartinus Linn. Turn. t. 28. eng. bot. t. 908. F. pistillatus Gmel. t. 12. f. 1. Lam. dist. t. 27. Sphærococcus gigartinus Ag. (v. s.)
10. G. ACICULARIS (Lamour. l. c.) fronte cartilagineâ tereti subdichotomâ flexuosa, ramis patentibus acuminatis hinc indè ramulos laterales horizontales spiniformes emitentibus, conceptaculis sphæricis sessilibus sparsis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — F. acicularis Wulf. Turn. t. 126. — Color. fusca ad extremitates lutescens. (v. s.)
11. G. USTULATA (Dub. mss.) pusilla cespitosa densè intertexto - pulvinata, fronde cartilagineâ setacea ramosissimâ, ramis erectisculis acutis ramulos laterales horizontales spiniformes abbreviatis emitentibus. — Ad littora Corsicæ. (Ph. Thomas). — Sphærococcus ustulatus Ag. — Color niger. (v. s.)

XIX. POLYIDES Ag. syst. 194. Gaillon res. thalass. p. 18. — {Agartinæ sp. Lamour.

Frons cylindrica filiformis enervis ramosa corneo-cartilaginea continua, ramis fastigiatis; conceptacula verrucosa elongata opaca sessilia spongiosa fibris sporidia sustinentibus constituta ramis ad basin ramorum adnata.

1. P. GRIFFITHSIÆ (Gaillon l. c.) fronde parvâ filiformi dichotomâ fastigiâtâ, ramulis setaceis, conceptaculis oblongis amplexicaulibus. — Ad littora Oceani, rarius. — F. Griffithsiæ Turn. t. 37. Stackh. t. 19. Sphærococcus Griffithsiæ Ag. Gigartina Griffithsiæ Lam. Desmaz. cr. exs. n. 262. (v. s.)
 2. P. ROTUNDA (Gaillon l. c.) fronde tereti contortâ dichotomâ fastigiâtâ, dichotomiarum angulis obtusiusculis, ramulis teretibus crassis furcatis acutis, conceptaculis difformibus oblongis lateralibus. — Ad littora Oceani. — F. rotundus Gmel. t. 6. f. 3. Turn. t. 5. eng. bot. t. 1738. Stackh. t. 6. Polyides lumbricalis Agardh. Chauvin alg. norin. n. 92. Spougiocarpus rotundus Grev. (v. v.)
- β. fastigiata* (Agardh.) fronde graciliore nigrescente. — Ad littora Armo- raciæ et Neustriæ ex cl. Lenorm. — F. fastigiatus Esp. t. 16.

XX. SPOROCHNUS Gaillon res. thalass. p. 18. — Sporochni sp. Agardh. — Gigartinæ et Dictyotæ sp. Lamour.

Frons cylindrica filiformis setacea irregulariter et lanâ ramosa corneo-cartilaginea; conceptacula terminalia aut lateralia globosa aut hemisphærica minuta sessilia aut pedunculata.

1. S. PEDUNCULATUS (Agardh. syst. p. 259.) fronde ramosâ setacea, ramis elongatis simpliciusculis oppositis verticillatisve, conceptaculis ellipticis latera-

954 ACOTYL. SEU CELLULARES.

libus pedunculo æqualibus. — Ad littora Armoraciæ et Neustriæ, rarus (cel. Chauvin). — F. pedunculatus Stackh. t. 16. eng. bot. t. 545. Turn. t. 183. Esp. t. 156. Gigartina pedunculata Lamour. (v. s. sine concept.)

2. S. RHIZODES (Agardh. l. c.) fronde ramosissimâ setacea, ramis elongatis ramosissimis vagis toruloso-rugosis, conceptaculis globosis ellipticisve laterilibus sessilibus ramulosve terminantibus. — In Oceano ad littora provinc. boreali-occidentalium. — F. rhizodes Turn. t. 235. Chordaria rhizodes Lyngb. t. 13. Ch. paradoxa Lyngb. t. 14. Conserva verrucosa eng. bot. t. 1638. (v. s.)

Trib. IV. DICTYOTEÆ Lamour. l. c. p. 269.

Frondes olivaceo-virides exsiccatione non nigrescentes, membranaceæ, e contextu reticulato-cellulari, cellulis majusculis hexagonis aut quadrangulis, conflatae, continuæ, expansæ, planæ aut fistulosæ; conceptacula minutissima granuliformia sparsa aut seriatim disposita. — Omnes marinæ.

XXI. DICTYOPTERIS Lamour. ess. thalass. in ann. mus. 20. p. 270. — Haliseris Agardh.

Stipes cylindricus sensim attenuatus in frondem planam tenuem latolineare confusè et irregulariter reticulatam simplicem aut dichotomam nervo teretiusculo per omnem longitudinem percursam; conceptacula minutissima aggregata in maculas subproeminentes in fronde sparsas interdum nervo parallelas, rarius in series transversas digestas.

1. D. POLYPODIOIDES (Lamour. in Desv. journ. bot. 2. p. 130.) fronde planâ dichotoma integrâ, segmentis margine integris obtusis, conceptaculis minutis numerosis sparsis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — D. elongata Lamour. l. c. Haliseris polypodioides Agardh. F. polypodioides Lamour. diss. t. 24. f. 1. F. membranaceus Stackh. t. 6. Turn. t. 87. eng. bot. t. 1758. Ulva polypodioides DC. fl. fr. 2. p. 15. — Olivaceo-viridis. (v. v.)

β . minor (Lamour. diss. p. 32. t. 24. t. 2.) fronde magis ramosâ, nervo tortuoso undulato raro proliferò. (v. s.)

XXII. DICTYOTA Lamour. in Desv. journ. bot. 2. p. 41. ess. thalass. in ann. mus. 20. p. 271. excl. sect. primâ; dict. class. 5. p. 483. — Zonariæ sp. Agardh.

Frons plana tenuis linearis reticulata enervis dichotoma aut laciniata; conceptacula granuliformia ad superficiem frondis sita in parvas maculas sparsas aut lineolas longitudinales flexuosasve digesta.

1. D. DICHOTOMA (Lamour. l. c.) fronde dichotoma integrâ, segmentis erectis elongato-cuneatis lato-linearibus apice forcatis rotundato-obtusis, conceptaculis punctiformibus sparsis discum et nunquam marginem occupantibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Ulva dichotoma Lightf. scot. t. 34. Lyngb. t. 6. eng. bot. t. 774. DC. fl. fr. 2. p. 11. F. zoseroides Lamour. diss. t. 22. f. 3. t. 23. f. 1. Zonaria dichotoma Ag. Chauvin alg. norm. n. 47. (v. v.)

β . acuta (Chauv. in litt.) fronde angustâ ramosissimâ, apicibus furcato-divaricatis acutis. (v. v.)

γ . intricata (Agardh.) fronde angustâ ramosissimâ intricata latitudine inæquali interdum subfiliformi apicibus furcato-divaricatis angustissimis. — D. divaricata Lamour. (v. v.)

2. D. PAPILLOSA (Dub. mss.) fronde subcompressâ angustissimâ decomposito-dichotomo-ramosa integrâ, segmentis elongatis angustissimis setaceo-acutis, dichotomiarum axillis rotundatis, conceptaculis punctiformibus mi-

nutissimis digestis in glomerulos ubique in fronde et ad marginem sparsos.

— Ad littora Armoraciæ (cl. Chauvin). — *Zonaria papillosa* Agardh. syst. 267. — « Color olivaceus; substantia membranacea tenuis. Forsan Sporochni rhizodis var. » cl. Chauv. in litt. (v. s. in herb. Chauvin.)

3. *D. IMPLEXA* (Lamour. l. c.) fronde planâ angustissimâ ad infinitum decomposito-dichotomâ integerrimâ, segmentis divaricatis tenuissimis implexis, extremis setaceis obtusis, conceptaculis punctiformibus minutissimis in lineolas transversas obscuras parallelas digestis. — In mari Mediterraneo (cl. Lamour. Ph. Thomas.) — *Zonaria linearis* Agardh. F. implexus Desf. atl. ex Lam. (v. s.).
4. *D. FASCIOLA* (Lamour. l. c.) fronde compressâ linearî subcoriacâ decomposito-dichotomâ integerrimâ, segmentis elongatis extremis tenuibus obtusis, conceptaculis minutissimis punctiformibus minutissimis in lineolas transversas obscuras parallelas confertissimas digestis. — In mari Mediterraneo, ad littora Océani Gallo-Britannici propè Boulogne ex Desmazières crypt. exs. n. 205. — *Zonaria fasciola* Agardh. F. fasciola Roth. cat. 1. t. 7. f. 1. Esp. t. 44. (v. s.)
5. *D. LACINIATA* (Lamour. l. c.) fronde planâ linearî membranacea dichotomo-ramosissimâ, segmentis elongato-enneatis approximatis tenuibus ad apicem in lacinias tenuissimas penicillatas solutis, conceptaculis minutissimis punctiformibus in parvas maculas orbiculares nudique sparsas confertas digestis. — In Oceano et mari Mediterraneo rario. — *D. penicillata* Lamour. l. c. *Zonaria multifida* Agardh. Chauv. alg. norm. n. 48. *Ulva multifida* eng. bot. t. 1913. Turn. in Schrad. journ. 1800. 2. p. 301. t. 1. f. B. (v. s.)
6. *D. SETOSA* (Dub. mss.) fronde planâ palmato dichotomâ linearî elongato-cuncatâ, segmentis angustis margine hinc inde setosis apice in lacinias flabellatas obtusas truncatasve solutis, conceptaculis punctiformibus minutissimis lineas flexuosas remotas transversas digestis. — Ad littora Corsicæ (Ph. Thomas). (v. s. D.)
7. *D. CILIATA* (Lamour. in Desv. journ. bot. t. 2. p. 41.) fronde planâ dilatato-palmata, segmentis latis margine integris aut ciliato-serratis sœpè irregulâribus apice truncato-obtusis, conceptaculis punctiformibus in lineas diverse flexuosas continuas aut interruptas digestis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Zonaria atomaria* f. Agardh. syst. F. pseudo-ciliatus Lamour. diss. t. 25. f. 2. *Ulva atomaria* Woodw. U. serrata DC. fl. fr. 2. p. 11. (v. v.)

XXIII. PADINA Adans. Lamour. Bory dict. class. t. 12. p. 589. Gaillon res. thalass. p. 24. — Dictyotæ sp. Lam. ess.

Frons reniformis flabelliformis plana reticulata enervis; conceptacula granuliformia ad superficiem frondis sita in lineolas transversas parallelas arcuatas concentricasque digesta.

1. *P. TOURNEFORTIANA* (Lamour. in dict. class. l. c.) stipite fibroso spongioso, fronde flabelliformi ramosâ in laminas cuneatas laciniatas explanata, conceptaculis sœpè sparsis aut in lineolas flexuosas transversas digestis. — Ad littora Galloprovinciæ et Corsicæ ex cl. Lamour. — *F. Tournefortii* Lamour. diss. t. 26. f. 1. Bertol. am. t. 6. f. 1. *Zonaria flava* Ag. — *Tourn.* inst. t. 336. (v. s.)
2. *P. SQUAMARIA* (Lamour. l. c.) frondibus reniformibus aggregatis subimbriatis coriaceis rubro-fuscis subtus tomentosis, conceptaculorum zonis concentricis concoloribus. — Ad littora Mediterranea et Oceanica circa Bayonam. ex cl. Bory. — *F. squamarius* Gmel. t. 20 f. 1. Turn. t. 224. *Ulva squamaria* Gmel. DC. fl. fr. 2. p. 17. *Zonaria squamaria* Ag. (v. v.)
3. *P. PAVONIA* (Lamour. l. c.) frondibus membranaceis reniformibus flabelliformibus viridi-pallescibus subtus glabris margine tenuissime hitsuto-tomentosis longitudinaliter striatis et transversim concentricè sulcatis. — In mari frequens. — *Ulva pavonia* Linn. Esp. app. t. 4. evg. bot. t. 1276.

956 ACOTYL. SEU CELLULARES.

DC. fl. fr. 2. p. 17. *Zonaria pavonia* Drap. Ag. — Ellis cor. t. 33. f. c. — Moris. t. 8. f. 7.

a. Oceanica, stipite elongato in frondes basi cuneiformes diviso. — P. Oceanica Bory. (v. v.)

b. Mediterranea, stipite brevissimo in frondes basi reniformes diviso. — P. Mediterranea Bory. (v. v.)

XXIV. ASPEROCOCCUS Lamour. ess. thal. in ann. mus. 20. p. 277. — Encælium Agardh. — Ulvæ sp. auct.

Frondes reticulatæ fistulosæ simplices elongatæ; conceptacula granuliformia solitaria sparsa primum innata demum proeminentia et frondem exasperantia, oculo armato papillæformia elongato-rotunda.

i. *A. rugosus* (Lamour. l. c.) fronde angustâ subfiliformi subincrassatâ valde exasperatâ. — In Oceano mari Mediterraneo. — *Ulva rugosa* DC. fl. fr. 2. p. 8 non Linn. *Encælium echinatum* Ag. (v. s.)

b. bulbosus, fronde inflatâ clavatâ minus exasperatâ. — In Oceano. — *A. bulbosus* Lamour. ess. l. c. t. 6. f. 5. *Ulva Turneri* eng. bot. t. 2570. *Gastridium opuntia* Lyngb. t. 18. *Encælium bulbosum* Agardh. (v. s.)

Trib. V. ULVACEÆ Lamour. l. c. p. 275. *Gaillon res. thal.* p. 7 et 25.

Frondes virides aut viridi-fuscescentes rariū violaceæ exsiccatione colorem servantes aut lūescentes, papyraceo-membranaceæ, e contextu nitido tenerrimo cellulari rariū filamentoso conflatæ, continuæ, flabelliformes planæ aut fistulosæ, simplices aut ramosæ. Conceptacula minutissima per totam frondem hinc inde sparsa aut immersa. — In mari aut aquâ dulci viventes, rariū terrestres.

XXV. FLABELLARIA Lamour. in ann. mus. 20. p. 274. t. 12. f. 4. *Gaillon res. thalass.* p. 26. — *Codii* sp. Agardh. — *Ulvæ* sp. DC. — *Confervæ* sp. Desfont.

Stipes simplex ramosusve compressus dilatatus in frondem flabelliformem parenchymate quodam obiectam et e filamentis continua tubulosis ramulis brevibus horizontalibusque intertextis contextam; conceptacula ignota.

i. *F. Desfontainii* (Lamour. l. c.) frondibus planis membranaceis subzonatis margine eroso-laciñati, filamentis hinc inde liberis et parenchymate destitutis. — Ad littora Mediterranei Massiliæ ad Nicæam. — Desmaz. cr. exs. n. 204. *Ulva flabelliformis* Poir. DC. fl. fr. 5. p. 4. *Conferva flabelliformis* Desf. atl. *Codium flabelliforme* et membranaceum Ag. syst. 177. — Mars. hist. t. 6. f. 27. Ginn. op. post. t. 25. f. 56. — *Filamenta Vaucheriis* analogia intus corpusculis ovoideis tenuissimis vestita. (v. v.)

XXVI. BRYOPSIS Lamour. ess. l. c. p. 281. Agardh syst. p. 158.

Frons fistulosa continua hyalina ramosa nitida, intus corpusculis globuliformibus minutissimis viridibus onusta et ab iis colorata; conceptacula ignota.

i. *B. Balbisiana* (Lamour. ess. in ann. mus. t. 20. t. 7. f. 2.) dense cespitosa, frondibus intertextis inferue nudis demum ramosissimis dichotomis, ramulis elongatis simplicibus aut apice ramulosis. — In mari Mediterraneo. — Agardh syst. 179^o (v. v. D.)

2. *B. HYPOIDES* (Lamour. l. c. t. 1. f. 2.) fronde tereti tenerimâ a basi ramo-sissimâ, ramis ramulisque elongatis vagis intertextis. — In mari Mediterraneo propè Massiliam (cl. Solier), Cette ex Lamour., in Oceano propè St.-Malo (cl. de Bréb. et Lenormand). — *B. arbuscula* Ag. syst. 179. non Lamour. (v. s.)
3. *B. MUSCOSA* (Lamour. journ. bot. 2. t. 1. f. 4.) fronde tereti ramosâ, ramulis setaceis brevibus vagis simplicibus superne numerosissimis densis, infernè rarís. — In mari Mediterraneo propè Massiliam ex Lamour. (v. s. communica-tam a cl. Chauvin.)
4. *B. ARBUSEULA* (Lamour. journ. bot. 1. 2. t. 1. f. 1.) fronde compressâ infernè undâ a medio ramosâ ramis pinnatis, pinnalis patensibus longinsculis laxis sparsis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *B. composita* et *B. plumosa* Agardh syst. p. 179 et 178. *Fucus arbuscula* DC. fl. fr. 2. p. 35. *Ulva plumosa* Huds. (v. v.)

XXVII. SCYTOSIPHON. — *Scytosiphonis* sp. *Lyngb.* *Agardh.* — *Ceramii* sp. *Roth.*

Frons teres angustissima filiformis ramosissima non tubulosa; conceptacula ovato-globosa solitaria hic illic frondis paginæ exteriori im-mersa.

1. *S. FOENICULACEUS* (fl. dan. t. 1595. f. 1.) fronde setacea vase ramosâ, ramis basi patulis apicem versus attenuatis. — In Oceano circâ Cherbourg (cl. Chauvin et Lenorm.). — *Lyngb.* t. 14. *Chauv.* alg. norm. n. 99. *Fucus sub-tilis* Turn. t. 234. *Ceramium fibrosum* Roth. — *Dill. musc.* t. 2. f. 8. — *Barr.* ic. t. 1123. f. 1. (v. s.)

XXVIII. CHORDA Lamour. in ann. mus. 20. p. 46. *Lyngb.* tent. p. 72. — *Chordæ* sp. Stackh. — *Scytosiphonis* sp. *Agardh.*

Frons teres elongata simplicissima tubulosa, tubo interiori dissepimentis hic illic intersepto; conceptacula minutissima pyriformia totam externam frondis paginam præsertim in partibus inferioribus densissime ob-sidentiae.

1. *C. FILUM* (Lyngb. l. c. t. 18.) frondibus aggregatis utrinque attenuatis senec-tute spiralibus. — In Oceano. — *Fucus filum* Linn. Turn. t. 86. eng. bot. t. 2487. fl. dan. t. 821. *Fucus Tendo* Esp. t. 22. *Ceramium filum* Roth. DC. fl. fr. 2. p. 47. — *Bocc. mus.* t. 7. f. 9. *Fusco-olivacea*. (v. v.)

XXIX. ULVA Lamour. ess. l. c. p. 277. — *Ulva Solenia Porphyra et Tetraspora* Ag. — *Ulvæ* sp. DC.

Frons cellulosa fistulosa aut plana membranacea substantiâ tenerimâ; conceptacula granuliformia minutissima innata sparsa nunquam eminentia.

Sect. 1. *ILEA* Fries syst. orb. veg. 1. p. 336. *Gaillon res. thalass.* p. 26. — *Solenia* Agardh non Hoffm. Pers., etc. — *Scytosi-phonis* sp. *Lyngb.*

Frons tubulosa ad basin attenuata, contextu striato et in pluribus areolato; conceptacula densissima.

1. *U. FISTULOSA* (Huds. ang. 569.) fronde tereti filiformi tubulosâ utrinque attenuatâ coriacea simplicissimâ. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Eng. bot. t. 642. DC. fl. fr. 5. p. 2. *U. filum* Gonan; *U. lumbicalis* Lamour. *Scy-tosiphon fistulosum* Lyngb. tent. p. 66. *S. filum* ζ *fistulosum* Agardh. *Encælium Lyngbyanum* Grev. crypt. fl. t. 290. — *Viridi-olivacea*. (v. s.)
2. *U. INTESTINALIS* (Linn. sp. 1632.) fronde tereti longissimâ tubulosâ simplici-

- ad apicem subinflatā. — In fossis aquae stagnantis aut subsalsæ. — DC. fl. fr. 2. p. 8. Mong. et Nestl. exs. n. 791. *Solenia intestinalis* Agardh. (v. v.)
3. *U. VENTRICOSA* (DC. rapp. 1. p. 7.) fronde simplici fistulosā elongatā basi constrictā demūn ventricosā hinc inde constrictā ad apicem subappendiculatā. — Ad littora Oceani rarius. — Lamour. ann. mus. 20. p. 280. DC. fl. fr. 5. p. 2. *U. instestinalis* γ maxima Agardh. Chauv. alg. norm. n. 90. — Dill. musc. t. 9. f. 7. *Viridis*. (v. s.)
4. *U. COMPRESSA* (Linn. sp. 1632.) fronde ramosā tubulosā elongatā lineariclavatā filiformi compressā, ramis simplicibus basi attenuatis. — In Mari et Oceano vulgaris. — DC. fl. fr. 2. p. 7. eng. bot. t. 1739. fl. dan. t. 1480. f. 1. — *Viridis* aut luteo-viridis. (v. v.)
- β. crispata* (Lyngb. t. 15. f. 1.) fronde rugulosā ramulos capillares simplices teretes emittente. — *Ulva prolifera* fl. dan. t. 763. f. 1. Lamour. ess. p. 280. l. c. — Cum priori et in fossis submarinis stagnantibus. (v. s.)
- γ. crinita* (Ag.) fronde filiformi capillari. — In aquis dulcibns et salsis. — *Ulva capillaris* Lam. *U. confervoides* Thunb. Lam. *Solenia clathrata* Agardh. *Conferva erinaria* Roth cat. 1. t. 1. f. 3. *Scyotosiphon clathratus* Lyngb. t. 16. Fl. dan. t. 1667. — Mich. gen. t. 89. f. 1. — Dill. musc. t. 2. f. 7. (v. v.)
5. *U. LINZA* (Linn. sp. 1633.) fronde lanceolato-ensiformi utrinque longè attenuatā undulato-crispā. — In Mari et Oceano. — DC. fl. fr. 2. p. 10. Fl. dan. t. 889. *Solenia Linza* Ag. S. *Bertolonii* Ag. *Ulva crispata* Bertol. Dill. musc. t. 9. f. 6. — *Viridis*. (v. v.)
- β. lanceolata* (Ag.) fronde elongatā dilatato-lanceolatā minus crispā. — *U. lanceolata* Linn. DC. fl. fr. 2. p. 10. *U. caulescens* Lamour. ess. thal. t. 7. f. 1. DC. fl. fr. 5. p. 3. — Dill. musc. t. 9. f. 5. — *Viridis*. (v. s.)

Sect. II. ULVASTRUM. — *Ulva Gaillon res. thal. p. 25.* — *Ulva* et *Porphyra* Ag.

Frons plana membranacea non striata nec areolata; conceptacula subquaternata.

6. *U. PURPUREA* (Roth catal. 1. t. 6. f. 1.) fronde purpureā planā tenui oblongo-lanceolatā aut dilatatā margine integrā undulato-crispā. — In Mari et Oceano ubique. — DC. fl. fr. 2. p. 9. *Porphyra purpurea* Agardh. (v. v.)
- β. umbilicata* (Ag.) fronde rotundatā margine laciniatō-crispā. — Ad littora Oceani. (v. v.)
7. *U. LACTUCA* (Linn. sp. 1632.) frondibus viridis planis tenuis subcoriaceis obovatiss lanceolatis subrotundisve undulatis integris laciniatiss. — In Mari et Oceano ubique. — DC. fl. fr. 2. p. 9. *U. umbilicalis* Linu. DC. Lamour. *U. latissima* Agardh. *U. rigida* Ag. *U. plicata* Ag. — Dill. musc. t. 8. f. 3. (v. v.)
8. *U. CRISPATA* (Lightf. scot. 2.) frondibus confertis bullosis tenuissimis plicato-crispis rugosis decumbentibus in stratum expansum aggregatis. — Ad terram in umbrosis et ambulacris vix adhærens. — Ag. syst. 190. *U. terrestris* Roth DC. fl. fr. 5. p. 3. — Dill. musc. t. 10. f. 12. (v. s.)
9. *U. MINIMA* (Vauch. conf. t. 17. f. 1.) fronde parvulā obovatā aut subrotundā lubricā tenuissimā subdiaphanā sinnoso-bullosā demūn explanatā. — In rivulis lapidibus adhærens. — DC. fl. fr. 2. p. 8. *U. halbosa* Agardh. — Dill. musc. t. 8. f. 2. (v. s.)

Sect. III. TETRASPORA Ag. syst. p. XXXII et 188.

Frons tubulosa vel inflata gelatinosa; conceptacula quaternata laxa.

10. *U. LACUNOSA* (Dub. mss.) frondibus gelatinosis gregatim adnatis simplicibus primò tabulosis apice clavatis mox in membranam laciniatem foraminibus inæqualibus cribrosis explanatis. — Ad rivorum lapides circa Vire (cl. Delise et Lenormand), Falaise (cl. de Brebiisson), Dax (cl. Gratehou). —

Tetraspora lacunosa Chauvin ined. — Conceptacula sub lente quaternatim disposita, membranula cæteram hyalina perfragilis. — Chauv. in litt. (v. s.)

11. *U. CYLINDRICA* (Wahl. lapp. t. 30. f. 1.) fronde simplici elongata tubulosa subcylindrica apice clavata, tenuissimâ diaphana. — In rivulis circâ Palaise (cl. de Breb. et Lenorm.). — *Tetraspora cylindrica* Agardh. (v. s.)

12. *U. GELATINOSA* (Vauch. conf. 1. 17. f. 2.) fronde vesiculosâ ovatâ clavata tremulâ. — In rivulis. — *Tetraspora gelatinosa* Ag. *Rivularia tubulosa* DC. fl. fr. 2. p. 5. (v. v.)

13. *U. LUBRICA* (Roth. cat. 1. p. 204. t. 5. f. 7.) fronde simplicisculâ tubulosa convolutâ undulato-sinuosa tenuissimâ gelatinoso-lubricâ. — In fossis aquæ stagnantis. — Moug. et Nestl. vog. n. 600. *Rivularia lubrica* DC. fl. fr. 5. p. 1. *Tetraspora lubrica* Ag. Chauvin alg. norm. n. 91. (v. s.)

XXX. CAULERPA Lamour. in ann. mus. t. 20. p. 282. — *Ulva* sp. DC.

Frons stipitata membranaceo-foliacea viridis nitens pinnata plana aut e ramentis brevissimis imbricatis composita e surculo cylindrico horizontali reptante aut ramoso proveniens; conceptacula ignota.

1. *C. PROLIFERA* (Lamour. in journ. bot. 1809. t. 2. p. 142.) surculo angulato filiformi repente, frondibus stipitatis planis oblongis nitidis simplicibus proliferis. In mari Méditerraneo circâ Massiliam, Telonem. — *Ulva prolifera* DC. fl. fr. 5. p. 4. (v. s.)

2. *C. OCELLATA* (Lamour. l. c. t. 2. f. 1.) surculo brevissimo repente, frondibus subsessilibus planis oblongis nitidis subproliferis maculis orbiculatis ocellatis instructis. In mari Méditerraneo propè Massiliam ex cl. Lamour. — *Ulva ambigua* DC. l. c. (v. s. ex Hisp.)

XXXI. NEMALION Dub. mss. — *Chordariæ* sp? Ag. — *Fuci* sp. Bertolini.

Frons simpliciuscula compressa gelatinoso-membranacea elongata obtecta filamentis tenuissimis pellucidis; conceptacula? filamentis immixta numerosa brevia aut paululum elongata apice claviformia intus materiâ viridi impleta.

1. *N. LUBRICUM* (Dub. mss.) frondibus e massâ gelatinosâ prodeuntibus simpliciusculis flexuosis obtusis lubricis. — In mari Méditerraneo circâ Massiliam (cl. Solier). — *Fucus Nemalion* Bertol. ann. t. 5. f. 9. *Chordaria?* Nemalion Agardh syst. 257. — *Viridi suscens*. (v. s.)

XXXII. SPONGODIUM Lamour. ess. thalass. in ann. mus. 20. p. 288. *Gaillon res. thalass.* p. 28. — *Codium* sp. Agardh. — *Ulva* sp. DC.

Frons ramosa aut simplex e filamentis fistulosis intertextis composita, obtecta filamentis numerosis brevibus obtusis claviformibusve circa frondem horizontaliter et radiatim digestis intus corpusculis oblongis minutissimis virescentibus impletis.

1. *S. DICHOTOMUM* (Lamour. l. c.) fronde cylindrica elongata dichotoma ramissimâ fastigiatâ. — In Oceano et mari Méditerraneo. — *Fucus tomentosus* Stackh. t. 7. et 12. eng. bot. t. 712. Turn. t. 135. *Ulva tomentosa* DC. fl. fr. 2. p. 6. *Codium tomentosum* Agardh. — *Moris. hist.* 3. s. 15. t. 8. f. 7. — *Viridescens*. (v. v.)

2. *S. ADHÆRENS* (Lenormand in litt.) fronde expanso-crustacea sessili irregulari. — Ad rupes insularum Chosey propè Granville (cl. Lenormand). — *Codium adhaerens* Agardh syst. 178. — *Siccum atro-viride*. (v. s.)

3. *S. BURSA* (Lamour. l. c.) fronde globosâ cavâ sessili. — Ad rupes arenosas circa Granville et St. Malo (cl. Lenormand), in mari Méditerraneo ex Lamour. — *Fucus Bursa* Turn. t. 136. eng. bot. t. 2183. *Codium Bursa* Ag. —

960 ACOTYL. seu CELLULARES.

Filamenta brevissima numerosissima clavæformia pellucida. Amœnæ viridis.
(v. s.)

XXXIII? HYDROCLATHRUS Bory dict. class. 8. p. 419.

Frondes membranaceo--mucosæ tenaces crassæ exsiccatione duriusculæ fuscescentes pellucidæ , primò in sphæram irregulariter ovoideam clathrato-reticulatam demùm in membranas laceratas laxè reticulatas adpressas dispositæ ; conceptacula granulosa densa sparsa innata.

1. H. CANCELLATUS (Bory l. c. cum ic.). — Ad rupes Vindilis (Belle-Ile en mer) detexit cl. Bory de St.-Vincent. — Encælium clathratuni Ag. syst. 262.

Trib. VI. CHÆTOPHOROIDEÆ Grev. fl. edin. p. 336. — Tremellarieæ Bory in dict. class. 3. p. 14.

Frondes viridis rariū coloratæ gelatinosæ globosæ aut elongatæ cylindricæ , continuæ , intùs aut filamentis simplicibus aut ramosis, subcontinuis aut articulatis, sparsis aut e centro radianibus , aut rariū granulis discretis farctæ . — Ad terram aut rupes madidas, in aquis dulcibus , rariū in mari viventes.

XXXIV. NOSTOC Vauch. conf. p. 203. Ag. syst. p. xvij. — Nostoc et Ulvæ sp. DC. — Clavatella et Nostoc Bory.

Frons gelatinosa expansa et plicata vel globosa filamentis moniliformibus curvato-crispis farcta.

Sect. I. CLAVATELLA Bory dict. class. t. 3. p. 14 et t. 4. p. 197. — Ulvæ sp. DC.

Frondes membranaceo-coriaceæ globulosæ imbricatæ filaments divergentia dichotoma transversim articulata clavata foventes.

1. N. MESENTERICUM (Agardh syst. p. 21.) coriaceum viridi-olivaceum , froude sinuoso-lobata lobis convexis intùs vacuis. — In Oceano , mari Mediterraneo propè Massiliam (cl. Solier). — Ulva Nostoc DC. fl. fr. 5. p. 1. U. mesenterica Bonnem. in journ. bot. t. 24. f. 1. Chætophora marina Lyngb. Clavatella Nostoc Bory. Corynephora marina Ag. syst. 24. (v. v. DC.)

2. N. BULLATUM (Dub. mss.) coriaceum atro-viride , fronde bullatæ lubricæ , bullis subsphæricis irregularibus aggregatis intùs vacuis. — Ad rupes submarinas Oceani rarins. — Ulva bullata DC. fl. fr. 5. p. 1. Aleyonidium bullatum Lamour. Clavatella viridissima Bory. (v. v. DC.)

Sect. II. NOSTOCHIA. — Nostoc Vauch. DC. Bory.

Frondes membranaceæ globulosæ aut sinuosæ filaments simplicia curvata foventes.

3. N. VESICARIUM (DC. fl. fr. 2. p. 3.) carlagineo-membranaceum nitidum vesicæforme vix rugosum succo viscoso impletum. — Ad terram madidam. — Tremella vesicaria Bull. champ. p. 224. t. 427. f. 3. — Viridi-rufescens. (v. s.)

4. N. COMMUNE (Vauch. conf. t. 16. f. 1.) expansum difforme plicatum undulatum membranaceum nitidum , filamentorum articulo ultimo majusculo. — Ad terram post pluvias vulgatissimum. — DC. fl. fr. 2. p. 3. Mong. et Nestl. exs. n. 700. Tremella Nostoc Linn. eng. bot. t. 461. Ulva ætherea DC. fl. fr. 5. p. 3. — Dill. musc. t. 10. f. 14. — Mich. t. 67. f. 1. — Var. a rufo-viridi ad cærulecentem. (v. v.)

5. N. CORIACEUM (Vauch. conf. t. 16. f. 4.) expansum difforme coriaceum solidum crispum , filamentis minutis recurvatis vix moniliformibus. — Ad terram paludosam rariū. — Luteo-rufescens. (v. s.)

6. *N. VERRUCOSUM* (Vanch. conf. t. 16. f. 3.) suborbiculare globoso-plicatum subcoriaceum demum gelatinosum verrucis granulatis creberrimis asperum, filamentis moniliformibus intertextis. — Ad saxa in aquis puris et rivulis. — DC. fl. fr. 2. p. 4. Chauvin alg. norm. n. 53. Tremella verrucosa Linn. — Dill. musc. t. 10. f. 16. — Mich. t. 67. f. 2. — Junius solidum-lapidibusque adfixum, adultius vesiculosum et aquis innatans ex el. Chauvin. Viride. (v. v.)
7. *N. LICHENOIDES* (Vanch. conf. t. 16. f. 5.) difforme expansum crispum membranaceum, filamentis moniliformibus. — Ad terram et lapides post pluvias. — DC. fl. fr. 2. p. 3. — Olivaceo-nigricans. (v. v.)
8. *N. SPHÆRICUM* (Vanch. conf. t. 16. f. 2.) minutum globosum solidum lœve interdùm confluens, filamentis moniliformibus. — Ad terram humidam. — DC. fl. fr. 2. p. 4. N. pusillum Mong. et Nestl. vog. n. 799. Lineckia granulata Roth. Ulva pisiformis Huds. — Dill. musc. t. 10. f. 17. — Brunneeo-viride. (v. s.)
9. *N. LEMANEÆ* (Agardh syst. p. 20.) minutissimum dilatè olivaceum maximè rugosum cavum subhemisphæricum aggregatum demum confluens, filamentis tenuissimis paucis. — Lemaneæ fluviatilis filaments investiens circà Minatem (el. Prost).

XXXV. RIVULARIA Roth. catal. 1. p. 212. Agardh syst. p. 24. — Linckia Lyngb. tent. p. 194. — Linckia et Gaillardotella Bory.

Frons gelatinosa subglobosa filamentis e communi basi prodeuntibus, radiantibus globulo insidentibus simplicibus cylindricis continuis intus annulatis appendicibus tenuissimis terminatis farcta. — Color atro-virens.

1. *R. ATRA* (Roth. 1. c.) fronde hemisphæricâ durâ, filamentis densissime compactis appositione ramosis. — Ad lapides, Algas, etc., in Oceano propè Granville (el. Lenormand). — Eng. bot. t. 1798. Linckia atra Lyngb. t. 67. Batrachospermum hemisphæricum DC. fl. fr. 2. p. 591. Tremella hemisphærica Linn. — Gregaria sinapis semen circiter magnitudine æquans. (v. s.)
2. *R. DURA* (fl. dan. t. 1788. f. 1.) fronde globosâ sublævi durâ opacâ, filamentis tenuibus dense compactis breviter exsertis apice laciniatis. — Ad plantas aquáticas in Neustriâ. — Linckia dura Lyngb. t. 67 excl. syn. *R. pisum* ♂ dura Agardh. Chauv. alg. norm. n. 27. — Gregaria a Sinapis semine ad Pisum magnitudine. (v. s.)
- ♂. *Pisum*, fronde lævi molli nitidâ atro-viridi. — Cum priore ex cl. Lenormand. — *R. Pisum* Ag.
3. *R. NATANS* (Roth. cat. 3. p. 340.) fronde globosâ gelatinosâ cavâ sordide viridi. — Ad plantas aquáticas in fundo aquæ nascens demum natus. — Linckia natans Lyngb. t. 67. f. A. Gaillardotella natans Bory in Moug. et Nestl. vog. n. 796. et in dict. class. t. 7. p. 100. Tremella nataus Hedw. th. t. 36. f. 7-10. Ulva pruniformis eng. bot. t. 968. — A Sinapis semine ad Avellanae nucem magnitudine. (v. v.)

XXXVI. CHÆTOPHORA Lyngb. p. 192. Agardh syst. p. xix et 21. Bory dict. class. 3. p. 430. — Batrachospermi sp. Vanch. DC.

Frons gelatinosa globosa vel lobata filamentis e communi basi prodeuntibus radiantibus elongatis articulatis ramosis et appendicibus ciliiformibus tenuissimis terminatis farcta. — Color in plerisque lâtè viridis.

1. *C. HÆMATITES* (Bory in dict. cl. 1. c.) fronde pulvinatâ subglobosâ lævissimâ atro-viridi, filamentis subsimplicibus adpressis elongatis. — Ad rupes graniticas madidas Pyrenæorum. — Batrachospermum hæmatites DC. syn. gall. p. vi. fl. 5. p. 9. (v. v. DC.)

962 ACOTYL. SEU CELLULARES.

2. *C. PISIFORMIS* (Agardh syst. 27.) fronde globosâ dilutè viridi, filamentis adpressis implexis ramosis ramis dichotomis. — In fontibus et fossis. — *Batrachospermum intricatum* Vauch. t. 12. f. 2. 3. DC. fl. fr. 2. p. 58. *Rivularia pisiformis* Roth. (v. v.)

β. tuberculosa (Ag.) fronde tuberosâ cavâ, filamentis in orbiculos multos distributis. — *C. tuberculosa* Hork. *Rivularia tuberculosa* Roth. eng. bot. t. 2366.

3. *C. ELEGANS* (Lyngb. tent. t. 65. f. D.) fronde globosâ dilutè viridi, filamentis internè dichotomis patentibus superne in ramos fasciculatos divisis. — Ad plantas aquaticas. — Mong. et Nestl. n. 797. *Rivularia elegans et rugosa* Roth. (v. v.)

4. *C. ENDIVIAE FOLIA* (Agardh syn. 42. Lyngb. tent. t. 65. f. C.) fronde teretiusculâ linearî papillosâ ramosâ dichotomâ dilutè viridi, ramis divaricatis apice explanato-dilatatis. — In aquis, lapidibus, lignis et herbis adhærens. — Mong. et Nestl. vog. n. 699. Chauv. alg. norm. n. 1. *C. cornu-damæ* Agardh. *Rivularia endiviaefolia* fl. dan. t. 1488. f. 21. *Batrachospermum fasciculatum* Vanch. conf. t. 13. f. 1. 2. DC. fl. fr. 2. p. 58. — Dill. muse. t. 10. f. 10. — Filamenta adpressa simplicia apice breviter ramosa. (v. v.)

β. elongata (Ag.) ramis gracilibus elongatis attenuatis. — *C. elongata* Lyngb. tent. 192. *C. riccioides* Bory. *Riccia fluitans* fl. dan. t. 275.

XXXVII. MESOGLOIA Ag. syn. 196. Lyngb. tent. 190. t. 65. — *Chætophoræ* sp. Hook.

Frons gelatinosa filiformis cylindrica elongata ramosa, e filamentis compactis minutissimis hyalinis articulatis dichotomis e filamento quasi medullari radiantibus composita.

1. *M. VERMICULARIS* (Ag. syn. 126.) fronde filiformi luteo-fuscescente siccâ fusco-nigrescente subcylindrica, ramis divaricatis elongatis. — In Oceano ad littora Neustriæ et Armoraciæ. — Lyngb. t. 65. *Alcyonidium? fucicola* Lamour. *Rivularia fucicola* Roth. (v. v.)

β. coriacea (Agardh) fronde cylindrica solidâ magis dilatata ramosissimâ, ramis elongatis subsparsis. — Ad littora Neustriæ (cl. Lamour.), Armoriciæ (cl. Bonnemaison), Massiliæ (cl. Solier). — *Rivularia vermiculata* eng. bot. t. 1818. *Alcyonium vermiculatum* Lamour. ess. thalass. *Dumontia vermiculata* Lamour. in herb. meo. *Batrachosperma alcyonidea* Bory dict. class. 2. p. 227. (v. s.)

2. *M. MULTIFIDA* (Agardh syst. 50.) fronde filiformi tereti flexuosa rubra siccâ rubro-fusca dichotoma, axillis rotundatis, ramis supremis divaricatis apice obtusisculis. — Ad littora Armoriciæ (cl. Chauvin). — *Rivularia multifida* Web. et Mohr it. t. 3. f. a. b. c. *Chordaria multifida* Lyngb. fl. dan. t. 1669. *Chætophora multifida* Hook. *Batrachosperma spongiodoides* Bory. dict. class. 2. p. 227. (v. s. communic. a cl. Chauvin.)

β. rosea (Agardh) substantiâ molliori magisque lubricâ, colore etiam in exsiccatâ dilutè roseo, axillis acutioribus, ramis supremis approximatis. — Ad littora Armoriciæ (cl. Chauvin). (v. s.)

3. *M. COCCINEA* (Agardh syst. 51.) fronde submoniliformi virgata coccinea filiformi, ramis sparsis obtusis patentibus. — In Oceano propè Brest ex cl. Lenormand. — *Rivularia verticillata* eng. bot. t. 2466. *Batrachosperma rivularioides* Bory dict. class. 2. p. 227.

XXXVIII. CLUZELLA Bory in dict. class. t. 3. (1823) p. 14. — *Hydrurus* Agardh syst. alg. (1824) p. 24. — *Rivulariæ et Batrachospermi* sp. DC.

Frons gelatinosa elongata ramosissima, ramis subulatis cylindricis, e filamentis coadunatis hyalinis granula elliptica plerumque præsertim in extremitate ramulorum seriatim disposita, foventibus composita.

1. *C. FÄTIDA* (Bory in dict. class. t. 4. p. 234.) fronde basi compactâ tandem apice in ramos graciles secedens. — In rivulis lapidibus adhærens. — *Ulva fætida* Vanch. conf. t. 17. f. 3. *Rivularia fætida* DC. fl. fr. 2. p. 5. *Conferva fætida* Vill. t 56. *Hydrurus Voucherii* Ag. — *Fætida atro-viridis.* (v. v.)
2. *C. MYOSURUS* (Bory l. c.) fronde a basi in ramos verticillatos excentricos penicillatos divisa. — In rivulis et fontibus Vogesorum. Jurassi Cebennarum. — *Batrachospermum Myosurus* Ducluz. B. *Myurus* DC. fl. fr. 2. p. 591. *Palmella Myosurus* Lyngb. t. 68. f. 2. *Rivularia myurus* Mong. et Nestl. vog. n. 500. — *Fætida* plerumque dilutè viridis. (v. v.)

XXXIX. PALMELLÆ Lyngb. tent. t. 69. Bory dict. class. t. 3. p. 14 et 12. p. 620.
— *Palmellæ* sp. Agardh.

Gelatina hyalina expansa vel globosa granulis discretis globulosis vel ellipticis farcta.

1. *P. HYALINA* (Lyngb. t. 69.) fronde hyalino viridescente subglobosa, granulis globosis viridibus. — In aquâ dulci natans. — Mong. et Nestl. vog. n. 800. Grev. crypt. fl. t. 247. (v. v.)
2. *P. RUPESTRIS* (Lyngb. t. 69.) fronde disformi rugosâ lutescenti-olivacea, granulis globosis quaternatim connatis. — Ad rupes madidas propè Falaise (cl. de Brébisson). — Agardh syst. 13. (v. s.)

§. II. FILAMENTOSÆ.

Trib. VII. **CERAMIEÆ**. — Ceramiarieæ Bory dict. cl. 3. p. 369 add. plur. gen. — Thalassiohytæ diaphysisteæ Gaill. res. thal. p. 39 et seq. excl. *Chloronito*.

Filamenta plerumque colorata, olivacea fusca purpurea rosea, etc. rariùs viridia, cylindrica, simplicia aut ramosa, articulata id est cellulis plus minus elongatis simplici aut multiplice serie dispositis et epidermide volutis constantia. Fructificatio biformis, hæc sub formâ conceptaculorum formâ variorum sessilium pedicellorumve occurrens, illa tuberculiformis globosa apicibus ramorum intumescentibus innata. — Ferè omnes exceptis quibusdam aquæ dulcis incolis, marinæ.

XL. CLADOSTEPHUS Ag. syn. Lyngb. tent. p. 102. t. 30. — *Dasytrichia* Lamour. ined. Bonnemais. ess. hydroph. Gaillon res.

Filamenta articulata rigida olivaceo-fuscescentia simplicia aut ramosa ramis laxis diffusis sæpè trichotomis solidis coriaceis undique sitis imbricatis aut verticillatis simplicibus vel ramosis vestitis; fructificatio uniformis rara conceptaculis ovoideis pedicellatis lateralibus.

1. *C. CLAVÆFORMIS* (Agardh syst. p. 168.) fronde nanâ simplici clavæformi undique setis densissimis onustâ. — In mari Mediterraneo. — *Conferva clavæformis* Roth. Spr. in berl. mag. 1809. t. 6. f. 8. *Spongia vermicularis* Scop. carn. t. 64. — Setæ hyalinæ materiâ viridi farctæ aut vacuæ clavatae apice 2-5 ramulis ad insertionem articulatis verticillatis simplicibus instructis. Viridis. (v. v.)
2. *C. VERTICILLATUS* (Hook. scot. 2. p. 89.) fronde elongatâ ramoso-dichotoma basi nudâ, ramis setis densis verticillatis incurvis furcatis vel cristatis imbricatis onustis. — In mari Atlantico et Mediterraneo. — *C. myriophyllum* Ag. — *Ceranium verticillatum* DC. fl. fr. 2. p. 38. *Fucus verticillatus* Wulf.

964 ACOTYL. SEU CELLULARES.

crypt. aq. t. 1. Conserva verticillata Lygbf. Dill. t. 55. eng. bot. t. 1718 et 2427. f. 2. — *Fusco-virescens.* (v. v.)

3. *C. spongiosus* (Agardh syst. p. 168.) fronde elongatâ ramosâ undique setis confertissimis imbricatis simplicibus vestitâ. — In Oceano. — *Ceramium spongiosum* DC. fl. fr. 2. p. 38. *Conserva spongiosa* Huds. Dill. conf. t. 42. eng. bot. t. 2427. f. 1. *Fucus hirsatus* Linn. — *Fusco-virescens.* (v. v.)

XLI. SPHACELARIA Lyngb. tent. p. 103. Agardh syst. p. xxx et 164. Gaillon res. thalass. p. 52. — *Sphacelaria Delisella* et *Lyngbyella Bory.* — *Ceramii sp. DC.*

Filamenta articulata rigida fuscescentia aut fusco-viridia distiche ramosa pinnata, articuli sæpè fasciati; fructificatio biformis, hæc discoidea sessilis ad periphæriam pellucida, illa terminalis ex apicibus ramorum incrassatis truncatis sphacelatis pulvisculum tenuissimum includentibus constans.

1. *S. SCOPARIA* (Lyngb. tent. p. 104. t. 31.) fusco-olivacea cartilaginea ramosissima, ramis fasciculatis subfastigiatis subpinnatis, superioribus elongatis, pinnis brevioribus alternis distichis subulatis in ramis superioribus simplicibus adpressis in inferioribus paululum ramosis subpatentibus, articulis diametro æqualibus 2-3-striatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Desmaz. crypt. exs. n. 151. *Ceramium scoparium* DC. fl. fr. 2. p. 41. *Conserva scoparia* Linn. Dillw. conf. t. 52. eng. bot. t. 1552. — Dill. musc. t. 4. f. 23. (v. v.)

2. *S. PENNATA* (Lyngb. t. 31.) viridi-olivacea cartilaginea ramosa cespitosa parvula pinnata rarius bipinnata, pinnis tenuibus subelongatis alternis oppositisve filiformibus subpatentibus, superioribus pyramidalis, articulis diametro subæqualibus. — *Algis majoribus* adnata in Oceano ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), mari Mediterraneo ex Agardh. — *S. cirrhosa* Agardh. Chauv. alg. norm. n. 36. *Conserva pennata* Huds. Dillw. t. 86. fl. dan. t. 1486. f. 2. *Conf. cirrhosa* Roth. *Delisella penuata* Bory. — Dill. musc. t. 4. f. 21. (v. s.)

3. *S. PLUMOSA* (Lyngb. tent. p. 103. t. 30.) fusco-nigra aut fusco-rubra cartilaginea cespitosa ramosa; ramis vagis pectinato-pinnatis, pinnis oppositè alternisve strictis patentibus confertis simplicibus aut ad apicem congesto-pinnatis summis incurvis, articulis diametro subæqualibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Ag. syst. 166. *Hutchinsia pennata* Ag. syst. 156. *Ceramium pennatum* Roth. cal. 3. p. 133. fl. dan. t. 1486. f. 2.. *Conf. pennata* eng. bot. t. 2330. (v. v.)

4. *S. FILICINA* (Agardh syst. 166.) viridi pallescens cartilaginea cespitosa ramosissima, ramis decomposite pectinato-pinnatis pinnis alternis subulatis, pinnulis minutissimis, articulis diametro æqualibus. — In mari Mediterraneo (cl. Grataloup), Oceano ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), circâ S. Malo ipse reperiit. — *S. disticha* Lyngb. t. 31. *Ceramium filicinum* Gratel. journ. med. 4. p. 33. — Rarissima et elegantissima species. (v. s. D.)

XLII. RHODOMELA Gaillon res. thalass. p. 55. — *Rhodomelæ* sp. Agardh. Bory. — *Gigartinae* sp. Lamour. Lyngb. — *Ceramii* sp. DC.

Filamenta ramosa cylindrica fusco-nigrescentia articulata, articulis, in ramulis tantum sublente simplici distinguendis, fasciatis sed speciem articuli simplicis ferentibus; fructificatio biformis, hæc subformâ conceptaculorum subsessilium ovatorum corpusculos ovatos pyriformesve foventium occursens, illa tuberculiformis globosa apicibus ramorum intumescentibus innata, simplici vel dupli serie congesta.

1. *R. PINASTROIDES* (Ag. syst. 200.) nigrescens cartilaginea rigida crassa ramosissima, ramis apicē (filicem juniorum more) involutis, ramulis sub-simplicibus densissimis subulatis sparsis, summis secundis, conceptaculis lanceolatis sphaericisque. — In mari Atlantico et Mediterraneo. — *Gigartina*

pinastroides Lyngb. *Ceramium incurvum* DC. fl. fr. 2. p. 43. *Fucus pinastroides* Gmel. fuc. t. 11. f. 1. Turn. hist. t. 11. Staekh. t. 13. eng. bot. t. 1402. (v. v.)

2. *R. subfuscata* (Ag. syst. 199.) fusco-nigricans cartilaginea rigida filiformis ramosissima, ramis alternatis erecto-patentibus apice subulatis, ramulis setaceis subulatis fasciculato-penicillatis, conceptaculis ovatis lateralibus subsessilibus. — Ad rupes in Oceano. — *Gigartina subfuscata* Lamour. Lyngb. t. 10. *Fucus subfuscus* Woodw. in Linn. trans. 1. t. 12. Turn. t. 10. Esp. t. 117. Stackh. t. 19. eng. bot. t. 1164. (v. v.)

XLIII. POLYSIPHONIA Grev. fl. edin. p. 308. — *Hutchinsia Agardh*. Lyngb. Gaill. non Brown. DC. — *Grammita Bonnemais*. non Grammitis Swartz. — *Hutchinsia Dicarpella Brogniartella et Grateloupella Bory*.

Filamenta ramosa cylindrica fusco - purpurea exsiccatione nigrescentia; articuli fasciati et speciem articuli simplicis canalibus subparallelis percursi ferentes; fructificatio biformis, hæc subformâ conceptaculorum sessilium basi rotundatum ad apicem acuminatorum aut truncatorum intus corpusculos pyriformes foventium occurrens, illa granuliformis globulosa seriatim ramulorum extremitati subinflatæ et subsiliqueformi innata.

1. *P. polymorpha* (Dub. mss.) atro-fusca sicca nigra dense cespitosa ramosissima fastigiata, filamentis setaceis subæqualibus extremitis plerumque apice furcatis, articulis diametro brevioribus medio punto nigro notatis. — In Oceano. — *P. fastigiata* Grev. *Conferva polymorpha* Linn. Ellis in phil. trans. 57. t. 18. eng. bot. t. 1764. Dillw. t. 44. *Ceramium polymorphum* DC. fl. fr. 2. p. 45. *Cer. fastigiatum* Roth. *Hutchinsia fastigiata* Ag. Lyngb. t. 33. Chauv. alg. norm. n. 35. *Dicarpella fastigiata* Bory. *Grammita fastigiata* Desmaz. crypt. exs. n. 254. — Dill. musc. t. 6. f. 35. B. — Barreb. t. 1301. (v. v.)
2. *P. fucoidea* (Grev. fl. edin. p. 308.) rufo-nigrescens nigrescensve cespitosa elongata, filamentis superne sensim ramosissimis diffusis, ramulis tenuissimis capillaribus alternis subfasciculatis in vetustioribus opacis, articulis infimis brevissimis exsiccatione nodulosis diametrum subæquantibus aut subduplicè superantibus in vetustioribus obsoletis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Hutchinsia nigrescens* Agardh syst. 151. Chauv. alg. norm. n. 62. *H. violacea* Agardh syn. 54 et syst. 150. *H. fæniculacea* Ag. syst. 156. *Dicarpella violacea* Bory. *Ceramium fucoidea* DC. fl. fr. 2. p. 44. *Conf. fucoidea* Dillw. t. 75. eng. bot. t. 1743. *C. nigrescens* eng. bot. t. 1717. *C. nigra* eng. bot. t. 2340. non Dillw. (v. v.)
3. *P. atro-rubescens* (Grev. l. c.) atro-rubescens demùm intensior cespitosa ramosissima tenuissima, ramis elongatis subdistantibus ramulis brevissimis subnatis subfasciculatis onustis, articulis ramorum diametro tripli longioribus, ramulorum diametrum subæquantibus. — Ad littora Galliæ borealis ex cl. Desmaz. — *Conferva atro-rubescens* Dillw. t. 70. Hutch. atro-rubescens Ag. *Grammita atro-rubescens* Desmaz. crypt. exs. n. 253.
4. *P. urceolata* (Grev. l. c.) fusco-rubra cespitosa intertexta elongata, filamentis capillaribus superne sensim ramosissimis, ramulis brevibus diffusis articolatis in ramis longis in ramulis brevibus, conceptaculis substipitatis ovatis urceolatis. — Ad littora Armoraciæ et Massiliæ ex cl. Chauvin. — *Hutchinsia urceolata* Lyngb. t. 34. f. A. *Conferva urceolata* Dillw. p. 82. t. G. eng. bot. t. 2365. (v. s. e Dania communic. a cl. Chauvin.)
5. *P. fruticulosa* (Dub. mss.) fusca nigrescensve cespitosa elongata, filamentis ramosis virgatis, ramis alternatis subpinnatis brevibus ad apicem 3-6 pinulis brevissimis subfastigiatis onustis, articulis in ramis obsoletis in ramulis diametro brevioribus, conceptaculis sessilibus ovatis. — Ad rupes in Oceano et mari Mediterraneo. — *Fucus fruticulosus* Wulf. in Jacq. coll. t. 16. f. 1.

966 ACOTYL. SEU CELLULARES.

Esp. t. 87. eng. bot. t. 1686. Turn. t. 227. *Ceramium Wulfenii* Roth. cat. 3. p. 140. *Grammita fruticulosa* Desmaz. crypt. exs. n. 255. (v. v. D.)

6. *P. ALLOCHROA* (Dub. mss.) fusca aut fusco-nigrescens dense cespitosa ramosissima diffusa, filamentis subcartilagineis dichotomis, ramis divaricatis sub-pinnatis ramulis brevibus ad apicem pinnulis 3-6 brevissimis subfastigiatis onustis, pinnulis in fibras tenuissimas capillatas pellucidas fuscantes penicillatis expansis, articulorum ramorum obsoletis ramulorum abbreviatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Hutch. *allochroa* Ag. *Ceramium subnatum* Ducluz. ess. p. 70. *Conferva capillata* Roth. C. *fibrata* Dillw. t. G. (v. v. D.)
7. *P. BYSSOIDES* (Grev. fl. edin. 309.) recens purpurascens sicca rubro-fusca aut fusco-nigrescens elongata elegantissima ramosissima, filamentis decomposito-pinnatis, ramis elongatis, ramulis obsessis setulis brevissimis subfasciculatis tenuissimis, articulis ramorum diametro triplò longioribus, ramulorum eodem subbrevioribus, conceptaculis ovatis subsessilibus. — Ad littora Oceanij, Algij majoribus innata. — Hutch. *byssoides* Ag. Lyngb. t. 34. Chauv. alg. norm. n. 9. *Ceramium byssoides* DC. fl. fr. 5. p. 9. *Conf. byssoides* eng. bot. t. 597. Dillw. t. 58. *Ceramium molle* Roth. *Brongnartella elegans* Bory. (v. v.)
8. *P. OCCELLATA* (Gratel. in journ. med. monsp. 1807. f. 2.) canescens pusilla subfuscata, filamentis simpliciusculis abbreviatis vestitis ramulis brevissimis ramosissimis penicillatis, setulis terminalibus confertissimis. — Ad rupes maritimos Cettæ (cl. Grateloup). — *Hutchinsia ocellata* Agardh syst. 157. (v. s.)
9. *P. BRODII* (Dub. mss.) fusca cespitosa diffusa decomposito-ramosissima filamentis ramisque primariis patulis inarticulatis, ramulis capillaceis in penicillum fasciculatis articulatis, articulis diametrum subæquantibus, conceptaculis ovato-globosis axillaribus subsessilibus. — Ad rupes portuas Cettæ ex Ducluz., Armorice ex Ag., Calvadosii (cl. Chauvin). — *Hutchinsia Brodii* Lyngb. t. 33. H. *violacea* Chauvin alg. norm. n. 61. non Ag. H. *penicillata* Ag. syst. 157. *Conferva Brodiæ* Dillw. t. 107. eng. bot. t. 2589. *Ceramium granulatum* Ducluz. Agardh. (v. s.)
10. *P. MULTIFIDA* (Dub. mss.) fusca aut fusco-violascens diffusa decomposito-ramosissima, ramisque primariis subpatulis, ramulis suberectis abbreviatis racemoso-fastigiatis sensim tenuioribus supremis capillaceis in filamenta tenuissima hyalina abeuntibus, articulis ramorum diametro subquadriplò longioribus, ramulorum sensim decrescentibus et diametrum vix æquantibus. — In maritimis Monspelii. — *Conferva fæniculacea* var. *multifida* Draparn. *Hutchinsia flocculosa* Agardh? (v. s.)
11. *P. STRICTA* (Grev. fl. edin. 309.) griseo aut fusco-violascens ramosissima tenuis stricta, filamentis æqualibus capillaribus, ramis erectis dichotomis setaceis virgatis, articulis ramorum diametro subquintaplò longioribus, ramulorum minutissimis conceptaculis ovato-rotundis subpedicellatis. — In rupibus maritimis Mediterranei et Calvadosii (cl. Chauvin et Lenormand). — *Hutchinsia stricta* Agardh. *Conferva stricta* Dill. t. 40. fl. dan. t. 1666. *Ceramium sertularioides* Gratel. in journ. med. monsp. 1807. f. 4. (v. s.)
12. *P. VIOLACEA* (Dub. mss.) purpureo-violacea diffusa valde elongata ramosissima, filamentis setaceis dichotomis, ramulis capillaribus tenuissimis copiosissimis fasciculatis, articulis inferioribus diametro 10-4-plò longioribus, superioribus diametrum subæquantibus, conceptaculis lateralibus remotis sessilibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *Ceramium violaceum* Roth. cat. 1. p. 150, t. 8. f. 2 et 3. p. 150. (v. v.)

XLIV. CERAMIUM. — *Ceramium Griffithsia* et *Hutchinsiae* sp. Agardh. — *Ceramium* et *Callithamnion* Lyngb. — *Callithamnion Ceramium* Boryna Bory. — *Ceramium Griffithsia* Boryna Gaillona Gaillon res. — *Ceramii* sp. DC.

Filamenta ramosa aut simplicia purpurea aut rosea, articuli fasciati et speciem articuli simplicis canalibus subparallelis percorsi ferentes aut

simplices; fructificatio biformis hæc sub formâ conceptaculorum rotundorum ovoideorum aut urceolatorum lateralium et serialium sessilium aut breviter pedicellatorum interdùm involucratorum intùs massam coloratam homogenam aut grumulosam foventium occurrentes, illa granuliformis globulosa seriatim ramulorum parti subovoideæ aut subsiliquiformi innata.

1. *C. DESLONGCHAMPII* (Chauv. alg. norm. n. 85.) purpureo-rubrum erectum capillare repens dichotomo-ramosum, ramis erectis, ramulis adpressis apice furcatis attenuatis, articulis diametrum subæquantibus, conceptaculis nudis hemisphæris in apicibus ramulorum crebre ad genicula annulatim dispositis. — Ad basim Polysiphoniæ suctoidis per repente ad littora Calvadosii det. cel. Chauvin. — Radiculæ sparsæ subsimplices hyalinæ basi discoideæ. (v. s. communic. et descr. a cl. Chauv.)
2. *C. CLAVIGERUM* (Bonnemaison ex cl. Chanvin) intense roseum cespitosum subdiffusum flacidum ramosum, filamentis creberrimè dichotomis capillaribus, ramulis subfasciculatis brevibus apice oblongis subclavulatis, articulis diametro 4°-8° longioribus, conceptaculis obovatis obovato-clavatisve subsessilibus saepius axillaribus. — Ad rupes marinas Calvadosii rarissimam det. cl. Chauvin. — *C. clavulatum* Ag? ex Chauv. — Planta in aquâ dulci demersa brevi momento glutinosa fit et inextricanda Ch. (v. s. communic. et descr. a cl. Chauv.)
3. *C. GRACILE* (DC. fl. fr. 2. p. 46.) fusco-purpureum tenue subrigidulum plures dichotomum, filamentis subæqualibus ramosis virgatis, ramis acutis, divergentibus, articulis inferioribus diametro quintuplo longioribus. — In Oceano propè Dieppe ex cel. DC. — *Hutchinsia gracilis* Ag. †
4. *C. DIAPHANUM* (Ag. syn. 61; syst. 133.) purpureum roseumve cespitosum diffusum tenue flacidum plures dichotomum, filamentis capillaribus submembranaceis, ramulis numerosis divaricatis extremis apice forcipatis seu introrsum involutis, articulis diametrum subæquantibus cylindricis, conceptaculis ovatis sessilibus involucratis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *C. forcipatum* DC. fl. fr. 2. p. 46.
 - α. ciliatum* (DC.) geniculis subelevatis ciliis muricatis erectis verticillatim obsessis. — *C. ciliatum* Ducluz. Lyngb. t. 37. Conf. *ciliata* Ellis phil. trans. 97. t. 18. f. h. Dillw. t. 53. eng. bot. t. 2428. Conf. *pilosa* Roth. cat. 2. t. 5. f. 2. *Boryna ciliata* Gratel. Bory. Gaillon. Desmaz. exs. n. 156. *B. forcipata* Bory. (v. v.)
 - β. glabellum* (DC.) geniculis subelevatis nudis. — *C. diaphanum* Roth. Lyngb. t. 37. Conf. *diaphana* Lightf. fl. dan. t. 951. eng. bot. t. 1712. *Ceramum elegans* Ducluz. *C. axillare* DC. fl. fr. 2. p. 46. Conf. *elegans* Roth. cat. 1. t. 5. f. 4. *Boryna diaphana* Gratel. Gaillon. B. *axillaris*, B. *elegans* Gratel. (v. v.)
5. *C. RUBRUM* (Ag. syn. 60; syst. 135 excl. plur. syn.) saturatè aut dilutè rubrum cespitosum subdiffusum suberectum tenue strictiusculum plures dichotomum, filamentis capillaribus subcartilagineis, ramulis numerosis subdivaricatis extremis apice furcatis, articulis diametrum subæquantibus aut paulam superantibus, ovato-oblongis medio subpellucidis, conceptaculis subglobosis involucratis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Conf. *rubra* Huds. Dillw. t. 34. fl. dan. t. 1482. eng. bot. t. 1166. *Boryna rubra* Gaillon. Desmaz. crypt. exs. n. 155.
 - α. nodulosum*, conceptaculis sessilibus. — *C. virgatum* Roth. catal. 1. t. 8. f. 1. *C. nodulosum* DC. fl. fr. 2. p. 45. *Boryna nodulosa* Gratel. (v. v.)
 - β. pedicellatum*, conceptaculis pedicellatis. — *C. pedicellatum* DC. fl. fr. 2. p. 43. *Boryna pedicellata* Gratel. (v. v.)
 - γ. proliferum* (Lyngb.) ramulis brevibus simplicibus ad genicula verticillatis. — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin). (v. s.)
 - δ. secundatum* (Ag.) proliferum, ramulis ad interiora dichotomiarum la-

968 ACOTYL. SEU CELLULARES. CERAMIUM.

teria omnibus secundis disticbis approximatis. — *C. secundatum* Lyngb. t. 37. non Ag.

6. *C. ELONGATUM* (Roth. cat. bot. 3, p. 128 non 2, p. 178.) saturatè rubrum basi rubro-violaceum subopaeum cespitosum diffusum crassiusculum, filamentis cartilagineis dichotomis penicillatim ramosissimis, ramulis elongatis strictis setaceis, ultimis brevibus utrinque angustatis, articulis fasciatis diametro subbrevioribus, inferioribus obsoletis, conceptaculis subtundis. — In Oceano, rariū. — DC. fl. fr. 2. p. 44. Lyngb. t. 66. D. i. Conferva elongata Huds. Dillw. t. 33. Hutchinsia elongata Agardh. Boryna elongata Gratel. (v. v.)

C. denudata (Agardh.) ramulis perdegitis. — *Fucus diffusus* Huds. Conferva elongata Sow. eng. bot. t. 2429. Ceramium brachygonium Lyngb. t. 36. Gratieloupella brachygonium Bory. (v. s.)

7. *C. SETACEUM* (Dub. mss.) roseo obscuro et intenso viridi hyalinoque variegatum cespitosum strictum, filamentis dichotomis attenuatis, ramis erectis elongatis, articulis cylindraceis diametro sub 4-6plò longioribus, conceptaculis pellucidis intus massam grumulosam foventibus involucratis pedicellatis. — In Oceano. — Conf. setacea Huds. Ellis phil. trans. 57. t. 18. f. e. eng. bot. t. 1689. Dillw. t. 82. Cer. penicillatum Duckuz. DC. fl. fr. 2. p. 43. Griffithsia setacea Agardh. Chauvin alg. norm. n. 8. — Dill. muse. t. 6. f. 37. (v. v.)

8. *C. CORALLINUM* (Bory dict. cl. 3, p. 342.) splendide rosetum aut viridi aureo rubroque variegatum interdùm aureo-viride cespitosum diffusum flaccidum, filamentis dichotomis lubricis, ramis erectis fastigiatis corymbosis ultimis attenuatis obtusis, articulis incrassatis diametro 2-4plò longioribus, conceptaculis pellucidis intus massam grumulosam foventibus involucratis demùm nudis sessilibus aut breviter pedicellatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Conf. corallinoides Linn. C. corallina Lightf. eng. bot. t. 1815. Dill. t. 98. C. geniculata Eliis in phil. trans. 57. t. 18. Griffithsia corallina Agardh. Gaillon. — Dill. muse. t. 6. f. 36. (v. v. D.)

9. *C. CASUARINÆ* (DC. fl. fr. 2. p. 40.) purpureo-roseum siccum fuscescens cespitosum diffusum flaccidum, filamentis elongatis ramosis ramis oppositis subpatulis, ramulis paulò infra genicula subternatis a basi multifidis simplibusve abbreviatis aut subelongatis articulam tamen vix superantibus, articulis cylindricis diametro multiplò longioribus, conceptaculis intus massam homogenam foventibus ovato-globosis nudis subsessilibus racemosis. — Ad littora Calvadosii. — Conferva multifida eng. bot. t. 1816. Griffithsia multifida Agardh. Chauvin alg. norm. n. 7. G. Casuarinæ Gaillon. (v. v.)

10. *C. EQUISETIFOLIUM* (DC. fl. fr. 2. p. 39.) purpureum cespitosum rigidum subdiffusum filamentis elongatis ramosis ramis alternis undique tectis ramulis subverticillatis imbricatis brevibus multifidis, articulis diametro multiplò longioribus. — Ad littora Oceani. — Conf. equisetifolia Lightf. Dillw. t. 54. eng. bot. t. 1749. Conf. cancellata Roth. Griffithsia equisetifolia Agardh. Chauvin alg. norm. n. 34. Cer. simplicifolium DC. l. c. (v. v.)

11. *C. TETRICUM* (Ag. syst. 141.) purpureum cespitosum rigidum subdiffusum, filamentis ramosissimis undique vestitis ramis strictis decompositis pinnatis ramulis pinnatis, pinis pinnulisque alternis, articulis inferioribus purpureis æqualibus diametram subduplo longioribus, superioribus medio inflatis diaphanis interdùm moniliformibus diametram subæquantibus, conceptaculis ad apices pinularum pedicellatis. — Ad littora Oceani. — Conferva tetrica Dillw. t. 81. eng. bot. t. 1919. (v. s.)

12. *C. TETRAGONUM* (Agardh syst. 137.) purpureum cespitosum flaccidum diffusum, filamentis ramosissimis elongatis virgatis, ramis subpatulis ad quoque geniculum instructis ramulis brevibus tenuioribus patentibus angulo-dichotomis subfastigiatis basi angustatis apice submucronatis, articulis ramorum purpureis subæqualibus diametro subduplo longioribus, ramulorum medio inflatis diaphanis diametrum subæquantibus. — Ad littora Calvadosii

- (cl. Chauvin), rarum. — Chauv. alg. norm. n. 60. Conf. *tetragona* Dillw. t. 65. eng. bot. t. 1690. (v. s.)
13. *C. CANCELLATUM* (DC. fl. fr. 2. p. 40 excl. syn. non Ag.) *purpurascens* flaccidum diffusum, filamentis compressis ramosis, ramis patulis dichotomis, ramulis alternis multipartito-digitatis, inferioribus distantibus brevibus superioribus confertis terminalibus fastigiatis dense intertextis. — In mari Mediterraneo. (v. s.)
14. *C. COCCINEUM* (DC. fl. fr. 2. p. 40.) *purpureo-coccineum cespitosum rigidum diffusum*, filamentis ramosissimis setulis numerosis brevibus articulatis obsexis, ramis alternis compressis decomposito-pinnatis, ramulis alternis fasciculato-multifidis, pinululis distichis, articulis caulinis obsoletis, ramorum ramulorumque purpureis fasciatibus subequalibus diametrum subsuperantibus, pinnularum medio-inflatis diaphanis diametro brevioribus, conceptaculis ovatis acuminatis ad basin ramulorum dispositis. — In Oceano frequens. — Conf. *coccinea* Huds. Dillw. t. 36. eng. bot. t. 1055. Conf. *plumosa* Ellis ph. trans. 57. t. 18. f. e. o. Cer. *hirsutum* Roth. *Hutchinsia coccinea* Ag. *Callithamnion coccineum* Lyngb. *Gaillona coccinea* Bonnem. Desmaz. crypt. exs. n. 107. (v. v.)
15. *C. PLUMULA* (Agardh syn. scand. 62 et syst. 142.) dilutè roseum elegantissimum cespitosum flaccidum tenue diffusum, filamentis vase ramosis ad quodque geniculum obsexis ramulis oppositis brevibus tenuissimis patentibus pectinatis pinnulis secundis, ramis ramulisque conformibus, articulis diametrum subsuperantibus, conceptaculis secundis globosis pedicellatis. — In Oceano et mari Mediterraneo, rariis. — Chauv. alg. norm. n. 6. Conf. *plumula* Ellis in phil. trans. 57. t. 18. Dillw. t. 50. *C. crispum* Ducluz. *C. floccosum* Roth. Conf. *floccosa* fl. dan. t. 828. f. 1. (v. v. D.)
16. *C. GRATELOUPII* (Dub. mss.) fuscum elegans cespitosum flaccidum diffusum tenue ramosissimum, filamentis cartilagineis, ramis subelongatis decomposite-pinnatis vestitis ramulis tenuissimis abbreviatis ramosissimis et in racemum secus ramum dispositis, pinnulis confertissimis penicillato-corymbosis, articulis inferioribus diametro triplò longioribus, superioribus diametrum subæquantibus. — Ad littora maris Mediterranei propè Monspelium (cl. Grateloup.). (v. s.)
17. *C. BOUCHETI* (Dub. mss.) dilutè roseum siccum fuscescens elegantissimum cespitosum flaccidum diffusum tenue ramosissimum, filamentis cartilagineis setaceis dichotomo-ramosis, ramis breviusculis obsexis ramulis tenuissimis hyalinis in penicillos confertis, articulis ramorum obsoletis ramulorum diametro subtriplo longioribus, conceptaculis minimis globosis creberrimis inter penicillos sparsim nidulantibus. — Ad rupes marinas Neustriæ propè Cherbourg et Caen (cl. Chauvin), Rupellæ (cl. d'Orbigny), Corsicæ (cl. Soleiro). — *Gaillona Boucheti* Bonnemaison ex cl. Chauv. — Color citò evanescit. (v. s. D.)
18. *C. FILAMENTOSUM* (Dub. mss.) roseo-purpureum cespitosum rigidusculum diffusum tenue ramosissimum, filamentis membranaceis, ramis subelongatis obsexis ramulis laxis solitariis verticillatisve piliformibus simplicibus, articulis ramorum purpureis fasciatibus diametro duplo-minoribus, ramulorum minutissimis simplicibus medio subinflatis diaphanis. — In mari Mediterraneo circà Massiliam (cl. Solier). — *Fucus filamentosus* Wulf. *Hutchinsia filamentosa* Agardh syst. 159 excl. plur. syn. (v. s. D.)
19. *C. CORYMBOSUM* (Bory in dict. class. 2. p. 342.) amœnè roseum solitarium rariis cespitosum flaccidum diffusum elegantissimum tenue ramosissimum, filamentis elongatis membranaceis capillaribus, ramis patulis alternis multifidis corymboso-fastigiatis, ramulis summis fasciculatis, articulis diametro triplo quadruplo longioribus, conceptaculis atro-purpureis lateralibus sparsis ovato-globosis subsessilibus nudis. — In Oceano, mari Mediterraneo, rarum. — Chauvin alg. n. 33. Conf. *corymbosa* Sow. eng. bot. t. 2352. Cer. *pedicellatum* fl. dan. t. 1596. f. 2. *Callithamnion corymbosum* Lyngb. t. 38. (v. v. D.)

20. *C. FRUTICULOSUM* (Roth catal. 2. p. 183; 3. p. 146.) *purpureum* *siccum* *purpureo-fuscescens* *cespitosum* *rigidiuscum* *valde diffusum* *tenue supra-decomposito-ramosum*, *ramis elongatis*, *ramulis fasciculatis fastigiatis densissimis brevibus*, *articulis inferioribus diametrum subduplicem superantibus superioribus subaequantibus*, *conceptaculis ovato-globosis ad ramulorum axillas sessilibus*. — Ad *ropes* et *Fucaceas Calvadosii* (cl. Chauvin et Lenormand). — Conf. *fruticulosa* Wulf. *Callithamnion fruticulosum* Lyngb. t. 38. *Cer. versicolor* Agardh syst. 140? (v. s.)
21. *C. ROSEUM* (Roth cat. 2. p. 182.) *amoenè roseum elegantissimum cespitosum* *rigidiuscum diffusum* *tenue a basi ramosissimum*, *filamentis submembranaceis alternatim decomposito-pinnatis*, *ramis ramulisque alternis rigidiusculis patulis subulatis*, *pinnulis elongatis plerumque simplicibus inferioribus superiores subaequantibus*, *articulis pinnularum ramulorumque diametro subduplicem ramorum subtriplo longioribus*, *conceptaculis globosis ad interius latus pinnularum sessilibus*. — In Oceano et mari Mediterraneo, rarius. — DC. fl. fr. 5. p. 9. Agardh syst. 139. *C. miniatum* Agardh syst. 141. Conf. *rosea* Dillw. t. 17. eng. bot. t. 996. *Callithamnion roseum* Lyngb. t. 39 male excl. var. ℓ . (v. v.)
22. *C. THYOIDES* (Agardh syst. 139.) *amoenè roseum elegantissimum cespitosum flaccidum diffusum tendissimum a basi ramosissimum*, *filamentis submembranaceis alternatim decomposito-ramosum*, *ramis ramulisque alternis flaccidis patulis subulatis tenuissimis*, *pinnulis elongatis plerumque ad apicem pinnatis subaequalibus*, *articulis pinnularum extremis minutissimis diametro minoribus*, *inferioribus sensim elongatis*, *ramorum diametro multoties longioribus*, *conceptaculis globosis ad interius latus pinnularum extremorum sessilibus*. — In Oceano ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), Vasconiae (cl. Grateleur), rarus. — Conf. *thyoides* eng. bot. t. 2205. — Priori valde affine sed multo gracilis. (v. s. D.)
23. *C. SCOPULORUM* (Agardh syst. 132.) *amoenè roseum elegantissimum minutum* *valde cespitosum rigidiuscum strictum paulo ramosum*, *filamentis membranaceis alternatim 2-3-pinnatis*, *ramis ramulisque alternis rigidis patulis subulatis*, *ramulis elongatis superioribus fastigiatis extremis bipinnatis subfasciculatis*, *articulis pinnularum extremis minutissimis diametro minoribus*, *inferioribus sensim elongatis*, *ramorum diametro multoties longioribus*, *conceptaculis sessilibus secundis globosis numerosis*. — Ad *scopulos Calvadosii* (cl. Chauvin et Lenormand), rarissimum. — Chauv. alg. norm. n. 84. *Callithamnion roseum tenue* Lyngb. p. 126. t. 39. b. (v. s. D.)
24. *C. TURNERI* (Roth cat. 3. t. 5.) *amoenè roseum miniatum valde cespitosum flaccidum substrictum ramosum*, *ramis elongatis pinnatis*, *pinnulis inferioribus plerumque simplicibus oppositis*, *superioribus multifidis multifido-penicillatisve abbreviatis*, *articulis superioribus diametro duplo*, *inferioribus 4-5-plave longioribus*, *conceptaculis in axillis pinnularum multifidarum sessilibus subglomeratis subsecundis globosis*. — Ad littora Calvadosii et Armoraciæ (cl. Chauvin), rarissimum. — Ag. syst. 142. *C. Borreri* Ag. syst. 140. Conf. *Turneri* Dillw. t. 100. eng. bot. t. 2339. non t. 1637. Conf. *Borreri* eng. bot. t. 1741. (v. s. D.)
25. *C. LAMOUROUXII* (Dub. mss.) *amoenè roseum minutum valde cespitosum rigidiuscum substictum ramosum*, *ramis elongatis pinnatis*, *pinnulis inferioribus simplicibus alternis elongatis subulatis*, *pinnulis superioribus abbreviatis in sterilibus simplicibus in fertilibus 2-5-fidis*, *articulis superioribus diametro 2-4-plave*, *inferioribus multoties longioribus*, *conceptaculis pinnulas abbreviatas terminantibus pedicellatis globosis ovato-globosisque*. — Ad littora Calvadosii in *Fucis majoribus* (cl. Lamouroux). (v. s. D.)
26. *C. PLUMA* (Agardh syst. 132.) *roseum siccum fuscescens pusillum valde cespitosum repens rigidiuscum strictum ramosum*, *ramis erectis infra mediisculis superne irregulariter pinnatis*, *pinnulis oppositis rarius alternis hinc inde approximatis supremis simplicibus inferioribus semel aut bis*

dichotomis, articulis superioribus diametro 2-3-plò, inferioribus multoties longioribus. — In Algis majoribus littorum Calvadosii (cl. Chauvin et Lenormand). — Conf. pluma Dillw. t. suppl. f. r. *Callithamnion plumula* β Lyngb. t. 39. C? (v. s. D.)

27. *C. Rothii* (Agardh syst. 133.) intensè roseum minutissimum dense cespitosum erectum fastigiatum, filamentis tenuissimis laxè præcipue apicem versus dichotomo-ramosis, ramis ramulisque alternis elongatis remotiusculis subfastigiatis, articulis diametro duplo triplò longioribus. — Ad majores Algas littorum Neustriæ ex cl. Chauvin et Lenormand. — *Callithamnion Rothii* et *C. floridulum* Lyngb. t. 41. f. A. et D. Conf. Rothii Dillw. t. 75. eng. bot. t. 1702. Conf. *floridula* Dillw. supp. t. r. (v. s. ex mari Septentrio-nali communic. a cl. Chauvin.)
28. *C. repens* (Agardh syn. scand. 63 et syst. 131.) saturatè roseum minutissimum densissimè intricatum, filamentis repentibus sparsim emitentibus radices bulboso-sentatas ramosis, ramis erectis ramosis, ramulis alternis sèpè secundis brevibus subsimplicibus divaricatis obtusis, articulis diametro 2-4-plò longioribus, conceptaculis minutissimis ad summitates ramorum sparsim dispositis globosis subsessilibus. — Ad Algas majores præcipue Fur-cellariam lumbricalem in Oceano, non frequens. — Desmaz. crypt. exs. n. 202. *Callithamnion repens* Lyngb. t. 40. Conf. *repens* Dillw. t. 18. eng. bot. t. 1608. fl. dan. t. 1665. (v. v. D.)
29. *C. Daviesii* (Agardh syst. 132.) dilutè roseum minutissimum tenerrimum cespitosum erectum, filamentis fastigiatis, ramis ramulisque sparsis alternis subadpressis acutis, articulis diametro triplò longioribus, conceptaculis minimis, glomeratim ad interiora ramulorum latera sèpius ad axillas sitis. — In Halymeniâ Dubyi et Furcellariâ lumbricale, ad littora Neustriæ propè Cherbourg (cl. Chauvin et Lenormand), rarum. — *Callithamnion Daviesii* Lyngb. t. 41. Conf. Daviesii Dillw. supp. t. r. eng. bot. t. 2329. (v. s. D.)
β. secundatum (Lyngb. t. 41.) strictum, ramis alternis, ramulis creberrimis patentibus obtusis secundis abbreviatis, articulis diametro sesquilon-gioribus. — In apicibus Chloroniti rupestris ad littora Calvadosii (cl. Chauvin). — *C. secundatum* Ag. (v. s. communic. a cl. Chauv.)

XLV. ARTHROCLADIA *Dub. mss.* — *Conservæ* sp. *Huds. Dillw.* — *Sporochni* sp. *Agardh.*

Filamenta cornea articulata flexilia viridia ramoso-dichotoma, ramis sensim attenuatis, setulis ciliiformibus brevibus tenuissimis flexilibus ramosis in verticilos densos circà articulos aggregatis vestita basi nuda; fructificatio uniformis? conceptacula minutissima cylindrico-globosa utrinque depressa in ramulos cylindricos plus minus elongatos oltusos siliquæformes torulosos pedicellatos ad basin præcipue setularum sitos seriatim congesta, demùm exeuntia et ramulum vacuum et flaccidum relinquentia.

1. *A. VILLOSA* (Dub. mss.) articulis diametro sesquilon-gioribus. — Ad littora Oceani, rariùs. — *Conservæ villosa* Huds. Dillw. t. 37 et supp. t. F. — *Chordaria villosa* Ag. syn. 14. *Sporochnus villosus* Ag. syst. 260. — Dilutè viridis primo adspectu Conservam omnino simulans. (v. s.)

XLVI. ECTOCARPUS *Agardh syst. alg. xxx et 161.* — *Lyngbya Gaillon res.* *thalass. p. 46.* — *Ectocarpi* sp. *Lyngb.* — *Ectocarpus, Capsicarrella Pilayella* et *Audouinellæ* sp. *Bory.*

Filamenta ramosissima tenuissima maximè flexilia olivaceo aut lu-tescenti-viridia articulata articulis diaphanis aut materiâ granulosâ varia-bili farctis; conceptacula lateralia aut terminalia sessilia aut pedicellata sphærica aut elongata.

972 ACOTYL. seu CELLULARES.

1. *E. LITTORALIS* (Lyngb. t. 42.) lutescenti-viridis densissimè implexus elongatus flaccidns, filamentis ramosissimis ramulisque tenuissimis oppositis alternisque, articulis diametrum longitudine æquantibus sesquilonioribus, conceptaculis globosis ovato-globosisve sessilibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Chauv. alg. norm. n. 10 et 86. Conf. littoralis Huds. Dillw. t. 31. Ceramium tomentosum Roth. Fl. dan. t. 1487. f. 2. — Cer. Mertensii DC. fl. fr. 5. p. 9. an Roth? — Dill. musc. t. 6. f. 19. — Filamenta primaria latiora filam. sp. sequentis. Chartæ valde adhærens. (v. v.)
2. *E. SILICULOSUS* (Lyngb. t. 43.) olivaceo-viridis densissimè implexus elongatus subrigidus, filamentis ramosissimis ramulisque tenuibus omnibus alternis, articulis diametro subminoribus aut sesquilonioribus, conceptaculis lanceolato-acuminatis siliquæformibus pedunculatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Chauv. alg. norm. n. 10. Conferva siliculosa Dillw. supp. t. E. Ceramium confervoides Roth. cat. 1. t. 8. f. 3. Capsicarpella elongata Bory. — Chartæ minus adhærens. (v. v.)
3. *E. TOMENTOSUS* (Lyngb. t. 44.) olivaceo-viridis aut fuscescens minus elongatus subrigidus, filamentis tenuissimis in funes filiformes dense contortis implicatis ramosissimis, ramulisque alternis divaricatis, articulis diametro 3-4-plò longioribus, conceptaculis ovato-lanceolatis pedunculatis lateralibus. — In Oceano, rariùs. — Conf. tomentosa Huds. Dillw. t. 56. Spreng. in berl. mag. t. 7. f. 12. Ceramium compactum Roth. Auduinella funiformis Bory. — Dill. musc. t. 3. f. 13. (v. s.)

XLVII. ELACHISTEA Dub. mss. — Confervæ sp. eng. bot.

Filamenta simplicia aut parte inferiore ramulos 1-2 proferentia minutissima rigida viridia articulata articulis diaphanis aut materiâ viridi farctis; conceptacula? lateralia opposita breviter pedicellata id est ramulos terminantia claviformia.

1. *E. SCUTELLATA* (Dub. mss.) viridi-lutescens penicillata penicillis in maculam scutiformem densissimè agglomeratis, filamentis obtusis, articulis a basi ad apicem decrescentibus, conceptaculis articulos 3-4 longitudine æquantiibus. — Ad littora Calvadosii Fucis majoribus adnatam detexit cl. Chauvin. — Conferva scutulata eng. bot. t. 2311. Sphacelaria? scutulata Ag. syst. 167. — Minutissima, penicilli oculo nudo non distinguendi, articuli inferiores diametro subduplo longiores, superiores diametrum vix æquantes; conceptacula materiâ viridi granulosâ intensiore farcta. (v. s. D.)

XLVIII. AUDUINELLA Bory dict. class. 3. p. 340, excl. primâ specie. — Trentepohliæ sp. Ag. syst. — Ectocarpi sp. Lyngb. — Confervæ sp. Auct.

Filamenta brevia ramosa tenuissima stricta purpurea aut purpureo-violacea articulata; conceptacula nuda ovali-oblonga sessilia in ramulis numerosis alternis abbreviatis agglomeratâ terminalia aut lateralia.

1. *A. CHALYBÆA* (Bory l. c.) minuta purpureo-chalybæa ramosissima cespitosa conferta virgata, ramulis numerosissimis a basi 2-7-fidis pinnulis fasciculatis, articulis diametro quadruplo longioribus intus purpureo-violaceis, conceptaculis ovali-oblongis sessilibus pinnulas terminantibus. — Ad rotas molendinarias aut lapides inundatas in rivulis Armoraciæ, Neustriæ. — Conf. chalybæa Roth. cat. 3. t. 8. f. 2. Dillw. t. 91. Conf. corymbifera eng. bot. t. 1996. f. 1. Ceramium chalybæum Ag. disp. p. 19. Ectocarpus chalybæus Lyngb. t. 44. fl. dan. t. 1666. f. 1. Trentepohlia pulchella & chalybæa Ag. syst. 37. Chauv. alg. norm. n. 3. (v. s.)
2. *A. HERMANNI* (Dub. mss.) minutissima purpureo-vinosa ramosissima cespitosa conferta diffusa, ramulis numerosissimis simplicibus aut ad apicem 2-7-fidis pinnulis subfasciculatis, articulis diametro 2-4-plò longioribus diaphanis, conceptaculis minutissimis ovato-globosis sessilibus termina-

libus lateralibusque. — Ad muscos et Confervas majores in rivulis Vogesorum, Neustriæ, Armoracæ, agri Lezurenensis. — A. miniata Bory l. c. Conf. Hermanni Roth. C. nana eng. phot. t. 2585 non Dillw. nec Lyngb. Chantransia nana Moug. et Nestl. vog. n. 594. Trentepohlia pulchella Chauv. alg. norm. n. 79. (v. s.)

XLIX. BULBOCHÆTE Agardh syn. 71. Lyngb. p. 134. t. 45.

Filamenta brevia membranacea dichotomo-ramosissima stricta viridia articulata, setis elongatis basi bulbosis ad summitates articulorum instructa; conceptacula nuda ovata sessilia lateralia summatibus articulorum setis expertium insidentia.

1. **B. SETIGERA** (Ag. l. c.). — Ad muscos, paleas etc. in lacibus et fontibus. — Lyngb. t. 45. A. Chauv. alg. norm. n. 59. B. longiseta et tristis Bory. Conf. vivipara Dillw. conf. t. 59. C. setigera Roth. cat. t. 8. f. 1. — Articuli ad insertionem setæ paululum incrassati diametro 3-5-plò longiores granulis sparsis viridescentibus repleti; setæ solitariae tenuissimè hyalinæ fragiles continuæ plus minus elongatae longitudine sèpè totius plantæ. (v. v.)

L? DESMARETTELLA Bory de Saint-Vincent in dict. class. t. 5. p. 438. — Oscillatoriae sp. Lyngb. — Calothryx sp. Ag. syst.

Filamenta simplicia brevissima stricta cespitosa fusco-virescentia articulata, articulis brevissimis, conceptacula? nuda subrotunda sessilia aut subsessilia lateralia.

1. **D. CONFERVICOLA** (Bory l. c.) filamentis æruginosis erectis rigidiusculis minutis subulatis basi fasciculatis. — Ad Ceramium rubrum aliaque in Oceano. — Calothryx confervicola Ag. syst. 50. Oscillatoria confervicola Ag. syn. Conf. confervicola Dillw. t. 8. fl. dan. t. 1484. f. 1. eng. bot. t. 2576. (v. v.)

Trib. VIII. VAUCHERIEÆ Grev. fl. edin. p. 305.

Filamenta viridia tenuissima capillaria cylindrica simplicia aut ramosa continua membranacea. Conceptacula externa globosa aut ovata, sessilia aut pedunculata, solitaria didyma aut aggregata.

LI. VAUCHERIA DC. in Vauch. conf. p. 25. fl. fr. 2. p. 61. Lyngb. tent. 75. — Ectosperma Vauch. conf. p. 9. Bory dict. class. t. 6. p. 63.

Filamenta cylindrica tenuia capillaria continua plus minus pellucida materiâ viridi granulosâ intùs farcta; conceptacula rotunda aut ovata externa sessilia aut pedunculata solitaria didyma aut aggregata opaca et corpusculis granuliformibus impleta.

* *Conceptaculis solitariis sessilibus subsessilibusve obovatis lateralibus nudis.*

1. **V. DICHOTOMA** (Agardh syn. 47.) filamentis setaceis majusculis cespitosis dichotomis fastigiatis, conceptaculis globosis sessilibus solitariis. — In fossis aquæ dulcis, substantantibus. — Lyngb. t. 19. Desmaz. cr. exs. n. 259. Chauv. alg. norm. n. 38. Ectosperma dichotoma Bory. Conf. dichotoma Linn. Dillw. t. 15. eng. bot. t. 932. — Dill. musc. t. 3. f. 19. (v. v.)

β. submarina (Lyngb. tent. t. 20. A.) filamentis tenuioribus, conceptaculis lanceolatis ovatisque. — In fossis submarinis. — Fl. dan. t. 1724. f. 2 et 4. Ectosperma littoralis Bory.

2. **V. DILLWYNII** (Ag. syn. 50.) filamentis cespitosis capillaribus flexuosis, conceptaculis sessilibus subsessilibusve globosis. — In umbrosis terrestribus Armoraciæ ex cl. Lenormand. — Fl. dan. t. 1596. f. 1. Lyngb. t. 21. G. Cera-

mium Dillwynii Roth. Conf. frigida Dillw. t. 16. Riccia arachnoidea G. dan. t. 898. f. 2.

3. *V. APPENDICULATA* (DC. fl. fr. 2. p. 64.) filamentis solidis pallidè flavis fusco-roseis hinc indè appendiculatis, conceptaculis? globosis minutis sessilibus. — In crateribus aquæ salsaë circa Lons-le-Saulnier ex cl. Vaucher et aliorum salinarum ex cl. Bory. — Ectosperma appendiculata Vauch. t. 3. f. 11. E. salinarum Bory.
4. *V. MARINA* (Lyngb. tent. 79. t. 22. A.) filamentis capillaribus minutissimis erectis ramosis, ramis remotiusculis attenuatis, conceptaculis ovatis brevissimè pedicellatis. — Ad rupes lutosas ad ostium fluminis Orne propè Caen ex cl. Chanvin et Lenormand. — Chauv. alg. norm. n. 63. Ectosperma marina Bory.

* * *Conceptaculis sessilibus globosis lateralibus solitariis geminatisve, appendice cornuformi intermedio.*

5. *V. SESSILIS* (DC. fl. fr. 2. p. 63.) filamentis ramosis capillaribus dense cespitosis, conceptaculis sessilibus ovato-globosis subbinis cornu intermedio reflexo. — In fossis aquæ dulcis aut. — Lyngb. t. 22. D. eng. bot. t. 1765. Desmaz. crypt. exs. n. 256. Chauvin alg. norm. n. 64. Ectosperma sessilis Vauch. conf. 2. f. 7. (v. v.)

* * * *Conceptaculis solitariis pedicellatis.*

6. *V. OVATA* (DC. fl. fr. 2. p. 63.) filamentis capillaribus dense cespitosis longissimis subdichotomis, conceptaculis pedunculatis solitariis globosis sub-terminalibus, pedunculis nudis. — In fossis aquæ dulcis hyeme et primo vere. — Lyngb. tent. t. 20. b. V. bursata Agardh. Ectosperma ovata Vauch. t. 2. f. 1. Conferva vesicata null. petr. 3. t. 2. f. 6-9 et berl. besch. 4. t. 3. f. 5. 6. (v. v.)

7. *V. HAMATA* (DC. fl. fr. 2. p. 63.) filamentis capillaribus dense cespitosis vage ramosis, conceptaculis solitariis globosis terminalibus, pedunculis cornu hamato lateraliter instructis plerumque secundis. — In fossis aquæ dulcis, primo vere. — Lyngb. t. 20. c. fl. dan. t. 1726. f. 1. Ectosperma hamata Vauch. t. 2. f. 2. (v. v.)

8. *V. TERRESTRIS* (DC. fl. fr. 2. p. 62 excl. plur. syn. non Lyngb.) filamentis strictis dense cespitosis minutis intertextis, conceptaculis solitariis complanatis dorso pedunculi cornuti recurvi insidentibus. — Ad terram humidam, aut. et hyeme. — Desmaz. cr. exs. n. 260. Ectosperma terrestre Vauch. t. 2. f. 3. (v. v.)

* * * * *Conceptaculis sessilibus geminatis ad apicem appendicis ultra producti oppositis sessilibus stipitatisve.*

9. *V. GEMINATA* (DC. fl. fr. 2. p. 62.) filamentis capillaribus dichotomis dense cespitosis, conceptaculis geminatis globosis pedicellatis in pedunculo communi cornuto oppositis, cornu intermedio subrecto. — In aquis quietis. — Eng. bot. t. 1766. Lyngb. t. 23. A. Desmaz. crypt. exs. p. 57. Ectosperma geminata Vauch. t. 2. f. 5. (v. v.)

10. *V. CESPITOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 63.) filamentis capillaribus densissimè cespitosis dichotomo-ramosis, ramulis ultimis horizontalibus secundis conceptaculiferis, conceptaculis imis globosis sessilibus terminalibus, cornu intermedio subincurvo. — In aquis puris. — Lyngb. t. 23. f. 8. fl. dan. t. 1726. f. 2. Moug. et Nestl. veg. n. 595. Ectosperma cespitosa Vauch. t. 2. f. 4. (v. v.)

11. *V. CRUCIATA* (DC. fl. fr. 2. p. 62.) filamentis capillaribus tenuissimis dense cespitosis, conceptaculis geminatis globosis sessilibus, cornu intermedio tricuspidato. — In aquis stagnantibus. — Ectosperma cruciata Vauch. t. 2. f. 6.

* * * * * *Conceptaculis racemosis sessilibus pedicellatisve.*

12. *V. RACEMOSA* (DC. fl. fr. 2. p. 61.) filamentis capillaribus ramosis dense cespitosis, conceptaculis subpedicellatis in racemum pedunculatum congestis.

— In fossis, imprimis vere. — Lyngb. t. 236. fl. dan. t. 1727. f. 1. Chauv. alg. norm. n. 13. Desmaz. crypt. exs. n. 257. Ectosperma racemosa Vauch. t. 3. f. 8. (v. v.)

13. *V. MULTICORNIS* (DC. fl. fr. 2. p. 61.) filamentis ramosis, conceptaculis pedicellatis subternis in racemum pedicellatum congestis cum cornibus subincuryis alternantibus. — In aquis. — Ectosperma multicornis Vauch. t. 3. f. 9.

* * * * * *Conceptaculis ovato-clavatis terminalibus.*

14. *V. CLAVATA* (DC. fl. fr. 2. p. 64.) filamentis capillaribus tenuissimis dense intricatis, conceptaculis? ovatis ramulos terminantibus claviformibus. — In aquis puris. — Lyngb. tent. t. 21. D? Chauv. alg. norm. n. 88. Ectosp. clavata Vauch. t. 3. f. 10. (v. v.)

LIL. HYDROGASTRUM Desv. journ. bot. Bory dict. class. t. 8. p. 423. — Vau-cheriae sp. Ag.

Filamenta tenuissima ramosa radiciformia; vesiculæ (conceptacula?) virides globosæ intus cavæ aquâ vel massâ aquosè pellucidâ repletæ, vetustate collabentes.

1. *H. GRANULATUM* (Desv. l. c.) — In terrestribus humidis argillaceis, fossisque exsiccatis. — Ulva granulata Linn. fl. dan. t. 705. Tremella granulata Huds. eng. bot. t. 324. Ulva radicata Retz. Vaucheria radicata Agardh. — Dill. musc. t. 10. f. 17. — Vesiculæ aggregate glanco-virides magnitudine semenis Sinapeos. (v. v.)

Trib. IX. ZYGNEMEÆ.

Filamenta viridia lutescenti-viridia rariū violacea capillaria simplicia membranacea articulata, primò libera demùm ope tubolorum aut reticulatim conjuncta. Conceptacula? interna globosa aut ovata.

LIII. ZYGNEMA Ag. syn. 98. Lyngbye tent. 170. — Zygnema et Mougeotia Ag. syst. 77 et 83. — Leda Tendaridea Salmacis et Zygnema id est Arthrodierarum trib. IIIa Bory dict. class. 1. p. 595. — Conferva DC. fl. fr. 2. p. 52. — Conjugata Vauch. conf. p. 37.

Filamenta elongata tenuia membranacea simplicia cylindrica articulata, juniora intus materiâ sæpius viridi rariū coloratâ granula varie disposita fovente farcta, primò libera demùm ope tubolorum transversalium aut reticulatim conjuncta, et tunc materia colorata ex hoc filamento in illud transiens hoc reliquit vacuum et in quoque alterius articulo sese sub formâ corpusculi globosi ovalisve (propaguli) disponit.

* *Materia viridis spiraliiter disposita.* — Salmacis Bory dict. l. c. p. 596. pl. arthr. f. 10.

1. *Z. FASCIATUM* (Agardh syst. 81.) articulis diametro quadruplò longioribus fasciâ medio notatis, spiris curvatis laxis, crucibus subquaternis. — In aquis dulcibus circa Caen trabibus adnata ex el. Lenormand et Chauvin. — Sequenti duplò tenuius, crucis rectilineæ crassiores. An sp. satis dist.?

2. *Z. DECIMINUM* (Ag. syn. 99. syst. 81.) articulis diametro 3-5-plò longioribus propaguliferis ellipticis, spiris à cruciatis laxis, crucibus subquaternis, propagulis ellipticis. — In aquis quietis provinc. occidentalium (cl. Roberge et Chanvin) et probabiliter Galliae totius. — Lyngb. t. 59. Conf. decimina Mull. in nov. act. petr. 3. t. 2. f. 3. Conf. nitida Dillw. t. 4. f. A.B. C. jugalis Dillw. t. 5. C. inflata eng. bot. t. 2376 non t. 1676. (v. s.)

976 ACOTYL. SEU CELLULARES. ZYGEMA.

3. *Z. NITIDUM* (Ag. syn. 98; syst. 82.) articulis diametro subæqualibus, spiris pluribus densis tenuibus cruciatis, propagulis ovato-ellipticis. — In fossis aquâ dulci stagnanti repletis. — Lyngb. t. 59. Chauv. alg. norm. n. 31. Conf. nitida Müll. fl. dan. t. 819. eng. bot. t. 2337. Dillw. conf. t. 4. f. c. C. jugalis Müll. fl. dan. t. 883. DC. fl. fr. 2. p. 53. Conjugata princeps Vauch. conf. t. 4. f. 1-6. Salmacis nitida Bory. Desmaz. crypt. exs. n. 56. — Mich. t. 89. f. 6. — Dill. musc. t. 2. f. 2. (v. v.)
4. *Z. QUININUM* (Agardh syn. 100.) filamentis æqualibus, articulis diametro 2-3-plò longioribus, spiris simplicibus primò arctinsculis tandem arcuatis, propagulis ovatis. — In aquis quietis. — Chauv. alg. norm. n. 52. Conf. quinina Müll. in nov. act. pet. 3. t. 2. f. 4. 5. C. porticalis Müll. l. c. t. 1. f. 2. 8. DC. fl. fr. 2. p. 53. C. spiralis Dillw. t. 3 pro parte. Conjugata porticalis Vauch. t. 5. f. 1. Salmacis quinina Gaill. Desmaz. cr. exs. n. 104. (v. v.)
5. *Z. CONDENSATUM* (Ag. l. c.) filamentis æqualibus, articulis diametrum æquantiibus spiris simplicibus arctissimis binis, propagulis sphæricis. — In fluviis et rivulis. — Conf. condensata DC. fl. fr. 2. p. 54. Conjugata condensata Vanch. conf. p. 5. f. 2. (v. v.)
6. *Z. ADNATUM* (Ag. l. c.) filamentis æqualibus, articulis diametro sesquilon-gioribus, spiris cruciatis tenuibus arctis, propagulis ellipticis. — In rivulis flaviisque saxis adnatum. — C. adnata DC. l. c. Conjugata adnata Vauch. t. 5. f. 4. (v. v.)
7. *Z. INFLATUM* (Ag. l. c.) filamentis hinc indè inflatis, articulis diametro triplò longioribus propaguliferis ellipticis, spiris simplicibus laxis, propagulis ovato-ellipticis. — In fossis. — C. inflata DC. l. c. Conjugata inflata Vauch. conf. t. 5. f. 3. (v. s.)
8. *Z. ELONGATUM* (Ag. l. c.) filamentis æqualibus, articulis diametro 6-8-plò lon-gioribus, spiris elongatis simplicibus laxissimis, propagulis ellipticis. — In fossis et stagnis. — C. elongata DC. fl. fr. 2. p. 55. Conjugata elongata Vauch. conf. t. 5. f. 2. (v. v.)
- ** *Materia viridis in duplice stellam in quoque articulo disposita.* — Tenda-ridea Bory l. c. fig. 9. Ledæ sp. Bory.
9. *Z. GRACILE* (Dub. mss. non Ag.) filamentis tennissimis intense viridibus, articulis diametro subquadruplò longioribus, materiâ viridi primò continuâ articulum semireplente tandem in stellas binas subdispositâ, propagulis glo-bosis. — In fossis. — Z. Vaucherii Ag. conf. gracilis DC. fl. 2. p. 55. Con-jugata gracilis Vauch. conf. t. 6. f. 2. (v. v.)
10. *Z. LUTESCENS* (Dub. mss.) filamentis tennissimis lubricis pingui-nitentibus lutescentibus nigrescentibusve, articulis diametro 2-3-plò longioribus, materiâ viridi primò continuâ linearî articulum semireplente tandem in globulos binos confluentes dispositâ, propagulis.... — In fossis. — C. lutescens DC. l. c. Conjugata lutescens Vauch. conf. t. 6. f. 3. — Made facta chartam colore luteo tingit. (v. v.)
11. *Z. DECUSCATUM* (Ag. syst. 78.) filamentis conjugatis sàpè convolutis, articulis diametro quadruplò longioribus, materiâ viridi primò continuâ articulum semireplente demùm in segmenta duo subdivisâ, propagulis sphæricis in tubulis transversalibus contentis. — In fossis paludosis. — Conjugata de-cussata Vauch. conf. t. 7. f. 3. C. decussata Dill. n. 39.
12. *Z. STELLINUM* (Agardh syst. 77.) filamentis pallide viridibus, articulis dia-metro duplò longioribus, materiâ viridi in 2 maculas stelliformes subhexa-diatis divisâ, propagulis ovatis intrâ loculos contentis. — In fossis. — C. stellina Müll. in nov. act. pet. 3. t. 2. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 56. Conjugata stellina Vauch. conf. t. 7. f. 1. a sequente cum quo conjunctum a cl. Lyngbye sat distinctum. (v. v.)
13. *Z. CRUCIATUM* (Ag. l. c.) filamentis viridi-lutescentibus, articulis diametro duplò longioribus materiâ viridi in 2 maculas stelliformes subglobosas aut obsoletè 4 radiatas divisâ, propagulis globosis intrâ loculos contentis. — In

fossis. — Chauv. alg. norm. n. 82. Z. bipunctatum Lyngb. t. 60. A. Conf. bipunctata Roth. cat. 2. p. 204. Dillw. t. 2. f. c. eng. bot. t. 2463. f. B. t. 2. C. cruciata DC. fl. fr. 2. p. 56. Conjugata cruciata Vauch. conf. t. 6. f. 4 et t. 7. f. 2. Tendaridea bipunctata Desmaz. cr. exs. n. 201. T. Castor Bory arthr. f. 9. e-g. (v. v.)

14. Z. PECTINATUM (Ag. l. c.) articulis diametro æqualibus vel sesquialgoribus, materiâ viridi in maculas 2 transversim oblongas pectinatas interdum densas confluentes et articulum totum implentes divisâ, propagulis sphæricis in tubulis transversalibus contentis. — In fossis, rivulis et fluviis. — Lyngb. t. 60. Conf. pectinata DC. fl. fr. 2. p. 56. C. bipunctata eng. bot. t. 1609 non t. 2463. C. pectinalis eng. bot. t. 1611. C. bipartita eng. bot. t. 2302. Conjugata pectinata Vauch. t. 7. f. 4. (v. v.)

* * * *Materia colorata tubum implens.* — Zygnum Bory l. c. f. 11. et Ledæ sp.
— Mugeotia Agardh.

15. Z. GENUFLEXUM (Ag. syn. 98.) filamentis demùm hinc indè genuflexis angulisque conjunctis, articulis diametro 4-6plò longioribus, materiâ viridi longitudinaliter rectangulâ articulum totum aut pro parte implente demùm in medio condensatâ. — In stagnis et fossis. — Lyngb. t. 58. Mong. et Nestl. n. 697. C. genuflexa Roth. Dillw. conf. t. 6. DC. fl. fr. 2. p. 57. Conjugata angulata Vauch. conf. t. 8. f. 1-9. Mugeotia genuflexa Ag. syst. 83. Chauvin alg. norm. n. 55. (v. v.)

16. Z. SERPENTINUM (Dub. mss.) filamentis convolutis, articulis diametro duplò longioribus, materiâ viridi longitudinaliter rectangulâ articulum implente demùm longitudinaliter condensatâ. — In paludibus. — Z. compressum Lyngb. t. 58? Conf. serpentina Mull. in nov. act. pet. t. 1. f. 8. DC. fl. fr. 2. p. 57. Conjugata serpentina Vauch. t. 8. f. 10.

17. Z. CAPUCINUM (Dub. mss.) filamentis nitentibus atro-violaceis, demùm hinc indè inflexis et reticulatim conjunctis, articulis diametro 3-6plò longioribus, materiâ dilutè violacea longitudinaliter rectangulâ articulum subimplete, demùm in lineolas elongatas flexuosaes violaceaes aut in puncta hyalina condensatâ. — In aquis stagnantibus Vogesorum (cl. Mong. et Nestl.), Neustriæ (cl. Lenormand et Despréaux), agri Syrtici (cl. Grateloup). — Leda capucina Mong. et Nestl. n. 793. Mugeotia capucina Ag. (v. s.)

Trib. X. CONFERVEÆ — Confervearum et Chaodinearum gen. *Bory*.

Filamenta viridia rariùs colorata, capillaria aut filiformia, simplicia aut ramosa, gelatinosa aut membranacea, articulata, nunquam conjugata. Concepitacula in Batrachospermo ut videatur externa, in cæteris nulla aut potius ignota. — Aquæ dulcis aut maris incolæ.

LIV. THOREA Bory in ann. mus. 12. p. 126.

Filamenta mucosa flexilia filiformia ramosa continua, ramulis ciliformibus minutis tenuibus articulatis obducta.

1. T. RAMOSISSIMA (Bory l. c. t. 18. f. 1.) filamentis longissimis ramosissimis atro-viridibus exsiccatione amœnè violacea, ramulis simplicibus. — In fluviis. — Berl. mag. 1808. t. 6. f. 1. Mong. et Nestl. n. 795. T. Lehmanni fl. dan. t. 1594. f. 1. Lyngb. t. 13. Batrachospermum hispidum DC. fl. fr. 2. p. 60. Conf. hispida Drap. Thore mag. enc. t. 6. p. 398. C. hirsuta Th. chl. (v. s.)

978 ACOTYL. SEU CELLULARES.

LV. LEMANEA Bory ann. mus. 12. p. 181. dict. class. t. 9. p. 274. Agardh
syst. xxxvij. — Nodularia Linck. Lyngbye. — Polyspermæ sp. Vauch. — Chan-
transiæ sp. DC.

Filamenta stricta rigida non gelatinosa cylindrica articulata simplicia
aut parum ramosa extrinsecus sèpè hinc inde nodulosa, intùs filamenta
minutissima moniliformia penicillata foventia.

1. L. FLUVIATILIS (Ag. dec. n. 36. f. 2. act. holm. 1814. t. 2. f.) filamentis sub-
simplicibus elongatis rectis papillosis, papillis subternis, articulis oblongis
diametro sub-5plò longioribus. — In fluviis et rivulis saxis et lignis adnata.
— L. corallina Bory ann. 12. t. 21. f. 2. Nodularia fluviatilis Lyngb. t. 29.
Chantransia fluviatilis DC. fl. fr. 2. p. 50. Polysperma fluyatilis Vauch.
conf. t. 10. f. 1. 2. 3. Conf. fluviatilis Linn. — Vaill. bot. t. 4. f. 5. (v. v.)
f. fucina, filamentis ramosis valdè elongatis. — In rivulis Galliæ occiden-
talib. — L. fucina Bory l. c. f. 3. Chauv. alg. norm. n. 69. — Nunc sub-
simplicem nunc ramosissimam plus minus elongatam vidiisse monet cl.
Chauvin. (v. s.)
2. L. TORULOSA (Ag. in act. holm. l. c. t. 2. f. 1. syst. 256.) filamentis simpli-
cibus brevioribus incurvatis epapillosis articulationibus inflatis moniliformi-
bus, articulis diametro 3-4plò longioribus. — In fluviis et rivulis. — L. in-
curvata Bory l. c. f. 1. Chantransia torulosa DC. fl. fr. 2. p. 50. Couferva to-
rulosa Roth. — Dill. musc. t. 7. f. 48. (v. v.)

LVI. BATRACHOSPERMUM Roth. germ. 3. p. 480. Bory ann. mus. 12. p. 310.
dict. class. t. 2. p. 226. — Batrachospermum sp. Vauch. DC.

Filamenta gelatinosa valdè flexilia cylindrica ramosissima articulata,
ramulis minutis moniliformibus ad genicula verticillatis appendice ca-
pillari tenuissimo terminatis; fructificatio intrà verticulos sita constans
ex cl. Bory e gemmis corpusculis aggregatis formatis subpedicellatis, ex
cl. Lyngbye e conceptaculis globosis.

I. *Lemanina* (Bory dict. class. l. c.).

Filamenta opaca minus gelatinosa articulationibus inflatis, ramulis subsim-
plicibus raris verticillatis sparsive.

1. B. TENUISSIMUM (Bory dict. cl. l. c.) filamentis ramosissimis elongatis te-
nuissimis atris aut griseo-cærulescentibus, articulis cylindricis superne sub-
incrassatis opacis inferne attenuatis pellucidis. — In rivis et fontibus lapidi-
bus adhærens. — Lemanea batrachospermosa Bory ann. mus. 12. t. 22. f. 3.
4. Chantransia atra et C. dichotoma DC. fl. fr. 2. p. 51 et 50. Conserva atra
Roth. Dillw. conf. t. 2. (v. v.)
f. sertularinum, filamentis atris crassiusculis; nodis paulò magis inflatis.
— In rivulis Armoraciæ circa Fougères. — B. sertularina Bory Dict.
clas. Lemanea sertularina. Bory ann. mus. 12. t. 22. f. 1. (v. s.)
2. B. DILLENI (Bory dict. class. l. c.) filamentis ramosissimis divaricato-im-
plexis brevibus nigris, articulis cylindricis superne turgidis opacis, inferne
attenuatis subpellucidis opacisve. — In rivulis Galliæ occidentalis, rariùs.
— Lemanea Dillenii Bory in ann. mus. 12. t. 22. f. 2. — Dill. musc. t. 2. f.
46. (v. s.)

II. *Thorinia* (Bory dict. class. 2. p. 227. excl. sp. marin.).

Filamenta pellucida articulationibus subæqualibus aut parùm distinctis, ra-
mulis subsimplicibus confertis sparsis.

3. B. TURFOSUM (Bory ann. mus. 12. p. 327. t. 31. f. 1.) filamentis cylindricis
subdichotomis ramosissimo-vagis viridi-cærulescentibus, undique tectis ra-
mulis verticillatis, verticillis compressis, horizontalibus indistincto-confe-

sis, ramis apice subincrassatis, articulationibus vix distinctis. — In tufosis Vogesorum et agri Syrtici. — *B. vagum* Ag. Lyngb. t. 64. *B. moniliforme vagum* Roth. (v. v. D.)

4. *B. HYBRIDUM* (Bory dict. class. l. c.) filamentis moniliformibus duris ramosissimis fusco-lutescentibus, ramis attenuatis, verticillis distinctis globosis, ramulis confertis dichotomis. — In stagnis. — *B. durum* Ag. syst. 53. †

III. *Monilina* (Bory dict. cl. l. c.).

Filamenta articulationibus distinctis ramulis verticillatis cinctis.

5. *B. KERATOPHYTUM* (Bory ann. mus. 12. t. 31. f. 2.) filamentis corneis nigro-fuscis basi nudis vase-ramosis, ramis inferioribus ramulis sparsis tectis, superioribus viridi-cærulecentibus verticilliferis, verticillis distinctis remotis ad extremitates ramorum confertis, ramis apice non incrassatis, articulationibus distinctis. — In fontibus agri Syrtici. — *B. vagum* γ laxum Ag. (v. s.)
6. *B. MONILIFORME* (Roth. cat. 2. p. 187; fl. germ. 3. p. 480.) filamentis gelatinosis lubricis vase-ramosis, ramis alternis patentibus obtusiusculis, articulis imò insimis instructis ramulis densissimis dichotomis in verticilos sphæricos distinctos in ramis extremis valde confertos aggregatis. — Ubique, rivulorum lapidibus adhærens. Vauch. conf. p. 112. DC. fl. fr. 2. p. 59. *B. ludibunda* Bory ann. mus. 12. p. 317. Conf. gelatinosa Linn. (v. v.)
- α. *confusum* (Bory t. 29. f. 3.) griseo-fuscum verticillis contiguis subconfusis supernè et infernè compressis.
 - β. *Boryanum* (Agardh) atro-fuscum, verticillis inferioribus distinctis sphæricis, extremis confuso-compressis. — *B. ludibunda moniliforme* Bory ann. t. 30. f. 1. *B. moniliforme* Vauch. conf. t. 11. f. 1 et 3. Lyngb. t. 64. A. — Dill. musc. t. 7. f. 42.
 - γ. *pulcherrimum* (Bory t. 30. f. 2.) griseo-violaceum, verticillis sphæricis distantibus inferioribus extremisque distinctis.
 - δ. *cærulescens* (Bory t. 30. f. 3.) griseo-aut violaceo-cærulescens, ramis elongatis gracilibus, verticillis elegantissimè sphæricis. — *B. cærulescens* Bory dict. class. l. c. — Dill. musc. t. 7. f. 45.
 - ε. *viridis* (Bory t. 30. f. 4.) cæruleo-virescens, filamentis ramosissimis densis, verticillis approximatis.
 - ζ. *stagnale* (Bory t. 30. f. 5.) luteo virescens, filamentis crassis ramosis, verticillis distinctis compressiusculis, inferioribus confusis. — Dill. musc. t. 7. f. 44.
7. *B. HELMINTHOSTUM* (Bory ann. mus. 12. p. 316. t. 29. f. 2.) filamentis gelatinosis lubricis viridi-cærulecentibus ramosis infernè nudis, ramis pyramidalis, simplicibus subpinnatis acutiusculis, ramulis densissimis dichotomis in verticilos compressos contiguos confusos confertis. — In fontibus et rivulis, rariùs. — Vail. bot. t. 6. f. 6. — Prioris probabiliter forma. (v. s.)

IV. *Draparnalina* (Bory dict. class.).

Filamenta vaga hyalina cylindrica, articulationibus vix distinctis, ramulis in verticilos sæpè incompletos digestis.

8. *B. TRISTE* (Bory ann. mus. p. 329. t. 31. f. 3. 4.) filamentis setaceis elongatis, ramis brevioribus, verticillis sparsis completis incompletis. — In fontibus et rivulis Galliae austro-occidentalis. — *Draparnaldia glomerata* γ gracillima Agardh syst. 59. — Filam. 3-9 poll. alta.

- α. *chlora* (Bory l. c. f. 3.) luteo-virescens pallida, filamentis longioribus tenuissimis.
- β. *colorata* (Bory l. c. f. 4.) violaceo-virescens, filamentis brevibus crassiuseculis.

980 ACOTYL. SEU CELLULARES.

LVII. DRAPARNALDIA *Bory de Saint-Vincent* in ann. mus. t. 12. p. 399;
dict. class. t. 5. p. 614. — Batrachospermi sp. *Vauch. DC.*

Filamenta gelatinosa valdè flexilia cylindrica ramosa articulata, ramulis cylindricis articulatis fasciculato-penicillatis rariùs sparsis appendice capillari tenuissimo terminatis.

1. D. TENUIS (Agardh dec. 3. n. 30; syst. alg. 57. excl. C. pusillà) filamentis elongatis ramosis valdè mucosis tenuissimis subcontinuis, ramis vagis di varicatis, ramulis nunc laxis nunc fasciculatis, articulis diametro subduplò longioribus. — In rivulis et stagnis. — D. mutabilis *Bory* in ann. l. c. t. 35. f. a et c. D. laxa *Bory* dict. cl. D. hypnosa *Moug. et Nestl.* vog. n. 499. C. lubrica *Lyngb.* t. 51. c et 52 b. *Dillw.* t. 57. C. protensa *Dillw.* t. 67. (v. v.)
2. D. GLOMERATA (Ag. disp. 41; syst. 58.) filamentis ramosissimis gelatinosis crassiusculis articulatis, ramis vagis, ramulis in penicillos ovatos obtusos patentes fasciculatis, articulis in ramis diametro subduplò longioribus in ramulis subæqualibus. — In stagnis et rivulis. — *Lyngb.* t. 64. D. mutabilis *Bory* l. c. t. 35. f. 1. b. d. *Moug. et Nestl.* vog. n. 498. Batrachospermum glomeratum *Vauch.* conf. t. 12. f. 1. DC. fl. fr. 2. p. 59. Conferva Chara *Roth.* (v. v.)
3. D. PLUMOSA (Agardh disp. 42.) filamentis subgelatinosis ramosissimis gracilibus elongatis, ramis vagis, ramulis in penicillos suboppositos lanceolatos acutos erectos fasciculatis, articulis diametro sesquilonioribus. — In fluviis et rivulis. — D. hypnosa *Bory* t. 35. f. 2. Batrachospermum plumosum *Vauch.* t. 11. f. 2. et 4. DC. fl. fr. 2. p. 49. Conferva mutabilis *Roth.* *Dillw.* t. 12. fl. dan. t. 1481. f. 1. Conferva lubrica eng. bot. t. 2087. (v. v.)

LVIII. CONFERVA *Agardh* syst. xxvj et 86. — Confervæ sp. *Auct.* — Zoocarpeæ et Confervarum gen. *Bory.*

Filamenta simplicia aut ramosa cylindrica flexilia membranacea vitrea articulata, articulis materiâ viridi rariùs coloratâ farctis.

A. RAMOSÆ.

* *Marinae.*

1. C. CATENATA (Linn. syst. veg. 973.) primò viridis demù rufescens et fusco-rufescens cespitosa ramosissima, ramis 2-3-chotomis fastigiatis extremis obtusis, articulis ad genicula contractis inferioribus valdè elongatis superioribus brevioribus sed semper diametro triplo longioribus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — C. prolifera *Roth* cat. 1. t. 3. f. 2. 3. Ag. 119. C. catenata Desf. Ag. l. c. Ceramium catenatum DC. fl. fr. 2. p. 42. Chloronitum proliferum Gaillon in Desm. cr. exs. 251. Bryopsis confervoides Lenorm. in litt. — *Dill. mus.* t. 5. f. 27. (v. v.)
2. C. AEGAGROPILA (Linn. syst. 4. p. 973. non auct.) atro-viridis, filamentis densissime cespitosis e centro communi egressis globulum constituentibus rigidis ramosissimis dichotomis, extremis obtusis, articulis ad genicula contractis diametro quintuplo longioribus. — Ad littora maris Mediterranei præsertim Corsicæ. — Ceramium aegagropilum DC. fl. fr. 2. p. 41. Chloronitum aegagropilum Gaillon. (v. s.)
3. C. RUPESTRIS (Linn. sp. 1637.) saturate viridis interdùm pallescens, filamentis dense cespitosis setaceis strictis fasciculatis virgatis obtusis ramosissimis, ramis subtrichotomis erectis, articulis ad genicula contractis inferioribus diametro multò longioribus superioribus longitudine sensim decrescentibus extremis diametrum vix æquantibus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Fl. dan. t. 948. *Dillw.* t. 23. eng. bot. t. 1699. Chany. alg. norm. n. 4. *Lyngb.* t. 54. Ceramium rupestre DC. fl. fr. 2. p. 42. Chloronitum rupestre Gaillon in Desmaz. cr. exs. u. 152. — *Dill. musc.* t. 5. f. 29. (v. v.)

4. *C. SERICEA* (Huds. ang. 485.) viridis demum rufo-lutescens sericea nitens, filamentis elongatis dense cespitosis capillaceis diffosis obtusis ramosissimis inferne dichotomis medio trichotomis, ramis divaricatis, ramulis superioribus secundis rigidis, articulis ad genicula minus contractis diametro 3-4plò longioribus. — In Oceano et mari Mediterraneo. — *C. sericea marina* Lyngb. *Ceramium sericeum* DC. fl. fr. 2. p. 42. *Chlorouitum sericeum* Gaill. in Desmaz. cr. exs. 153. — Dill. musc. t. 5. f. 33. (v. v.)
f. Mediterranea, filamentis brevioribus crassioribusque, articulis inflatis diametro subduplicè longioribus. — In mari Mediterraneo. (v. v. D.)
5. *C. REFRACTA* (Roth cat. bot. 2. p. 193.) viridi-lutescens valde sericea nitens, filamentis elongatis dense cespitosis tenuissimis valde diffusis obtusis ramosissimis 2-3-chotomis, ramis divaricatis subrecurvis creberrimis, ramulis superioribus oppositis alternis secundis, articulis in ramis ad genicula non contractis diametro 2-3plò longioribus, in ramulis subcontractis diametrum vix æquantibus. — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), rarè. — Ag. syst. 119. *C. fracta marina* Lyngb. non Roth. — Rami maximè intricati. Valde elegans. (v. s.)
6. *C. FALCATA* (Dub. mss.) intensè viridis, filamentis elongatis dense cespitosis tenuibus implicatis obtusis decomposito-ramosissimis, ramis implexis ramulis creberrimis fasciculatis falcato-pectinatis brevibus ob sessis, pinnulis secundis obtusis alternis oppositis, articulis ad genicula non contractis diametro subsesquialongioribus, pinnularum ultimo longiori. — Ad littora Mediterranei maris circa Massiliam reperi. — Primo adspectu habitu fasciculato dignoscenda. (v. v. D.)
7. *C. CRYSTALLINA* (Roth cat. 1. p. 196. 3. p. 239.) viridi-lutescens tenerima demùm crystallina, filamentis elongatis dense fasciculatis implexis tenuissimis flexuosis ramosissimis, ramulis ramulisque subverticillatis, ramulis extremis subsecundis solitariis strictis, articulis ad genicula non contractis diametro 8-10plò etiam in ramulis longioribus. — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin). — Lyngb. p. 155. t. 54. *Chauvin alg. norm. n. 57. C. pura* Roth. (v. s.)
8. *C. LANOSA* (Roth cat. 3. p. 291. t. 9.) flavo-virescens exsiccata nitens, filamentis brevibus in fasciculum subrotundum densissimum consertis rectis tenuissimis ramosissimis, ramulis remotis alternis elongatis simplicibus, articulis ad genicula non contractis inferioribus diametro duplo summis quintuplo longioribus. — Ad littora Neustriæ Halymeniac laciniatæ incolam reperiit cl. Roberge. — Dillw. supp. t. e. Lyngb. t. 56. (v. s. D.)
9. *C. UNCIALIS* (fl. dan. t. 771. f. 1. non Lyngb.) cespite basi simplici sculo apice fastigato-dilatato brevissimo, ramulis subpectinatis secundis, articulis diametro sextuplo longioribus. — Fucorum parasitica ad littora propè Cherbourg ex cl. Lenormand. — Ag. syst. III.
10. *C. AERUGINOSA* (Huds. ang. 1. c.) filamentis ramosis flexuosis brevibus æruginosis, ramis sparsis patentibus obtusis, articulis diametro subsesquialongioribus. — In fucis ad littora Oceani circa St.-Malo et Granville ex cl. Lenormand. — Dillw. supp. t. e. Agardh syst. 104. — Dill. musc. t. 4. f. 20.
11. *C. DENSA* (Dub. mss.) viridis exsiccata lutescens sericea nitens, filamentis in fasciculum subglobosum densissime intertextis tenuibus flexuosis dichotomis, ramis paucis sparsis elongatis subsimplicibus apice obtusis, articulis ad genicula non contractis inæqualibus diametro 4-10plò longioribus. — Ad littora Corsicæ (Ph. Thomas). — Genicula in ramis superioribus difficile distingueda. (v. s. D.)
- ** *Aquæ dulcis.*
12. *C. PUSILLA* (Lyngb. tent. p. 149. t. 51.) lète viridis, filamentis tenuissimis brevissimis strictis in fasciculum minutum subglobosum dense agglomeratis virgatis ramosis, ramulisque alternis attenuatis superioribus approximatis, articulis inferioribus diametro 4-5plò longioribus ramulorum diametrum subæquauibus. — In rivulis Neustriæ circa Caen Confervis majoribus

982 ACOTYL. SEU CELLULARES. CONFERA.

adnata (cl. Chauvin). — *Genicula subcontracta* undè hanc cum Draparnaldiā teuni cl. Agardh conjanxerit non perspicitur. (v. s. D.)

13. *C. RIPARIA* (Dillw. introd. n. III. supp. t. E.) *viridis*, filamentis capillaceis elongatis flexuosis cespitosis densè intricatis remotissimè ramosis, ramis brevibus divaricatis simplicibus angulis dichotomiarum insigiter obtusis, articulis ad genicula pellucida non contractis diametrum nunc subæquantibus nunc eodem subduplicè longioribus. — Ad rotas molendinarias Neustriæ circa Caen (cl. Roberge et Chauvin), rariùs. — Eng. bot. t. 2100. Conf. obtusangula Lyngb. t. 55. (v. s.)

14. *C. GLOMERATA* (Linn. syst. nat. 2. p. 721.) saturatè viridis, filamentis capillaceis valde elongatis flexuosis densè cespitosis aggregatis ramosissimis, ramis alteruis divaricatis apicem versus fasciculatis, ramulis summis brevibus subsecundis fastigiatis, articulis cylindricis diametro 3-4plò longioribus. — In flaviis et aquis puris, saxis et lignis adhærens. — Fl. dan. t. 651. f. 2. Dillw. t. 13. Lyngb. t. 53. Dillw. t. 13. *C. lætevirens* Dillw. t. 48. eng. bot. t. 1854. *Chantransia glomerata* DC. fl. fr. 2. p. 51. *Polysperma glomerata* Vanch. conf. t. 10. f. 4. 5. — Dill. musc. t. 4. f. 16 et 18. t. 5. f. 31. (v. v.)

β macrogonya (Lyngb. t. 53.) filamentis tenuissimis, ramis elongatis, articulis diametro 8-10plò longioribus. — Cum priori, rariùs. (v. s. D.)

15. *C. CRISPATA* (Roth. cat. 1. p. 178.) saturatè viridis demùm lutescens, filamentis tenuibus elongatis flexuosis cespitosis densissimè implexis remotè ramosis, ramis alternis subdichotomis, articulis cylindraceis ad genicula subcontractis diametro 6-10plò longioribus siccitate alternatim compressis. — In fossis et flaviis. — Dillw. t. 93. Chauv. alg. norm. n. 56. *C. capillaris* eng. bot. t. 2364. *C. rivularis* Moug. et Nestl. vog. p. 693. (v. v.)

16. *C. ELONGATA* (Agardh syst. 109.) saturatè viridis, filamentis capillaceis longissimis strictis densè cespitosis rectis laxè dichotomis inæqualibus, ramis alternis, articulis ad genicula contractis longitudine valde inæqualibus diametro 2-6plò longioribus siccitate alternatim compressis. — Saxis et lignis in flaviis et rivulis adnata circa Mimatem (cl. Prost), in Neustriæ ex cl. Lenormand. — Chartæ vix adhærens, 1-3-pedalis. (v. s.)

17. *C. FRACTA* (Dillw. t. 14.) viridis demùm flavescens, filamentis capillaceis tenuibus elongatis implexis et stratum densissimum efficientibus ramosissimis, ramis divaricatis alternis, superioribus crebris subrecurvis, articulis diametro 3-4plò longioribus. — In stagnis Galliæ borealis ex cl. Lenorm. et Desmaz. — Eng. bot. t. 2338. Lyngb. t. 52? *C. divaricata* Roth. pro parte. *C. vagabunda* Huds. Dicks. — Dill. musc. t. 3. f. 11. B. — In speciminibus meis artieuli medio intumescentes ut delineavit Dillwyn sunt. (v. s. ex Angliâ.)

B. SIMPLICES.

* *Marinæ.*

18. *C. FUCICOLA* (Agardh syst. 103.) filamentis penicillatis simplicibus flaccidis fastigiatis luteis, articulis pellucidis diametro sesquilonioribus. — Ad fucos majores ad littora Calvadosii ex cl. Lenormand.

19. *C. FERRUGinea* (Roth. cat. bot. 3. p. 274.) dilutè fusca aut ferruginea, filamentis penicillatis simplicibus rigidiusculis fastigatis, articulis diametro duplò longioribus. — In Fuco vesiculoso aliisque ad littora Oceani. — Ag. syst. 103. *C. fucicola* Dillw. t. 66. Ag. fl. dan. t. 1484. f. 2. Lyngb. tent. t. 50. (v. v. D.)

20. *C. FLACCIDA* (Dillw. int. n. 52. supp. t. 6.) fusco-virescens, filamentis penicillatis simplicibus tenuissimis rigidiusculis attenuatis fastigiatis, articulis inferioribus diametro brevioribus, superioribus subæqualibus. — Ad littora Calvadosii, fucis majoribus adnata. — Lyngb. t. 50. eng. bot. t. 2310. *C. Youngana* Ag. syu. (v. s.)

21. *C. ZEBRA* (Dill. t. 80.) dilutè viridis, filamentis cespitosis simplicibus

crassiusculis elongatis rigidis erectis fluctuantibus, articulis iuxequalibus diametrum vix æquantibus. — Ad littora Oceani et maris Mediterranei. — Lyngb. t. 51. C. antennina Bory. (v. v.)

22. C. LINUM (Roth. cat. 1. p. 174.) sordidè vel flavo-virescens, filamentis laxè implicatis longissimis crispatis simplicibus filiformibus rigidis exsiccatione variegatis, articulis diametro sublongioribus siccitate contractis et corrugatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. — Lyngb. t. 50. C. melagonium fl. dan. t. 1483. f. 1. non Web. et Mohr. C. capillaris Huds. Dillw. t. 9. Ceramium Linum DC. fl. fr. 2. p. 47. — Moris. III. sect 15. t. 4. f. 4. — Dill. musc. t. 5. f. 25. A. (v. v.)
23. C. TORTUOSA (Dillw. t. 46.) intensè viridis, filamentis intricatis crispatis capillaribus tenuibus simplicibus rigidiusculis, articulis diametro 2-3plò longioribus. — Ad rupes marinas Calvadosii ex cl. Lenormand. — Eng. bot. t. 2220. Lyngb. t. 49.
24. C. IMPLEXA (Dillw. introd. p. 46. supp. t. B.) viridis vel sordidè flavescens, filamentis simplicibus tenuissimis elongatis crispato-implexis flexuosis molibus, articulis turgescientibus diametro sesqui aut duplò longioribus. — In Oceano ad littora Calvadosii detexit summus DC. — Lyngb. t. 49. eng. bot. t. 2309. Ceramium glomeratum DC. fl. fr. 2. p. 48. (v. v. DC.)

** *Aquæ dulcis.*

25. C. CAPILLARIS (Linn. syst. nat. 2. p. 721.) filamentis simplicibus tenuibus crispatis proliferisque varie flexis et laxè intricatis, articulis diametro subduplò longioribus siccitate alternatim compressis, granulis sparsis vel in globulum oblongum demùm collapsis. — In fluviis, fossis et stagnis. — Lyngb. t. 47. Prolifera crispa Vauch. conf. t. 14. f. 2. Chantransia crispa DC. fl. fr. 2. p. 52. Ceramium capillare DC. fl. fr. 2. p. 48. excl. localitate. Prolifera Vaucherii Leclerc in mem. mus. t. 3. f. 4. Tiresias crispa Bory in dict. class. Arthr. f. 13. — Dill. musc. t. 5. f. 25. B. (v. v.)
- β. alterna (Ag.) articulis diametro æqualibus, alternis nigricantibus. — In fossis. — Chauv. alg. norm. n. 83. Prolifera composita Vauch. conf. t. 14. f. 5. (v. s.)
26. C. RIVULARIS (Linn. syst. nat. 2. p. 720.) filamentis simplicibus capillaceis longissimis rectis contortis æqualibus, articulis diametro 2-4plò longioribus, siccitate alternatim compressis nitidis, materiâ viridi articulum totam implente aut in lineam latam contractâ. — In fluviis. — Lyngb. t. 48. eng. bot. t. 1654. Chauv. alg. norm. n. 32. Prolifera rivularis Vauch. conf. t. 14. f. 1. Chantransia rivularis DC. fl. fr. 2. p. 51. Prolifera Cuvieri Leclerc. — Dill. musc. t. 2. f. 1. — Mich. gen. t. 89. f. 7. (v. v.)
27. C. PARASITICA (DC. fl. fr. 2. p. 57.) filamentis simplicibus adnatis fasciculatis tenuissimis minutissimisque flexuosis obtusis, articulis diametro paulò longioribus. — Ad Conservam glomeratam parasitica. — Agardh syst. 94? Prolifera parasitica Vauch. conf. t. 14. f. 6. (v. s.)
28. C. VESICATA (Ag. disp. p. 30.) filamentis simplicibus tenuibus elongatis dense intricatis, articulis diametro sesquilongoribus hic et illuc globuloso-inflatis proliferisve, granulis sparsis. — In fluviis et stagnis. — Lyngb. t. 47. D. f. 1. C. alterna Dillw. eng. bot. t. 2304. Prolifera vesicata Vauch. conf. t. 14. fl. dan. t. 1433. f. 2. Chantransia vesicata DC. fl. fr. 2. p. 52. — Artienlos globuloso-inflatos in hâc aliisque speciebus habet cl. Leclerc ut statum plantæ fructificantem, atque se ex his articulis corpuscula globosa (propagula) excurrentia et novas plantas emittentia vidisse. Hæc autem propagula ut Zoocarpa habet cl. Bory. (v. v.)
29. C. VERRUCOSA (Agardh syst. 93.) intensè viridis, filamentis simplicibus capillaribus elongatis intricatis flexuosis hinc inde verrucis gibbis proliferisque, articulis diametro sesqui aut duplò longioribus, materiâ viridi articulum implens aut in conum duplicem subdispositâ. — In fontibus Neustriæ (cl. Chauvin). (v. s. D.)
30. C. FUGACISSIMA (Roth. cat. bot. 1. p. 176.) viridi-lutescens gossypina, fila-

984 ACOTYL. seu CELLULARES.

mentis simplicibus tenuissimis elongatis rectiusculis, articulis hinc inde inæqualibus ad genicula contractis diametro 2-3plò longioribus. — In stagnis Neustriæ (cl. Lenorm. et de Bréb.). — Ag. syst. 93. non Lyngb. — Valdè elegans. (v. s. D.)

31. *C. dissiliens* (Dillw. t. 63.) viridis lubrica gelatinosa, filamentis simplicibus tenuibus æqualibus fragilibus strictis rigidis elongatis, articulis diametro duplò brevioribus rariùs æqualibus interdum solatis, materiâ viridi in fasciam transversalem aut globulum ovatum dispositâ. — In fossis et rivulis Galliæ borealis. — Lyngb. f. 45. *C. bicolor* eng. bot. *Cadmus dissiliens* Bory. — An suadente cl. Chauvin sequentis status?

32. *C. zonata* (Web. et Mohr it. suec. p. 97. t. 1. f. 7. a. b.) viridis lubrica gelatinosa, filamentis simplicibus tenuibus apicem versus attenuatis rectis flexuosis elongatis, articulis diametro nunc duplò brevioribus nunc æqualibus, materiâ viridi in fasciam transversalem latam dispositâ. — Ad ligna et lapides in rivulis. — Lyngb. t. 45. Chauvin Alg. norm. n. 58. et mem. soc. linn. norm. 1827. t. 6. *C. lucens* Dillw. t. 47. eng. bot. t. 1655. — Cl. Chauvin I. c. se-pulvisculam tenuissimum viridem ex articulis ejaculatum motu proprio donatum vidisse affirmat. (v. v.)

33. *C. mucosa* (Dillw. supp. t. B.) dilutè viridis mucoso-lubrica gelatinosa exsiccata nitida, filamentis simplicibus tenuissimis æqualibus rectis flexuosis elongatis ob mucositatem discretis, articulis diametro subæqualibus ad genicula parùm contractis, materiâ viridi articulum totum replete aut in fasciam longitudinalem contractâ. — In aquis circa Falaise (cl. de Brébisson). — Ag. syst. 90. — Valdè elegans. (v. s. D.)

34. *C. floccosa* (DC. fl. fr. 2. p. 57.) dilutè viridis demùm lutescens arachnoidea mucosa, filamentis simplicibus tenuissimis æqualibus in stratum bullosum impletis elongatis, articulis diametro subæqualibus ad genicula non contractis, materiâ viridi in globulum rotundum vel subovatum demùm in fasciam longitudinalem contractâ. — In fossis et stagnis. — Lyngb. t. 46. Pro-lifera floccosa Vauch. conf. t. 14. f. 3. *Monilina floccosa* Bory. (v. v.)

35. *C. sordida* (Roth. cat. 1. p. 77.) viridi-lutescens arachnoidea mucosa, filamentis simplicibus tenuissimus æqualibus in stratum bullosum implicatis longissimis, articulis diametro 2-6plò longioribus valdè longitudine inæqualibus hic illuc inflatis junioribus medio punctatis demùm hyalinis. — In fossis et stagnis. — Lyngb. t. 46. Dillw. t. 60. non eng. bot. *C. bombycina* Ag. (v. v.)

36. *C. ERICETORUM* (Roth. cat. 2. t. 5. f. 2.) fusco-violacea arachnoidea, filamentis tenuissimis densissimè implexis longis, articulis diametro æqualibus aut ses-quilongioribus ad genicula parùm contractis. — In turfosis inundatis aut subexsiccati. — Dillw. t. 1. fl. dan. t. 1548. f. 2. Lyngb. t. 47. eng. bot. t. 1553. Moug. et Nestl. vog. n. 694. Grev. crypt. fl. t. 261. f. 1. (v. v.)

LIX? HYDRODYCTION Roth. germ. 3. p. 521. Vauch. conf. p. 82. DC. fl. fr. 2. p. 61.

Filamenta membranacea viridia in formam reticuli piscatorii connexa areolis polygonis; articuli fracti materiâ primò viridi granulis nitentibus farctâ demùm in reticulum omnimodò matri simile demùm egrediens expansâ.

1. *H. UTRICULATUM* (Roth. I. c.) areolis pentagonis lateribus crassitie subæqualibus. — In fossis, flaviis, lacubus. Ag. fl. dan. t. 1597. Moug. et Nestl. n. 498. Lyngb. t. 58. *H. pentagonum* Vauch. conf. t. 9. DC. I. c. *H. majus* et *tenellum* Roth. Conf. reticulata Pluck. phyt. t. 24. f. 2. eng. bot. t. 1687. (v. v.)

Trib. XI. BANGIEÆ.

Filamenta fusca olivaceo-viridia aut purpurascentia capillaria flexilia membranacea continua intus sphærulas aut granula nunc densa nunc laxa includentia. — Maris rarius aquæ dulcis incolæ.

LX. SPHÆROPLETHIA Dub. mss.

Filamenta capillaria brevia flexuosa intertexta continua membranacea diaphana simplicia, intus sphærulas (propagula?) nunc aurantiacas nunc pellucidas crassas nunc densissime congestas nunc in seriam simplicem duplensem subdispositas, integumento pellucido echinato involutas foventia.

1. S. SOLEIROLII (Duby mss.). — In paludibus Corsicæ circè Calvi detexit cl. Soleirol. — Oculo nudo amoenissimè miniato-aurantiaca. (v. s.)

LXI. BANGIA Agardh syst. xxv et 75. — Bangiæ sp. Lyngb.

Filamenta capillaria flexilia continua membranacea non composita, intus granula elliptico-cylindracea aut globosa in fascias cylindricas depresso transversales articulum mentientes agglomerata foventia.

* Virides.

1. B. LAMINARIA (Lyngb. t. 24. f. B.) filamentis olivaceo-viridibus cespitosis fastigiato-penicillatis capillaribus simplicibus, extus undique fibrillis minutissimis hyalinis hirsutis intus granulis globosis seriatim transverse dispositis obsoletè notatis. — In utrâque Laminariæ bulbosæ paginâ propè Cherbourg detexit cl. Chauvin et cum descr. communie., rarissima. — Substantia rigidiuscula. (v. s. D.)

† * Coloratæ.

2. B. CRISPA (Fl. dan. t. 1601. f. 2.) filamentis roseis cespitosis crispis capillaribus simplicibus, granulis minutissimis rotundis vel subquadratis in quavis fascia 1-4 interdùm pluribus congestis. — Ad rupes marinas circè Cherbourg ex cl. Lenormand. — Lyngb. t. 24. f. A. — Subst. membranacea tenacissima.
3. B. FUSCO-PURPUREA (Lyngb. t. 24. C.) filamentis viridi aut fusco-purpureis dense cespitosis elongatis capillaribus simplicibus rigidiusculis, granulis minutis quadrato-sphæricis pallidis in quavis serie transversali 1-5 vel pluribus dispositis demùn laxis inordinatis, fasciis simplicibus demùn laxè et inordinatè congestis. — Ad rupes marinas in Oceano et mari Mediterraneo. — B. atro-purpurea & fusca purpurea Ag. Conf. fusco-purpurea Dillw. t. 92. C. jubata Drap. (v. s.)
4. B. ATRO-PURPUREA (Agardh syst. 76.) filamentis atro-purpureis dense cespitosis elongatis capillaribus simplicibus mollioribus granulis crassioribus sub-sphæricis atro-violaceis in quavis serie transversali 1-100 demùn confertissimis semper serialibus, fasciis per paria dense approximatis demùn dense et ordinate congestis. — In rivulis ad ligna et rotas molendinarias. — B. fusco-purpurea & atro-purpurea Lyngb. Conf. atro-purpurea Dillw. t. 103. Roth. cat. 3. t. 6. Cadmus violacea Bory in Moug. et Nestl. vog. n. 895. (v. v.)

LXII. SCHIZONEMA Agardh syst. alg. xv et 9. — Bangiæ sp. Lyngb.

Filamenta flexilia rutilantia et fusca sicca nitidissima luteo-viridia e filamentis angustioribus coadunatis composita granula elliptica includentibus in quæ iterum secedunt.

1. S. HELMINTHOSUM (Chauvin alg. norm. n. 77.) cespitosum vage irregulariterque valde ramosum, filamentis setaceis ad apices attenuato-acutis, gra-

986 ACOTYL. SEU CELLULARES.

nulis oblongis elongatis seriatim longitudinaliter parallelèque dispositis. — Ad rupes marinas Calvadosii (cl. Chauvin). — Substantia gelatinosa tenera; color brunneo-fuscus post exsiccationem olivaceo-viridis (v. s. D.) communic. et descr. a cl. Chauvin).

2. *S. APICULATUM* (Agardh syst. 11.) cespitosum vage irregulariterque ramosum, filamentis setaceis ad apicem elongato-lanceolatis fastigiatis, granulis elongato-lanceolatis utrinque attenuatis seriatim longitudinaliter parallelèque dispositis. — Ad rupes maritimas Calvadosii rarum (cl. Chauvin). — Chauv. alg. norm. n. 52. *Gloconema apiculatum* Grev. crypt. flora t. 30. — Granula sèpè imbricatim disponuntur. Priori triplò minus. (v. s. D.)
3. *S. RAMOSISSIMUM* (Ag. l. c.) cespitosum vage irregulariterque ramosum, filamentis tenuissimis ad apicem longissimis attenuatis, granulis parallelogrammis seriatim longitudinaliter parallelèque dispositis. — Ad rupes maritimas Calvadosii (cl. Chauvin), rarissimum. (v. s. D.)
4. *S. COAXIMBOSUM* (Ag. l. c.) cespitosum vix ramosum, filamentis tenuissimis ad apicem flabellato-penicillatis, granulis parallelogrammis extremitatibus obtusis inordinatis? — Ad littora Calvadosii (cl. Chauvin), Armoraciæ ex cl. Bonnemaison, rarum. (v. s. D.)
5. *S. QUADRIPUNCTATUM* (Agardh syst. 10.) dense cespitosum ramosum subdichotomum, filamentis intricatis tenuissimis longissime attenuatis elongatis, granulis cylindraceo-ovatis sparsis demum punctis quatuor luteis stellatim dispositis notatis. — Ad Algas majores in littoribus Calvadosii (cl. Chauvin et Lenorm.). — *Bangia 4-punctata* Lyngb. t. 26. excl. syn. *Monema quadrupunctatum* Grev. crypt. fl. t. 286. (v. s. D.)
6. *S. RUTILANS* (Ag. l. c.) cespitosum elongatum sordidè luteum exsiccatum lutescens rutilans, filamentis simplicibus interdum bifurcatis tenuissimis, granulis cylindraceo-oblongis extremitatibus obtusis parallelis confertis. — Ad Algas majores in littoribus Neustriæ. — *Bangia rutilans* Lyngb. t. 26. *Conferva rutilans* Roth. (v. s. D.)

Trib. XII. LYNGBYEÆ.

Filamenta fusco-nigra æruginosa aut intensè viridia, basi affixa libera tenuissima cylindrica continua intùs tenuissimè et densè lineolata. — Maris et aquæ dulcis incolæ rariùs terrestres.

LXIII. *SCYTONEMA* Bory dict. class. 4. p. 393. — *Scytonematis* sp. Lyngb. Agardh.

Filamenta brevia tenuissima flexuosa continua coriacea cylindrica ramosa, intùs striis transversalibus parallelis densissimis annulatis articulatum mentientibus notata.

1. *S. MYOCHROUS* (Ag. disp. 38.) filamentis in cespitem nigro-fuscum densissimè intricatis, intùs nunc moniliformibus nunc transversaliter annulatis, ramulis geminis simplicibus secundis. — In turfosis et rivulis saxis lignis plantis inundatis adnascens. — Lyngb. t. 27. fl. dan. t. 1602. f. 2. *S. ocellatum* Lyngb. t. 28. Moug. et Nestl. n. 691. *Conferva myochrous* Dillw. t. 19. eng. bot. 1555. *C. seriata* Wahl. lapp. t. 30. f. 2. *C. ocellata* Dillw. t. 81. eng. bot. t. 2530. (v. s.)
2. *S. COMOIDES* (Ag. syn. 112.) filamentis in cespitem nigro-ferrugineum intricatis flexuosis, annulis distantibus aureo-fuscis moniliformibus, ramis solitariis remotiusculis adscendentibus apice attenuatis. — Ad littora borealia Gallæ ex cl. Lenormand. — Lyngb. p. 97. *Gaillonella comoides* Bory dict. cl. 11. p. 473. *Conferva comoides* Dillw. t. 27. eng. bot. t. 1700 non *Gaill.* ex Ag. et Bory.

LXIV. CALOTHRYX Agardh syst. alg. xxiv et 70. — Oscillatoriæ sp. Lyngb.

Filamenta tenuissima brevissima affixa muco communi non involuta rigidiuscula stricta non oscillantia, tubo continuo intus tenuissime lineolato, lineolis sèpè inconspicuis. — Parasitica.

1. C. RULVINATA (Ag. l. c.) filamentis erectis abbreviatis dichotomis, linea virescenti longitudinaliter percursis, in cespitem densum obscurè viridem fasciculatis. — Ad rupes marias circa Cherbourg ex cl. Lenormand.
2. C. TINCTORIA (Ag. l. c.) filamentis mucosis abbreviatis erectis ramosis in cespitem densum intense viridem exsiccatione violaceum fasciculatis. — In aquis Vogesorum et prov. borealium, herbas investiens. — Conf. tinctoria Pers. Leptomitus investiens Bory in Moug. et Nestl. vog. n. 899. (v. s.)
3. C. DISTORTA (Ag. l. c.) filamentis mucosis sublongioribus rigidiusculis erectis ramosis cæruleo-virescentibus exsiccatione fuscescens in cespitem densum fasciculatis. — In rivulis circa Falaise (cl. de Brébisson). — Oscillatoria distorta Ag. Lyngb. Conferva distorta fl. dan. t. 820. Dillw. t. 22. eng. bot. t. 2577. (v. s.)
4. C. LANATA (Ag. l. c.) filamenta minus mucosis elongatis erectis flexuosis virescentibus in cespitem densum atro-viridem fasciculatis. — Ad rupes rivulorum circa Falaise (cl. de Bréb.). (v. s.)
5. C. FONTINALIS (Ag. l. c.) filamentis erectis brevibus ramosis hyalino-cæruleis in cespitem cinereo-viridem exsiccatione æruginosum aggregatis. — Ad lapides et herbas rivulorum circa Vire (cl. Lenormand). — Oscillatoria fontinalis Ag. non Lyngb. (v. s.)

LXV. LYNGBYA Ag. syst. xxv et 73. — Oscillatoriæ sp. Auct.

Filamenta tenuissima elongata libera muco communi non involuta flexilia curvata non oscillantia, tubo continuo intus tenuissime lineolato.

1. L. VARIABILIS (Ag. l. c.) filamentis elongatis flaccidis in cespitem ab æruginoso ad roseum vergentem implicatis. — Circà Parisios ex Ag. Vire ex cl. Lenormand. — Oscillatoria variabilis et O. majuscula Desvaux. — Potius Oscillatoriæ sp. videtur.
2. L. CRISPA (Ag. l. c.) filamentis æruginosis crispis rigidiusculis in cespitem obscurè viridem implicatis. — In Oceano Nenstriæ ex cl. Lenormand. — Oscillatoria crispa Ag. O. majuscula Dillw. t. A. Conferva stuposa Roth.
3. L. MURALIS (Ag. l. c.) filamentis viridibus rigidiusculis curvato-flexuosis crassiæculis in stratum viride implicatis, lineolis densis. — Ad terram muros et ligna in locis umbrosis. — Desmaz. cr. exs. n. 105. Chauvin alg. norm. n. 30. Oscillatoria muralis Ag. Lyngb. Moug. et Nestl. n. 597. Conf. muralis Dillw. t. 7. eng. bot. t. 1554. (v. v.)

APPENDIX.

I. GENERA INTER PLANTAS ET ANIMALIA AMBIENTIA.

Trib. XIII? DIATOMÆ Agardh syst. alg. xij.

Filamenta hyalina vel leviter colorata nunc cylindrica nunc compressa, tenuissima et minutissima, in frustula formâ varia tandem secedentia.

988 ACOTYL. seu CELLULARES.

LXVI. MYCODERMA Pers. myc. eur. 1. p. 96. Desmaz. cat. pl. om. p. 12. et obs. bot. et zool. p. 26. Bory dict. class. 11. p. 348. — Hygrocrocis Ag. syst. xxiiij et 45.

Filamenta hyalina arachnoidea tenuissima creberrima ramosa moniliformia aut obsoletè articulata, in gelatinam informem vel membranam coloratam intertexta fluitantia. — In solutionibus vegetorum. — Filamentorum articulos ut Zoocarpa demum secedentia et libera habet cl. Bory, hæc autem filamenta ut efformata adjunctione animalium monadinorum simplicissimorum præditorum locomobilitate plus minus manifesta et inter se ab uno extremo ad alterius extremum ordine longo, sive in statu primordiali, sive post elongationem plus minus notabilem, cohærentium habent cl. Desmazières et Gaillon. Adhuc sub judice lis est.

1. M. CERVISIÆ (Desmaz. cat. pl. om. 13; crypt. exs. n. 101; obs. bot. 43. t. 8. f. 1-4.) filamentis simplicibus ramosisve subflexuosis moniliformibus vel articulis inæqualibus articulatis in pelliculam leviter rugatam leuco-falvam intertextis. — Ad superficiem cervisiæ aëri expositæ. — Articuli secedentes (animalcula Desm.) ovoidea inter se ferè æqualia (v. v.)
2. M. MALTI-CERVISIÆ (Desmaz. obs. 45.) filamentis simplicibus ramosisve subflexuosis moniliformibus vel articulis inæqualibus articulatis in pelliculam fulvam vix rugatam intertextis. — Ad superficiem aquæ in malto Cervisiæ subsidente. — Articuli secedentes subsphærici crassitudine inæquales.
3. M. MALTI-JUNIPERINI (Desmaz. crypt. exs. n. 102; obs. t. 8. f. 5-9.) filamentis simplicibus ramosisve subflexuosis non moniliformibus in pelliculam albam rugatam intertextis. — Super maltum aquæ-vitæ juniperinæ. — Articuli secedentes in formâ parallelogrammi angulis rectis apice rotundatis.
4. M. GLUTINI-FARINULÆ (Desmaz. obs. 48. t. 8. f. 10.) filamentis subsimplicibus imbricato-moniliformibus vix in pelliculam intertextis. — Super glutinum farinulæ. — Articuli secedentes erasissimi ovoidei complanati.
5. M. VINI (Vallot bibl. phys. econ. aug. 1822.) filamentis ramosis flexuosis moniliformibus vel articulis inæqualibus articulatis in pelliculam sive acervum carnosum subalbidum vel rubescens intertextis. — Ad superficiem Vini vel ad rimas doliorum. — Desmaz. crypt. exs. n. 103; obs. t. 8. f. 11-13. M. mesentericum et M. Lagenæ Pers. Hygrocrocis Vini Agardh. — Articuli secedentes ovoidei inæquales minores et magis gelatinosi quam in M. Cervisiæ. (v. v.)
6. M. DESMAZIERI (Dub. mss.) filamentis flexuosis tenuissimis ramosis, ramis alternis ad apicem valde attenuatis, obsoletè articulis diametro 2-3plò longioribus, in pelliculam purpureo-fuscam intertextis. — In fando tinturæ Coccinillæ acido sulsarico mixta obs. cl. Desmazières. — Hygrocrocis Desmazieri Ag. mss. (v. s.)
7. M. TYPHLODERMA, filamentis subramosis in pelliculam olivaceam densissime implexis, articulis diametro subæqualibus. — In solutione Gamni Arabicæ. — Hygrocrocis typhloderma Ag. Conserva typhloderma Dillw. t. 83.
8. M. ATRAMENTI, filamentis dichotomo-ramosis minutissimis decumbentibus in stratum albidum densissime intertextis, articulis diametro sesquilongoribus. — Super atramentum. — Hygrocrocis Atramenti Ag. Conserva Atramenti Lyngb. t. 57. (v. v.)

LXVII. LEPTOMITUS Agardh syst. xxiiij et 49.

Filamenta hyalina vel levi tinturâ colorata arachnoidea minutissima obsoletè articulata libera erecta affixa non intertexta.

1. L. LACTeus (Ag. c. l.) filamentis ad quodque geniculum ramosis in massam

informem gelatinosam consertis hyalinis sordidè lacteis, articulis longissimis.
— In stagnis et rivulis Neustriæ (cl. Lenormand). — Conf. lactea Roth.
Dillw. t. 79. (v. s.)

2. L. CERATOPHYLLI (Ag. l. c.) filamentis simplicibus erectis adnatis canis fragilibus, articulis diametro sesquilongoribus, interstitiis hyalinis. — In stagnis ad Ceratophyllum observavit cl. Bory ex Agardh.
3. L. BREVIA (Ag. l. c.) filamentis simplicibus adnatis erectis minutissimis strictis subhyalinis leviter viridi-tinctis, articulis diametro 4plò longioribus. — Ad plantas aquáticas in aquis dulcib[us] Galliæ obs. cl. Desvaux ex Agardh.
— Conferva brevis Desv.

LXVIII. GAILLONELLA Bory dict. class. t. 4. p. 393 et 7. p. 101. — Meloseira Agardh syst. 8. — Fragillaria sp. Lyngb.

Filamenta brevissima rigida articulata fragillima cylindrica simplicia, articulis globulum ovatum vel subcylindricum coloratum pellucidum lineolâ tenuissimâ transversali notatum includentibus, sic moniliformibus demùm evacuatis hyalinis.

1. G. NUMMULOIDES, cespite flavescenti siccо cinereo, filamentis inæqualibus, articulis diametro subæqualibus globulos fusco-aureos moniliformes ellipticos globososve includentibus. — Ad plantas aquáticas in submarinis Neustriæ (cl. Lenormand). — Fragillaria nummuloides Lyngb. t. 63. excl. syn. Dillw. Meloseira nummuloides Ag. (v. s. D.)

LXIX. FRAGILLARIA Lyngb. tent. p. 182. Ag. syst. p. 7. — Nematopla Bory dict. class. 1. p. 593 et 11. p. 499.

Filamenta simplicia compressa transversim densissimè striata ad strias fragillima et in frustula angulis non cohærentia sed omnino solutè secedentia.

1. F. HYMALIS (Lyngb. p. 185. t. 63. excl. syn. Roth.) filamentis fragillimis compressis sensim attenuatis, articulis diametro subbrevioribus aureis hic illic solutis. — In fossis et rivulis provinc. boreali-occidentalium. (v. s.)
2. F. STRIATULA (Lyngb. t. 63.) filamentis compressis fragillimis flavescentibus, densissimè striatis, articulis (id est striarum intervallis) diametro 6-8 plò brevioribus rariis solutis. — Ad plantas aquáticas in fossis circa Caen (cl. Chanvin), Nematopla caudata Bory. (v. v.)
3. F. PECTINALIS (Lyngb. t. 63.) filamentis compressis rigidis strictis fragillimis crassioribus attenuatis dense striatis, articulis diametro triplo brevioribus mediò pellucidis hic illic solutis. — Ad plantas aquáticas in fossis. — Conferva pectinalis Mull. act. petr. 3. t. 1. f. 4-7. Dillw. t. 24. eng. bot. t. 1611. Conferva branchialis Roth. Diatomæ pectinalis fl. dan. t. 1598. f. 1. Nematopla argentea et capucina Bory arthr. f. 3. N. bronchialis Bory dict. class. 11. p. 499. (v. v.)

LXX. ACHNANTHES Bory dict. class. 1. p. 79 et 593. Agardh syst. 1. — Echinella sp. Lyngb.

Filamenta subquadrata plana articulata simplicia, articulis linearibus incurvis 1-6 cohærentibus non secedentibus angulis obtusis composita, ab altero angulo tenuissimè stipitata. — Parasitica.

1. A. BREVIPES (Ag. syst. 1.) articulis bipunctatis, stipite brevissimo. — Ad littora Oceani. — Grev. crypt. fl. t. 295. A. adnata Bory dict. cl. l. c. arthr. f. 2. A. bacillarioides et A. dubia Bory l. c.? Echinella stipitata Lyngb. t. 70. (v. v. D.)
2. A. LONGIPES (Ag. syst. 1.) articulis unipunctatis, stipite elongato. — Ad

990 ACOTYL. SEU CELLULARES.

littora Oceani. — Chauv. alg. norm. n. 26. Conf. stipitata eng. bot. t. 2488.
C. armillaris Müll. nov. act. holm. 1783. t. 3. f. 6. 7. (v. v. D.)

LXXI. DIATOMA DC. fl. fr. 2. p. 48. Lyngb. tent. p. 177. Bory dict. class. 5. p. 461. — Diatomatis sp. Ag.

Filamenta articulata simplicia compressa demum longitudinaliter soluta, articulis angulis alternatim cohaerentibus. — Parasitica.

* Aquæ dulcis.

1. D. TENUIS (Ag. Dec. n. 10. syst. 4.) filamentis compressis minutissimis rigidis, articulis angulis alternatim cohaerentibus diametro 3plò brevioribus hyalinis non striatis. — In aquis quietis. — Ag. sv. bot. 491. f. 4 et 5. Lyngb. t. 61. Chauvin alg. norm. n. 51. D. vulgare Bory arthr. f. 1. a. b. (v. v.)
2. D. FLOCCULOSUM (Ag. disp. 35. non DC.) filamentis compressis minutissimis flexuosis, articulis diametro subæqualibus striatis, striis plurimis (5-10) parallelis longitudine æqualibus medium non attingentibus et sic sèpè duplice lineam verticalem simulantibus. — In fluvii, stagnis et aquis quietis. — Lyngb. t. 61. Moug. et Nestl. 508. Conf. flocculosa Roth. cat. t. 4. f. 4 et t. 5. f. 6. Dillw. t. 28. eng. bot. t. 1761. (v. v.)

* * Marinæ.

3. D. ARCUATUM (Fl. dan. t. 1598. f. 2.) filamentis compressis minutis rigidis arcuatis, articulis diametro æqualibus aut sesquilongoribus striis numerosis parallelis totum diametrum occupantibus densissimis notatis. — Ad littora provinciarum borealium. — Lyngb. t. 62. D. rigidum DC. fl. fr. 2. p. 49. D. striatum Ag. syst. 6. Chauvin alg. norm. n. 76. (v. v.)
4. D. MARINUM (Lyngb. p. 180. t. 62.) filamentis compressis minutissimis flexuosis, articulis diametro 1-2plò brevioribus, striis 2 rarius 1-parallelis medium non attingentibus notatis. — In Oceano et mari Mediterraneo frequens. — D. flocculosum DC. fl. fr. 2. p. 49. excl. syn. D. Danica Bory. (v. v.)
 - f. effiguratum*, filamentis crassioribus, articulis diametro 3-4plò brevioribus granulis varie effiguratis sèpius in ferrum equinum duplex medio oppositum et lineola compunctum dispositis notatis. — In Oceano et mari Mediterraneo. (v. v. D.)
5. D. UNIPUNCTATUM (Ag. syst. 6.) filamentis compressis minutissimis fragilis, articulis diametrum subæquantibus medio puncto rosaceo magno ut plurimum pellucido notatis. — Ad littora Calvadosii (cl. Lenormand). — Fragillaria unipunctata Lyngb. t. 62. Achnanthes unipunctata Grev. crypt. fl. t. 287. (v. s. D.)
6. D. OBLIQUATUM (Lyngb. t. 62.) filamentis compressis minutissimis flexuosis, articulis diametro æqualibus vel dimidio brevioribus trapezoideis medio fascia pellucidâ verticali et plerùmque puncto rosaceo notatis, angulis acutisculis cohaerentibus. — In Ptilotâ plumosâ circâ Granville et Cherbourg ex cl. Lenormand. — Conf. obliquata eng. bot. t. 1889.

LXXII. ECHINELLA non Agardh nec Bory. — Echinella sp. Lyngb. — Diatomatis sp. Ag.

Filamenta brevissima simplicia inarticulata rigida stricta linearia subæqualia utrinque truncata aggregata aut rarius solitaria basi communi fasciculatim aut radiatim inserta. — Parasitica.

1. E. FASCICULATA (Lyngb. p. 210. t. 70.) filamentis fastigiatis subæqualibus inordatim fasciculatis. — In Oceano et mari Mediterraneo valdè frequens. — Grev. crypt. fl. t. 16. Diatomafasciculatum et D. crystallinum Ag. syst. 3. sv. bot. t. 491. f. 6. 7. (v. v.)
2. E. CHAUVINII (Dub. mss.) filamentis æqualibus radiatim et circulariter con-

gestis. — In aquis dulcibus circa Vire Batrachospermo Dillenii incidentem reperiit cl. Chauvin. — Valde elegans. (v. s. D.)

II. GENERA EVIDENTIUS ANIMALIA.

Trib. XIV ?? *BACILLARIEÆ* Bory dict. class. 2. p. 127.

Corpuscula pellucida utrinque attenuata elongato-cuneata aut cuneiformia solitaria aut aggregata, inserta demum libera.

LXXIII. FRUSTULIA Ag. syst. xij et 1. — Bacillariearum sect. prima Bory dict. class. 2. p. 128.

Corpuscula pellucida rigida cylindrica aut compressa elongato-cuneata aut utrinque attenuata, solitaria aut aggregata inserta demum libera. — Genus in elementis heterogeneis conflatum hic ut observationi rursus subjicietur insertum, in futurum delendum.

1. F. CIRCULARIS, corpusculis strictis longitudine æqualibus cuneatis compactis in circulo plano dispositis flabellatisve. — In fossis et rivulis agri Mimatensis (cl. Prost.) et probabiliter Galliae totius. — *Echinella circularis* Grev. crypt. fl. t. 35. E. ventilatoria Bory dict. cl. 6. p. 32? (v. s.)
2. F. OBTUSA (Ag. syst. 1.) corpusculis solitariis aut 1-3 aggregatis rectangularis elongatis utrinque obtuse truncatis. — In rivulis et fossis. — *Echinella obtusa* Lyngb. t. 67. (v. s.)
3. F. ACUTA (Ag. syst. 2.) corpusculis linearibus elongatis solitariis hyalinis utrinque acutis. — In aquis quietis. — F. minor Ag. l. c. *Echinella acuta* Lyngb. t. 69. *Lunulina diaphana* Bory dict. cl. 9. p. 542. (v. v.)
4. F. OLIVACEA, corpusculis solitariis cylindraceo-cuneatis obtuse truncatis. — In fossis et rivulis. — *Echinella olivacea* Lyngb. t. 70. *Meridion vernale* Ag. syst. 2. *Lunulina olivacea* Bory l. c.
5. F. CUNEATA (Agardh l. c.) corpusculis cuneatis sessilibus aggregatis, in extremitate latiori 3-4-dentatis. — In Oceano. — *Echinella cuneata* Lyngb. t. 70. Bory dict. class.

LXXIV. STYLLARIA Bory in dict. class. 2. p. 129. — *Gomphonema* Agardh. syst. 11.

Corpuscula cuneiformia aut cuneato-urceolata stipiti translucido simplici inarticulato aut ramoso inserta. — Parasitica.

1. S. LENORMANDI (Dub. mss.) corpusculis minutissimis cuneatis in parte superiori 2-dentatis solitariis aut 2-3 aggregatis, stipiti longitudine variò insertis. — In aquis dulcibus circa Vire (cl. Lenormand). (v. s. D.)
2. S. GEMINATA (Bory l. c.) corpusculis minutis cuneato-urceolatis obtusis geminatis solitariisve stipiti longò incidentibus. — Ad littora Oceani et maris Mediterranei. — *Gomphonema geminatum* Ag. l. c. Grev. crypt. fl. t. 244. f. 2. (v. v. D.)
3. S. PARADOXA (Bory l. c.) corpusculis minutis cuneiformibus truncatis stipitis longis ramosissimis densè intricatis incidentibus. — In Oceano. — *Echinella paradoxa* Lyngb. t. 70. Grev. crypt. fl. t. 25. *Gomphonema paradoxum* Ag. (v. v. D.)

Trib. XV ?? *OSCILLARIEÆ* Bory dict. class. 1. p. 593 et 12. p. 480.

Filamenta simplicia cylindrica tubis duobus striis parallelis transversis densis lineolatis, interno materiâ coloratâ farcto ex-

992 ACOTYL. seu CELLULARES.

terno vaginato, composita rigida elastica oscillantia aut reptantia, muco communi involuta et in stratum sœpè densissimum demum intertextæ.

LXXV. ANABAINA Bory dict. cl. l. c.

Filamenta libera, tubo externo hyalino, interno moniliformi, interstitiis ovalibus diametro æqualibus, nonnullis hic illuc crassioribus, reptantia.

* Aquæ dulcis.

1. A. OSCILLARIOIDES (Bory dict. class. 1. p. 308. arthr. fig. 7. a-c.) filamentis crassiusculis, interstitiis depresso-ovalibus, in stratum atro-viride filamentosum elongatum apice subexpansum densissime intertextis. — In filamentis Confervarum aut plantarum aquaticarum foliis, in aquis puris substagnantibus. — Oscillatoria flexuosa Ag. ic. alg. t. 10. f. 3. syst. p. 66. (v. v.)
2. A. MEMBRANINA (Bory l. c. arthr. fig. 7. d.) filamentis tenuissimis, interstutiis subsphæricis in stratum cæruleo-viride membranaceum papyraceum expansum intertextis. — Ad Conservas in fossis et aquis stagnantibus. — Moug. et Nestl. vog. n. 896. Nostoch flos aquæ Lyngb. t. 68. excl. syn? (v. v.)
3. A. THERMALIS (Bory l. c.) filamentis tenuissimis amœne viridibus, interstitiis vix conspicuis, in stratum latissimum gelatinosum primò lœve dilatè æruginosum deponit flavescentia sinuosum anfractuosum cavum et bullosum intricatis. — In aquis thermalibus circa Dax. — Fucus thermalis Secondat in phil. trans. 1744. Tremella thermalis Thore. Oscillatoria labyrinthiformis Ag. (v. v.)
4. A. MONTICULOSA (Bory dict. class. 12. p. 482) filamentis tenuissimis in stratum latissimum mucosum lamellis superpositis densis parallelis membranaceis compositum anfractuosum cavum et bullosum ad superficiem viridi-æruginosum intus flavescentia pellucidum. — In thermis Néris detexit cl. Gay ex cel. Bory. — Au satis a præcedenti distincta?
5. A. IMPALPABILIS (Bory dict. 1. p. 309.) filamentis tenuissimis, interstutiis vix conspicuis ovato-depresso in stratum tenue æruginosum aut atro-viride expansum intricatis. — In paludibus et aquis stagnantibus fluitans aut plantas investiens.

** Terrestres.

6. A. LICHENIFORMIS (Bory l. c.) filamentis crassiusculis brevioribus viridilutescentibus in stratum viscoso-mucosum tenuissimum atro-viride lucidum rotundatum intricatis. — Ad terram nudam et humidam in umbrosis facile cum Nostoch deliquescente confundenda. — Desmaz. crypt. exs. n. 54. (v. v.)

LXXVI. MICROCOLEUS Desmaz. cat. pl. om. p. 7. Bory dict. class. 10. p. 524.
— Vaginaria Bory dict. cl. 1. p. 594. non Pers.

Filamenta tenuissima tenuissimè lineolata muco communi non involuta apice libera basi in vaginâ membranacea ex quâ reptanter oscillanterque exerunt fasciculata, demum dilatata et in vaginas mutata.

1. M. TERRESTRIS (Desmaz. l. c. et crypt. exs. n. 55.) fasciculis capillaribus nigris flexuosis demum implexum lucidum intertextis. — Ad terram in humidis. — Vaginaria terrestris Bory arthr. f. 6. Oscillatoria vaginata Vauch. conf. t. 15. f. 13. Oscillatoria autumnalis & vaginata Ag. Chauvin alg. norm. n. 29. Rhizomorpha muralis DC. fl. fr. 5. p. 116. (v. v.)

LXXVII. OSCILLARIA Bosc. Bory dict. class. t. 1. p. 594. et 12. p. 457. — Oscillaria Vauch.

Filamenta muco communi obvoluta, tubo externo hyalino plus minus conspicuo, interno tenuissimo lineolato interstitiis quadrangulis, interno plus minus elongato et illicis extremitatem sæpè vacuam relinquentia, oscillantia.

1. *O. PARLETINA* (Vauch. conf. t. 15. f. 8.) filamentis atro-viridibus rigidis rectis oscillantibus in stratum atrum nitidum centro densissimum mucosum intertextis. — In paludibus, ad muros humidos, plateas urbium, etc., frequens. — *O. Adansonii* Bory l. c. *O. autumnalis* Lyngb. Ag. excl. var. 2 et plur. syn. (v. v.)
2. *O. FUSCA* (Vauch. conf. t. 15. f. 9.) filamentis tennissimis elongatis griseo-nigrescentibus siccis atro-cæruleis ad apicem attenuatis oscillantibus in stratum atro-cæruleum centro densissimum nigrum lucidum intertextis. — In terrâ umbrosâ, muris humidis, etc., frequens. — *O. urbica* Bory l. c. arthr. f. 5. a-c. Mong. et Nestl. vog. n. 897, *O. autumnalis* Chauvin alg. norm. n. 3. non Ag. (v. v.)
3. *O. ANGUINA* (Bory l. c.) filamentis tennissimis atro-viridibus atro-cæruleisve densissimè lineolatis ad apicem obtusis mox rectis mox incurvis oscillantibus aut sinuosè et spiraliter reptantibus in stratum deusin mucosum nigrum nitidum intertextis. — Ad lapides, paleos, trabes, in rivulis ex cl. Bory.
4. *O. NIGRESCENS* (Bory in Moug. et Nestl. vog. n. 792.) filamentis tenuibus intensè cæruleis nitidis tennissimè lineolatis apice obtusis flexuoso-crispis, oscillantibus in stratum centro densum atro-cæruleum nitidum intertextis. — Ad plantas et conservas inundatas in aquis paris et rivois lentè fluentibus. — *O. nigra* Vauch. conf. t. 15. f. 4. non Lyngb. nec Ag. (v. v.)
5. *O. PRINCIPIS* (Vauch. conf. t. 15. f. 1. 2.) filamentis capillaceis elongatis cæruleo-viridibus mucosis fugacibus tennissimè lineolatis apice rotundis, oscillantibus, primò in fundo repentibus demùm in stratum gelatinosum atro-virens fluitans longè radians intertextis. — In aquis puris subquietis. — Ag. syst. 67. Chauv. alb. norm. n. 81. *O. tænioides* Bory dict. cl. arthr. f. 5. d. f. — Dill. musc. t. 2. f. 4. (v. v.)
6. *O. MAJOR* (Vauch. conf. t. 15. f. 3.) filamentis tennissimis elongatis cæruleo-viridibus flexuosis tennissimè lineolatis apice incurvis oscillantibus primò in fundo repentibus demùm in stratum undulatum viridi-æruginosum aut atro-cæruleum fluitans longissimè radians intertextis. — In aquis calidis propè Dax. — Ag. syst. 67. *O. Grateloupii* Bory arthr. f. 5. g. (v. v.)
7. *O. GYROSA* (Bory atl. dict. Lev. veg. elem. f. 3. et in dict. class. t. 12. p. 470.) filamentis tennissimis elongatis in fasciculos crisplos congestis subdiaphanis, lineolis densissimis vix conspicuis centro in stratum compactum atro-cæruleum exsiccatione nitidissimum intertextis. — In aquis frigidis stagnantibus. (v. s.)
8. *O. LIMOSA* (fl. dan. t. 1549. f. 2.) filamentis obscurè æruginosis tenuibus elongatis obtusis viride oscillantibus, lineolis minus deusis, in stratum gelatinosum longè radians amænissimè cæruleo-viride implexis. — In fossis et stagnis frequens. — Ag. syst. 66. *O. Adansonii* Vauch. conf. t. 15. f. 6. — Dill. musc. t. 2. f. 5. (v. v.)
9. *O. VIRIDIS* (Vauch. conf. t. 15. f. 7.) filamentis viridescentibus tennissimis subpellucidis viride oscillantibus attenuatis, lineolis subinconspicuis, interstitiis diametro subæqualibus, in stratum mucosum smaragdinum breviter radians intertextis. — Ad linum in aquis quietis. — Moug. et Nestl. vog. n. 898. *O. tenuis* Ag. Lyngb. *O. smaragdina* Bory. (v. v.)
10. *O. MOUGBOTII* (Bory dict. class. 12. p. 473. non Ag.) filamentis præ aliis tenuissimis dilutè viridibus rectis apice uncinatis, lineolis tennissimis, interstitiis diametro subæqualibus, in pelliculam tennissimam cæruleo-viridem

994 ACOTYL. SEU CELLULARES. OSCILLARIA.

arachnoideam demum centro macula sanguinea margine violaceo-cerulea notatam intertextis. — In aquis calidis. — O. major Moug. et Nestl. vog. n. 596. non Vauch. O. tenuis & calida Ag. (v. s.)

11. O. MEMBRANACEA (Bory l. c.) filamentis diaphanis elongatis amænè viridibus, lineolis densis, in pelliculam densam tremelloideam breviter radiantem intense aut dilutè viridem intertextis. — Ad trunco, radices caules inondatos in rivulis et aquis puris.

12. O. ÆRUGINOSA (Ag. syn. 109.) filamentis capillaribus fusco-viridibus aut latè viridibus intricatis apice obtusis, lineolis densissimis, in stratum expansum fuscum æruginosumve densissime intertextis. — Secùs littora provincie borealium, occidentalem rarius. — O. æstuarii Lyngb. tent. t. 26. f. E. Lyngbya ferruginea et L. æruginosa Ag. syst. (v. s.)

13. O. SCORIGERA (Ag. syst. 65.) filamentis præ aliis tenuissimis latè viridibus rectis elongatis in stratum mucosum atro-viride vel fascescens in penicillos longos radians implicatis. — In rivulis præsertim agri syrtici ex cl. Bory. — O. fallax Bory l. c. Thorea viridis Bory in ann. mus. 13. t. 18. f. 3. pro parte.

14. O. MERETRIX (Bory dict. cl. I. c.) filamentis præ aliis tenuissimis æruginoso-fuscis implicatis obtusis, lineolarum interstitiis diametro subæqualibus, in stratum densum compactum subspongiosum nigro et atro-viridi variegatum non radians intertextis. — In rivulis rapidis. (v. s.)

15. O. PAPYRINA (Bory l. c.) filamentis brevibus obtusis implicatis curvatim oscillantibus, lineolarum interstitiis diametro subæqualibus, in membranam tennem papyraceam nitido-viridem implicatis. — Ad ligna, trabes, etc., in rivulis rapidis ex cl. Bory.

16. O. SUBFUSCA (Vauch. conf. t. 15. f. 5.) filamentis crassiusculis fuscis implicatis lineolatis apice attenuatis, oscillantibus et spiraliter reptantibus, in stratum membranaceum densum breviter radians intertextis. — Ad lapides et trabes in rivulis et flaviis. — O. tela Bory l. c. (v. v.)

17. O. RUPESTRIS (Ag. syst. 63.) filamentis tenuissimis flexuosis atro-virescenti-hyalinis in stratum nigrum nitens velutino-mucosum sèpè valde expansum subtus vidente brevissime radians densissime intertextis. — Ad lapides et limum in rivulis. — O. subfusca alra Lyngb. (v. v.)

18. O. CORIUM (Ag. disp. 36, syst. 64.) filamentis tenuissimis implicatis lutescentibus hyalinisve, lineolis tenuissimis interstitiis diametro subæqualibus, curvatim et lentè oscillantibus, in stratum densum compactum subcoriacum fusco-viride intus fuscum expansum vix radians intertextis. — Ad saxa rivulorum Vogesorum ex cl. Maugeot. — Bory dict. cl. 12. p. 476.

19. O. PANNOSA (Bory dict. class. 12. p. 478.) filamentis crassiusculis fuscis rigidis densissime lineolatis in stratum densum valde compactum pannosum subrotundum viridi-æruginosum demum atro-olivaceum densissime intertextis. — Ad lapides in fontibus puris. — O. levigata Vauch. t. 14. f. 10? (v. s.)

20. O. VIBRIONIDES (Bory l. c.) filamentis dense implexis præ aliis valde tenuissimis diaphanis viride sinuatim curvatimve oscillantibus lineolarum vix conspicuarum interstitiis diametro subæqualibus, in nabeculam aut lanuginem griseam pellucidam brevissimam densissime intertextis. — Ad Oscillarias maiores in aquis calidis. — O. alba Vauch. conf. t. 15. f. 11? O. tenuissima Vauch. conf. t. 15. f. 12? non Ag.

21. O. PHARAONIS (Bory l. c.) filamentis tenuissimis elongatis flexuosis amænè viridibus demum lilacinis aquam purpureo et violaceo tingentibus in penicilos elongatos flexuosos intertextis. — Ad plantas aquáticas et lapides Neustriae (cl. Chauvin et Lenormand). (v. s.)

APPENDIX

SIVE

ENUMERATIO SPECIERUM CONSULTO OMISSARUM.

§. I. *Ob limitum mutationes.*

ARABIS ALLIONII DC. fl. fr. 4. p. 676. \mathcal{U} in Pedemontio tantum reperta.

ARABIS HALLERI Linn. sp. 929. DC. fl. fr. 4. p. 679. — Scop. carn. t. 39. ② in Pedemontio et agro Moguntino nec adhucdum in Galliâ reperta.

CARDAMINE GRANULOSA All. auct. p. 16. DC. fl. fr. 4. p. 682. \mathcal{U} in pratis collum Taurinensium.

ALYSSUM ARGENTEUM Willd. sp. 3. p. 461. DC. fl. fr. 4. p. 693. — All. ped. t. 54. f. 3. 3 in Pedemontio.

ALYSSUM HALIMIFOLIUM Willd. sp. 3. p. 460. DC. fl. fr. 4. p. 692. — All. ped. t. 54. f. 1. 3 in Pedemontio saxosis propè *Tende* et forsitan in Galloprovinciæ montibus reperiendum. — *A. halimifolium* Lapeyr. est *A. macrocarpum*.

PELTARIA ALLIACEA Linn. sp. 910. DC. fl. fr. 4. p. 691. \mathcal{U} in Pedemontio circa Fenestrelles ex All. nec in Galliâ.

ERYSIMUM LONGISILIQUOSUM Willd. enum. 680. E. virgatum & DC. ic. rar. t. 36; fl. fr. 4. p. 660. ② in Helvetiâ Galliæ conterminâ.

ERYSIMUM REPANDUM Linn. sp. 923. DC. fl. fr. 4. p. 660. ① in Pedemontio et Hispaniâ; in Galliâ non satis certum.

ERYSIMUM HELVETICUM DC. fl. fr. 4. p. 658. All. ped. t. 58. f. 2. ② in Helvetiâ et Pedemontio.

ISATIS ALPINA All. ped. t. 86. f. 2. DC. fl. fr. 4. p. 723 non Vill. Thunill. \mathcal{U} ? in monte Vesulo ad limites vallis Delphinensis Queyras et forsitan in Galliâ reperienda.

HELIANTHEMUM LUNULATUM DC. fl. fr. 4. p. 816. — All. auct. t. 2. f. 3. 3 in montibus Pedemontii.

VIOLA VALDERIA All. ped. t. 24. f. 3. DC. fl. fr. 4. p. 805. V. Cenisia Ging. in DC. prod. 1. p. 302. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis.

VIOLA LUTEA DC. fl. fr. 5. p. 619 non 4. p. 809. V. Sudetica & Ging. in DC. prod. 1. p. 303. \mathcal{U} in pascuis calaminaliis propè aquas Grani.

DIANTHUS FURCATUS Balb. act. taur. 7. p. 12. t. 2. DC. fl. fr. 4. p. 743. \mathcal{U} in Pedemontii montibus circa *Tende* et inde in Alpibus Sedenensibus forsitan reperiendus.

DIANTHUS TANER Balb. act. taur. 7. p. 13. t. 3. Ser. in DC. prod. 1. p. 362. \mathcal{U} ad margines agrorum Tendæ.

SILENE CAMPANULA Pers. enc. 1. p. 500. DC. fl. fr. 4. p. 748. — All. auct. t. 1. f. 3. \mathcal{U} in rupestribus umbrosis Alpium Pedemontii.

SILENE VIRIDIFLOXA Linn. sp. 597. DC. fl. fr. 4. p. 754. — Herit. parad. 199. ic. ② in petrosis Pedemontii.

SILENE CORDIFOLIA All. ped. t. 23. f. 3. DC. fl. fr. 4. p. 755. ♀ in Alpibus Pedemontii circa Tende.

ORTEGIA DICHOTOMA Linn. mant. 174. DC. fl. fr. 4. p. 767. — All. ped. t. 4. f. 1. ♀ in Pedemontio et Hispaniâ.

ARENARIA POLYGONOIDES Wolf. in Jacq. coll. 1. p. 241. t. 15. DC. fl. fr. 4. p. 786. — All. ped. t. 64. f. 4. ♀ in Alpibus Pedemontii et Helvetiae.

CERASTIUM MANTICUM Linu. sp. 629. Waldst. et Kit. hung. 1. t. 96. *Stellaria mantica* DC. fl. fr. 4. p. 794. (1) in pratis montosis Italie borealis non in Gallia.

HIBISCUS TRIONUM Linn. sp. 981. Cav. diss. 3. t. 64. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 837. (1) in Pedemontio.

GERANIUM MACRORHIZON Linn. mant. 343. Cav. diss. 4. t. 85. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 845. ♀ in Alpibus Tendæ.

GENISTA OVATA Waldst. et Kit. hung. 1. t. 84. DC. syn. gall. 342. ♂ in Pedemontio.

CYTISUS NIGRICANS Linn. sp. 104 t. DC. fl. fr. 4. p. 502. — Clus. hist. 1. p. 95. f. 1. ♂ in Pedemontio et Valesiâ.

MEDICAGO GLOMERATA Balb. el. 93. DC. fl. fr. 4. p. 540. ♀ in Pedemontio.

TRIFOLIUM PANNONICUM Linn. mant. 276. Jacq. obs. 1. t. 42. DC. fl. fr. 4. p. 527. ♀ in Alpibus Pedemontii et Austriae nec adhucdum certò in Gallia repertum.

PHACIA FRIGIDA Linn. Svec. 2. p. 657. DC. fl. fr. 4. p. 563. — Crantz austr. 419. t. 2. f. 2. ♀ in Alpibus Pedemontanis et Sabaudis, nondum in Gallia reperta.

ASTRAGALUS LEONTINUS Jacq. ic. rar. 1. t. 3. DC. fl. fr. 4. p. 570. ♀ in editioribus Alpibus Vallesiæ.

ASTRAGALUS EXSCAPUS Linn. mant. 275. Jacq. ic. rar. t. 561. DC. fl. fr. 4. p. 575. ♀ in editioribus Alpibus Vallesiæ.

RUBUS CANESCENS DC. cat. monsp. 139; fl. fr. 5. p. 545. ♂ in Alpibus Pedemontii propè Vinadio.

FRAGARIA COLLINA Ehr. beytr. 7. p. 26. DC. fl. fr. 5. p. 543. ♀ in Germaniâ et Alpibus Pedemontanis, nondum in Gallia reperta.

POTENTILLA NIVRA Linu. sp. 715. Fl. dan. t. 1035. DC. fl. fr. 4. p. 462. ♀ in Alpibus Helveticis.

POTENTILLA GLACIALIS Hall. fil. in Ser. mus. helv. 1. p. 61 et 59. t. 7. P. frigida & DC. fl. fr. 4. p. 462. ♀ in editioribus Alpibus Vallesiæ.

POTENTILLA MULTIFIDA Linn. sp. 710. DC. fl. fr. 4. p. 456. Ser. mus. helv. 1. t. 8. ♀ in editioribus Alpibus Vallesiæ et Pedemontii.

POTENTILLA VALDERIA Linn. sp. 714. All. ped. t. 24. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 465. ♀ in saxosis editiorum Alpium Pedemontii.

POTERIUM SPINOSUM Linn. sp. 1411. DC. fl. fr. 4. p. 449. — Moris. hist. s. 8. t. 18. f. 5. ♂ in Pedemontio ex J. Bauh. et All.

SUFFRENIA FILIFORMIS Bell. act. taur. 7. t. 1. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 411. excl. Lob. syn. (1) in oryzetis Pedemontii.

SEDUM ALSINÆFOLIUM All. ped. n. 1740. t. 22. f. 2. DC. fl. fr. 4. p. 388. (2) in petrosis umbrosis montium Pedemontii.

SEMPERVIVUM HIRTUM Linn. sp. 665. All. ped. t. 65. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 398. ♀ in Alpibus Pedemontii.

PEUCEDANUM VERTICILLARE Koch. umb. 95. in adnot. Imperatoria verticillaris DC. fl. fr. 4. p. 287. Angelica verticillaris Linn. — Pluckn. t. 134. f. 1. ♀ in Pedemontio.

DANIA AQUILEGIFOLIA All. ped. t. 63. DC. fl. fr. 4. p. 311. \mathcal{U} in collibus lapi-
dosis et subalpinis Pedemontii.

DONDIA EPIPACTIS Spreng. umb. prod. 21. *Astrantia Epipactis* Scop. 1. p. 185.
DC. fl. fr. 4. p. 352. — Lob. ic. 664. f. 1. \mathcal{U} in Pedemontio ab Hallero in-
dicata.

GALIUM PEDEMONTANUM All. anct. 2. DC. fl. fr. 4. p. 250. — Act. taur. 5.
p. 252. t. 7. (1) in Pedemontio.

ASPERULA HEXAPHYLLA All. ped. t. 77. f. 3. DC. fl. fr. 4. p. 244. \mathcal{U} in saxosis
montium Tendæ, forsan in montibus Sedenensibus reperienda.

CEPHALARIA TRANSYLVANICA Schrad. cat. sem. gætt. 1814. *Scabiosa Transylva-
nica* Linn. sp. 141. DC. fl. fr. 4. p. 225. — Moris. 3. s. 6. t. 13. f. 13. (1) in
collibus Pedemontii.

CHRYSANTHEMUM HETEROPHYLLUM Willd. sp. 3. p. 2142. DC. syn. gall. 286. \mathcal{U}
in umbrosis subalpinis Pedemontii.

ANTHEMIS TRIUMFETTI DC. fl. fr. 5. p. 483. *A. Austriaca* DC. fl. fr. 4. p. 206.
non Jacq. *Chamæmelum Triumfetti* All. ped. n. 680. (1) in Pedemontio.

ANTHEMIS DISCOIDEA Willd. sp. 3. p. 2188. DC. fl. fr. 4. p. 208. \mathcal{U} (1) in Pede-
montio.

SENECIO UNIFLORUS All. ped. n. 728. t. 17. f. 3. DC. fl. fr. 4. p. 166. \mathcal{U} in
editioribus Pedemontii et Vallesiæ Alpibus.

SENECIO OVATUS Willd. sp. 3. p. 2004. DC. fl. fr. 4. p. 923. \mathcal{U} in sylvis Palati-
natūs, Galloprovineæ superioris ex Loïs. — A S. nemorensi vix distinctus.

INULA ENSIFOLIA Linn. sp. 1240. Jacq. aust. t. 162. DC. fl. fr. 4. p. 152. \mathcal{U} in
Pedemontio ex All.

ARTEMISIA PONTICA Linn. sp. 1187. DC. fl. fr. 4. p. 192. — Lob. ic. t. 755. f. 2.
 \mathcal{U} in Pedemontio ab Allioni, et in Jurasso supra Convet in pago Neoco-
mensi ab Hallero indicata, sed nondum in Galliâ reperta.

ARTEMISIA VALLESIACA All. ped. n. 614. DC. fl. fr. 4. p. 197. \mathcal{U} in Pedemontio
et Vallesiæ.

CIRSIUM HYBRIDUM Koch in DC. fl. fr. 5. p. 463. \mathcal{U} in Palatinatū pratis ex
C. palustri et *C. oleraceo* ortum.

CENTAUREA SPLENDENS Linn. sp. 1293. DC. fl. fr. 4. p. 90. — Clas. hist. 2. p. 10.
f. 1. (2) in Pedemontio.

CENTAUREA CENTAURIUM Linn. sp. 1287. DC. fl. fr. 4. p. 89. — Clas. hist. 2.
p. 10. f. 2. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis circa Fenestrelles ex All.

CENTAUREA ALPINA Linn. sp. 1286. DC. fl. fr. 4. p. 89. — Barr. ic. t. 514. \mathcal{U}
in Sabaudia propè Sanctum Mauricium.

CENTAUREA FLOSCULOSA Willd. sp. 3. p. 2285. DC. fl. fr. 4. p. 92. \mathcal{U} in Alpibus
Pedemontii propè Fenestrelles. — An satis a *C. nigra* distincta?

CENTAUREA CINEREA Lam. dict. 1. p. 669. DC. fl. fr. 4. p. 96. — Jacq. vind.
t. 93. \mathcal{U} in Pedemontio. — Per errorem ut videtur in Oœcitania et Pyrenæis
indicata.

CENTAUREA HYBRIDA All. ped. n. 593. DC. fl. fr. 4. p. 101; ic. rar. t. 22. (2) in
pratis siccis Taurinensium.

LACTUCA SEGUSIANA Balb. el. taur. 94; misc. t. 8. DC. fl. fr. 4. p. 12. (1) in
Pedemontii collibus circa Segusium. Fl. purpurei.

PODOSPERMUM MURICATUM DC. syn. gall. 265. \mathcal{U} circa Tende Pedemontii.

SCORZONERA AUSTRIACA Willd. sp. 3. p. 1498. DC. syn. gall. 265. \mathcal{U} in mon-
tibus Pedemontanis. — In Pyrenæorum sylvâ salvanaire a La Peyr. indicata;
sed dubia civis.

CATANANCHE LUTEA Linn. sp. 1142. Lam. ill. t. 653. f. 2. DC. fl. fr. 4. p. 67. (1)
in Pedemontio.

HIERACIUM SCHRAADERI Schleich. DC. fl. fr. 4. p. 28. \mathcal{U} in Alpibus Sabaudis et Vallesiacis.

PHYTUM HUMILIS Schleich. in Murr. bot. val. 84. P. Carestiae Birob. — Barr. ic. t. 523. f. 1. \mathcal{U} in summis Vallesiae et Pedemontii jugis hucusque tantum reperta.

PHYTUM COMOSA Linn. sp. 242. Jacq. aust. app. t. 50. DC. fl. fr. 3. p. 711. \mathcal{U} in Alpibus Carniolicis.

PHYTUM MICHELII All. ped. t. 7. f. 3. DC. fl. fr. 3. p. 712. \mathcal{U} in monte Ceniso, sed nondum in Galliae Alpibus lectam vidi.

CAMPANULA SIBERICA Linn. sp. 236. Jacq. aust. t. 200. DC. fl. fr. 3. p. 731. \mathcal{U} in Pedemontii collibus aridis.

CAMPANULA ELATINES Linn. sp. 240. All. ped. t. 7. f. 1. DC. fl. fr. 3. p. 704. — Barr. ic. t. 453. \mathcal{U} in Pedemontii Alpinis.

CAMPANULA PYRAMIDALIS Linn. sp. 233. DC. fl. fr. 3. p. 700. \mathcal{U} in Sabaudia ex All. sed per errorem?

CAMPANULA BONONIENSIS Linn. sp. 234. C. simplex DC. fl. fr. 3. p. 730. \mathcal{U} in montibus Pedemontii et Vallesiae.

ERICA HERBACEA Linn. syst. 301. DC. fl. fr. 3. p. 679. — Erica VIII et IX. Clus. hist. 1. p. 44. ic. 5 in Sabaudiæ et Pedemontii subalpinis, nec usque tunc in Gallia indicata.

GENTIANA HYBRIDA DC. fl. fr. 3. p. 651. \mathcal{U} in Alpibus Vallesiacis et Sabaudis.

GENTIANA PANNONICA Jacq. aust. t. 136. — Barr. t. 64. \mathcal{U} in editioribus Alpibus Vallesiae? Sabaudiæ? Pedemontii?, sed nondum in Gallia reperta et per errorem ut videtur in Pyrenæis indicata.

ANCHUSA BAERELIEBI DC. fl. fr. 3. p. 632. — Barr. ic. 333. \mathcal{U} in Pedemontio.

CELSIA ORIENTALIS Linn. sp. 866. DC. fl. fr. 3. p. 599. — Buxb. cent. 1. t. 20. (1) in Pedemontio ab All. indicata, et, ut videtur, per errorem.

MANDRAGORA OFFICINALIS Mill. dict. n. 1. ic. t. 173. DC. fl. fr. 3. p. 611. \mathcal{U} in Pedemontii vallis Augustanæ montibus in All. — Ibi non repetitur.

VERBASCUM PHÆNICUM Linn. sp. 254. Jacq. aust. t. 125. DC. fl. fr. 3. p. 604. (2) in collibus aridis Pedemontii.

DIGITALIS THAPSI Linn. sp. 867. DC. fl. fr. 3. p. 596. \mathcal{U} in Sabaudia, et ut videtur falsò, indicata.

DIGITALIS FERRUGINEA Linn. p. 867. DC. fl. fr. 3. p. 597. \mathcal{U} in collibus Pedemontii.

PEDICULARIS ATRO-RUBENS Schl. DC. syn. gall. 212. \mathcal{U} in Vallesiae monte Pennino.

PEDICULARIS FLAMMEA Linn. sp. 846. DC. fl. fr. 3. p. 483. — Hall. helv. t. 8. f. 3. \mathcal{U} in Sabaudiæ et Helvetiæ Alpibus.

PEDICULARIS RECUTITA Linn. sp. 846. DC. fl. fr. 3. p. 480. — Hall. helv. t. 8. f. 2. \mathcal{U} in Pedemontii et Vallesiae Alpibus.

SALVIA VIRIDIS Linn. sp. 34. Desf. atl. 1. p. 20. t. 1. DC. fl. fr. 3. p. 510. (1) in arvis circa Oneille ex All.

SALVIA HISPANICA Linn. sp. 37. Ard. spec. 10. t. 2. DC. fl. fr. 3. p. 512. (1) in olivetis circa Oneille ex All.

THYMUS SPICATA Linn. sp. 795. DC. fl. fr. 3. p. 525. — Fluck. t. 116. f. 5. 5 in montibus Pedemontii ex All., sed, ut videtur, tantum in Sardinia quærenda.

LAMIUM GARGANICUM Linn. sp. 808. DC. fl. fr. 3. p. 539. — Till. pis. t. 34.

- f. 2. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis crescens, in montibus Sedenensibus probabiliter reperiendum.
- SCUTELLARIA COLUMNÆ** All. ped. t. 84. f. 2. DC. fl. fr. 3. p. 571. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis.
- THYMUS PIPERELLA** Linn. syst. 453. DC. fl. fr. 3. p. 562. — Barr. ic. t. 694. \mathcal{U} in rupestribus Alpium maritimarum Pedemontii.
- LYSIMACHIA PUNCTATA** Linn. sp. 210. Jacq. aust. t. 366. DC. fl. fr. 3. p. 435. \mathcal{U} in Pedemontio et in Belgio, sed nondum in Galliâ reperta.
- PRIMULA LONGIFLORA** All. ped. t. 39. f. 3. DC. fl. fr. 3. p. 447. \mathcal{U} in editioribus Alpibus Vallesiae et Pedemontii.
- SALSOLA ARENARIA** Koel. ap. Rœm. coll. p. 45. t. 1. f. 1-20. DC. fl. fr. 3. p. 395. (I) in arenosis Moguntiae.
- POTAMOGETON ALPINUM** Balb. misc. p. 13. DC. fl. fr. 3. p. 724. P. annulatum Bell. act. taur. 7. p. 445. t. 1. f. 2. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis et Vallesiacis.
- ALLIUM PANICULATUM** Linn. sp. 428. DC. fl. fr. 3. p. 227. lil. t. 252. \mathcal{U} in Pedemontio et Jorasso Helveticio nec usquedum in Galliâ repertum.
- CAREX PARVIFLORA** Host gram. 1. p. 64. t. 87. DC. fl. fr. 5. p. 291. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis ad montem Cramont.
- CAREX BICOLOR** All. ped. n. 2311. DC. fl. fr. 3. p. 721. \mathcal{U} in monte Cenisio et Alpibus Vallesiacis.
- CAREX HISPIDULA** Gand. agrost. 2. p. 136. excl. syn. fl. fr. DC. fl. fr. 5. p. 292. C. fimbriata Schk. car. t. V u. n. f. 165. \mathcal{U} in editioribus Alpibus Vallesiae.
- KOBRESIA CARICINA** Willd. sp. 4. p. 206. DC. fl. fr. 5. p. 298. — All. ped. t. 89. f. 5. \mathcal{U} in monte Cenisio.
- ORYZA SATIVA** Linn. sp. 475. Lam. ill. t. 264. DC. syn. gall. 122. (I) in Pedemontio colitur, nondum in Galliâ.
- PANICUM UNDULATIFOLIUM** Ard. sp. 2. t. 4. DC. fl. fr. 3. p. 14. P. Burmanni Balb. — in umbrosis Alpium Pedemontii.
- CALAMAGROSTIS HALLERIANA** DC. fl. fr. 5. p. 256. Arundo Halleriana Gand. agrost. 1. p. 197. \mathcal{U} in Alpibus Helveticis.
- FESTUCA ACUMINATA** Gand. agr. 2. p. 287. DC. fl. fr. 5. p. 265; F. flavescentia Gand. agr. 1. p. 272 non Bell. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis non Gallicis.
- FESTUCA VIOLENCEA** Gand. agr. 1. p. 231. DC. fl. fr. 5. p. 265. \mathcal{U} in editioribus Alpibus Sabaudiæ. Hanc in paludosis Lugduni circa Echayx et Passieux indicat cl. Balbis Lugd. 1. p. 812, sed evidenter hic aliquis latet error.
- FESTUCA ALPINA** Gand. agr. 1. p. 232. non Host. DC. fl. fr. 5. p. 266. \mathcal{U} in editioribus Alpibus Sabaudiæ Vallesiae.
- TRITICUM GLAUCUM** Desf. cat. hort. par. 16. DC. fl. fr. 5. p. 281. \mathcal{U} in Vallesiae, nondum in Galliâ reperta.
- POA MOLINIERII** Balb. add. p. 85. misc. t. 5. f. 1. DC. fl. fr. 5. p. 274. \mathcal{U} in Alpibus Pedemontanis.
- POA CONCINNA** Gand. agr. 1. p. 196. P. Molinieri DC. fl. fr. 3. p. 62 non Balb. \mathcal{U} in arenosis Vallesiae inferioris.
- POA KOELEI** DC. syn. galb. 131. \mathcal{U} in pratis Moguntiae.
- POA RHENANA** Koel. gram. 196. DC. fl. fr. 3. p. 720. \mathcal{U} in arenosis Moguntiae.
- KOELERIA HIRSUTA** Gand. agr. 1. p. 150. DC. fl. fr. 5. p. 270. Festuca hirsuta DC. fl. fr. 3. p. 53. \mathcal{U} in summis Alpibus Vallesiacis.

APPENDIX.

AVENA LOEFLINGIANA Linn. sp. 118. DC. fl. fr. 3. p. 39. *Trisetum Loeflingianum* Palis. de Beauv. (1) in Vallesia.

DIDYMODON APICULATUM Arn. disp. meth. p. 34. *Trichostomum latifolium* Hedw. st. crypt. t. 33. DC. fl. fr. 5. p. 217. ♀ ad saza in Alpibus Helveticis.

POLYTRICHUM SEPTENTRIONALE Sw. musc. Suec. t. 9. f. 18. P. crassisetum DC. fl. fr. 5. p. 486. P. sexangulare Hoppe bot. tasch. 1800. p. 150. Brid. supp. I. p. 52. ♀ in Alpibus Vallesiae Sabaudiae, nondum vero in Gallia.

ACARICUS TUBAEFORMIS Schäff. tung. t. 248 et 249. ♂ clavariaeformis Alph. DC. in ann. sc. nat. 1. t. 23. *Clavaria thermalis* DC. fl. fr. 2. p. 101. — In Thermalibus loci dicti Cormayeur in valle Augustana Pedemontii, trabibus humidis adnatus.

ÆCIDIUM? EQUISETI DC. fl. fr. 5. p. 99. — Ad *Equisetum hyemale* in littoribus lacus Neocomensis. — Planta ceterum valde dubia.

RIVULARIA HALLERI DC. fl. fr. 2. p. 5. — In rivo dicto Seyon prope Neocomum nec alibi reperta.

§. 2. *Ob patriam non satis certam.* (1)

IBERIS SEMPERVIRENS Linn. sp. 905. non fl. fr. 4. p. 713. — Barr. ie. t. 214. ♂ in rupibus Cretae crescit, nec in Gallia reperitur.

LEPTOCARPA LOESELII DC. syst. 2. p. 202. *Sisymbrium Loeselii* Linn. sp. 921. (1) Mogontiae, in Gallia boreali, quærenda; nam species sub hoc nomine in Gallia usquedum indicata est *Sisymbrium Columnæ*.

DENTARIA ENNEAPHYLLA Linn. sp. 912. ♀ in Arvernia monte Aureo ex Delarbri indicata, sed, ut videtur, per errorem.

SISYMBRIUM HISPANICUM Jacq. ic. rar. 1. t. 124. (2) in Gallia meridionali ex Poiret; sed civitas dubia.

LEPIDIUM SUBULATUM Linn. sp. 899. ♀ in agro Ruscinonensi circa Collioure ex La Peyr. abr. supp. 90. — In herb. La Peyr. deest teste cl. Arnolt, nec in loco indicato hanc unquam reperiit Xatard.

HESPERIS RAMOSISSIMA Desf. atl. 2. t. 161. Viv. cors. 11. (1) in Corsica ex Viv.

BRASSICA CRETICA Lam. dict. 1. p. 747. DC. syst. 2. p. 594. ♂ in Corsica ex cl. Viv. cors. 11.

RAPHANUS LANDRA Moretti fl. insub. DC. syst. 2. p. 668. (2) ♀ prope Collioure ex cl. Bentham.

HELIANTHEMUM ANGUSTIFOLIUM Pers. encycl. 2. p. 79. ♂ probabiliter in Gallia australi.

SAPONARIA BELLIDIFOLIA Sm. spicil. bot. 5. Ser. in DC. prod. 1. p. 366. — Bocc. mus. t. 62. f. 1. ♀ in editioribus Pyrenæis a La Peyrouse indicata, sed videatur per errorem.

(1) In hac sicut in tertia hujus Appendicis sectione, nec minimè affirmare volui species in utraque insertas in Gallia non reperiiri posse aut species non recipiendas esse. In secunda sectione species quas e Gallia ortas non vidi et quarum indigenatus mihi incertus videtur, in tertia species quas nec vidi nec ex descriptione recognoscere potui inserui. Haec igitur ambae sectiones non ut accusatio sed ut confessio ignorantiae habenda sunt. Omnes ergo botanicos rogo, qui ab una quacumque specierum designatarum dubium removere possent, ut velint mihi observationes suas communicare, præsertim si opinionem speciminiibus authenticis fulcire non dignantur.

SILENA BEHEN Linn. sp. 599. DC. fl. fr. 4. p. 752. — Dill. elth. t. 317. f. 409.
♀ circa Monspelium a cl. Lamarck indicata, sed ibi nondum reperta.

SILENA RUBELLA Linn. sp. 600. DC. fl. fr. 5. p. 604. (1) in Lusitaniâ et Oriente
spontanea, nec adhucdum certò in Galliâ reperta.

PHARNACEUM CERVIANA Linn. sp. 308. Lam. ill. t. 214. f. 1. *Mollugo Cerviana*
Ser. in DC. prod. 1. 392. (2) in Pyrenæis Orientalibus circa *Boulon* a Pourret
ex La Peyr. indicatum.

ARENARIA ECHINATA Poir. dict. 6. p. 377. — In Alpibus.

ARENARIA SAXATILIS Linn. sp. 607. — Barr. ic. t. 580. ♀ in Galliâ ex Linnaeo. —
A. saxatilis La Peyr. abr. 255. est ex cl. Arnolt, qui hanc in herb. La Peyr.
vidit, A. grandiflora. A. saxatilis Lois. gall. 261. est A. setacea. — Species
Linnaeana cæterum obscura.

ARENARIA SCABRA Poir. dict. 6. p. 377. — In Alpibus.

CERASTIUM CAMPANULATUM Viv. ann. bot. 1. p. 2. t. 1. DC. prod. 1. p. 417. (1)
in Galloprovinciâ ex Lois. gall. ed. II. t. 1. p. 325.

LAVATERA THURINGIACA Linn. sp. 973. Cav. diss. 2. t. 31. f. 3. DC. fl. fr. 4.
p. 835. ♀ in Thuringiâ et Germaniâ crescens, circa Nicæam ab All. Mon-
spelium a J. Baph. per confusionem, ut videtur, indicata.

LAVATERA TRILoba Linn. sp. 792. Cav. diss. 2. t. 31. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 833. ♂
A. cl. Gouan circa Monspelium indicata.

LAVATERA AMBIGUA DC. prod. 1. p. 440. — In Corsicâ ex cl. Viv. cors. II.

GERANIUM REFLEXUM Linn. mant. 257. Cav. diss. 4. t. 81. f. 1. DC. fl. fr. 4. p. 846.
♀ Italiæ indigenum, in montibus Arvernæ indicatum fuit, sed ibi non
satis certò habitat, ut in florâ Gallicâ asservari possit.

ERODIUM GRUINUM Willd. sp. 3. p. 633. Cav. diss. 4. t. 88. f. 2. DC. fl. fr. 4.
p. 842. (1) circa Monspelium in sepibus a cl. Gouan indicatum, sed ex eo ibi
non repertum.

ERODIUM REICHARDI DC. prod. 1. p. 649. E. chamaedryoides L'Hér. ger. t. 6. excl.
syn. Bocc. et ideo nomine. ♀ in Majoriâ. — G. chamaedryoides Bocc. est G.
maritimum & Bocconi.

ERODIUM MURCICUM Willd. sp. 3. p. 636. Geran. Muricum Cav. diss. 5. t. 126.
f. 1. (1) Murciæ et Africæ indigenum circa Forum Julii indicat cl. Loisel.

ERODIUM ASPLENIOIDES Willd. sp. 3. p. 635. Ger. asplenioides Desf. atl. 2. t. 168.
♀ circa Monspelium ad Portum Juvenalem ex cl. Loiseleur.

RUTA CHALEPENSIS a Linn. mant. 69. DC. fl. fr. 4. p. 733. quæ R. macrophylla
Sol. in bot. mag. t. 2018. DC. prod. 1. p. 710. ♂ in Africâ et Asiâ crescens;
nondum reperta fuit in Galliâ.

PEGANUM HARMALA Linn. sp. 638. DC. fl. fr. 4. p. 733. Bull. herb. t. 343. ♀ in
Hispaniâ et Oriente crescens, circa Nicæam ab All. indicatum fuit, sed ibi,
teste cl. Rissô, nunquam reperitur.

GENISTA TRIQUETRA Ait. kew. 3. p. 14. DC. fl. fr. 4. p. 497. ♂ in Corsicâ a cl.
Willdenow indicata, sed ibi nondum certò reperta.

GENISTA UMBELLATA Poir. supp. 2. p. 715. Spartium umbellatum Desf. atl. 2.
t. 180. ♂ in Corsicâ a cl. Lois. indicata, sed, ut videtur, per confusionem cum
specie forsitan novâ.

GENISTA TRIACANTHOS Brot. phyt. 130. t. 54. DC. prod. 2. p. 147. ♂ in Corsicâ
ex cl. Viv.

GENISTA MONOSPERMA Lam. dict. 2. p. 616. DC. fl. fr. 4. p. 493. — Lob. ic. 2.
p. 91. f. 2. ♂ Monspelii per errorem a Sauvages indicata.

GENISTA SPHEROCARPA Lam. dict. 2. p. 616. Spartium sphærocarpon Linn.
mant. 571. non La Peyr. — Clus. hist. 1. p. 102. f. 2. ♂ in Barbarie asperis
crescens, nondum in Galliâ reperta. — Spartium sphærocarpon La Peyr.
abr. est ex cl. Arnolt G. purgans.

ONONIS LAXIFLORA Desf. atl. 2. t. 190. (1) in Corsicā circa Bonifacio ex cl. Viviani cors. 13, forsitan per confusionem cum *O. molli*.

ONONIS VILLOSISSIMA Desf. atl. 2. t. 192. — In arvis Algeriæ crescents, in Pyrenæis a La Peyr. abr. 408. et supp. 73, indicatur.

ONONIS PICTA Desf. atl. 2. t. 187. (2) in arvis Barbariæ crescents indicatur a La Peyr. in castello St.-Beat Pyrenæorum.

ANTHYLLIS ERINACEA Linn. sp. 1014. (3) in Corsicā ex cl. Viv. cors. 13.

MEDICAGO MOLLISSIMA Roth. cat. 3. p. 74. (1) in Galliâ ex Pers. enh. 2. p. 357. Au differt a *M. minimâ longisetâ* Ser.?

MEDICAGO CILIARIS Willd. sp. 3. p. 1411. DC. fl. fr. 5. p. 567. — In Calabriâ crescents, nec adhucdum in Galliâ reperta.

TRIFOLTUM CLYPEATUM Linn. sp. 1084. DC. fl. fr. 4. p. 532. — Alp. exot. 806. ic. (1) in Oriente crescents, per errorem, ut videtur, a La Peyr. in Pyrenæis indicatum; circa Bonifacio in Corsicā ex cl. Loisel.

TRIFOLIUM PALLIDUM Waldst. et Kit. hung. 1. t. 36. (1) (2) in Corsicā propè Bonifacio ex cl. Lois.

ASTRAGALUS ALOPECUROIDES Linn. sp. 1064. DC. astr. 145; fl. fr. 4. p. 573. (2) circa St.-André propè Embrun et ad lacum Seguret a cl. Villars indicatus, sed tamen civitas dubia.

HEDYSARUM PALLIDUM Desf. atl. 2. p. 177. DC. prod. 2. p. 340. (2) hanc Barbariæ incolam in Corsicā indicat cl. Viviani cors. 14. forsitan per confusionem cum *H. capitato*.

ERYMUM NIGRICANS Bieb. taur. 2. p. 164. E. lentoides Tenore Lois. gall. II. 2. p. 152. (1) in arvis Parisiorum et Galloprovinciæ ex Lois.

VICIA ALTISSIMA Desf. atl. 2. p. 163. (2) in Corsicā ex cl. Lois.

SPIREA SALICIFOLIA Linn. sp. 700. DC. fl. fr. 4. p. 477. — Gmel. sib. 3. t. 49. (3) in montibus Arverniæ ex Delarbrea??

POTENTILLA DIVARICATA DC. cat. monsp. 135; fl. fr. 5. p. 541. P. recta & *Astracanica* Ser. in DC. prod. 2. p. 578. (2) ex monte Rotondo Corsicæ in hortum Telonensem et exinde in hortum Monspeliensem allata dicitur; sed hæc habitatio non satis certa videtur.

POTERIUM HYBRIDUM Linn. sp. 1411. P. agrimonifolium Cav. & hybridum DC. prod. 2. p. 595. — Barr. ic. t. 562. (2) in hortis colitur, nec usquedum certo in Galliâ repertum fuit.

SEDUM HISPANICUM Linn. sp. 618. DC. prod. 3. p. 406. non DC. fl. fr. 4. p. 395. — Dill. eth. t. 256. f. 332. (2) in Alpibus Helvetiis et Germaniâ australiori, nondum in Galliâ repertum.

UMBILICUS ERECTUS DC. fl. fr. 4. p. 384. Cotyledon umbilicus & Linn. sp. 613. C. lutea Huds. — Dod. mem. t. 73. Nondum certo in Galliâ repertus.

DAUCUS PARVIFLORUS Desf. atl. 1. p. 241. t. 60. DC. fl. fr. 5. p. 513. — in Armeriacæ maritimis ex cl. Loisel.

ATHAMANTHA MATTHIOLI Wulf. in Jacq. coll. 1. p. 211; ic. rar. 1. t. 57. non DC. fl. fr. (2) in montibus Anstriæ, nec adhucdum in Galliâ reperta. — *A. Matthioli nostrorum* est *A. Cretensis* decipiens Dub. bot. gall. 1. p. 228.

LIBANOTIS VERTICILLATA DC. prod. t. 4. ined. Athamantha verticillata Sibth. fl. græc. t. 275. (2) specimen iconi simillimum circa Bayonam loco dicto *Chambre d'Amour* a cl. Fauchet lectum habet summus DC.; an revera hujusce speciei?

LAGOECIA CUMINOIDES Linn. sp. 294. Lois. gall. II. 1. p. 138. (1) in regionibus australibus? ex Lois.

SMYRNIUM DODONEI Spreng. umb. 24. Lois. 1. c. 2. (2) in dumetis Corsicæ circa Bonifacio ex Lois.

GALIUM MEGALOSPERMUM All. ped. n. 35. t. 79. f. 4. non Vill. *G. megalospermum* a DC. fl. fr. 4. p. 249. — In herbario Aillionii non reperitur et in monte Cenisio frustra quæsitum (DC. in fl. fr. 5. p. 495).

GALIUM RUBIOIDES Linn. sp. 152. DC. fl. fr. 4. p. 253. var. α . \mathcal{U} in Pedemontio et in Palatinatu indicata, sed nunquam certò reperta. Civitas Gallica admodum dubia.

ASPERULA LONGIFLORA Waldst. et Kit. hung. t. 150. Lois. gall. II. 1. p. 107. \mathcal{U} in Galloprovinciâ ex Lois.

SENECTIA NEBRODENSIS Linn. sp. 1217. (1) in Pyrenæis ex Linn., in Occitanâ ex Broussonet.

ANTHEMIS AUSTRALIS Willd. sp. 3. p. 2177. \mathcal{U} in maritimis regionum australium ex Lois.

ANTHEMIS ALPINA Linn. sp. 1561 nou All. nec Gouan. Jacq. aust. app. t. 30. DC. fl. fr. 4. p. 205. \mathcal{U} in Alpibus Tyrolensis, sed nondùm in Galliâ certò reperta.

ANTHEMIS AUSTRIACA Jacq. aust. t. 444 non DC. fl. fr. Will. sp. 3. 281. (1) in arvis Austriæ nascens, circa Burdigalam a cl. Loisel. indicatur.

ANACYCLUS PYRETHRUM DC. fl. fr. 5. p. 484. *Anthemis Pyrethrum* Linn. sp. 1262. DC. fl. fr. 4. p. 207. — Lob. ic. t. 774. f. 2. \mathcal{U} Orienti indigenus per errorem a Sauvages Monspelii indicatus.

ASTER PUNCTATUS Waldst. et Kit. hung. 2. p. 113. t. 109. \mathcal{U} a La Peyr. abr. pyr. 518. in valle *Gistain* Pyrenæorum indicatus, sed probabiliter confusus cum *A. acris*?

ARTEMISIA PALMATA Lamb. dict. 1. p. 268. DC. fl. fr. 4. p. 196. \mathcal{U} in Galliâ Narbonensi Hispaniæ conterminâ indicata, sed nonquàm certò reperta. — Species alioquin valde obscura.

ACHILLEA ALPINA Linn. sp. 1266. DC. fl. fr. 4. p. 211. — Bocc. mus. t. 101. \mathcal{U} in Alpibus Sabaudis a Boccone et Catalonicis a Pourret indicata, sed in Galliâ nondùm reperta.

BIDENS BIPINNATA Linn. sp. 1166. (1) ad ripas circa Monspelium ex Loisel.

ONOPORDUM ACAULE Linn. sp. 1159. Jacq. ic. rar. t. 167. (2) \mathcal{U} in Pyrenæis a La Peyr. et in montibus Arvernîæ a cl. Loiseleur indicatum, sed probabiliter cum *O. Pyrenaico* confusum.

CIRSIUM ANGUSTIFOLIUM DC. mss. *Carduus angustifolius* Lam. dict. 1. p. 703. \mathcal{U} in Alpibus ?? — Affine *C. Tatarico*.

CARDUUS PARVIFLORUS Linn. mant. 279. \mathcal{U} in Alpibus australibus.

CARDUUS PANICULATUS Vahl. symb. 1. p. 68. \mathcal{U} in humidis Pyrenæorum.

CENTAUREA ISNARDI Linn. sp. 1293. — In provinciis australibus.

CENTAUREA LIPPI Linn. sp. 1266. Lois. gall. ed. II. t. 2. p. 208. (1) propè Mons-pelium ad portum Juvenalem ex Lois.

CENTAUREA SICULA Linn. sp. 1298. (1) circa Monspelium ex Gouan.

CARLINA RACEMOSA Linn. sp. 1161. (1) in aridis Galloprovinciæ? ex Lois.

CHONDRLILLA CREFOIDES Linn. syst. veg. 595. Willd. sp. 3. p. 1531. La Peyr. abr. 462. (1) in Pyrenæis a La Peyr. indicata.

HEDYPNOIS MAURITANICA Willd. sp. 3. p. 1616. Viv. cors. 14. (1) in Corsiâ ex cl. Viv.

CREPIS VIRGATA Desf. atl. 2. p. 230; act. soc. hist. nat. par. 1. t. 8. La Peyr. abr. 483. (1) circa Collioure ex La Peyr.

CREPIS LAPPAEA Willd. sp. 3. p. 1599. La Peyr. abr. 483. (1) circa St.-Beat in Pyrenæis? ex La Peyronse.

SCORZONERA GLASTIFOLIA Willd. sp. 3. p. 1499. La Peyr. abr. 456. \mathcal{U} Germaniæ

incola indicatur a cl. La Peyr. et Benth. in Pyrenæis centralibus et ab isto in monte Lupi propè Monspelium. Mihi cæterum ignota et incerta species.

HIERACIUM FORRIFOLIUM Linn. sp. 1128. Jacq. aust. t. 286 non DC. fl. fr. 4. p. 26.

♀ in Alpibus Italiae borealis, nondum in Galliâ repertum.

HIERACIUM RUPESTRE All. auct. t. 1. f. 2. DC. fl. fr. 5. p. 443. *♀ in Alpibus Pseudo-montanis Galliæ conterminis indicatum, sed nondum certò in Galliâ repertum. An. species distincta?*

HIERACIUM CHONDRILOIDES Jacq. aust. t. 429. DC. fl. fr. 4. p. 36. *♀ in Apenninis et Alpibus Austricæ, sed unquam in Galliâ nascens.*

PHYTUM GLOBULARIÆFOLIA Sternb. ex Rom. et Schult. veg. 5. p. 76. Lois. gall. II. 1. p. 145. *♀ in Alpibus et Pyrenæis ex cl. Loisel.*

ERICA VIRIDIPURPUREA Linn. sp. 402. ♂ in regionibus australibus ex Lam.

RHODODENDRON CHAMÆCISTUS Linn. sp. 562. Jacq. aust. t. 217. ♂ in monte Pyrenæorum Sissoy plantam Germanicarum Alpium iucolam indicat La Peyr. abr. 221.

FRAXINUS OXYCARPA Willd. sp. 4. p. 1100. ♂ dubitanter a cl. Bentham in Occitaniâ et agro Ruscinonensi indicata.

GENTIANA PUMILA Jacq. aust. t. 302. *♀ in Alpibus a Vill. et Lois. indicata.*

GENTIANA AUREA Linn. sp. 331. — Sueciæ indigena a cl. Lois. gall. ed. primâ p. 151. In Alpibus indicata, sed in ed. secundâ omissa.

CONVOLVULUS ARGENTEUS Lamb. fl. fr. 2. p. 266. DC. fl. fr. 3. p. 642. C. Cneorum Linn. — Moris. sect. 1. t. 3. f. 1. ♂ Per errorem a Gonan circa Monspelium et ab All. circa Nicæam indicatus. In Galliâ sponte nuspiam crescit.

CYNOGLOSSUM APENNINUM Linn. sp. 134. DC. fl. fr. 3. p. 637. — Col. ecphr. 1. p. 178. t. 175. (2) in montibus Vallesiæ? crescens, per errorem, ut videtur, circa Monspelium indicatum a Gouan.

CYNOGLOSSUM LITTORALE Sprengr. syst. 1. p. 567. Lois. gall. II. 1. p. 156. Picotia littoralis Rom. et Schult. (1) in maritimis Armoricæ ex cl. Lois.

LYCOPSIS VARIEGATA Linn. sp. 198. Lois. gall. II. 1. p. 153. (1) in agro Nicæensi ex Lois.

ECHIUM CRETICUM Linn. sp. 200. (1) hanc speciem Cretæ et Ægypto indigenum circa Perpignan indicat La Peyr.

ECHIUM LUTEUM Desf. atl. 1. t. 45. (2) propè Perpignan ex La Peyr.

ECHIUM MARITIMUM Willd. sp. 788. (1) in insulis Stæchadum ex Tournef. inst. 136, circa Telonem ex Lois. gall. II. 1. p. 150.

NONNA PULLA DC. fl. fr. 3. p. 626. in adn. *Lycopsis pulla* Linn. sp. 198. *♀ in agro Ruscinonensi propè Cazas de Pena ex auctoritate Pourretii indicat La Peyr. abr. 89.*

HYOSCYAMUS FUSILLUS Linn. sp. 253. (1) in Corsicâ ex cl. Lois. gall. II. 1. p. 170.

Datura TATULA Linn. sp. 256. La Peyr. abr. supp. 39. (1) propè Perpignan ex cl. La Peyr.

Datura Metel Linn. sp. 256. La Peyr. abr. 115. — Rumph. aarb. 5. t. 87. (1) hanc Africæ civem circa Banyuls indicat cl. La Peyr. Ibi hanc frustâ quæsivi.

CERATOSTIGMA CRETICA Linu. supp. 281. — Mill. ic. t. 273. (2) in agris circa Telonem ex cl. Lois.

SCROPHULARIA BETONIÆFOLIA Linn. mant. 87. *♀ in agro Nicæensi ex cl. Lois. gall. 380. et in Corsicâ ex cl. Viv. cors. 10.*

LIMARIA PILOSA DC. fl. fr. 3. p. 584. *Anterchinum pilosum* Linn. mant. 29. Jacq. obs. 2. t. 48. *♀ in Italiae saxosis ultrâ Romanam crescens, per errorem in Alpibus a Tournef., in Pyrenæis a Linn., indicata fuit.*

LINARIA BIPUNCTATA. *Antirrhinum bipunctatum* Linn. sp. 853. ♀ in Pyrenæis propè Villefranche et St.-Béat ex La Peyr. abr. 351.

THYMORA VERTICILLATA Linn. sp. 796. ♂ in agro Nicæensi ex cl. Loisel.

TEUCRIUM RESUPINATUM Desf. atl. 2. t. 117. DC. fl. fr. 3. p. 517. (I) Falsò in Corbaciensibus ex specimine in herb. L'Hér. asservato indicatum.

NEPETA TUBEROSA Linn. sp. 798. ♀ in Pyrenæis loco dicto Port de Paillères a cl. La Peyr. indicata.

STACHYS INCARNATA Linn. sp. 802. Cav. ic. 2. t. 186. non DC. fl. fr. 3. p. 531. — Bocc. mus. t. 67. f. 2. ♂ Hispaniæ indigena nondum in Galliâ reperta fuit.

MARRUBIUM HISPANICUM Linn. sp. 716. — Barr. ic. 767. ♀ circa Massiliam ex cl. Poiret.

BETONICA ORIENTALIS Linn. sp. 811. DC. fl. fr. 3. p. 546. Lam. ill. t. 507. f. 2. B. grandiflora Thuil. paris. II. 1. p. 293. ♀ circa Meaux per errorem, ut videatur, indicavit Thuillier.

ORIGANUM HERACLEOTICUM Linn. sp. 823. ♀ in Lotharingiâ ex Villemet phyt. 2. p. 715. in Burgundiâ Occitaniâ et Galloprovinciâ ex cl. Lois.

ORIGANUM SMYRÆNUM Linn. sp. 823. ♀ in montibus Corsicæ supra Corté ex cl. Viv.

THYMUS MASTICHINA Linn. mant. 413. La Peyr. abr. 340. ♂ in Pyrenæorum regione vulgo dictâ le pays basque ex auctoritate Tournefortii indicat cl. La Peyr.

PINGUICULA VILLOSA Vill. dauph. 2. p. 445. Lois. gall. II. 1. p. 14. in Linn? (I) in Alpibus Delphinatûs.

STATICÆ CORDATA Linn. sp. 394. Lois. gall. II. 1. p. 224. ♀ in littoribus Mediterranei ex Lois.

STATICÆ ALLIACEA Poir. ic. rar. 2. t. 109. Lois. gall. II. 1. p. 223. ♀ in arenis Telonis ex cl. Lois.

SALICORNIA RADICANS Bocan. an eng. bot. t. 1591? in Corsicâ ex Viv. — An ne potius *S. macrostachya* Moric.?

CHENOPODIUM LANCEOLATUM Willd. enum. 42. Mér. fl. par. II. 2. p. 127. (I) in ruderatis circa Parisios.

CHENOPODIUM SCOPARIA Linn. sp. 321. Lois. gall. II. 1. p. 216. (I) in Galloprovinciâ? ex Lois.

ATRIPLEX GRÆCA Willd. sp. 4. p. 959. ♂ in Corsicâ ex Viviani.

ATRIPLEX GLAUCÀ Linn. sp. 1493. excl. syn. Barr. DC. fl. fr. 3. p. 385. — Dill. elth. 46. t. 40. f. 46. ♂ per errorem in Occitaniâ indicata.

RHEUM RHAPONTICUM Linn. sp. 531. DC. fl. fr. 3. p. 379. ♀ in montibus Arverniæ ex Delarbre indicatum per confusionem cum Ruminice Alpino.

RUMEX DIVARICATUS Linn. sp. 478. — Till. pis. 93. t. 37. f. 2. (I) in Pyrenæis ex La Peyr. — Species cæterum dubia.

RUMEX RUGOSUS Camp. mon. rum. 113. ♀ in Alpibus ex Linn. sed indicatio cl. Campderæ dubia videtur.

RUMEX LUXURIANS Linn. fil. supp. 212. — Bocc. mus. 165. t. 126. ♀ in Galliâ ex Dumont-Courset.

EUPHORBIA CORALLOIDES Linn. sp. 659. E. dulcis DC. fl. fr. 3. p. 341 non Linn. ♀ nondum, ut videtur, in Galliâ reperta.

SALIX LAURINA Willd. sp. 4. p. 662. Lois. gall. II. 2. p. 343. ♂ in Cebennis et montibus Delphinatûs ex cl. Lois.

SALIX UNDULATA Ehr. beytr. 6. p. 101. ♂ circa Lutetiam passim ex Lois.

SALIX PONTEDERANA Willd. sp. 4. p. 61. excl. Vill. syn. DC. fl. fr. 5. p. 348. ♂ dubitanter a La Peyr. in Pyrenæis indicata; in Alpibus Delphinatûs ex Lois.

- ALNUS CORDIFOLIA** Ten. cat. 1819. p. 65. DC. fl. fr. 5. p. 350 excl. syn. Lois. 5
in Corsicā ex anoritate cl. Robert in florā Gallicā l. c. indicata, sed, ut
videtur, per confusionem cum A. cordata.
- QUERCUS ÆGYLOPS** Linn. sp. 1414. DC. fl. fr. 3. p. 312. — Lob. ic. 2. p. 156.
f. 1. 5 Orienti indigena per confusionem cum Q. Cerri in Galliā indicata.
- PINUS RIGIDA** Lamb. mon. Willd. sp. 4. p. 498. 5 in Pyrenæis ex La Peyr.
- POTAMOGETON SETACEUM** Linn. sp. 184. Lois. gall. I. p. 96. 2 in fossis stagni
Sancti Gratiani circā Parisios ex cl. Lois.
- OPHRYS SPECULUM** Bert. pl. gen. 124. Lois. II. 2. p. 271. 2 in Galloprovinciā
circā Grasse ex Lois.
- IRIS SAMBUCINA** Linn. sp. 55. Red. lil. t. 338. 2 in ripibus umbrosis vallis
Lavedan Pyrenæorum ex La Peyr.
- NARCISSUS RADIFLORUS** Salisb. prod. 225. N. angustifolius bot. mag. 193. 2 in
Gallia australi ex Spreng.
- NARCISSUS TRIANDRUS** Linn. sp. 415; bot. mag. 48 et 1262. 2 in Pyrenæis ex
cl. Sprengel.
- CONVALLARIA LATIFOLIA** Jacq. aust. t. 282. non DC. fl. fr. 3. p. 176. 2 in
Germaniā crescens, nondum in Galliā reperta.
- FATILLARIA INVOLUCRATA** All. auct. 34. Lois. gall. II. 1. p. 240. 2 in Alpibus
Galloprovinciæ, Delphinatūs ex Lois.
- ALLIUM LITTOREUM** Bert. am. it. 241. 2 in Galloprovinciā ex Spreng.
- ALLIUM SIBERICUM** Linn. mant. 562. La Peyr. abr. 182. 2 in Pyrenæorum
Laurenti valdè Eynes etc. ex La Peyr.
- ALLIUM DESCENDENS** Linn. sp. 427. 2 in vineis agri Ruscinonensis circā Olette
et Villefranche.
- ALLIUM PARVIFLORUM** Linn. sp. 427. Vill. dauph. 2. p. 257. La Peyr. abr. 180.
2 in pratis Delphinatūs circā Durbon et Piegion ex Vill., Pyrenæorum ex
La Peyr.
- ALLIUM ARENARIUM** Linn. sp. 426. Vill. dauph. 2. p. 254. 2 in regione Delphi-
natūs dictā le Chamsaur, Vapincum, etc., ex Vill.
- SCILLA PERUVIANA** Linn. sp. 442. — *Hyacinthus stellatus* peruv. fl. cœrul.
Moris. s. 4. t. 12. n. 19. 2 in Corsicā plantam peruvianam indicat cl. Viv.
cors. 5.
- SCILLA ITALICA** Linn. sp. 442. DC. fl. fr. 3. p. 213. bot. mag. t. 663. — Besl.
eytt. vern. 42. f. 1. 2. 2 in petrosis et umbrosis circā Nicæam ab All. indicata,
sed, ut videtur, per confusionem cum S. Bertolonii.
- JUNCUS INFLEXUS** Linn. sp. 464 La Peyr. abr. pyr. 193. Lois. gall. ed. 1. p. 203.
2 circā Parisios ex Lois., in Pyrenæis ex La Peyr. — Species cæterū dubia
et probabiliter a J. glauco non distincta.
- ARUM TENUIFOLIUM** Linn. sp. 1370. DC. fl. fr. 3. p. 153. — Lob. ic. t. 599.
f. 1. 2. 2 circā Monspelium per errorem, ut videtur, indicatum.
- CYPERUS PANNONICUS** Linn. supp. 103. Jacq. aust. app. t. 6. (I) in editioribus
Pyrenæis ex cl. Loisel.
- CYPERUS GLABER** Linn. mant. 179. (I) dubitanter a cl. Lois. gall. II. 1. p. 33. in
Delph. Occit. Pyrenæis indicatus.
- CAREX SCHENOIDES** DC. fl. fr. 3. p. 104 non Host? 2 valdè dubia civis.
- SESLERIA SPHEROCEPHALA** Ardnin. sp. 2. p. 2. t. 2. Host. gram. t. 99. S. lenco-
cephala DC. fl. fr. 3. p. 76. 2 in Alpibus Salisburgensibus, sed non in Galliā
crescens.
- SESLERIA TENELLA** Host. gram. 2. t. 100. S. microcephala DC. fl. fr. 3. p. 76
excl. syn. Ard. et Jacq. 2 in Alpibus Carinthiacis.

SESLERIA ELONGATA Host. gram. 2. t. 97. DC. fl. fr. 5. p. 280. • quæ ex fide Schleicheri, ut a cl. Zeyhero Michelfeldæ propè Huningam detecta indicata fuit, nunquam ibi lecta fuit; sed ex horto Carternhano illi missa, ipso Zeyhero id nuper denuò asseverante. • Hagen. fl. basil. 1. p. 70.

ARUNDO ALTISSIMA Benth. cat. 62. 2^l ad littora maris Catalonica propè *Barcelonne* ex cl. Benth., sed fortasse in agro Ruscinonensi ad fontem Saleenii reperienda.

* *ARUNDO FESTUCOIDES* Desf. atl. 1. p. 108. t. 34. Lois. gall. II. 1. p. 61. 2^l hæc Mauritaniae et Sardiniae indigena nondum in Gallia certò reperta fuit.

AIRA MINUTA Lois. gall. II. 1. p. 56 an Linn? (I) in Corsicâ ex cl. Lois.

POA REPENS Bieb. cauc. 3. p. 69. *Dactylis repens* Desf. atl. 1. p. 79. t. 15. Lois. gall. II. 1. p. 69. 2^l in Gallia australi ex cl. Lois.

NITELLA OPACA Agardh syst. alg. 124. *Chara flexilis* eng. bot. t. 1070. — In aquis stagnantibus circa *Caen* ex cl. Lenormand.

POLYSTICHUM SPINULOSUM DC. herb. non fl. fr. *Aspidium spinulosum* Sw. 2^l in sylvis propè *Verviers*, sed nondum in Gallia repertum.

SCOLOPENDRIUM HEMIONITIS Sw. syn. fil. 89. *Hemionitis peregrina* Clus. 2. p. 214. 2^l in Gallia nunquam repertum.

MARCHANTIA TRIANDRA Scop. carn. 2. p. 354. t. 63. Balb. diss. p. 4. f. 1. — In rupibus circa *Fremilly* propè Parisios ex cl. Mérat.

ROCELLA TINTORIA DC. fl. fr. 2. p. 324. — Eng. bot. t. 211. — Dill. musc. t. 17. f. 39. — Ex insulis Azoricis, Canariis, etc., orta, per errorem, ut videtur, ad rupe Galliae indicata.

PATELLARIA LIMOSA. *Lecidea limosa* Ach. lich. 182.—Ad terram in ericetis propè Parisios ex Chevall.

ÆCIDIUM RHAMNI Pers. obs. 1. t. 2. f. 4. — In foliis Rhamni Frangulae circa Parisios ex Chevall.

SPHACELARIA SCOPARIOIDES Lyngb. tent. t. 32. — Ad littora Galliae ex Agardh.

§. 3. *Ob characteres dubios aut speciem non satis certam.*

RANUNCULUS INSULARIS Viv. cors. app. 2. — In montibus Corsicæ.

RANUNCULUS DEALBATUS Lapeyr. abr. 315. 2^l in Pyrenæis editioribus. — Ex specimine incompleto in herb. Lapeyr. conjectit cl. Arnolt hanc speciem forsitan reverè distinguendam esse.

HYPOCNUM GRANDIFLORUM Benth. cat. 91. — An satis ab *H. procumbente* distinctum?

FUMARIA LEUCANTHA Viv. cors. 12. — Circà Bonifacio. An diversa a *F. parviflora*?

ARABIS MULTIFLORA Lapeyr. abr. 386; supp. 93. (2) in Pyrenæis ad montem Chatelet. — An *A. sagittata* ut ex autopsiâ censem cl. Arnolt.

ARABIS INTEGRIFOLIA La Peyr. abr. 385; supp. 93. (1) in Pyrenæis loco dicto *Mail du Cristal*.

TURRITIS SETOSA La Peyr. supp. 93. 2^l in Pyrenæis. — Au Brassica Cheiranthos, ut me monet cl. Arnolt.

CARDAMINE BOCCONI Viv. cors. app. 4. et illo teste Bocc. mus. p. 171. t. 116. — In montibus Corsicæ.

CARDAMINE HETEROPHYLLA La Peyr. abr. 377. (2) in Pyrenæis ad apicem montis *Pic du Midi*. — *C. resedifolia* ex cl. Arnolt.

IBERIS PYRENAICA La Peyr. abr. 370. (1) in Pyrenæorum valle *Gistain* propè *Sin*.

- SISYMBRIUM GALlicum** Willd. enum. 678. — Species obscura, nec adhucdum satis definita.
- LEPIDUM POLlichii** Roth. germ. II. 91. (I) in Alsatiâ ex Lois. — An L. Iberis aut L. sativi var. laciniata?
- THLASPI SCAPIFLORUM** Viv. cors. app. 3. — In monte *Coscione Corsicæ*.
- BRASSICA RECTANGULARIS** Viv. cors. app. 5. — In Corsicâ propè *Cagna*.
- HESPERIS TRILoba** Lam. dict. 3. p. 323. Lois. gall. II. 2. p. 77. (I) in Stachydibus ex Lois.
- CISTUS CORsicus** Lois. gall. II. 1. p. 380. ♂ in Corsicâ circa *Ajaccio* ex cl. Loisel.
- Dianthus integer** Mer. fl. par. ed. II. t. 1. p. 331. ♀ circa Parisios.
- Dianthus biflorus** Mer. fl. par. ed. II. t. 1. p. 331. ♀ circa Clermont sur Oise.
— An D. deltoides ex cl. L. Graves in litt.?
- Silene alsinoides** Viv. cors. 6. — In monte *Coscione*.
- Silene nodulosa** Viv. cors. 6. — In Corsicâ propè Bonifacio.
- Silene Xerantheme** Viv. cors. 7. — Cum priori.
- Sagina filiformis** Pourr. chl. hisp. n. 593. ex La Peyr. abr. supp. 27. (I) in Pyrenæis promiscua cum S. procumbente quâcum confunditur.
- Cerastium Laricifolium** Vill. dauph. 3. p. 644. t. 48. — In montibus Delphini natûs circa *le Buis*, monte Ventoso, etc.
- Cerastium molle** Vill. dauph. 3. p. 644. — In editoribus Alpibus Delphinatûs circa *la Mure*, *Prémol*, etc.
- Cerastium alsinoides** Pers. enc. 1. p. 521. — Circâ Burdigalam.
- Cerastium litigiosum** De Lens in Lois. gall. II. 1. p. 323. (I) in aridis Lutetiae.
- Cerastium tenue** Viv. cors. 7. — In Corsicâ propè *Tolano*, secus vias.
- Cerastium heterophyllum** Viv. cors. 7. — In Corsicæ montibus.
- Malva hirsuta** Ten. fl. neap. ex Viv. cors. 12. — In Corsicâ australi.
- Malva ribifolia** Viv. cors. app. 5. — In Corsicæ montibus.
- Malva circinnata** Viv. cors. app. 6. — In Corsicâ.
- Erodium cuneatum** Viv. cors. app. 5. — In ruderatis circa *Ajaccio* Corsicæ.
- Rhamnus lycioides** Lois. gall. ed. I. p. 137. — In provinciis australibus.
- Genista? heterophylla** DC. prod. 2. p. 152. *Cytisus heterophyllum* La Peyr. abr. 422. ♂ in Pyrenæis ad Monney.
- Genista gymnoptera** Spartium gymnopterum Viv. cors. app. 6. — In rupibus maritimis Corsicæ.
- Ononis rhinanthoides** La Peyr. abr. 407. (I) in Pyrenæis ad montem *Cagire*. — *Vexillum purpureum*.
- Ononis scabra** La Peyr. abr. 407. (I) in Pyrenæis orientalibus. — *Cor. alba vexillo roseo*.
- Ononis capuca** Vill. dauph. 3. p. 428. — In vineis circa *Mont Dauphin*.
- Medicago media** Pers. enc. 2. p. 356. ♀ in pratis collibus et versuris agrorum ex Pers. — An M. sativæ var.?
- Medicago marginata** Willd. enum. p. 802. (I) in Europâ australi ex Willd.. — Varietas M. orbicularis?
- Medicago tentaculata** Willd. sp. 3. p. 1413. Ser. in DG. prod. 2. p. 177. (I) in Europâ australi ex Willd.
- Medicago nigra** Willd. sp. 3. p. 1418. — Moris. hist. 2. sect. 2. t. 15. f. 19. (I) in Gallia australi ex Willd.

MEDICAGO TRUNCATULA Gærtn. Benth. cat. 103. (1) circa Monspelium ex cl. Benth.

MELILOTUS ALTISSIMA Thunl. fl. par. ed. 2. p. 378. (2) circa Lutetiam. — Fl. albi-

TRIFOLIUM SYLVATICUM Gér. in Lois. not. p. 111. — In Galloprovinciæ sylvâ Maurorum — Planta lanugine sericeâ vestita Cor. purpureæ Spica uncialis constans floribus ultra 40. (Gér.)

TRIFOLIUM LONGISTIPULATUM Loja gall. II. 2. p. 122. (1) ? in Corsicâ circa Bonifacchio. — An T. squarrosum?

LOTUS DIOSCORIDIS All. ped. t. 59. f. 1. Ser. in DC. prod. 2. p. 212. — Circa Niçæam ex Allioni.

LOTUS SUAVEOLENS Pers. encr. 2. p. 354. Ser. in DC. prod. 2. p. 213. — In Gallia australi ex Pers.

HEDYSARUM UNIFLORUM La Peyr. abr. 434. 2/ in inter saxa Pyrenæorum. — Fl. lutea.

VICIA GALLOPROVINCIALIS Poir. supp. 5. p. 471. Ser. in DC. prod. 2. p. 356. — Ger. gallop. p. 497. n. 5. t. 19. 2/ in pratis montanis Galloprovinciæ australis.

VICIA CORNIGERA Chaub. in St. Am. fl. agenn. 294. (1) in arenosis propè Aginum. — An V. sativa angustifolia? ang. ser.

POTENTILLA CRASSINERVIA Viv. cors. app. 2. — In monte Coscione Corsicæ.

ROSA ARISTATA La Peyr. fl. pyr. t. 105. ex Lindl. ros. 33. Ser. in DC. prod. 2. p. 606. 3 propè Valletriam (Barreges).

CRATAEGUS LÆVIGATA DC. prod. 2. p. 630. *Mespilus lævigata* Poir. dict. 4. p. 441. 3 in Vogesis.

MESPILUS ELEGANS Poiret dict. 4. p. 439. 3 circa Lutetiam.

ILLECEBRUM NARBONENSE Vill. in Schrad. journ. 1801. p. 411. Circa Narbonam.

SEDUM ARISTATUM Vill. dauph. 4. p. 680. t. 45. 2/ in Delphinatû propè Sigoyer.

HERACLEUM SETOSUM La Peyr. abr. 153. 2/ in Pyrenæis. — Hanc speciem H. Pyrenaico refert cl. Bentham.

HERACLEUM TESTICULATUM La Peyr. abr. supp. 44. 2/ in demissoribus Pyrenæis. — Hoc cum dubio H. Alpino refert cl. Benth.

BUPLEUREUM REPENS La Peyr. abr. pyr. 139. 2/ in Pyrenæis loco dicto Port de plan. — Hanc speciem sequentemque B. ranunculoidi refert cl. Benth.

BUPLEURUM OBTUSATUM La Peyr. abr. supp. p. 42. 2/ in Pyrenæis orientalibus.

AMMI PYRENÆUM La Peyr. abr. 145. (1) in pratis propè St. Beat.

CHÆROPHYLLUM ALPINUM Vill. dauph. 2. p. 642. DC. fl. fr. 4 p. 288. (2) in Alpibus Delphinatû ex Vill. — Specimina desunt et in herbario meo et in herb. Cannolliano.

GALIUM PAPILLOSUM La Peyr. abr. pyr. 66. 2/ in Pyrenæis. — Fl. albi, fr. papillosus. — An G. lave aut G. Bocconi?

GALIUM FRAGILE Poir. chl. hisp. n. 512. ex La Peyr. abr. supp. 23. (1) circa St. Paul de Fenouilletèdes. — Fr. glaber.

GALIUM ATRO-VIRENS La Peyr. abr. supp. 22. 2/ in rupibus montium Pyren. demissoribus. — Fr. lavis.

GALIUM MARCHANDI Roni. et Sch. syst. 3. p. 528. G. hirsutum La Peyr. abr. supp. 25. 2/ in monte Pyrenæorum Héas. — Fr. papillaris.

ASPERULA MULTIFLORA La Peyr. abr. pyr. 62. 2/ in altissimis Pyrenæorum mediiorum. — An A. Cynanchicæ var.?

SCARIOSA SETIFERA Lam. ill. n. 1321. Poir. dict. 6. p. 723. 2/ circa Massiliam ex cl. Poiret.

SCABIOSA MEDITERRANEA Viv. cors. app. 1. — In sylvis montanis Corsicæ.

- CINERARIA BICOLOR* Willd. sp. 3. p. 2085. Viv. cors. 15. — In Corsica ex Viv.
- SENECIO CINERARIOIDES* Viv. ad calcem fl. lyb. 68. — In Corsica.
- SENECIO FLABELLATUS* Viv. cors. app. 6. — In Corsicæ collibus siccis circa Castel Sardo.
- SOLIDAGO NUMIFLORA* Viv. cors. B. — In monte Talano Corsicæ.
- SOLIDAGO RETICULATA* La Peyr. abr. pyr. 520. ♀ in Pyrenæis Orientalibus. — An *S. virgæ-aureæ* var.?
- GNAPHALIUM MICROPHYLLUM* Willd. sp. 3. p. 1864. Viv. cors. 15. — In Corsica australi ex Viv. — An *Elichrysum angustifolium*?
- ACHILLEA FALCATA* La Peyr. abr. 534. ♀ in Pyrenæis.
- ARTEMISIA SIEVERSTIANA* Lois. gall. 2. p. 234 non Willd. ② in agris Corsicæ circa Ajaccio ex cl. Lois.
- ARTEMISIA INSIPIDA* Vill. dauph. 3. p. 249. t. 35. — in Delphinatu circa les Baux.
- SANTOLINA PECTINATA* Benth. cat. 117 an Lagascæ? ♂ in agro Ruscinonensi propè *Prats de Mollo* ex cl. Benth.
- ONOPORDUM HORRIDUM* Viv. cors. 14. — circa Bonifacio in Corsicæ.
- CARDUUS FASCICULIFLORUS* Viv. cors. app. 6. — Reperitur circa Vignolla et Parao, in Corsicæ.
- CARDUUS SANCTÆ-BALMÆ* Lois. non. not. 34. gall. II. 2. p. 216. ♀ circa Telenem loco dicto *Sainte-Baume* ex Lois.
- CYNARA CORSICA* Viv. ad calc. fl. lyb. 68. — in Corsicæ Bonifacio.
- CENTAUREA FILIFORMIS* Viv. cors. app. 6. — in vertice montis Corsicæ *Tavolara*.
- CENTAUREA VARIIFOLIA* Lois. not. p. 130, gall. II. 2. p. 211. ♀ in Galloprovincia? — *C. scabiosæ* var.?
- LACTUGA SONCHOIDES* La Peyr. abr. pyr. 461. et supp. 121. ♀ in Pyrenæis. — An *L. perennis* var.?
- LACTUCA ASPERRIMA* Mér. par. ed. II. t. 2. p. 231. ① in septo Bougival propè Parisios.
- LACTUCA CHAIXI* Vill. dauph. 3. p. 154; t. 32. ① in sylvis Delphinatū circa les Baux, Babon et Chaudun.
- CREPIS GLANDULOSA* Bast. journ. bot. 1814. 3. p. 17. — in vallibus Montis-Aurei. — An *Crepis biennis*?
- HIERACIUM INTERMEDIUM* La Peyr. abr. 471. ♀ in Pyrenæis. — An var. *H. sylvatici*?
- HIERACIUM DENUDATUM* La Peyr. abr. 473. ♀ in Pyrenæis. — An *H. sylvaticum*?
- HIERACIUM ERIOPHORUM* La Peyr. abr. 474 non DC. ♀ An specimina in Pyrenæis reperta *H. Sabando*, aut *H. murorum* β lanuginoso, aut novæ speciei pertinent.
- HIERACIUM EHOMEIOIDALE* La Peyr. abr. 477, mem. toul. 1. p. 215. t. 18. ♀ in pratis Pyrenæorum.
- HIERACIUM COPULORUM* La Peyr. abr. supp. 124. ♀ in Pyrenæis. — An *H. saxatilis* var.?
- HIERACIUM ALTISSIMUM* La Peyr. abr. supp. 125. ♀ in Pyrenæis Orientalibus.
- HIERACIUM CORDIPOLIUM* La Peyr. abr. supp. 128. ♀ in Pyrenæis propè *Saint-Beat*. — *H. Sabaudi* var.?
- HIERACIUM (LEPICAUNE)* turbinatum La Peyr. abr. 480. ♀ in Pyrenæis.
- HIERACIUM HISPIDO-MACULATUM* La Peyr. fl. burd. ed. II. p. 341. ♀ Burdigalæ.
- HIERACIUM LORTETIUM* Balb. fl. lugd. 1. p. 450. ♀ in monte Pilato. — An ab. *H. murorum* distinctum?

SCOREZONEA VARIFOLIA Laterr. fl. burdig. ed. II. p. 336. \mathcal{U} propè Burdigalam.

CICHORIUM DIVARICATUM Schousb. marocc. 197. Lois. gall. II. 2. p. 198. (1) in agris circa Telonem ex Loisel.

CAMPANULA BELLIDIFOLIA La Peyr. abr. pyr. supp. 36. (1)? in Pyrenæis.

ERICA UMBELLIFERA Lois. not. 63; gall. II. 1. p. 276. \mathfrak{h} in agro Ruscinonensi circa Elne.

CUSCUTA DENSIFLORA Villemet in ann. soc. linn. par. 1825. p. 281. (1) Lini parasitica.

ANCHUSA CRISPA Viv. cors. app. 1. — in Corsicæ collibus.

CYNOGLOSSUM PELLUCIDUM La Peyr. abr. supp. 28. (1) in Pyrenæis editioribus.

ECHIUM MAGALANTHOS La Peyr. abr. supp. 29. E. grandiflorum La Peyr. abr. go. (2) propè Saint-Béat.

VERBASCUM THAPSOIDES Lam. dict. 4. p. 216 an Linn. sp. 1669? DC. fl. fr. 3. p. 600 non Hoffm. et Linck. fl. port., nec Schrad. verb. (2) in arvis Delphinatus ex Vill. — An var. V. Thapsi aut V. thapsiformis aut V. phlomoidis?

DIGITALIS INTERMEDIA La Peyr. abr. pyr. 357. — in umbrosis Pyrenæorum.

LINARIA ALSINÆFOLIA Spreng. syst. veg. 2. p. 792. *Antirrhinum alsinæfolium* Viv. cors. 10. — in insulis inter Corsicam et Sardiniam ex Viv.

ANTIRRHINUM FILIFORME Poir. supp. 27. — in Galloprovinciâ propè Salun.

SALVIA AGRESTIS Vill. dauph. 2. p. 402. \mathcal{U} secùs vineas circa Saint-Paul-Trois-Châteaux.

STACHYS BETONICÆFOLIA Pers. enc. 2. p. 124. \mathcal{U} circa La Rochelle.

OROBANCHE SPECIOSA DC. fl. fr. 5. p. 393. \mathcal{U} in agro Telonensi. — Cuinam plantæ parasitæ?

OROBANCHE GRACILIS Sm. trans. linn. 4. p. 172. Wallr. orob. 39. \mathcal{U} Ad plantarum (quarumnam?) radices per Galliam ex Wallr.

OROBANCHE RETICULATA Wallr. orob. p. 42. — propè Tolosam ex Wallr.

STATICE HYBRIDA ann. soc. Linn. burd. 1825. p. 47. \mathcal{U} in maritimis Armoricae.

PLANTAGO SESSILIFLORA La Peyr. abr. pyr. 72. \mathcal{U} in rupestribus Pyrenæorum.

ATRIPLEX MICROSPERMA Lois. gall. II. 1. p. 218. non Waldst. et Kit. (1) in arvis Galliæ borealis.

RUMEX PUSILLUS Delarb. fl. auv. ed. II. p. 523. — Tabern. ic. 437. (2) in humidis et ruderatis. — An var. R. acutis? ex cl. Campd.

RUMEX PYRENAICUS Pourt. ex La Peyr. supp. 49. — In pascuis siccis Pyrenæorum ex La Peyr.

EUPHORBIA MUCRONATA La Peyr. abr. 271. \mathfrak{h} circa Collioure in agro Ruscinonensi.

EUPHORBIA LONGIRADIATA La Peyr. abr. supp. 65. \mathcal{U} circa Prades in agro Ruscinonensi.

EUPHORBIA SQUAMIGERA Lois. gall. 729, II. t. 29. (1)? in agris et locis humidis circa Telonem. — An var. E. platyphyllus? ex cl. Reper.

EUPHORBIA THYMIFOLIA Lois. gall. I. p. 727, II. 1. p. 338 non Linn? (1) in maritimis Galloprovinciæ.

EUPHORBIA SEMIPERFOLIATA Viv. cors. 7. \mathcal{U} Alla Trinita in Corsicæ.

EUPHORBIA ILLYRICA Lam. dict. 2. p. 435. Lois. gall. 728. \mathcal{U} in Gallia austro-occidentali ex Lois.

ULMUS PYRENAICA La Peyr. abr. supp. p. 154. \mathfrak{h} in Pyrenæis secùs viam quæ tendit ad Port de la Picade.

- QUERCUS VIMINALIS* Bosc. mem. p. 12. ♂ in montibus Galliae orientalis.
- QUERCUS MICROCARPA* La Peyr. abr. pyr. 582. ♂ in sylvis Pyrenæorum ex La Peyr.
- QUERCUS STOLONIFERA* La Peyr. fl. pyr. t. 191 ex abr. 582. ♂ in demissioribus Pyrenæis.
- QUERCUS ALZINA* La Peyr. abr. 584. — In valle Andorræ Pyrenæorum.
- SALIX LAURIFOLIA* Delarb. aun. ed. II. p. 740. ♂ in valle balneorum Montis-Aurei. — S. pentandra videtur.
- SALIX SPADICEA* Vill. dauph. 3. p. 777. ♂ in Delphinatū regione dictā le Cham-saur circa Chabottes.
- SALIX FLUGGEANA* Willd. sp. 4. p. 709. S. oleæfolia Vill. dauph. 3. p. 784. non Sm. ♂ circa Gratianopolim, Vapincum, Lugdunum ex Vill.
- PINUS PYRENAICA* La Peyr. abr. supp. 126. ♂ in Pyrenæis.
- POTAMOGETON LONGIFOLIUM* Poir. supp. t. 4. p. 525. ♀ circa Lutetiam. — An distinctum à P. oblongo?
- ORCHIS CORSICA* Viv. cors. 16. ♀ circa Bonifacio.
- ORCHIS PICTA* Lois. gall. II. 2. p. 263. ♀ circa Telonem.
- OPHYRS FUNEREA* Viv. cors. 15. ♀ in collibus Corsicæ australis.
- OPHYRS CANALICULATA* Viv. cors. app. 7. ♀ in collibus Corsicæ circa Bonifacio.
- OPHYRS FUSCA* Willd. sp. 4. p. 69. St.-Am. fl. agen. p. 375. t. 8. ♀ in pratis circa Aginnum. — An distincta ab. O. araniferā?
- LIMODORUM SPHÆROLABIUM* Viv. cors. app. 6. ♀ propè Bonifacio.
- CROCUS TRIPHYLLUS* Lois. gall. II. 1. p. 27. ♀ in pratis Alpium inferiorum Galloprovinciæ.
- NARCISSUS JUNCIFOLIUS* Lois. I. c. p. 237. ♀ in Occitaniâ et Galloprovinciâ.
- JUNCUS INSULARIS* Viv. cors. 5. — In Corsicâ circa Bonifacio.
- JUNCUS MACROCEPHALUS* Viv. cors. 5. — In Corsicâ circa Bonifacio.
- JUNCUS SCHÆNOIDES* Mérat par. II. 2. p. 75. ♀ in humidis propè Parisios.
- CAREX VILLARSII* Schk. car. f. 122. C. Valdensis Vill. dauph. 2. p. 196. t. 6. ♀ in Delphinatū circa Allevard, Laut du Pont et Sept-Laux.
- CAREX FURCATA* La Peyr. abr. pyr. 568. ♀ in Pyrenæis propè St.-Béat.
- CAREX SPHÆRICA* La Peyr. abr. 570. ♀ in pascuis Pyrenæorum orientalium loco dicto aux Canals de Lecca des Albères.
- CAREX ALOPECUROS* La Peyr. abr. pyr. supp. 141. ♀ in montibus vallis Garonne propè Melles.
- CAREX CUSPIDATA* Degland in Lois. gall. II. 2. p. 194. an Willd. ♀ circa Lutetiam. — Videtur C. glauca forma?
- CAREX NEGLECTA* Degl. I. c. ♀ juxta Harfleur.
- CAREX XANTHOCARPA* Degl. I. c. ♀ in palustribus circa Château-Gonthier.
- CAREX PALLIDIOR* Degl. I. c. ♀ in agro Telenensi et circa Lutetiam.
- CAREX RETUSA* Degl. I. c. p. 307. t. 30. ♀ in agris Galliae australis.
- CAREX PROVINCIALIS* Degl. I. c. t. 31. ♀ in uliginosis Galloprovinciæ.
- CYPERUS BIFIDUS* Pourr. chl. hisp. n. 174 ex La Peyr. abr. supp. 9. ♀ in pratis Pyrenæorum orientalium.
- SCIRPUS LEPTALEXUS* Koch syll. pl. nov. in bot. zect. 1824. p. 8. Loisel. gall. II. 1. p. 35. (1) in pascuis paludosis Armoricae, Cebennarum, Lutetiae.
- SCIRPUS RADICANS* Schkuhr in hist. ann. bot. 4. p. 48. t. 1. Lois. I. c. p. 37. ♀ ad ripas fluminum ex Lois.

CALAMAGROSTIS DONACIFORMIS Lois. gall. II. I. p. 53. \mathcal{U} secus vias circa Forum Julii.

AGROSTIS EXILIS Lois. nouv. not. 7; gall. II. I. p. 50. (I) in sylva Galloprovinciae de l'Esterelle.

GASTRIDITUM MUTICUM Spreng. syst. veg. I. p. 250. Lois. gall. II. I. p. 49. (I) in arenosis Galloprovinciae ex Lois.

MILIUM PURPUREUM La Peyr. abr. pyr. 33. (I) in Pyrenæis orientibus circa Fort-Sarral.

AIBA FESTUCOIDES Vill. dauph. 2. p. 85. Loisel. I. c. \mathcal{U} in Delphiuatû ex Villars.

POA DIVARICATA Vill. dauph. 2. p. 127. \mathcal{U} in Alpibus Delphinatû inter Rhododendra.

FESTUCA LEMANII Bast. est. p. 36. \mathcal{U} in collibus et pratis siccis Andegaviæ ex Bast. — Varietas F. glaucæ?

FESTUCA BULBOSA Dubois in Delarb. anv. II. p. 696. — In pratis Arverniciæ circa Sarliève.

FESTUCA MONTIS-CELTICI Delarb. anv. II. p. 696. — In monte *Canital*.

FESTUCA MONTIS-AUREI Delarb. anv. II. p. 696. \mathcal{U} in monte-Aureo ad fontes Dordonieæ.

FESTUCA INCRASSATA Lois. gall. II. I. p. 85. (I) in Galliâ australi ex Lois.

BROMUS REQUIENII Lois. I. c. p. 90. (I) in insulis Stæchadibus.

POLYPODIUM LESEBLII Merat. fl. Paris. ed. II. t. I. p. 277. — Propè Parisios.

TORTULA APODA De la Pyl. in Laterr. burdig. ed. II. p. 436. — Prope Burdigalam.

DICRANUM? PHASCOIDEUM Palis. de Beauv. prod. æth. 54. — Ad murum in sylva Auteuil.

RACOMITRIUM FLAVIPES Brid. math. 81. \mathcal{U} in Delphinatû det. cl. Dejean ex Brid.

HYPNUM TUMIDUM De la Pyl. in Laterr. burd. ed. II. p. 443. — Propè Burdigalam.

HYPNUM CIRCINATUM Brid. sp. 2. p. 148. \mathcal{U} in faucibus *d'Olioules* propè Telonem.

HYPNUM MONTANUM Lam. dict. 3. p. 173. — In Monte-Aureo ex Lam., agro Syrtico ex Thore.

JUNGERMANNIA AQUATICA Mer. par. I. p. 223. — Propè Parisios.

PARMELIA PUSILLA Ach. lich. univ. 472; syn. 204. — In Galliâ ad truncos Populi ex Ach.

PARMELIA DISTORTA Ach. syn. 219. — In Galliâ ex Ach.

COLLEMA FORMOSUM Ach. syn. 311. — In Galliâ suprà terram ex Ach.

ALLECTORIA THRAUSTA Ach. lich. 596. — In Galliâ ex Ach. Cryptogamas a Villars, Dubois, Delarb., etc. ut omnino ignotas incertasque et ad genera nequidem revocabiles omitto; sed omnes botanicos qui typos aut observationes de his aliisque suppeditare possent, ut mittere velint deprecor.

ARTHONIA ECRUSTACEA Léon Duf. in journ. phys. t. 87. p. 205. A. nudata Chevall. — In cortice Quercûs emortuæ.

ARTHONIA OCHRACEA L. Duf. I. c. Cenangium ochraceum Fries. — In cortice Quercûs Cerasi, in Galliâ austro-occidentali.

ARTHONIA OBTUSANGULA L. Duf. I. c. — In cortice Quercûs in Galliâ austro-occidentali rariùs.

- ARTHONIA CASTANEA* Chevall. in *journ. phys.* 1822. fl. par. 1. p. 541. — Ad truncos juvenes Castaneæ.
- ARTHONIA MACULARIS* Chevall. l. c. an Ach. ? — Ad truncos Aceris.
- ARTHONIA DILUTA* Chev. l. c. — Ad truncos juvenes Fraxini.
- ARTHONIA PLUMBEA* Chev. l. c. — Ad corticem juvenum arborum.
- ARTHONIA CERASINA* Chevall. l. c. — Ad truncos Cerasi.
- ARTHONIA LINEOLA* Chevall. l. c. fl. par. 1. p. 542. — Ad ramos Quercūs.
- ARTHONIA GELATINOSA* Chev. l. c. — Ad corticem Alni et Sorbi.
- ARTHONIA IMMERSA* Chev. l. c. — Ad cortices.
- ARTHONIA QUERCICOLA*, Chev. l. c. p. 544. — Ad ramos juniorum Quercuum.
- OPEGRAPHA PELLICULA* L. Duf. in *journ. phys.* t. 87. p. 211. — In cortice lævisculâ arborum circa Lutetiam.
- OPEGRAPHA ILLECEBROSA* L. Duf. l. c. — In ramis truncorum annosarum Quercum in Galliâ australi.
- OPEGRAPHA PUNCTULATA* L. Duf. l. c. — In cortice Quercus Galliæ meridionalis.
- OPEGRAPHA DIFFICILIS* L. Duf. l. c. — In ligno putrescente Salicis ad Parisios.
- OPEGRAPHA ACERVULATA* L. Duf. l. c. — Ad corticem lævigatam Quercus ad St.-Sever.
- OPEGRAPHA CORYLI* Chevall. *journ. de phys.* 1822. fl. par. 1. p. 521. — Ad truncum Coryli.
- OPEGRAPHA TILIACEA* Chevall. l. c. — Ad juvenes truncos Tiliæ.
- OPEGRAPHA GIGANTEA* Chevall. fl. par. l. c. p. 523. — Ad truncos Quercūs.
- OPEGRAPHA STIPATA* Chev. l. c. — Ad truncum Juglandis.
- OPEGRAPHA GIBBA* Chevall. *journ. phys.* 1822. fl. par. l. c. — Ad truncum Fraxini.
- OPEGRAPHA CRUSTACEA* Chev. ll. cc. — Ad truncum Carpini.
- OPEGRAPHA PUNCTIFORMIS* Chev. fl. par. 1. p. 524. — Ad corticem lævigatam Quercūs.
- OPEGRAPHA MUTABILIS* Chev. l. c. — Ad truncos vetustos.
- OPEGRAPHA IMPLEXA* Chev. l. c. — Ad truncos juvenes.
- OPEGRAPHA APPROXIMATA* Chevall. l. c. — Cum priori.
- OPEGRAPHA ASTEROMA* Chev. l. c. — Ad truncos vetustos denudatos.
- OPEGRAPHA CINerea* Chev. l. c. — Ad truncos Carpini et Mespili.
- OPEGRAPHA MINUTA* Chev. l. c. par. 532. — Ad truncum Salicis.
- OPEGRAPHA ULMARIA* Chev. l. c. — Ad juvenes truncos Ulmi.
- OPEGRAPHA PULICARIA* Chev. l. c. — Ad corticem lævigatam Ulmi.
- OPEGRAPHA SPURIA* Chev. l. c. — Ad rimas vetustorum truncorum.
- OPEGRAPHA PERTURBATA* Chev. l. c. — Ad aridas cortices.
- OPEGRAPHA DIFFUSA* Chev. l. c. — Ad truncos.
- OPEGRAPHA CANA* Chev. l. c. — Ad corticem lævigatam Æsculi.
- OPEGRAPHA LICHENOIDES* Chev. l. c. non Pers. — Ad truncos.
- OPEGRAPHA GLAUCOMA* Chevall. l. c. 539. — Ad corticem Fraxini.
- PYRENULA COMPOSITA* Ach. syn. 124. — In Galliâ ad corticem arborum lævigatam.
- PYRENULA PINGUIS* Chevall. *hist. verr. icon.* fl. par. 1. p. 518 an Fée. Spreng. syst. 4. p. 245. — Ad corticem Tiliæ, Fraxini.
- VERRUCARIA LATERITIA* Pers. in *act. soc. wett.* t. 2. Ach. syn. 96. — In Galliâ supra terram limosam.

VERRUCARIA GRISEA Chevall. hist. verr. ic., par. 1. p. 514. — In ramis Coryli et Aesculi.

VERRUCARIA CINEREA Chev. l. c. — In truncis annosis Aesculi.

LECIDIA FUSCATA Ach. lich. 211. — In saxis Galliae.

LECIDIA MELAMBOLA Ach. syn. 23. — Ad saxa Galliae australis ex cl. Sprengel.

LECIDIA SORDIDA Chevall. par. 1. p. 564. — Ad muros circà Clamarii.

LECIDIA EXPANSA Chevall. l. c. — Ad lapides silaceos in sylvis circà Versailles.

LECIDIA APPLANATA Chevall. l. c. — Ad lapides silaceos circà Parisios.

LECIDIA GLOBULOSA Chevall. l. c. p. 566. — Ad lapides silaceos propè Fontainebleau.

LECIDIA CÆSIA Chev. l. c. — Ad lapides calcarios Parisiorum in campo Martis.

LECIDIA FULGIANA. — Ad terram et muros argillaceos propè Parisios.

LECIDIA AGGREGATA Chev. l. c. p. 572. — Ad arborum corticem propè Parisios.

LECIDIA ATRO-FERRUGINEA Chevall. l. c. p. 578. — Ad muros et lapides propè Parisios.

LECIDIA PAPAVERACEA Chevall. l. c. — Ad rupes cretaceas ad Fontainebleau.

LECIDIA OLIVACEA Léon Duf. ex Fries syst. orb. veg. 1. p. 285. sub Biatora. — Ad saxa calcaria Galliae australis.

LECIDIA MOROSA Duf. ex Fries l. c. p. 286. — Ad rupes Pyrenæorum.

PSORA DENTICULATA Chevall. fl. par. 1. p. 641. t. 14. f. 1. — Ad terram in aridis sylvæ Compiègne.

LECANORA MORTOSA Ach. syn. 151. — Ad truncos arborum subputridos Galliae.

LECANORA STROBILINA Ach. syn. 171. — Ad squamas strobilorum Pini Cembræ et P. Piceæ in Galliâ.

LECANORA STONEI Ach. lich. 573. Lichen hæmatomma eng. bot. t. 486. — In muris lateritiis et ad corticem arborum Galliae.

LECANORA LEUCOCHROA Chevall. fl. par. 1. p. 550. — Ad rupes siliceas propè Compiègne. — A Lec. badiâ quantum ex descriptione videri licet, non diversa.

LECANORA EVANIDA Chevall. l. c. — Ad antiquos lateres circà Parisios.

LECANORA PULVERACEA Chevall. l. c. — Ad muros et mænia Parisiorum.

LECANORA PALLIDA Chevall. fl. par. 1. p. 558. — Ad rupes siliceas propè Compiègne, Fontainebleau.

URCEOLARIA VERRUCOSA Ach. lich. 339. — In ligno vetusto Galliae.

URCEOLARIA PERIMELAS Chevall. fl. par. 1. 548. — In rupibus sylvæ Compiègne.

URCEOLARIA RHIZOCARPON Chevall. l. c. — Ad lapides siliceos murorum propè Parisios.

URCEOLARIA NIVEA Chevall. l. c. t. 12. f. 8. — Ad lapides siliceos murorum propè Vincennes.

PORINA RUGOSA Ach. syn. 110. — In Galliâ ad corticem arborum.

VARIOLARIA CONGLOBATA Ach. syn. 132. — In Galliâ.

VARIOLARIA SULPHUREA Chev. fl. par. 1. p. 584. — Ad rupes propè Fontainebleau.

VARIOLARIA CERULESCENS Pers. in act. wett. vol. 2. — Ad muros vetustos Galliae.

SPILOMA DENDRITICUM Ach. syn. 3. — Ad crustam laevigatam Pertusariæ pustulatæ in Galliâ.

- SPILOMA ERUBESCENS** Chev. par. 1. 581. — In cortice antiquâ Quercum propé Parisios. — Status adultior Coniocarp. cinnabarinii?
- SPILOMA DECIPiens** Chevall. par. 1. p. 582. — Ad juniores truncos Carpini.
- SPILOMA RUBICUNDUM** Chevall. journ. phys. fébr. 1822. fl. par. 1. t. 12. f. 2. — Ad truncos Coryli.
- SPHÆRIA CURVATA** Chevall. hist. des hypox. ic. ex fl. par. 1. p. 498. — Ad truncos cæduos secùs strata lignea.
- SPHÆRIA NITENS** Chevall. fl. par. 1. p. 463. — Ad folia viridia Graminum.
- SPHÆRIA EQUISETI** Desmaz. crypt. exs. n. 183. — Ad caules siccus Equiseti in Galliâ boreali, vere.
- SPHÆRIA GROSSULARIA** Desmaz. cat. pl. om. 31. — Ad caudices propè Lille, vere.
- SPHÆRIA (DEPAZEA) LONICERÆ** Chevall. fl. par. 1. p. 452. — Ad folia Lonicerae Xylostei.
- SPHÆRIA (DEPAZEA) ELÆAGNI** Chevall. l. c. — Ad paginam superiorem foliorum Elæagni angustifoliæ.
- SPHÆRIA (DEPAZEA) VINCÆ** Chevall. l. c. non Fries. — Ad folia exsiccata Vincæ minoris, vere.
- SPHÆRIA (DEPAZEA) EGLANTERIÆ** Chevall. l. c. — Ad corticem ramorum Rosæ Eglanteriæ.
- DOTHIDEA RHYSMOIDES** Chevall. l. c. — Ad paginam inferiorum foliorum Alni.
- DOTHIDEA (ASTEROMA) LAUREOLÆ** Chevall. fl. par. 1. p. 418. — Ad paginam superiorem foliorum Daphnis Laureolæ cultæ.
- DOTHIDEA? (ASTEROMA) BRASSICÆ** Chevall. l. c. — Ad utramque paginam foliorum Brassicæ.
- DOTHIDEA (ASTEROMA) ATRATUM** ad paginam superiorem foliorum Solidaginis Virgæ aureæ.
- HYSERIUM STRIATUM** Chevall. fl. par. 1. p. 432. t. 11. f. 19. — Ad ligna denudata Salicis.
- HYSERIUM (LOPHODERMUM) PETIOLARE** Chevall. fl. par. 1. p. 436.
- CYTISPORA ATRO-NITENS** Chevall. fl. par. 1. p. 431. — Ad ramos emortuos Salicis viminalis, aut.
- TREMELLA BADIA** Chevall. fl. par. 1. p. 95. t. 7. f. 8. — Ad annosos truncos.
- HELVELLA SINUOSA** Brond. in ann. soc. linn. par. 1824. t. 3. f. 5. *Gyrocephalus aginnensis* Pers. l. c. — Ad terram in sylvis circâ Aginnum, vere. — An Tremella? an Helvella? aut Morchella? aut sui generis?
- STRICTIS BULLATA** Pers. myc. eur. 1. p. 339. — In ramis exsiccatis Castaneæ vescæ in Galliâ australi detecta a cl. Dufour ex Pers.
- TYMPANIS LONICERÆ** Fries el. fung. 2. p. 19. — Ad ramos Lonicerae Periclymeni in Vogesis.
- PEZIZA ACUUM** Pers. myc. enr. 1. p. 317. non Alb. et Schw. — In foliis adhuc viridibus Pini sylvestris propè Neufchâtel et probabiliter in Jurasso finitimo.
- PEZIZA BETULI** Pers. myc. eur. 1. p. 325. non Alb. et Schw. — Ad corticem Carpini Betuli in Vogesis.
- PEZIZA GLOBULARIS** Pers. myc. eur. 1. p. 326. *Cenangium Urceolus* Fries. — Ad ramos Betulæ albae in Vogesis ex cl. Pers.; in sylvâ Troissereux propè Beauvais ex cl. Graves.
- PEZIZA CLAVELLATA** Desmaz. crypt. exs. n. 175. — Ad caules semiputridos herbarum propè Lille, vere.
- PEZIZA CATULACEA** Desmaz. cat. pl. om. 15. — In sylvis propè Lille ad amenta putrida Coryli Avellanae, hyeme et vere.

PEZIZA MUSCIGENA Desmaz. cat. pl. am. 16. — Ad muscos in sylvis propè *Lille*, hyeme et vere.

PEZIZA AMPLISSIMA Balb. fl. lugd. 2. p. 304. — Ad terram circa *Lugdunum*, april.

PEZIZA LIMOSA Spreng. syst. veg. supp. p. 335. Balbis fl. lugd. 2. p. 311. — Ad limum circa stagna in *Bressia* ex cl. Balbis.

CLAVARIA SPATHULATA Chevall. fl. par. 1. p. 109. t. 8. f. 2. — Ad terram in sylvâ *Sénart* propè *Parisios*.

CLAVARIA SETACEA Desmaz. exs. n. 218. — Ad terram circa *Lille*, aut.

CLAVARIA DICHOTOMA Desmaz. cat. p. 16. — Ad terram in aggeribus circa *Lille*, aut.

CLAVARIA? CONICA. *Gomphus conicus* Pers. myc. eur. 2. p. 9. — In *Vogesis*.

THELEPHORA MONTAGNEA Balbis fl. lugd. 2. p. 294. — Ad ramulos deciduos *Fraxini* circa *Lugdunum*.

THELEPHORA JURATENSIS Pers. myc. eur. 1. p. 125. — Ad truncos *Fagi sylvaticæ* in summo *Jurasso*, aut.

THELEPHORA INTERMEDIA Desmaz. crypt. exs. n. 118. — Ad ramulos emortuos in *Galliâ boreali*.

HYDNUM SCUTATUM Pers. myc. eur. 2. p. 170. — In *Quercetis* circa *Versailles*, aut.

HYDNUM VIOLACEUM Thore in Pers. champ. com. 249. — Ad terram circa *Dax*, aut.

HYDNUM (HERICUM) UNGUICULATUM Pers. myc. eur. 2. p. 153. — Ad truncos *Crataegi?* in sepibus propè *Lugdunum*.

HYDNUM PALEACEUM Thore chl. land. p. 492. *Sistotrema paleaceum* Pers. myc. eur. 2. p. 203. — Ad truncos vetustos *Pineos* incisos propè *Dax*. An *Hydnum?*

HYDNUM PROLIFERUM Pers. myc. eur. 2. p. 213. — Ad truncos *Populi nigrae* in *Galliâ meridionali*.

HYDNUM? LOBATUM. *Sistotrema lobatum* Desmaz. cat. 19. — Inter herbas et folia demortua in sylvis propè *Lille*, aut.

BOLETUS UMBRINUS Pers. myc. eur. 2. p. 140. — In sylvula quâdam castaneâ, propè *Parisios* unicâ vice reperiit cl. Pers.

BOLETUS ACIDESCENS Pers. myc. eur. 2. p. 141. — In sylvâ *Vincennes* propè *Parisios*.

BOLETUS HORIZONTALIS Thore chl. 489. — Ad *Salices* et *Cerasos* in agro *Syrtico*.

BOLETUS CUTICULARIS Thore chl. 487. — Ad antiquos caudices in agro *Syrtico*.

BOLETUS VINOUS Thore chl. 488. — Ad trabes *Pineas* agri *Syrtici*.

BOLETUS PINI Thore chl. land. 487. — In *Pinis* agri *Syrtici*.

POLYPORUS DISSECTUS Letellier hist. champ. alim. et ven. — Propè *Parisios*.

POLYPORUS PACHYPSUS Pers. myc. eur. 2. p. 47. — In *Jurasso* propè *Neufchâtel*.

POLYPORUS RHEADES Pers. myc. eur. 2. p. 69. — Ad truncos in *Galliâ*.

POLYPORUS ARGYBACKUS Pers. myc. eur. 2. p. 73. — Cl. Persoon a D. Chaillet communicatus.

POLYPORUS? GLABERRIMUS. *Sistotrema glaberrimum* Pers. myc. eur. 2. p. 214. — Incolit rariùs truncos *Juglandinos* propè *Viennam Delphinatûs*.

CANTHARELLUS TURFOSUS. *Merulius turfosus* Pers. myc. eur. 2. p. 26. — In *Vogesorum* *turfosis* frequens.

CANTHARELLUS PERSOONII. *Thelephora lutescens* Pers. myc. eur. 1. p. 116. — Ad muscos, aest.

CANTHARELLUS BRACHOPODES Chevall. fl. par. 1. p. 240. t. 7. f. 5. — In nemoribus circa *Parisios*, aut.

- AGARICUS CRUCIGERUS** St.-Am. soc. agric. agen. p. 88. — Circà Aginnum.
AGARICUS TORQUATUS St.-Am. soc. agr. 87. — Circà Aginnum.
AGARICUS GYMNOPODIUS Bull. herb. t. 601. f. 1. — Circà Parisios.
AGARICUS ENEUS Letellier hist. champ. alim. et ven. — Circà Parisios?
AGARICUS CRYPTARUM Letellier l. c.
AGARICUS VESTITUS Chevall. fl. par. 1. p. 215. t. 6. f. 9. — Ad ramos demortuos
Quercùs, vere et aut.
AGARICUS PIGIS Fries syst. myc. 1. p. 177. A. odorus Vill. dauph. 2. p. 1015 non
Bull. — In Delphinatù.
AGARICUS TABACINUS DC. fl. fr. 5. p. 46. — In horto botanico Monspeliensi.
AGARICUS CAPNIOCEPHALUS Bull. herb. t. 547. f. 2. DC. fl. fr. 2. p. 177. —
AGARICUS HORIZONTALIS Bull. herb. t. 324. DC. fl. fr. 2. p. 194. — In rimis trân-
corum Pyri.
AGARICUS LATERALIPES Desmaz. cat. pl. am. 21. — Ad truncos in sylvis Galliae
borealis, aut.
AGARICUS ATRO-VIOLACEUS Desmaz. cat. 22. — In arvis post messem in Gallia
boreali.
AGARICUS CRASSIPES Desmaz. cat. 24. non fl. dan. nec Schæff. — Ad terram, in
sylvis circà Lille, aut.
AGARICUS GRISEO-PALLIDUS Desmaz. crypt. exs. n. 120. — Ad terram in hortis
circà Lille, aug.
TIPIALARIA FULVA Chevall. journ. phys. 1822. ic. fl. par. 1. p. 345. — Ad corti-
cem Ulmi propè Parisios.
PHILONOTIS SUBREA Chevall. fl. par. 1. p. 345. t. 9. f. 21. — Ad obturamenta
suberea in humidis deposita.
FULGIA ENCAUSTICA Chevall. in journ. phys. Feb. 1822. t. 1. f. 1. a.b. c. d. fl.
par. 1. p. 347. t. 9. f. 20. — Ad museos in sylvis circà Parisios.
PHYSARUM LEUCOSTICTUM Chevall. fl. par. 1. p. 336. t. 9. f. 29. — Ad folia Hyp-
norum circà Parisios, aut.
PHYSARUM RUBIGINOSUM Chevall. fl. par. 1. p. 338. — Ad radices arborum inter
muscos circà Parisios.
CHIBRARIA BADIA Chevall. fl. par. 1. p. 328. — In muscis ad radices arborum
circà Parisios.
STEMONITIS SPHERICA Desmaz. cat. pl. om. 27. — Ad truncos in sylvis circà
Lille. — An à S. ovata Pers. satis distincta?
LYCOPERDON MICHELIANUM Balb. fl. lugd. 2. p. 216. — In arenosis circà Lugdu-
num, aut.
LYCOPERDON CASTANEAFORME Balb. fl. lugd. t. 2. p. 219. — Ad terram in grami-
nosa montis Pilati propè Lugdunum.
LYCOPERDON SACCATUM Pers. journ. 1809. vol. 2. p. 19. t. 1. f. 2. — Circà Parisios.
LYCOPERDON SPADICUM Pers. l. c. p. 20. t. 1. f. 5. — In sylvâ Vincennes.
LYCOPERDON MACRORHIZON Pers. l. c. p. 22. t. 1. f. 6. — Cum priori.
LYCOPERDON BOLEOIDES Pers. l. c. p. 22. — In sylvâ Meudon.
SCLEROTIUM RADICATUM Desv. journ. 1809. 2. p. 313. — In Pictavia. Lycoperdoni
excipuliformi parasiticum.
SCLEROTIUM MUSCORUM Pers. ex Desv. journ. 1809. 2. p. 313. — Inter muscos
in Pictavia.
SCLEROTIUM ATRATUM Desv. journ. 1809. 2. p. 313. — Inter muscos in Pictavia.
RHIZOMORPHA SAMBUCI Chevall. fl. par. 1. p. 568. — In ramis Sambuci inter
lignum et medullam.

XYLOMA PUNCTUM Chevall. fl. par. 1. p. 451. — Ad utramque paginam foliorum exsiccatorum Convallariæ Polygonati circà Parisios.

ECTOSTROMA LILACIS Chevall. fl. par. 1. p. 447. — Ad folia Lilacis, circà Parisios, aut.

CENOCOCCUM GEOPHILUM Fries syst. orb. veg. 1. p. 365. — A cel. Mougeot cl. Friesio missum.

TUBERCULARIA CROCATA Chevall. fl. par. 1. p. 101. f. 7. — Ad annosos truncos Æsculi, circà Parisios, rarius, aut.

TUBERCULARIA EXPALLENS Fries in Desmaz. crypt. exs. n. 172. — Ad arbores emortuas Galliæ borealis, aut.

AZYGITES MOUGEOTII Fries syst. orb. veg. 1. p. 365. — A cl. Mougeot cel. Friesio missa.

ATHELIA PELLICULA Chevall. fl. par. 1. p. 85. t. 6. f. 1. — Ad ramos Phlomidis fruticosæ circà Parisios.

DEMATIUM INCRUSTANS Chevall. fl. par. 1. p. 78. — Neckera viticulosam investiens circà Parisios, vere. — An à D. muscorum Linck, distinctum.

DEMATIUM SERPIGINOSUM Chevall. fl. par. 1. p. 78. t. 3. f. 21. — Ad lagenas coacervatas in cellis Parisiorum.

HIMANTIA PULCHELLA Chevall. fl. par. 1. p. 81. non Pers. — Ad trabes fagineos, in cellis Parisiorum.

HIMANTIA RUFIPES Chevall. journ. phys. feb. 1822. ic. — In cellis Parisiorum.

CERATONEMA PALLIDUM Pers. myc. eur. 1. p. 49. — Inter folia sicca in Galliâ meridionali.

CERATONEMA TENERUM Pers. myc. eur. 1. c. — Intra acervum foliorum putridorum, sero aut.

CERATONEMA BICOLOR Pers. 1. c. — Inter muscos et ramulos dejectos quibuscum cohæret.

XYLOSTROMA CINEREUM Pers. myc. eur. 1. p. 93. — In Galliâ.

XYLOSTROMA LOREUM Pers. 1. c. — In Galliâ.

XYLOSTROMA SUBER Pers. 1. c. — Inventum in cupâ in quâ vinum sicut fabricatum et cuius fundum ferè totum implebat.

SPOROTRICHUM CHIONÆUM Pers. myc. enr. 1. p. 76. — Ad rupes aut ad terram.

SPOROTRICHUM FULIGINOSUM Pers. 1. c. — Ad cortices plantarum, rarius.

SPOROTRICHUM HYPNOPHILUM Pers. myc. 1. p. 78. — Ad Hypna majora, aut. An à S. bryophilo distinctum?

SPOROTRICHUM LAPIDUM Pers. 1. c. — Ad lapides propè Parisios semel reperiit cl. Pers.

SPOROTRICHUM OLIVACEUM Pers. 1. c. — Lapidem investiens unicâ vice circâ Parisios reperiit cel. Pers.

SPOROTRICHUM GROCHROUM Desmaz. crypt. exs. n. 113. — Ad truncos putridos Fraxini propè Lille.

ERINEUM CORYLEUM Pers. myc. eur. 1. p. 3. — In foliis Coryli Avellanæ rarius.

BYSSUS RUBRA DC. fl. fr. 2. p. 68. Dematium cinnabarinum Pers. syn. 697? — In ligno semiputrido.

EXOSPORIUM LONGISETUM Chevall. fl. par. 1. p. 40. t. 3. f. 8. — In caulis siccis Urticæ dioicæ.

RABdosFORIUM DIFFUSUM Chevall. fl. par. 1. p. 428. t. 11. f. 13. — Ad ramos demortuos Quercus, aut.

PUCCINIA PUNCTUM Linck. sp. pl. 6. 2. p. 68. — In foliis et caulinibus Cyperacearum, Liliacearum et Iridearum variarum, circa Parisios ex Chevall.

PUCCINIA CIRCI-OLERACEI Desmaz. cat. pl. am. 24. — Ad paginam inferiorem foliorum Cirsii oleracei circa Lille.

PUCCINIA APII Desmaz. l. c. — In petiolis et utrâque paginâ Apii graveolentis, circa Lille. — An à P. umhelliferarum diversa?

PUCCINIA Fabæ Linck. sp. pl. 6. 2. p. 82. P. Polygoni-Avicularis β Fabæ Alb. et Schw. — In foliis et caule Fabæ circa Parisios. ex cl. Chevall.

ACIDIU M PELTIGERÆ DC. fl. fr. 2. p. 238. — In Peltigeræ caninæ lobis.

ACIDIU M POLYGONI Kunze in Linck sp. pl. 6. 2. p. 44. Cæoma Polygonatum Linck l. c. — In Polygono Persicariæ, etc., circa Parisios ex Chevall.

UXADO ERYNGII Chevall. fl. par. 1. p. 401. — Ad folia Eryngii campestris circa Parisios.

TREMELLA ERECTA Chantr. conf. 162. DC. rapp. p. 17. — In cellis circa Brigantini.

TREMELLA PROSTRATA Chantr. conf. 162. n. 67. DC. rapp. p. 17. — In cellis circa Brigantium.

TREMELLA PALUSTRIS, etc. Chantr. conf. 121. n. 38. — In aquis stagnantibus circa Brigantium.

FUCUS POIRETII Lamour. est. p. 36. F. acinarium Poir. enc. meth. 8. p. 251. — Ad littora Galliæ Mediterraneæ ex Lam.

FUCUS LICHENOIDES Desf. atl. 2. p. 427. DC. fl. fr. 5. p. 6. est ex sententiâ cl. Lamouroux, Zoophytæ sp. quam nomine Liagoræ versicoloris designat.

SPHACELARIA MERTENSII Ag. syst. 166. Conferva Mertensii eng. bot. t. 999. — In Oceano ad oras Armoricanæ ex Ag. — An potius Ectocarpi sp. et forsitan E. littoralis?

CERAMUM PEDICELLATUM Ag. 137 non DC. Conferva pedicellata Dilliv. t. 108 non eng. bot. — Ad Galliæ littora ex Ag.

CERAMUM PINNULATUM Ag. syst. 139. — Ad oras Galliæ, in mari Atlantico.

CERAMUM GRACILLIMUM Ag. syst. 141. — In mari atlantico ad littora Galliæ ex Ag.

CERAMUM FELIXII Gaill. Desmaz. crypt. exs. n. 203. — Ad paleos circa Dieppe ex cl. Gaillon.

HUTCHINSIA PULVINATA Ag. syst. 148. Conf. pulvinata Roth cat. 1. t. 3. f. 4. — In saxis calciariis atque conchis ad Gallium ex Agardh.

HUTCHINSIA SECUNDA Ag. syst. 149. Conferva lanosa Drap. — In mari Mediterraneo ex Agardh.

HUTCHINSIA AMENTACEA Ag. syst. 149. Lamourouxia amentacea Bonnemais. — In mari Atlantico ad Armoricanam ex cl. Ag.

HUTCHINSIA COMOSA Ag. syst. 149. Lamourouxia comosa Bonnemais. — Ad Finisterre ex Ag.

HUTCHINSIA VARIEGATA Ag. syst. 153. — In mari Atlantico ad Galliam et mari Mediterraneo ex Ag.

HUTCHINSIA DESCHAMPSII Ag. syst. 156. Ceramum Deschampsii Bonnem. — In mari Atlantico ad Armoricanam ex Ag.

VAUCHERIA MAMMIFORMIS DC. fl. fr. 2. p. 64. Conferva mammiformis Chantr. conf. p. 28. t. 4. f. 7. — Ad saxa humida.

NOSTOC LACINIATUM DC. fl. fr. p. 2. p. 4. Tremella laciniata Bull. chemp. p. 499. f. 1, est Collematis initium.

Batrachospermum zostericollum Bory dict. class. t. 2. p. 227. — Zosteris et Fucis parasiticum.

Batrachospermum aestivale Bory l. c. — Fucis parasiticum ad littora Vindilis (Belle-Ile en mer).

Batrachospermum miniatum Bory dict. class. t. 2. p. 227. — Hab....

Batrachospermum crassiusculum Bory l. c. — Hab....

Zygnum dubium Bory in Moug. et Nestl. 794. — In locis uidis ad oras sylvarum. — Species etiam a cl. Prost. in aquis agri Lezurense reperta a Botanicis qui hanc vivam videre poterunt, sedulò describenda.

Conferva trichotoma Ag. syst. 121. — In mari Atlantico ad oras Galliae ex Ag.

Conferva grata Ag. syst. 104. — In Ceramio rubro ad oras Galliae.

Conferva globulosa Gratel. ex Ag. syst. 101. — Ad littora Galliae ex Ag. — An C. flaccidæ forma?

Conferva obtusa Ag. syst. 101. — Ad littora Galliae. — An a priori diversa?

Conferva serpentina Ag. syst. 95. Tiresias serpentina Bory. — In aquis Galliae.

Conferva borysii Ag. syst. 94. Prolifera Borysiana Le Clerc in mem. mus. 3. p. 455. f. 6. — In aquis Galliae.

Conferva Candollii Ag. l. c. Prolifera Candollii Le Clerc l. c. f. 7. — In aquis Galliae.

Conferva nigrita Ag. l. c. — In paludosis circà Parisios.

Conferva Rothii Ag. syst. 90. Prolifera Rothii Le Clerc l. c. p. 476. t. 8. — In aquis Galliae.

Schizonema Grateloupii Ag. syst. 10. Ceramium lucidum Gratel. — In mari Mediterraneo.

Protonema muscicola Ag. syst. 45. Conferva muscicola Web. et Mohr. it. t. 1. f. 3. ab. fl. dan. t. 1668. f. 2. Moug. et Nestl. 695. C. castanea Dillw. t. 72. — In locis umbrosis muscos perreptans. — Ex numero Algarum excludenda. Est ut videtur radiculæ aliarum Cryptogamarum, v. g. Hypni.

Protonema Orthotrichi Ag. l. c. Conferva Orthotrichi Dillw. t. 89. — Ad sureulos Orthotrichi; evidenter nihil aliud nisi Orthotrichi radiculæ.

Protonema velutinum Ag. l. c. 43. Conferva velutina Dillw. t. 77. Moug. et Nestl. n. 796. — In nudâ terrâ. — Muscorum et probabiliter Polytrichi aloidis primordia.

Protonema umbrorum Ag. l. c. Conferva umbrosa Dillw. t. 71. — In nudâ terrâ. — Muscorum primordia.

Alcyonidium diaphanum Lamour. ann. mus. 20. t. 13. f. 4. *Ulva diaphana* With. brit. 4. p. 121. DC. fl. fr. 2. p. 6. — Est Zoophyton.

EMENDANDA ET SUPPLENDAM

AD PARTEM PRIMAM.

Page 2.

CLEMATIS.

2. C. FLAMMULA. — Pro in ♂ in sterilibus, etc., lege ♂ in sterilibus.
4. C. INTEGRIFOLIA. — P. 532. l. 632.

Page 3.

5. C. CIRRHOSA. Hanc cum sequenti et cum C. semitribloba Lag. DC. syst. I. p. 163. sub nomine C. polymorphae conjungit cl. Viviani, sed nomen Linnaeanum antiquius servandum.

Page 4.

THALICTRUM.

13. T. SIMPLEX. — Propè Lugdunum ex cl. Balbis.

Page 5.

ANEMONE.

6. A. CORONARIA. — 177. l. 277. p. 6.
13. A. TRIFOLIA. — In Andegaviæ, monente cl. Guépin, non reperitur.

Sect. IV. Omalocarpus.

Cariopsides.... caudatæ, lege ecaudatæ.

Page 11.

RANUNCULUS.

24. R. MONTANUS.

- β. TENELLUS, canibus procumbentibus brevibus tenellis apice glabris. — In montibus Corsicæ (cl. Soleirol). — R. Lapponicus Lois. gall. ed. II. p. 395. non Linn. (v. s.)

28. R. POLYANTHEMOS. — Subacutis l. sulcatis.

Page 12.

35. R. PULONOTIS. — Carpellis.... vel per omnem superficiem obsolete tuberculatis.

δ. cordigerus (Soleirol) in litt. — R. cordigerus Viv. Dub. bot. gall. I. p. 12. Lois. gall. ed. II. I. p. 398.

ε. pedunculatus (Sol. I. c.) caulis multi-rariis-uni-floris, foliis radicalibus 3-lobis, lobis cuneiformi rotundatis, caulinis incisis, floribus parvis. — In paludosis Monnaccia Corsicæ (cl. Soleirol). — R. pedunculatus Viv. cors. 8. Lois. I. c. p. 396. (v. s.)

ζ. patens, foliis 3-lobis, lobis triseptis elongato-cuneiformibus divaricatis. — Circà Bonifacio (cl. Soleirol).

Page 14.

ISOPYRUM.

1. I. THALICTROIDES. — In agro Lugdunensi ex cl. Balbis, Andegavensi (cl. Guépin).

NIGELLA, *ante Nigellam arvensem.*

1. *N. HISPANICA* (Linn. sp. 753.) antheris apiculatis, stylis 8-10 erectis, capsulis lœvibus dorsò uninervibus in fructum obconicum ultrà medium connexis, caule erecto glabro, ramis erectis. (I) in arvis Agiuni (cl. Soleiro). — Bot. mag. t. 1265. (v. s.)

Page 19. BERBERIS.

2. *B. CRETICA* (Linn. sp. 472.) spinis 3-5-partitis, foliis fasciculatis ovatis ovali-oblongis integris subserratis aut ciliato-serratis, racemis 3-8-floris foliis ferè brevioribus. (J) in summis montibus Corsicæ (cl. Soleiro). — DC. syst. 2. p. 9. — Alp. ex. p. 21. t. 12. — Baccæ ovatae nigrae 2-spermæ; stigma brevissimè pedicellatum. (v. s.)

Page 21. PAPAVER. — 448. l. 648.

2. *P. ALPINUM.* — Fl. fr. p. 932. l. 4. p. 632.

Page 22. ROEMERIA.

1. *R. HYBRIDA.* — In agro Andegavensi ex cl. Guépin.

Page 28. BARBAREA.

1. *B. VULGARIS.*

β. *denudata*, foliis inferioribus longè petiolatis simplicibus orbicularibus crenatis basi subcordatis. — In Corsicæ monte *Grosso* cum *B. præcoci* (cl. Soleiro.) (v. s.)

γ. *pusilla*, foliis inferioribus lyratis, lobo terminali ovato-rotundo, caulem subsuperantibus. — In Corsicæ monte *Coscione* (cl. Soleiro.). (v. s.)

Page 29. ARABIS.

8. *A. STRICTA.* — 592. l. 292.

Page 31. CARDAMINE.

3. *C. RESEDIFOLIA.* — In Corsicæ monte *Grosso* (cl. Soleiro).

4. lin. 5. descriptam, l. descripta.

Page 33. BERTEROA.

- * Lin. 3. convexo, planis, l. convexo-planis.

Page 34. ALYSSUM.

1. *A. CORSICUM.* — A. Bertolonii Lois. gall. II. 2. p. 54. non Desv.

Page 36. DRABA.

- 1a. *D. OLYMPICA* (Sibth. in herb. Banks et DC. syst. 2. p. 336.) scapis nudis velutinis, foliis linearibus carinatis confertissimis ciliatis, siliculis ovatis cano-villosis, stylo brevissimo. (J) in Corsicæ monte *Rotondo* (cl. Soleiro). *D. rigida* Lois. gall. II. 2. p. 51. non Willd. — Fl. magnilutei 5-6 in umbellam subdispositi ex cl. Soleiro. (v. s. sine fl.)

EROPHILA.

1. *E. VULGARIS.*

β. *oblonga*, siliculis oblongis pedicellis brevioribus. — In editoribus montibus Corsicæ (cl. Soleiro). — *E. Americana* DC. syst. l. c. (v. s.)

γ. *præcox*, siliculis suborbiculatis vix pedicello brevioribus. — Cum priori ex cl. Soleiro. — *E. præcox* DC. l. c. (v. s. e Canc.)

Page 37. COCHLEARIA. — Brevissimis, l. brevissimus.

Page 38. THLASPI.

1. *T. ARVENSE.* — (J) l. (I)

1024 EMENDANDA ET ADDENDA.

Page 39.

HUTCHINSIA.

2. *H. BREVISTYLA*. — *Lepidium pygmæum* Lois. gall. II. 2. p. 58.

TEEDALIA.

1. *T. IBERIS*. — *Folia villosa*, lobis rotundis; stamina 6.
2. *T. LEPIDUM*. — In agro Autegavensi (cl. Guépin). — *Folia glabra*, lobis angustis; stam. 4.

Page 41.

BISCUTELLA.

- 4^a. *B. APULA* (Linn. mant. 254.) siliulis pube minimâ disco et margine scabris, foliis lanceolatis serratis, caule folioso ramoso hirto. (I) in Corsicâ (cl. Soleirol). — Lam. ill. t. 260. f. 1. — Fl. parvi; siliulae approximatae. (v. s.)

Page 44.

SISYMBRIUM.

5. *S. TARAXACIFOLIUM*. — Pilo spatulos, l. pilos patulos.
8. *S. COLUMNÆ*. — *Buscintonensis*, l. *Ruscintonensis*.

Page 45.

ERYSIMUM.

1. *E. STRICTUM*. — In Burgundiâ inter *Vermanton* et *Auxerre* ex cl. Delavaux in bull. Feruss. 14. p. 350.

Page 51.

BRASSICA.

- 5^a. *B. ROBERTIANA* (Gay in ann. sc. nat. t. 7.) caule basi suffruticoso ramoso, foliis sinuatis lyratissimè subcarnosis glaberrimis glaucescentibus, siliquis erectis rostro quintuplo longioribus. (I) in fissuris rupium montis *Condòm* propè *Telonem* detexit cl. Robert. — *B. Balearica* Lois. gall. II. 2. p. 69. non Pers. — Fl. dilatè lutei.

Page 54. XLVI. ENARTHROCARPUS *Labill. syr. dec.* 5. p. 4. t. 2.

Calix erectis basi æqualis; petala unguiculata limbo integro; siliqua biarticulata articulo inferiore obconico brevi 1-3-spermo, superiore longo 9-10-spermo intus loculato.

1. *E. ARCUATUS* (Labill. l. c.) siliquis teretibus torulosis scabris, pedicellis infimis bracteatis. (I) circa Monspelium loco dicto *Port-Juvénal* ex cl. Lois. — Fl. purpurei aut albi. (v. s. è Cretâ.)
2. *E. LYRATUS* (DC. syst. 2. p. 661.) siliquis compressis nodulosis longitudinale striatis, pedicellis ferè omnibus bracteatis. (I) cum priori. — Fl. pallide latei. (v. s. ex Ægypto.)

Page 55.

RAPHANUS.

2. *R. RAPHANISTRUM*. — 953. l. 935.

Page 57.

CISTUS.

- 1^a. *C. CRETICUS* (Linn. sp. 738.) foliis spathulato-ovatis tomentoso-hirtis in petiolam, brevem attenuatis margine undulatis, pedunculis brevibus unifloris, sepalis sericeo-villosis. (I) in Corsicâ ex cl. Soleirol. — Jacq. ic. rar. 1, t. 95. (v. s. è Cretâ.)

- 1^b. *C. VILLOSUS* (Lam. dict. 2. p. 12.) foliis subrotundo-ovatis rugosis tomentoso-hirtis longè petiolatis, petiolis sulcatis connatis, pedunculis 1-3-floris, sepalis longè sericeis. (I) in Corsicâ ex cl. Soleirol. — *C. pilosus* Linn. sp. 737. Duham. arb. 1. p. 67. t. 64. *C. eriocephalus* Viv. cors. 8. Lois. gall. II. 1. p. 380. — Petala rubro-purpurea magna; calyces crassi. An hæ 2. sp. ab. *C. in-*
cano satis distinctæ sunt. (v. s. ex Italia.)

EMENDANDA ET ADDENDA. 1025

Page 68.

DROSERA.

3. D. ANGLICA. — Lugduni ex cl. Balb.

Page 78.

SILENE.

28a. S. SABULETORUM (Linck in Spreng. nov. prov. 39.) hirsuta, caulis a basi ramosis erectis, foliis inferioribus spatulatis superioribus lanceolatis, floribus spicatis et in dichotomiis ramorum, calycibus longè pilosis angustis cylindrico-clavatis, petalis emarginatis subbifidis. (I)? in agris arenosis Corsicæ circà Aleria ex cl. Soleiro. — Planta circiter 3-pedalis, petalis purpureo-violaceis.

Page 80.

BUFFONIA.

1. B. ANNUA. — Circà Lugdunum in siccis et petrosis Mont-Cindre ex cl. Balbis.

Page 82.

SPERGULA.

4. S. SAGINOIDES. — In Jurassi monte Dolaz ex cl. Gaudin.

5. S. SUBULATA. — Ad muros agri Lugdunensis propè Saint-Genis-Laval, ex cl. Balbis.

STELLARIA.

4. S. VISCUA. — Cum hâc conjungenda species sequens, S. dubia Bast. DC., quæ nullo modo differt. Huic etiam referendam Cerastium anomalum Willd.

Page 83.

ARENARIA.

3. A. MEDIA.

f. *macrorhiza*, radice crassâ, foliis internodio sublongioribus, stipulis subvaginantibus. — In pascuis maritimis Corsicæ. — A. macrorhiza Lois. gall. ed. II. 1. p. 322. — Fl. albi. (v. s.)

Page 87.

CERASTIUM.

6. C. MURALE. — Gravet. l. Graves.

Page 91.

MALVA.

7. M. NICÆENSIS. — In agro Andegavensi ex cl. Guépin.

Page 111.

RHAMNUS.

4. R. SAXATILIS. — Ad viam Miribelii in valle post pontem de la Cadette, ex cl. Balb.

Page 115.

ULEX.

3. U. PROVINCIALIS. — In Andegaviâ, monente cl. Guépin, non crescit.

Page 117.

GENISTA.

14. G. TINCTORIA.

γ. *Perreymondi*, leguminibus villoso - canescensibus. — G. Perreymondi Lois. gall. II. 2. 105.

Page 121.

ONONIS.

19. O. SERRATA. — O. diffusa Ten. DC. prod. 2. p. 163. O. villosissima Lois. nouv. not. 31. fl. gall. II. 2. p. 112. An Desf.?

Page 125.

MEDICAGO.

19. M. DENTICULATA. — Circà Lugdunum loco dicto aux Massues, cl. Balb.

Page 126.

32. M. GERARDI. — In petrosis Lugduni inter vias Gratianopolis et St.-Albani, ex cl. Balb.; in calcariis agri Andegavensis (cl. Guépin).

1026 EMENDANDA ET ADDENDA.

Page 129.

MELILOTUS.

9. *M. ELEGANS* (Salzmann ex Ser. in DC. prod. 2. p. 188.) caule erecto parum ramoso, foliolis obovato-lanceolatis retusis argutè serratis, stipulis linearisubulatis basi dilatatis setaceo-laciñati, dentibus calycinis subæqualibus lanceolatis longitudine tubi, leguminibus ovatis transversè rugoso-nervosis 1-spermis, seminibus subglobosis vix retusis. (I) in pratis humidis Corsicæ. (cl. Soleiro). (v. s.)

Page 133.

TRIFOLIUM.

32. *T. STRICTUM*. — In agro Andegavensi. (cl. Guépin).

Page 146.

ASTROLOBIUM.

2. *A. SCORPIOIDES*. — In agro Lugdunensi propè Villeurbanne ex cl. Balbi.

Page 147.

HIPPOCREPIS.

3. *H. VELUTINA*. — *H. bicontorta* Lois. nouv. not. 32; gall. II. 2. p. 162. t. 28.

Page 154.

ERVUM.

4. *E. MONANTHOS*. — In agro Lugdunensi ex cl. Balb.

Page 156.

LATHYRUS.

10. *L. SPHERICUS*. — In agro Lugdunensi ex cl. Balb.; Andegavensi. (cl. Guépin).

Page 173.

SIBBALDIA.

1. *S. PROCUMBENS*. — In Vogesorum monte Hohneck ex cl. Maugeot.

Page 178.

ROSA.

16. *R. RUBIGINOSA*. — *r. parvifolia*. — *R. Seraphini* Viv. cors. 8.

Page 193.

LYTHRUM.

Ante Lythrum hyssopifoliam.

- 1a. *L. GRAEFFERI* (Ter. prod. nap. supp. 2. xxvii.) herbaceum procumbens, foliis alternis oppositisque lanceolatis linearis-lanceolatisve, floribus breviter pedicellatis etiam fructiferis erectis, bracteolis acutis minimis, petalis 6 oblongo-ovatis, stam. 12. (I) an potius. — (2) ad littora Corsicæ (cl. Soleiro). — Fl. majores rubelli. An seq. rar.? (v. s.)

Page 199.

SCLERANTHUS.

2. *S. ANNUUS*. — *S. polycarpos* Lois. gall. II. 1. p. 294. non Linn.

Page 201.

SEDUM.

1. *S. RHODIOLA*. — In Vogesorum monte Hohneck ex cl. Maugeot.

Page 202.

23. *S. ANDEGAVENSE*. — Ferè semper, monente cl. Guépin, stam. petalis, laciñiisque calycinis 4, rariùs 5, gaudet.

Page 204.

16. *S. ANOPETALUM*. — In agro Lugdunensi (cl. Balb.), in calcariis agri Andegavensis circa Fontevrault (cl. Guépin).

Page 205.

CACTUS.

1. *C. ORUNTIA*. — Et in muris agri Andegavensis ex cl. Guépin.

Page 210.

SAXIFRAGA.

19. *S. AJUGAFOLIA*. — 571. 371.

EMENDANDA ET ADDENDA. 1027

Page 213. UMBELLIFERÆ.

Ordo invertendus, id est ab *Hydrocotyle* incipiendus et a *Laserpitio* terminandus.

Page 214. LASERPITIUM.

7. L. PRUTHENICUM. — 48 t. 84.

Page 217. TORILIS.

3a. T. HETEROPHYLLA (Guss. prod. sic. 1. p. 326.) caule erecto parum ramoso, foliorum lobis linear-lanceolatis incisis, extimo non elongato, summis linearibus integris, umbellis longe pedunculatis 2-3-radiatis, involucro subnullo, aculeis fructus latitudini aequalibus. ② in dumetis agris et glareolis Corsicæ et Galliæ australis. — Variat ut T. nodosa fructibus heteromorphis, nempe carpella exteriore setis aculeato, interiore muricato. (v. v.)

Page 221. PEUCEDANUM.

4. P. CARVIFOLIUM. — Palimbia Chabréi DC. prod. t. 4. ined.

6. P. ALSATICUM. — In Andegaviâ monente cl. Guépin non crescit.

Page 224. ANGELICA.

4a. A. SCABRA (Petit in ann. sc. obs. 1. p. 99. t. 3.) caule erecto sulcato basi folioso, foliis tripinnatisectis, nervis petiolisque glanduloso-scabris, umbellarum radiis 10-34, involucro 1-3-phyllo deciduo, fructus jugis dorsalibus crassis lateralibus paulò minoribus. ④ ad nives in summis Pyrenæis orientalibus loco dicto *Cueillade de Nourni*. — *Selenium scabrum* La Peyr. abr. 147. — Fol. vaginæ amplæ, petala alba acuminata.

Page 225. BUPLEURUM.

4a. B. ARISTATUM (Bartl. in Reich. icon 2. p. 70. t. 178.) caule erecto paniculato, foliis linearibus trinerviis, involucelli foliolis 5 umbellulam superantibus ellipticis aristato-cuspidatis, nervo medio pinnato reticulato-renosis, valleculis lœvibus 1-vittatis, jugis acutis tenuissimis. ① in agris et collibus provinc. australium. — B. glumaceum Spreng. umb. sp. 18. t. 3. f. 5. non Sibth. (v. v.)

4b. B. PROTRACTUM (Linck. fl. port. 2. n. 387.) foliis caulinis perfoliatis ovato-oblongis acuminatis, umbellis 3-radiatis, involucro nullo, involucelli foliolis 5 mucronatis, valleculis granuloso-echinatis. ① inter segetes Galliæ australis et occidentalis usque ad Angers. — B. subovatum Spreng. B. granulatum Gard. fl. helv. 2. p. 376. (v. v.)

Page 228. CONOPODIUM.

1. C. DENUDATUM. — Myrrhis Pyrenæa Spreng. Lois. gall. ed. II. 1. p. 208. t. 5.

Page 230. MEUM. Ante Meum Mutellinam.

1a. M. PYRENAICUM (Hay ex DC. prod. t. 4 ined.) soliis pinnatisectis, segmentis inciso-pinnati-partitis, lobis lanceolato-linearibus decussatis, caule subnudo simplici, involucro nullo, involucellis lanceolatis. ④ in Pyrenæorum orientalium valle Eynes legit cl. Gay, circa Mont-Louis cel. DC. — Laserpitium simplex La Peyr. abr. 152. excl. syn. — Planta pygmæa rariùs pedalis. (v. v. DC.)

Page 231. Ante MOLOPOSPERMUM.

XXXIII^a. GAYA Gaud. feuille vaud. 1826. n. 157. p. 28. fl. helv. 2. p. 389. DC. prod. t. 4. ined. non Kunth.

Cal. margo obsoletissimus; petala obovata plus minus emarginata, lacinulæ inflexâ latâ; fructus ovalis subcompressus; carpello jugis 5

1028 EMENDANDA ET ADDENDA.

elevatis alaeformibus basi contiguis aequidistantibus obtusis, extimis marginantibus; vittæ nullæ; semen subsemiteres. — Involucrum involucellumque oligophyllum; folia radicalia pinnatisecta, segmentis bipinnatisidis, lobis linearibus; caulis nudus simplex.

1. *G. SIMPLEX* (Gaud. l. c.) involueri foliolis paucis 7-10 subtrifidis. — *Ligusticum simplex* Dub. bot. gall. I. p. 230.
2. *G. PYRENAICA* (Gaud. l. c. in adnot.) involueri foliolis 1-5 indivisis. $\frac{1}{2}$ in Pyrenæis editioribus. — *Pimpinella dioica* L. La Peyr. abr. 166. — *Pygmæa glabra* submonophylla, foliorum lobis lanceolatis. (v. v. DC.)

Page 232.

XXXVI^a. BUNIUM Koch. ined. ex DC. prod. t. 4 ined. — *Bulbocastanum* Lagasca non Adans.

Cal. margo obsoletus; petala obovata emarginata, lacinulâ inflexâ; fructus a latere contractus linear-oblóngus; carpella jugis 5 aequalibus filiformibus obtusis, lateralibus marginantibus, valleculis 2-3-vittatis, commissurâ 4-vittatâ, vittis omnibus superficialibus; semen tereti-convexum anticè planiusculum. — Involucrum varium; involucellum oligophyllum; carpophorum libertum.

1. *B. VIRESSENS* (DC. prod. t. 4 ined.) radice fusiformi, caule sulcato-striato ramoso, foliis bipinnatisectis laciniis linearibus, involueri involucellisque foliolis setaceis brevibus, umbellæ radiis valde inæqualibus. $\frac{1}{2}$ in asperis Burgundiæ ad montem Africum propè Dijon. — *Sium virescens* Spreng. Lois. gall. II. I. p. 109. S. Cordiennii Lois. l. c. Peucedanum tauricum hort. par. 1821. — Petala virescentia apice subintegro involuta; fructus sectiones (v. s. et v. c.)
2. *B. PETRAEUM* (Lois. gall. ed. II. I. p. 195. non Tenore) radice globosâ, caule flexuoso, foliorum laciniis linear-oblóngis, involucro subnullo, involucellis oligophyllis, foliolis subulato-setaceis brevibus. $\frac{1}{2}$ in Corsicæ sylvis montosis. — Caulis 4-5-pollicaris parcè ramosus, umbellæ 3-5-radiatæ. (v. s.)

Page 234.

AMMI.

- 2^a. *A. INTERMEDIUM* (DC. prod. t. 4. ined.) glabrum, foliis omnibus decomposito-multipartitis subvirentibus, segmentis incisis dentatisve, inferioribus cuneatis superioribus linear-subulatis serratis acuminatissimis. (I) in agro Tolosano ex La Peyr. — *A. glaucifolium* La Peyr. pyr. 144. (v. s. DC. in herb. Gay.)

CNIDIUM.

2. *C. APIOIDES* (Spreng. umb. prod. p. 40.) caule ramoso striato, foliis 2-3-pinnatisectis segmentis pinnatipartitis, laciniis linear-lanceolatis mucronatis, involucro subnullo, involucelli foliolis setaceis umbellulam æquantibus. $\frac{1}{2}$ in alpestribus Galliæ orientalis, in sylvâ Vincennes reperiit D. Decaisne ex bull. Feruss. t. 14. p. 102. — DC. prod. t. 4. ined. *Ligisticum apioides* Lam. DC. fl. fr. 4. p. 308. *Lig. cicutæfolium* Vill. dauph. 2. t. 5. *Laserpitium silaifolium* Jacq. aust. app. t. 44. (v. v. DC.)

Page 236.

HELOSCIADIUM.

- 3^a. *H. CRASSIPES* (Koch l. c.) caule basi repente ascende, foliis pinnatisectis summis trisectis segmentis obovatis apice inciso-dentatis, umbellâ 3-5-fidâ exinvolucratâ, umbellulae pedicellis rigidis basi subincassatis subconnatis. $\frac{1}{2}$ in aquosis et innundatis Corsicæ circa Bonifacio et Porto-Vecchio. — Reich. ic. bot. 3. t. 218. (v. s.)

Page 237.

OENANTHE.

- 7^a. *O. SILAIFOLIA* (Bieb. supp. p. 232.) radicis fibris oblongo-fusiformibus

subtuberous cylindricisve fasciculatis, foliis pinnatisectis omnibus subconformibus, inferiorum lobis lanceolatis superiorum linearibus, involucro subnullo, fructibus ovatis confertis sessilibus vix involucello longioribus. *M. Monspelii ad Mireval et probabiliter in agro pago Genovensi finitimo.* — DC. prod. t. 4. ined. O. peucedanifolia Smith eng. bot. t. 348 non Poll. (v. v.)

Page 240. Lin. 27 semine l. semini.

Page 241. ECHINOPHORA.

1. E. SPINOSA. — DC. mem. omb. t. 16.

Page 244. Ante CAPRIFOLIACEAS.

Ordo L. ARALIACEÆ Juss. dict. 2. p. 348. DC. prod. t. 4.
ined.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus integer dentatusve. Petala 5-10 denticulis calycinis alterna in aestivatione valvata, rarissimè nulla et tunc (in Adoxâ) forsitan in stamina conversa stamina tot quot petala rariùs dupla, infrà disci magni epigyni marginem inserta. Anth. 2 loculares. Ovarium calyci adnatum, loculis 2 aut plurimis uniloculatis constans. Styli plures simplices nunc distincti divergentes nunc in unicum concreti ramo nulli. Stigmata simplicia. Bacca 2-15-locularis calycis limbo coronata, loculis numero stylorum 1-spermis. Semina angulata; testa crustacea, endopleura membranacea. Embryo parvus inversus albumine carnosò copioso circumpositus; radicula superior cotyledonibus duplò longior. — Arbores frutices rariùs herbæ; foliis alternis exstipulatis petiolatis. Flores (in nostris) umbellato-capitati.

I. ADOXA Linn. Dub. bot. gall. I. p. 212.

II. HEDERA Swartz. Dub. bot. gall. I. p. 244.

Lin. 13 et seq. pro Trib. I. HEDERACEÆ, etc., lege.

Trib. I. CORNEÆ Kunth nov. gen. 3. p. 430. — CORNEÆ
DC. prod. t. 4. ined.

Page 247. RUBIA.

2. R. PEREGRINA. — Circà Lugdunum ex cl. Balb.

4. R. REQUIENII. — R. angustifolia Lois. gall. II. I. p. 116. non Linn.

Page 248. GALIUM.

6. G. RUBRUM. — 446. l. 496.

5. G. CAMPESTRE. — In rupibus maritimis Corsicæ. (cl. Soleir.)

β. hirsutum, caule pubescente, foliis hirsutis. — Cum priore. — G. Soleirolii Lois. nouv. not. 7.; Fl. gall. II. I. p. 108. (v. s.)

Page 249.

16. G. GLAUCUM. — In agro Lugdunensi ex cl. Balbis.

16a G. CINEREUM (All. ped. t. 77, f. 2.) glauco-cinereum, foliis senis linearibus rigidis margine revolutis lucidis retrorsum scabris mucronatis, floribus paniculatis, pedicellis 3-chotomis, caule erecto basi ramoso rigido 4-gono

1030 EMENDANDA ET ADDENDA.

lævi. \mathcal{U} in Corsicâ et Galloprovinciâ. — DC. fl. fr. 4. p. 256. An satis a G tenuifolio distinctum? (v. s.)

19. G. SYLVATICUM. — In agro Andegavensi, monente cl. Guépin, nusquam reperitur.

Page 250.

23. G. ULIGINOSUM. — G. debile Desv. Lois.

28. G. TRICORNE. — Vill. l. Vaill.

31. G. VERTICILLATUM. — Circâ Massiliam (cl. Solier.)

Page 253.

VALERIANELLA.

9. V. HAMATA. — Species, ut videtur, delenda, cum a V. coronatâ non satis distincta sit.

Page 254.

VALERIANA.

8a. V. TRINERVIS (Viv. cors. 3.) caule erecto basi suffruticoso, foliis basi laxis apice confertis sessilibus ovato-lanceolatis obtusiusculis integerrimis trinerviis, floribus densè corymbosis. \mathcal{U} in monte Trinità Corsicæ (cl. Soleirol). — Flores parvi numerosi rubri. Habitus Centranthi latifolii ex cl. Soleirol. (v. s. spec. imperf.)

Page 260.

EUPATORIUM.

2. E. CORSICUM (Req. in Lois. nouv. not. 36. gall. II. 1. p. 223.) caule erecto subsimplici, foliis inferioribus ternatis, superioribus simplicibus oppositis alternisve petiolatis ovatis acutis aut obtusis mucronulatis crenatis, floribus in corymbum densum dispositis. \mathcal{U} in Corsicâ (cl. Soleirol.) — Planta 6-pedalis ex cl. Soleirol. Fl. purpurascens. (v. s.)

3. E. SOLEIROLII (Lois. II. cc.) eaule erecto ramosissimo, foliis omnibus oppositis petiolatis ovatis acutis grossè dentatis, inferioribus simplicibus superioribus tripartitis, lacinia intermedia multò latiore, floribus laxius corymbosis. \mathcal{U} secùs rivulos in montibus Corsicæ (cl. Soleirol.) — 1-2-pedalis, flores rosei ex cl. Soleirol.

Page 265.

ASTER.

4a. A. SEROTINUS (Willd. 3. p. 249.) caule ramosissimo subglabro, ramis corymbosis, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis glabris margine scabris, inferioribus medio subserratis, involucri squamis acuminatis. \mathcal{U} ex Americâ boreali orta, circâ Lugdunum ad extremitatem peninsulæ Perrache et in insulis Rhodani subspontanea ex cl. Balb. — Fl. cærulei. (v. v. c.)

Page 266.

SOLIDAGO.

4. S. SEROTINA (Willd. sp. 3. p. 2056.) caule erecto tereti lævi, foliis lanceolatis acuminatis glabris margine asperis argutè serratis tripliuerviis, racemis paniculatis secundis. \mathcal{U} ex Americâ boreali orta, in insulis Rhodani propè Lugdunum abundè crescens ex cl. Balbis, probabiliter ex hortis migrata. (v. v. c.)

Page 270.

GNAPHALIUM.

12. G. LEONTOPODIUM. — (1) lege. \mathcal{U} .

ELYCHRYSUM.

1. E. FRIGIDUM. — 1098 l. 1908.

Page 277.

ARTEMISIA.

10. A. CIRRHIFOLIA. — 4. l. 5.

Page 278.

TANACETUM.

1. T. VULGARE. — (2) l. \mathcal{U} .

EMENDANDA ET ADDENDA. 1031

Page 280.

BIDENS.

2. *B. CERNUA*. — *B. bullata* Willd. sp. 3. p. 1723. Balb. lugd. 1. p. 376. *B. minima* Linn. Lois. gall. II. 2. p. 229.

Page 281.

CARDUNCELLUS.

4. *C. TINGITANUS*. — Cum priori sub nomine *C. cæruleus* nunc, ex observationibus cl. Soleirolii meisque, conjungendum censeo.

Page 284.

CARDUUS.

9. *C. TENUIFLORUS*. — γ *pycnocephalus*. — *C. cephalanthus* Viv. cors. 14. Lois. gall. II. 2. p. 217.

Page 304.

HIERACIUM.

33. *H. succisæFOLIUM*. — In monte Pilato ex cl. Balbis.

Page 312.

PHYTEUMA.

3. *P. SERRATUM*. — *P. Carestiae* Lois. gall. II. 1. p. 145 non Bir.

PRISMATOCARPUS.

- 1a. *P. FALCATUS* (Ten. prod. 16; fl. nap. 1. p. 77. t. 20.) caule subsimplici aut a basi ramoso erecto, foliis oblongis crenatis, floribus solitariis, laciniis calycinis longissimis lanceolato-acuminatis apice divergentibus corollâ longioribus. (I) in Corsicâ communis. — Buxb. cent. 4. p. 24. t. 38. (v. s.)

Page 313. CAMPANULA stigma 4-rariùs l. 3.

8. *C. PETRÆA*. — Seminibus, l. staminibus.

Page 314.

11. *C. LINIFOLIA*. — β . *Valdensis*. — *C. Rohdii* Lois. gall. II. 1. p. 140. t. 24.

Page 317.

PYROLA.

1. *P. UNIFLORA*. — In Vogesorum monte *Hohneck* ex cl. Mongeot.

Page 327.

GENTIANA.

17. *G. GERMANICA*. — *G. flava* Lois. gall. II. 1. p. 180. t. 28.

Page 330.

CONVOLVULUS.

1. *C. SOLDANELLA*. — *C. pseudo-soldanella* Lois. gall. II. 1. p. 165.

Page 331.

CERINTHE.

3. *C. GLABRA* (Mill. dict. n. 2, ic. t. 91.) foliis calycibusque lævibus glabris, corollis tubulosis patulis acutiusculis 5-fidis ore angustatis calyce patulo longioribus. \mathcal{Y} in montibus Corsicæ (cl. Soleirol), in Jurasso ex cl. Gaudin. — DC. fl. fr. 3. p. 619. *C. major* Roth. (v. s.)

Page 332.

ECHIUM.

3. *E. PLANTAGINEUM*. — In Corsicâ. — *E. macranthum* Ræm. et Schult. 4. p. 20. Viv. cors. 1.

Page 333.

NONEA.

3. *N. LUTEA*. — *LITHOSPERMUM orientale* Lois. gall. II. 1. p. 149.

Page 341.

VERBASCUM.

18. *V. floccosum*. — Secùs vias Lugduni propè *Pierre-Bénite* ex cl. Balbis.

Page 346.

LINARIA.

21. *L. ALPINA*. — In glareolis Rhodani propè *Lugdunum* ex cl. Balbis.

1032 EMENDANDA ET ADDENDA.

Page 347.

SCROPHULARIA.

8. *S. SAMBUCIVOLIA*. — *S. mellifera* Vahl. Desf. atl. 2. t. 143. Lois. gall. II. 2. p. 37.

8a. *S. OBLONGIFOLIA* (Lois. nouv. not. 26, gall. II. 2. p. 36. (caule glabro tetragono, foliis oblongo-lanceolatis serratis in petiolum basi dilatatum attenuatis, paniculâ racemosâ terminali, pedunculis 1-5-floris, calycis laciniis rotundis obtusissimis margine subscariosis. 2. Ad ripas rivulorum in editioribus montis Corsicæ (Soleirol). — Fl. obscure purpurei ex cl. Lois. (v. s.)

Page 369.

Page 366. LAMIUM. — Antheræ glabræ, l. hirsutæ.

Page 369.

NEPETA.

3. *N. PANNONICA*. — *N. agrestis* Lois. gall. II. 2. p. 8.

Page 370.

LAVANDULA.

3. *L. VERA*. — *L. intermedia* Lois. gall. II. 2. p. 19.

Page 374.

MELITTIS.

1. *M. MELISSOPHYLLUM*. — (1) l. 2.

CLINOPODIUM. — Fauce nudâ, l. villis clausâ.

Page 377.

VERBENA.

1. *V. OFFICINALIS*. — (1) l. 2.

Page 379.

PINGUICULA.

3. *P. ALPINA*. — *P. flavescens* Lois. gall. II. 1. p. 14.

Page 381.

ANAGALLIS.

1. *A. ARVENSIS*. — *A. parviflora* Lois. gall. nouv. not. 9; gall. II. 1. p. 168.

Page 388.

STATICE.

3. *S. AURICULÆFOLIA*. — *S. Willdenowii* Poiret. Lois. gall. II. 1. p. 224.

Page 389.

15a. *S. SOLEIROLII* (Dub. mss.) caule fruticoso superne folioso, foliis fasciculatis subtus revolutis tenuissimè canaliculatis angustissimis linearibus sub-pungentibus, scapo glaberrimo simplici gracili foliis 3-4-plò longiore, squamis obtusissimis ovatis seariosis, perigonii externi dentibus aristato-acuminatis perigonio interno multò brevioribus. 3. Ad rupes maritimæ Corsicæ circè Calvi (cl. Soleirol). — Florum rubellorum capitula subduplicata minoræ ac. in *S. fasciculata*. (v. s.)

17a. *S. LEUCANTHA* (Lois. nouv. not. 13; gall. II. 1. p. 223.) foliis linearibus uninerviis rigidulis subacutis scapisque elongatis foliis 2-3-plò longioribus tenuissimè pubescentibus, involuci squamis exterioribus lanceolatis ovato-lanceolatis floribus minoribus, interioribus obovatis seariosis obtusis, perigonii externi basi pilosi dentibus aristato-acuminatis interno monopetalo subminoribus. 2. in editioribus montium Corsicæ (cl. Soleirol). — Flores splendide albi. (v. s.)

Page 392.

PLANTAGO.

17. *P. LANCOLATA*.

P. tomentosa (Guépin in lit.) foliis lanato-sericeis, scapis glabriusculis. — Ad oras Mayenne in Andegavia (cl. Guépin). (v. s.)

Page 393.

AMARANTHUS, l. AMARANTUS.

EMENDANDA ET ADDENDA. 1033

Page 395.

CORISPERMUM.

1. *C. hyssopifolium*. — Circà Lugdunum in arenosis Rhodani infra Irigny ex cl. Balbis.
2. *C. squarrosum* (Linn. sp. 6.) foliis linearibus mucronato-pungentibus. (1) circà Arelatem et Avenionem ex cl. Loiseleur. (v. v. c.)

SALSOLA.

1. *S. kali*. — Circà Lugdunum in arenosis propè Irigny ex cl. Balbis.
2. *S. tragus*. — Le Drev. l. Prev.

Page 402.

RUMEX.

14. *R. arifolius*. — In Jurassi monte Dolaz ex cl. Gaudin.

Page 403.

POLYCONUM.

1. *P. fagopyrum*. — *P. pyramidatum* Lois. gall. II. 1. p. 285.

Page 405.

12. *P. aviculare*. — *P. pulchellum* Lois. gall. II. 1. p. 284. *P. virgatum* Lois.
l. c.?

β. Bellardi. — *P. arenarium* Lois. l. c. non Waldst. et Kit.

13. *P. maritimum*. — *P. Roberti* Lois. gall. II. 1. p. 283. *P. flagelliforme* Lois.
l. c.?

15. l. 14. *P. equisetiforme*. — *P. scoparium* Lois. l. c.

Page 406.

DAPHNE.

3. *D. oleoides*. — *D. lucida* Lois. gall. II. t. 1. p. 280. t. 25.

Page 412.

RICINUS.

1. *R. communis*. — In Corsicâ, monente cl. Soleirol, fraticosa, 15-20 pedes alto, foliis circiter quadruplicè minoribus. — An sp. distincta?

Page 415.

EUPHORBIA.

23. *E. myrsinites*. — *E. Corsica* Req. in ann. sc. nat. 5. p. 384.
26. *E. segetalis*. — *E. Taurinensis* Lois. gall. II. 1. p. 340.

Page 416.

27. *E. provincialis*. — *E. ramosissima* Lois. gall. II. 1. p. 340.
28. *E. exigua*. — *β. retusa*. *E. sulcata* De Lens in Lois. gall. II. 1. p. 339.

Page 418.

URTICA.

3. *U. hispida*. — *U. atro-virens* Lois. nouv. not. 40.

Page 423.

ALNUS.

5. *A. cordata*. — Huic conjugas sequentem id est *A. ellipticam*, quæ, monente cl. Soleirol, nullo modo differt.

SALIX.

1. *S. caprea*. — *S. sphacelata* Smith brit. 3. p. 1066. Lois. gall. II. 2. p. 343.

Page 424.

5. *S. repens*. — *α. argentea*, *S. lanata* Lois. II. 2. p. 340 non Linn. *S. rosma-*
rinifolia Linn. sp. 144 8. Lois. b. c.

β. elliptica. — *S. fusca* Linn. sp. 1447. Lois. l. c.

Page 425.

10. *S. mollissima*. — *S. holescericea* Lois. gall. II. 2. p. 344? an Willd.

1034 EMENDANDA ET ADDENDA.

12. *S. FISSA*. — *S. Forbyana* Smith brit. 8. p. 1041. Lois. I. c.

16. *S. FRAGILIS*. — *S. Russeliana* Smith brit. 3. p. 1043. Lois. gall. II. 2. p. 338.

Page 426.

22. *S. ARBUSCULA*. — *S. formosa* Willd. sp. 4. p. 780. Lois. gall. II. 2. p. 341.

23. *S. CÆSIA*. — *S. myrtilloides* Lois. gall. II. 2. p. 341 non Linn.

Page 428.

TRICLOCHIN.

3. *T. BARRELLIERI*. — *T. laxiflorum* Lois. nouv. not. 16; gall. II. 1. p. 265.

Page 439.

POTAMOGETON.

3. *P. LUCENS*.

P. longifolium (DC.) foliis subpetiolatis prælongis lanceolatis utrinque attenuatis macronutatis. — *P. longifolius* Gay in Gaud. fl. helv. 1. p. 473.

4. *P. OBSCURUM*. — In stagnis et rivulis montanis Jurassi inter *St. Cergnes* et *la Roussel* ex cl. Gaudin. — *P. obtusus* Gaud. fl. helv. 1. t. 4.

Page 440.

9. *P. HETEROPHYLLUM*. — Hinc non vero *P. oblongo*, monenti cl. Guépin, referendum est *P. Plantago* Bast., quod est forma *P. heterophylli* ab aquâ recedente derelicto et foliis immersis orbati.

Page 445.

ORCHIS.

22a. *O. ACUMINATA* (Desf. atl. 2. p. 218. t. 247.) foliis radicalibus ovato-ellipticis obtusis, caulinis lanceolatis vaginantibus mucronulatis, spicâ brevi densâ, bracteis ovarium subsuperantibus, perigonii segmentis conniventibus laxiusculis 3 exterioribus apice subulatis, 2 interioribus minimis, labello 3-lobo, lobis lateralibus angulatis obtusis, intermedio lato apice rotundato denticulato, calcare compresso conico ovario breviore. *2f* in Corsicâ circa *Palasca* (cl. Soleiro). (v. s.)

Page 450.

MALAXIS.

1. *M. LOESELII*. — Circâ Lugdunum ex cl. Balb., Andegavum ex cl. Guépin.

EPIPOGIUM.

2. *E. GMELINI*. — In Vogesorum monte *Hohneck* ex cl. Mougeot.

Page 462.

TULIPA.

5. *T. CELSIANA*. — *T. Gallica* Lois. herb. am. t. 160; gall. II. 1. p. 241.

Page 463.

ASPHODELUS.

3. *A. RAMOSUS*.

A. microcarpus, fructibus minoribus. — *A. microcarpus* Viv. cors. 5. Lois. gall. II. t. 1. p. 242.

Page 465.

SCILLA.

12. *S. FASTIGIATA*. — *Hyacinthus Pouzolzii* Lois. gall. II. 1. p. 247.

Page 467.

ORNITHOGALUM.

3. *O. UMBELLATUM*.

O. minutum, scapo 1-2-pollicari 1-3-floro, bracteis mox pedicellis æquilibus mox duplò minoribus. — In graminosis Corsicæ (cl. Soleiro). — *O. exscapum* Lois. gall. ed. II. 1. p. 244? an Tenore. (v. s.)

Page 470.

ALLIUM.

31. *A. SENESCENS*. — In insulis Rhodani propè Lugdunum ex cl. Balb., ad rupes Jurassi extremi propè *la perte du Rhône* ex cl. Gaudin.

EMENDANDA ET ADDENDA. 1035

Page 473.

COLCHICUM.

1. C. MONTANUM. — C. arenarium Lois. gall. II. t. p. 265. non Waldst et Kit.

Page 477.

JUNCUS.

18. J. LAMPROCARPUS. — J. tricocephalus de La Harpe mon. junc. in mem. soc. hist. nat. par. t. 3. p. 127.

20a. J. ANCERS (de La Harpe l. c.) culmo erecto nodoso basi subascipiti, foliis tereti compressis subascipitibus, floribus capitatis in paniculam decompositam erectam digestis, perigonii segmentis subæqualibus exterioribus acutè mucronatis, interioribus obtusis capsula ovoideo-ellipsoidea triquetra rostrata brevioribus. $\frac{1}{2}$ circà Monspelium, Bayonam et Cænomanum ex cl. de La Harpe.

20b. J. LAGENARIUS (de La Harpe l. c.) culmo basi subascendente foliisque tereti-compressis, floribus capitatis in paniculam compositam cymosam digestis, perigonii segmentis æqualibus linearì lanceolatis acutis capsula turbinata obsoletè trigonà brevioribus. $\frac{1}{2}$ in Galliâ australi ex cl. de La Harpe.

Page 486.

SCIRPUS.

11. S. MICHELIANUS. — In agro Lugdunensi circà Pierre Bénite et Perrache ex cl. Balb.

Page 494.

CAREX.

53. C. BASTARDIANA. — C. pilulifera referendam censem ex cl. Guépin.

Page 497.

76. C. LÆVIGATA. — C. Corsica Degl. in Lois. gall. II. 2. p. 307.

Page 505.

MILIUM.

7. M. VERNALE (Bieb. cauc. 1. p. 52.) foliis angustis linearibus planis brevibus, ligulâ oblongâ denticulatâ, paniculâ angustâ subcoarctatâ, pedicellis semi-verticillatis erectis spiculis dispersis lævibus, glumæ valvulis ovatis obtusisculis perigonio glabro nitido longioribus. (I) secùs vias in Corsicâ, Aprili (cl. Soleirol). — Vix 2-pedalis. (v. s.)

Page 511.

AIRA.

3. A. CAPILLARIS. — Circà Lugdunum ex cl. Balbis lugd. 1. p. 807.

4. A. CARYOPHYLLÆA. — A. inflexa Lois. gall. II. 1. p. 56. t. 22. A. Lensæi Lois. l. c. A. divaricata Lois. ! l. c.

Page 517.

FESTUCA.

4. F. BROMOIDES. — F. agrestis Lois. gall. II. 1. p. 87.

Page 519.

15. F. NIGRESCENS. — In pratis humidis Pilati ex cl. Balb.

Page 524.

POA.

17. P. SUDETICA.

β . *hybrida*, foliis longissimis acutissimis, glumellæ valvulâ externâ basi lanuginosa. — In summis Jurassi cacuminibus. — P. hybrida Gaud. agr. 1. p. 215; fl. helv. 1. p. 229. (v. s.)

Page 525.

21. P. ERAGROSTIS. — In Andagaviâ, monente cl. Guépin, nuspiam reperitur.

Page 526.

CYNOSURUS.

3. C. ELEGANS. — C. fertilis Lois. gall. II. 1. p. 68?

1036 EMENDANDA ET ADDENDA.

Page 530.

TRITICUM.

19. *T. TENUICULUM*. — An ut me in litt. monet cl. Guépin, qui se spiculas simul aristatas et muticas reperiisse ait, var. aristata T. Poæ?

Page 539.

ATHYRIUM.

Capsulæ in acervulos ovatos elongatos sparsos dispositæ, inclusio laterali interioris dehiscente tectæ.

Page 543.

LYCOPODIUM.

3. *L. ANNOTINUM*. — In Monte Pilato ex cl. Balb.

AD PARTEM SECUNDAM.

Page 548.

FUNARIA.

2. *F. MUHLENBERGII*. — In rupibus calcariis Andegaviæ Septentrioni expositis communis (cl. Guépin) de Bréb. musc. exs. n. 64.

Page 550.

BRYUM.

12. *B. SPINOSUM*. — Affinem *B. affine*.

13^a. *B. AFFINE* (Brid. meth. 119.) caulinis elongatis, foliis obovatis obtusiusculis emarginatisque pellucido-punctatis ciliato-serratis, nervo in apiculam excurrente, pedunculis aggregatis, capsulâ ovatâ pendulâ, operculo conico acuto brevi. $\frac{1}{2}$ ad lapides in sylvis Vogesorum (cl. Mougeot). — *Mnium affine* Schw. — Dill. musc. t. 53. f. 79. M. (v. s.)

Page 552.

27^a. *B. WAHLENBERGII* (Schw. supp. 1. p. 92. t. 70.) caule subsimplici, foliis oblongo-ovatis acutis serrulatis, nervo evanido, capsulâ turbinatâ pendulâ, operculo conico acuminato. $\frac{1}{2}$ in Vogesis inferioribus circa Bipontem det. Bruch. (cl. Mougeot). — *B. albicans* Brid. supp. 3. p. 19. *B. flagellare* Brid. l. c. p. 30. (v. s.)

Page 553.

NECKERIA.

1. *N. PUMILA*. — Brébisson musc. exs. n. 30.

Ante *N. viticulosam*.

2^a. *N. CLADORHIZANS* (Hedw. sp. musc. 207. t. 47. f. 1-6.) caule procumbente, ramis attenuatis compressiusculis radicantibus, foliis ovato-lanceolatis integrerrimis, nervo evanido, setâ elongatâ, theca oblongâ erectâ, operculo obtusè conico. $\frac{1}{2}$ ad rupes calcarias Alsatiæ (cl. Mougeot). — DC. fl. fr. 2. p. 542. — Folia imbricata; cilia libera dentibus lateraliter inserta. (v. s.)

Page 554.

FONTINALIS.

1. *F. ANTIPYRETICA*. — Bréb. musc. exs. n. 51.
2. *F. SQUAMMOSA*. — Bréb. musc. exs. n. 52.

HOOKERIA.

1. *H. LUCENS*. — Bréb. musc. exs. n. 28.

Page 555.

HYPNUM.

5. *H. UNDULATUM*. — In agro Andegavensi (cl. Guépin).

Page 556.

16. *H. TENELLUM*. — In muris circa Argentoratum (cl. Mougeot).

Page 558.

33. *H. STRIGOSUM*. — In Andegaviâ communis et sterilis (cl. Guépin), sed ex eodem in pago dicto *de la Dordogne* fructificans.

Page 559.

41. *H. CONFERTUM*. — In agro Duramensi (*la Dordogne*) (cl. Guépin).

41a. *H. MEGAPOLITANUM* (Bland. in Web. et Mohr tasch. p. 326.) caule depresso ramoso, foliis laxè imbricatis subdistichis erecto-patentibus cordato-ovatis acuminatis planiusculis subintegerimis, nervo ultra medium producto, capsula ovato-arcuatâ cernuâ, operculo rostrato subulato. \mathcal{U} in sylvâ Boloniensi (cl. Guépin), circâ Bipontem (cl. Mongeot). — Priori dubitanter refert cl. Arnott. (v. s.)

43. *H. CORDIFOLIUM*. — Circâ Vire (cl. Lenormand), circâ *Falaise* cl. de Bréb., fructificantem detexerunt.

Page 562.

65. *H. REPENS*. — In agro Andegavensi (cl. Guépin).

Page 564.

TORTULA.

7. *T. CHLORONOTOS*. — In pago dicto *de la Dordogne* (cl. Durieu ex cl. Guépin), in Alsatiâ (cl. Mongeot).

Page 565.

9. *T. RURALIS*.

γ . *latifolia* (Arn.) foliis latis obtusis, nervo sæpè ultra apicem non producto. — Ad arborum truncos in Alsatiâ (cl. Mongeot). — *Syntrichia latifolia* Bruch ex Moug. (v. s.)

14. *T. CUNEIFOLIA*. — In humidis Andegaviæ (cl. Guépin) circâ *Falaise* (cl. de Bréb.) (v. s.)

Page 566.

DIDYMODON.

3. *D. LURIDUM*. — In agro Andegavensi propè *Saumur* (cl. Guépin.)

5. *D. GLAUCESCENS*. — Ad rupes Jurassi (cl. Mongeot.)

6. *D. OBSCURUM*. — In agro Andegavensi communis (cl. Guépin). — Grey. crypt. fl. t. 193.

Page 567.

10. *D. HOMOMALLUM*. — In Neustriâ (cl. de Bréb. musc. exs. n. 67.)

11. *D. RUSILLUM*. — In Vogesis (cl. Moug.)

12a. *D. CYLINDRICUM* (Ann. disp. meth. 36.) caule humili simplici, foliis patentibus e basi latiusculâ capillaribus flexuosis, capsula incurvâ cylindraceâ, operculo conico obtusinsculo. \mathcal{U} circâ Argentoratum (cl. Mongeot). — *Trichostomum cylindricum* Hedw. musc. frond. t. 24. f. 7-13. Schk. dent. moos. p. 79. t. 35. (v. s.)

13. *D. PALLIDUM*. — Bréb. musc. exs. n. 65.

Page 568.

DICRANUM.

11. *D. PELLUCIDUM*. — In pago dicto *la Dordogne* (cl. Durieu ex cl. Guépin.)

Page 569.

19. *D. HETEROMALLUM*.

β . *subulatum* (Web. et Mohr.) foliis e basi latiore longissime subulato-capillaceis. — Ad terram in Vogesis (cl. Mongeot). — *D. subulatum* Hedw. sp. t. 34. f. 1-3; eng. bot. t. 1273. (v. s.)

1038 EMENDANDA ET ADDENDA.

Page 570.

WEISSIA.

3. W. STARGKEANA. — In agro Andegavensi communis Guépin.)

Page 571.

4. W. TRISTICHA. — Ad rupes calcarias Jurassi (cl. Moug.)

Page 573.

TRICHOSTOMUM.

1. T. POLYPHYLUM. — Circà Vire (cl. Lenorm.), Angers et Nantes (cl. Guépin.)

6. T. HETEROSTICHUM. — Ad rupes schistosas agri Andegavensis (cl. Guépin.)

Page 574.

10. T. FUNALE. — In rupibus septentrioni expositis agri Andegavensis (cl. Guépin). — Dryptodon funalis Brid. bryol. un. p. 193. Bréb. musc. exs. n. 46.

GRIMMIA.

2. G. AFRICANA. — In muris apricis agri Andegavensis (cl. Guépin), circà Fa-laise (cl. de Bréb.), in Vogesis (cl. Mougeot.)

3. G. PULVINATA. — Dryptodon pulvinatus Brid. Bréb. mus. ex. n. 47.

Page 575.

4. G. LEUCOPHAEA. — Grev. in l. Grev. crypt.

5. G. OVATA. — Ad rupes schistosas Andegaviæ Septentrioni expositas (cl. Guépin.)

10. G. MARITIMA. — (v. s.)

Page 576.

ORTHOTRICHUM.

1a. O. STURMII (Hornsch. in bot. zeit. 1819. p. 89.) caule erecto ramoso, foliis lanceolatis acutis erecto-patentibus siccitate strictis rigidis, capsula subimmersa lœvi, peristomate simplici dentibus lacunosis, calyptra villosissimâ. $\frac{1}{2}$ ad rupes montis Hohneck Vogesorum (cl. Mougeot). (v. s.)

7. O. RIVULARE. — Circà Vire (cl. Lenormand).

Page 579.

ANICTANGIUM.

3. A. SUBSESSILE (Arnott disp. meth. 11.) caule erecto brevissimo subsimplici, foliis imbricatis ovatis concavis omnibus nervo valido fusco in pilum album longissimum producto instructis, capsula subsessili subglobosa, operculo convexiusculo rostellato. $\frac{1}{2}$ circa Argentoratum ex cl. Moug. — Schistidium subsessile Brid. meth. 21. Gymnostomum acaule W. et M. tasch. t. 6. f. 48.

Page 580.

GYNOSTOMUM.

3. G. MICROSTOMUM. — In agro Andegavensi (cl. Guépin), in arvis Alsatiæ (cl. Mougeot). — Hymenostomum obliquum et H. squarrosum Nees.

6. G. SPHERICUM. — In agro Andegavensi rarissimum (cl. Guépin).

11. G. FASCICULARE. — In humidis Andegaviæ (cl. Guépin). — De Bréb. mus. exs. n. 74.

Page 581.

15. G. VIRIDISSIMUM. — In agro Andegavensi det. cl. Guépin et ex eo in pago de la Dordogne cl. Durieu.

Page 582.

PHASCUM.

1a. P. STENOPHYLLUM (Voit ex Moug.) subacaule, foliis angustis lanceolato-subulatis erectis serrato-dentatis nervo crasso viridi instructis, capsula globosa immersa. (1) ad terram in agris Alsatiæ (cl. Mougeot). — Minimum, oculis vix perspiciendum. (v. s.)

2. P. ALTERNIFOLIUM. — In agro Andegavensi (cl. Guépin.)

EMENDANDA ET ADDENDA. 1039

2a. P. GLOBIFERUM (Brid. meth. 10.) caulescens, surculis tenuibus elongatis foliosis, foliis approximatis superioribus confertis ovato-lanceolatis acuminatis integris nervo apicem attingente, perichætialibus longissimis capsulam subsessilem involventibus. $\frac{1}{2}$ in arenosis humidis Alsatiæ (cl. Mongeot). (v. s.)

5. P. AXILLARE. — In agro Andegavensi (cl. Guépin.)

Page 583.

7. P. PACHYCARPON. — In agris Alsatiæ (cl. Moug.)

8a. P. FLÖRKEANUM (Web. et M. tasch. 70.) subacaule erectum minutissimum, foliis ovato-lanceolatis acuminatis concavis integerrimis apice patulis, nervo crasso excurrente, capsulâ subsessili immersâ erectâ ovalâ. (I) in solo lutoso Alsatiæ (cl. Moug.) — Schw. supp. I. t. 3. Schk. dent. moos. p. 5. t. 1. (v. s.)

10. P. BRYOIDES. — In humidis Andegaviae (cl. Guépin.)

11. P. RECTUM. — Circâ Falaise (cl. de Brébisson.)

Page 584.

JUNGERMANNIA.

1. J. TRICHOHYLLA. — Circâ Falaise (cl. de Breb.)

Page 585.

7. J. SPAGNI. — Circâ Vire (cl. Lenormand.)

8. J. CRENULATA. — In agro Andegavensi (cl. Guépin.)

10. J. EMARGINATA. — Ad rupes Septentrioni expositas agri Andegavensis (cl. Guépin.) circâ Falaise (cl. de Breb.)

13. J. INFLATA. — In tarfosis Vogesorum (cl. Mongeot.)

Page 586.

14. J. EXCISA. — In rupibus septentrioni expositis agri Andegavensis (cl. Guépin), circâ Vire (cl. Lenorm.)

16a. J. TURNERI (Hook. jung. t. 29.) caule procumbente flexuoso stellatim ramoso, foliis latè ovatis acutè bipartitiis, segmentis conduplicatis spinulosodentatis, capsulâ terminali, vaginis linearis oblongis longitudinaliter plicatis, ore denticulato. — In agro Andegavensi (cl. Guépin). — Pl. vix 3-4 lin. longa; folia vix 20m lineæ partem æquantia. (v. s.)

17. J. BYSSACEA. — In rupibus schistosis agri Andegavensis frequens (cl. Guépin.)

18. J. CONNIVENS. — Ad oras aquarum in Andegavia (cl. Guépin.)

Page 588.

31a. J. ANOMALA (Hook. jung. t. 34.) caule procumbente simplici, foliis orbicularibus his rotundo-ovatis concavis, illis ovato-acuminatis planiusculis, stipulis latè subulatis. — In tarfosis Vogesorum (cl. Mongeot). — Caules 1-3 poll. alti; folia bifaria $\frac{3}{4}$ -1 lin. longa. (v. s. sine fractu.)

Page 589.

40. J. BARBATA. — In agro Andegavensi (cl. Guépin.)

41. J. REPTANS. — In agro Andegavensi communis (cl. Guépin.)

42. J. TRILOBATA. — In agro Andeg. (cl. Guépin.)

47. J. SERPYLLIFOLIA. — Frequens in rupibus schistosis agri Andegavensis (cl. Guépin.)

Page 593.

RICCIA.

10. R. NATANS. — In flaviis lente fluentibus Andegavia (cl. Guépin.)

Page 603.

PARMELIA.

14. P. PHYSODES.

1040 EMENDANDA ET ADDENDA.

-*P. diatrypa*. — Hujus apothecia, monente in litt. cl. Le Prevost, reperit
cl. Maugeot, margine undulato crenato. Idecirò in dignitatem speciei
restituenda sub. n. 14a *P. diatrypa*. (Ach. lich. 493.)

Page 609.

COLLEMA.

13a. *C. AZUREUM* (Ach. lich. 654.) Thallo foliaceo membranaceo tenerimo
lævi pellucido cærulecente, lobis rotundatis glabris integerrimis, apotheciis
sparsis subpodicillatis rubris, margine pallido. — In Corsicâ propè San
Bonifacio del. cl. Pouzolz ex cel. Fee in dict. class. t. 9. p. 306. — *Lichen*
azureus Sw. fl. ind. occid. 3. p. 1895.

Page 636.

CALYGIUM.

3. *C. PREVOSTII*. — *C. physarellum* Fries ined. ex cl. Le Prev.

Page 640.

OPEGRAPHA.

12. *O. MACULARIS*. — *Hysterium rugosum* Fries el. fung. 2. p. 141.

Page 645.

VERRUCARIA.

15a. *V. HYDRELA* (Ach. syn. 94.) crustâ effusa tenui tartareo-verruculosa sub-
contiguâ hic illuc rimulosa cinerea aut fuscescenti-cinerea, apotheciis mi-
nutis subglobosis semi-immersis subpapillatis atris intus albidis. — Ad
silices in viis Neustriæ (cl. Le Prev.) (v. s.)

Page 656.

PATELLARIA.

77. *P. VIRIDI-ATRA*. — Conf. *P. armeniacam* n. 81.

Page 638.

SQUAMMARIA I. SQUAMARIA.

Page 672.

CHIODECTON.

1. *C. MYRTICOLA* Fée. ess. crypt. off. p. 8. t. 18. f. 1.; ann. sc. nat. mai 1829.
t. 1. f. 3.

Page 676.

CONIOCARPON.

8. *C. OLIVACEUM*. — In cortice Salicum nunquam vidit cl. Le Prevost, sed in
cortice Alni et vetustis trabibus.

Page 678.

SEHÆRIA.

5. *S. GUEPINII*. — Fries el. fung. 2. p. 58. — Stipes ad 6-7 unc. extensus lineam
crassus utique vellere stuposo obductus

Page 679.

11a. *S. RIGENS* (Fries el. fung. 2. p. 61.) subcarnosa applanata sparsa vix mar-
ginata utrinque e viridi-nigrescens intus alba, receptaculis in disco peri-
pherici sparsis pallidis, ostiolis sublatentibus. — Ad cortices et ligna Galliæ
occidentalis det. cl. Levieux ex Fries, p. 680.

17. *S. GRANULATA*. — *Stromatosphæria rubiginosa*. Grev. crypt. fl. t. 114 ex
cl. Fries.

24a. *S. UNITA* (Fries el. fung. 2. p. 67.) effusa plana contigua junior fuligineo-
prainoso intus cinerea adulta atro-purpurea intus atra, receptaculis laten-
tibus, ostiolis papillato-prominulis. — Suprà cortices Coryli in Galliâ, cl.
Guépin ex cel. Fries. — Receptacula primò in stromate sparsa demum
conferta.

Page 681.

25. *S. RUBRICOSA* (Fries el. fung. 2. p. 63.) qui hanc inter Polvinatas in vici-
nio *S. fragiformis* collocat.

31a. *S. ATRAMENTOSA* (Fries in Kunze myc. heft. 2. p. 38.) atra, receptaculis
peregrinis confertis hemisphæricis lævibus subastomis e stromate crustaceo.

tenui inaequabili nigro prominulis. — In asseribus vetustis et lignis decorticatis Mali det. cl. Mongeot ex cel. Fries, aut.

5. GLOBOSÆ I. GLEBOSÆ.

Page 682.

33a. *S. CORRUGATA* (Fries el. fung. 2. p. 70 an Chevall. par. 1. p. 498.) difformis confluens tuberculosa rimosa-corrugata atra intus einaerascens, receptaculis subglobosis profunde immersis, ostiolis papillæformibus rugosis. — Ad ligna mortua Salicis, Populi nigrae circa Angers det. cl. Guépin ex cel. Fries. — 2-3 lin. lata et crassa passim in tubercula uncialia longitudinaliter confluens.

35a. *S. CONSTRICTA* (Fries el. fung. 2. p. 70.) effusa crustacea plana secedens tuberculosa atra intus concolor, receptaculis stipatis parallelis oblongo-linearibus, ostiolis in tuberculis pertusis. — Ad ligna denudata Galliæ, vulgaris. — Stroma tenue latissime effusum.

38a. *S. VIRGULTORUM* (Fries in Kunze myc. heft. 2. p. 43.) oblonga longitudinaliter immersa extus intusque nigra, receptaculis ampullæformibus connatis, ostiolis hemisphæricis umbilicatis nitidis. — Ad ramos crassiores Betulæ in Neustriâ det. cl. Levieux ex cel. Fries. — Foveolas 1-2 uncias longas et valde profundas exsculpens,

40. *S. FAVACEA*. — *S. cavernosa* Chevall. par. 1. p. 497 ex cl. Fries.

Page 684.

57a. *S. JUNIPERI* (Fries syst. myc. 2. p. 366., el. fung. 2. p. 74.) brevis erumpens globosa, receptaculis minutis globosis ostiolisque prominentibus nigris furfure albido tectis. — In Castanea vescà Galliæ occidentalis (cl. Levieux). — Lin. 2 longa.

Page 687.

81. *S. MICROSTOMA*. — Huic refert cl. Fries el. 2. p. 78. *S. corniculatam* DC. fl. fr. 5. p. 124.

Page 690.

106a. *S. FURFURACEA* (Fries in vet. ac. handl. 1817. p. 103.) irregulariter circinnans, receptaculis globosis pulvere furfuraceo immixtis, ostiolis brevissimis junctis obsoletè prominulis. — Sub cortice Populi legit cl. Mongeot ex Fries el. 2. p. 79.

Page 691.

108a. *S. AURORA* (Fries el. fung. 2. p. 80.) cespitosa, receptaculis globosis laevibus coccineis subastomis è tuberculo gelatinoso albo stellato erumpentibus. — Ad cortices Tiliæ circa Neufchâtel det. cl. Chaillet ex Fries, probabiliter in Galliâ finitima nascentes. — Stroma per epidermidem stellatum fissam erumpens 3-5 lin. usquæ latum.

Page 692, antè *S. Melogramma*.

127a. *S. GYROSA* (Schw. syn. car. p. 24.) minor gregaria subrotunda confluens aurantie-miniata, stromate lutescente, receptaculis paucis gyrosis pulvulentis demum prominulis. — In rimbis et ligno decorticato Quercus in Galliâ occidentali ex cel. Fries. — Sub ipsâ epidermide innata mox erumpens; receptacula gelatinâ albâ farcta.

127b. *S. LEVIEUXII* (Fries el. fung. 2. p. 34.) effusa emersa coccineo-miniata, stromate rubro-lutescente, receptaculis numerosissimis minutis connatis demum prominulis collabentibus. — Ad cortices truncorum circa Rothmagum (cl. Levieux). — An à *S. coccinea* satis distincta.

127c. *S. ESCAROIDES* (Fries l. c.) emersa subsuperficialis convexa tubulosorugosa opaca atra nunc orbicularis nunc elongata, receptaculis minimis

1042 EMENDANDA ET ADDENDA.

globosis nigro-farctis, ostiolis prominulis. — Ad cortices Juglandis det. cl. Guépin. et Mougeot ex cl. Fries.

Page 694.

137a. *S. SUBUSTA* (Fries el. fung. 2. p. 89.) innata, stromate nullo, receptaculis numerosis minimis prominentibus astomis in maculas orbiculares nitidulas confluentibus. — Ad corticem vivum Coryli Avellanae circa Rothomagum (cl. Levieux). — Maenlæ ~~tin.~~ latæ tenerimæ epidermidis pellicula tectæ.

143. *S. ALOPECURI* (Fries el. fung. 2. p. 90.) — Ostiolis pro atris l. albis.

Page 696, ante *S. aurantiacam.*

160a. *S. FULVA* (Fries el. fung. 2. p. 90.) receptaculis sparsis depresso-hemisphaericis subastomis fulvo-fuscescentibus, subiculo effuso leproso aurantio-fulvo. — Suprà ligna et folia putrescentia circa Rothomagum detexit cl. Levieux ex Fries.

Page 697.

169. *S. CANESCENS.* — Huic refert cl. Fries el. 2. p. 92. *S. hispidam* DC. fl. fr. 5. p. 140 nou Tode.

Page 698.

177a. *S. DELICATULA* (Fries el. fung. 2. p. 92.) minuta conferta glabra globosa mollis collabescendo umbilicata subochracea, ostiolo latente. — In caulinis putredine consumptis Hellebori det. cl. Guépin ex cel. Fries — Superficialis.

Page 699.

184. *S. STERCORARIA* *β. stercoris* — Dele; vide supp. ad pag. 705.

Page 702.

217a. *S. ORTHOCERAS* (Fries el. fung. 2. p. 97.) innato-immersa seriata globosa persistens nigra, ostiolo stricto conico-cylindrico. — In caulinis putrescentibus Lapsanæ det. cl. Mong. ex Fries. — Receptacula profunde demersa.

Page 703.

226. *S. MEDUSINA.* — Cl. Fries l. c. pilos rigidos, etc., quos descripsi, ut ostiola copiosa fasciculato-erumpentia divergentia habet. Receptacula admodum parca minuta.

Page 704.

233a. *S. MAMILLANA* (Fries in vet. ac. handl. 1818. p. 103; syst. myc. 2. p. 487.) sparsa, receptaculis magnis hemisphaerico-prominulis epidermide nigrefactâ adnatâ tectis, papillâ erumpente globosa limbo albicante angustissimo cinctâ. — Ad ramos exsiccatos Corni et Rhamni in Galliâ det. cl. Guépin ex Fries. — Nulla adest macula nigra.

234a. *S. MERDARIA* (Fries el. fung. 2. p. 100.) sparsa distansve, receptaculis immersis globosis albis maculâ cinereo-nigricante tectis, papillâ nigra prominulâ demum pertusa. — In merdâ pecorum (cl. Mougeot). — Receptacula majuscula sub singulâ maculâ solitaria.

238a. *S. MOUGEOTII* (Fries el. fung. 2. p. 100.) erumpens sparsa, receptaculis obpyriformibus mollibus roseis siccis longitudinaliter collabentibus aurantiacis, ostiolo crasso papillæformi obscuriore. — In ramis Hederae in Vogenesis det. cl. Mougeot ex Fries.

238b. *S. ERICÆ* (Fries l. c.) erumpens sparsa, receptaculis globosis furfuraceis fuscis, ostiolo conico papillato. — In ramis Ericæ circa Angers det. cl. Guépin ex Fries.

240a. *S. EXCAVATA* (Fries l. c.) erumpens sparsa, receptaculis planis atris de-

mum collabescendo-cupuliformibus, ostiolo papilliformi prominente. — In ramis exsiccatis circa Rothomagum det. cl. Levieux ex Fries. — Epidermide secedente nuda; receptacula orbicularia lœvia.

Page 705.

242. *S. FRAXINI*. — Dele; vid. supp. ad. pag. 737.
 247a. *S. STERCORTIS* (DC. fl. fr. 2. p. 294.) minima primò tecta dein emersa prominula punctiformis, receptaculis nigris ovoideis collabentibus nitidis, ostiolo poroso. — In fimo. — Fries el. fung. 2. p. 104. S. simet DC. l. c. ex Fries. *S. stercoraria* f. *stercoris* Fries syst. Dub. bot. gall. 2. p. 699.

Page 706, antè Sphaeriam comatam.

- 252a. *S. LIRELLA* (Moug. et Nestl. exs. n. 668.) receptaculis liberis distinctis seriatis paucis minutis globoſis molibus collabescendo basi umbilicatis nidulantibus sub bullâ epidermidis lanceolata atrâ nitidâ. — In caulis aridis Spireæ Ulmariae. — Fries el. 2. p. 105. — Bulla lineam et ultrâ longa.
 252b. *S. SCUTIFORMIS* (Fries el. fung. 2. p. 105.) applanata orbicularis concentricè striata atra in centro umbonata, intus concolor, nucleo centrali globoso inclusu atro. — Ad caules herbarum exsiccatos det. cl. Levieux ex Fries. — Lineam subsequens. An Centhosporæ sp.?
 252c. *S. SOLIDAGINIS* (Fries l. c.) subinnata orbicularis deppressa fuligineo-atra, disco erumpente albo, papilla centrali prouidente globosâ atrâ umbilicata. — Ad caules Solidaginis circa Angers det. cl. Guépin ex Fries. — Discus demum fuscescens. An Centhosporæ sp.?

Page 707.

- 267a. *S. EUSTOMA* (Fries el. fung. 2. p. 109.) tecta suberumpens globoso-deppressa glabra atra, ostiolo simplici umbilicato. — Ad culmos det. cl. Guépin ex cl. Fries.

Page 713.

DOTHIDEA.

- 1a. *D. DECOLORANS* (Fries el. fung. 2. p. 122.) erumpens tuberculiformis hemisphærica è pallido-nigrescens intus concolor, cellulis minimis periphericis albis. — Ad ramos putridos det. cl. Levieux ex Fries. — Seminis Viciae aut Pisi magnitudine.

Page 717.

EUSTEGIA.

1. *E. DISCOLOR* (Fries obs. 2. t. 8. f. 2.) superficialis submembranacea atra intus albida, operculo convexo umbonato fusco-rufescente demum deciduo. — Ad asperes Pineos in Gallia ex cl. Fries. vere.
 2. *E. ILICIS*. — Fries el. 2. p. 112.

Page 718.

HYSERIUM.

- 4a. *H. EMERGENS* (Fries el. fung. 2. p. 140.) emergenti-superficiale molliusculum elliptico-oblongum punctiforme lœve atrum, labiis tenuibus inflexis. — Ad ligna Populi nigrae det. cl. Mougeot ex Fries.

Page 719.

7. *H. AGGREGATUM*. — Lophinum aggregatum Fries el. fun. 2. p. 114.

Page 726.

LABRELLA.

2. *L. PTARMICÆ* (Fries el. fung. 2. p. 145.) receptaculis majoribus opacis rotundato-difformibus atris sparsis demum rimâ longitudinali fissis, sporulis ellipsoideis. — In foliis gramineis exsiccatis det. cl. Mougeot ex Fries.

Page 728.

HYMENELLA.

2. *H. UMBILICATA* (Fries el. fung. 2. p. 37.) minuta orbicularis coriaceo-tremellosa atra submarginata centro umbilicata. — Ad caules exsiccatos Gentianæ luteæ in Vogesis, Angelicæ sylvestris propè Beauvais. — P? umbilicata Pers. Mong. et Nestl. vog. n. 788. Dub. bot. 2. p. 754. — Lineam vix attingens.
 3. *H. RUBELLA* (Fries el. fung. 2. p. 38.) seriato-elongata confluenus tenuissima immarginata lævis fulvo-coccinea. — Ad culmos Typhæ latifoliæ circa Angers det. cl. Guépin ex Fries. — In plures series parallelas disposita.

Page 729.

DACYRHYMYES.

- 2a. *D. ROSEUS* (Fries el. fung. 2. p. 35.) minutus cupulæformis mollis rosens. — In Jungermanniâ byssacea Vogesorum det. cl. Mongeot. — Puncto vix major.

Page 731.

TREMELLA.

- 7a. *T. INDECOLORATA* (Sommers. lapp. 306.) sessilis rotunda tumida convexa plicata opaca sordida sicca nigro-fusca. — Ad Populos in montanis. — Fries el. fung. p. 33. — Primò sicca aspero-corngata dura, madefacta tumens 2-4 lin. lata 2 lin. crassa.

Page 733.

STICTIS.

I. *CORTICIA* Fries syst. myc. 2. p. 192.

Ceraceo-molles subtremellosæ in ambitu sæpè liberæ ab epidermide ruptâ cinctæ, disco hymenio undique vestito. — Majusculæ.

1. *S. COCCINEA* (Fries el. fung. 2. p. 24.) erumpens ceracea coccinea tubercula-risæformis linearis aut sæpius orbicularis demùm urceolata, margine proprio obtuso. — In ramis emoriis Mori albæ det. cl. Chaillet, junior Fusidium, adultior Tubiculariam, perfecta Pezizam referens.
 2. *S. NIGRELLA* (Sommers. lapp. p. 303.) erumpens orbicularis ceraceo-mollis patellæformis disco nigro convexiusculo, margine tenui farinoso albicante. — In Populo det. cl. Chaillet ex Fries el. 2. p. 24.
 3. *S. PUPULA* (Fries syst. 2. p. 193; el. 2. p. 25.) erumpens orbicularis, ceraceo submollis patellæformis, disco atro concavo, margine crasso tumido farinoso albicante. — Ad ligna Pyrenæorum ex cl. Fries. — *S. mollis* Pers. myc. 1. p. 337. Urceolaria monocarpa Dufour ined. — Junior globulos minutos farinaceo-floccosos albos disco punctiformi nigrescente impresso sistens; passim limbi plures confluant in crustam niveam.

Page 734.

10. *S. RHODOLEUCA* (Sommers. lapp. p. 198.) erumpens ovata majuscula plana roseo-alba pruinosa intus flava, margine spurio cincta. — Ad strobilos Pini sylvestris in Galliâ boreali. — Discus 1-2 lin. longus.

11. *S. ALBA* (Fries el. fung. 2. p. 27.) erumpens prominens elongata immarginata constanter nivea, disco convexo farinaceo. — Ad ligna quercina. — Sclerotium album DC. fl. fr. 5. p. 112, mem. mus. 2. p. 411. Dub. bot. gall. — Limbus nullus.

Page 736.

CENANGIUM.

12. *C. DIFFORME*. — Stroma sub epidermide cortici interiori innatum latè ambienti-effusum, humidum nigrescens, siccum supernè lutescens aut olivaceum.

Page 737.

TYMPANIS.

- 2a. *T. FRAXINI* (Fries syst. myc. 2. p. 174, el. fung. 2. p. 18.) subsessilis sparsa

globosa dein *turbanato-truncata* *lævis nitida atra*, *disco piano irregulari subrugoso-tuberculoso*, *margine prominente obtuso flexoso marginato*. — In ranulis *exsiccatis* Fraxini in Galliæ boreali ex cl. Graves et Desmazières, aut. hyeme, vere. — *Sphæria Fraxini* Fries syst. 2. p. 493. Desmaz. cr. exs. n. 254. Dub. bot. gall. 2. p. 705.

- 2b. *T. ARIÆ* (Fries syst. 2. p. 175; el. fung. 2. p. 18.) *sessilis tota nigra*, *cupulis primò sparsis subrotundis demùm dense congestis dilatatis orbicularibus applanatis margine subelevato cinctis*. — In cortice Ariæ et Cotoneastri in Jurasso det. el. Chaillet. — Pez. Ariæ Pers. myc. eur. 1. p. 325. *Sphæria conica* Alb. et Schw. S. Cotoneastri Fries syst. myc. 2. p. 494. — *Cupulæ satis magnæ*.
5. *T. VITICOLA* (Fries syst. myc. 2. p. 176; el. fung. 2. p. 19.) *minuta sessilis hemisphærica innata rugulosa opaca fuscescenti-nigra tremellosa-coriacea*, *disco primo impresso punctiformi marginato dein dilatato*. — Ad ramos *exsiccatos* vitis in Galliæ ex cl. Fries. — *Sparsa solitaria*.

Page 740.

PEZIZA.

9a. *P. FULGENS* (Pers. myc. eur. 1. p. 241.) *subsessilis excentrica contorta nudulata subaurantia subtus subgranulosa concolor*. — In pinetis Helvetiæ propè Neuchâtel et in Jurasso finitimo, maio, junio. — Fries syst. myc. 2. p. 67. el. fung. 2. p. 6. Dub. bot. gall. 2. p. 742. — Ob sinus profundos ferè lobata 1-1½ unc. lata.

β. aureo-virens (Fries el. 1. c.) *substipitata intus virenti-aurea*, *extus subvirens*. — In Abiegnis Vogesorum det. cl. Mugeot ex cl. Fries.

Page 742.

29. *P. FULGENS*. — Dele. Conf. supp. ad. pag. 740.

Page 744.

45a. *P. HIRTA* (Fries syst. myc. 2. p. 84; el. fung. 2. p. 8.) *sessilis subhemisphærica extus fusca hirta*, *margine subinfexo*, *intus miniata*. — Ad terram sabulosam aut in pratis siccis Vogesorum det. cl. Mugeot, junio. — *P. vitellina* & *sabulosa* Pers. myc. 1. p. 257. Dub. bot. 2. p. 744. ubi delenda. — *Crassa subdepressa* 2-3 lin. lata, *disco in siccis expallente*.

Page 746.

63a. *P. ACUUM* (Alb. et Schw. p. 330. non Pers.) *minima stipitata albida aut rubescens*, *cupulæ planiusculæ extus hirtiusculæ*. — In foliis adhuc viridibus Pini sylvestris in Jurasso detexit cl. Chaillet. — *P. perpusilla* Pers. — *Stipes longus*, margo non prominens.

64. *P. ALBO-VIOLASCENS*.

β. velutina, alba. — Ad corticem Syringæ vulgaris et Lonicera Caprifolii propè Lille ex cl. Desmazières, vere. — *P. velutina* Desmaz. cat. pl. om. 14; crypt. exs. p. 17. ex cl. Fries.

67. *P. AMORPHA*. — *Thelephora amorpha* Fries el. fung. 1. p. 183.

Page 747.

69. *P. PICEÆ*. — *Cenangii* sp. cl. Fries el. fung. 2. p. 22. videtur.

77a. *P. STRIGOSA* (Fries syst. myc. 2. p. 103.) *gregaria vel sparsa innato-sessilis superficialisve applanata concava*, *setis longis erectis liberis strigosa*, *nigra disco albo-pallescidente*. — Ad culmos et folia graminum arida, ad caules herbarum majorum, v.g. Sonchi Alpini legit cl. Mugeot in præruptis Vogesorum ex Fries.

β. hysteriformis (Fries) elongata rugosa rimæ longitudinali dehiscens, disco pallidè cæruleo. — In caulibus Urticæ det. cl. Mugeot.

79a. *P. DENTARÆ* (Fries el. fung. 2. p. 9.) *minima punctiformis libera sub-*

1046 EMENDANDA ET ADDENDA.

sphærica glabrescens badio-fusca, disco aperto concolori. — In caulis Dentariæ in Jurasso det. cl. Chaillet ex cel. Fries, maio. — Sæpe prorsùs glabra, sed individua majora setulis patulis teguntur.

Page 750.

97. P. FRUCTIGENA. — Helotium flavescens Pers. myc. 1. p. 314 ex cl. Fries.

Page 751.

111. P. LENTICULARIS. — Helotium nigripes Pers. myc. eur. 1. p. 314 ex cel. Fries cl. 2. p. 5.

113. P. MOUGEOTII. — Lichenis speciem affirmat cl. Fries el. fung. 2. p. 11 et suæ Biatoræ campestri refert.

Page 752.

120a. P. TESTACEA (Fries el. fung. 2. p. 11.) gregaria sessilis ceraceo-gelatinosa inæqualis glabra subdepressa testacea exsiccata rufescens. — In telâ laceratâ et semiputridâ lecta à cl. Mougeot ex Fries. — Lin. $1\frac{1}{2}$ lata; discus sub-punctulatus.

Page 754.

140? P? UMBILICATA. — Dele. Conf. supp. ad pag. 728.

Page 758.

MORCHELLA.

6. M. SEMILIBERA. — M. hybrida Grev. crypt. fl. t. 89. M. crassipes Pers. myc. eur. 1. p. 206. ex el. Fries cl. fung. 2. p. 2.

Page 760.

TYPHULA.

2. T. FILICINA — T. Todei Fries syst. myc. 1. p. 494; el. fung. 1. p. 236.

Page 761.

PHACORHIZA.

1. P. SCLEROTIOIDES. — Pistillaria Phacorhiza Fries el. fung. 1. p. 238.

Page 762.

CLAVARIA.

2a. C. CORTICALIS (Batsch. cons. 1. t. 28. f. 162.) subcespitosa mollis subuliformis, pellucida carneo-pallida. — Ad cortices arborum dejectos det. cl. Chaillet ex cel. Fries. — Vix lineam longa.

Page 764.

11. C. INAEQUALIS. — Ut hujus formam habet cl. Fries C. fusiformem n. 12.

17. C. KUNZEL. — Huic C. chionæam n. 22. refert. cl. Fries.

Page 765.

21. C. CRISTATA. — Huic C. trichopum n. 19 refert cl. Fries.

26. C. PRATENSIS. — Huic C. vitellinam n. 18 refert cl. Fries el. fung. 1. p. 230.

27. C. MUSCIGENA. — Huic sequentem refert cl. Fries l. c.

Page 767.

MERISMA.

2. M. PALMATUM γ. flabellare. — Status imperfectior Thelephoræ caryophyllæ ex cl. Fries el. fung. 1. p. 166.

5. M? SERRATUM. — Thelephoræ incrustantis forma ex cl. Fries el. fung. 1. p. 214.

Page 768.

THELEPHORA.

1. T. CINREA. — Ut hujus speciei formas habet cl. Fries el. fung. 1. p. 221. T. fraxineam n. 38, T. Tiliæ n. 41, T. Piceæ n. 12, et T. Pinii n. 13.

EMENDANDA ET ADDENDA. 1047

5a. *T. GAUSAPATA* (Fries el. fung. 1. p. 171.) dimidiata, pileis subsuberosis rugosia zonatis fibroso-strigosis fusco-pallescens, hymenio glabro radiato-rugoso pallidè fuso. — Ad truncos circà Angers det. cl. Guépin ex cel. Fries. — Margo sèpè nigrescit.

Page 770.

17. *T. CORYLEAM*, *T. peltatum* et *T. rodum*. ut formas ejusdem speciei *T. rugosæ* Pers. myc. 1. p. 127. Habet cl. Fries cl. fung. 1. p. 177.

23a. *T. SUAVEOLENS* (Fries el. fung. 1. p. 208.) magna effusa suberoso-mollis contigua lèvis albida, hymenio glabriusculo. — Ad truncos Populi (cl. Mougeot.) — Odor fragrans.

Page 771.

27. *T. CASTANEÆ*. — Forma *T. nudæ* Fries syst. myc. 1. p. 447 ex Fries el. 1. p. 221.

28. *T. CORRUGATA*. — Huic refert cl. Fries *T. Padi* n. 36.

28a. *T. AREOLATA* (Chaillet in Fries el. fung. 1. p. 190.) resupinata lèvis lignosa, margine superfìe reflexo, angusto spadiceo bicolori, hymenio lèvi cinereo. — Ad cortices vetustos exsiccatos Taxì baccatæ det. cl. Chaillet ex Fries. — Ambitus vix uncialis passim rimoso-partitus; hymenium sub lente fortiori tenuissimè setulosum.

33. *T. AURANTIA*. — Ceracea adnata confluens ambiens, hymenio lète colorato pruinâ subcarneâ tenuissimâ adsperso. — Huic refert cl. Fries *T. incarnatam*, *T. lateritiam*, *T. polarim* et *T. fallacem* Pers. — Variat testacea crocea incarnata alutacea flava, nunc effusa nunc tuberculosa.

Page 773.

CONIOPHORA.

1. *C. MEMBRANACEA* f. *leioplaca*. — *Merulius palverulentus* Fries el. fung. 2. p. 60.

Page 775.

HYDNUM.

7. *H. LEUCOPUS* ab *H. lèvigate* non diversum ait cl. Fries el. Fung. 1. p. 130.

10. *H. BUBALINUM* ab *H. lèvigate* non diversum ex Fries l. c.

Page 776.

11. *H. FUSIPES* lege *H. infundibulum* (Swartz in vet. ac. handl. 1810. p. 244.) — Fries syst. myc. 1. p. 401; el. fung. 1. p. 130.

Page 778.

32. *H. ABIEtinum*. — Hocce refert cl. Fries *H. Pinastri* Fries obs. myc. 1. p. 149. *Sistotrema Pinastri* Pers. myc. 2. p. 199.

Page 779.

36. *H. FARREUM*. — Hocce ab *H. fallaci* n. 49 non diversum ait cl. Fries el. fung. 1. p. 140.

Page 780.

54. *H. PARADOXUM*. — *H. radula* Fries syst. myc. 1. p. 423. *H. lèvigate* Pers. *Radulm orbiculare* Grev. fl. crypt. t. 278. Fries el. fung. 1. p. 150.

Page 782.

BOLETUS.

7. *B. MITIS* lege *B. bovinus* (Fries syst. myc. 1. p. 388.) nomen antiquius servandum.

8. *B. GUTTATUS* l. *B. VARIEGATUS* Fries l. c.

11. *B. BRACHYPORUS*. — A. priori non diversum affirmat cl. Fries.

1048 EMENDANDA ET ADDENDA.

14. *B. ELATUS* l. *B. PACHYPERIS* (Fries obs. 1. p. 118.)

Page 783.

16. *B. TESTACEUS*. — Var. *fulvida* *B. cyanescens* ex cl. Fries el. fung. 1. p. 128.

Page 785.

POLYPORUS.

6. *P. RUFESCENS*.

P. biennis. — *Dædalea bieunis* Fries syst. myc. 1. p. 332. el. fung. 1. p. 65.

Page 789.

36. *P. PURPURASCENS*. — Hunc cum *Thelephorâ Corio* Pers. Grev. crypt. fl. t. 147. sub nomine, *Merulius Corium* conjungit cl. Fries el. fung. 1. p. 78.

37. *P. DOLOSOUS*. — Formam *P. Abietini* ait cl. Fries el. fung. 1. p. 97.

Page 790.

47. *P. TORULOSUS*. — *P. ignarius* c. Fries el. fung. 1. p. 109.

51. *P. LORICATUS*. — A *P. ignario* non distinctum affirmat cel. Fries el. fung. 1. p. 109.

Page 791.

53. *P. MEGALOPORUS* l. *P. expansus* Desmaz. crypt. exs. n. 16. Bol. *expansus* Desmaz. cat. pl. om.

56. *P. SCALARIS*. — *P. serialis* c. *scalaris* Fries el. fung. 1. p. 93.

61. *P. UMBRINUS*. — A *P. obliquo* non differre affirmat cl. Fries.

Page 794.

DÆDALEA.

1a. *D. SERPENS* (Fries syst. myc. 1. p. 240; el. fung. 1. p. 71.) effusa suberoso-tenuis confluens liqueo-pallens, margine villoso; poris magnis inæqualibus. — Ad trunco Sorbi in montibus Vogesis det. cl. Mougeot ex Fries. — *Coriaceus subfuscescens*; pori subrotundi vel elongati.

Page 796.

MERULIUS.

1. *M. CRUSTOSUS* est ex cel. Fries el. fung. p. 63, statutus *M. serpentis*.

2. *M. PAUCIRUGUS* l. *M. PORINOIDES* (Fries syst. myc. 1. p. 329.) — *Xylom. porinooides* Pers.

4. *M. CROCEUS* l. *M. HIMANTHOIDES* (Fries syst. myc. 1. p. 329.) — *Xylom. versicolor* Pers.

5. *M. PULCHER* l. *M. MOLLUSCUS* (Fries 1. c.) — *Xylom. molluscum* Pers.

Page 798.

CANTHARELLUS.

11a. *C. SPATHULATUS* (Fries el. fung. 1. p. 53.) dimidiatus, pileo carnosò-spathulato glabro subfusco inferne in stipitem tenuem lateralem porrecto, lamellis dichotomis albis. — Circa Angers det. cel. Guépin ex ill. Fries. — Subcespitosus; stipites lin. crassi vix unciales; pileus 1-1½ unc. longus et latus.

Page 799.

20. *C. XANTHOPUS* — ex cl. Fries el. 1. p. 51 à *C. lutescenti* non distinctus.

Page 864.

THELEBOLUS.

3. *T. DELICATUS* (Fries el. fung. 2. p. 51.) subglobosus glaber hyalino-fuscescens subiculo tenuissimo araneato argentato insidens. — In lignis putridis det. cel. Mougeot. — Peridium primò sphaericum astomum, humectatum hyali-

num exsiccatum fuscens puncto vix majus, dein ex ore precolato constricto globulus minutus mox decadens protruditur et peridium collabatur.

4. *T. SUDANS* (Fries l. c.) candidus, peridio subgloboso obsoletè pubescente, globulo lutescente, subiculo sericeo. — Ad ligna putrescentia Pineæ. — *Hydnus sudans* Alb. et Schw. Dub. bot. gall. 2. p. 779. ubi delendum. — Subiculum maculas sistens 2-3-uncias longas, 1 latas candidas, cui impo-nuntur peridia admodum regulariter disposita subconferta mollia.

Page 873.

SCLEROTIUM.

13a. *S. RHIZOMORPHA* (Fries el. fung. 2. p. 41.) globulare inaequabile extus intusque cervinum radicibus Rhizomorphæ instructum filiformibus teretibus ramosis per lignum repentibus. — In ligno putrido Populi nigrae det. cl. Guépin. — Piso æquale vel minus.

15a. *S. LATHYRIS* (Moug. in Fries el. fung. 2. p. 42.) punctiforme minimum globulare nigrum intus concolor è subiculo villoso griseo emergens liberatum. — In caulis emortuis Euphorbiæ Lathyris det. cl. Mongeot. — Nudo oculo puncta subtilia referens.

17a. *S. PROTUBERANS* (Fries el. fung. 2. p. 42.) erumpens rotundatum snprà planiusculum sulcatum fuscum intus griseum. — Ad ligna Populi det. cl. Le Prév. et Moug. ex Fries. — E ligno sere incolumi protuberans ligni fibris tectum.

17b. *S. CORRUGATUM* (Fries el. fung. 2. p. 43.) erumpens primò disciforme pallidum dein tuberoso-prominens atrum scruposo-rugosum intus griseo-album. — Ad caules Altheæ in Galliâ occidentali circâ Angers legit cl. Guépin. — Junius disciforme laciinis epidermidis laceratae cinctum, adultum Tuberculariam referens.

Page 874, n. 31. *S. HYACINTHI* est ex cl. Fries el. fung. 2. p. 44. var. ♂ Sclerotii dñri.

Page 936, l. 21. pro muricata lege muricata.
l. 26. CYSTOSCIRA l. CYSTOSEIRA.

Page 938, l. 1. Cystoscira l. Cystoseira.
l. 51. Sphorochni l. Sporochni.

Page 939, l. 1. DRESNAGI l. DRESNÆI.

Page 941, l. 3. FLORIDÆ l. FLORIDEÆ.

l. 5. rosæ l. roseæ.

Page 944, l. 12. l. Margines haud raro subdentati leviterque undulato-plicati.
l. 55. sublente l. sub lente.

Page 945, l. 34. numerosissimæ l. numerosissimos.
l. 50. laminæ l. laminas.

Page 948, l. 11. repugnata l. repugnare.

Page 949, l. 51. tereti compressæ l. tereti-compressæ. — externa l. externe.
l. 52. attenuatæ in... l. attenuatæ, in...

Page 950, l. 42. d'Arbigny l. d'Orbigny.

Page 953, l. 28. Agartinæ l. Gigartinæ.
l. 48. laue l. laxè.

Page 957, l. 30. obsidentia l. obsidentia.

Page 960, l. 12. viridis l. virides.

Page 962, l. ult. disposita, foventibus composita l. disposita foventibus, composita.

Page 963, l. 27. voluntis l. involutis.
l. 42. instructis l. instructæ.

Page 964, l. 40. reperiit l. reperi.

l. 41. v. s. l. v. v.
l. 45. sublente l. sub lente.

1050 EMENDANDA ET ADDENDA.

- Page 964, l. 46. subformā l. sub formā.
Page 965, l. 15. subformā l. sub formā.
l. 16. rotundatum l. rotundatorum.
Page 967, l. 11. per repentem l. perrepentem.
Page 972, l. 40. agglomeratā l. agglomerata.
Page 982, l. 1. subcontracta undē... l. subcontracta. Undē.
Page 983, l. 50. vidisse. l. vidisse affirmat.
Page 984, l. 16, 17. se-pulvisculam l. se pulvisculum.
Page 985, l. 9. seriam l. seriem.
Page 986, l. 9. Gloconema l. Glioconema.
Page 988, l. 18. ovoidea æqualia l. ovoidei æquales.
Page 989, l. 26. solutè l. soluta.
Page 991, l. 11. in l. ex.
Page 992, l. 3. intertextæ l. intertexta.
Page 995, l. 13. Pedemontio l. Pedemontii.
Page 997, l. 26. Convet l. Couvet.
Page 998, l. 3. Birob l. Birol.
Page 999, int. l. 17 et 18. JUNCUS ARCTICUS Wild. sp. 2. p. 206. DC. fl. fr. 3.
p. 165 2. In Alpibus Pedemontanis et Helveticis, non in Galliâ repertus.
Page id., l. 22. Gand l. Gaud. et seq.
Page 1000, l. 28. Arnolt l. Arnott et seq.
Page 1001, l. 3. 600. DC. l. 600 non DC.
int. l. 34 et 35, RHAMNUS LYCIODES. L. sp. 279. Lois. gall. II. t. 1.
p. 135 3. In regionibus australibus ex Loiseleur.
Page 1003, l. 24. Lamb. l. Lam.
Page 1004, l. 9. unquam l. nunquam; l. 21, Lamb. l. Lam.
Page 1005, l. 8. incarnata l. incana; l. 26, Poir. l. Cav.; l. 28, Bocanil l. Vi-
viani.
Page 1006, l. 23. valdè l. valle.
Page 1009, l. 17. ang. ser. l. ex Ser.
Page 1010, l. 5. B. l. 15. l. 42, copulorum, l. scopulorum; l. 48, La Peyr. fl.
burd. l. Laterr. fl. bord.
Page 1012, l. 7. ann. l. anv. et seq.
Page 1014, l. 36. lœvigatam l. lœvигatum et seq.
Page 1015, l. 7. silaceos l. siliceos et seq.
Page 1018, l. 8. pigis l. jugis.
Page 1019, l. 50. Rabdosforium l. Rabdosporium.
Page 1026, l. 27. Ter. l. Ten.; l. 31, rar. l. var.
Page 1028, l. 24. subintegro l. subintegra.
Page 1029, l. 20. ramo l. raro.
Page 1034, l. 16. la Roussel l. les Rousses; l. 20, derelicto l. derelicti.
Page 1036, l. 18. B. affine l. L. affine.
Page 1037, l. 5. Duramensi l. Durancensi.
Page 1040, l. 30. udiue l. undique.

ORDINUM GENERUMQUE

CLAVIS ANALYTICA.

1.	Fructificatio oculo nudo perspicua.....	2
	Fructificatio oculo nudo non perspicua.....	896
2.	Flores in involuero communi aggregati.....	3
	Flores in involucro communis non aggregati.....	4
5.	Antheræ coalitæ.....	COMPOSITÆ. 790
	Antheræ liberæ.....	4
4.	Perigonum duplex, calyx et corolla.....	5
	Perigonum simplex aut nullum.....	531
5.	Corolla polypetala.....	6
	Corolla monopetala.....	355

POLYPETALÆ.

6.	Ovarium liberum.....	122
	Ovarium calyci adnatum.....	7
7.	Carpella in fructum unilocularem concreta aut (abortu) solitaria.....	8
	Carpella in fructum 2-oo-locularem concreta, aut 2 demum segregata.....	9
8.	Frutices; caulis carnosis folia æmulantibus.....	
 NOPALEÆ (p. 205). (supp. 1026.)	
	Frutices, caulis ex succis cylindricis.... GROSSULARIEÆ (p. 206).	
9.	Carpella in fructum 2-oo-locularem concreta; flores non umbellati....	93
	Carpella 2 matura à basi ad apicem segregata et ex apice carpophori suspensa; flores umbellati UMBELLIFERÆ. (p. 213 et supp. 1027).-10	
10.	Semen anticè id est in superficie commissurali planum.....	24
	Semen anticè inflexum.....	11
11.	Carpella multijugata (v. p. 213).	12
	Carpella paucijugata.....	16
12.	Fructus subterè setosus vel aculeatus.....	13
	Fructus subglobosus nec setosus nec aculeatus.....	15
13.	Juga secundaria (v. p. 213), prominula aculeata.....	14
	Juga secundaria copiâ aculeorum obliterata.....	
 TORILIS (p. 217. supp. p. 1027).	
14.	Folia pinnata.....	TURGENIA (p. 216).
	Folia 2-3-pinnatifida.....	CAUCALIS (p. 217).
15.	Calyx 5-dentatus.....	CORYANDRUM (p. 217).
	Calycis margo obsoletus.....	BIFORA (p. 218).
16.	Fructus linearis-elongatus.....	17
	Fructus ovatus subglobosus.....	20
17.	Fructus solidus, id est pericarpo undique semini adhærente.....	18
	Fructus utriculosus, id est pericarpo dorso inflato, anticè semini adnato.....	MYSRIUS (p. 240).

ij ORDINUM GENERUMQUE

18.	{ Fructus erostratus.....	CHÆROPHYLLUM (p. 238).
	Fructus rostratus.....	19
19.	{ Carpella subteretia ejugata rostro tantum 5-jugato.	ANTHRISCUS (p. 239).
	Carpella jugis 5-obtusis æqualibus.....	SCANDIX (p. 240).
20.	{ Calycis margo obsoletus.....	21
	Calycis margo 5-dentatus.....	23
21.	{ Petala emarginata	CONIUM (p. 241).
	Petala integra.....	22
22.	{ Fructus à latere contractus.....	SMYRNIUM (p. 240).
	Fructus turgidus, crassus, suberosus.....	CACHRYS (p. 241).
23.	{ Petala emarginata.....	ECHINOPHORA (p. 241 et supp. 1029).
	Petala integra.....	PLEUROSFERMUM (p. 242).
24.	{ Umbellæ imperfectæ aut simplices.....	25
	Umbellæ compositæ.....	28
25.	{ Fructus sectione transversali subteres.....	26
	Fructus à latere evidenter compressus.....	HYDROCOTYLE (p. 243).
26.	{ Flores umbellati.....	27
	Flores capitati.....	ERYNGIUM (p. 243).
27.	{ Carpella jugis 5 elevatis; vittæ nullæ.....	ASTRANTIA (p. 242).
	Carpella aculeis tecta ejugata multivittata.....	SANICULA (p. 242).
28.	{ Multijugatæ, id est carpello jugis 5 primariis et 4 secundariis instructo.	29
	Paucijugatæ id est carpello jugis 5 primariis instructo, secundariis nullis.	33
29.	{ Juga exteriora alata aut magis prominula.....	30
	Juga exteriora filiformia aptera.....	SILER (p. 218).
30.	{ Juga exteriora alata, alâ inermi.....	31
	Juga exteriora aculeata.....	32
31.	{ Fructus 8-alatus.....	LASERPITIUM (p. 214 et supp. 1027).
	Fructus 4-alatus.....	THAPSIA (p. 214).
32.	{ Juga secundaria unifariam aculeata.....	DAUCUS (p. 215).
	Juga secundaria 2-3-fariam aculeata.....	ORLAYA (p. 215).
33.	{ Fructus à dorso compressus.....	34
	Fructus sectione transversali teres vel latere compressus.....	47
34.	{ Fructus margine dilatato incrassato noduloso vel plicato cinctus.....	35
	Fructus margine alato complanato vel convexiusculo cinctus.....	36
35.	{ Valleculæ 3-vittatæ; commissura multivittata..	CONDYLOCARPUS (p. 218).
	Valleculæ 1-vittatæ; commissura bivittata.....	TORDYLIUM (p. 219).
36.	{ Carpella totâ superficie commissurali connexa et sic fructus utrinquè unialatus.....	37
	Carpella centro superficie commissuralis tantum connexa et sic fructus utrinquè 2-alatus.....	44
37.	{ Calycis margo 5-dentatus.....	38
	Calycis margo obsoletus.....	41
38.	{ Involucellum oligophyllum.....	FERULA (p. 222).
	Involucellum polyphyllum.....	39
39.	{ Petala subrotunda integra lacinulâ brevi inflexâ.....	FERULAGO (p. 223).
	Petala obovata emarginata in lacinulam inflexam coarctata.....	40
40.	{ Valleculæ 1-vittatæ, vittis clavulatis.....	HERACLEUM (p. 219).
	Valleculæ 1-3-vittatæ, vittis elongatis linearibus.....	PEUCEDANUM (p. 221 et supp. 1027).
41.	{ Petala subrotunda integra involuta.....	42
	Petala obovata emarginata vel subintegra.....	IMPERATORIA (p. 222).

CLAVIS ANALYTICA.

iii

42.	{ Vallecūlæ 1-vittatæ.....	43
	Vallecūlæ 3-vittatæ.....	OPOBANAX (p. 222).
43.	{ Fructus à dorso plano-compressus; semen complanatum. PASTINACA (p. 220).	
	Fructus à dorso lenticulari-compressus; semen convexiusculum.....	ANETHUM (p. 220).
44.	{ Calyx 5-dentatus.....	ARCHANGELICA (p. 223).
	Calycis margo obsoletus.....	45
45.	{ Petala integra.....	46
	Petala emarginata.....	SELINUM (p. 224).
46.	{ Juga 3 dorsalia filiformia, 2 lateralia alata. ANGELICA (p. 223. supp. p. 1027).	
	Juga 5 alata.....	LEVISTICUM (p. 224).
47.	{ Folia dissecta.....	48
	Folia non dissecta.....	BUPLEVURM (p. 225. supp. p. 1027).
48.	{ Semen pericarpio spongioso latere commissurali tantum adnatum.....	
	CRITHMUM (p. 238).
	Semen pericarpiumque siccum in unum coadunata.....	49
49.	{ Juga elevata alæformia.....	50
	Juga filiformia.....	55
50.	{ Involucellum oligophyllum.....	51
	Involucellum polyphyllum.....	52
51.	{ Juga subalata; vallecūlæ multivittatæ.....	TROCHISCANTHES (p. 230).
	Juga alæformia; vittæ nullæ.....	GAYA (supp. p. 1027).
52.	{ Calyx 5-dentatus.....	53
	Calycis margo obsoletus.....	54
53.	{ Vallecūlæ multivittatæ.....	LIGUSTICUM (p. 229).
	Vallecūlæ 1-vittatæ.....	MOLOPOSPERMUM (p. 231).
54.	{ Vallecūlæ multivittatæ.....	LIGUSTICUM (p. 229).
	Vallecūlæ 1-vittatæ.....	CNDIUM (p. 234. supp. p. 1028).
55.	{ Petala integra.....	56
	Petala emarginata.....	70
56.	{ Calyx 5-dentatus.....	57
	Calycis margo obsoletus.....	63
57.	{ Involucellum polyphyllum.....	59
	Involucellum oligophyllum.....	58
58.	{ Juga subalata.....	TROCHISCANTHES (p. 230).
	Juga filiformia.....	HELOSCIADIUM (p. 235. supp. 1028).
59.	{ Vallecūlæ 1-vittatæ.....	60
	Vallecūlæ multivittatæ.....	61
60.	{ Petala obovata emarginata vel subintegra.....	SESELI (p. 234).
	Petala ovata integra.....	HELOSCIADIUM (p. 235. supp. p. 1028).
61.	{ Juga subalata.....	LIGUSTICUM (p. 229).
	Juga filiformia.....	62
62.	{ Involucrum polyphyllum.....	BRAUNIA (p. 227).
	Involucrum oligophyllum aut nullum.....	MEUM (p. 230. supp. p. 1027).
63.	{ Vallecūlæ 1-vittatæ.....	64
	Vallecūlæ multivittatæ.....	68
64.	{ Involucellum polyphyllum.....	65
	Involucellum nullum aut oligophyllum.....	66
65.	{ Carpophorum bipartitum.....	PETROSELINUM (p. 282).
	Carpophorum integrum.....	HELOSCIADIUM (p. 235. supp. p. 1028).
66.	{ Fructus à latere contractus.....	APIUM (p. 232).
	Fructus sectione transversali subteres.....	67

iv ORDINUM GENERUMQUE

67.	{ Petala lanceolata aut ovata.....	TRINIA (p. 233).
	Petala subrotunda.....	FORNICULUM (p. 236).
68.	{ Involucellum oligophyllum.....	CONOPODIUM (p. 228. supp. 1027).
	Involucellum polyphyllum.....	69
69.	{ Juga subalata.....	LIGISTICUM (p. 229).
	Juga prominula carinata.....	MEUM (p. 230. supp. p. 1027).
70.	{ Vallecule multivittatae.....	71
	Vallecule 1-vittatae aut evittatae.....	79
71.	{ Calyx 5 dentatus.....	72
	Cal. margo obsoletus.....	76
72.	{ Involucellum 3-5-phylum.....	TROCHISCHANthes (p. 230).
	Involucellum polyphyllum.....	73
73.	{ Fructus in collum attenuatus.....	ATHAMANTHA (p. 228).
	Fructus in collum non attenuatus.....	75
75.	{ Juga filiformia obtusiuscula.....	SIUM (p. 229).
	Juga arguta subalata.....	LIGISTICUM (p. 229).
76.	{ Involucellum polyphyllum.....	75
	Involucellum nullum aut oligophyllum.....	77
77.	{ Fructus ovatus.....	PIMPINELLA (p. 228).
	Fructus linearis-oblongus.....	78
78.	{ Fructus stylis divergentibus coronatus.....	BUNIUM (supp. p. 1028).
	Fructus stylis rectis coronatus.....	CONOPODIUM (p. 228. supp. 1027).
79.	{ Calyx 5-dentatus.....	80
	Calycis margo obsoletus.....	86
80.	{ Involucrum oligophyllum aut nullum.....	81
	Involucrum polyphyllum.....	84
81.	{ Fructus sectione transversali subteres.....	82
	Fructus à latere contractus.....	85
82.	{ Fructus stylis reflexis coronatus.....	SESELI (p. 234).
	Fructus stylis erectis coronatus.....	OENANTHE (p. 236. supp. p. 1028).
83.	{ Fructus ovatus aut oblongus.....	PTYCHOTIS (p. 235).
	Fructus subrotundus.....	CICUTA (p. 237).
84.	{ Fructus stylis reflexis coronatus.....	85
	Fructus stylis erectis coronatus.....	OENANTHE (p. 236. supp. p. 1028).
85.	{ Fructus elongato-oblongus.....	DREPANOPHYLLUM (p. 232).
	Fructus ovatus vel oblongus.....	SESELI (p. 234).
86.	{ Involucrum polyphyllum.....	87
	Involucrum nullum aut oligophyllum.....	88
87.	{ Petala regularia.....	CARUM (p. 231).
	Petala lobis inæqualibus.....	AMMI (p. 233. supp. p. 1028).
88.	{ Vallecule evittatae.....	EGOPODIUM (p. 231).
	Vallecule 1-vittatae.....	89
89.	{ Juga 5 filiformia æqualia.....	90
	Juga elevata crassa acutè carinata.....	ÆTHUSA (p. 232).
90.	{ Fructus oblongus.....	CARUM (p. 231).
	Fructus ovatus ovato-globosusve.....	91
91.	{ Petala lanceolata ovatae.....	TRINIA (p. 233).
	Petala subrotunda.....	92
92.	{ Petala vix emarginata.....	PETROSELINUM (p. 232).
	Petala profundè emarginata.....	SISON (p. 233).
93.	{ Petala numero definita.....	94
	Petala numero indefinita.....	FICOIDÆ (p. 205).

CLAVIS ANALYTICA.

v

94.	{	Stamina numero definita, 2-10.....	104
		Stamina numero indefinita, 20-∞.....	95
95.	{	Fructus horizontaliter bicameratus.....	GRANATEÆ (p. 183).
		Fructus horizontaliter simplex.....	96
96.	{	Folia alterna basi bistipulata.....	98
		Folia opposita exstipulata.....	97
97.	{	Fructus carnosus.....	MYRTUS (p. 184).
		Fructus siccus.....	PHILADELPHUS (p. 184).
98.	{	Fructus baccatus.....	ROSA (p. 175 supp. 1026).
		Fructus carnosus.....	99
99.	{	Calyx 5-fidus, 5-lobusvc.....	100
		Calyx 5-dentatus.....	COTONEASTER (p. 180).
100.	{	Petala plūs minus orbiculata.....	101
		Petala lanceolata.....	AMELANCHIER (p. 180).
101.	{	Pomum ovatum.....	CRATAEGUS (p. 180).
		Pomum turbinatum globosumve.....	102
102.	{	Pomum apertum.....	MESPILUS (p. 180).
		Pomum clausum.....	103
103.	{	Loculi 2-spermi.....	PYRUS (p. 181).
		Loculi ∞-spermi.....	CYDONIA (p. 182).
104.	{	Frutices aut arbusculæ.....	105
		Herbæ.....	109
105.	{	Calyx 4-5-dentatus.....	106
		Calyx 4-5-lobus.....	RHAMNEÆ (p. 110.).... 107
106.	{	Calyx 4-dentatus.....	HEDERA (p. 244 supp. 1029).
		Calyx 5-dentatus.....	CORNUS (p. 244).
107.	{	Fructus alatus.....	PALIURUS (p. 111).
		Fructus non alatus.....	108
108.	{	Fructus drupaceus.....	ZIZYPHUS (p. 111).
		Fructus subexsuccus aut baccatus.....	RHAMNUS (p. 111 supp. 1025).
109.	{	Herbæ scandentes.....	CUCURBITACEÆ (p. 185.).... 110
		Herbæ non-scandentes.....	114
110.	{	Petala libera aut basi vix coalita.....	111
		Petala coalita in corollam 1-petalam.....	113
111.	{	Calyx 5-dentatus.....	BRYONIA (p. 186).
		Calyx 5-lobatus.....	112
112.	{	Calyx campanulatus ; semina marginata.....	LAGENARIA (p. 185).
		Calyx tubuloso-campanulatus ; semina non marginata.	CUCUMIS (p. 185).
113.	{	Fructus hispido-scaber.....	MOMORDICA (p. 186).
		Fructus lœvis.....	CUCURBITA (p. 186).
114.	{	Flores monoici.....	MYRIOPHYLLUM (p. 190).
		Flores hermaphroditæ.....	115
115.	{	Ovarium pluriloculare.....	ONAGRARIEÆ (p. 187.).... 116
		Ovarium 2-loculare.....	SAXIFRAGEÆ (p. 207.).... 120
116.	{	Fructus nucamentaceus.....	TRAPA (p. 189).
		Fructus capsularis.....	117
117.	{	Petala 2.....	CIRCEA (p. 189).
		Petala 4.....	118
118.	{	Calycis limbus persistens.....	ISNARDIA (p. 189).
		Calycis limbus non persistens.....	119
119.	{	Semina papposa.....	EPILOBIUM (p. 187).
		Semina nuda	OENOTHERA (p. 188).

ORDINUM GENERUMQUE

120.	{ Corolla polypetala.....	SAXIFRAGA (p. 207 supp. 1026).
	Corolla nulla.....	121
121.	{ Capsula 1-loocularis.....	CHRYSPLENIUM (p. 212).
	Bacca 4-5-loocularis.....	APOXA (p. 212 supp. 1029).
122.	{ Ovarium unicum.....	123
	Ovaria plura.....	323
123.	{ Corolla regularis.....	181
	Corolla irregularis.....	124
124.	{ Calcar calycis vel corollæ basi.....	125
	Calcar nullum.....	130
125.	{ Stamina 5 aut 6 ; calcar ex corollâ ortum.....	126
	Stamina 8 ; calcar è calyce ortum.....	TROPEOLEÆ (p. 105).
126.	{ Calyx 5-sepalus.....	VIOLARIEÆ (p. 63).
	Calyx 2-sepalus.....	127
127.	{ Stam. 6 ; stylus filiformis.....	FUMARIACEÆ (p. 128).
	Stam. 5 ; stylus o.....	BALSAMINEÆ (p. 129).
	Siliqua 2-valvis polysperma.....	CORYDALIS (p. 24).
128.	{ Capsula 2-valvis 2-sperma.....	SARCOCAPNOS (p. 25).
	Cariopsis indehiscens 1-sperma.....	FUMARIA (p. 25).
129.	{ Stigmata distincta ; capsula ovata.....	BALSAMINA (p. 106).
	Stigmata coalita ; capsula prismatico-teretiuscula...	IMPATIENS (p. 106).
	Stamina 4.....	HYPECOUM (p. 23).
	Stamina 6.....	IBERIS (p. 39).
130.	{ Stamina 7.....	HIPPOCASTANEÆ (p. 99).
	Stamina 8.....	POLYGALEÆ (p. 69).
	Stamina 10 et magis.....	131
131.	Petala laciniata.....	RESEDACEÆ. 132
	Petala integra.....	133
132.	Carpella coalita in capsulam 3-6-gonam.....	RESEDA (p. 66).
	Carpella toro stipitiformi insidentia.....	ASTROCARPUS (p. 67).
133.	Stigmata 5.....	ERODIUM (p. 103).
	Stigma 1.....	LEGUMINOSÆ. 134
134.	Petala in corollam papilionaceam disposita.....	136
	Petala nulla aut subpapilionacea.....	135
	Petala o ; legumen coriaceum indehiscens valvis crassis intùs pul- posis.....	CEBATORIA (p. 161).
135.	Petala 5 subpapilionacea ; legumen tenue compressum , valvis exsuccis.....	CERCIS (p. 161).
136.	Stamina libera.....	ANAGYRIS (p. 115).
	Stamina mono-diadelpa.....	137
137.	Legumen continuum.....	144
	Legumen in loculos articulosve 1-spermis transversim divisum.....	138
138.	Flores racemosi.....	139
	Flores umbellati.....	140
139.	Legumen sessile 1-articulatum.....	ONOBRYCHIS (p. 148).
	Legumen constans articulis plurimis 1-spermis....	HEDYSARUM (p. 148).
140.	Calyx 2-labiatus ; legumen rostratum.....	SECURIGERA (p. 147).
	Calyx æqualis ; legumen non rostratum.....	141
141.	Calyx 5-fidus.....	142
	Calyx 5-dentatus.....	142a
142.	Legumen revolutum æqual.....	SCORPIURUS (p. 145)
	Legumen revolutum constans articulis in ferri equini formam curvis.....	HIPPOCREPIS (p. 147 supp. 1026).

CLAVIS ANALYTICA.

vij

142a.	{ Calyx campanulatus.....	CORONILLA (p. 145).
	{ Calyx tubulosus.....	143
143.	{ Calyx ebracteatus.....	ASTRALOBIUM (p. 146 supp. 1026).
	{ Calyx bracteatus.....	ORNITHOPUS (p. 146).
144.	{ Calyx 2-labiatus.....	145
	{ Calyx æqualis	154
145.	{ Stamina diadelpha.....	146
	{ Stamina monadelpha.....	148
146.	{ Carina contorta.....	PHASEOLUS (p. 159).
	{ Carina recta	147
147.	{ Folia stipulata.....	DORYCNIUM (p. 136).
	{ Folia exstipulata.....	GLYCERHIZA (p. 139).
148.	{ Fructices.....	150
	{ Herbæ.....	149
149.	{ Folia simplicia.....	GENISTA SAGITTALIS (p. 117).
	{ Foliola 5-9-digitata.....	LUPINUS (p. 160).
150.	{ Legumen vix calyce longius.....	ULEX (p. 115 supp. 1025).
	{ Legumen calyce longius.....	151
	{ Legumen glandulas subpedicellatas undique gerens.....	
151.	{ADENOCARPUS (p. 119).	
	{ Legumen eglandulosum.....	152
152.	{ Calyx spathaceus ; vexillum subrotundum.....	SPARTIUM (p. 115).
	{ Calyx non spathaceus ; vexillum ovale.....	153
153.	{ Calycis labium superius 2-partitum , carina genitalia non omnino includens.....	GENISTA (p. 115 supp. p. 1025).
	{ Calycis labium superius sèpius integrum ; carina genitalia includens.....	CYTISUS (p. 117).
154.	{ Stamina monadelpha.....	155
	{ Stamina diadelpha.....	158
155.	{ Calyx 5-fidus.....	ONOCRIS (p. 119 supp. 1025).
	{ Calyx 5-dentatus.....	156
156.	{ Calyx supernè fissus.....	SPARTIUM (p. 115).
	{ Calyx supernè non fissus.....	157
157.	{ Legumen calyce indusiato tectum.....	ANTHYLLIS (p. 122).
	{ Legumen calyce non tectum.....	GALEGA (p. 139).
158.	{ Calyx 5-fidus.....	159
	{ Calyx 5-dentatus.....	174
159.	{ Legumen rectum.....	160
	{ Legumen falcatum vel in spiram contortum. MEDICAGO (p. 123 supp. 1025).	
160.	{ Legumen alatum.....	TETRAGONOLEBUS (p. 138).
	{ Legumen non alatum.....	161
161.	{ Legumen calyce manifestè longius.....	163
	{ Legumen calycem subæquans.....	162
162.	{ Folia palmatim trifoliolata.....	TRIFOLIUM (p. 129 supp. 1026).
	{ Folia pinnatim trifoliolata.....	PSORALEA (p. 139).
163.	{ Legumen turgidum vel subinflatum.....	164
	{ Legumen cylindricum vel compressum.....	168
164.	{ Cotyledones planiusculæ per germinationem in foliam conversæ.....	
	{ Cotyledones crassæ farinaceæ per germinationem sub terrâ remanentes. ONOCHIS (p. 115 supp. 1025).	
165.	{ Folia impari-pinnata.....	CICKA (p. 149).
	{ Folia abruptè pinnata , id est petiolo communi apice in setiplam cirrhumve desinente.....	166

ORDINUM GENERUMQUE

166.	Folia crassa.....	FABA (p. 150).
	Folia non crassa.....	167
167.	Calycis laciniæ foliaceæ; 2 superiores breviores.....	PISUM (p. 154).
	Calycis laciniæ æquales non foliaceæ.....	ERVUM (p. 153 supp. 1026).
168.	Folia 3-foliolata.....	169
	Folia pinnata.....	170
169.	Calyx campanulatus; carina alis minor.....	TRIGONELLA (p. 127).
	Calyx tubulosus; carina alas subæquans.....	LOTUS (p. 137).
170.	Legumen depresso-planum dorso sinnato-dentatum	BISERRULA (p. 144).
	Legumen compressum cylindricumve dorso æquale.....	171
171.	Stylus angulum ferè rectum cum ovario conficiens.....	VICIA (p. 150).
	Stylus cum ovario continuus.....	172
172.	Calycis laciniæ foliaceæ.....	PISUM (p. 154).
	Cal. laciniæ non foliaceæ.....	173
173.	Stylus complanatus apice dilatatus.....	LATHYRUS (p. 155 supp. 1026).
	Stylus gracilis linearis non dilatatus.....	OROBUS (p. 158).
174.	Fratices.....	175
	Herbæ.....	176
175.	Legumen compressum.....	ROBINIA (p. 139).
	Legumen inflatum.....	COLUTEA (p. 140).
176.	Folia 3-foliolata.....	MELILOTUS (p. 128. supp. p. 1026).
	Folia pinnata 2-oo jugata.....	177
177.	Legumen 1-loculare.....	178
	Legumen 2-loculare aut semibiloculare.....	180
178.	Legumen subturgidum.....	PHACA (p. 140).
	Legumen compressum aut cylindricum.....	179
179.	Stylus glaber.....	GALEGA (p. 139).
	Stylus supernè villosus.....	VICIA (p. 150).
180.	Carina obtusa.....	ASTRAGALUS (p. 141).
	Carina in mucronem desinens.....	OXYTROPIS (p. 140).
181.	Stamina 10. vel minus.....	210
	Stamina 11. vel magis.....	182
182.	Petala numero indefinita.....	NYMPHÆACEÆ. 183
	Petala numero definita.....	184
183.	Flores albi.....	NYMPHÆA (p. 20).
	Flores lutei.....	NUPHAR (p. 20).
184.	Calyx monosepalus.....	185
	Calyx 2-6-sepalus.....	193
185.	Arbores fruticesve.....	186
	Herbæ aut suffrutescens.....	191
186.	Calyx marcescens 3-5-dentatus.....	AURANTIACEÆ (p. 94).
	Calyx decidens 5-fidus.....	AMYGDALEÆ. 187
187.	Drupa carnosa.....	188
	Drupa exsucca.....	AMYGDALUS (p. 162).
188.	Putamen sulcis insigniter rugosum.....	PERSICA (p. 163).
	Putamen læve.....	189
189.	Drupa extùs velutina.....	ARMENIACA (p. 163).
	Drupa glaberrima.....	190
190.	Putamen compressum.....	PRUNUS (p. 163).
	Putamen subglobosum.....	CERASUS (p. 163).
191.	Petala thalamo inserta.....	HYPERICINEÆ. 192
	Petala sursum calycis tubo inserta.....	LYTHRAUM (p. 193. supp. p. 1026).

CLAVIS ANALYTICA.

ix

192.	{ Capsula baccata.....	ANDROSIMUM (p. 96).
	Capsula membranacea.....	HYPERICUM (p. 96).
193.	{ Calyx 2-sepalus.....	194
	Calyx 3-6-sepalus.....	200
194.	{ Petala 5.....	PORTULACA (p. 195).
	Petala 4.....	PAPAVERACEÆ. 195
195.	{ Capsula obovata.....	196
	Capsula elongata.....	197
196.	{ Stylus 0 ; stigmata 4-20-sessilia super discum ovarium coronantem.....	PAPAVER (p. 21 supp. 1023).
	Stylus brevis ; stigmata 4-6-libera.....	MESCONOPSIS (p. 22).
197.	{ Capsula 3-4-valvis.....	ROEMERIA (p. 22 supp. 1023).
	Capsula 2-valvis.....	198
198.	{ Capsula transversè nodosa seu articulata.....	HYPERCOUM (p. 23).
	Capsula nec nodosa nec articulata.....	199
199.	{ Capsula 2-locularis.....	GLAUCIUM (p. 22).
	Capsula 1-locularis.....	CHELIDONIUM (p. 23).
200.	{ Arbores.....	TILIACEÆ (p. 94).
	Frutices aut herbæ.....	201
201.	{ Petala omnia integra.....	203
	Petala superiora palmati-partita.....	RESEDACEÆ. 202
202.	{ Carpella 3-6-in capsulam 3-6-gonam apice hiantem coalita RESEDA (p. 66).	
	Carpella 4-6-stellatim patentia follicularia.....	ASTROCARPUS (p. 67).
203.	{ Ovarium stipitatum.....	CAPPARIDÆ (p. 56).
	Ovarium sessile.....	204
204.	{ Staminum filaments libera ; antheræ 2-loculares.....	CISTINÆ. 205
	Staminum filaments in tubum coalita ; antheræ 1-loculares. MALVACEÆ. 206	
205.	{ Capsula 5-10-valvis.....	CISTUS (p. 57. supp. 1024).
	Capsula 3-valvis.....	HELIANTHEMUM (p. 58).
206.	{ Calyx nudus.....	SIDA (p. 91).
	Calyx involucro-cinetus.....	207
207.	{ Carpella in capsulam 5-locularem coalita.....	HIBISCUS (p. 93).
	Carpella in capitulum aggregata.....	MALOPE (p. 91).
	Carpella in orbem disposita.....	208
208.	{ Involucrum 3-rariùs-5-6-phylum.....	MALVA (p. 91 supp. 1025).
	Involucrum 3-9-fidum.....	209
209.	{ Involucrum 6-9-fidum.....	ALTHÆA (p. 92).
	Involucrum 3-6-fidum.....	LAVATERA (p. 92).
210.	{ Stamina 6 aut minus.....	243
	Stamina 7 aut magis.....	211
211.	{ Petala 3-9.....	213
	Petala abortu nulla.....	212
212.	{ Calyx 10-fidus ; suffrutescens.....	CORIARIEÆ (p. xij).
	Calyx 5-fidus ; herbæ.....	SCLERANTHUS (p. 199 supp. 1026).
213.	{ Arbores.....	214
	Frutices aut herbæ.....	215
214.	{ Folia alterna ; stam. 10.....	MELIACEÆ (p. 100).
	Folia opposita ; stam. 5-9.....	ACERINEÆ (p. 98).
215.	{ Calyx 1-5-sepalus aut 4-5-lobatus 4-5-dentatus.....	218
	Calyx 2-valvis aut 8-12-dentatus.....	216
216.	{ Calyx 8-12-dentatus ; petala 4-6.....	LYTHRARIEÆ. 217
	Calyx 2-valvis ; pet. 5.....	PORTULACA (p. 195).

ORDINUM GENERUMQUE

217.	{ Calyx campanulatus 12-fidus.....	PEPLIS (p. 193).
	Calyx tubulosus 6-12-dentatus.....	LYTHRUM (p. 193. supp. 1026).
218.	{ Folia parva squamiformia.....	MYRICARIA (p. 194).
	Folia non squamiformia.....	219
219.	{ Stylus 1 aut 0.....	220
	Styli 2-5.....	224
220.	{ Stylus 0.....	ZYGOPHYLLEÆ (p. 107).
	Stylus 1.....	221
221.	{ Calyx 5-sepalus; carpella demum libera.....	GERANIACEÆ. 222
	Calyx 3-5-partitus; carpella semper adnata.....	RUTACEÆ. 223
222.	{ Stamina 10, fertilia; carpellorum aristæ intus glabræ. GERANIUM (p. 101).	
	Stamina 5 antherifera, 5 sterilia; aristæ intus barbatæ. ERODIUM (p. 103).	
223.	{ Calyx persistens; capsula subglobosa	RUTA (p. 108).
	Calyx deciduus; capsula carpellis 5 internè connexis. DICTAMNUS (p. 108).	
224.	{ Folia ternata.....	OXALIDEÆ (p. 106).
	Folia non ternata.....	225
	Petala calyci inserta; stamina petalis sepalisque opposita.....	
225.	{ SAXIFRAGA (p. 207 supp. 1026).	
	Petala toro inserta; stamina petalis alia alterna alia opposita.....	CARYOPHYLLEÆ. 226
226.	{ Calycis sepala in tubum cylindraceum coalita.....	227
	Calycis sepala libera aut sublibera.....	232
227.	{ Styli 2.....	228
	Styli 3.....	231
	Styli 5.....	LYCHNIS (p. 78).
228.	{ Petala non unguiculata.....	GYPSOPHILA (p. 71).
	Petala unguiculata.....	229
229.	{ Calyx basi squamis stipatus.....	DIANTHUS (p. 72).
	Calyx nudus.....	230
230.	{ Petala brevia; stamina 5-6.....	VELEZIA (p. 80).
	Petala plus minus magna; stam. 10.....	SAPONARIA (p. 74).
231.	{ Capsula carnosa.....	CUCUBALUS (p. 75).
	Capsula membranacea.....	SILENE (p. 75. supp. 1025).
232.	{ Petala 4.....	233
	Petala 5.....	236
233.	{ Styli 2.....	234
	Styli 4-5.....	235
234.	{ Stamina 4.....	BUTTERVIA (p. 80 supp. 1025).
	Stamina 8.....	MOEHRINGIA (p. 81).
235.	{ Capsula 1-locul.....	SAGINA (p. 80).
	Capsula 4-locul.....	ELATINE (p. 81).
236.	{ Styli 2.....	GOUFFEIA (p. 80).
	Styli 3-5.....	237
237.	{ Styli 3.....	238
	Styli 4-5.....	240
	Petala dentata.....	HOLOSTEUM (p. 81).
238.	{ Petala integra.....	239
	Petala 2-fida.....	STELLARIA (p. 82. supp. 1025).
	Petala minima emarginata.....	CHERLERIA (p. 88).
239.	{ Calyx 5-sepalus; capsula oo-sperma.....	ARENARIA (p. 83. supp. 1025).
	Calyx 5-partitus; capsula oligosperma.....	ADENARIUM (p. 86).
240.	{ Calyx 5-fidus basi urceolatus.....	LARREA (p. 82).
	Calyx 5-partitus non urceolatus.....	241

CLAVIS ANALYTICA.

xj

241.	{ Petala bifida.....	CERASTIUM (p. 86 supp. 1025).
	{ Petala integra.....	242
242.	{ Stamina 4-5; capsula 4-5 valvis.....	SAGINA (p. 80).
	{ Stamina 5-10; capsula 6-valvis.....	SPERGULA (p. 81 supp. 1025).
243.	{ Calyx 1-sepalus.....	244
	{ Calyx 2-6-sepalus.....	261
244.	{ Arbores fruticesve.....	245
	{ Herbæ.....	253
245.	{ Frutices sarmentosi.....	AMPELIDÆ (p. 100).
	{ Frutices arboresve non sarmentosi.....	246
246.	{ Folia parva squamiformia.....	TAMARIX (p. 194).
	{ Folia non squamiformia.....	247
247.	{ Folia composita.....	248
	{ Folia simplicia.....	250
248.	{ Flores dioici.....	PISTACIA (p. 113).
	{ Flores hermaphroditi.....	249
249.	{ Folia pinnata.....	STAPHYLEA (p. 109).
	{ Folia impari-pinnata.....	RHUS (p. 113).
250.	{ Folia spinosa.....	ILEX (p. 110).
	{ Folia non spinosa.....	(p. 251).
251.	{ Fructus capsularis.....	EVONYMUS (p. 110).
	{ Fructus drupaceus.....	252
252.	{ Calyx 5-partitus; petala 5.....	RHUS (p. 112).
	{ Calyx 3-4-dentatus; petala 3-4.....	CNEORUM (p. 113).
253.	{ Capsula 2-locularis.....	217
	{ Capsula 1-locularis.....	254
254.	{ Corolla 1-petala 5-partita.....	MONTIA (p. 195).
	{ Petala 0 aut 5 parva squamiformia.....	PARONYCHIÆ. 255
	{ Petala 5 unguiculata.....	254
254 ^a .	{ Capsula polysperma.....	FRANKENIACEÆ (p. 70).
	{ Capsula 1-sperma.....	STATICÆ (p. 387 supp. 1032).
255.	{ Folia alterna.....	256
	{ Folia opposita.....	257
256.	{ Capsula polysperma.....	TELEPHIUM (p. 196).
	{ Capsula 1-sperma.....	CORRIGIOLA (p. 196).
257.	{ Capsula indehisens 1-sperma.....	258
	{ Capsula 3-valvis polysperma.....	260
258.	{ Calycis sepala dorso incrassato; stylus vix ullus..	ILLECEBRUM (p. 197).
	{ Calycis sepala dorso non incrassata, styli 2 aut 3.....	259
259.	{ Calycis sepala subcucullata; stylus unicus.....	PARONYCHIA (p. 198).
	{ Calycis sepala non cucullata; styli 2 breves distincti aut basi concreti....	HERNIARIA (p. 197).
260.	{ Styli 2 brevissimi; stipulæ scariosæ.....	POLYCARPON (p. 199).
	{ Stylus unicus; stipulæ nullæ, sed folia basi appendiculata.....	LOEFLINGIA (p. 199).
261.	{ Sepala 2 decidua.....	HYPECOUM (p. 23).
	{ Sepala 3-6.....	262
262.	{ Stamina basi in annulum monadelpha.....	LINEÆ. 263
	{ Stamina basi non monadelpha.....	264
263.	{ Flores proportione partium quinariæ.....	LINUM (p. 89).
	{ Flores proportione partium quaternariæ.....	RADIOLA (p. 90).
264.	{ Stamina 6, quorum 2 breviora.....	270
	{ Stamina 3-10 subæqualia.....	265

ORDINUM GENERUMQUE

265.	{ Frutices.....	BERBEZIS (p. 19 supp. 1023).
	{ Herbae.....	266
266.	{ Petala 4 intus appendice discolore ancta.....	EPIMEDIUM (p. 19).
	{ Petala 4-5 non appendiculata.....	267
267.	{ Folia alterna.....	DROSERACEÆ. 268
	{ Folia opposita.....	232
268.	{ Squamæ 5 unguibus petalorum oppositæ, in setas apice glandulosas desinentes.....	PAHNASSIA (p. 68).
	{ Squamæ nullæ.....	269
269.	{ Foliorum limbus complicatus subvesicularis.....	ALDROVANDA (p. 68).
	{ Foliorum limbus planus.....	DROSERA (p. 68 supp. 1025).
270.	{ Siliqua.....	271
	{ Silicula.....	291
271.	{ Siliqua articulata.....	293
	{ Siliqua non articulata.....	272
272.	{ Semina compressa interdùm marginata.....	273
	{ Semina ovata globosave immarginata.....	281
273.	{ Calyx basi 2-saccatus.....	274
	{ Calyx basi æqualis.....	275
274.	{ Stigmatis dorsa incrassata vel cornigera.....	MATHIOLA (p. 26).
	{ Stigmatis dorsa non gibba.....	CHEIRANTHUS (p. 27).
275.	{ Semina in quoque loculo 2-serialia.....	276
	{ Semina uniserialia.....	277
276.	{ Siliqua teretiuscula aut ellipsoidea; valvæ concavæ. NASTURTIUM (p. 27).	
	{ Siliqua elongata anceps, valvæ planæ.....	TURRITIS (p. 28).
277.	{ Flores flavi.....	BARBAREA (p. 28. supp. p. 1023).
	{ Flores albi rosei purpurascentesve.....	278
278.	{ Siliquæ valvulæ nervosæ vel venosæ.....	ARABIS (p. 28 supp. 1023).
	{ Siliquæ valvulæ enerviæ.....	279
279.	{ Siliquæ lineares, stylo brevi aut subnullo. CARDAMINE (p. 31 supp. 1023).	
	{ Siliquæ lanceolatæ; stylo anticipite aut filiformi.....	280
280.	{ Stylus anceps.....	PTERONEURUM (p. 32).
	{ Stylus filiformis.....	DENTARIA (p. 32).
281.	{ Calyx clausus erectusve.....	284
	{ Calyx patens.....	282
282.	{ Semina ovata aut oblonga; cotyledones planæ.....	283
	{ Semina subglobosa; cotyledones conduplicatæ.....	SINAPIS (p. 52).
283.	{ Siliqua teretiuscula; semina ovata aut oblonga.....	
	{ Siliqua subtetragona; semina subcylindrica.....	SISYMBRIUM (p. 43 supp. 1024). ALLIARIA (p. 45).
284.	{ Siliqua teretiuscula aut subtetragona.....	287
	{ Siliqua compressa.....	285
285.	{ Flores flavi aut albi.....	286
	{ Flores purpurascentes.....	MORICANDIA (p. 52).
286.	{ Stylus vix ullus.....	SISYMBRIUM (p. 43 supp. 1024).
	{ Stylus conicus semina 1-2 gerens aut vacuus.....	DILOTAXIS (p. 53).
287.	{ Semina ovata aut oblonga; cotyledones planæ.....	289
	{ Semina subglobosa; cotyledones conduplicatæ.....	288
288.	{ Siliqua teretiuscula; rostrum nullum aut conicum.....	
	{ Siliqua ovali-oblonga, rostrum ensiforme vix valvulis brevius.....	BRASSICA (p. 50. supp. 1024). ERUCA (p. 53).
289.	{ Stigma acutissimum simplex.....	MALCOMIA (p. 42).
	{ Stigma 3.....	290

CLAVIS ANALYTICA.

xij

290.	{ Petala subintegra; stigmata 2 erecta conniventia	HESPERIS (p. 43).
	Petala integra; stigmata 2 distincta aut in capitolum connata	SISTMBRIUM (p. 43 supp. 1024).
	Petala integra; stigmata 2 patula	Erysimum (p. 45 supp. 1024).
291.	{ Silicula transversè in articulos secedens	292
	Silicula non articulata	296
292.	{ Cotyledones planæ accumbentes	CAKILE (p. 42).
	Cotyledones conduplicatæ	293
293.	{ Siliqua	294
	Silicula	295
294.	{ Calyx basi æqualis	ENARTHROCARPUS (supp. p. 1024).
	Calyx basi subbisaccatus	RAPHAELIA (p. 54 supp. 1024).
295.	{ Stamina majora apice dente lateralí aucta	CRAMBE (p. 54).
	Stamina edentula	RAPISTRUM (p. 54).
296.	{ Silicula 2-valvis, septata	302
	Silicula indehisrens; septum evanidum	297
297.	{ Silicula 2-4-locularis	298
	Silicula 1-locularis	299
298.	{ Flores flavi	BUNIAS (p. 55).
	Flores albi minimi	SENEBIRIA (p. 47).
	Silicula subglobosa	300
299.	{ Silicula orbicularis plana	CLYPEOLA (p. 35).
	Silicula ovato-oblonga aut subcuneata	301
300.	{ Silicula 2-sperma; flores flavi	NESLIA (p. 47).
	Silicula 1-sperma; flores albi	CALEPINA (p. 53).
301.	{ Calyx patens; silicula ovali-oblonga depresso-plana	ISATIS (p. 49).
	Calyx suberectus; silicula compressa ferè cuneata	MYAGRUM (p. 49).
302.	{ Septum ovatum ellipticum	311
	Septum angustissimum lineare	303
303.	{ Petala inæqualia, 2 exteriora majora	IBERIS (p. 39).
	Petala subæqualia	304
304.	{ Flores flavi; stylus longus	BISCUTELLA (p. 41. supp. 1024).
	Flores albi aut rosei; stylus brevior	305
305.	{ Stamina edentula	307
	Stamina majora connata aut intùs squamulâ aucta	306
306.	{ Semina orbicularia; flores albi minimi. ① TEESDALIA (p. 39. supp. 1024).	
	Semina ovato-oblonga; flores ex albo-rosei majores. ③	ÆTHIONEMA (p. 49).
307.	{ Siliculæ valvæ alatæ	308
	Siliculæ valvæ non alatae	309
308.	{ Valvæ naviculares; semina in quoqueloculo 100, rarius duo	
		THLASPI (p. 38 supp. 1023).
	Valvæ carinatæ; loculi 1-spermi	LEPIDIUM (p. 48).
309.	{ Silicula triangularis	CARSELLA (p. 47).
	Silicula oblonga aut ovata	310
310.	{ Valvæ naviculares; loculi 2-6-spermi	HUTCHINSIA (p. 38 supp. 1024).
	Valvæ carinatæ; loculi 1-spermi	LEPIDIUM (p. 48).
311.	{ Valvæ naviculares	305
	Valvæ non naviculares	312
312.	{ Folia radicalia subulata	SUBULARIA (p. 55).
	Folia non subulata	313
313.	{ Calyx basi bisaccatus	314
	Calyx basi æqualis	316

ORDINUM GENERUMQUE

314.	{	Stamina minora dente aucta.....	<i>FARSETIA</i> (p. 33).
		Stamina omnia edentula.....	315.
315.	{	Valvæ planæ.....	<i>LUNARIA</i> (p. 33).
		Valvæ convexissimæ.....	<i>VESTICARIA</i> (p. 34).
316.	{	Siliculæ valvulæ ventricosæ.....	317.
		Siliculæ valvulæ planæ aut convexo-planæ.....	318.
317.	{	Flores albi.....	<i>COCHLEARIA</i> (p. 37).
		Flores lutei.....	<i>CAMELINA</i> (p. 46).
318.	{	Stamina 2 basi intus dentata.....	319.
		Stamina omnia edentula.....	320.
319.	{	Petalorum limbus 2-lobus.....	<i>BERTEROA</i> (p. 33 supp. 1023).
		Petalorum limbus integrusculus.....	<i>ALYSSUM</i> (p. 34 supp. 1023).
320.	{	Petala 2-partita.....	<i>EROPHILA</i> (p. 36. supp. 1023).
		Petala integruscula.....	321.
321.	{	Siliculæ loculi 1-2-spermi.....	322.
		Loculi oo-spermi.....	<i>DRABA</i> (p. 35. supp. 1023).
		Siliculæ septum tenuissimum; fl. flavi aut albi.....	
322.	{		<i>ALYSSUM</i> (p. 34 supp. 1023).
		Siliculæ septum ellipticum membranaceum; fl. rosei. <i>PETROCALLIS</i> . (p. 35).	
323.	{	Calyx polysepalus.....	324.
		Calyx gamosepalus.....	324.
324.	{	Æstivatio imbricata; stamna libera.....	<i>RANUNCULACEÆ</i> .
		Æstivatio spiraliter contorta, staminum filaments in tubum coalita.....	325.
325.	{	Petala regularia aut o.....	325.
		Petala irregularia tubulata bilabiata calcarata aut saccata.....	326.
326.	{	Calyx sœpè petaloideus regularis.....	328.
		Calyx petaloideus irregularis.....	327.
327.	{	Calycis petalum superius in calcar deorsum productum.....	
		Calycis sepalum superius concavum cassidæforme... <i>ACONITUM</i> (p. 17).	
328.	{	Calyx 1-5-sepalus.....	<i>TROLLIUS</i> (p. 14).
		Calyx 5-8-sepalus.....	329.
329.	{	Petala calcarata.....	<i>AQUILEGIA</i> (p. 15).
		Petala non calcarata.....	330.
330.	{	Capsulæ in unicam plus minusve concretæ.....	331.
		Capsulæ distinctæ.....	332.
331.	{	Ovaria 3; styli brevissimi.....	<i>GARIDELLA</i> (p. 15).
		Ovaria 5-10; styli longi.....	<i>NIGELLA</i> (p. 35. supp. 1023).
332.	{	Sepala 6-8; involucrum multipartitum sub flore....	<i>ERANTHIS</i> (p. 14).
		Sepala 5.....	333.
333.	{	Calyx persistens; petala 8-10.....	<i>HELLEBORUS</i> (p. 14).
		Calyx deciduus; petala 5.....	<i>ISOPYRUM</i> (p. 14 supp. 1022).
334.	{	Petala o; calyx coloratus.....	335.
		Petala plura; calyx plerumque viridis.....	338.
335.	{	Carpella capsularia intus dehiscentia oo-sperma.....	<i>CALTHA</i> (p. 13).
		Carpella indehiscentia 1-sperma	336.
336.	{	Folia opposita.....	<i>CLEMATIS</i> (p. 2. supp. 1022).
		Folia radicalia aut alterna.....	337.
337.	{	Involucrum sub flore o.....	<i>THALICTRUM</i> (p. 3 supp. 1022).
		Involucrum 3-folium à flore distans.....	<i>ANEMONE</i> (p. 4 supp. 1022).
		Involucrum calyciforme 3-foliatum.....	<i>HEPATICÆ</i> (p. 6).
338.	{	Bacca aut Capsula oo-sperma.....	339.
		Carpella indehiscentia 1-sperma.....	340.

CLAVIS ANALYTICA.

xv

339.	{ Calyx 4-sepalus; fructus baccatus.....	<i>ACTEA</i> (p. 18).
	{ Calyx 5-sepalus; fr. capsularis.....	<i>PÆONIA</i> (p. 18).
340.	{ Carpella barbato-caudata.....	<i>CLEMATIS</i> (p. 2. supp. 1022).
	{ Carpella non barbato-caudata.....	341
341.	{ Carpella apice producta in longum cornu compressum.....	
	{CERATOCEPHALUS (p. 8).	
	{ Carpella in cornu longum non producta.....	342
342.	{ Calyx 5-sepalus; carpella stylo brevi apiculata.....	343
	{ Cal. 3-sepalus; carp. obtusa.....	<i>FICARIA</i> (p. 13).
343.	{ Petala 6-15, ungue nudo.....	<i>ADONIS</i> (p. 6).
	{ Petala 5, ungue filiformi tubuloso.....	<i>MYOSURUS</i> (p. 7).
	{ Petala 5-intus basi squamulâ instructa.....	<i>RANUNCULUS</i> (p. 8. supp. 1022).
344.	{ Folia plius minus carnosa.....	<i>CRASSULACEÆ</i> . 351
	{ Folia non carnosa.....	345
345.	{ Carpella circa axim verticillata demùn capsularia 2-6-sperma.....	
	{ <i>SPIREA</i> (p. 164).	
	{ Carpella toro inserta, akenia 1-sperma.....	346
346.	{ Calyx 8-9-partitus.....	<i>DRYAS</i> (p. 165).
	{ Calyx 4-5-fidus.....	347
347.	{ Calyx extus nudus.....	<i>RUBUS</i> (p. 167).
	{ Calyx extus setis involucriformibus onustus.....	<i>ACRIMONIA</i> (p. 173).
	{ Calyx extus bracteolatus.....	348
348.	{ Carpella caudata.....	<i>GRUM</i> (p. 165).
	{ Carpella non caudata.....	349
349.	{ Folia composita.....	<i>POTENTILLA</i> (p. 168).
	{ Folia 3-foliolata.....	350
350.	{ Calyx 6-bracteolatus; receptaculum carnosò - succulentum.....	
	{ <i>FRAGARIA</i> (p. 168).	
	{ Calyx 4-5-bracteolatus; receptaculum exsuccum.....	
	{ <i>SIBBALDIA</i> (p. 173 supp. 1026).	
351.	{ Stamina 3-4.....	352
	{ Stamina 5-12.....	353
352.	{ Calyx 3-4-partitus; carpella 2-sperma.....	<i>TILLEA</i> (p. 200).
	{ Calyx 4-fidus; carpella polysperma.....	<i>BULLIARDIA</i>(p. 200).
353.	{ Corolla gamopetala.....	<i>UMBILICUS</i> (p. 201).
	{ Corolla polypetala.....	254
354.	{ Calyx 4-7-partitus; squamæ nectariferæ integræ.....	
	{ <i>SEDUM</i> (p. 201 supp. 1026).	
	{ Calyx 6-12-fidus; squamæ emarginatæ aut laceræ. <i>SEMPERVIVUM</i> (p. 204).	

MONOPETALÆ.

355.	{ Stamina thalamo inserta.....	<i>PLUMEAGO</i> (p. 387).
	{ Stamina calyci inserta.....	356
	{ Stamina corollæ inserta.....	395
356.	{ Fructus 1-spermus.....	357
	{ Fructus 2-oo-spermus.....	366
357.	{ Plantæ parasiticæ; fructus baccatus.....	<i>LORANTHEÆ</i> (p. 246).
	{ Plantæ non parasiticæ, fructus non baccatus.....	358
358.	{ Ovarium 1 centrale.....	361
	{ Ovaria 2 aut 1 laterale.....	359
359.	{ Flores glomerati aut dichotomi.....	<i>ALCHIMILLA</i> (p. 173).
	{ Flores spicati.....	360

ORDINUM GENERUMQUE

360.	{	Stamina 4.....	SANGUISORBA (p. 174).
		Stamina 20-30.....	POTERIUM (p. 174).
361.	{	Flores corymbosi paniculati aut subcapitati.....	362
		Flores in receptaculo communi aggregati, involucro polyphylio cincti.....	DIPSACEÆ. 363
362.	{	Corolla calcarata.....	CENTRANTHUS (p. 25).
		Corolla ecalcarata.....	VALERIANA (p. 253. supp. 1030).
363.	{	Involucellum (calyx externus), 4-foveolatum.....	KNAUTIA (p. 256).
		Involucellum 8-foveolatum.....	364
364.	{	Calycis (interni) limbus setis 5 hinc indè abortientibus munitus.....	
		Calycis interni limbus subcyathiformis non setosus.....	SCABIOSA (p. 255).
365.	{	Receptaculi paleæ spinosæ.....	DIPSACUS (p. 257).
		Receptaculi paleæ non spinosæ.....	CEPHALARIA (p. 257).
366.	{	Fructus baccatus siccus aut carnosus.....	367
		Fructus capsularis.....	386
367.	{	Flores monoici.....	113
		Flores dioici aut hermaphroditi.....	368
368.	{	Frutices aut suffrutices.....	374
		Herbæ.....	RUBIACEÆ. 369
369.	{	Corolla campanulata aut rotata.....	370
		Corolla infundibuliformis.....	372
370.	{	Fructus calycibus limbo dilatatis tricornis.....	VAILLANTIA (p. 247).
		Fructus calyce nou coronatus.....	371
371.	{	Corolla campanulato-patens 4-5-loba.....	RUBIA (p. 247 supp. 1029).
		Corolla rotata aut campanulata 4-fida.....	GALIUM (p. 247. supp. 1029).
372.	{	Fructus calycis dentibus accretis coronatus.....	SHEBARDIA (p. 251).
		Fructus calyce non coronatus.....	373
373.	{	Calycis laciniaæ 2 oppositæ profundaæ.....	CRUCIANELLA (p. 252).
		Calycis laciniaæ 4 æqualiter profundæ.....	ASPERULA (p. 251).
374.	{	Stamina 3-5.....	376
		Stamina 8-10.....	375
375.	{	Stamina 8.....	VACCINIUM (p. 315).
		Stamina 10.....	ARBUTUS (p. 316).
376.	{	Flores dioici, stamna 3.....	EMPETRUM (p. 316).
		Flores hermaphroditi, stamna 4-5.....	CAPRIFOLIACEÆ. 377
377.	{	Stylus 0; bacca 1-locularis.....	378
		Stylus 1; bacca 2-4-locularis.....	379
378.	{	Corolla rotata.....	SAMBUCUS (p. 244).
		Corolla campanulata.....	VIBURNUM (p. 245).
379.	{	Calyx 5-dentatus; stam. 5.....	LONICERA (p. 245).
		Cal. 5-fidus; stam. 4.....	LINNÆA (p. 246).
380.	{	Herbæ.....	385
		Frutices suffruticesve.....	381
381.	{	Stam. 5.....	AZALEA (p. 318).
		Stam. 8.....	382
		Stam. 10.....	381
382.	{	Corolla campanulata 4-fida.....	383
		Corolla oblongo-ovoidea 4-dentata.....	MENZIEZIA (p. 318).
383.	{	Folia verticillata plus minus laxa.....	ERICA (p. 317).
		Folia adpressæ imbricata.....	CALLEUNA (p. 318).
384.	{	Stamina declinata.....	RHODODENDRON (p. 319).
		Stamina non declinata.....	ANDROMEDA (p. 317).

385.	{ Stam. 1-5.....	388
	Stam. 8-10.....	386
386.	{ Herbæ carnosæ coloratæ tristes.....	MONOTROPEÆ (p. 319).
	Herbæ non carnosæ virides.....	387
387.	{ Stylus filiformis staminibus longior.....	PYROLA (p. 317 supp. 1031).
	Stylus brevis ovario immersus.....	CHIMOPHILA (p. 317).
388.	{ Calyx liber.....	MONTIA (p. 195).
	Calyx ovario adhærens.....	389
389.	{ Stam. 2-3.....	390
	Stam. 5.....	391
390.	{ Corolla regularis; stam. 3.....	VALERIANELLA (p. 252. supp. 1029).
	Corolla irregularis; stam. 2.....	FEDIA (p. 253).
391.	{ Corolla suprà longitudinaliter fissa.....	LOBELIACEÆ (p. 310).
	Corella non fissa.....	CAMPANULACEÆ. 391
392.	{ Antheræ connatæ.....	JASIONE (p. 311).
	Antheræ distinctæ.....	393
393.	{ Corolla campanulata.....	CAMPANULA (p. 312 supp. 1031).
	Corolla rotata.....	394
394.	{ Flores solitarii aut subsolitarii....	PRISMATOCARPUS (p. 312 supp. 1031).
	Flores in spicas aut capitula bracteata congesti.....	PHYTEUMA (p. 311 supp. 1031),
395.	{ Flores capitati involucro polyphyllo cincti receptaculo paleaceo impositi.....	GLOBULARIEÆ (p. 366).
	Flores receptaculo paleaceo non impositi.....	396
396.	{ Stamina 2-4.....	452
	Stamina 5-16.....	397
397.	{ Fructus follicularis.....	APOCYNEÆ. 398
	Fructus non follicularis.....	401
398.	{ Corolla tubulosa.....	399
	Corolla non tubulosa.....	400
399.	{ Frutices.....	NERIUM (p. 324).
	Herbæ.....	VINCA (p. 324).
400.	{ Corolla reflexa; stigma muticæn.....	ASCLEPIAS (p. 323).
	Corolla subrotata; stigma apiculatum.....	CYNANCHUM (p. 323).
401.	{ Fructus simplex.....	415
	Nuces aut cariopsides 2-4.....	BORRAGINEÆ. 402
402.	{ Nuces 2.....	CERINTHE (p. 331. supp. p. 1031).
	Nuces 4.....	403
403.	{ Nuces cohærentes.....	HELIOTROPIUM (p. 331).
	Nuces distinctæ.....	404
404.	{ Corollæ faux nuda.....	405
	Corollæ faux squamis instructa.....	409
405.	{ Calyx fructifer inflatus.....	NONEA (p. 333 supp. 1031).
	Calyx fructifer non inflatus.....	406
406.	{ Corolla obliquè truncata, laciñis inæqualibus. ECHIUM (p. 332 supp. 1031).	
	Corolla laciñis æqualibus aut alternatim majoribus.....	407
407.	{ Corolla tubulosa; antheræ sagittatae basi lobis connexæ. ONOSMA (p. 334).	
	Corolla infundibuliformis, antheræ omnino liberae.....	408
408.	{ Calyx 5-partitus, stigma 2-fidum.....	LITHOSPERMUM (p. 332).
	Calyx 5-fidus, stigma emarginatum.....	PULMONARIA (p. 333).
409.	{ Calyces post maturationem dilatati; flores axillares. ASFERUGO (p. 335).	
	Calyces non dilatati; flores terminales.....	410

xvij ORDINUM GENERUMQUE

410.	Corollæ limbus tubulato ventricosus.....	SYMPHITUM (p. 334).
	Corollæ limbus patens aut erecto-patens.....	411
412.	Corollæ tubas incurvus.....	LYCOPERS (p. 334).
	Corollæ tubus non incurvus.....	413
413.	Corolla rotata.....	BORRAGO (p. 334).
	Corolla hypocrateriformis.....	MYOSOTIS (p. 335).
	Corolla infundibuliformis.....	414
414.	Calyx 5-partitus ; nuces depressæ.....	CYNOGLOSSUM (p. 336).
	Calyx 5-fidus ; nuces non depressæ.....	ANCHUSA (p. 334).
415.	Folia pinnata.....	POLEMONIDÆ (p. 329).
	Folia non pinnata.....	416
416.	Stamina corollæ lobis opposita.....	PRIMULACEÆ. 417
	Stamina corolla lobis alterna.....	432
417.	Folia pectinata.....	HOTTONIA (p. 379).
	Folia non pectinata.....	418
418.	Stamina 4	CENTUNCULUS (p. 380).
	Stamina 5-6.....	419
	Stam. 7.....	TRIENTALIS (p. 381).
419.	Capsula circumscissa.....	ANAGALLIS (p. 381 supp. 1032).
	Capsula apice dehiscens.....	420
420.	Corolla calyce brevior.....	421
	Corolla calyce longior.....	422
421.	Caulis nullus.....	ANDROSACE MAXIMA (p. 383).
	Caules ramosissimi.....	ASTEROLINUM (p. 380).
422.	Corolla rotata.....	LYSIMACHIA (p. 380).
	Corolla non rotata.....	423
423.	Calyx basi spinosus.....	CORIS (p. 381).
	Calyx non spinosus.....	424
424.	Corollæ limbus reflexus.....	425
	Corollæ limbus non reflexus.....	426
425.	Scapus multiflorus.....	DODECATHEON (p. 385).
	Scapus uniflorus.....	CYCLAMEN (p. 385).
426.	Caules nulli aut valde abbreviati.....	428
	Caules plus minus elongati.....	427
427.	Calyx coloratus ; corolla nulla.....	GLAUX (p. 385).
	Calyx non coloratus ; corolla.....	SAMOLUS (p. 385).
428.	Corolla hypocrateriformis.....	429
	Corolla campanulata.....	431
429.	Capsula globosa.....	ANDROSACE (p. 381).
	Capsula ovalis.....	430
430.	Capsula disperma.....	GREGORIA (p. 383).
	Capsula co-sperma.....	PRIMULA (p. 383).
431.	Corolla lacero-multifida.....	SOLDANELLA (p. 385).
	Corolla sub-5-partita.....	CORTUSA (p. 384).
432.	Capsula 1-4-sperma.....	449
	Capsula polysperma.....	433
433.	Corollæ aestivatio plicata ; folia alterna.....	SOLANEÆ. 434
	Corollæ aestivatio imbricativa ; folia opposita	GENTIANEÆ. 443
434.	Fructus baccatus.....	435
	Fructus capsularis.....	439
435.	Corolla rotata.....	436
	Corolla infundibuliformis.....	LYCIUM (p. 337).
	Corolla campanulata	ATROPA (p. 338).

CLAVIS ANALYTICA.

xix

436.	{ Bacca calyce ampliato vesicario tecta.....	PHYSALIS (p. 338).
	Bacca calyce non tecta.....	431
437.	{ Antheræ apice poris duobus dehiscentes.....	SOLANUM (p. 337).
	Antheræ longitudinaliter dehiscentes.....	438
438.	{ Folia pinnatisecta.....	LYCOPERSICUM (p. 338).
	Folia simplicia.....	CAPSICUM (p. 337).
439.	{ Calyx magnus tubulosus ventricosus 5-angularis.....	DATURA (p. 339).
	Calyx corollæ multo brevior.....	440
440.	{ Corolla infundibuliformis.....	441
	Corolla rotata.....	442
441.	{ Calyx urceolatus ; corolla regularis.....	NICOTIANA (p. 339).
	Calyx tubulosus ; corollæ limbus inæqualis.....	HYOSCIAMUS (p. 339).
442.	{ Corolla subinæqualis ; stamina approximata.....	RAMONDIA (p. 339).
	Corolla inæqualis ; stam. non omnino approximata.....	VERRASCUM (p. 339 supp. 1031).
443.	{ Capsula 1-locularis.....	444
	Capsula 2-locularis.....	448
444.	{ Corolla rotata.....	445
	Corolla infundibuliformis , hypocrateiformis campanulatave.....	446
445.	{ Corollæ lobi margine ciliati.....	VILLARIA (p. 325).
	Corollæ lobi non ciliati.....	SWERTIA (p. 325).
446.	{ Folia 3-foliolata.....	MENYANTHES (p. 325).
	Folia integra.....	441
447.	{ Stamina 8.....	CHLORA (p. 325).
	Stamina 5.....	GENTIANA (p. 326 supp. 1031).
448.	{ Stamina 5 ; antheræ post deflorationem spiraliter contortæ.....	CHIRONIA (p. 327).
	Stamina 4 ; antheræ non tortæ.....	EXACUM (p. 328).
449.	{ Styli 5.....	STATICE (p. 387 supp. 1032).
	Stylus 1.....	450
450.	{ Calyx.....	CONVOLVULACEÆ. 451
	Involucrum calyciforme.....	NYCTAGINEÆ (p. 393).
451.	{ Corolla campanulata.....	CONVOLVULUS (p. 329 supp. 1031).
	Corolla tubulosa.....	CRESSA (p. 330).
	Corolla globoso-urceolata.....	CUSCUTA (p. 331).
452.	{ Fructus simplex.....	453
	Cariopsides 4 nudæ.....	LABIATÆ. 483
453.	{ Stamina 2.....	454
	Stamina 4.....	462
454.	{ Corolla calcarata.....	LENTIBULARIEÆ. 455
	Corolla non calcarata.....	456
455.	{ Calyx 5-fidus.....	PINGUICULA (p. 378 supp. 1032).
	Calyx 2-partitus.....	UTRICULARIA (p. 379).
456.	{ Herbae.....	VERONICA (p. 355).
	Arbores aut frutices.....	JASMINEÆ. 457
457.	{ Calyx 5-fidus.....	JASMINUM (p. 321).
	Calyx 4-dentatus , aut 4-partitus , aut 0.....	458
458.	{ Corollæ tubus elongatus.....	LILAC (p. 322).
	Corollæ tubus brevis.....	459
459.	{ Corolla 4-fida ; fructus carnosus.....	460
	Corolla 4-partita ; fructus siccus.....	FRAXINUS (p. 322).
460.	{ Drupa.....	Olea (p. 321).
	Bacca	461

ORDINUM GENERUMQUE

461.	{ Bacca 1-sperma.....	PHYLLOREA (p. 321).
	Bacca 2-4-sperma.....	LIGUSTRUM (p. 321).
462.	{ Cor. regularis scariosa ; stamina æqualia.....	PLANTAGINEÆ. 463
	Cor. irregularis colorata ; stamina inæqualia.....	464
463.	{ Fl. monoici ; ovarium 1-spermum.....	LITTORELLA (p. 390).
	Fl. hermaphroditi ; ovarium 2 oo-spermum.....	PLANTAGO (p. 390 supp. 1032).
464.	{ Pericarpium drupaceum aut baccatum.....	VERBENACEÆ. 465
	Capsula.....	466
465.	{ Frutices	VITEX (p. 377).
	Herbæ	VERBENA (p. 377 supp. 1032).
466.	{ Capsulæ dissepimentum valvis oppositum....	ACANTHACEÆ (p. 378).
	Capsulæ dissepimentum valvis parallelum.....	467
467.	{ Capsula 1-localaris.....	468
	Capsula 2-localaris.....	=469
468.	{ Corolla tubulosa ringens suprà brevissima infrà 3-fida.....	
	Corolla campanulata minima.....	LINDERNIA (p. 348).
469.	{ Calyx 5-partitus , 5-fidus aut 2-3-lobus.....	470
	Calyx 4-dentatus , 4-fidusve.....	479
470.	{ Corolla subrotata.....	SIBTHORPIA (p. 355).
	Corolla non rotata.....	471
471.	{ Calyx ventricosus 5-fidus vel 2-3-lobus.....	PEDICULARIS (p. 352).
	Calyx non ventricosus 5-partitus.....	472
472.	{ Corolla campanulata.....	DIGITALIS (p. 342).
	Corolla tubulosa aut globoso-tubulosa.....	473
473.	{ Corolla calcarata.....	474
	Corolla non calcarata.....	475
474.	{ Corolla tubulosa fauce patente.....	ANARRHINUM (p. 342).
	Corolla ringens tubo inflato.....	LINARIA (p. 343 supp. 1031).
475.	{ Corolla basi gibba.....	476
	Corolla basi æqualis.....	477
476.	{ Corolla palato prominulo destituta.....	ANARRHINUM (p. 342).
	Corolla palato ad faucem prominulo.....	ANTIRRHINUM (p. 343).
477.	{ Corollæ limbus planus subæqualis.....	ERINUS (p. 347).
	Corollæ limbus non planus nec æqualis.....	478
478.	{ Corolla globosa ; limbo coarctato SCROPHULARIA (p. 346. supp. 1032).	
	Corolla tubulosa subbilabiata.....	GRATIOLA (p. 342).
479.	{ Corollæ labium superius galeatum.....	480
	Corollæ labium superius non galeatum.....	TOZZIA (p. 351).
480.	{ Calyx ventricosus.....	RHINANTHUS (p. 353).
	Calyx non ventricosus.....	481
481.	{ Capsula obtusa.....	EUPHRASIA (p. 354).
	Capsula acuminata.....	482
482.	{ Corollæ labium superius margine replicatum ; capsula 2-sperma.....	
	MELAMPYRUM (p. 351).	
	Corollæ labium superius erectum ; caps. oo-sperma , . . . BARTSIA (p. 353).	
483.	{ Stamina 2 fertilia.....	484
	Stamina 4 fertilia.....	487
484.	{ Calyx villis ore clausus.....	CUNILA (p. 359).
	Calyx nudus.....	485
485.	{ Corolla tubulosa 4-5-loba.....	LYCOPUS (p. 369).
	Corolla 2-labiata.....	486

CLAVIS ANALYTICA.

xxj

486.	{ Antheræ loculi connectivo filiformi transversè filamento adnato dissiti.....	SALVIA (p. 360).
	Antheræ loculi coadunati.....	ROSMARINUS (p. 359).
487.	{ Semina baccata.....	PRASIUM (p. 376).
	Semina non baccata.....	488
488.	{ Corolla distinctè bilabiata.....	489
	Corolla labio superiori minimo aut lobis subæqualibus.....	525
489.	{ Stamina corollæ labio inferiori inclinata.....	OXYMUM (p. 375).
	Stamina erecta aut ad labium superius dejecta aut in tubo inclusa.....	490
490.	{ Filamenta apice bifurca.....	491
	Filamenta simplicia.....	492
491.	{ Calyx post florescentiam nudus.....	BRUNELLA (p. 375).
	Calyx post florescentiam villis clausus.....	CLEONIA (p. 375).
492.	{ Calyx squamulâ concavâ superiùs incumbente onustus.....	
	SCUTELLARIA (p. 376).
	Calyx non squamulosus.....	493
493.	{ Corollæ labium inferius basi utrinquè 1-2 dentibus minutis instructum.	494
	Cor. labium inferius basi nudum.....	496
494.	{ Antheræ plùs minùs hirsutæ.....	495
	Antheræ glabræ.....	OVALIA (p. 366).
	Cor. labium superius integrum, antheræ extùs subhirsutæ.....	
495.	{	LAMIUM (p. 366 supp. 1032).
	Cor. labium superius subcrenatum, antheræ intùs subhirsutæ...	
	GALEOPSIS (p. 365).
496.	{ Calyx 2-labiatus.....	497
	Calyx non 2-labiatus.....	504
497.	{ Calyx post florescentiam nudus.....	498
	Calyx post florescentiam villis clausus.....	503
498.	{ Flores axillares verticillati aut laxè spicati.....	499
	Flores in spicas densas bracteis imbricatas digesti.....	502
499.	{ Corollæ faux valdè inflata.....	DRACOCEPHALUM (p. 374).
	Corollæ faux vix aut non inflata.....	500
500.	{ Flores verticillati aut capitati.....	CLINOPODIUM (p. 374 supp. 1032).
	Flores solitarii aut laxè racemosi.....	501
501.	{ Corollæ labium superius fornicateum; semina glabra...	MELISSA (p. 374).
	Corollæ labium superius planum; semina extùs villosa.....	
	MELITTIS (p. 374 supp. 1032).
502.	{ Calyx dente summo apice appendiculatim producto; cor. tubus longus cylindricus.....	LAVANDULA (p. 369 supp. 1032).
	Calyx non appendiculatus; cor. tubus compressus...	ORIGANUM (p. 375).
503.	{ Calyces spinosi.....	SIDERITIS (p. 368).
	Calyces non spinosi.....	THYMUS (p. 372).
504.	{ Calyx 10-striatus.....	505
	Calyx non striatus.....	508
505.	{ Calyx fructifer nudus.....	506
	Calyx fructifer villis clausus.....	SATUREIA (p. 370).
506.	{ Flores in quâque axillâ 1-2.....	GLECHOMA (p. 367).
	Flores numerosi in verticilos densos congesti.....	507
507.	{ Calyx campanulatus; corollæ labium superius crenatum..	BALLOTA (p. 365).
	Calyx cylindricus; corollæ labium bisidum.....	MARRUBIUM (p. 364).
508.	{ Ovaria apice tomentosa.....	LEONURUS CARDIACA (p. 364).
	Ovaria glabra.....	509

ORDINUM GENERUMQUE

509.	{ Calyx fructifer villis clausus.....	510
	Calyx nudus.....	511
510.	{ Flores in verticilos axillares dispositi.....	MENTHA (p. 371).
	Flores in spicas densas bracteis imbricatas digesti.,,	ORIGANUM (p. 375).
511.	{ Stamina exserta.....	512
	Stamina non exserta.....	524
512.	{ Corollæ tubus dilatatus.....	MELITTIS (p. 374 supp. 1032).
	Corollæ tubus angustus.....	513
513.	{ Calyx infundibuliformis.....	MOLUCCELLA (p. 363).
	Calyx vix dilatatus aut cylindricus.....	514
514.	{ Faucis margines reflexi.....	NEPETA (p. 369 supp. 1032).
	Faucis margines erecti aut vix patentes.....	515
515.	{ Corollæ faux non inflata.....	BETONICA (p. 365).
	Corollæ faux plus minus dilatata.....	516
516.	{ Stamina per paria approximata aut ad unum corollæ latus deflexa....	517
	Stamina erecta aut remota.....	523
517.	{ Corollæ labium superius integerrimum.....	518
	Corollæ labium superius emarginatum aut bifidum.....	520
518.	{ Flores lutei.....	GALEOBODON (p. 364).
	Flores albi aut rosei.....	519
519.	{ Corollæ labium inferius reflexum 3-partitum subæquale.	LEONURUS (p. 364).
	Corollæ labium inferius 3-lobum lobis lateralibus minimis reflexis, medio	
	majore.....	LAMIUM (p. 366).
520.	{ Antheræ in crucem conniventæ.....	GLECHOMA (p. 367).
	Antheræ in crucem non conniventæ.....	521
521.	{ Stamina deflorata ad latus utrinquè reflexa.....	STACHYS (p. 367).
	Stamina deflorata ad latus non reflexa.....	522
522.	{ Labii superioris laciniæ divaricatae; folia cordata.	LAMIUM BIFIDUM (p. 366).
	Labii super. laciniæ non divaricatae; folia non cordata.	PHLOMIS (p. 364).
523.	{ Flores secundi ; labia 2 valde distincta	HYSSOPUS (p. 363).
	Flores non secundi, labia 2 parùm distincta.....	526
524.	{ Calycis dentes spinosi.....	SIDERITIS (p. 368).
	Calycis dentes non spinosi.....	525
525.	{ Flores in spicas terminales digesti.....	LAVANDULA (p. 369 supp. 1032).
	Flores in verticilos axillares digesti.....	LEONURUS (p. 372).
526.	{ Corollæ lobi primo adspectu in labium unicum protensi.....	527
	Corollæ lobi subæquales.....	528
	Labium superius minimum 2-dentatum ; cariopsis reticulatae.....	
527.	AJUGA (p. 361).
	Labium sup. 2-partitum , laciniis ad latera deflexis ; cariopsis laves...	
	TEUCRIUM (p. 362).
528.	{ Folia integræ aut dentata.....	529
	Folia int. fida aut pinnatifida.....	VERBENA (p. 377 supp. 1032).
529.	{ Corolla 5-loba.....	SATUREIA (p. 370).
	Corolla 4-loba.....	530
530.	{ Flores capitati verticillati aut spicati.....	MENTHA (p. 371).
	Pedunculi solitarii 1-3-flori	THYMUS PARVIFLORUS (p. 372).

INCOMPLETÆ.

531.	{ Flores omnino nudi, aut involuero communi cincti.....	532
	Flores omnes perigonio proprio cincti.....	572
532.	{ Plantæ fluitantes natantes aut submersæ.....	533
	Plantæ super terram crescentes.....	539

CLAVIS ANALYTICA.

xxij

533.	{ Flores hermaphroditæ.....	534
	Flores monoici aut dioici.....	535
534.	{ Antheræ 4 sessiles reniformes; fructus capsularis.....	RUFFIA (p. 440).
	Antheræ 3 filamentis dilatatis basi extus insertæ; fructus baccatus.....	CAULINTA (p. 441).
535.	{ Plantæ marinæ.....	ZOSTERA (p. 440).
	Plantæ aquatiles.....	536
536.	{ Herbae natantes minimæ, folio aut fronde compressâ lenticulari constan- tes.....	LEMNACEÆ (p. 532).
	Herbae submersæ caulis donatae.....	537
537.	{ Stamina nulla; caules ramis verticillatis instructi..	CHARACEÆ (p. 533).
	Stamen 1; caules foliosi.....	538
538.	{ Ovaria 2-6; capsulae compressæ.....	ZANNICHELLIA (p. 440).
	Ovarium 1, capsula ovoidea.....	NAIAS (p. 441).
539.	{ Herbæ.....	540
	Arbores suffruticose.....	549
540.	{ Succus proprius lacteus.....	EUPHORBIA (p. 412 supp. 1033).
	Succus proprius non lacteus.....	541
541.	{ Caules scandentes.....	HUMULUS (p. 419).
	Caules non scandentes.....	542
542.	{ Plantæ aphyllæ, ramis verticillatis.....	EQUISETACEÆ (p. 534).
	Plantæ foliis donatae.....	543
543.	{ Flores circè spadicem aut in amentum aggregati.....	544
	Flores in spicam laxam digesti.....	548
544.	{ Folia linearia.....	545
	Folia non linearia.....	AROIDÆ. 547
545.	{ Stamina 6; ovarium polyspermum.....	ACORUS (p. 481).
	Stamina 3; ovarium monospermum.....	TYPHACEÆ. 546
546.	{ Amenta cylindrica.....	TYPHA (p. 482).
	Amenta globosa.....	SPARGANIUM (p. 482).
547.	{ Spadix apice nudus.....	ARUM (p. 480).
	Spadix undique tectus staminibus et ovariis intermixtis..	CALLA (p. 481).
548.	{ Antheræ longæ.....	SCHUECHZERIA (p. 438).
	Antheræ extrorsæ subsessiles.....	TRIGLOCHIN (p. 438 supp. 1034).
549.	{ Folia pinnata.....	FRAXINUS (p. 322).
	Folia integra dentata aut lobata.....	550
550.	{ Folia lobata nervis palmatis.....	551
	Folia integra denticulata vel pinnatifida.....	552
551.	{ Succus proprius lacteus; flores involucro carnosò inclusi..	FICUS (p. 419).
	Succus proprius non lacteus; flores spicati vel breviter amentacei.....	MORUS (p. 419).
552.	{ Ovarium pedicellatum 3-coccum 3-spermum.	EUPHORBIA (p. 412 supp. 1033).
	Ovarium sessile.....	553
553.	{ Nux calyce baccato et akenio crustaceo constans; folia subtùs squamato- argentea.....	HIPPOPHAË (p. 409).
	Fructus non baccatus; folia subtùs non squamata.....	554
554.	{ Filamenta staminum libera; folia non acerosa sèpius dentata.....	AMENTACEÆ. 555
	Filamenta staminum nulla vel coalita; folia nunquam dentata sèpius ace- rosa.....	CONIFERÆ. 566

xxiv ORDINUM GENERUMQUE

555.	{ Flores hermaphroditi.....	ULMUS (p. 421).
	Flores monoici aut dioici.....	556
556.	{ Folia palmatiloba.....	PLATANUS (p. 430).
	Folia simplicia.....	557
557.	{ Semina comosa.....	558
	Semina non comosa.....	559
558.	{ Stamina 2-5.....	SALIX (p. 423 supp. 1033).
	Stamina 8-30.....	POPULUS (p. 427).
559.	{ Stigmata in quoque flore 2.....	560
	Stigmata 3-6.....	564
560.	{ Fructus drupaceus.....	MYRICA (p. 431).
	Fructus non drupaceus.....	561
561.	{ Fructus involucrati.....	562
	Fructus non involucrati.....	563
562.	{ Involucrum calyciforme margine lacerum.....	CORYLUS (p. 429).
	Involucrum squamiforme 3-lobum.....	CARPINUS (p. 430).
563.	{ Amenta feminea elongato-cylindrica; nuculæ 1-loculares.	BETULA (p. 422).
	Amenta feminea ovato-globosa; nuculæ 2-loculares.....	ALNUS (p. 422 supp. p. 1033).
564.	{ Involucrum non clausum.....	QUERCUS (p. 428).
	Involucrum hispidum clausum.....	565
565.	{ Involucrum spinis mollioribus muricatum.....	FAGUS (p. 428).
	Involucrum spinis durioribus muricatum.....	CASTANEA (p. 428).
566.	{ Stamina in quoque flore 2.....	567
	Stamina 4-10.....	569
567.	{ Amenta mascula racemosa; coni squamæ clavatae ligneæ.	PINUS (p. 433).
	Amenta mascula simplicia; coni squamæ tenues non clavatae.....	568
568.	{ Folia persistentia; squamæ obtusæ.....	ABIES (p. 434).
	Folia caduca; squamæ acutæ.....	LARIX (p. 434).
569.	{ Suffrutex aphyllus.....	EPHEDRA (p. 432).
	Frutices Arboresve foliis instructi.....	570
570.	{ Folia alterna.....	TAXUS (p. 432).
	Folia terna aut imbricata.....	571
571.	{ Frutices; squamæ demùm carnosæ.....	JUNIPERUS (p. 432).
	Arbores excelsæ; squamæ siccae.....	CUPRESSUS (p. 432).
572.	{ Stamina 7 aut ultrà.....	573
	Stamina 1-6.....	605
573.	{ Ovaria plura.....	574
	Ovarium unicum.....	577
574.	{ Ovaria 2.....	POTERIUM (p. 174).
	Ovaria 5-oo.....	575
575.	{ Stamina 9.....	BUTOMUS (p. 437).
	Stamina indefinita.....	576
576.	{ Folia sagittata.....	SAGITTARIA (p. 438).
	Folia non sagittata.....	325
577.	{ Perigonium 10-12 lobatum.....	578
	Perigonium 2-8-lobatum.....	580
578.	{ Folia in lobos filiformes divisa.....	CERATOPHYLLUM (p. 192).
	Folia repanda aut integra.....	579

CLAVIS ANALYTICA.

xxv

579.	{ Carpella 5 ad maturitatem discreta.....	CORYLACEÆ	xii
	{ Capsula 3-cocca.....	CROTON (p. 411).	
580.	{ Perigonium 8-partitum.....	PARIS (p. 459).	
	{ Perigonium 2-6-lobatum.....	581	
581.	{ Arbores frutices suffruticesve.....	582	
	{ Herbae.....	589	
582.	{ Folia pinnata.....	JUGLANDÆ (p. 420).	
	{ Folia non pinnata.....	583	
583.	{ Stigma 1.....	584	
	{ Stigmata 2-6.....	587	
584.	{ Arbor.....	LAURINEÆ. (p. 407).	
	{ Suffrutices aut herbæ.....	THYMELEÆ. 585	
585.	{ Herbæ.....	STELLERA (p. 405).	
	{ Suffrutices.....	586	
586.	{ Stylus lateralis ; capsula.....	PASSERINA (p. 406).	
	{ Stylus terminalis ; bacea.....	DAPHNE (p. 406 supp. 1033).	
587.	{ Capsula 2-3-cocca.....	596	
	{ Fructus non 2-3-coccus.....	588	
588.	{ Caules basi sublignosi.....	POLYGONUM (p. 403).	
	{ Caules lignosi.....	554	
589.	{ Flores in spathâ inclusi.....	HYDROCHARIDEÆ. 590	
	{ Flores in spathâ non inclusi.....	592	
590.	{ Folia orbicularia.....	HYDROCHARIS (p. 436).	
	{ Folia non orbicularia.....	591	
591.	{ Folia ensiformi-3-angularia aculeata.....	STRATIOTES (p. 436).	
	{ Folia linearia.....	VALLISNERIA (p. 436).	
592.	{ Fructus baccatus.....	593	
	{ Fructus capsularis.....	594	
593.	{ Flores capitati ; planta vix pedalis.....	ABOXA (p. 212 supp. 1029).	
	{ Flores racemosi ; planta 3-6-pedalis.....	PHYTOLACCA (p. 399).	
594.	{ Capsula 2-6-locularis.....	595	
	{ Capsula 1-locularis.....	600	
595.	{ Hermaphroditæ ; folia reniformia.....	ASARUM (p. 411).	
	{ Dioicæ aut Monoicæ ; folia non reniformia.....	EUPHORBIACEÆ. 596	
596.	{ Capsula 2-cocca.....	MERCURIALIS (p. 417).	
	{ Capsula 3-cocca.....	597	
597.	{ Perigonium nullum ; stamina 10-36 circa ovarium solitarium pedicellatum congesta, involucro cincta.....	EUPHOBIA (p. 412 supp. 1033).	
	{ Perigonium 3-10-lobatum ; flores feminei et masculis distincti.....	598	
598.	{ Stam. 4.....	BUXUS (p. 412).	
	{ Stam. 8-oo.....	599	
599.	{ Folia ovato-rhomboidea.....	CROTON (p. 411).	
	{ Folia peltato-palmata.....	RICINUS (p. 412 supp. 1033).	
600.	{ Herbae parasiticæ squamis loco foliorum donatæ.....	CRTRIKEÆ (p. 410).	
	{ Herbae non parasiticæ foliis instructæ.....	601	
601.	{ Perigonium 2-fidum, stamina 12-19.....	TRELIQONUM (p. 394).	
	{ Perigonium 4-6-lobatum, stamina 5-10.....	602	
602.	{ Stylus unicus.....	585	
	{ Styli 2-3.....	603	

xxvij ORDINUM GENERUMQUE

603.	{ <i>Capsula polysperma</i>	CHRYSSOPLIUM (p. 212).
	{ <i>Capsula i-sperma</i>	604
604.	{ <i>Folia opposita</i>	SCLERANTHUS (p. 199 supp. 1026).
	{ <i>Folia alterna</i>	POLYGONUM (p. 403 supp. 1033).
605.	{ <i>Perigonum coloratum petaloideum</i>	606
	{ <i>Perigonum glumaceum aut ealycinum</i>	670
606.	{ <i>Stamina 1-2</i>	ORCHIDEÆ. 607
	{ <i>Stamina 3 et ultra</i>	617
607.	{ <i>Labellum maximum inflatum calceolatum</i>	CYPripedium (p. 451).
	{ <i>Labellum nou calceolatum</i>	608
608.	{ <i>Labellum basi calcaratum</i>	609
	{ <i>Labellum ecalcaratum</i>	611
609.	{ <i>Plantæ foliis donatæ</i>	OCHIS (p. 442 supp. p. 1034).
	{ <i>Plantæ aphyllæ</i>	610
610.	{ <i>Perigonum laxiusculè erecto-connivens; labellum ascendens longè calcaratum</i>	LIMODORUM (p. 450).
	{ <i>Perigonum deorsum patens, labellum posticum vesicario-calcaratum</i>	EPIPOGİUM (p. 450 supp. 1034).
611.	{ <i>Plantæ aphyllæ aut squamiferae</i>	612
	{ <i>Plantæ foliis instructæ</i>	613
612.	{ <i>Labellum obcordatum</i>	EPIFACTIS NIDUS-AVIS (p. 449).
	{ <i>Labellum oblongum acutum</i>	CORALLORHIZA (p. 450).
613.	{ <i>Perigonum inversum; labellum posticum</i> . MALAXIS (p. 450 supp. 1034).	.
	{ <i>Perigonum non inversum; labellum anticum</i>	614
614.	{ <i>Styli columnæ cuspidata aut appendiculata</i>	615
	{ <i>Columna obtusa</i>	616
615.	{ <i>Perigonii segmenta superiora cucullato-coalita; labellum concavum</i>
	{ <i>Perigonii segmenta superiora basi conniventia apice libera; labellum ventricosum</i>	SEAPIAS (p. 448).
616.	{ <i>Stigma anticum; anthera terminalis</i>	OPHRYS (p. 446).
	{ <i>Stigma obliquum terminale; anthera margini postico styli adnata</i>	EPIFACTIS (p. 449).
617.	{ <i>Stamina 3</i>	618
	{ <i>Stamina 4 et 5</i>	622
	{ <i>Stamina 6</i>	631
618.	{ <i>Suffrutex</i>	OSYRIS (p. 408).
	{ <i>Herbæ</i>	IRIDEÆ. 619
619.	{ <i>Stylus lacinias 3 maximas petaloideas gerens</i>	IRIS (p. 451).
	{ <i>Stylus lacinias petaloideas non gerens</i>	620
620.	{ <i>Perigonium bilabiatum</i>	GLADIOLUS (p. 452).
	{ <i>Perigonium non 2-labiatum</i>	621
621.	{ <i>Stigma 3-partitum, lacinias siliiformibus</i>	Ixia (p. 453).
	{ <i>Stigmata 3 crassa convoluta</i>	CROCUS (p. 453).
622.	{ <i>Perigonium duplex aut perigonium internum involucratum</i>	623
	{ <i>Perigonium non involucratum</i>	627
623.	{ <i>Stamina 4</i>	PLANTAGINEÆ. 624
	{ <i>Stamina 5</i>	625
624.	{ <i>Monoica, ovarium 1-spermum</i>	LITTORELLA (p. 390).
	{ <i>Hermaphrodita, ovarium 2-oo-spermum</i> . PLANTAGO (p. 390 supp. p. 1032).	.

CLAVIS ANALYTICA. xxvij

625.	Perigonum externum tubulosum integrum aut dentatum..... PLUMBAGINÆ. 626 Involucrum calyciforme 5 lobum..... NYCTAGINÆ. (p. 393).
626.	Stylus 1; capsula 5-valvis..... PLUMBAGO (p. 387). Styli 5; capsula indehiscentia..... STATICÆ (p. 387 supp. p. 1032).
627.	Folia basi vaginantia aut vaginæ intrafoliaceæ adnatae..... POLYGONUM (p. 403). Folia non vaginantia..... 628
628.	Herbae..... 629 Arbores aut arbustulæ..... ELÆAGNEÆ. 630
629.	Folia cordata..... MAYANTHEMUM (p. 459). Folia ovato-lanceolata..... GLAUX (p. 385). Folia linearia aut linear-lanceolata..... THYMUS (p. 408).
630.	Flor. hermaphroditi; perigonum 4-5-fidum..... ELMAGNUS (p. 409). Fl. dioici; perigonum nullum aut apice bifidum..... HIPPOPHAX (p. 409).
631.	Ovarium 1; stylus 1 aut 0..... 632 Ovaria plura aut styli plures..... 663
632.	Perigonum in ligulam extensum..... ARISTOLOCHIA (p. 410). Perigonum in ligulam non extensum..... 633
633.	Perigonum ovario adhærens..... 634 Perigonum liberum..... 640
634.	Plantæ scandentes..... TAMUS (p. 460). Plantæ non scandentes..... 635
635.	Folia dentato-spinosa..... AGAVE (p. 472). Folia non dentato-spinosa..... AMARYLLIDEÆ. 636
636.	Stamina valdè exserta..... PANCRATIUM (p. 454). Stamina faucem non aut vix superantia..... 637
637.	Perigonum coronâ petaloideâ ad faucem instructum. NARCISSUS (p. 454). Perigonum coronâ non instructum..... 638
638.	Flores lutei, fauœ squamulis 6 instructa..... AMARYLLIS (p. 454). Flores albi aut rosei, fauœ nuda..... 639
639.	Laciniæ perigonii 6 æquales apice crassiusculæ..... LEUCORUM (p. 457). Laciniæ 3 interiores externis 3 duplo breviores emarginatæ..... GALANTHUS (p. 457).
640.	Fructus baccatus..... 641 Fructus capsularis..... 644
641.	Folia fasciculata..... ASPARAGUS (p. 458). Folia non fasciculata..... 642
642.	Filamenta in urceolum coalita..... RUSCUS (p. 460). Filamenta libera..... 643
643.	Perigonum 6-partitum..... STAPTOPUS (p. 458). Perigonum 6-dentatum..... CONVALLARIA (p. 459).
644.	Flores sessiles basi squamis scariosis cincti..... APHYLLANTHES (p. 454). Flores basi squamis scariosis non cincti..... 645
645.	Filamenta lanuginosa persistentia..... 646 Filamenta non lanuginosa LILIACEÆ. 647
646.	Ovarium pyramidale; flores virescentes..... ABAMA (p. 474). Ovarium globosum; fl. albi aut rosei... PHALANGIUM BICOLOR (p. 464).

xxvij ORDINUM GENERUMQUE

647.	{ Stigmata 3.....	648
	Stigma 1.....	653
648.	{ Scapus nudus; folia radicalia.....	649
	Caulis foliosus.....	651
649.	{ Folia elongata linearia.....	POLYANTHES (p. 472).
	Folia lanceolata aut lato-lanceolata.....	650
650.	{ Floris laciniæ basi unguiculatæ angustæ conniventes.....	BULBOCODIUM (p. 473).
	Laciniæ revolutæ aut reflexæ.....	ERYTHRONIUM (p. 463).
651.	{ Perigonii laciniæ basi soveâ nectariferâ ovatâ excavatæ.....	FRITILLARIA (p. 462).
	Laciniæ basi soveâ ovatâ non excavatæ.....	652
652.	{ Perigonii laciniæ suprà sulco longitudinali ad basin excavatæ.....	LILIUM (p. 462).
	Laciniæ basi non sulcatæ.....	TULIPA (p. 461 supp. 1034).
653.	{ Stamina declinata.....	654
	Stamina erecta.....	655
654.	{ Perigonii segmenta unguiculata.....	CZACKIA (p. 463).
	Perig. segmenta basi in tubum coalita.....	HEMEROCALLIS (p. 471).
655.	{ Flores umbellati e spathâ 2-valvi orti.....	ALLIUM (p. 468 supp. 1034).
	Flores spicati, racemosi aut paniculati.....	656
656.	{ Perigonium 6-fidum aut 6-dentatum.....	657
	Perigonium 6-partitum.....	659
657.	{ Perigonium tubulosum.....	658
	Perigonium ovatum medio inflatum.....	MUSCARI (p. 466).
658.	{ Stamina basi perigonii inserta.....	SCILLA (p. 464 supp. 1034).
	Stamina circâ medianam perigonii longitudinem inserta.	HYACINTHUS (p. 466).
659.	{ Staminum filamenta basi dilatata.....	660
	Stamina filamenta basi non dilatata.....	661
	Filamenta 6 basi dilatata ovarium obtegentia.....	
660.	{ Filamenta 3 basi dilatata ovarium non obtegentia.....	ASPHODELUS (p. 463 supp. p. 1034).
	ORNITHOGALUM (p. 467 supp. p. 1034).
661.	{ Flores lutei.....	GAGEA (p. 466).
	Flores albi purpurei aut cœrulei.....	662
662.	{ Semina 3-quatra; radices fasciculatæ.....	PHALANGIUM (p. 464).
	Semina rotundata; radices bulbosæ.....	SCILLA (p. 464 supp. 1034).
663.	{ Fruetus baccatus.....	SMILAX (p. 459).
	Fruetus non baccatus.....	664
664.	{ Ovaria plura.....	665
	Ovarium 1.....	667
665.	{ Capsulæ oo-spermæ.....	VERATRUM (p. 472).
	Capsule 1-2-spermæ.....	666
666.	{ Folia linearia rigida.....	548
	Folia nec linearia nec rigida.....	ALISMA (p. 437).
667.	{ Cariopsis.....	POLYGONUM (p. 403 supp. 1033).
	Capsula oo-sperma.....	668
668.	{ Perigonium involucro minimo 3-partito basi einctum.	TOFFIELDIA (p. 474).
	Perigonium non involucratum.....	669

669.	{ Antheræ erectæ hastatæ.....	MEBENDERA (p. 473).
	{ Anth. oblongæ versatiles.....	COLCHICUM (p. 473 supp. 1035).
670.	{ Arbores aut Frutices.....	671
	{ Suffrutices aut Herbæ.....	677
671.	{ Folia alata digitata aut profundè lobata.....	672
	{ Folia integra dentata sinuatave.....	674
672.	{ Folia pinnata.....	673
	{ Folia digitata.....	PALMÆ (p. 480).
	{ Folia profundè lobata.....	651
673.	{ Drupa sicca.....	PISTACIA (p. 113).
	{ Legumen indehiscens.....	CERATOMIA (p. 161).
674.	{ Fructus 3-cornis 3-locularis.....	BUXUS (p. 412).
	{ Fructus nec 3-cornis nec 3-locularis.....	675
675.	{ Drupa globosa.....	676
	{ Fructus non drupaceus.....	554
676.	{ Arbor.....	CELTIS (p. 421).
	{ Frutex.....	MYRICA (p. 431).
677.	{ Perigonii limbus 8-12-lobatus.....	678
	{ Perigonii limbus 1-6-lobatus.....	679
678.	{ Folia multilobata.....	CERATOPHYLLUM (p. 192).
	{ Folia simplicia.....	217
679.	{ Folia composita aut digitata.....	680
	{ Folia simplicia rarissimè pinnatifida.....	682
680.	{ Flores dioici.....	CANNABIS (p. 417).
	{ Flores monoici aut hermaphroditi.....	681
681.	{ Herbæ natantes.....	MYRIOPHYLLUM (p. 190).
	{ Herbæ non natantes.....	359
682.	{ Stamina 6.....	683
	{ Stamina 1-5.....	689
683.	{ Stigma 1.....	ACORUS (p. 481).
	{ Stigmata 2-6.....	684
684.	{ Ovaria plura.....	548
	{ Ovarium 1.....	685
685.	{ Cariopsis.....	POLYGONEÆ. 686
	{ Capsula 3-oo-sperma.....	JUNCEÆ. 688
686.	{ Involucellum sub flore 3-bracteolatum... RUMEX (p. 400 supp. 1033).	
	{ Involucellum sub flore nullum.....	687
687.	{ Perigonii laciniæ post anthesin auctæ.....	OXYRIA (p. 403).
	{ Perigonii laciniæ post anthesin non auctæ. POLYGONUM (p. 403 supp. 1033).	
688.	{ Folia teretia.....	JUNCUS (p. 475 supp. p. 1035).
	{ Folia plana.....	LUZULA (p. 478).
689.	{ Stamina 4-5.....	690
	{ Stamina 1-3.....	711
690.	{ Stylus 1 aut 0.....	691
	{ Styli 2-3.....	707
	{ Styli 4.....	SPINACIA (p. 399).
691.	{ Ovaria plura.....	692
	{ Ovarium 1.....	693
692.	{ Perigonium 4-partitum.....	POTAMOCETON (439 supp. p. 1034).
	{ Perigonium caducum 2-valve.....	RUPPIA (p. 440).

XXX ORDINUM GENERUMQUE

693.	{ Perigonium cum ovario adhærens.....	694
	{ Perigonium cum ovario non adhærens.....	696
694.	{ Folia opposita ; ovarium 4-loculare.....	ISNARDIA (p. 189).
	{ Folia alterna aut subopposita ; ovarium 1-loculare. SANTALACEÆ. 695	
695.	{ Perigonium 4-5-fidum.....	THESIUM (p. 408).
	{ Perigonium 3-fidum.....	OSTRIS (p. 408).
696.	{ Perigonii sepala ad apicem in cornu aristatum desinentia.....	ILLECEBRUM (p. 197).
	{ Perigonii sepala non cornuta.....	697
697.	{ Perigonium duplex.....	624
	{ Perigonium unicum.....	698
698.	{ Flores hermaphroditæ.....	702
	{ Flores monoici aut dioici.....	699
699.	{ Caules scandentes.....	HUMULUS (p. 419).
	{ Caules non scandentes.....	700
700.	{ Flores masculi solitarii.....	HEXINE (p. 418).
	{ Flores masculi aggregati aut racemosi.....	701
701.	{ Flores feminei perigonio 4-partito.....	PARIETARIA (p. 418).
	{ Flores feminei perigonio 2-valvi.....	URTICA (p. 418 supp. 1033).
702.	{ Perigonium 2-partitum.....	CORISPERMUM (p. 395 supp. p. 1033).
	{ Perigonium 3-5-partitum.....	703
703.	{ Fructus perigonio non tectus.....	CAMPHOROSMA (p. 395).
	{ Fructus perigonio tectus.....	704
704.	{ Perigonium post inflorescentiam accretum.....	705
	{ Perigonium post inflorescentiam non accretum.....	706
705.	{ Perigonii laciniæ 5 post inflorescentiam appendice scarioso dorso instructæ.....	SALSOLA (p. 395 supp. 1033).
	{ Perigonii laciniæ 2 post inflorescentiam crescentes. ATRIPLEX (p. 397).	
706.	{ Stigmata 2-4.....	CHENOPODIUM (p. 396).
	{ Stigma 1.....	PARIETARIA (p. 418).
707.	{ Fructus 3-locularis.....	BUXUS (p. 412).
	{ Fructus 1-locularis.....	708
708.	{ Capsula 5-valvis.....	ILLECEBRUM (p. 197).
	{ Capsula circumscissa.....	AMARANTHACEÆ (p. 393).
	{ Fructus indehiscens.....	709
709.	{ Folia basi vaginantia aut vaginæ intrafoliaceæ adnata.....	687
	{ Folia vaginis destituta.....	710
710.	{ Perigonium basi ovario semi-adhærens.....	BETA (p. 399).
	{ Perigonium omnino liberum.....	698
711.	{ Folia verticillata.....	HIPPURIS (p. 191).
	{ Folia non verticillata.....	712
712.	{ Folia non vaginantia , flores non glumacei.....	713
	{ Folia vaginantia , flores glumacei.....	724
713.	{ Perigonium 1-2-partitum aut nullum.....	714
	{ Perigonium 3-6-partitum.....	716
714.	{ Plantæ terrestres.....	CORISPERMUM (p. 395 supp. 1033).
	{ Plantæ aquatiles.....	715
715.	{ Bracteæ 2 oppositæ petaloideæ ad basin floris ...	CALLITRICHE (p. 191).
	{ Bracteæ ad basin floris nullæ.....	538

CLAVIS ANALYTICA.

xxxj

716.	{ Capsula 5-valvis.....	ILLECEBRUM (p. 197).
	Capsula non 5-valvis.....	717
717.	{ Stamina 3.....	718
	Stamina 1-2.....	721
718.	{ Folia ensiformia subvaginantia.....	TYPHACEÆ. 719
	Folia nec ensiformia nec minimè vaginantia.....	720
719.	{ Amenta cylindrica.....	TYPHA (p. 482).
	Amenta globosa.....	SPARGANIUM (p. 482).
720.	{ Stylus 2-fidus; folia subulata.....	POLYCHENUM (p. 394).
	Styli 3; folia non subulata.....	AMARANTHUS (p. 393 supp. 1032).
721.	{ Capsula 3-cocca 3-sperma.....	EUPHORBIA (p. 412 supp. 1033).
	Capsula non 3-cocca.....	722
722.	{ Plantæ natantes.....	VALLISNERIA (p. 436).
	Plantæ non natantes.....	723
723.	{ Perigonium vix 5-dentatum; ramuli articulati....	SALICORNIA (p. 395).
	Perigonium 3-partitum; ramuli non articulati.....	BLITUM (p. 399).
724.	{ Perigonium 6-partitum.....	JUNCUS (p. 475 supp. p. 1035).
	Perigonium 1-2-valve.....	725
725.	{ Gluma univalvis; perigonium proprium nullum; foliorum vaginæ integræ.....	CYPERACEÆ. 726
	Gluma sæpius 2-valvis; singulo flori perigonium 1-2-valve; foliorum vaginæ longitudinaliter fissæ.....	GRAMINEÆ. 731
726.	{ Flores monoici dioicive.....	727
	Flores hermaphroditi.....	728
727.	{ Semina in urceolo persistenti inclusa.....	CAREX (p. 488 supp. 1035).
	Semina in urceolo non inclusa.....	KOBRESIA (p. 488).
728.	{ Semen basi setis longissimis cinctum.....	ERIOPHORUM (p. 487).
	Semen basi nudum aut setulis glumâ brevioribus cinctum.....	729
729.	{ Glumæ disticho imbricatæ.....	CYPERUS (p. 483).
	Glumæ undique imbricatæ.....	730
730.	{ Glumæ omnes fertiles.....	SCIRPUS (p. 485 supp. 1035).
	Glumæ inferiores steriles.....	SCHENUS (p. 484).
731.	{ Flores hermaphroditi aut masculi et feminei in eâdem spiculâ.....	732
	Flores sexu distincti nempè masculi et feminei in diversis spiculis.....	787
732.	{ Spiculæ pedicellatæ et in paniculam sæpe spiciformem digesti.....	733
	Spiculæ sessiles secùs rachin spicatae.....	790
733.	{ Spiculæ 1-floræ.....	734
	Spiculæ 2-multifloræ.....	755
734.	{ Stamina 2.....	735
	Stamina 3.....	736
735.	{ Perigonii valvæ dorso aristulatæ.....	ANTHOXANTHUM (p. 509).
	Perigonii valvæ inermes.....	CYRPSIS (p. 509).
736.	{ Gluma et perigonium.....	737
	Gluma nulla; perigonium 2-valve.....	LEERSIA (p. 501).
737.	{ Glumæ valvula externa muricata, interna minutissima..	TRAGUS (p. 501).
	Gluma 2-3-valvis, valvula externa non muricata.....	738
738.	{ Gluma 2-valvis.....	740
	Gluma 3-valvis.....	739
739.	{ Panicula laxa aut spiciformis.....	PANICUM (p. 506.).
	Panicula spiciformis digitata.....	DIGITARIA (p. 501).

xxxij ORDINUM GENERUMQUE

740.	{ Glumæ aut perigonia extus villosa.....	741
	Glumæ aut perigonia extus glabra aut subglabra.....	742
741.	{ Glumæ valvulae extus lanugine sericeâ onustæ.....	SACCHARUM (p. 500).
	Perigonii valvæ basi aut dorso villis sericeis onusta.....	CALAMAGROSTIS (p. 502)
742.	{ Glumæ aut perigonia aristata.....	745
	Glumæ et perigonia mutica.....	750
743.	{ Glumæ valvulae in aristam productæ.....	744
	Glumæ valvulae muticæ.....	746
744.	{ Perigonium inerme.....	PHLEUM (p. 508).
	Perigonium aristatum.....	745
745.	{ Perigonium 1-aristatum.....	POLYPOGON (p. 508).
	Perigonium 3-aristatum.....	LAGURUS (p. 500).
746.	{ Perigonium 3-aristatum.....	LAGURUS (p. 500).
	Perigonium 1-aristatum.....	747
747.	{ Perigonii valva externa aristam longam apice gerens...	STIPA (p. 505).
	Perigonii valva externa aristam dorso aut basi gerens.....	748
748.	{ Panicula laxa.....	749
	Panicula spiciformis.....	ALOPECURUS (p. 508).
749.	{ Semen liberum.....	AGROSTIS (p. 502).
	Semen perigonio corticatum.....	MILIUM (p. 505 supp. p. 1035).
750.	{ Flores subsessiles in spicas digitatas dispositæ.....	751
	Panicula laxa aut spiciformis.....	752
751.	{ Glumæ valvulae patentes, spiculæ solitariæ.....	CYNODON (p. 501).
	Glumæ valvulae adpressæ, spiculæ geminatæ.....	DIGITARIA (p. 501).
752.	{ Panicula laxa.....	749
	Panicula spiciformis.....	753
753.	{ Glumæ valvulae apice retusæ.....	PHLEUM (p. 508).
	Glumæ valvulae non retusæ.....	754
754.	{ Perigonii valvæ concavæ glumâ minores.....	PHALARIS (p. 507).
	Perigonii valvæ lanceolatae glumâ longiores.....	CRYPTIS. (p. 509).
755.	{ Perigonium basi villis glumellas superantibus cinctum.	ARUNDO (p. 520).
	Perigonium basi glabrum aut pubescens.....	756
756.	{ Perigonium aristatum.....	757
	Perigonium muticum.....	764
757.	{ Arista dorsalis aut basilaris.....	758
	Arista terminalis.....	759
758.	{ Arista basilaris	AIRA (p. 511 supp. 1035).
	Arista dorsalis.....	AVENA (p. 511).
	Arista sub apice nascens.....	BROMUS (p. 515).
759.	{ Arista ex imâ fissurâ valvulae perigonii exterioris nascens.....	
	Arista in fissurâ non nascens.....	DANTHONIA (p. 514).
760.	{ Arista sub apice nascens.....	BROMUS (p. 515).
	Arista verè terminalis.....	761
761.	{ Spiculae omnes fertiles 3-20-flora.....	62
	Spiculae 2-3-flora, aliæ steriles ternæ pendulæ, aliæ fertiles germinatae.....	LAMARCKIA (p. 510).

CLAVIS ANALYTICA.

xxxij

762.	{ Glumæ valvulæ concavæ aut parùm carinatæ, panicula laxa aut coarcata rariùs spiciformis.....	FESTUCA (p. 517 supp. 1035).
	Glumæ valvulæ valdè carinatæ; panicula glomerata aut spiciformis...	763
763.	{ Perigonii valvæ duo carinatæ; panicula glomerata... DACTYLIS (p. 521). Perigonii valva exterior carinata internam angustam amplexans; panicula spiciformis.....	KOELREUTIA (p. 521).
764.	{ Bractea foliacea lacera ad basin spiculæ, CYNOSURUS (p. 526 supp. 1035); Bractea foliacea nulla.....	765
765.	{ Gluma 1-2-flora fertiles includens, valvis valdè scariosis.....	MELICA (p. 510).
	Gluma flores 2-oo-fertiles includens, valvis parùm scariosis.....	766
766.	{ Gluma 2-flora..... Gluma 3-oo-flora.....	767 768
767.	{ Glumæ valvæ concavæ..... Glumæ valvæ carinatæ.....	AIROPSIS (p. 510). 768
768.	{ Perigonii valvulæ ventricosæ cordatæ..... Perigonii valvulæ nec ventricosæ nec cordatæ.....	BRIZA (p. 525). 769
769.	{ Glumellæ valvulæ obtusæ aut acutæ..... Glumellæ valvulæ acuminatæ aut aristatæ.....	POA (p. 522 supp. p. 1035). 762
770.	{ Spiculæ sessiles, rachis non excavata..... Spiculæ in rachi excavatâ basi semi-immersi.....	771 780
771.	{ Spiculæ unifloræ..... Spiculæ 2-oo-floræ.....	772 777
772.	{ Stigmata 2..... Stigma 1.....	773 NARDUS (p. 527).
773.	{ Glumæ valvula externa muricata..... Gluma non muricata.....	TRAGUS (p. 500). 774
774.	{ Gluma mutica..... Gluma aristata.....	775 776
775.	{ Perigonium minimum urceolatum margine lacerum..... Perigonium integerrimum.....	CHAMAGROSTIS (p. 527). 751
776.	{ Gluma 2-aristata..... Gluma 1-aristata.....	PHELEUM (p. 508). TRACHYNOTIA (p. 527).
777.	{ Bractea foliacea lacera ad basin spiculæ, CYNOSURUS (p. 526 supp. 1035). Bractea nulla.....	779 778
778.	{ Perigonii valvula exterior laciniata acuta aut aristata..... Perigonii valvula exterior integra, arista dorsalis.....	AVENA (p. 511).
779.	{ Perigonii valvula exterior 4-5-fida..... Perigonii valvula exterior trifida.....	ECHINARIA (p. 526). SESLERIA (p. 526).
780.	{ Spiculæ in quoque racheos dente solitariæ..... Spiculæ 2-3 in quoque racheos dente.....	781 786
781.	{ Glumæ valvula exterior 3-5-aristata..... Glumæ valvula exterior mutica aut uniaristata.....	ÆGYLOPS (p. 528). 782
782.	{ Spiculæ 3-oo-floræ..... Spiculæ 1-2-floræ.....	783 784
783.	{ Spiculæ rachi parallelæ..... Spiculæ rachi oppositæ.....	LOLIMUM (p. 531). TRITICUM (p. 528 supp. p. 1036).

XXXIV. ORDINUM GENERUMQUE

- | | |
|------|---|
| 784. | <i>{ Gluma valvula latæ naviculares dentatae. Triticum (p. 528 supp. p. 1036).</i>
<i>{ Gluma valvula non naviculares nec dentatae..... 785</i> |
| 785. | <i>{ Perigonium muticum..... ROTTBOLLA (p. 527).</i>
<i>{ Perigonium aristatum..... SECALIS (p. 530).</i> |
| 786. | <i>{ Spiculæ 1-floræ..... HORDEUM (p. 531).</i>
<i>{ Spiculæ 2-4-floræ..... ELYMUS (p. 531).</i>
<i>Spiculæ masculæ feminineæ et hermaphroditæ in eadem inflores-</i>
<i>centia intermixtae..... 788</i> |
| 787. | <i>Spiculæ masculæ paniculatæ terminales, feminineæ spicatæ late-</i>
<i>rales..... MAYS (p. 499).</i> |
| 788. | <i>Folia latissima..... HOLCUS (p. 499).</i>
<i>Folia angusta..... 789</i> |
| 789. | <i>Spiculæ geminæ rarius ternæ, gluma basi extus pilosa.....</i>
<i>..... ANDROPOGON (p. 499).</i>
<i>Spiculæ ternæ, gluma basi glabra..... HORDEUM (p. 531).</i> |

COMPOSITÆ.

- | | |
|------|--|
| 790. | <i>Flores in unoquoque capitulo biformes centrales tubulosi periphe-</i>
<i>rici ligulati in radios dispositi..... 791</i>
<i>Flores in unoquoque capitulo uniformes seu tubulosi seu ligulati.... 816</i> |
| 791. | <i>Semina papposa..... 792</i>
<i>Semina nuda aut cristata..... 804</i> |
| 792. | <i>Involucrum spinosum..... ATRACTYLIS (p. 293).</i>
<i>Involucrum non spinosum..... 793</i> |
| 793. | <i>Folia opposita..... 794</i>
<i>Folia alterna aut radicalia..... 795</i> |
| 794. | <i>Flosculi omnes tubulosi..... EUPATORIUM (p. 259 supp. p. 1030).</i>
<i>Flores radiati..... ARNICA MONTANA (p. 264).</i> |
| 795. | <i>Flores ligulati à tubulosis discolores..... 796</i>
<i>Flores ligulati cum tubulosis concolores..... 799</i> |
| 796. | <i>Involucrum imbricatum..... 797</i>
<i>Involucrum uniseriatum..... 798</i> |
| 797. | <i>Ligulæ graciles lineares angustissimæ..... ERIGERON (p. 265).</i>
<i>Ligulæ latiusculæ oblongæ..... ASTER (p. 264 supp. p. 1030).</i> |
| 798. | <i>Involuci squamæ acutæ..... BELLIDIASTRUM (p. 266).</i>
<i>Involuci squamæ spatulatae..... BELLUM (p. 266).</i> |
| 799. | <i>Involuci squamæ unicæ aut dupli serie dispositæ..... 800</i>
<i>Involuci squamæ imbricatae..... 803</i> |
| 800. | <i>Involucrum simplex..... 801</i>
<i>Involucrum calyculatum..... SENEPIO (p. 261).</i>
<i>Involuci squamæ dupli ordine dispositæ..... 802</i> |
| 801. | <i>Folia radicalia, scapus uniflorus..... TUSSILAGO FARFARA (p. 260).</i>
<i>Folia caulina, flores plus minus numerosi..... CINERARIA (p. 261).</i> |
| 802. | <i>Flosculorum semina pappo simplici coronata, ligularum nuda.....</i>
<i>..... DORONICUM (p. 263).</i>
<i>Semina omnia pappo coronata..... ARNICA (p. 264).</i> |
| 803. | <i>Ligulæ subquinæ..... SOLIDAGO (p. 265 supp. p. 1030).</i>
<i>Ligulæ 10-∞..... IKULA (p. 267).</i> |

CLAVIS ANALYTICA.

xxxv

804.	{ Folia alterna aut radicalia.....	805
	{ Folia opposita.....	813
805.	{ Receptaculum nudum.....	806
	{ Receptaculum paleaceum.....	810
806.	{ Semina omnia nuda aut membranâ coronata.....	807
	{ Flosculorum semina papposa.....	DORONICUM (p. 263).
807.	{ Semina membranacea irregularia curvata.....	CALENDULA (p. 280).
	{ Semina recta et regularia.....	808
808.	{ Involucrum simplex ; caulis nudus aut vix foliosus....	BELLIS (p. 266).
	{ Involuerum imbricatum ; caules foliosi.....	809
809.	{ Involuci squamæ margine scariosæ.....	CHRYSANTHEMUM (p. 271).
	{ Involuci squamæ non scariosæ.....	MATRICARIA (p. 273).
810.	{ Receptaculum planum.....	811
	{ Receptaculum conicum.....	812
811.	{ Involucrum ovatum squamis brevibus adpressis....	ACHILLEA (p. 274).
	{ Involucrum patens squamis bracteiformibus aut linear-lanceolatis.....	BUPHTHALMUM (p. 271).
812.	{ Semina cylindrica aut trigona non marginata.....	ANTHEMIS (p. 273).
	{ Semina compressa margine membranacea.....	ANACYCLUS (p. 274).
813.	{ Folia integra aut lobata.....	814
	{ Folia pinnato-multifida.....	TAGETES (p. 280).
814.	{ Semina margine membranaceo coronata.....	BUPHTHALMUM (p. 271).
	{ Semina aristis 2-5 coronata.....	815
815.	{ Receptaculum latum ; aristæ molles et caducæ...	HELIANTHUS (p. 280).
	{ Receptaculum angustum ; aristæ rigidæ et persistentes.....	BIDENS (p. 280 supp. 1031).
816.	{ Flosculi omnes tubulosi.....	817
	{ Flosculi omnes ligulati.....	860
817.	{ Capitula monoica ; florum fem. perigonum nullum , involucrum 1-phylum.....	818
	{ Capitula hermaphrodita ; flores omnes perigonio instructi ; involucrum polyphylum.....	819
818.	{ Folia bipinnata.....	AMBROSIA (p. 279).
	{ Folia lobata aut dentata.....	XANTHIUM (p. 279).
819.	{ Semina pappo piloso plumosove coronata.....	820
	{ Semina nuda aut pappo membranaceo aut aristato coronata.....	846
820.	{ Pappus pilosus ciliatusve.....	821
	{ Pappus ramosus plumosusve.....	838
821.	{ Receptaculum squamosum paleaceumve ; folia sæpè spinosa.....	822
	{ Receptaculum omnino nudum ; folia nunquam spinosa.....	831
822.	{ Receptaculum favosum.....	823
	{ Receptaculum longè paleaceum.....	824
823.	{ Semina lœvia.....	ARCTIUM (p. 282).
	{ Semina transversè sulcata.....	ONOPORDUM (p. 282).
824.	{ Flosculi disci hermaphroditæ, radii neutri majores.....	825
	{ Flosculi omnes hermaphroditæ æquales.....	826
825.	{ Involuci squamæ extérieores foliaceæ pinnatifidæ.....	
	{	KENTROPHYLLUM (p. 292).
	{ Involuci squamæ non pinnatifidæ.....	CENTAUREA (p. 289).
826.	{ Involuci squamæ apice hamatæ.....	LAPPA (p. 282).
	{ Involuci squamæ non hamatæ.....	827

xxxvij ORDINUM GENERUMQUE

827.	Involuci squamæ spicæ appendiculatæ, folia albo maculata.....	827
	Involuci squamæ non appendiculatæ, folia non albo maculata.....	SILYBUM (p. 283).
828.	Involucrum foliaceum.....	CARDUNCELLUS (p. 281 supp. p. 1031).
	Involucrum non foliaceum.....	829
829.	Involuci squamæ apice spinosæ.....	CARDUUS (p. 283 supp. 1031).
	Involuci squamæ apice non spinosæ.....	830
830.	Involuci squamæ acutæ.....	SERRATULA (p. 284).
	Involuci squamæ scariosæ rotundatæ.....	RHAPONTICUM (p. 289).
831.	Involucrum simplex aut calyculatum.....	832
	Involucrum imbricatum.....	834
832.	Involucrum omnino simplex.....	TUSSILAGO (p. 260).
	Involucrum calyculatum vel subcalyculatum.....	833
833.	Flores lutei vel ochroleuci.....	SENECIO (p. 261).
	Flores nec lutei nec ochroleuci.....	CACALIA (p. 260).
834.	Flosculi omnes hermaphroditi.....	835
	Flosculi allii hermaphroditi alii feminini aut steriles.....	837
835.	Involuci squamæ albæ aut flavæ....	ELYCHRYSUM (p. 270 supp. 1030).
	Involuci squamæ virides.....	836
836.	Flores lutei.....	CHRYSOCOMA (p. 264).
	Flores non lutei.....	EUPATORIUM (p. 259 supp. p. 1030).
837.	Flosculi exteriores 3-dentati.....	CONYZA (p. 267).
	Flosculi exteriores 5-dentati.....	GNAPHALIUM (p. 268 supp. 1030).
838.	Receptaculum nudum.....	ELYCHRYSUM (p. 270 supp. 1030).
	Receptaculum paleaceum.....	839
839.	Pappus ramosus.....	STÆHELINA (p. 293).
	Pappus plumosus.....	840
840.	Involuci squamæ intimæ multò longiores coloratæ radium men- tientes.....	CARLINA (p. 293).
	Inv. squamæ intimæ nec longiores nec radium mentientes.....	841
841.	Involucrum ovatum cinctum foliis longioribus pinnatifido - spinosis.	ATRACTYLIS (p. 293).
	Involucrum non bracteatum aut foliis non pinnatifido - spinosis cinctum.....	842
842.	Flosculi disci hermaphroditi, marginis neutri majores.....	GALACTITES (p. 289).
	Flosculi omnes hermaphroditi et æquales.....	843
843.	Pappus duplicitis ordinis, externi brevis, interni longus plumbosus.	SAUSSUREA (p. 285).
	Pappus simplex.....	844
844.	Receptaculum magnum valde carnosum.....	CYNARA (p. 288).
	Receptaculum vix aut non carnosum.....	845
845.	Involuci squamæ scariosæ lucidæ.....	LEUZEA (p. 288).
	Involuci squamæ nec scariosæ nec lucidæ.....	CIRSIUM (p. 285).
846.	Semina disci aut omnia nuda aut pappo membranaceo coronata.....	848
	Semina disci aut omnia aristis 2-5 coronata.....	847
847.	Involuci squamæ interiores longiores coloratæ radium æmulantes.	XERANTHEMUM (p. 294).
	Involuci squamæ exteriores longiores patulæ.	BIDENS (p. 280 supp. 1031).
848.	Involucrum spinosum.....	849
	Involucrum nec minimè spinosum.....	850

CLAVIS ANALYTICA.

xxxvi

849.	{ Flores luteo-aurantiaci.....	CARTHAMUS (p. 281).
	Flores albi aut cærulescentes.....	ECRINOPS (p. 281).
850.	{ Receptaculum paleaceum.....	851
	Receptaculum pilosum aut nudum.....	856
851.	{ Semina pappo membranaceo obliquè truncato coronata. LONAS (p. 278).	
	Semina omnino nuda.....	852
852.	{ Flosculi medio coarctati basi dilatati in appendices 2 ovarium cingentes.....	DIOTIS (p. 278).
	Flosculi basi non appendiculati.....	853
853.	{ Semina margine membranacea.....	ANACYCLUS (p. 274).
	Semina margine non membranacea.....	854
854.	{ Flosculi omnes hermaphroditæ.....	SANTOLINA (p. 278).
	Flosculi in disco steriles; receptaculum in radio tantum paleaceum...	855
855.	{ Flosculi disci 4-fidi.....	FILAGO (p. 270).
	Flosculi disci 5-dentati.....	MICROPUS (p. 270).
856.	{ Semina membranæ coronata.....	857
	Semina omnino nuda.....	858
857.	{ Flosculi omnes 5-dentati.....	BALSAMITA (p. 279).
	Flosculi centri 5 lobi, radii 3-lobi. TANACETUM (p. 278 suppl. p. 1030).	
858.	{ Flosculi disci 4-dentati.....	COTULA (p. 278).
	Flosculi disci 5-lobi aut 5-dentati.....	859
859.	{ Involueri squamæ exteriores magnæ patulae.....	CARPESIUM (p. 271).
	Invol. squamæ parvæ dense imbricatae.....	ARTEMISIA (p. 276).
860.	{ Semina papposa.....	863
	Semina omnino nuda.....	864
861.	{ Involucrum spinosum.....	SCOLYMUS (p. 294).
	Involucrum non spinosum.....	862
862.	{ Semina matura persistens involucro cincta.....	RHAGADIOCUS (p. 298).
	Semina matura caduca involucro minimè cincta.... LAMPSANA (p. 297).	
863.	{ Pappus squamosus.....	864
	Pappus pilosus plumbosusve.....	866
864.	{ Plantæ spinosæ.....	SCOLYMUS (p. 294).
	Plantæ non spinosæ.....	865
865.	{ Receptaculum paleaceum.....	CATANANCHE (p. 309).
	Receptaculum nudum vel subpilosum.....	CICHORIUM (p. 310).
866.	{ Pappus pilosus.....	867
	Pappus plumosus.....	883
867.	{ Pappus sessilis.....	868
	Pappus stipitatus.....	877
868.	{ Involucrum calyculatum.....	869
	Involucrum imbricatum non calyculatum	872
869.	{ Seminum disci pappus pilosus, radii squamatus.....	HYOSKARIS (p. 309).
	Seminum omnium pappus pilosus.....	870
870.	{ Involucrum demum coriaceum pappus brevissimus. ZACINTHA (p. 298).	
	Involucrum non coriaceum; pappus semen longitudine æquans aut superans.....	871
871.	{ Fructus elongatus; involucrum laxum; pappus niveus.. CREPIS (p. 299).	
	Fructus non elongatus; involucrum non laxum; pappus albus.....	
	PRENANTHES (p. 297).	

xxxvij ORDINUM GENERUMQUE

872.	{ Receptaculum favosum.....	DREpania (p. 305).
	Receptaculum non favosum.....	873
873.	{ Receptaculum pilosum.....	874
	Recept. omnino nudum.....	875
874.	{ Recept. pilis semina superantibus onustum.....	ANDRYALA (p. 305).
	Recept. pilis sparsis semine brevioribus.....	HIERACIUM (p. 301).
875.	{ Involucrum basi nec tumidum nec ovatum; pappus rigidus s ^æ pē rufescens.....	HIERACIUM (p. 301).
	Involucrum basi tumidum aut ovatum; pappus mollis nonquam rufes- cen	876
876.	{ Involuci squamæ margine membranaceæ.....	PICARDIUM (p. 295).
	Inv. squamæ non membranaceæ.....	SONCHUS (p. 295).
877.	{ Receptaculum paleaceum.....	878
	Recept. nudum.....	879
878.	{ Semina marginalia nuda.....	PTEROTHECA (p. 299).
	Semina radii 6-aristata.....	GEROPOGON (p. 306).
879.	{ Involucrum squamis 7-8 basi calyculatum.....	880
	Involuci squamæ numerosæ imbricatæ.....	881
880.	{ Caulis foliosus.....	CHONDRILLA (p. 296).
	Scapi uniflori.....	TARAXACUM (p. 300).
881.	{ Inv. squamæ margine membranaceæ; flores lutei aut cærulei.....	LACTUCA (p. 296).
	Inv. squamæ non membranaceæ, flores semper lutei.....	882
882.	{ Involucrum duplex; scapi uniflori.....	TARAXACUM (p. 300).
	Invol. calyculatum, caulis s ^æ pissimè foliosus,....	BARKHAUSIA (p. 298).
883.	{ Pappus distinctè stipitatus.....	884
	Pappus sessilis.....	890
884.	{ Involuci sqnamæ exteriore 5 foliacæ laxæ.....	HELMINTHIA (p. 300).
	Invol. sq. exteriore non foliacæ.....	885
885.	{ Receptaculum nudum.....	886
	Receptaculum paleaceum.....	888
886.	{ Involucrum imbricatum.....	SCORZONERA (p. 308).
	Involucrum simplex 8-10-phylum.....	887
887.	{ Semina transversè sulcata.....	UROSPERMUM (p. 295).
	Semina longitudinaliter striata.....	TRAGOPOGON (p. 306).
888.	{ Involucrum imbricatum.....	HYPOCHORRIS (p. 306).
	Inv. simplex.....	889
889.	{ Semina radii pappo nullo.....	SERIOLA (p. 306).
	Semina radii 6-aristata.....	GEROPOGON (p. 306).
890.	{ Receptaculum nudum.....	891
	Recept. favosum tuberosum paleaceumve.....	892
891.	{ Involucrum imbricatum squamis margine membranaceis.....	SCORZONERA (p. 308).
	Invol. calyculatum, squamis non membranaceis.....	PICRIS (p. 300).
892.	{ Semina pedicellata.....	PODOSPERMUM (p. 308).
	Semina non pedicellata.....	893
893.	{ Receptaculum paleaceum.....	894
	Receptaculum favosum.....	895

CLAVIS ANALYTICA.

xxxix

- | |
|---|
| 894. { Involucrum simplex.....
<i>Rosmaria</i> (p. 305).
Inv. imbricatum.....
<i>Hydrostachys</i> (p. 306). |
| 895. { Semina disci pappo plumoso, radii abortivo donata..
<i>Turbinaria</i> (p. 307).
Semina omnia pappo donata.....
<i>Liontodon</i> (p. 307). |

CRYPTOGAMÆ.

896. { Plantæ foliis caule radicibusque donatæ..... Plantæ homogeneæ frondosæ crustaceæ filamentosæ, etc., in quibus nec caules nec folia distincta apparent..... 897 975
897. { Folia juniora à basi ad apicem circinnato-convoluta..... Folia non convoluta..... 898 916
898. { Fructificationes in facie inferiore frondis sitæ aut terminales spicatæ..... Fructificationes radicales..... FILICES. 899 915
899. { Fruetus in dorso folii digesti..... Fructus in spicam racemumve dispositi..... 900 913
900. { Fructus indusio tecti..... Fructus nudi, indusio nullo..... 901 911
901. { Capsulæ ad marginem frondis sitæ..... Capsulæ in superficie folii varie dispositæ..... 902 904
902. { Indusia 2-valvia..... <i>HYMENOPHYLLUM</i> (p. 541). Indusia 1-valvia..... 903
903. { Capsulæ in lineam continuam marginalem dispositæ... <i>PTERIS</i> (p. 540). Capsulæ in puncta discreta seu lineolas distributæ, <i>ADIANTHUM</i> (p. 541).
904. { Capsulæ in lineolas dispositæ..... Capsulæ in puncta subrotunda ovatave digestæ..... 905 908
905. { Capsularum lineolæ costæ frondis parallelæ..... <i>BLECHNUM</i> (p. 540). Capsularum lineolæ obliquæ aut costæ perpendiculares..... 906
906. { Lineolæ longæ geminæ interveniæ..... <i>SCOLOPENDRUM</i> (p. 540). Lineolæ breves transversæ sparsæ..... 907
907. { Capsularum sori oblongi linearesve..... <i>ASPLENIUM</i> (p. 539). Sori ovati..... <i>ATHYRIUM</i> (p. 539).
908. { Indusium calyciforme apertum margine crinitum... <i>WOODSIA</i> (p. 538). Indusium nec calyciforme nec crinitum..... 909
909. { Indusium umbilicatum nempe centro adfixum et margine totum dehis- cens..... <i>POLYSTICHUM</i> (p. 538). Indusium margine adfixum..... 910
910. { Indusium ex uno latere adfixum et longitudinaliter ex altero dehis- cens..... <i>ATHYRIUM</i> (p. 539). Indusium ab apice ad basin utrinque dehiscens.... <i>Asplenium</i> (p. 539).
911. { Capsulæ squamis scarioso-fuscis obtectæ..... <i>CETERACH</i> (p. 537). Capsulæ squamis non obtectæ..... 912
912. { Capsulæ in accervos oblongos sublineares sparsæ... <i>GRAMMITIS</i> (p. 537). Capsulæ in puncta rotunda sparsa aggregate... <i>POLYTRODIUM</i> (p. 537).
913. { Frons integra..... <i>Oreoglossum</i> (p. 536). Frons pinnata bipinnatæ..... 914

ORDINUM GENERUMQUE

914.	{ Capsulæ sessiles opaca.....	BOTRYCHIUM (p. 536).
	Capsulæ pedicellatae pellucidae.....	OSMUNDA (p. 536).
915.	{ Folia quadrifoliolata.....	MARSILIA (p. 543).
	Folia filiformia.....	PILULARIA (p. 542).
916.	{ Plantæ ramis verticillatis.....	917
	Plantæ non ramosæ aut ramis non verticillatis.....	918
917.	{ Articuli vagina 1-phyllo cincti.....	EQUISETACEÆ (p. 534).
	Articuli non vaginati.....	CHABACEÆ (p. 533).
918.	{ Plantæ natantes folijs ovato-subcordatis.....	SALVINTA (p. 542).
	Plantæ folijs nullis aut nunquam ovato-subcordatis.....	919
919.	{ Fructificationes sessiles crustaceæ.....	921
	Fructificationes pedicellatae nec crustaceæ.....	920
921.	{ Frondes foliiformes.....	922
	Frondes expansæ.....	923
922.	{ Capsulæ indehiscentes; folia radicalia subulata.....	Isoetes (p. 543).
	Capsulæ dehiscentes; folia caulinæ numerosa nunquam subulata.....	Lycorodium (p. 543 supp. p. 1036).
923.	{ Capsulæ in valvulas dehiscentes.....	924
	Capsulæ indehiscentes.....	927
924.	{ Capsula 4-8-valvis.....	923
	Capsula 2-valvis.....	926
925.	{ Capsulæ solitariæ.....	JUNGERMANNIA (p. 584 supp. p. 1039).
	Capsulæ aggregatæ.....	MARCHANTIA (p. 591).
926.	{ Capsula longissima subulata.....	ANTHOCEROS (p. 591).
	Capsula globosa.....	TARGIONIA (p. 592).
927.	{ Capsulæ 2-5 calypræ membranaceæ indehiscenti obvolutæ.....	
	Capsula non calyprata.....	928
928.	{ Capsulæ intræ calycem 1-valvum inclusa.....	SPHEROCARPOS (p. 592).
	Capsula intræ frondem nidulans.....	RICCIJA (p. 592).
929.	{ Fructificationes solitariæ.....	931
	Fructificationes aggregatæ.....	MARCHANTIA (p. 591).
930.	{ Capsulæ operculo et calypræ destitutæ.....	
	Capsulæ calypræ et operculo deciduis aut persistentibus instructæ.....	MUSCI. 932
931.	{ Peristoma duplex.....	933
	Peristoma simplex.....	946
	Peristoma nullum.....	969
932.	{ Seta terminalis.....	934
	Seta lateralis.....	942
933.	{ Peristoma interius membrana.....	935
	Perist. interius cilia aut dentes.....	937
934.	{ Calyptra mitræformis.....	BUXbaumia (p. 578).
	Calyptra dimidiata.....	936
935.	{ Peristomatis externi dentes 32-aut 64 incurvi..	POLYTRICHUM (p. 546).
	Perist. ext. dentes 16 erecti.....	PTCHOSTOMUM (p. 549).
936.	{ Calyptra mitræformis.....	938
	Calyptra dimidiata.....	939

CLAVIS ANALYTICA.

xli

938.	Capsula pyriformis; calyptra basi ventricoso-tetragona semper glabra	
 Capsula non pyriformis; calyptra non ventricosa sèpè pilosa	FUNARIA (p. 348).
939.	Peristomatis interni cilia 8	ZYGODON (p. 548).
	Perist. interni cilia 16-64	940.
940.	Peristoma internum è ciliis 64 spicibus 2-vel 4 connexis dentes exteriores oppositos efformantibus	TRIMMIA (p. 552).
	Peristoma internum è dentibus 16 integris aut bifidis cum dentibus peristom. externi alternis	941.
941.	Capsula subglobosa	BARTHRAMIA (p. 547).
 Capsula pyriformis obovata aut subcylindrica	BAYUM (p. 549 supp. p. 1036).
942.	Calyptra mitriformis	943.
	Calyptra dimidiata	945.
943.	Capsula subsessilis perichaetio subocculta	FONTINALIS (p. 553).
 Capsula perichaetio non occulta	944.
944.	Capsula seta perichaetio immersa	DALTONIA (p. 553).
 Capsula seta exserta	HOOKERIA (p. 554.).
945.	Perist. exter. dentibus 16 erectis internis alternantibus; interius ciliis. 16	NECKERIA (p. 533 supp. p. 1036).
	Perist. ext. dentibus 16; interius membrana in 16 segmenta aequalia divisa	HYPNUM (p. 554 supp. p. 1036).
946.	Calyptra dimidiata	947.
	Calyptra mitriformis	958.
947.	Peristomatis dentes spiraliter torti	TORTULA (p. 563 supp. p. 1037).
	Perist. dentes non spiraliter torti	948.
948.	Dentes 32	949.
	Dentes 16	952.
949.	Seta lateralis	950.
	Seta terminalis	951.
950.	Dentes 32 angusti per paria basi coaliti	LEUCODON (p. 562).
	Dentes 16 bifidi aequidistantes	DICRANUM (p. 567 supp. p. 1037).
951.	Dentes per paria approximati	DIDYMODON (p. 566 supp. p. 1037).
	Dentes bifidi aequidistantes	DICRANUM (p. 567 supp. p. 1037).
952.	Dentes in conum persistentem conniventes	CONOSTOMUM (p. 547).
	Dentes in conum persistentem non conniventes	953.
953.	Peristomatis dentes coriacei introrsum flexi	FAERONIA (p. 563).
	Dentes nec coriacei nec introrsum flexi	954.
954.	Dentes per paria approximati	DIDYMODON (p. 566 supp. p. 1037).
	Dentes aequidistantes	955.
955.	Dentes bifidi	DICRANUM (p. 567 supp. p. 1037).
	Dentes integri	956.
956.	Seta lateralis	PTERIGYMANDRUM (p. 563).
	Seta terminalis	957.
957.	Dentes perforati	TRIMATODEM (p. 570).
	Dentes imperforati	WILSSIA (p. 570).
958.	Peristoma, membrana conoidea truncata plicata	DIPHYSCIUM (p. 578).
	Peristoma, cilia aut dentes	959.

xlij ORDINUM GENERUMQUE

959.	{ Dentes 3.....	960
	Dentes 4-16 integri aut bifidi.....	962
960.	{ Dentes filiformes contorti.....	CINCLIDOTUS (p. 573).
	Dentes non contorti.....	961
961.	{ Columella apice dilatata.....	SPLACHNUM (p. 578).
	Columella apice non dilatata.....	TREMATODON (p. 573).
962.	{ Dentes apice bifidi.....	963
	Dentes apice integri.....	964
963.	{ Capsula apophysata.....	DISSODON (p. 578).
	Capsula non apophysata.....	THESANOMITRION (p. 573).
964.	{ Calyptra magna extinctoriiformis capsulam maturam involvens.....	ENCALEPTA (p. 572).
	Calyptra non extinctoriiformis.....	965
965.	{ Dentes 4.....	TETRAPHIS (p. 577).
	Dentes 8-16.....	966
966.	{ Theca apophysata.....	SPLACHNUM (p. 578).
	Theca non apophysata.....	967
967.	{ Dentes 8 trilineati vel 16 unilineati. ORTHOTRICHUM (p. 576 supp. p. 1038).	
	Dentes 16 non lineati.....	968
968.	{ Dentes subulati basi divisi.....	TRICHOSTOMUM (p. 573).
	Dentes pyramidatè integri aut perforati.....	GRIMMIA (p. 574).
969.	{ Operculum deciduum.....	970
	Operculum persistens.....	973
970.	{ Calyptra irregulariter fissa nunc capsulae basi adnata nunc transversim dehiscens.....	SPHAGNUM (p. 581).
	Calyptra mitræformis aut dimidiata.....	971
971.	{ Seta lateralis.....	HEDWIGIA (p. 579).
	Seta terminalis.....	972
972.	{ Calyptra mitræformis.....	ANICTANGIUM (p. 579 supp. p. 1038).
	Calyptra dimidiata.....	GYNOSTOMUM (p. 579).
973.	{ Seta sob capsula in discum infundibuliformem dilatata..	VOITIA (p. 582).
	Seta non dilatata.....	974
974.	{ Capsula ovata aut subglobosa.....	PHASCUM (p. 582 supp. p. 1038).
	Capsula 4-valvis.....	ANDREA (p. 583).
975.	{ Thallus verus (id est frons aut crista plus minus expansa) nullus...	1017
	Thallus, seu crista plus minusve expansa aut frons quæ foliacea aut filamentosa.....	976
976.	{ Thallus frondosus aut filamentosus.....	977
	Thallus crustaceus.....	LICHENES. 979
977.	{ Fructus vix conspicui aut interni nunquam verè scutati, plantæ ferè semper aquaticæ.....	ALGÆ. 1202
	Fructus scutati vel capsulares; plantæ rariùs aquaticæ.....	978
978.	{ Fructus scutati.....	LICHENES. 979
	Fructus capsulares aut pileiformes.....	HEPATICÆ. 923
979.	{ Thallus frondosus.....	980
	Thallus crustaceo-foliaceus squamosus crustaceus vel pulverulentus..	998

CLAVIS ANALYTICA.

xliij

980.	{ Thallus in expansiones foliiformes applicatas dilatatus.....	981
	Thallus in expansiones cauliformes teretinsculosa dilatatus.....	990
981.	Receptacula sphæroidea thallo immersa, ostiolo protuberante.....	
 Endocarpum (p. 593).	
	Receptacula sessilia aut pedicellata.....	982
982.	{ Receptacula adultiora plicata.....	Umbilicaria (p. 595).
	Receptacula non plicata.....	983
983.	{ Thallus gelatinosus exsiccatione cartilagineus.....	
 Collema (p. 607 supp. p. 1040).	
	Thallus non gelatinosus.....	984
984.	{ Thallus podetiis fertilibus sterilibusque instructus..	Cenomyce (p. 619).
	Thallus podetiis non instructus.....	985
985.	{ Receptacula thallo tota superficie adnata.....	986
	Receptacula subtus libera aut sublibera.....	987
	Receptacula depressa aut applanata; thallus membranaceus.....	
986. Peltigera (p. 596).	
	Recept. demum convexa aut globosa; thallus subsuberosus.....	
 Pannaria (p. 606).	
987.	{ Receptacula tota à thallo formatâ.....	Ramalina (p. 613).
	Receptacula subtus tantum à thallo formatâ, lamina proligera margin'e thallode cincta.....	988
988.	{ Thallus ramoso-laciñatus, laciñis liberis erectis ascendentibusve.....	Physcia (p. 611).
	Thallus lobatus vel multifido-laciñatus plâno expansus.....	989
989.	{ Thallus subtus cyphellis sorediisve intra tomentum instructus,	
 Sticta (p. 599.).	
	Thallus subtus glaber aut fibrillosus...	Parmelia (p. 601 supp. p. 1039).
990.	{ Thallus ramoso-laciñatus	991
	Thallus fruticulosus ramosus aut podetiis instructus.....	992
991.	{ Apothecia pedicellato-subpeltata.....	Ramalina (p. 613).
	Apothecia thallo innata.....	Roccella (p. 615).
992.	{ Thallus solidus.....	994
	Thallus (aut podetia) subfistulosus.....	993
993.	{ Thallus erectus; podetia nulla.....	Siphula (p. 619).
	Thallus nullus aut expansus; podetia erecta.....	Cenomyce (p. 619).
994.	{ Receptacula scutelliformia.....	995
	Receptacula hemisphærica subglobosiva.....	996
995.	{ Apothecia peltata immarginata.....	Usnea (p. 615).
	Apothecia sessilia aut obliquè peltata marginata. Cornicularia (p. 616).	
996.	{ Receptacula in thalli crustacei podetiis terminalia....	Isidium (p. 618).
	Receptacula in thalli fruticosi ramis terminalia.....	997
997.	{ Receptacula tota ex tñs à thallo formata.....	Sphaerophorus (p. 618).
	Receptacula subtus à thallo formata; lamina proligera tandem marginem obtegens.....	Stereocaulon. (p. 618).
998.	{ Receptacula podetiis incidentia.....	999
	Receptacula podetiis non incidentia.....	1001
999.	{ Receptacula carnosa rubescens.....	Bacomycetes (p. 635).
	Receptacula coriacea rarius rubescens.....	1000

xliv ORDINUM GENERUMQUE.

- | | | |
|-------|--|------------------------------------|
| 1000. | { Receptacula scyphuliformia vel pileolata..... | CALYCUM (p. 635). |
| | Receptacula demum subglobosa..... | ISIDIUM (p. 634). |
| 1001. | { Receptacula pulverulenta aut nulla..... | 1002 |
| | Receptacula membranacea aut coriacea..... | 1004 |
| 1002. | { Receptacula nulla..... | LEPRA (p. 676). |
| | Receptacula verticiformia aut pulvinata..... | 1003 |
| 1003. | { Receptacula verruciformia soredifera alba..... | VARIOLARIA (p. 674). |
| | Receptacula è corpusculis in pulvinulos difformes coloratos ag-
gregatis composita..... | CONIOCARPON (p. 675). |
| 1004. | { Thallus crustaceo-foliaceus squamosus aut ambitu effiguratus..... | 1005 |
| | Thallus crustaceus uniformis aut areolatus..... | 1008 |
| 1005. | { Receptacula thallo immersa..... | ENDOCARPOX (p. 593). |
| | Receptacula sessilia..... | 1006 |
| 1006. | { Receptacula à thallo discolora membranà coloratà undique ves-
tita..... | PSORA (p. 657). |
| | Lamina proligera discum efformans colorata, margine à thallo
formato et eidem concolori cincta..... | 1007 |
| 1007. | { Thallus expanso-lobatus, squamis sèpiùs imbricatis è centro ra-
diantibus suprà apothecia gerentibus constans.. | SQUAMARIA (p. 658). |
| | Thallus stellato-radiatus centro granulosus ambitu plicatus sub-
lobatus, apothecia in parte granulosa gerens... | PLACODIUM (p. 660). |
| 1008. | { Receptaculum punctiforme aut plus minus lineari-elongatum..... | 1009 |
| | Recept. tuberculatum aut rotundatum..... | 1010 |
| 1009. | { Receptacula longitudinaliter dehiscentiâ plerumque utrinquè
marginata..... | OPEGRAPHA (p. 639). |
| | Recept. punctiformia indehiscentia immarginata..... | STIGMATIDUM (p. 643). |
| 1010. | { Receptacula apice papillulâ vel ostiolo instructa..... | |
| | Recept. nec papillata nec ostiolata..... | 1011 |
| 1011. | { Receptacula scyphuliformia..... | CALYCUM (p. 636). |
| | Recept. scutelliformia..... | 1012 |
| 1012. | { Receptacula in verrucis inclusa..... | 1013 |
| | Receptacula sessilia aut immersa, sed non in verrucis inclusa..... | 1015 |
| 1013. | { Recept. plura in verrucâ è propriâ substantiâ albâ formatâ in-
clusa..... | CHIODECTON (p. 672 supp. p. 1040). |
| | Recept. plura aut singula in verrucis à thallo formatis inclusa..... | 1014 |
| 1014. | { Verrucæ immarginatae ostiolis pertusæ..... | PERTUSARIA (p. 672). |
| | Verrucæ apice apertæ marginatae..... | THELOTREMA (p. 673). |
| 1015. | { Lamina proligera in thalli substantiâ tota immersa et ab eo mar-
ginata..... | URCOLARIA (p. 670). |
| | Receptacula sessilia..... | 1016 |
| 1016. | { Receptac. membranâ cartilagineâ undique vestita, disco immar-
ginato aut margine concolore cincto. | PATELLARIA (p. 647 supp. p. 1040). |
| | Lamina proligera margine à thallo formato et eidem concolori
cincta..... | LEGANORA (p. 662). |
| 1017. | { Sporulæ aut sporidia in receptaculo coriaceo lignoso aut fibroso
primo inclusa..... | 1018 |
| | Sporulæ aut sporidia nuda aut receptaculo solido carnoso sub-
eroso gelatinosove imposta aut in receptaculo filamentoso in-
clusa... | 1076 |

CLAVIS ANALYTICA.

xlv

	Recept. coriacea aut lignosa contextu celluloso denso formata.	
1018.	{ Recept. fibrosa filamentis intertextis subhyssoides formata aut contigua compacta..... LYCOPERDACEÆ. 1037	HYPoxyLA. 1019
	Receptaculum primò clausum ostiolo aut rimâ longitudinali de- hiscens.....	1020
1019.	{ Recept. sæpius disco apertum rimis pluribus rumpens aut cir- cumscissum.....	1029
	Receptaculum indehiscens.....	1071
	Receptacula aut cellulæ solitariæ aut in tuberculis aggregatae	
1020.	{ ambitu uniformi.....	1022
	Cellulæ confertæ ambitu fibrillis subradiato.....	1021
	Fibrillæ steriles noduloso-exasperatae..... ACTINONEMA (p. 717).	
1021.	Fibrillæ cellulæ centro obiectæ..... DOTHIDEA (p. 713 supp. p. 1043).	
1022.	{ Receptacula ostiolo dehiscentia.....	1023
	Receptacula rimâ longitudinali dehiscentia.....	1027
1023.	{ Recept. propria solitaria aut stromate (v. p. 677.) juncta.....	1024
	Cellulæ plures vel solitariæ iu stromate immersæ absque recepta- culo proprio.....	1026
1024.	{ Receptacula singula apice ostiolo perforata.....	1025
	Receptacula cellularia cellulæ circinnantibus apice junctis ostiolo communi..... CYTISPORA (p. 724).	
	Receptacula solitaria aut stromate juncta ossea rotundata.....	
1025.	{ SPHÆRIA (p. 677 supp. p. 1040-1043).	
	Receptacula solitaria elongata subcylindrica grumosa.....	
	SPHÆRONEMA (p. 724).	
1026.	{ Cellulæ in stromate immersæ nucleo ex thecis (v. p. 677.) com- posito..... DOTHIDEA (p. 713 supp. p. 1043).	
	Nucleus grumosus in tuberculo à matrice formato eique innato inclusus, thecæ nullæ..... PHOMA (p. 727).	
1027.	{ Receptacula verticalia..... LOPHIUM (p. 717).	
	Receptacula horizontalia.....	1028.
	Nucleus linearis subpersistens thecas foveis.....	
1028.	{ HYSTERIUM (p. 718 supp. p. 1043).	
	Sporulæ ellipsoideæ vel fusiformes diaphanae massæ gelatinosæ immersæ..... LABRELLA (p. 726 supp. p. 1043).	
1029.	{ Receptaculum in tuberculo primò reconditum, demùm illo longius ei filamenta erumpentia proferens..... GRAPHIOLA (p. 727).	
	Recept. nunquam filamenta proferens.....	1030
1030.	{ Receptaculum demùm circumscissum.....	1031
	Rec. demùm in lacinias rimasve plures dehiscens.....	1033
1031.	{ Receptacula rotundata cupulæformia.. EUSTEGIA (p. 717 supp. p. 1043).	
	Recept. innata.....	1032
	Receptaculum maculæforme demùm totum à matrice secedens.....	
1032.	{ LEPTOSTROMA (p. 726).	
	Receptaculum scutiforme demùm sub formâ operculi membranacei radiato- fibroci secedens..... ACTINOTHYRUM (p. 726).	
1033.	{ Receptacula dehiscencia in lacinias plures.....	1034
	Receptacula sulcata aut in rimas transversales irregularesve dehiscen- tia.....	1035

xlvj ORDINUM GENERUMQUE

1034.	Nucleus disciformis subpersistens thecis farctus.....	PHACIDIUM (p. 721).
	Nucleus ater dissolutus; thecae nullæ.....	CRUTHOSPORA (p. 725).
1035.	Nucleus compositus submultilocularis carnosus thecis refertus.....	RHYTISMA (p. 723).
	Nucleus è sporulis fusiformibus compositus.....	1036
1036.	Receptaculum sessile demum rimis pluribus ruptum. PILIDIUM (p. 725).	
	Recept. scutiforme longitudinaliter sulcatum.. LEPTOTHYRUM (p. 726).	
1037.	Receptaculum intus filamentosum.....	1038
	Receptaculum intus non filamentosum.....	1063
1038.	Recept. figuræ determinatae distinctum sæpè pedicellatum.....	1039
	Recept. figuræ indeterminatae irregulare sessile fugax.....	1059
	Recept. crassum primò carnosò-molle, dein firmum suberosum coriaceumve persistens; majores.....	1040
1039.	Recept. tenue primò pulposum aut mucilaginosum, dein membranaceum, plus minus fugax; minores.....	1047
1040.	Recept. simplex.....	1042
	Recept. duplex.....	1043
1041.	Terrestres	1042
	Majoribus fungis (Agaricis) parasiticæ..... ASTEROPHORA (p. 855).	
	Recept. demum vertice rumpens includens peridiola numerosa.....	
1042. POLYSACCUM (p. 852).	
	Recept. irregulariter rumpens includens sporulas in glomerulos coacer-vatas	SCLERODERMA (p. 852).
1043.	Recept. exterioris discretum.....	1044
	Recept. exterioris adnatum squamosum furfuraceumve.....	1045
1044.	Recept. internum sessile aut stipitatum ostiolo unico. GEASTRUM (p. 853).	
	Recept. internum stipitibus pluribus sussultum apice osculis pluribus de-hiscens.....	MYRIOSTOMA (p. 853).
1045.	Receptaculum longè et distinctè stipitatum.....	TULOSTOMA (p. 855).
	Recept. sessile aut stipiti crasso abbreviato insidens.....	1046
1046.	Recept. exterioris cellulosum squamosè ruptum; sporulæ pedicellatæ.....	BOVISTA (p. 854).
	Recept. ext. furfuraceum verrucosumve; sporulæ agglomeratæ.....	Lycoperdon (p. 854).
1047.	Recept. duplex utrumque membranosè crustaceum. DIDIUM (p. 858).	
	Recept. simplex.....	1048
1048.	Fungi parvi in unguis et cornubus nascentes	ONYGENA (p. 856).
	Fungilli epiphyti.....	1049
1049.	Recept. dimidiatum aut totum evanescens; filamenta persistentia retien-latim connexa.....	1050
	Recept. ad apicem rumpens rarius circumscissum; filam. vaga non persis-tentia.....	1054
1050.	Recept. totum evanescens.....	1051
	Recept. in parte inferiori persistens.....	1052
1051.	Filamenta receptaculo globoso ignata.....	DICTYDUM (p. 856).
	Filamenta ex columellâ orto; receptaculum elongatam rarius globosum.	STEMONITIS (p. 857).
1052.	Filamenta receptaculo innata.....	CHIBBIA (p. 856).
	Filamenta è basi ascendentia.....	1053

1153. { Receptaculum subcylindricum circumseissum..... **ARCYRIA** (p. 857).
 Recept. globosum aut filiforme effusum apice irregulariter rumpens..... **TRICHLIA** (p. 859).
1054. { Recept. externè verrucosum, immaturum intùs pulposum.....
 Lycogala (p. 862).
 Recept. non verrucosum nec intùs pulposum..... 1055
1055. { Filamenta rara aut nulla..... **LICEA** (p. 861).
 Filamenta numerosa..... 1056
1056. { Recept. elliptica apice clausa et epiphragmate plano clausa.....
 CRATERIUM (p. 858).
 Recept. globosa aut irregularia irregulariter rumpentia..... 1057
1057. { Sporulae sparsæ..... **TRICHLIA** (p. 859).
 Sporulae agglomeratæ..... 1058
1058. { Recept. membranose crustaceum ad apicem rumpens.....
 LEARGIUM (p. 858).
 Recept. membranaceum demùm squamulatum fatiscens.....
 PHYSARUM (p. 860).
1059. { Recept. filiformia elongata..... 1060
 Recept. omnino disformia..... 1061
1060. { Sporulae sparsæ **TRICHLIA** (p. 859).
 Sporulae congestæ..... **LICEA** (p. 861).
1061. { Fungilli pelliculam tomentosam primò referentes.....
 TRICHODERMA (p. 864).
 Fungi primò pulposi molles dein in pulverem fatiscentes..... 1062
1062. { Sporulae filamentis basi adnatis ramosis intertextæ.....
 RETICULARIA (p. 862).
 Sporulae stratis membranaceis interseptæ..... **FULIGO** (p. 863).
 Sporulae in plicis peridiæ interioribus coacervatæ... **SPUMARIA** (p. 863).
1063. { Receptaculum distinctum rotundatum aut varium apice rumpens... 1064
 Recept. tuberculæ-aut-maculæforme indistinctum indehiscens..... 1065
1064. { Recept. peridiola solitaria vel plura sovens..... 1065
 Recept. contiguum cum internâ massâ persistente connatum..... 1069
1065. { Recept. rotundatum protrudens peridiolum solitarium..... 1066
 Recept. varium peridiola plura colligens..... 1067
1066. { Recept. simplex urceolato-ventricosum protrudens peridiolum vesicula-
 tum..... **THELEBOLUS** (p. 864 supp. p. 1049).
 Recept. duplex interius fugacissimum projiciens peridiolum solidum....
 **CARPOBOLUS** (p. 865).
1067. { Recept. demùm regulariter apertum intùs peridiola libera distincta colli-
 gens..... **CHATHUS** (p. 865).
 Recept. crassum clausum aut irregulariter dehiscens; peridiola vix dis-
 tincta..... 1068
1068. { Recept. radicatum; peridiola sessilia..... **RHIZOPEGON** (p. 866).
 Recept. arhizum; peridiola pedicellata..... **TUBA** (p. 866).
1069. { Recept. intùs subgelatinosum..... 1070
 Recept. intùs compactum aut subpulverulentum..... 1071
1070. { Fungilli nigri..... **CHETOMIUM** (p. 876).
 Fungilli colorati..... **ILLOSPIRIUM** (p. 876).
1071. { Recept. fibris crustaceo corticatis elongatis radiciformibus adnata.....
 **RHIZOMORPHA** (p. 867).
 Fibrae nullæ aut molles arachnoideæ..... 1072

xlvij ORDINUM GENERUMQUE

1072.	Recept. globulare liberum filamentis decumbentibus radiantibus impositum.....	Erysipex (p. 868).
	Recept. subrotundum aut irregulare liberum erumpens aut subadnatum, basi nudâ aut villoso-radiculatâ... .	SCLEROTIUM (p. 872 supp. p. 1049).
1073.	Recept. intus subgelatinosum.....	1070
	Recept. non gelatinosum.....	1074
1074.	Fungi subterranei.....	RHIZOCTONIA (p. 867).
	Fungi non subterranei.....	1075
1075.	Recept. subrotundum aut irregulare cartilagineo-carnosum liberum erumpens aut subadnatum.....	SCLEROTIUM (p. 872 supp. 1049).
	Substantia homogenea carnosa aut suberosa compacta innata.....	XYLOMA (p. 875).
1076.	Recept. carnosa suberosa spongiosa gelatinosave, obtecta hymenio (v. p. 728.) in quo collocata sunt sporulæ aut sporidia....	FUNGI. 1077
	Sporidia stromati solido vero aut spurio (v. p. 877.) imposita innatae, aut filamenta tubulosa vel apice capitata plus minus elongata....	1124
1077.	Fungi difformes membranacei vel gelatinosi molles, contextu filamentoso ; hymenium cum receptaculo confusum.....	1078
	Fungi formâ varii carnosí suberosive variùs volvacei ; hymenium distinctum limitatum.....	1085
	Fungi è volvâ apice rumpente elasticè pronascentes ; sporulæ nidulantes in strato mucoso heterogeneo nudo cum quo diffundunt.....	1123
1078.	Fungilli elongati subclavati perpendiculares....	ACROSERMUM (p. 729).
	Fungi non elongati nec clavati nec perpendiculares.....	1079
1079.	Recept. submembranaceum cupulatum pendulum....	CYPRELLA (p. 732).
	Recept. (saltem humidum) gelatinosum non cupulatum.....	1080
1080.	Recept. applanatum tenuissimum, siccum coriaceum.....	
	HYMENELLA (p. 728 supp. p. 1044).	
	Recept. turgidum sphäricum lobatum aut subauriforme.....	1081
1081.	Fungi minimi punctiformes compacti homogenei ceracei innato sessiles.	
	AGTRIUM (p. 728).	
	Fungi minores maioresve carnosò-gelatinosi mollesve sessiles aut stipitati.	1082
1082.	Rec. persistens pulpam gelatinosam mollem demùm in nucleus ceraeum committatam continens.....	PYRENIA (p. 729.)
	Recept. homogeneum.....	1083
1083.	Recept. horizontale submarginatum, hymenio papillis prominulis tecto..	EXIDIA (p. 731).
	Recept. rotundatum aut. multiforme, hymenio lœvi.....	1084
1084.	Recept. rotundatum carnosò-gelatinosum demùm subdeliquescens.....	
	DACRYMYCES (p. 729 supp. p. 1044.)	
1085.	Recept. subpellucidum lobatum vel plicatum gelatinosum.....	TREMELLA (p. 730 supp. p. 1044.)
	Recept. cupulatum pileatum aut mitræforme, hymenium superficiem superiorem obtegens.....	1086
1086.	Rec. erectum clavæforme simplex vel ramosum ; hymenium magnam partem receptaculi obtegeus.....	1100
	Rec. horizontale nunc pileatum, nunc resupinatum effusum crustæforme ; hymenium inferum.....	1108
1087.	Recept. cupulatum primò clausum.....	1087
	Rec. inversè cupulatum aut mitræforme nunquam clausum.....	1096
1087.	Recept. tubuliforme.....	SOLENIA (p. 733.)
	Recept. non tubuliforme.....	1088

CLAVIS ANALYTICA.

xlix

1088.	{ Recept. matrici totum immersum et ab eadem marginatum.....	STRICTIS (p. 733 supp. p. 1044).
	Innato-erumpentes sessiles stipitative.....	1089
1089.	{ Recept. bullatum subtus concavum fibrillis radiciformibus suffultum.....	BRIZINA (p. 755).
	Recept. convexum non bullatum.....	1090
1090.	{ Recept. marginatum.....	1091
	Recept. immarginatum.....	HELOTIUM (p. 755).
1091.	{ Hymenium persistens.....	1092
	Hymenium fatiscens aut deliqescens.....	1095
	Recept. epidermide crassâ discolori; fungi innato-erumpentes.....	
1092.	CERANGIUM (p. 734 supp. p. 1044).	
	Recept. epidermis contigua non discolor; fungi erumpentes sessiles vel	
	stipitati.....	1093
1093.	{ Fungi molles aut tremelloso-gelatinosi.....	1094
	Fungi carnosí vel ceracei.....	PEZIZA (p. 739 supp. p. 1045).
1094.	{ Fungi corticolæ.....	BULGARIA (p. 738).
	Fungi finicolæ.....	ASCOBOLUS (p. 738).
	Recept. patellatum, hymenio demùm tumente gelatinoso corrugato-plicato	
1095.	deliquescente.....	DITIOLA (p. 737).
	Recept. cyathiforme, hymenio non tumente demùm fatiscente.....	
	TYMPANIS (p. 737 supp. p. 1044).	
1096.	{ Receptaculum campanulatum aut digitaliforme.....	VERPA (p. 758.)
	Rec. orbiculare rotundatum capitatumve.....	1097
	Rec. deflexum sinuosum, adultum mitræforme lobatum.....	
1097.	HELVELLA (p. 756).	
	Rec. non deflexum plicato - reticulatum aut læve nec mitræforme nec	
	lobatum.....	1098.
1098.	{ Recept. plicato-reticulatum excavatum.....	MORCHELLA (p. 757.)
	Recept. undulatum vel læve.....	1099
1099.	{ Rec. pileatum margine revolutum; fungi terrestres.....	LEOTIA (p. 758).
	Rec. capitatum; fungi lignatiles.....	VIBRISSEA (p. 759).
1100.	{ Recept. à stipite discretum aut cum eo confluens.....	1101
	Recept. cum stipite confusum.....	1106
1101.	{ Recept. in tuberculo volvaceo carnoso primò inclusum.....	
	PHACORHIZA. (p. 761).	
	Recept. in tuberculo non inclusum.....	1102
1102.	{ Recept. compressum.....	SPATHULARIA (p. 761).
	Recept. non compressum.....	1103
1103.	{ Recept. clavatum vel subspathulatum.....	1104
	Recept. cylindricum subcylindricumve.....	1105
1104.	{ Recept. basi stipitem discretum arctè ambiens; fungi epiphyti.....	
	MITRULA (p. 759).	
	Recept. in stipitem productum; fungi terrestres... GROGLOSSUM (p. 761).	
	Rec. hymenio undique sporigero vestitum, à stipite capillari discretum...	
1105.	TYPHULA (p. 760).	
	Rec. absque stipite discreto; hymenium ad apicem tantum sporigerum.	
	PISTILLARIA (p. 761).	
1106.	{ Thecae nullæ.....	PISTILLARIA (p. 761).
	Thecae distinctæ.....	1107

ORDINUM GENERUMQUE

	Recept. cylindricum tarsum incrassatum simplex vel ramosum.....	
1107.	{ Recept. irregulare ramosum ramis compressis apice dilatatis et filamentosis.	CLAVARIA (p. 762 supp. 1046). MERISMA (p. 766).
1108.	{ Hymenium laxe papillosum subulatum vel tuberculosum. Hymenium porosum sinuatum lamellatumve.....	1109 1115
1109.	{ Hymenium laxe aut papillosum..... Hymenium subulatum tuberculosumve.....	1110 1113
1110.	{ Recept. coriaceum membranaceumve nunquam venoso-rugosum.... Recept. coriaceo-tremellosum aut venoso-rugosum.....	1111 1112
1111.	{ Recept. coriaceum undique thecas raro obsoletas gerens..... Rec. membranaceum sporulas in acervulos concentricos dispositas gerens.	THELEPHORA (p. 767 supp. 1046). CONIOPHORA (p. 773.)
1112.	{ Thecae nullae; fungi dimidiati latere adfixi..... Thecae immersae; fungi resupinati effusi.....	AURICULARIA (p. 773). PHLEbia (p. 773).
1113.	{ Hymenium primò verrucosum, verrucis demù tubuliferis..... Hymenium dentato-lamellosum aculeatumve.....	FISTULINA (p. 780). 1114
1114.	{ Hymenium dentatō-lamellosum..... Hymenium aculeatum.....	SISTOTREMA (p. 774). HYNUM (p. 774).
1115.	{ Hymenium porosum sinuosumve..... Hymenium plicatum lamellatumve.....	1116 1118
1116.	{ Hymenium porosum..... Hymenium sinuosum.....	1117 DÆDALEA (p. 794 supp. 1048).
1117.	{ Hymenium è substantia propriâ formatum; tubuli à se invicem separabiles.	BOLLETUS (p. 781 supp. p. 1047). POLYPOAUS (p. 784 supp. p. 1047).
1118.	{ Plicæ aut lamellæ continuae..... Lamellæ interruptæ.....	1119 SISTOTREMA (p. 774).
1119.	{ Rec. apice irregulariter rumpens et è filamentis contextum..... Rec. nec rumpens nec filamentosum.....	ASTEROPHORA (p. 855). 1120
1120.	{ Hymenium venosum vel sinuoso-plicatum..... Hymenium lamellatum.....	1121 1122
1121.	{ Plicæ anastomosantes cellulas irregulares formantes.. Plicæ radiantes ramosæ subparallelæ.....	MERULius (p. 796). CANTHARELLUS (p. 797 supp. p. 1048).
1122.	{ Lamellæ omnes longitudinaliter bifidæ..... Lamellæ longitudinaliter simplices.....	SCHIZOPHYLLUM (p. 796). ACARICUS (p. 800).
1123.	{ Recept. stipitatum..... Recept. sessile.....	PHALLUS (p. 850). CHEATHRUS (p. 851).
1124.	{ Sporidia brevia simplicia rariùs septata, stromati vero aut spurio imposita aut innata.....	UREDINEÆ. 1125
1125.	{ Filamenta tubulosa aut apice capitata continua aut septata, sterilia aut sporulas gerentia vel intùs foventia..... Sporidia simplicia receptaculo solido persistenti superficiali aut liberato imposita.....	MUCEDINEÆ. 1154 1126
	Sporidia sub epidermide nascentia demù erumpentia stromati semper innato spurio aut obsoleto insidentia.....	1132

CLAVIS ANALYTICA.

Ij

1126. { Receptaculum verticaliter elongatum contextu vesiculoso filamentoso, 1127
 Recept. plus minus distincte horizontaliter expansum aut rotundatum. 1129
1127. { Recept. stipitiforme firmum capitulo terminatum. 1228
 Recept. elongatum continuum fugax ad extremitates clavatum fibrosum
 carnosum ve. ISARIA (p. 878).
1128. { Recept. cylindricum conicum ve capitulo ovato aut cylindrico terminatum.
 CAPHALOTRICHUM (p. 877).
 Recept. subulatum terminatum capitulo rotundo.... PERICOXIA (p. 877).
1129. { Recept. membraceo-plicatum contextum è filamentis apice prominulis.
 CERATIUM (p. 879).
 Recept. tuberculatum capitatum ve. 1130
1130. { Sporidia globosa.... 1131
 Sporidia fusiformia.... FUSARIUM (p. 880).
1131. { Sporidia sparsa ad superficiem stromatis gramosi.... ALGARIA (p. 879).
 Sporidia in stratum stroma carnosum corticans digesta.... TUBERCULARIA (p. 879).
1132. { Sporidia stromate instructa per epidermidem erumpente aut sub epi-
 dermide nascente. 1133
 Sporidia per epidermidem erumpentia, stromate nullo. 1149
1133. { Sporidia septata.... 1134
 Sporidia simplicia.... 1144
1134. { Sporidia pedicellata.... 1135
 Sporidia non pedicellata.... 1139
1135. { Stroma aurantiacum fulvum ve. 1136
 Stroma atrum. 1137
1136. { Sporidia stromati vesiculoso-gelatinoso subeffusa innata....
 GYMNOFORANGIUM (p. 881).
 Sporidia stipitibus basi in stroma clavatum gelatinosum junctis.... PODISOMA (p. 881).
1137. { Sporidia rhombea.... PHAGMOTAIICHUM (p. 881).
 Sporidia fusiformia.... 1138
1138. { Sporidia stromati innato effusa superficiali-adnata....
 SPORIDESMIUM (p. 882).
 Sporidia stromati verruciformi plano innato erumpenti innata.... COXYNUM (p. 882.).
1139. { Sporidia stromati innato verruciformi effusoque adnata....
 EXOSPORIUM (p. 882).
 Sporidia coacervata supra stroma spurium aut cum stromate congluti-
 nata.... 1140
1140. { Sporidia supra stroma spurium coacervata.... 1141
 Sporidia cum stromate conglutinata.... 1143
1141. { Sporidia stellata.... ASTEROSPORIUM (p. 883).
 Sporidia in acervos coacervata.... 1142
1142. { Sporidia septata.... STILBOSPORA (p. 883).
 Sporidia didyma aut uniseptata.... DIDYMOSENCEUM (p. 883).
1143. { Sporidia septata.... SEPTARIA (p. 885).
 Sporidia didyma.... BULLARIA (p. 886).
1144. { Sporidia coacervata supra stroma spurium.... 1145
 Sporidia cum stromate conglutinata.... 1146
1145. { Sporidia alia simplicia alia uniseptata.... DIDYMOSENCEUM (p. 883).
 Sporidia omnia non septata.... MELANCONIUM (p. 884).

ORDINUM GENERUMQUE

1146. { *Sporidia cylindrica* *BLENNORIA* (p. 885).
Sporidia globosa 1147.
1147. { *Sporidia cirrhosa profluentia* *NEMASPORA* (p. 885).
Sporidia non cirrhosa profluentia 1148.
1148. { *Sporidia cum stromate granuloso conglutinata discoideo-erumpentia*
Sporidia non discoideo-erumpentia 1070
1149. { *Sporidia pedicellata* 1150
Sporidia sessilia 1152
1150. { *Sporidia 3-50-septata* 1151
Sporidia uni-rarius 2-septata aut non septata 1152
1151. { *Sporidia cylindrica* *PURAGMIDIUM* (p. 886).
Sporidia subglobosa *TRIPHRAGMIUM* (p. 886).
1152. { *Sporidia uni-rarius 2 septata* *PUCCINIA* (p. 887).
Sporidia non septata 1153
1153. { *Sporidiorum acervuli epidermide in pseudo-peridium tubulosum vel cya-*
 thiforme extensa cincti | *ECIDIUM* (p. 902).
Epidermis in pseudo-peridium non extensa *UARDO* (p. 892).
Filamenta simplicia continua (in foliis vivis nascentia) intus spornas
foventia 1155
1154. { *Filamenta in foliis vivis rarius nascentia septata; aut sporidia inspersa*
vel ex ultimis articulis filamentorum formata 1156
1155. { *Filamenta colorata basi in tuberculum dilatata* *CRONARTIUM* (p. 909).
Filamenta subdiaphana basi non tuberculosa *ERINEUM* (p. 909).
1156. { *Filamenta apice in peridiolum vesiculatum capitata* 1157
Filamenta in peridiolum vesiculatum non capitata 1165
1157. { *Peridiolum carnosum* *ERYSIPHE* (p. 868).
Peridiolum non carnosum 1158
1158. { *Filamenta omnia erecta* 1159
Filamenta sterilia decumbentia 1160
1159. { *Filamenta rorida coronata peridiolo demum elasticè explosa*
Filamenta carnosa solida capitulo gelatinoso molli diffidente terminata *STILBUM* (p. 913).
1160. { *Filamenta apice clavata* 1161
Filamenta peridiolis subglobosis terminata 1162
1161. { *Filamenta apice peridio collapso sporas sustinentia*
Sporulae globosæ ex filamentorum apicibus erumpentes seriatæ *SPORODINIA* (p. 915).
Sporulae globosæ ex filamentorum apicibus erumpentes seriatæ *ASPERGILLUS* (p. 915).
1162. { *Filamenta omnia decumbentia* *EUROTIUM* (p. 916).
Filamenta fertilia erecta 1163
1163. { *Filamenta simplicia aut ramosa, ramis omnibus peridiolis terminata*
Filam. simplicia aut ramosa, ramis inferioribus omnibusve sporulis ter-
minatis 1164
1164. { *Filamenta apice peridiolum gerentia; ramo sporidiis solitariis terminati* *THAMNIDIUM* (p. 915).
Peridiolum nullum sed sporulae globosæ ex apicibus erumpentes seriatæ *ASPERGILLUS* (p. 915).
1165. { *Filamenta pellucida fugacia sèpè septata* 1161
Filam. opaca continua aut rarius septata 1183

CLAVIS ANALYTICA.

Kij

1166.	{ Filam. fertilia apice penicillata.....	1167
	Filam. fertilia omnino aut apice saltem simplicia.....	1168
1167.	{ Filam. fertilia deorsum in stipitem confluentia.....	<i>COREMIUM</i> (p. 917).
	Filam. fertilia in stipitem non confluentia.....	<i>PENICILLIUM</i> (p. 918).
1168.	{ Sporidia circa filamentorum ramos apicesve collecta.	<i>BORYTIS</i> (p. 918).
	Sporidia non collecta terminalia aut inspersa.....	1169
1169.	{ Filam. omnia aut saltem sterilia decumbentia.....	1170
	Filam omnia erecta.....	1178
1170.	{ Sporidia globosa.....	1171
	Sporidia fusiformia aut appendiculata aut ovoidea.....	1175
1171.	{ Sporidia solitaria.....	1172
	Sporidia inspersa aut coacervata.....	1173
1172.	{ Filamenta ramosa , sporidia ramulos terminantia.	<i>VERTICILIUM</i> (p. 916).
	Filam. vix ramosa ; sporidia persistentia æqualiter stipitata.....	<i>ACRYMONIUM</i> (p. 917).
1173.	{ Filam. fertilia erecta , ramis lateralibus oppositis aut vertieillatis.....	<i>STACHYLIDIUM</i> (p. 916).
	Filam. omnia decumbentia aut subdecumbentia laxè ramosa.....	1174
1174.	{ Sporidia liberè inspersa.....	<i>SPOXOTRICHUM</i> (p. 921).
	Sporidia in medio cespitis coacervata demùm effusa.....	<i>SEPEDONIUM</i> (p. 925).
1175.	{ Sporidia appendiculo globoso et filiformi.....	<i>Mycogonia</i> (p. 917).
	Sporidia non appendiculata.....	1176
1176.	{ Sporidia ovoidea didyma.....	<i>TRICOTHECIUM</i> (p. 924).
	Sporidia elongata aut fusiformia simplicia vel obscurè septata.....	1177
1177.	{ Filamenta apice truncata ; sporidia elongata....	<i>BACTRIDIUM</i> (p. 917).
	Filam. non truncata ; sporidia fusiformia.....	<i>FUSISPORIUM</i> (p. 925).
1178.	{ Filam. moniliformia.....	1179
	Filam. continua aut septata sed non moniliformia.....	1180
1179.	{ Filam. ramosa , sporidia continua.....	<i>SPONDYLOCLADIUM</i> (p. 917).
	Filam. simplicia ; sporidia didyma.....	<i>POLYTHYNCIUM</i> (p. 927).
1180.	{ Filam. basi stromate juncta.....	<i>Psilonia</i> (p. 926).
	Filam. basi stromate non juncta.....	1181
1181.	{ Filam. sporidia magna lineatim coacervata foventia.....	<i>SPORENDONEMA</i> (p. 925).
	Sporidia adspersa aux immixta.....	1182
1182.	{ Fungelli foliis glumacearum innati.....	<i>ARTHRIUM</i> (p. 926).
	Fungelli in truncis putrescentibus viventes.....	<i>ACLADIUM</i> (p. 927).
1183.	{ Filamenta tota aut ad apicem tantùm moniliformia.....	1184
	Filamenta continua aut septata.....	1188
1184.	{ Sporidia intrà basin filamentorum nascentia granuliformia.....	<i>ANTENNARIA</i> (p. 930).
	Articuli demùm in sporidia dilabentes.....	1185
1185.	{ Filam. articuli remoti parte filiformi distincti.....	<i>ALTERNARIA</i> (p. 931).
	Articuli non distincti.....	1186
1186.	{ Filam. apicibus tantùm septatis.....	<i>CLADOPORTIUM</i> (p. 930).
	Filam. tota septata.....	1187
1187.	{ Articuli opaci.....	<i>TORULIA</i> (p. 931).
	Articuli pellucidi.....	<i>OINUM</i> (p. 931).

liv ORDINUM GENERUMQUE

1188.	{ Sporidia sparsa externa.....	1189
	Sporidia externa nulla.....	1197
1189.	{ Filamenta continua.....	1190
	Filamenta septata.....	DACTYLUM (p. 930).
1190.	{ Sporidia globosa.....	1191
	Sporidia non globosa.....	1194
1191.	{ Filam. decumbentia.....	RACODIUM (p. 928).
	Filam. erecta.....	1192
1192.	{ Sporidia circa filamentorum bases in globos collecta.. CONOPLEXA (p. 929).	
	Sporidia vagè inspersa.....	1193.
1193.	{ Sporidia simplicia.....	CHLORIDIUM (p. 927).
	Sporidia septata.....	HELMISPORIUM (p. 929).
1194.	{ Sporidia spiraliter involuta.....	HELCOSPORIUM (p. 929).
	Sporidia non involuta.....	1195
1195.	{ Sporidia septata.....	HELMISPORIUM (p. 929).
	Sporidia simplicia	1196
1196.	{ Sporidia longissimá cylindrica incurva.....	CAMPTOSPORIUM (p. 928).
	Sporidia fusiformia.....	CIRCINNOTRICHUM (p. 928).
1197.	{ Filam. ramulis extremis septatis	1198
	Filam. non septata.....	1199
1198.	{ Filam. in ramos apposita quorum minores septati....	OZONIUM (p. 934).
	Filam. ramulis extremitatibus septatis.....	ACROTHAMNIUM (p. 932).
1199.	{ Filam. medio in pelliculam tenuem condensata.....	ATHELIA (p. 932).
	Filam. in pelliculam non condensata.....	1200
1200.	{ Filamenta semi-pellucida.....	BYSSUS (p. 934).
	Filam. opaca.....	1201
1201.	{ Filam. intertexta.....	DEMATIUM (p. 933).
	Filam. vix intertexta.....	HIMANTIA (p. 935).
1202.	{ Plantæ frondosæ id est in laminam plus minus dilatatam expansæ..	1203
	Plantæ filamentosæ id est filiformes tubulosæ rarius solidæ.....	1245
1203.	{ Contextus fibrosus aut vasculari-cellulosus.....	1204
	Contextus cellularis.....	1211
1204.	{ Frondes cylindrica aut compressæ in ramos ramulosve expansæ;	
	conceptacula terminalia.....	1205
1205.	Frondes compressæ aut in laminam expansæ; conceptacula per	
	totam frondem sparsa.....	1210
1206.	Frondes vesiculis instructæ.....	1206
1207.	Frondes vesiculis non instructæ.....	1208
1208.	Frondes in ramulos foliiformes divisæ.....	SARGASSUM (p. 936).
1209.	Frondes in ramulos lineares filiformesve divisæ aut in ramulos non	
	dilatatae.....	1207
1210.	Conceptacula subglobosa apicibus attenuata mucronata aut denti-	
	colata.....	1205
1211.	Conceptacula compressa nec mucronata nec denticulata. FUCUS (p. 937).	
1212.	Frondes ramis ramulisque in petiolum angustatis spinulis marginatis	
1213.	instructæ.....	DESMARETIA (p. 938).
1214.	Frondes ramulis sessilibus aut nullis nunquam spinulosis.....	1209
1215.	Frondes cylindrica.....	FURCELLARIA (p. 939).
1216.	Frondes compressæ aut alatae.....	Fucus (p. 937).

CLAVIS ANALYTICA.

iv

- | | |
|-------|--|
| 1210. | <p>{ Frons è basi cyathiformi erumpens; conceptacula per totam frondem
sparsa..... <i>HIMANTHALIA</i> (p. 939.)</p> <p>Frons radicibus ramosis et fibrosis; conceptacula immersa.....
..... <i>LAMINARIA</i> (p. 939.).</p> |
| 1211. | <p>{ Frondes intus homogeneæ aut fistulosæ..... 1212</p> <p>Frondes intus filamentis aut granulis farctæ..... 1240</p> |
| 1212. | <p>{ Frondes (oculo armato) filamentis obtectæ..... 1213</p> <p>Frondes filamentis non obtectæ..... 1214</p> |
| 1213. | <p>{ Frondes è massâ gelatinosâ prodeentes..... <i>NEMALION</i> (p. 959).</p> <p>Frondes è massâ gelatinosâ non prodeentes..... <i>SPONGODIUM</i> (p. 959).</p> |
| 1214. | <p>{ Frondes in sphæram clathrato - reticulatam demum in membranas laxè
reticulatas dispositæ..... <i>HYDROCLATHRUS</i> (p. 960).</p> <p>Frondes non reticulatae..... 1215</p> |
| 1215. | <p>{ Frondes fistulosæ..... 1216</p> <p>Frondes non fistulosæ..... 1221</p> |
| 1216. | <p>{ Frondes hinc indè externè contractæ aut attenuatæ, in ramulos breves
subfoliiformes dilatatae..... <i>LOMENTARIA</i> (p. 949).</p> <p>Frondes in ramulos subfoliiformes non dilatatae..... 1217</p> |
| 1217. | <p>{ Frons angustissima hyalina nitida intus corpusculis minutissimis viridibus
colorata..... <i>BRYOPSIS</i> (p. 956).</p> <p>Frons plus minus lata, colorata; corpuscula interna nulla..... 1218</p> |
| 1218. | <p>{ Conceptacula pyriformia frondem densissimè obsidentia. <i>CHORDA</i> (p. 957).</p> <p>Conceptacula granuliformia sparsa aut innata..... 1219</p> |
| 1219. | <p>{ Conceptacula demum proeminentia et frondem exasperantia.....</p> <p>..... <i>ASPEROCOCCUS</i> (p. 956).</p> <p>Conceptacula nunquam eminentia..... 1221</p> |
| 1220. | <p>{ Frons subgelatinosa; conceptacula solitaria sparsa.. <i>DUMONTIA</i> (p. 941).</p> <p>Frons membranacea; conceptacula densissima..... <i>ULVA</i> (p. 957).</p> |
| 1221. | <p>{ Frondes angustissimæ cylindricæ aut lineares..... 1222</p> <p>Frondes plus minus dilatatae planæ..... 1231</p> |
| 1222. | <p>{ Frondes hinc indè externè contractæ, in ramulos brèves subfoli-
formes attenuatæ..... <i>LOMENTARIA</i> (p. 949).</p> <p>Frondes in ramulos subfoliiformes non dilatatae..... 1223</p> |
| 1223. | <p>{ Frons ramosissima disticha..... <i>PLOCAMIUM</i> (p. 949).</p> <p>Frons non disticha..... 1224</p> |
| 1224. | <p>{ Frons obsita ramillis minutis spinulæformibus..... 1225</p> <p>Frons non obsita ramillis spinulæformibus..... 1226</p> |
| 1225. | <p>{ Frondes planæ lineares..... <i>DESMARETIA</i> (p. 938).</p> <p>Frondes cylindricæ..... <i>HYPNEA</i> (p. 951).</p> |
| 1226. | <p>{ Conceptacula hic illuc immersa..... <i>SCYTOSIPHON</i> (p. 957).</p> <p>Conceptacula innata aut adnata..... 1227</p> |
| 1227. | <p>{ Conceptacula verrucosa ad basin ramulorum adnata.. <i>POLYIDES</i> (p. 953).</p> <p>Conceptacula tuberculiformia terminalia aut lateralia..... 1228</p> |
| 1228. | <p>{ Frons setacea..... <i>SPOROCHNUS</i> (p. 953).</p> <p>Frons non setacea..... 1229</p> |
| 1229. | <p>{ Frons gelatinosa sicca cornea..... <i>LAURENCIA</i> (p. 951).</p> <p>Frons corneo-cartilaginea..... 1230</p> |
| 1230. | <p>{ Frons plana aut valde compressa, conceptacula tuberculiformia ad apicem
aut rarius per omnem longitudinem ramorum ramulorumve sita.....</p> <p>..... <i>GELIDIUM</i> (p. 948).</p> <p>Frons cylindrica rarius plana; conceptacula globosa gigantina ramis aut
ramulis adnata aut innata..... <i>GIGARTINA</i> (p. 952).</p> |

ORDINUM GENERUMQUE

1231. { Frons alato-costata spiraliter contorta..... VOLUBILARIA (p. 946).
Frons non spiraliter contorta..... 1232
1232. { Frons flabelliformis è filamentis tubulosis contexta. FLABELLARIA (p. 956).
Frons è filamentis tubulosis non contexta..... 1233
1233. { Frons nervosa..... 1234
Frons enervis..... 1235
1234. { Frons rosea aut rubra..... DELESSERIA (p. 945).
Frons olivaceo-viridis..... DICTYOPTERIS (p. 954).
1235. { Frons è surculo reptante aut ramoso proveniens.... CAULERPA (p. 959).
Frons è surculo reptante non proveniens..... 1236
1236. { Frondes cartilagineo-coriaceæ rariùs gelatinosæ, conceptacula punctiformia aut tuberculiformia..... 1237
Frondes membranaceo-papyraceæ, conceptacula minutissima..... 1238
1237. { Lamina foliiformis..... HALYMENTIA (p. 941).
Lamina coriacea aut coriaceo-cartilaginea..... CHONDRUS (p. 947).
1238. { Frons reticulata, conceptacula ad superficiem frondis sita..... 1239
Frons cellulosa, conceptacula innata..... ULVA (p. 957).
1239. { Frons flabelliformis; conceptacula in lineolas transversas concentricasque digesta..... PADINA (p. 955).
Frons dichotoma aut laciuiata, conceptacula in maculas aut lineolas longitudinales digesta..... DICTYOTA (p. 954).
1240. { Frons granulis farcta..... 1241
Frons filamentis farcta..... 1242
1241. { Frons elongata ramosissima..... CLUZELLA (p. 962).
Gelatina expansa vel globosa..... PALMELLA (p. 963).
1242. { Frons filiformis cylindrica elongata..... MESOGLOIA (p. 962).
Frons expansa globosa vel lobata..... 1243
1243. { Frons filamentis moniliformibus curvato-crispis farcta.. NOSTOC (p. 960).
Frons filamentis è communī basi prodeuntibus radiantibus farcta... 1244
1244. { Filamenta globulo insidentia simplicia continua intus annulata..... RIVULARIA (p. 261).
Filamenta elongata articulata ramosa..... CHETOPHORA (p. 961).
1245. { Articulatæ id est cellulis plus minus elongatis dissepimento terminatis formatæ aut in frustula secedentes..... 1246
Continuæ aut tenuissimè lineolatae sed non articulatæ..... 1271
1246. { Filamenta rariùs viridia; conceptacula externa aut apicibus ramorum intumescentibus innata..... 1247
Filamenta sæpiùs viridia, conceptacula interna aut nulla..... 1258
1247. { Filamenta ramis undique setis imbricatis verticillatisve vestita.... 1248
Filamenta setis confertis non vestita..... 1250
1248. { Filamenta viridia; conceptacula in ramulos torulosos congesta.....
Filamenta non viridia, conceptacula solitaria aut extremitati ramulorum innata..... 1249
1249. { Filamenta olivaceo-fuscescentia..... CLADOSTEPHUS (p. 963).
Filamenta purpurea aut rosea..... CERAMIUM (p. 966).
1250. { Filamenta distiche ramosa pinnata..... SPHACELARIA (p. 964).
Filamenta non distiche ramosa et pinnata..... 1251
1251. { Filamenta viridia aut olivaceo-viridia..... 1252
Filamenta fusco-nigrescentia purpurea aut rosea..... 1255

CLAVIS ANALYTICA.

.lvij

1252.	{ Filamenta setis basi bulbosis instructa.....	BULBOCHETEA (p. 973).
	Filamenta setis nullis aut basi non bulbosis.....	1253
1253.	{ Filamenta ramosissima.....	ECTOCARPUS (p. 971).
	Filamenta simplicia aut subsimplicia.....	1254
1254.	{ Filamenta viridi-lutescentia penicillata.....	ELACHISTEA (p. 972).
	Filamenta æruginosa cespitosa.....	DESMARETELLA (p. 973).
1255.	{ Aquæ delcis incolæ.....	AUDUINELLA (p. 972).
	Aquæ salsæ incolæ.....	1256
1256.	{ Filamenta purpurea aut rosea.....	CERAMNIUM (p. 966).
	Filamenta fusco-nigrescentia aut fusco-purpurea.....	1257
1257.	{ Conceptacula ovata.....	RHODOMELA (p. 964.)
	Conceptacula basi rotundata ad apicem acuminata aut truncata.....	POLYSIPHONIA (p. 965).
1258.	{ Filamenta demùm ope tubolorum aut reticulatim conjuncta.....	ZYGNEMA (p. 975).
	Filamenta nunquam conjuncta.....	1259
1259.	{ Filamenta in frustula secedentia.....	1260
	Filamenta in frustula non secedentia.....	1266
1260.	{ Filamenta subquadrata stipitata.....	ACHNANTHES (p. 989).
	Filamenta non stipitata.....	1261
1261.	{ Filamenta arachnoidea.....	1262
	Filamenta non arachnoidea.....	1263
1262.	{ Filamenta in gelatinam vel membranam intertexta..	MYCODERMA (p. 988).
	Filamenta libera affixa.....	LEPTOMITUS (p. 988).
1263.	{ Filamenta cylindrica.....	GAILLONELLA (p. 989).
	Filamenta compressa.....	1264
1264.	{ Frustula angulis cohærentia.....	DIATOMA (p. 991).
	Frustula angulis non cohærentia.....	1265
1265.	{ Filamenta densissimè striata.....	FRAGILLARIA (p. 989).
	Filamenta non striata.....	ECHINELLA (p. 990).
1266.	{ Filamenta gelatinosa.....	1267
	Filamenta non gelatinosa.....	1269
1267.	{ Filamenta ramulis ciliiformibus undique obducta.....	THOREA (p. 977).
	Filamenta ramulis verticillatis aut penicillatis hinc indè instructa....	1268
1268.	{ Ramuli moniliformes verticillati.....	Batrachospermum (p. 978).
	Ramuli cylindrici fasciculato-penicillati.....	Draparnaldia (p. 980).
1269.	{ Filamenta in formam reticuli connexa	HYDROCYTION (p. 984).
	Filamenta non connexa.....	1270
1270.	{ Filamenta stricta rigida.....	LEMANEA (p. 978).
	Filamenta flexilia.....	CONFerva (p. 980).
1271.	{ Filamenta radiciformia vesiculam globosam sustinentia.....	.
	Filamenta nec radiciformia nec vesiculifera.....	1272
1272.	{ Conceptacula externa.....	VAUCHERIA (p. 973).
	Conceptacula interna aut nulla.....	1273
1273.	{ Filamenta linearia.....	1274
	Filamenta elongato-cuneata aut cuneata.....	1286
1274.	{ Filamenta pellucida corpusculis minutis colorata.....	1275
	Filamenta ipsa colorata.....	1279

Ivijj ORDINUM GENERUMQUE, etc.

- | | | |
|-------|--|-------------------------|
| 1275. | { Filamenta corpusculis viridibus intus onusta et ab iis colorata..... | 1276 |
| | Corpuscula non viridia..... | 1277 |
| 1276. | { Ramosa..... | BRYOPSIS (p. 956). |
| | Simplicia..... | BANGIA (p. 985). |
| 1277. | { Filamenta intus sphærulas echinatas continentia..... | SPHEROPLETHIA (p. 985). |
| | Filamenta granula varia foventia..... | 1278 |
| 1278. | { Filamenta è filamentis angustioribus coadunatis composita..... | SCHIZONEMA (p. 985). |
| | Filamenta non composita..... | BANGIA (p. 985). |
| 1279. | { Filamenta brevissima non lineolata..... | ECHINELLA (p. 990). |
| | Filamenta tenuissimè lineolata..... | 1280 |
| 1280. | { Filamenta brevissima..... | 1281 |
| | Filamenta plus minus elongata..... | 1282 |
| 1281. | { Filamenta simplicia..... | DESMARETELLA (p. 973). |
| | Filamenta ramosa..... | CALOTHYX (p. 987). |
| 1282. | { Filamenta nec oscillantia nec muco communi involuta..... | 1283 |
| | Filamenta oscillantia aut reptantia muco communi aut vaginâ involuta. | 1284 |
| 1283. | { Filamenta affixa cespitosa..... | SCYTONEMA (p. 986). |
| | Filamenta libera curvata..... | LYNGEYA (p. 987). |
| 1284. | { Filamenta basi in vaginâ fasciculata..... | MICROCOLCUS (p. 992). |
| | Filamenta libera..... | 1285 |
| 1285. | { Filamenta tubo interno moniliformi..... | ANABAENA (p. 992). |
| | Filamenta tubo interno non moniliformi..... | OSCILLARIA (p. 993). |
| 1286. | { Corpuscula stipitata..... | STYLLARIA (p. 991). |
| | Corpuscula non stipitata..... | FRUSTULIA (p. 991). |

CLAVIS ANALYTICÆ FINIS.

INDEX ALPHABETICUS.

A.

<i>Abama</i> ,	474	<i>Agrostis</i> ,	502, 1013
<i>Abies</i> ,	434	<i>Agyrium</i> ,	505
<i>Abies</i> ,	ibid.	<i>Aira</i> ,	728
ABIETINEÆ ,	433	<i>Aira</i> ,	511, 1007, 1013, 1035
ACANTHACEAE ,	378	<i>Airopsis</i> ,	510
<i>Acanthus</i> ,	ibid.	<i>Ajuga</i> ,	510
<i>Acer</i> ,	98	<i>Alchimilla</i> ,	361
ACERINEAE ,	ibid.	<i>Aleyrodon</i> ,	173
<i>Aceras</i> ,	446	<i>Aldrovanda</i> ,	960, 962
<i>Achillea</i> ,	274, 1003, 1010	<i>Alectoria</i> ,	68
<i>Achnanthes</i> ,	989	<i>Aleurisma</i> ,	616
<i>Achnanthes</i> ,	990	ALGAE ,	921, 922
<i>Achnodonton</i> ,	507	<i>Alisma</i> ,	935
<i>Acladion</i> ,	927	ALISMACEAE ,	437
<i>Acladion</i> ,	919	ALISMOIDEÆ ,	ibid.
<i>Aconitum</i> ,	17	<i>Alliaria</i> ,	ibid.
<i>Acorus</i> ,	481	<i>Allium</i> ,	45
<i>Acremonium</i> ,	917	<i>Alnus</i> ,	468, 999, 1006
<i>Acrospermum</i> ,	729	<i>Alopecurus</i> ,	422, 1006
<i>Acrosporium</i> ,	921, 952	<i>Alsine</i> ,	508
<i>Acrostichum</i> ,	537	ALSINEÆ ,	81, 82
<i>Acrothamnium</i> ,	932	<i>Alphitomorpha</i> ,	80
<i>Actæa</i> ,	18	<i>Alternaria</i> ,	468
<i>Actinonema</i> ,	717	<i>Althæa</i> ,	931
<i>Actinothyrium</i> ,	726	ALYSSINEÆ ,	92
<i>Adenarium</i> ,	86	<i>Alyssum</i> ,	33
<i>Adenocarpus</i> ,	119	<i>Alyssum</i> ,	34, 995
<i>Adenostyles</i> ,	260	<i>Alytosprium</i> ,	33, 34, 47
<i>Adianthum</i> ,	541	<i>Amanita</i> ,	923
<i>Adonis</i> ,	6	AMARANTHACEAE ,	808, 849, 850
<i>Adoxa</i> ,	212, 1029	<i>Amaranthus</i> ,	393
<i>Æcidium</i> ,	902, 1000, 1007, 1020	AMARYLLIDEAE ,	ibid.
<i>Ægerita</i> ,	879	<i>Amaryllis</i> ,	454
<i>Ægerita</i> ,	923, 925	<i>Amelanchier</i> ,	ibid.
<i>Ægilops</i> ,	528	AMENTACEAE ,	180
<i>Ægopodium</i> ,	231	<i>Ambrosia</i> ,	420
<i>Æsculus</i> ,	99	<i>Ammi</i> ,	279
<i>Æthalium</i> ,	863	<i>Ammophila</i> ,	502
<i>Ætheorhiza</i> ,	297	Ampelideæ ,	100
<i>Æthionema</i> ,	49	<i>Amphicorda</i> ,	878
<i>Æthusa</i> ,	232	<i>Amphiconium</i> ,	934
<i>Æthusa</i> ,	235	<i>Amphidium</i> ,	548
AGARICÆ ,	767	AMYGDALEÆ ,	162
<i>Agaricus</i> ,	800, 1000, 1018	<i>Amygdalus</i> ,	162
<i>Agaricus</i> ,	793, 795, 796, 855	<i>Anabaina</i> ,	992
<i>Agarum</i> ,	940	<i>Anacampsis</i> ,	446
<i>Agave</i> ,	472	ANACARDIEÆ ,	112
<i>Agrimonia</i> ,	173	<i>Anacyclus</i> ,	274, 1003
<i>Agropyron</i> ,	528, 530	<i>Anacyclus</i> ,	278

INDEX.

<i>Anagallis,</i>	381	<i>Arrenatherum,</i>	512
<i>Anagyris,</i>	115	<i>AROIDEAE,</i>	480
<i>Anarrhinum,</i>	342	<i>Artemisia,</i>	276, 997, 1003, 1010
<i>Anchusa,</i>	334, 998, 1011	<i>Arthonia,</i>	639, 640, 642-644
<i>Andraea,</i>	583	<i>Arthrinium,</i>	926
<i>Andromeda,</i>	317	<i>Arthrocladia,</i>	971
<i>Andropogon,</i>	499	<i>ARTOCARPEÆ,</i>	419
<i>Androsace,</i>	381	<i>Arum,</i>	480, 1006
<i>Androsænum,</i>	96	<i>Arundo,</i>	502, 1007
<i>Andryala,</i>	305	<i>Arundo,</i>	502
<i>Andryala,</i>	299	<i>Asarum,</i>	410
<i>Anemone,</i>	4, 1022	<i>Ascoholus,</i>	738
<i>ANEMONEÆ,</i>	3	<i>Ascophora,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anethum,</i>	220	<i>ASCLEPIADEÆ,</i>	914
<i>Anethum,</i>	236	<i>Asclepias,</i>	323
<i>Angelica,</i>	223, 1027	<i>Asclepias,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Angelica,</i>	218, 223, 224	<i>ASPARAGEAE,</i>	324
<i>ANGELICEÆ,</i>	223	<i>Asparagus,</i>	458
<i>ANGIOGASTRES,</i>	864	<i>Asperococcus,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Angoridium,</i>	861	<i>Aspergillus,</i>	956
<i>Anictangium,</i>	579, 1038	<i>Aspergillus,</i>	915
<i>Anictangium,</i>	579, 580, 581	<i>Aspergillus,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Anomodon,</i>	553	<i>Asperula,</i>	251, 997, 1003, 1009
<i>Antennaria,</i>	930	<i>Asperugo,</i>	335
<i>Antennaria,</i>	928	<i>ASPHODELEÆ,</i>	463
<i>Anthriscus,</i>	239	<i>Asphodelus,</i>	463, 1034
<i>ANTIRRHINEAE,</i>	342	<i>Aspidium,</i>	539
<i>Antirrhinum,</i>	343	<i>Asplenium,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Antirrhinum,</i>	344	<i>Aster,</i>	264, 1003, 1030
<i>Anthemis,</i>	273, 997, 1003	<i>Asterisca,</i>	643
<i>Anthemis,</i>	274	<i>Asterolinum,</i>	380
<i>Anthocéros,</i>	591	<i>Asteroma,</i>	715, 716
<i>Anthoxanthum,</i>	509	<i>Asterophora,</i>	855
<i>Anthyllis,</i>	121, 1002	<i>Asterosporium,</i>	883
<i>Aphyllanthes,</i>	474	<i>ASTRAGALEÆ,</i>	140
<i>Apium,</i>	232	<i>Astragalus,</i>	141, 996, 1002
<i>Apium,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Astrantia,</i>	242, 997
<i>Apluda,</i>	499	<i>Astrocarpus,</i>	67
<i>APOCYNEAE,</i>	323	<i>Astrolobium,</i>	146, 1026
<i>Apodanthus,</i>	578	<i>Athamantha,</i>	228, 1002
<i>AQUIFOLIACEÆ,</i>	210	<i>Athamantha,</i>	234
<i>Aquilegia,</i>	15	<i>Athelia,</i>	932, 1019
<i>ARABIDEÆ,</i>	26	<i>Athyrium,</i>	539, 1036
<i>Arabis,</i>	28	<i>Athyrium,</i>	539
<i>Arabis,</i>	28, 46	<i>Atractium,</i>	880
<i>ARALIACEAE,</i>	1029	<i>Atractylis,</i>	293
<i>Arbutus,</i>	316	<i>Atriplex,</i>	397, 1005, 1011
<i>Archangelica,</i>	223	<i>ATRIPLICEÆ,</i>	394
<i>Arctium,</i>	282	<i>Atropa,</i>	338
<i>Arcyria,</i>	857	<i>Avena,</i>	511, 1000
<i>Arenaria,</i>	83, 996, 1001, 1025	<i>Avena,</i>	511
<i>Arenaria,</i>	86, 199	<i>Auduinella,</i>	972
<i>Arisarum,</i>	481	<i>AURANTIACEAE,</i>	94
<i>Aristolochia,</i>	410	<i>Auricularia,</i>	773
<i>ARISTOLOCHIEAE,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Auriculaea,</i>	732
<i>Armeria,</i>	390	<i>Azalea,</i>	318
<i>Armeniaca,</i>	163	B.	
<i>Arnica,</i>	264	<i>BACILLARIEÆ,</i>	991
<i>Arnoseris,</i>	297	<i>Bactridium,</i>	917

Bæomyces,	635	Bruchia,	582
Bæomyces,	635, 655	Brunella,	375
Ballota,	365	Bryonia,	186
Balsamina,	106	Bryopsis,	956
BALSAMINEÆ,	105	Bryopsis,	980
Balsamifa,	279	Bryum,	549, 1036
Bangia,	985	Bryum,	548
Bangia,	617, 986	Bubon,	228
BANGIEÆ,	985	Buffonia,	80, 1025
Barbarea,	28, 1023	Bulbochæte,	973
Barbula,	564-566	Balbocodium,	473
Barkhausia,	298	Bulbocodium,	ibid.
Bartramia,	547	Bulgaria,	738
Bartsia,	353	Bullaria,	886
Batrachospermum,	978, 1021	Bulliarda,	200
Batrachospermum,	961-963, 977, 980	BUNIADEÆ,	55
Bellevalia,	466	Bunias,	ibid.
Bellidiastrum,	266	Bunias,	47, 54
Bellis,	ibid.	Bunium,	1028
Bellium,	ibid.	Bunium,	228, 231
BERBERIDEÆ,	19	Buplevrum,	225, 1027
Berberis,	19, 1023	Buplithalmum,	271
Berteroia,	33, 1023	BUTOMEÆ,	437
Beta,	399	Butomus,	ibid.
Betonica,	365, 1005	Buxbaumia,	578
Betula,	422	Buxbaumia,	ibid.
Betula,	ibid.	Buxus,	412
BETULEÆ,	ibid.	BYSSACEÆ,	927
BETULINEÆ,	421	Byssocladium,	924
Biatora,	653, 663, 671	Byssus,	934, 1019
Bidens,	280, 1003	Byssus,	928, 930, 933-935.
Bifora,	218	C.	
Biscutella,	41, 1024	Cacalia,	260
Blasia,	590	Cacalia,	263
Blechnum,	540	Cachrys,	241
Blennoria,	885	Cactus,	205, 1026
Blitum,	399	Cadmus,	984, 985
Boletus,	781, 1017	Cæoma,	892-909
Boletus,	780, 784-797	Cælosporium,	929
Bonnemaisonie,	949	CÆSALPINIEÆ,	161
BORRAGINEÆ,	331	Cakile,	42
Borrago,	334	Cakile,	50, 54.
Borrera,	606, 611, 612	CAKILINEÆ,	42
Boryna,	967, 968	Calamagrostis,	502, 999, 1013
Botrychium,	536	Calamagrostis,	507
BOTRYTIDEÆ,	916	Calendula,	280
Botrytis,	918	Calepina,	53
Botrytis,	916	Calla,	481
Bovista,	854	Callithamnion,	969, 970, 971
Brachypodium,	519, 529	Callitrichæ,	191
Brassica,	50, 1000, 1008, 1024	CALLITRICHINEÆ,	ibid.
Brassica,	46, 52, 53	Calluna,	318
BRASSICEÆ,	50	Calothryx,	987
Brignolia,	227	Calothrix,	973
Briza,	525	Caltha,	13
BROMELIACEÆ,	472	CALYCIFLORÆ,	109
Bromus,	515, 1013	Calycium,	636
Bromus,	520	Calycium,	724
Brongniartella,	966		

INDEX.

<i>Camelina,</i>	46	<i>Ceramium,</i>	952, 957, 963-966, 971, 980,
CAMELINEÆ,		<i>ibid.</i>	981, 983.
<i>Campanula,</i>	312, 998, 1011	<i>Cerastium,</i>	86, 996, 1001, 1008
<i>Campanula,</i>	335	<i>Cerasus,</i>	163
CAMPANULACEAE,	311	<i>Ceratium,</i>	879
<i>Camphorosma,</i>	394	<i>Ceratocephalus,</i>	8
<i>Camptosporium,</i>	928	<i>Ceratonema,</i>	868, 878, 934
<i>Camptoum,</i>	926	<i>Ceratonia,</i>	161
<i>Campylopus,</i>	572, 574	CERATOPHYLLEAE,	192
<i>Cantharellus,</i>	797, 1017, 1048	<i>Ceratophyllum,</i>	<i>ibid.</i>
<i>Cannabis,</i>	417	<i>Cercis,</i>	161
<i>Capitularia,</i>	621-633	CERCODIANÆ,	190
CAPPARIDEAE,	56	<i>Cerinthe,</i>	331, 1031
<i>Capparis,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Ceterach,</i>	537
CAPRIFOLIACEAE,	244	<i>Ceterach,</i>	538
CAPRIFOLIEÆ,	245	<i>Cetraria,</i>	612, 613
<i>Capsella,</i>	47	<i>Ceuthospora,</i>	725
<i>Capsicarpea,</i>	972	<i>Chærophyllum,</i>	239, 1009
<i>Capsicum,</i>	337	<i>Chærophyllum,</i>	239, 240
<i>Cardamine,</i>	31, 995, 1007	<i>Chætomium,</i>	876
<i>Cardamine,</i>	32	<i>Chætophora,</i>	961
<i>Carduncellus,</i>	281, 1031	<i>Chætophora,</i>	960, 962
<i>Carduus,</i>	283, 1003, 1010	CHÆTOPHOROIDEÆ,	960
<i>Carduus,</i>	283	<i>Chaetospora,</i>	952
<i>Carex,</i>	488, 999, 1006, 1012	<i>Chaixia,</i>	339
<i>Carex,</i>	488	<i>Chamærops,</i>	480
CARIOPHYLLEAE,	71	<i>Chamagrostis,</i>	527
<i>Carlina,</i>	293, 1003	<i>Chamorchis,</i>	447
<i>Carpesium,</i>	271	<i>Chantransia,</i>	973, 978, 982, 983
<i>Carpinus,</i>	430	<i>Chara,</i>	533, 1007
<i>Carpobolus,</i>	865	CHARACEAE,	533
<i>Carthamus,</i>	281	<i>Cheilanthes,</i>	541
<i>Carum,</i>	231	<i>Cheiranthus,</i>	27
CASSIEÆ,	161	<i>Cheiranthus,</i>	27, 43, 46
<i>Catabrosia,</i>	525	<i>Chelidonium,</i>	23
<i>Catananche,</i>	309, 997	<i>Chelidonium,</i>	22, 23
<i>Catharinea,</i>	546	CHENOPODEAE,	394
<i>Catonia,</i>	303, 304	<i>Chenopodium,</i>	396, 1005
CAUCALINEÆ,	216	<i>Cherleria,</i>	88
<i>Caucalis,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Chiliadenus,</i>	264
<i>Caucalis,</i>	216, 217, 239, 240	<i>Chilochoea,</i>	507, 508
<i>Caulerpa,</i>	959	<i>Chimophila,</i>	317
<i>Caplinia,</i>	441	<i>Chiodecton,</i>	672, 1040
<i>Caulinia,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Chironia,</i>	327
CELASTRINEÆ,	109	<i>Chironia,</i>	97
CELLULARES,	545	CHLATHRACEÆ,	850
CELTIDEÆ,	421	<i>Chlathrus,</i>	851
<i>Celtis,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Chlora,</i>	325
<i>Cenangium,</i>	734	<i>Chloridium,</i>	927
<i>Cenomyce,</i>	619	<i>Chloronitum,</i>	980, 981
<i>Centaurea,</i>	289, 997, 1003, 1010	<i>Chondria,</i>	948, 950, 951
<i>Centaurea,</i>	293	<i>Chondrilla,</i>	296, 1003
<i>Centranthus,</i>	253	<i>Chondrus,</i>	947
<i>Centunculus,</i>	380	<i>Chorda,</i>	957
<i>Cephalaria,</i>	257, 997	<i>Chordaria,</i>	952, 954, 959, 962, 971
<i>Cephalanthera,</i>	449	<i>Chrithmum,</i>	238
<i>Cephalotrichum,</i>	877	<i>Chrysanthemum,</i>	271, 997
CERAMIEÆ,	963	<i>Chrysocoma,</i>	264
<i>Ceramium,</i>	966, 1020	<i>Chrysosplenium,</i>	212

INDEX.

1055

<i>Chrysurus</i> ,	510, 526	<i>Conoplea</i> ,	876, 882, 926
<i>Cicer</i> ,	149	<i>Conopodium</i> ,	228
CICHORACEÆ ,	294	<i>Conostomum</i> ,	546
<i>Cichorium</i> ,	310, 1011	<i>Convallaria</i> ,	459, 1006
<i>Cicuta</i> ,	237	<i>Convallaria</i> ,	459
<i>Cicuta</i> ,	241	CONVOLVULACEAE ,	329
<i>Cicutaria</i> ,	238	<i>Convolvulus</i> ,	329, 1004
<i>Cinclidotus</i> ,	573	<i>Conyocybe</i> ,	636
<i>Cineraria</i> ,	261, 1010	<i>Conyza</i> ,	266
<i>Cineraria</i> ,	264	<i>Corallorrhiza</i> ,	450
<i>Cionium</i> ,	859, 860	CORIANDREÆ ,	217
<i>Ciræa</i> ,	189	<i>Coriandrum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Circinnotrichum</i> ,	928	<i>Coriandrum</i> ,	218
<i>Cirsium</i> ,	285, 997, 1003	<i>Coriaria</i> ,	xij
CISTINEAE ,	57	CORIARIEAE ,	<i>ibid.</i>
<i>Cistus</i> ,	57, 1008, 1024	<i>Coris</i> ,	381
<i>Citrus</i> ,	95	<i>Corispernum</i> ,	395, 1033
<i>Cladium</i> ,	484	<i>Cornicularia</i> ,	616
<i>Cladobotrys</i> ,	919	<i>Cornus</i> ,	244
<i>Cladonia</i> ,	619 634	COROLLIFLORÆ ,	320
<i>Cladosporium</i> ,	930	<i>Coronilla</i> ,	145
<i>Cladosporium</i> ,	923	CORONILLEÆ ,	144
<i>Cladostephus</i> ,	963	<i>Coronopus</i> ,	47
<i>Clavaria</i> ,	762, 1017, 1046	<i>Corrigiola</i> ,	196
<i>Clavaria</i> , 729, 730, 760, 761, 762,	766, 767, 878, 879.	<i>Corsinia</i> ,	593
CLAVARIEÆ ,	759	<i>Cortusa</i> ,	384
<i>Clavatella</i> ,	960	<i>Corvisartia</i> ,	267
<i>Clematis</i> ,	2, 1022	<i>Corydalis</i> ,	24
CLEMATIDEÆ ,	2	<i>Corylus</i> ,	429
<i>Cleonia</i> ,	375	CORYMBIFERÆ ,	259
<i>Climacium</i> ,	555	<i>Coryne</i> ,	731
<i>Clinopodium</i> ,	374, 1032	<i>Corynephora</i> ,	960
CLITORIEÆ ,	139	<i>Corynephorus</i> ,	511
<i>Clypeola</i> ,	35	<i>Coryneum</i> ,	882
<i>Cluzella</i> ,	962	<i>Coscinodon</i> ,	570
<i>Cneorum</i> ,	113	<i>Cotoneaster</i> ,	180
<i>Cnidium</i> ,	234, 1028	<i>Cotula</i> ,	278
<i>Cochlearia</i> ,	37	<i>Cotyledon</i> ,	201
<i>Cochlearia</i> ,	48	<i>Crambe</i> ,	54
<i>Codium</i> ,	956, 959	CRASSULACEAE ,	200
COLCHICACEAE .	473	<i>Crataegus</i> ,	179, 1009
<i>Colchicum</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Crataegus</i> ,	180-182
<i>Collema</i> ,	607, 1013, 1040	<i>Craterellus</i> ,	799
<i>Collema</i> ,	604, 618, 647, 655	<i>Craterium</i> ,	858
<i>Colutea</i> ,	140	<i>Crepis</i> ,	299, 1003, 1010
<i>Comarum</i> ,	171	<i>Crepis</i> ,	298, 299, 305
COMPOSITAE ,	258	<i>Cressa</i> ,	330
<i>Condyllocarpus</i> ,	218	<i>Cribaria</i> ,	856, 1017
<i>Conferva</i> ,	980, 1021	<i>Cribaria</i> ,	856
<i>Conferva</i> , 617, 956, 971, 972, 975-980,	984-992.	<i>Crocus</i> ,	453, 1012
CONFERVEÆ ,	977	<i>Cronartium</i> ,	999
CONIFERAЕ ,	431	<i>Croton</i> ,	411
<i>Coniocarpoa</i> ,	675	<i>Crucianella</i> ,	252
<i>Coniocarpon</i> ,	668	CRUCIFERÆ ,	26
<i>Coniophora</i> ,	773	<i>Crypsis</i> ,	509
<i>Conium</i> ,	241	<i>Cryptospheria</i> , 696, 703, 704, 706, 707	
<i>Conoplea</i> ,	928	<i>Cucubalus</i> ,	75
		<i>Cucumis</i> ,	185

INDEX.

<i>Cucurbita</i> ,	186	<i>Dematium</i> ,	933, 1019
<i>Cucurbita</i> ,	185, 186	<i>Dematium</i> , 914, 917, 920, 927, 929,	
CUCURBITACEAE ,	185	930, 934.	
<i>Cucurbitaria</i> ,	689, 691, 692, 693	<i>Depazea</i> ,	711-713
<i>Cunila</i> ,	359	<i>Deschampsia</i> ,	511
CUPPRESSINEÆ ,	432	<i>Dentaria</i> ,	32
<i>Cupressus</i> ,	ibid.	<i>Desmaretella</i> ,	973
<i>Cuscuta</i> ,	331, 1011	<i>Desmaretia</i> ,	938
<i>Cuviera</i> ,	531	<i>Desmia</i> ,	939
<i>Cyathea</i> ,	539	<i>Dianthus</i> ,	72, 995, 1008
<i>Cyathus</i> ,	865	<i>Diatoma</i> ,	990
<i>Cyclamen</i> ,	385	<i>Diatoma</i> ,	989, 990
<i>Cydonia</i> ,	182	DIATOMEÆ ,	987
<i>Cymbidium</i> ,	450	<i>Dicarpella</i> ,	965
<i>Cyaanchum</i> ,	323	<i>Dichæna</i> ,	641
<i>Cynara</i> ,	288, 1010	<i>Dichosporium</i> ,	864
CYNAROCEPHALÆ ,	281	DICOTYLEDONEÆ ,	1
<i>Cynodon</i> ,	500	<i>Dicranum</i> ,	567, 1013, 1037
<i>Cynodontium</i> ,	566, 567	<i>Dicranum</i> , 563, 566, 567, 570, 573-	
<i>Cynoglossum</i> ,	336, 1004, 1011	575.	
<i>Cynosurus</i> ,	526	<i>Dictamnus</i> ,	108
CYPERACEAE ,	483	<i>Dietydium</i> ,	856
<i>Cyperus</i> ,	483, 1006, 1012	<i>Dictyopteris</i> ,	954
<i>Cypella</i> ,	732	<i>Dictyota</i> ,	ibid.
<i>Cypelium</i> , 636, 637, 638, 639, 645,	735.	DICTYOTEÆ ,	ibid.
<i>Cypripedium</i> ,	451	<i>Diderma</i> ,	858, 859, 861
<i>Cystoseira</i> ,	936	<i>Didymium</i> ,	858
<i>Cystoseira</i> ,	938	<i>Didymium</i> ,	860, 862
CYTINEÆ ,	410	<i>Didymodon</i> ,	566, 1000, 1037
<i>Cytinus</i> ,	ibid.	<i>Didymodon</i> ,	565
<i>Cytispora</i> ,	724, 1016	<i>Didymosporium</i> ,	883
<i>Cytispora</i> ,	704	<i>Digitalis</i> ,	342, 998, 1011
CYTISOREÆ ,	733	<i>Digitaria</i> ,	501
<i>Cytisus</i> ,	117, 996	<i>Digitaria</i> ,	ibid.
<i>Cytisus</i> ,	116, 119	<i>Dimorphantes</i> ,	267
<i>Czackia</i> ,	463	DIOSPYREÆ ,	320
D.		<i>Diospyros</i> ,	ibid.
<i>Dacrymyces</i> ,	729, 1044	<i>Diotis</i> ,	278
<i>Dactylis</i> ,	521	<i>Diphyscium</i> ,	578
<i>Dactylis</i> ,	522	DIPLECOLOBEÆ ,	55
<i>Dactylium</i> ,	930	<i>Diplocamium</i> ,	549
<i>Dædalea</i> ,	794, 1048	<i>Diplopappus</i> ,	265
<i>Daltonia</i> ,	553	<i>Diplotaxis</i> ,	53
<i>Damasonium</i> ,	438	DIPSACEÆ ,	255
<i>Danthonia</i> ,	514	<i>Dipsacus</i> ,	257
<i>Danthonia</i> ,	ibid.	<i>Dissodon</i> ,	578
<i>Daphne</i> ,	406	<i>Ditiola</i> ,	737
<i>Daphne</i> ,	ibid.	<i>Dodecatheon</i> ,	385
<i>Datura</i> ,	339, 1004	<i>Donax</i> ,	520
DAUCINEÆ ,	215	<i>Doronicum</i> ,	263
<i>Daucus</i> ,	215, 1002	<i>Doronicum</i> ,	264, 266
<i>Dawsonia</i> ,	943, 945	<i>Dorycnium</i> ,	136
<i>Decandolia</i> ,	503	<i>Dothidea</i> ,	713, 1016, 1043
<i>Delesseria</i> ,	945	<i>Dothidea</i> ,	680
<i>Delesseria</i> ,	944, 945, 949	<i>Draba</i> ,	35, 1023
<i>Delisella</i> ,	964	<i>Draba</i> ,	35, 37, 55
<i>Delphinium</i> ,	15	<i>Dracocephalum</i> ,	374
		<i>Draparnaldia</i> ,	980
		<i>Draparnaldia</i> ,	979

INDEX.

1057

Drepania,	305	Erineum,	909, 1019
Drepanophyllum,	232	Erineum,	909, 929
Drosera,	68, 1025	Erinus,	347
DROSERACEÆ,	68	Eriolepis,	287
DRYADEÆ,	165	Eriophorum,	487
Dryas,	ibid.	Erodium,	103, 1001, 1008
Dufourea,	619	Erophila,	36, 1023
Dumontia,	941	Ervum,	153, 1002, 1026
Dumontia,	962	Eruga,	53
E.		Erucaria,	54
EBENACEAE,	320	Eryngium,	243
Echinella,	990	Erysimum,	45, 995, 1024
Echinella,	989, 991	Erysimum,	28
Echinochloa,	506	Erysiphe,	868
Echinophora,	241	Erythronium,	463
Echinops,	281	EUHEDYSAREÆ,	148
Echium,	332, 1004, 1011	Eupatorium,	259, 1030
Ectocarpus,	971	Euphorbia,	412, 1005, 1011
Ectocarpus,	972	EUPHORBIACEAE,	411
Ectosperma,	973-975	Euphrasia,	354
Ectostroma,	726, 876	Eurotium,	ibid.
Elachistea,	972	Eustegia,	916
ELAEAGNEAE,	409	Evernia,	717, 1043
Elæagnus,	ibid.	EVONYMEÆ,	109
Elaphomyces,	853	Evonymus,	110
Elatine,	81	Exacum,	328
Eleocharis,	485	Excipula,	736, 754
Eleusine,	522	Exidia,	731
Elychrysum,	270	Exosporium,	882, 1019
Elymus,	531	F.	
Elyna,	488	Faba,	150
Empetrum,	316	Fabronia,	563
Enarthrocarpus,	1024	Fœniculum,	236
Encælium,	956, 957, 960	Fagus,	428
Encalypta,	572	Farsetia,	33
Endocarpon,	593	Fedia,	253
ENDOGENÆ CRYPTOGAMÆ,	533	Ferula,	222
ENDOGENÆ PHANEROGAMÆ,	435	Ferulago,	223
Enodium,	520	Festuca,	ibid.
Entosthodon,	570	Festuca,	517, 999, 1013
Ephedra,	432	Fibrillaria,	521, 524
Epilobium,	187	Ficaria,	878
Epimedium,	19	FICOIDEAE,	12
Epipactis,	449	Ficus,	205
Epipogium,	450	Filago,	419
Epochnium,	925	FILICES,	270
EQUISETACEAE,	534	Fimbristylis,	536
Equisetum,	ibid.	Fissidens,	485
Eragrostis,	525	Fistulina,	563, 567, 568, 574
Eranthis,	14	Flabellaria,	780
Erianthus,	500	FLORIDEÆ,	956
Erica,	317, 998, 1004, 1011	Fontinalis,	941
ERICACEÆ,	316	Fontinalis,	553
ERICINEAE,	ibid.	Fragaria,	573
Erigeron,	265	Fragillaria,	168, 996
Erinacea,	942	Fragillaria,	989
		Fragillaria,	ibid.

INDEX.

<i>Frankenia</i> ,	70	<i>Gladiolus</i> ,	452
FRANKENIACEAE ,	<i>ibid.</i>	<i>Glaucium</i> ,	22
<i>Fraxinus</i> ,	322, 1004	<i>Glaux</i> ,	385
<i>Fritillaria</i> ,	462, 1006	<i>Glechoma</i> ,	367
<i>Frustulia</i> ,	991	<i>Glechoma</i> ,	<i>ibid.</i>
FUCACEÆ ,	935	<i>Globularia</i> ,	386
<i>Fucus</i> ,	937, 1020	GLOBULARIEAE ,	<i>ibid.</i>
<i>Fucus</i> , 936, 945, 955, 957, 959, 965,		<i>Gloionema</i> ,	986
966.		<i>Glyceria</i> ,	525
FULIGINEÆ ,	862	<i>Glycyrrhiza</i> ,	139
<i>Fuligo</i> ,	863	<i>Gnaphalium</i> ,	268, 1010
<i>Fumago</i> ,	930	<i>Gomphonema</i> ,	991
<i>Fumaria</i> ,	25, 1007	<i>Gomphus</i> ,	798
<i>Fumaria</i> ,	25	<i>Goniosporum</i> ,	926
FUMARIAE ,	24	<i>Goodyera</i> ,	448
<i>Funaria</i> ,	548, 1036	<i>Gouffeia</i> ,	84
<i>Funaria</i> ,	570	GRAMINEAE ,	499
FUNGI ,	728	<i>Grammarthron</i> ,	264
FUNGINEÆ ,	732	<i>Grammita</i> ,	965, 966
<i>Furcellaria</i> ,	939	<i>Grammitis</i> ,	537
<i>Fusarium</i> ,	880	<i>Grammitis</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Fusarium</i> ,	729, 926	GRANATEAE ,	183
<i>Fusidium</i> ,	880, 926	<i>Graphiola</i> ,	727
<i>Fusisporium</i> ,	925	<i>Graphis</i> ,	642, 643
		<i>Grateloupella</i> ,	968
		<i>Grateloupia</i> ,	942
		<i>Gratiola</i> ,	342
G.		<i>Gregoria</i> ,	383
<i>Gagea</i> ,	467	<i>Griffithsia</i> ,	968
<i>Gaillardotella</i> ,	961	<i>Grimmia</i> ,	574, 1038
<i>Gaillona</i> ,	969	<i>Grimmia</i> ,	567, 570-572
<i>Gaillonella</i> ,	989	GROSSULARIEAE ,	206
<i>Gaillonella</i> ,	986	<i>Guepinia</i> ,	39, 730
<i>Galactites</i> ,	289	<i>Gyalecta</i> ,	663, 666, 670
<i>Galanthus</i> ,	457	<i>Gymnadenia</i> ,	442
<i>Galega</i> ,	139	<i>Gymnosporangium</i> ,	881
GALEGEÆ ,	139	<i>Gymnosporangium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Galeobdolon</i> ,	364	<i>Gymnostomum</i> ,	579, 1038
<i>Galeopsis</i> ,	365	<i>Gymnostomum</i> ,	579
<i>Galium</i> , 247, 997, 1003, 1009, 1029		<i>Gypsophila</i> ,	71
<i>Garidella</i> ,	15	<i>Gyrocephalus</i> ,	730, 757
<i>Gastridium</i> ,	505, 941, 950, 956	<i>Gyrophora</i> ,	595
<i>Catryona</i> ,	300		
<i>Gaudinia</i> ,	513		
<i>Gaya</i> ,	1027		
<i>Geastrum</i> ,	853		
<i>Gelidium</i> ,	948		
<i>Genista</i> , 115, 996, 1001, 1008, 1025			
<i>Genista</i> ,	115, 118		
GENISTÆ ,	115		
<i>Gentiana</i> .	325, 998, 1004		
GENTIANAE ,	325		
<i>Geoglossum</i> ,	761		
<i>Geotrichum</i> ,	919		
GERANIACEAE ,	101		
<i>Geranium</i> ,	101, 996, 1001		
<i>Geropogon</i> ,	306		
<i>Geum</i> ,	165		
<i>Gifola</i> ,	269		
<i>Gigartina</i> ,	952		
<i>Gigartina</i> ,	950, 953, 954, 964		
		H.	
		<i>Hagea</i> ,	199
		<i>Halidrys</i> ,	937, 938
		<i>Haliseris</i> ,	954
		HALORAGEAE ,	190
		<i>Halymenia</i> ,	941
		<i>Halymenia</i> ,	941, 950
		<i>Haplaria</i> ,	920
		<i>Haplotrichum</i> ,	919
		<i>Hedera</i> ,	244, 1029
		HEDERACEAE ,	244
		<i>Hedwigia</i> ,	579
		<i>Hedwigia</i> ,	<i>ibid.</i>
		HEDYSAREÆ ,	144
		<i>Hedysarum</i> ,	148, 1002, 1009
		<i>Heleochnloa</i> ,	509

INDEX.

1059

Helianthemum,	58, 995, 1000	Hydrocotyle,	243
Helianthus,	280	HYDROCOTYLINAE,	<i>ibid.</i>
Helicosporium,	929	Hydrodryction,	984
Heliotropium,	331	Hydrogastrum,	975
HELLEBOREÆ,	13	Hydrurus,	963
Helleborus,	14	Hygrocrocis,	988
<i>Helleborus</i> ,	<i>ibid.</i>	Hymenella,	728, 1044
Helminthia,	300	<i>Hymenophallus</i> ,	851
Helmisporium,	929	<i>Hymenophyllum</i> ,	541
<i>Helonias</i> ,	474	Hyoscyamus,	339, 1004
<i>Helopodium</i> ,	626	Hyoseris,	309
Helosciadium,	235, 1028	Hypecoum,	23, 1007
Helotium,	755	HYPERICINEÆ,	96
<i>Helotium</i> ,	738	Hypericum,	<i>ibid.</i>
Helvella,	755, 1016	<i>Hypha</i> ,	934
<i>Helvella</i> ,	755, 759, 760	Hypnæa,	951
HELVELLACEÆ,	733	Hypnum,	554, 1013, 1037
Helxine,	418	<i>Hypnum</i> ,	554, 563
HEMEROCALLIDEÆ,	471	Hypocharis,	306
Hemerocallis,	<i>ibid.</i>	<i>Hypoderma</i> , 705, 709, 719, 720, 721,	
<i>Hemerocallis</i> ,	464	726, 736.	
Hepatica,	6	<i>Hypodermium</i> ,	885
HEPATICAE,	584	HYPOXYLA,	677
<i>Hericium</i> ,	777	Hippocratea,	147
<i>Herminium</i> ,	447	Hyssopus,	363
Herniaria,	197	Hysterium,	718, 1016, 1043
Hesperis,	43, 1000, 1008	<i>Hystrium</i> , 639, 701, 705, 706, 718,	
<i>Hesperis</i> ,	29, 30, 42, 45	721, 734, 736.	
Heterographa,	641	I.	
Heteropogon,	500	Iberis,	39, 1000, 1007
Heterosphæria,	707	<i>Ilea</i> ,	957
Hibiscus,	93	Hex,	110
Hieracium,	301, 998, 1004, 1010	ILLECEBREÆ,	197
<i>Hieroehloa</i> ,	512	Illecebrum,	197, 1009
Himantia,	935, 1019	Illosporium,	876
<i>Himanitia</i> ,	716, 921, 923, 924, 935	Imbricaria,	601-607
Himanthalia,	939	Impatiens,	106
HIPPOCASTANEAE;	99	<i>Imperata</i> ,	500
Hippophae,	409	Imperatoria,	222
HIPPURIDEÆ,	191	<i>Imperatoria</i> ,	224, 231
Hippuris,	<i>ibid.</i>	Inula,	267, 997
Holcus,	499	<i>Inula</i> ,	264, 265
<i>Holcus</i> ,	512	<i>Iridæa</i> ,	944
Holosteum,	81	IRIDEÆ,	451
HOMALOPHYLLÆ,	592	<i>Iris</i> ,	451, 1006
<i>Homogyne</i> ,	260	<i>Isaria</i> ,	378
Hookeria,	554	<i>Isaria</i> ,	877, 879
Hordeum,	531	ISATIDEÆ,	49
Hottonia,	379	Isatis,	49, 995
Humulus,	419	Isidium,	634
Hutchinsia,	38, 1020	Isnardia,	189
<i>Hutchinsia</i> ,	964-969	Isoetes,	543
Nyacinthus,	466	ISOETIDEÆ,	543
Hydnium,	774, 1017	<i>Isolepis</i> ,	485, 486
<i>Hydnium</i> ,	774, 785, 789, 793, 878	Isopyrum,	14
HYDROCARYES,	189	Ixia,	453
HYDROCHARIDEÆ;	435	Jastione,	311
Hydrocharis,	436		
Hydroclathrus.	960		

J.

INDEX.

JASMINEAE,

Jasminum,

JUGLANDEAE,

Juglans,

JUNCAGINEÆ,

JUNCEAE,

Juncus,*Jungermannia*,

JUNGERMANNIEAE;

Juniperus,

JUSSIEÆ,

K.

Kentrophyllum,*Klasea*,*Knappia*,*Knautia*,*Kobresia*,*Kochia*,*Koeleria*,

L.

LABIATAE,

Labrella,*Lactuca*,*Lagenaria*,*Lagurus*,*Lamarckia*,*Laminaria*,

LAMINARIEÆ,

Lamium,*Lampsana*,*Lamyra*,*Lappa*,*Larbrea*,*Larix*,*Laserpitium*,*Laserpitium*;*Lasiobotrys*,*Lathræa*,*Lathyrus*,*Laureucia*,*Laurencia*,

LAURINEAE,

Laurus,*Lavandula*,*Lavatera*,*Leangium*,*Lecanora*,*Lecanora*, 604-607, 610, 635, 648, 653,*658, 662, 671, 673, 674.**Lecidea*, 595, 596, 638, 645, 647-657,*658, 661, 663, 665, 666, 668-671.**Leda*,*Ledum*,*Leersia*,

LEGUMINOSAE,

Lemanea,*Lemanea*,*Lemna*,

LEMNACEAE,

ibid.

LENTIBULARIEAE,

*ibid.**Leocarpus*,*ibid.**Leontodon*,*ibid.**Leontopodium*,*ibid.**Leonurus*,*ibid.**Leotia*,*ibid.**Leotia*,*ibid.**Lepicaune*,*ibid.*

LEPIDINEÆ,

*ibid.**Lepidium*,*ibid.**Lepidium*,*ibid.**Lepra*,*ibid.**Lepra*,*ibid.**Lepraria*,*ibid.**Leptodon*,*ibid.**Leptomitus*,*ibid.**Leptomitus*,*ibid.**Leptostroma*,*ibid.**Leptothyrium*,*ibid.**Lerouxia*,*ibid.**Leskeia*,*ibid.**Leucodon*,*ibid.**Leucoium*,*ibid.**Leuzea*,*ibid.**Levisticum*,*ibid.**Licea*,*ibid.**Licea*,*ibid.*

LICHENES,

*ibid.**Lichina*,*ibid.**Ligusticum*,*ibid.**Ligusticum*,*ibid.**Ligustrum*,*ibid.**Lilac*,*ibid.*

LILACEÆ,

*ibid.**Lilium*,*ibid.**Limbara*,*ibid.**Limboria*,*ibid.**Limnetis*,*ibid.**Limodorum*,*ibid.**Limodorum*,*ibid.**Limosella*,*ibid.**Linaria*,*ibid.**Linckia*,*ibid.**Lindernia*,*ibid.*

LINEAE,

*ibid.**Linæa*,*ibid.**Linum*,*ibid.**Linum*,*ibid.**Liparis*,*ibid.**Listera*,*ibid.**Lithospermum*,*ibid.**Littorella*,*ibid.**Lebaria*,*ibid.**Lobelia*,*ibid.**Læfflingia*,*ibid.**Logfia*,*ibid.**ibid.*

378

858

307

270

364

758

759, 760

263, 295, 303

47

48, 1000, 1008

39

677

635, 648, 653

676

563

988

987

726

ibid.

380

554-556, 560, 562

562

467

288

224

861

ibid.

593

948

229

231

322

ibid.

461

462

267

639

527

450, 1012

450

348

343, 1004, 1005, 1011

INDEX.

<i>Loiseleuria</i> ,	319	<i>Medicago</i> , 123, 996, 1002, 1008, 1009,
<i>Lolium</i> ,	531	1025.
<i>Lomentaria</i> ,	949	<i>Meesia</i> ,
<i>Lonas</i> ,	278	549
<i>Lonicera</i> ,	245	<i>Megastachia</i> ,
<i>Lophium</i> ,	717	525
<i>Lophium</i> ,	707	<i>Melampyrum</i> ,
<i>Lophodermium</i> ,	720	351
LORANTHEAE ,	246	MELANCONIEÆ ,
<i>Loroglossum</i> ,	446	881
LOTEÆ ,	115	<i>Melanconium</i> ,
<i>Lotus</i> ,	137, 1009	884
<i>Lotus</i> ,	136, 138	<i>ibid.</i>
<i>Lunaria</i> ,	33	<i>Melia</i> ,
<i>Lunulina</i> ,	991	100
<i>Lupinus</i> ,	160	MELIACEAE ,
<i>Luzula</i> ,	478	510
<i>Lychnis</i> ,	78	<i>Melica</i> ,
<i>Lycium</i> ,	337	128, 1009, 1026
<i>Lycogala</i> ,	362	<i>Melilotus</i> ,
<i>Lycogala</i> ,	<i>ibid.</i>	374
LYCOPERDACEAE ,	851	<i>Melissa</i> ,
LYCOPERDEÆ ,	852	33
LYCOPERDINEÆ ,	<i>ibid.</i>	<i>Melittis</i> ,
<i>Lycoperdon</i> ,	854	<i>Meloseira</i> ,
<i>Lycoperdon</i> ,	853-854	989
<i>Lycopersicum</i> ,	338	<i>Menispora</i> ,
LYCOPODIACEAE ,	543	928
LYCOPODIEÆ ,	<i>ibid.</i>	<i>Mentha</i> ,
<i>Lycopodium</i> ,	334, 1004	371
<i>Lycopsis</i> ,	359	<i>Meayanthes</i> ,
<i>Lycopus</i> ,	987	325
<i>Lyngbya</i> ,	986	<i>Menziezia</i> ,
LYNGBYEÆ ,	380, 987	318
<i>Lysimachia</i> ,	380	<i>Mercurialis</i> ,
<i>Lysimachia</i> ,	192	417
LYTHRARIEAE ,	192	<i>Merendera</i> ,
<i>Lythrum</i> ,	192, 1026	473
M.		
<i>Malaxis</i> ,	450, 1034	<i>Meridion</i> ,
<i>Malcomia</i> ,	42	991
<i>Malope</i> ,	91	<i>Merisma</i> ,
<i>Malus</i> ,	181	766
<i>Malva</i> ,	91, 1008, 1025	<i>Merulius</i> ,
MALVACEAE ,	90	796
<i>Marcelia</i> ,	278	<i>Merulius</i> ,
<i>Marchantia</i> ,	591, 1007	797-800, 855
<i>Marchantia</i> ,	590	<i>Mesembrianthemum</i> ,
<i>Marrubium</i> ,	364, 1005	205
<i>Marsilea</i> ,	542	<i>Mesogloia</i> ,
MARSILEACEAE ,	<i>ibid.</i>	962
MARSILEÆ ,	542	<i>Mespilus</i> ,
<i>Maruta</i> ,	273	180
<i>Mathiola</i> ,	26	<i>Mespileus</i> ,
<i>Matricaria</i> ,	273	230, 1027
<i>Mayanthemum</i> ,	459	<i>Meum</i> ,
<i>Mays</i> ,	499	527
<i>Meconopsis</i> ,	22	<i>Mibora</i> ,
		992
		<i>Microcoleus</i> ,
		270
		<i>Micropus</i> ,
		549
		<i>Micropus</i> ,
		552
		<i>Milium</i> ,
		199
		<i>MINUARTIEÆ</i> ,
		293
		<i>Mitina</i> ,
		759
		<i>Mitrula</i> ,
		549-552
		<i>Mnium</i> ,
		81
		<i>Möhringia</i> ,
		<i>ibid.</i>
		<i>Molinia</i> ,
		519, 520
		<i>Molopospermum</i> ,
		231
		<i>Moluccella</i> ,
		363
		<i>Momordica</i> ,
		186
		<i>Monema</i> ,
		986
		<i>Monerma</i> ,
		527
		<i>Monilia</i> ,
		915, 918, 920, 931, 932
		984
		MONOCHLAMYDEÆ ,
		387
		MONOCOTYLEDONEÆ ,
		435
		<i>Monotropa</i> ,
		319
		MONOTROPEAE ,
		<i>ibid.</i>
		<i>Montia</i> ,
		195
		<i>Morea</i> ,
		452
		<i>Morchella</i> ,
		757
		<i>Morchella</i> ,
		758
		<i>Morus</i> ,
		419
		<i>Mougeotia</i> ,
		977

INDEX.

MUCEDINEAE,	909	O.	
<i>Mucor</i> ,	914	<i>Ocymum</i> ,	375
MUCOREÆ,	912	<i>Oenanthe</i> ,	236, 1028
<i>Muscari</i> ,	466	<i>Oenanthera</i> ,	188
MUSCI,	545	<i>Oidium</i> ,	931
<i>Myagrum</i> ,	49	<i>Oidium</i> ,	925
<i>Myagrum</i> ,	37, 47	<i>Olea</i> ,	321
<i>Mycelis</i> ,	297	<i>Oligotrichum</i> ,	546
<i>Mycinema</i> ,	772	<i>Omalocline</i> ,	305
<i>Mycobanche</i> ,	925	<i>Oligosporus</i> ,	277
<i>Mycoderma</i> ,	988	ONAGRÆ,	187
<i>Mycogone</i> ,	917	ONAGRARIAE,	<i>ibid.</i>
<i>Myosotis</i> ,	335	<i>Onobrychis</i> ,	148
<i>Myosurus</i> ,	7	<i>Ononis</i> ,	119, 1002, 1008
<i>Myrica</i> ,	430	<i>Onopordum</i> ,	282, 1003, 1010
<i>Myricaria</i> ,	194	<i>Onosma</i> ,	334
MYRICEÆ,	430	<i>Onotrophe</i> ,	286, 287
<i>Myriophyllum</i> ,	190	<i>Onygena</i> ,	856
<i>Myriostoma</i> ,	853	<i>Opegrapha</i> ,	639, 1014
<i>Myrrhis</i> ,	240	<i>Opegrapha</i> ,	643, 648, 734
MYRTACEAE,	183	<i>Ophrys</i> ,	446, 1006, 1012
MYRTEÆ,	184	OPHIOGLOSSEÆ,	536
<i>Myrtus</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Ophioglossum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Myxosporium</i> ,	885	<i>Ophiurus</i> ,	527
N.		<i>Opopanax</i> ,	222
<i>Næmaspora</i> ,	712, 724, 725	ORCHIDÆAE,	442
<i>Narcissus</i> ,	454, 1006, 1012	<i>Orchis</i> ,	442, 1012, 1034
<i>Nardosmia</i> ,	261	<i>Orgya</i> ,	940
<i>Nardus</i> ,	527	<i>Origanum</i> ,	375, 1005
<i>Nasturtium</i> ,	27	<i>Orlaya</i> ,	215
<i>Nayas</i> ,	441	<i>Ormenis</i> ,	273
<i>Neckera</i> ,	553, 1036	<i>Ornithogalum</i> ,	467, 1034
<i>Neckera</i> ,	553	<i>Ornithogalum</i> ,	467
<i>Nemalion</i> ,	959	<i>Ornithopus</i> ,	146
<i>Nemaspora</i> ,	885	<i>Ornithopus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Nematoplate</i> ,	989	<i>Orobanche</i> ,	348, 1011
<i>Neottia</i> ,	448	OROBANCHEÆ,	348
<i>Neottia</i> ,	449	<i>Orobus</i> ,	158
<i>Nepeta</i> ,	369	<i>Orobus</i> ,	150
<i>Nephroma</i> ,	597	ORONTIACEÆ,	481
<i>Nerium</i> ,	324	ORTHOPLOCEÆ,	50
<i>Neslia</i> ,	47	<i>Orthotrichum</i> ,	576, 1038
<i>Nicotiana</i> ,	339	<i>Orvala</i> ,	366
<i>Nidularia</i> ,	863	<i>Oscillaria</i> ,	993
<i>Nigella</i> ,	15, 1023	OSCILLARIEÆ,	991
<i>Nigritella</i> ,	442	<i>Oscillatoria</i> ,	973, 987, 992-994
<i>Nitella</i> ,	534	<i>Osmunda</i> ,	536
<i>Nodularia</i> ,	978	OSMUNDACEÆ,	<i>ibid.</i>
<i>Nonea</i> ,	333, 1004	<i>Osyris</i> ,	408
NOPALEAE,	205	OXALIDEÆ,	106
<i>Nostoc</i> ,	960, 1020	<i>Oxalis</i> ,	106
<i>Notobasis</i> ,	287	<i>Oxyria</i> ,	403
NOTORHIZÆ,	42	<i>Oxytropis</i> ,	140
<i>Nuphar</i> ,	20	<i>Ozonium</i> ,	934
NYCTAGINEAE,	393	<i>Ozonium</i> ,	760, 923
<i>Nyctago</i> ,	<i>ibid.</i>	P.	
<i>Nymphaea</i> ,	20	<i>Padina</i> ,	955
<i>Nymphaea</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Paeonia</i> ,	18
NYMPHAEACEAE,	<i>ibid.</i>	<i>Pæoniaceæ</i> ,	<i>ibid.</i>

INDEX.

1063

<i>Paleya</i> ,	295	<i>Phalangium</i> ,	464
<i>Paliurus</i> ,	111	<i>Phalaris</i> ,	507
<i>PALMAE</i> ,	480	<i>Phalaris</i> ,	509, 521
<i>Palmella</i> ,	963	<i>Phallus</i> ,	850
<i>Palmella</i> ,	677, 771, 963	<i>Phascum</i> ,	582, 1038, 1039
<i>Pancratium</i> ,	454	PHASEOLEÆ ,	159
<i>Panicum</i> ,	506, 999	<i>Phaseolus</i> ,	160
<i>Papuaria</i> ,	606	PHILADELPHÆ ,	184
<i>Pannaria</i> ,	655	<i>Philadelphus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Papaver</i> ,	21	<i>Phlebia</i> ,	773
<i>Papaver</i> ,	<i>ibid.</i>	<i>Phlebia</i> ,	<i>ibid.</i>
PAPAVERACEÆ ,	<i>ibid.</i>	<i>Phleum</i> ,	508
PAPILIONACEÆ ,	114	<i>Phleum</i> ,	507-509
<i>Parietaria</i> ,	418	<i>Phlomis</i> ,	364
<i>Paris</i> ,	459	<i>Phoma</i> ,	727
<i>Parmelia</i> ,	600, 1013	<i>Phragmidium</i> ,	886
<i>Parmelia</i> , 600, 604, 606-608, 615,	658, 660, 662, 670, 671, 673.	<i>Phragmites</i> ,	520
<i>Parnassia</i> ,	68	<i>Phragmotrichum</i> ,	881
<i>Paronychia</i> ,	198	<i>Phyllerium</i> ,	909
<i>Paronychia</i> ,	197	PHYLLERIEÆ ,	<i>ibid.</i>
PARONYCHIEÆ ,	196	<i>Phyllirea</i> ,	321
<i>Paspalum</i> ,	500	<i>Phyllosticta</i> ,	711
<i>Pastinaca</i> ,	220	<i>Phymatium</i> ,	853
<i>Pastinaca</i> ,	222	<i>Physalis</i> ,	338
<i>Patellaria</i> ,	647, 1007	<i>Physarum</i> ,	860, 1017
<i>Patellaria</i> , 607, 609, 638, 639, 642,	662-670, 676.	<i>Physarum</i> ,	858
<i>Patellaria</i> Fr. non Hoffm.	754	<i>Physcia</i> ,	611
PEDICULARINEÆ ,	351	<i>Physcia</i> ,	613, 614
<i>Pedicularis</i> ,	352, 998	<i>Phyteuma</i> ,	311, 998, 1004
<i>Peltidea</i> ,	597, 598	<i>Phytolacca</i> ,	399
<i>Peltigera</i> ,	596	PHYTOLACEÆ ,	<i>ibid.</i>
<i>Penicillaria</i> ,	760	<i>Picnomon</i> ,	286
<i>Penicillium</i> ,	918	<i>Picridium</i> ,	295
<i>Penicillium</i> ,	920	<i>Picris</i> ,	300
<i>Pennisetum</i> ,	506	<i>Pilidium</i> ,	725
<i>Peplis</i> ,	193	<i>Pilobolus</i> ,	912
<i>Perichaëna</i> ,	861	<i>Pilularia</i> ,	542
<i>Periconia</i> ,	877	<i>Pimpinella</i> ,	228
<i>Persica</i> ,	162	<i>Pimpinella</i> ,	233
<i>Pertusaria</i> ,	672	<i>Pingnacula</i> ,	378, 1005
<i>Pertusaria</i> ,	633, 674	<i>Pinus</i> ,	433, 1006, 1012
<i>Petrocallis</i> ,	35	<i>Piptatherum</i> ,	505
<i>Petroselinum</i> ,	232	<i>Pistacia</i> ,	113
PEUCEDANEÆ ,	219	<i>Pistillaria</i> ,	761
<i>Peucedanum</i> ,	220, 996, 1027	<i>Pistillaria</i> ,	730
<i>Peucedanum</i> ,	230	<i>Pisum</i> ,	154
<i>Peziza</i> , 739, 1016, 1017, 1045, 1046	140, 996	<i>Placodium</i> ,	660
<i>Peziza</i> ,	707, 732-738, 755	<i>Placodium</i> ,	606
<i>Phaca</i> ,	140, 996	PLANTAGINEÆ ,	390
PHACIDIACEÆ ,	718	<i>Plantago</i> ,	390, 1011, 1032
<i>Phacidium</i> ,	721	PLATANEÆ ,	430
<i>Phacidium</i> ,	707, 725, 727, 736	<i>Platanus</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Phacorrhiza</i> ,	761	<i>Platanthera</i> ,	446
<i>Phacorrhiza</i> ,	760	<i>Platygramma</i> ,	643
<i>Phæcasium</i> ,	297	<i>Pleuridium</i> ,	582
<i>Phænixopus</i> ,	<i>ibid.</i>	PLEURORHIZEÆ ,	26
<i>Phagnalon</i> ,	267	<i>Pleurospermum</i> ,	242
		<i>Plocamium</i> ,	949
		PLUMBAGINEÆ ,	387

INDEX.

Plumbago,	387	Pterigynandrum,	556, 560, 574
Poa,	523, 999, 1007, 1013, 1035	Pteris,	540
Poa,	510, 518, 520, 522	Pteris,	541
Podisma,	881	Pterogonium,	563
Podospermum,	308, 997	Pteroneurum,	32
Pohlia,	531, 552	Pterotheca,	299
POLEMONIDEAE,	329	Ptilota,	949
Polemonium,	ibid.	Ptychostomum,	549
Pollinia,	499	Ptychotis,	235
Polyactis,	920, 921	Puccinia,	887, 1020
Polyanthes,	472	Puccinia,	886
POLYCARPÆ,	199	Pulicaria,	268
Polycarpon,	ibid.	Pulmonaria,	333
Polyenemum,	394	Punica,	183
Polygala,	69	Pycnothelia,	620
POLYGALÆ,	ibid.	Pyrenium,	729
POLYGONEAE,	400	Pyrenotea,	639, 645
Polygonum,	403	Pyrenula,	645-647
Polyides,	953	Pyrethrum,	272
POLYPODIACEÆ,	537, 1013	Pyrola,	317
Polypodium,	538	Pyrola,	ibid.
Polypondium,	508	Pyrus,	181
Polyporus,	784, 1017	Pyrus,	182
Polyporus,	794		
Polysaccum,	852	Q.	
Polysiphonia,	965	QUERCINEÆ,	428
Polystichum,	538, 1007	Quercus,	428, 1006, 1012
Polystigma,	680, 714	R.	
Polythryucium,	927	Racodium,	928
Polytrichum,	545, 1000	Racodium,	778, 914-916, 922, 933
POMACEÆ,	179	Radiola,	90
Populus,	427	Ramalina,	613
Porcellites,	306	Ramalina,	611
Porina,	643, 672	Ramondia,	339
Porophora,	672	RANUNCULACEAE,	2
Porphyra,	958	RANUNCULEÆ,	7
Portulaca,	195	Ranunculus,	8, 1007, 1022
PORTULACEAE,	ibid.	RAPHANEÆ,	54
POTAMEAE,	439	Raphanus,	54, 1000
Potamogeton,	439, 999, 1006, 1012,	Raphanus,	51
	1034.	Rapistrum,	54
Potamogeton,	150	Reseda,	66
Potentilla,	168, 996, 1002, 1009	Reseda,	67
Prasium,	376	RESEDACEAE,	66
Prenanthes,	297	Reticularia,	862
Primula,	383, 999	Reticularia,	861, 863
Primula,	383	Rhagadiolus,	298
PRIMULACEAE,	379	RHAMNEÆ,	110
Prismatocarpus,	312, 1031	Rhamnus,	111, 1008, 1025
Prolifera,	983, 984	Rhaponticum,	289
Prunus,	163, 164	RHINANTHACEAE,	351
Prunus,	502	Rhinanthus,	353
Psamma,	926	Rhizina,	755
Psilonia,	657, 1014	Rhizocarpon,	656, 657
Psora,	139	Rhizoctonia,	867
Psoralea,	113	Rhizomorpha,	867, 1018
PTELEACEÆ,	563	Rhizomorpha,	679, 934, 992
Pterigynandrum,		Rhizopogon,	866
		Rhododendron,	319, 1004

INDEX.

Rhodomela,	964	Satureia,	370
<i>Rhodomela</i> ,	946, 949	Saussurea,	285
RHODORACEÆ,	318	Saxifraga,	207
Rhus,	113	SAXIFRAGEAE,	<i>ibid.</i>
<i>Rhynchosporu</i> ,	484	Scabiosa,	255, 1009
Rhytisma,	723	<i>Scabiosa</i> ,	257
Ribes,	206	SCANDICINEÆ,	238
Riccia,	592	Scandix,	240
Ricinus,	412	<i>Schænodoru</i> s,	518-520
<i>Ricnophora</i> ,	774	Schænus,	484
Rivularia,	961, 1000	Scheuchzeria,	438
<i>Rivularia</i> ,	959, 962, 963	Schismus,	521
Robertia,	305	Schistidium,	579, 581
Robinia,	139	Schizoderma,	885
Roccella,	614, 1007	<i>Schizoderma</i> ,	720
Roemeria,	22	Schizonema,	985, 1021
Røstelia,	902	Schizophyllum,	796
<i>Romulea</i> ,	453	Schmidtia,	305
Rosa,	175, 1009	<i>Schyzoxylon</i> ,	639
ROSACEÆ,	162	Scilla,	464, 1006
ROSEÆ,	175	Scirpus,	485, 1012, 1035
Rosmarinus,	359	<i>Scirpus</i> ,	484
Rottbolla,	527	SCLERANTHEÆ,	399
Rubia,	247	Scleranthus,	<i>ibid.</i>
RUBIACEÆ,	<i>ibid.</i>	<i>Sclerochloa</i> ,	522, 523
Rubus,	167, 996	Scleroderma,	852
Rumex,	400, 1005, 1011	<i>Scleroderma</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Rumex</i> ,	403	Scleroglossum,	729
<i>Rubigo</i> ,	911, 912	<i>Sclerophora</i> ,	636
Ruppia,	440	SCLEROTIACEÆ,	867
Ruscus,	460	Sclerotium,	872, 1018
Ruta,	108, 1001	Sclerotium,	726, 875
RUTACEÆ,	108	<i>Scolochloa</i> ,	520
S.		Scolopendrium,	540, 1007
Saccharum,	500	Scolymus,	294
<i>Sagedia</i> ,	671	Scorpiurus,	145
Sagina,	80, 1008	Scorzonera,	308, 997, 1003, 1011
Sagittaria,	438	Serophularia,	346, 1004, 1032
SALICINEÆ,	423	Scutellaria,	376, 999
Salicornia,	395, 1005	<i>Scyphophorus</i> ,	628-633
Salix,	423, 1005, 1012	Scytonema,	936
<i>Salmacis</i> ,	975, 976	Seytosiphon,	957
Salsola,	395, 999	<i>Seytosiphon</i> ,	957, 958
Salvia,	360, 998, 1011	Secale,	530
Salvinia,	542	Securigera,	147
SALVINIEÆ,	<i>ibid.</i>	Sedum,	201, 996, 1002, 1009, 1026
SAMBUCINEÆ,	244	Selinum,	226
Sambucus,	<i>ibid.</i>	<i>Selinum</i> ,	221-224, 234, 235
Samolus,	385	Sempervivum,	204, 996
Sanguisorba,	174	Senebiera,	47
SANGUISORBEÆ,	173	Senecio,	261, 997, 1003, 1010
Sanicula,	242	<i>Sepedonium</i> .	925
SANICULEÆ,	<i>ibid.</i>	<i>Sepedonium</i> ,	<i>ibid.</i>
SANTALACEÆ,	408	Septaria,	885
Santolina,	278, 1010	Serapias,	448
Saponaria,	74, 1000	Seriola,	306
Sarcocapnos,	25	<i>Seriola</i> ,	305, 306
Sargassum,	936	Serratula,	284
		<i>Serratula</i> ,	289

INDEX.

<i>Seseli,</i>	234	<i>Sphaerobolus,</i>	865
<i>Seseli,</i>	231, 235	<i>Sphaerocarpus,</i>	592
SESELINÆ,	225	<i>Sphaerococcus,</i> 942-945, 947, 948, 949,	
<i>Sesleria,</i>	526, 1006, 1007	952, 953.	
<i>Sesleria,</i>	522	<i>Sphæronema,</i>	724
<i>Setaria,</i>	506	<i>Sphærophorus,</i>	618
<i>Sherardia,</i>	251	<i>Sphæroplethia,</i>	985
<i>Sibbaldia,</i>	173	<i>Sphagnum,</i>	581
<i>Sibthorpia,</i>	355	<i>Spicularia,</i>	732, 920, 921
<i>Sida,</i>	93	<i>Spiloma,</i>	642, 668, 675
<i>Sideritis,</i>	368	<i>Spinacia,</i>	399
<i>Sieversia,</i>	166	<i>Spiræa,</i>	164, 1002
<i>Silaus,</i>	230	SPIRÆACEÆ,	164
<i>Silene,</i> 75, 995, 1001, 1008, 1025		<i>Spiranthes,</i>	448
SILENEÆ,	71	SPIROLOBEÆ,	55
<i>Siler,</i>	218	<i>Splachnum,</i>	578
SILERINEÆ,	<i>ibid.</i>	<i>Splachnum,</i>	577, 578
<i>Silybum,</i>	283	<i>Spondylocladium,</i>	917
<i>Sinapis,</i>	52	<i>Spongicarpus,</i>	953
<i>Sinapis,</i>	53	<i>Spongodium,</i>	959
<i>Siphula,</i>	619	<i>Sporendonema,</i>	925
<i>Sison,</i>	233	<i>Sporidesmium,</i>	882
<i>Sistotrema,</i>	774	<i>Sporocephalum,</i>	919, 920
<i>Sistotrema,</i> 774, 778-780, 785, 789,		<i>Sporotrichum,</i>	716
793, 795.		<i>Sporochnus,</i>	953
SISYMBREÆ,	42	<i>Sporochnus,</i>	939, 971
<i>Sisymbrium,</i>	43, 1000, 1008	<i>Sporodinia,</i>	915
<i>Sisymbrium,</i>	27, 28, 30, 51, 53	<i>Sporophleum,</i>	927
<i>Sium,</i>	229	<i>Sporotrichum,</i>	921, 1019
<i>Sium,</i> 227, 232, 233, 235, 236		<i>Sporotrichum,</i>	676, 932
<i>Skitophyllum,</i>	554, 570	<i>Spumaria,</i>	863
<i>Smilax,</i>	459	<i>Squamaria,</i>	859
SMYRNEÆ,	240	<i>Stachylidium,</i>	916
<i>Smyrnium,</i>	240, 1002	<i>Stachys,</i>	367, 1005, 1011
SOLANEÆ,	337	<i>Stæhelina,</i>	293
<i>Solanum,</i>	<i>ibid.</i>	<i>Staphylea,</i>	109
<i>Solanum,</i>	338	STAPHYLEACEÆ,	<i>ibid.</i>
<i>Soldanella,</i>	385	<i>Statice,</i>	387, 1005, 1011, 1032
<i>Solenia,</i>	733	<i>Stegia,</i>	92
<i>Solenia,</i>	957, 958	<i>Stellaria,</i>	82, 1025
<i>Solidago,</i>	265, 1010, 1030	<i>Stellaria,</i>	82
<i>Solorina,</i>	596, 597	<i>Stellera,</i>	405
<i>Sonchus,</i>	295	<i>Stemmacantha,</i>	285
SOPHOREÆ,	115	<i>Stemonitis,</i>	857, 1017
<i>Sorbus,</i>	182	<i>Stereocaulon,</i>	618
<i>Sorghum,</i>	499	<i>Sticta,</i>	599
<i>Sparganium,</i>	482	<i>Stictis,</i>	733, 1016, 1044
<i>Spartina,</i>	527	<i>Stictis,</i>	728
<i>Spartium,</i>	115	<i>Stigmatidium,</i>	643
<i>Spathularia,</i>	761	<i>Stigonema,</i>	617
<i>Spergula,</i>	81, 1025	<i>Stilbospora,</i>	883
<i>Spermadermia,</i>	689	<i>Stilbospora,</i>	883-885
<i>Spermoëdia,</i>	872	<i>Stilbum,</i>	913
<i>Sphacelaria,</i>	964, 1007, 1020	<i>Stilbum,</i>	761
<i>Sphacelaria,</i>	972	<i>Stipa,</i>	505
<i>Sphæria,</i> 677, 1016, 1040, 1041, 1042		<i>Stipa,</i>	502
<i>Sphæria,</i> 639, 644, 713-717, 724, 725,		<i>Stratiotes,</i>	436
727, 735-737, 883, 929.		<i>Streptopus,</i>	458
SPHÆRIACEÆ,	677	<i>Stromatosphaeria,</i>	680-682

<i>Strongylium</i> ,	862	<i>Tilia</i> ,	94
<i>Sturmia</i> ,	527	TILIACEAE ,	<i>ibid.</i>
<i>Styllaria</i> ,	991	<i>Tillæa</i> ,	200
STYRACEÆ ,	320	<i>Timmia</i> ,	552
<i>Styrax</i> ,	ibid.	<i>Tiresias</i> ,	983
SUBULARIEÆ ,	.55	<i>Tofieldia</i> ,	474
<i>Subularia</i> ,	ibid.	TORDYLINEÆ ,	218
SUMACHINEÆ ,	113	<i>Tordylium</i> ,	219
<i>Swartzia</i> ,	566	<i>Tordylium</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Swertia</i> ,	325	<i>Torilis</i> ,	217, 1027
<i>Symphytum</i> ,	334	<i>Tomentilla</i> ,	169
<i>Syntherisma</i> ,	501	<i>Tortula</i> ,	563, 1013, 1037
<i>Syntrichia</i> ,	565	<i>Torula</i> ,	932
T.		<i>Torula</i> ,	921, 930
<i>Tagetes</i> ,	280	<i>Tozzia</i> ,	351
TAMARISCINEÆ ,	194	<i>Trachylia</i> ,	675
<i>Tamarix</i> ,	ibid.	<i>Trachynotia</i> ,	527
<i>Tamarix</i> ,	ibid.	<i>Tragopogon</i> ,	306
<i>Tamus</i> ,	460	<i>Tragus</i> ,	501
<i>Tanacetum</i> ,	278	<i>Trapa</i> ,	189
<i>Taphria</i> ,	912	<i>Trematodon</i> ,	570
<i>Taraxacum</i> ,	300	<i>Tremella</i> ,	730, 1016, 1020, 1044
<i>Targionia</i> ,	592	<i>Tremella</i> ,	728, 729, 732, 874
<i>Targionia</i> ,	ibid.	TREMELLINEÆ ,	728
TAXINEÆ ,	431	<i>Trentepohlia</i> ,	552, 934, 972, 973
<i>Taxus</i> ,	432	<i>Triblidium</i> ,	719, 735, 736
<i>Teesdalia</i> ,	39, 1024	<i>Tribulus</i> ,	107
TELEPHIEÆ ,	196	<i>Trichia</i> ,	859
<i>Telephium</i> ,	ibid.	TRICHIACEÆ ,	856
<i>Tendaridea</i> ,	976, 977	<i>Trichocrepis</i> ,	299
TEREBINTHACEÆ ,	112	<i>Trichoderma</i> ,	864
<i>Tetradontium</i> ,	577	<i>Trichoderma</i> ,	919, 924
<i>Tetragonolobus</i> ,	138	<i>Trichodesmium</i> ,	727
<i>Tetraphis</i> ,	577	<i>Trichodium</i> ,	503, 504
<i>Tetraspora</i> ,	958	<i>Trichostomum</i> ,	573, 1038
<i>Teucrium</i> ,	362, 1005	<i>Trichostomum</i> ,	564, 566, 567, 573
THALAMIFLORÆ ,	1	<i>Tricothecium</i> ,	924
<i>Thalictrum</i> ,	3	<i>Trientalis</i> ,	381
<i>Thamnidium</i> ,	915	TAIWANÆ ,	123
<i>Thapsia</i> ,	214	<i>Trifolium</i> ,	129, 996, 1001, 1009
THAPSIEÆ ,	213	<i>Triglochin</i> ,	438
<i>Thelebolus</i> ,	864	<i>Trigonella</i> ,	127
<i>Thelebolus</i> ,	748	<i>Trinia</i> ,	233
<i>Thelephora</i> ,	767, 1017, 1046, 1047	<i>Triodia</i> ,	515
<i>Thelephora</i> ,	766, 767, 773, 774, 797, 932, 933	<i>Triphragmium</i> ,	886
<i>Theligonum</i> ,	394	<i>Trisetum</i> ,	512, 513
<i>Thelotrema</i> ,	673	<i>Triticum</i> ,	528, 900
<i>Thelotrema</i> ,	672, 673	<i>Trochiscanthes</i> ,	230
<i>Thesanomitrion</i> ,	572	<i>Trollius</i> ,	14
<i>Thesium</i> ,	408	TROPÆOLEAE ,	105
<i>Thlaspi</i> ,	38, 1008	<i>Tropæolum</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Thlaspi</i> ,	48, 49	<i>Tuber</i> ,	866
THLASPIDEÆ ,	38	<i>Tuber</i> ,	<i>ibid.</i>
<i>Thorea</i> ,	977	<i>Tubercularia</i> ,	879, 1019
<i>Thrincia</i> ,	307	<i>Tubercularia</i> ,	876, 880
THYMELEAE ,	405	TUBERCULARIEÆ ,	877
<i>Thymus</i> ,	372, 999, 1005	<i>Tubulina</i> ,	862
		<i>Tulipa</i> ,	461

INDEX.

TULIPACEÆ,	461	VERBENACEAE,	377
<i>Tulostoma</i> ,	855	<i>Veronica</i> ,	355
<i>Turgenia</i> ,	216	VERONICEÆ,	<i>ibid.</i>
<i>Turritis</i> ,	28, 1007	<i>Verpa</i> ,	758
<i>Tossilago</i> ,	260	<i>Verrucaria</i> ,	644, 1015, 1040
<i>Tympanis</i> ,	737, 1016, 1044	<i>Verrucaria</i> ,	639, 650, 651
<i>Typha</i> ,	482	Verticillium,	916
TYPHACEAE,	<i>ibid.</i>	<i>Vesicaria</i> ,	34
<i>Typhula</i> ,	760	Vibrissa.	759
<i>Tyrimus</i> ,	283	Viburnum,	245
U.		<i>Vicia</i> ,	150; 1002, 1009
<i>Ulex</i> ,	115, 1025	<i>Vicia</i> ,	154, 157
ULMÆ,	421	VICIEÆ,	149
<i>Ulmus</i> ,	421, 1011	<i>Vilfa</i> ,	503
<i>Ulota</i> ,	577	Villarsia,	325
<i>Ulva</i> ,	957	<i>Villemetia</i> ,	298
<i>Ulva</i> , 940, 941, 944, 947, 948, 950,		<i>Viaca</i> ,	324
951, 954-956, 959, 960.		VINCEÆ,	<i>ibid.</i>
ULVACEÆ,	956	<i>Viola</i> ,	63, 995
UMBELLIFERAЕ,	213	VIOLARIEAЕ,	<i>ibid.</i>
<i>Umbilicaria</i> ,	595	<i>Virgaria</i> ,	921
<i>Umbilicus</i> ,	201, 1002	Viscum,	246
<i>Urceolaria</i> ,	670, 1015	Vitex,	377
<i>Urceolaria</i> ,	659, 661, 670	Vitis,	101
UREDINEAE,	877	Voitia,	582
<i>Uredo</i> ,	892, 1020	Volubilaria,	946
<i>Uredo</i> ,	925	<i>Volvaria</i> ,	673
<i>Urospermum</i> ,	295	<i>Vulpia</i> ,	517
<i>Urtica</i> ,	418	W.	
URTICEAE,	417	<i>Wallrothia</i> ,	230
<i>Usnea</i> ,	615	<i>Webera</i> ,	550-552
<i>Usnea</i> ,	611, 616	Weissia,	570, 1038
<i>Utricularia</i> ,	379	Weissia,	566-568, 572, 581
V.		Woodsia,	538
VACCINIEAE,	316	X.	
<i>Vaccinium</i> ,	<i>ibid.</i>	Xanthiam,	279
<i>Kaginaria</i> ,	992	Xeranthemum,	294
<i>Vaillantia</i> ,	247	<i>Xylaria</i> ,	678
<i>Vaillantia</i> ,	248	Xyloma,	875, 1019
<i>Valeriana</i> ,	254, 1030	<i>Xyloma</i> , 696, 709, 710, 714-717, 721-	
<i>Valeriana</i> ,	253	723, 725, 727, 737.	
VALERIANEAE,	252	<i>Xylomyzon</i> ,	796
<i>Valerianella</i> ,	252, 1030	<i>Xylostroma</i> ,	933
<i>Vallisneria</i> ,	436	Z.	
<i>Variolaria</i> ,	674, 1015	Zacintha,	298
<i>Kariolaria</i> ,	645	Zannichellia,	440
MUSCULARES,	1	ZILLEÆ,	53
<i>Vaucheria</i> ,	973, 1020	Zizyphus,	111
<i>Vaucheria</i> ,	975	<i>Zonaria</i> ,	940, 954-956
VAUCHERIEÆ,	973	Zostera,	440
<i>Velezia</i> ,	80	Zygnuma,	975, 1021
<i>Veratrum</i> ,	473	ZYGNEMEÆ,	975
<i>Verbascum</i> ,	339, 998, 1011	Zygodon,	548
<i>Verbena</i> ,	577	ZYGOPHYLLEAE,	107

FINIS.