



Ent. MONOGRAPHIA

COLEOPTERORVM
MICROPTERORVM

L.C.C. 2.
6-24-64

AVCTORE

I. L. C. GRAVENHORST
DOCTORE PHILOSOPHIAE IN ACADEMIA
GEORGIA AVGVSTA GOTTINGENSI.



G O T T I N G A E
T Y P I S H E N R I C I D I E T E R I C H .

1806.



595.77

G775

Ins-

V I R O

ILLVSTRI ATQVE DOCTISSIMO

A V G V S T O G V I L I E L M O
K N O C H

P H Y S I C E S E T M I N E R A L O G I A E P R O F F S -
S O R I I N C O L L E G I O C A R O L I N O
B R V N S V I G A E ,

E N T O M O L O G O C E L E B E R R I M O ,

C V I S C O M M U N I C A T I O N I B V S H O C C E O P V S C V L V M
C O L L E C T A N E A P L V R I M A N O V A D E B E T

H A N C

M O N O G R A P H I A M M I C R O P T E R O R V M

G R A T O A N I M O

D E D I C A V I T

A V C T O R .

P R A E F A T I O.

Quod iam anno 1802. edidi *Systema Coleopterorum Micropteronum* artificiale naturali quidem, quatenus fieri poterat, adaequare tentabam; saepius autem exceptiones obstatabant mihi probantes, naturam vincula systematis artificialis haud tolerare, et inuitio me eogebar, speciem quamdam a reliquis conspeciebus, quibus natura eam associauerat, remouere, iubente forsan charactere singulo, quem, secundum rugulas systematis artificialis, ad hoc genus distinguendum et designandum adoptaueram. Hac inconuenientia motus, systemati illi artificiali naturale iuxtapponam, quo quisque nexum naturalem inter genera et species Coleopterorum Micropteron perspiciat.

Quanto diligentius autem leges studeo, quibus natura in formandis corporibus organicis agit, tanto euidentius mihi patet, naturam forsan nullum genus, in sensu hodierno, agnoscere. Multa genera, quae, quamdiu paucae tantummodo species eorum existerent, ipso toto charactere externo seu habitu naturali

rali vulgo sic dicto longe inuicem remota erant, serius, simulac plures species proferebantur, magis magisque appropinquabantur, donec tandem confinia eorum vix dum designari poterant, nec nisi vnico forsan charactere distinctiō, quo totus character externus minime exprimebatur, genera ista distinguebantur; nunc autem, regulis systematis naturalis sublatis, sistema artificiale locum eius occupabat. Haec experientia in Coleopterorum Micropteronum systemate quoque mihi se obtulit: E generibus receptis *Stenus* solummodo, *Oxyporus*, *Piestus* et *Lomechusa* finibus adhuc satis praecisis contenti sunt ita ut primo statim intuitu, e habitu naturali exteruo, designiri possint. Reliqua autem genera omnia, immediate vel mediate, unum per alterum, inter se cohaerent, et quaedam eorum adeo in alia Coleopterorum genera, a systemate Micropteronum exclusa, transeunt. Tabula affinitatum, opusculo huic adnexa, magis reddet perspicuum quod dixi, quodque in ipso textu, scilicet in generis cuiusque praemissis, clarius exponam; ubi characteres etiam explicabo, quibus haec genera artificialiter sciungi atque distinguiri possunt; genera enim requisitum sunt necessarium in systemate corporum naturalium. — Redeo iterum ad

Stenum,

Stenum, Oxyporum, Piestum et Lomechusam: Vidimus, haec genera, collatione cum reliquis, paucas tautum species comprehendere; et, ex analogia, credo, me haud errare, si coniicio, illa genera, specierum numero crescente, generibus quoque aliis, a quibus adhuc satis distant, adpropinquatum iri, donec tandem cum his confluent nec nisi forsan unico quodam charactere distinguenda erint.

Generum dispositioni et definitioni, in hoc opusculo commutatis et, vti spero, emendatis, plurium specierum diagnoses, descriptiones, comparationes et synonyma emendatas et auctas, nec non species multas nouas, quarum numerus valde increuit, addidi.

Praecipue hic etiam illarum mentionem facio specierum, ad quas collectionem *Boscianam* allegauit; scimus enim, *Fabricium*, in scriptis suis entomologicis, hanc collectionem faepius citauisse, et *Boscius* ipse professus est, *Fabricium* ipsum species plurimas illius collectionis vel denominauisse vel iam denominatas probauisse. Vbi ergo coleopteron quoddam, etiam a *Fabricio* iam descriptum, e collectione *Bosciana* citatum est, Entomologis persuasum esse potest, me insectum illud ipsum descripsisse, quod etiam *Fabricius* ante oculos habuit.

Iter,

Iter, per Galliae et Germaniae partem institutum, praecipue autem commoratio Parisiis diuturnior, opportunitatem mihi praebuerunt, multa noua, ad historiam naturalem spectantia, inuestigandi; et benevolentiae Entomologorum plurium Parisiensium erga me, Entomologorum iam diu celebratorum, e quibus *Bosc*, *Olivier*, *Brongniart*, *Latreille*, *Desmarest* hic nominare mihi liceat, cum aditum liberum ad collectiones priuatas Insectorum egregias quam humanissime sponte mihi offerrent, Entomologiae sectatores descriptiones multarum nouarum Micropteronorum specierum debent. — Redux in patriam multis nouis animalium speciebus auctas inueniebam collectiones Zoologicas Comitis *de Hoffmannsegg* et Dom. Professoris *Hellwig*, nunc in vnam coniunctas collectionem eamque vnicam sui generis, quae forsan omnes aemulas, tam numero specierum insectorum quam ordine systematico et exactitudine in tribuendis nominibus generalibus specialibusque, antecellit. Scimus omnes, Comitem illustrissimum, itineribus, per maximam Europae partem, cognitionis naturae causa, institutis celebrem, studio indefatigabili et temporis atque opum impensis optime de cultura totius historiae naturalis meruisse; hic etiam libellus entomologicus

gicus debet ei quasdam species nouas et elegantes, imprimis e numero micropterorum exoticorum.

Praecipue autem in collectione Dom. Professoris *Knoch*, fautoris mei aestumatissimi, qui p^rae aliis s^ystema huius coleopterorum familiae, studiis et scrutinationibus summis elaborauit, materiem plurimam huius Micropterorum Monographiae inueni; et magna multitudo specierum nouarum, quae, post editionem tentaminis mei primi systematis Micropterorum, in solo ducatu Brunsuicensi, temporis adeo breuis lapsu, repertae sunt, probat saue, quantopere cultura historiae naturalis horum animalculorum alibi adhuc neglecta sit; haud enim me liercule verisimile est, solum brunsuicense p^rae caeteris prouinciis multitudine adeo stupenda micropterorum frequentatum esse. Quare omnes scrutatores entomologiae et insectologas haud satis vrgere possum, ne his quoque insectis attentionem suam recusent; respondeo, eos pro labore et studiis impensis premium exoptatum laturos esse. Haud quidem negari potest, quod etiam e hoc opusculo satis perspicue patet, nullum forsitan coleopterorum genus tantis obnoxium esse difficultibus, nullumque scrutinationem desiderare profundiorem quam haec coleopterorum

rorum familia; huiusmodi vero difficultates ipsae potius calcar esse debent, quo Entomologus verus, cui perfectio scientiae cordi est, incitetur, quam frenum, quo retineatur ab inuestigatione intima horum insectorum, nam “per aspera ad astra” tendimus. Non nisi viribus iunctis spes nos arridet eo perueniendi quo in his etiam coleopterorum generibus aequilibrium cum reliquis restituī possit.

Hac occasione non possum non diligentiae et zelo Domini *Dahl*, vnius expertissimorum et felicissimorum e nostris insectolegis, publice meritas agere gratias. Frequentibus et saepe laboriosis excursionibus per prata sylvas et montes Ducatus Brunsuicensis non solum, tam in reliquis quam etiam et praecipue in his insectorum generibus, magnam vim nouarum specierum, quibus imprimis collectiones *Knochiana*, *Hoffmannseggio-Hellwigiana* et mea propria insigniter locupletatae sunt, prehendit, sed etiam omnia, quae de vitae modo horum insectorum obseruare poterat, exactissime annotauit; hasque annotationes mecum communicauit. Cum vero haec infecta, quotquot eorum Dom. *Dahl* possidet, curis Dom. Prof. *Knoch* accuratissime examinata et nominata sint, Entomologi, qui eum adirent, hac via species exactissime determinatas sibi procurare

curare possent. E propria experientia ego affirmare possum, Dominum *Dahl* in his negotiis maxima affabilitate et fide agere.

Denique etiam Domino *Sturm* Norimbergae, qui mecum Coleoptera Microptera sua beneuole communicauit, gratias hic habeo publicas. Debenus ei plures nouas species et varietates.

* * *

Scripta autorum, quibus, praeter illa in *Monographia Micropterorum Brunsvicensium* pag. XXI. recensita, in hac Monographia usum, haec sunt:

1. *Fabr. Eleuth.*

Ioh. Christ. Fabricii etc. *Systema Eleutheratorum* etc. Tomus II. Kiliae 1801. 8. (*Staphylinus* p. 589. *Stenus* p. 602. *Oxyporus* p. 604. *Paederus* p. 608).

2. *Herbst Nat. d. K.*

Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten von *Carl Gustav Jablonsky*, fortgesetzt von *Ioh. Friedr. Wilh. Herbst*. — *Die Käfer* Th. 1-9. Berlin, 1785 — 1801. 8.

3. *Ljungh. St.*

Monographia Stenorum, auctore *Suenone Ingemaro Ljungh*, in *Archiv für die systematische Naturgeschichte*, herausgegeben von *Dr. Friedr. Weber* und *Dr. D. M. H. Mohr*. B. I. St. 1. Leipzig 1804. 8. (pag. 59).

4. *M.*

Coleoptera Microptera Brunsvicensia nec non Exoticorum quotquot exstant in collectionibns Entomologorum Brunsvicensium, in genera familias et species

species distribuit Dr. I. L. C. Gravenhorst, Brunsuigae, 1802. 8.

5. Panzer ad Schaefferum.

Systematische Nomenclatur über Herrn Dr. Jacob Christian Schäffers Abbildungen regensburgischer Infekten, von Dr. Georg Wolfgang Franz Panzer, Erlangen, 1804. 4.

6. Schaeffer Inf. Ratisb.

D. Iacobi Christiani Schaefferi Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum etc. Vol. I-III., Regensburg 1766. 4.

* * *

Priusquam ad Systema ipsum transeo hic
Adnotationes quasdam ad Prolegomena Monographiae Micropteronorum de anno 1802.
 (vide n. 4.) praemitto.

Ad p. XV. partem inferiorem.

Forma et proportio partium oris haud
 obsoleta et semper invariabilis sunt. Quod
 ad formam, obseruaui, palporum articulum
 ultimum *Astrapaei* (nunc *Staphylini Vlmi*)
 triangularem magis minusue contrahi et arti-
 culo ultimo ouato palporum Staphylinorum
 familiae primae (nunc quintae) similem fieri.
Proportio mandibularum et palporum in spe-
 ciebus quibusdam *Oxytelorum* et *Staphyli-
 norum* variat (e. g. in *O. picei* et *carinati*, *St.
 castanopteri* et *erythropteri* indiuiduis).

Ad p. XIX. part. sup.

Quamquam series punctorum thoracis *Sta-
 phylinis* familiae tertiae (nunc primae), ra-
 tione

tione numeri punctorum constantissimae esse solent, species attamen quaedam sunt incertae aut spuriae vel intermediae, quibus puncta ista mutabiliora sunt, vti obseruationes continuatae crebriores et recentiores me docuerunt (e. g. varietates spuriae *St. variantis atrati* etc.). In familia quarta autem (nunc secunda) numerus punctorum, numerum senarium excedens, inconstantior est (e. g. in *St. ochraceo, elongato*).

Ad p. XIX. part. inf.

Diagnosis allegata *Oxyteli caelati* eo commutanda est: “*O. caelatus* foueis duabus dorsibus” (nam foueae laterales prorsum fere evanescunt et omnibus Oxytelis eadem sunt) “arcuatis, thorace transuerso.” Plurimi enim reliqui Oxyteli numero vel forma fouearum thoracis distinguuntur.

Ad p. XXV. part. sup.

Corpus breuissimum et globuliforme est *Tachyporo granulum*, speciei nouae.

Ad p. XXX. part. med.

Staphylinus stenoïdes, noua species, habitu valde singulari, ad tertiam attamen (nunc primam) familiam Staphylinorum referenda, caput habet vbique punctis crassioribus impressum, Stenororum capiti simile, cum omnibus reliquis huius familiae Staphylinis caput medio

medio laeuissimum, lateribus tantummodo punctum sit.

Ad p. XXXI. part. inf.

Oculi Staphylini stenoidis oculis micropterorum, de quibus nomen dicit, similes pro-silientes magni sunt, reliquis Staphylinis au-tem planiores.

Ad p. XXXIII. part. med.

Articuli medii antennarum vel sunt cam-punulati, vel pateraeformes, vel latere interiore subincuruo-elongati; ex his *antennae ferratae* constructae solo *Staph. dilatato* inter omnes Micropterorum species propriae sunt.

Ad p. XXXV. part. inf.

Staphylinus dilatus antennis serratis ab omnibus Micropteris distinctus, articulo vltimo antennarum haud parabolice obtuso, sed ouato, a reliquis huius familiae Staphylinis maioribus differt.

Ad p. XXXVIII. part. inf.

Calliceri mandibulae eadem sunt forma vt in reliquis Aleocharis.

Ad p. XL.

Palpi anteriores Stenis solis triarticulati esse videntur; omnibus reliquis Micropteris quadriarticulati. *Articulus vltimus* quibus-dam *subuliformis* interdum ab articulo penul-timo valido recipitur, plurimis attamen Mi-cropte-

cropteris semper exsertus est. Nunquam ego hunc articulum in *Paederis* deprehenderam, quo inductus ut crederem, Paederos hoc articulo carere, characterem praecipuum distinctiuum generis de absentia eius desumebam. Tandem autem in collectione *Latreilleana* Parisis, inter multa alia huius generis specimina, unicum videbam *Paederi orbiculati* individuum articulo quarto palporum anteriorum subuliformi exerto; et nunc me convictum consiteor, Paederos quoque *palpis anterioribus quadriarticulatis, articulo ultimo subuliformi*, instructos esse. Persingulare autem et notatu dignum est, Microptera huius generis articulum ultimum palporum anteriorum semper fere in penultimum abscondere, quod nunquam in reliquis Micropteris, quorum palpi acuminati sunt, obseruatur.

Proportio palporum, ratione longitudinis et crassitie, haud semper eadem est. Longissimi sunt et graciles *Stenis* et *Staphylino stenoidi*, nec non *Aleocharis* quibusdam (e. g. *Al. excisae*, Speciei nouae). *Staphylinis familiae primae* (nunc *quintae*) nec non *Staph. Vlmi* et *tenui* e familia tertia (nunc prima) crassiores quam reliquis Staphylinis. *Euaestheto*, generi nouo, longi et clauati.

Ad p. XLIV. part. sup.

Loco canaliculae marginalis Staphylinus dilatato puncta minuta impressa sunt.

Ad p. XLV. part. inf.

Thorax conicus i. e. basi latus, apicem versus valde angustatus, inter omnia Microptera soli St. fulgenti proprius est.

|Ad p. XLVI. part. med.

De seriebus punctorum thoracis supra in adnotatione ad p. XIX. quaedam iam monui.

Ad p. XLVII. part. med.

Staphylinus stenoidi thorax est in angulis apicis multipunctus, praeterea punctis quibusdam sparsis maioribus impressus, seriebus autem dorsalibus sexpunctis.

Ad p. LVII. part. med.

Oxytelis minoribus tibiae sunt multo graciliores et minus spinosae quam maioribus, tibiis attamen Aleochararum semper validiores.


Ad p. LIX. part. inf.

Vnguis, seu quintus tarisorum articulus, cum apice articuli quarti cohaerere solet; Pinophilo (nunc Lathrobio latipede) autem basi articuli quarti insertus est.

Oxy-
telus.

Carter-
bees

^{altri}



Tabula affinitatum generum Colepoterorum
Micropterorum inter se et cum quibusdam ge-
neribus reliquorum Coleopterorum. —

Genera Micropterorum circulis inclusa sunt,
reliqua quadratis. —

Lineas rectae simplices ostendunt nexum
intimorem, lineae punctae autem nexum
debiliorem.

GENVS I.

T A C H Y P O R V S.

Sub hoc genus nunc comprehenduntur illa Col. Microptera, quae olim in fam. II. Tachypororum et fam. I. Tachinorum segregaueram. Licet enim palpis differant, itaque, secundum regulas systematis strenue artificialis secernenda esse videantur, habitu attamen toto communis inter se congiunt et a reliquis cogenribus differunt, quam quod combinationem eorum suscipere non auderem — *Corpus* conuexum nitidum laeve; *caput* retractum; *thorax* convexus transuersus; *coleoptra* connexa, abdominis magnam partem tegentia; omnes haes partes truncus, arctius cohaerentes, praebent, vel omnes vel partim coniunctae, characteres, quibus natura hoc genus a reliquis distinxit.

FAMILIA I.

Corpus globosum.

Caput retractum, longitudine triplo fere latius. *Ore* producto; palpis anticis acuminatis, articulo ultimo minutissimo. *Antennis* capite thoraceque longioribus; articulo

I. *Tachyporus.* F. I.

culo 1 crassissimo, 2 paulo minore, ambo-
bus autem multo crassioribus quam reli-
qui, 3-7 gracilibus, vix sensim crescenti-
bus, 8-11 crassioribus, ultimo ouato acuto.

Thorax conuexus, longitudine quadruplo fere
latior, apicem versus paulo angustatus.

Coleoptra conuexa, lateribus rotundata, tho-
race latiora et duplo longiora; elytris qua-
dratis.

Abdomen breue, acutum, sub coleoptera om-
nino fere retractum.

Haec familia vnam modo speciem continet,
quae quidem transitum ad *Scaphidia* ostendit,
sed nullo modo cum eis confundi potest.
Corpus globosiusculum conuexum, partibus
trunci arctius cohaerentibus, et coleoptra ab-
dominis maximani partem tegentia *Tachypo-
ris* huius familiae cum *Scaphidiis* quidem com-
munia sunt; his vero elytra sunt apicem ver-
sus sensim angustata, apice ipso obtuso nec
truncato. Elytra autem truncata sunt omnium
Micropteroni character communis. Praeter-
ea autem scaphidiis sunt palpi filiformes, *Ta-
chyporis* huius familiae autem acuminati.

A *Tachyporis* familiae sequentis haec fa-
milia corpore magis sphaeroideo et, quod inde
sequitur, capite thorace coleoptrisque multo
latioribus differt.

1. *T. granulum*, nitidus, niger; coleoptris interdum fuscis seu fusco-castaneis;

Long. $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ lin.

Caput antennis fuscis.

Thorax marginibus lateralibus interdum sub-pallescentibus.

Habitat, tempore verno et aestiuo, sub foliis deciduis et sub muscis ad radices arborum, haud frequens.

FAMILIA II.

Complectitur omnia illa Microptera, quae olim familiam II. Tachypororum constituebant. Corpus eis est nitidum conuexum, quamvis non globosum, ut in fam. I, et partes corporis angustiores sunt; thorax transversus. A familiae tertiae speciebus haec familia, statura minore, nitore splendidiore, coloribus plerumque viuidioribus, thorace convexiore, elytris glaberrimis, palpis semper acuminatis, qui illis filiformes sunt, praecipue differt. Habitent etiam rarius et, ut videtur, cum oua pariunt, in fimo.

Sunt quaedam *Aleocharae* e familia IV, e.g. *Al. palpalis* et *minuta*, quae faciliter pro Tachyporis huius familiae, *Tachyporo pediculario* affinibus, haberi possunt; sed thorax harum Aleochararum apicem versus gibbulosior

est, basi autem minus arcte cum coleopteris cohaeret, angulis baseos scilicet magis rotundatis; abdomen Aleochararum haud setis adeo rigidis ut in *Tachyporis* vestitum est; palpi autem et labrum in *Aleocharis* allegatis longiores sunt. —

Tibiae spinosae in maioribus quidem *Tachyporis* distinctae sunt; in minoribus autem spinae sensim sensimque se subducunt, et tibiae interdum setis singulis tenuibus vestitae sunt, quod etiam in *Aleocharis* maioribus obseruamus.

2. *T. pedicularius*, (M. p. 133.), nitidus, obscurō-fuscus, subgriseo-sericans; ore, antennis, pedibusque testaceis.

Long. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{5}$ l.

Caput nitidissimum, nigrum. *Antennis*, capitis thoracisque longitudine, extrorsum crassioribus.

Thorax, magnitudine coleoptrorum, transversus, apicem versus angustatus, conexus, nitidus, nigro-fuscus, sub-griseo-sericans; margine summo baseos magis minusue diaphano testaceo.

Abdomen pilosellum; pilis apicem versus crebrioribus et rigidioribus; nigro-fuscum, nitidum, sub-griseo-sericans; marginibus segmentorum diaphano-subtestaceis.

Habi-

Habitat Brunsuigae, sub gramine.

3. *T. truncatellus* breuis, crassus, nitidus, rufotestaceus; oculis abdomineque obscurioribus.

Long. vix. 1 lin.

Caput obscuro-rufum; palpis antennisque pallidioribus; oculis fuscis.

Thorax et *coleoptra* rufa, pilis tenuissimis subgriseo-sericantibus vestita.

Abdomen pilosum, fuscum, marginibus segmentorum pallidioribus.

Ratione nitoris subsericantis et statura *T. pediculario* assinis est. Cum *T. nitidulo* haud confundi potest, ob statuam crassiorem atque conuexiorem et nitorem subsericantem; quibus characteribus etiam, praeter paruitatem, a varietatibus pallidis *T. analis* differt.

Habitat Brunsuigae, locis arundinosis.

T. truncatellus Knoch.

4. *T. bipunctatus* M. p. 153.

5. *T. binotatus* M. p. 152.

6. *T. bimaculatus* M. p. 152. *T. bipustulatus*.

7. *T. cellaris* M. p. 151.

Staphylinus 20 Geoffr. Hist. St. *maculatus* Fourcr. Ent. Par. n. 20. a *T. cellari* non nisi colore nigro, qui in hoc obscuro-fuscus esse solet, differre videtur.

8. *T. pubescens* M. p. 150.

Var.

Var. fusca, sericans; antennis pedibus elytrisque rufis. — Habitat Brunsuigae — Dahl.

Var. corpore nigricante; antennis fuscescens-tibus, articulis 2 primis et 2 vltimis rufis. — Habitat Norimbergae — Sturin.

Var. statura paulo latiore, long. 2 lin. coleoptris castaneo-rufescentibus. — Habitat Parisiis — Bosc.

9. *T. crassus* M. p. 190.

10. *T. analis* M. p. 129.

11. *T. saginatus* nitidus niger; palpis, antennis, thorace, elytris, pedibusque rufis seu obscuro-castaneis.

Long. 2 lin.

Caput nigerrimum, nitidissimum, palpis et antennis rufis seu obscuro-castaneis.

Thorax testaceo-rufus seu obscuro castaneus, nitidissimus, leuissimus.

Coleoptera rufo-castanea, basi et lateribus interdum paulo obscuriora.

Scutellum nigrum.

Abdomen nigrum; segmentorum marginibus dorso pallidioribus.

Habitat Brunsuigae — Knoch.

Notitiam hic addo Dom. Prof. Knochii, cui huius speciei indiuidua duo debeo: “*T. saginatus* primo intuitu *T. chrysomelinus* bene saginatus”

saginatus esse posset, sed magnitudo eius insignior, antennae crassiores, habitatio constanter hanc speciem distinguunt."

12. *T. chrysomelinus* M. p. 128.

Hunc Tachyorum *Paykull* cum *T. anali* copula iunctum vidi — Payk. Mon. St. p. 79.

Tachyorum teneo, medium tenentem inter *T. anali* et *chrysomelinum*. Statura nec non partium forma ac proportione ambobus similis est; colore autem testaceo, oculis, elytrorum basi, abdomine pectoreque nigris. Caput ergo testaceum, oculis nigris, a *T. anali*; abdominis pectoris et baseos elytrorum colorem nigrum a *T. chrysomelino* habet. — Hic forsan e copula illorum ortus est.

Tachyopus alter collectionis meae, huic omnino similis, totus autem testaceus, oculis solummodo nigris, varietas iunior unius alterius esse videtur. — Conf. *St. dispar* Payk. Mon. St. n. LIV. var. ε, rufosflavus, capite nigro.

13. *T. marginatus* M. p. 127.

St. dispar Payk. var. §.

Oxyporus dimidiatus Fb. El. p. 607. ?

14. *T. lateralis* M. p. 127.15. *T. abdominalis* M. p. 127.16. *T. ruficollis* M. p. 128.

Variat

Variat coleoptris totis nigris; coleoptris nigris, margine summo apicis diaphano-testaceo; coleoptris rufo-fuscescentibus, margine laterali et apicali, interdum etiam praeterea macula discoidali, nigricantibus, statura reliquis paulo minore. Dom. Prof. Knobch hanc varietatem pro specie peculiari declarat, cui attamen haud assentire possum.

Dahl huius specimina plura legit Brunsvigae, ad radices salicium, tempore autunnali.

17. *T. transversalis*, nitidus niger; thorace, (apice elytrorum) pedibus, antennis et ore testaceis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l.

Caput nigrum. *Antennis*, *capitis thoracisque* longitudine, rufo-fuscis; *ore* rufo-testaceo, *palpis* anticus obscurioribus.

Thorax rufo-testaceus, *margine apicis* et *baseos* nigricante.

Coleoptra quadrata; *vel nigra*, *apice obsolete diaphano-testacea*; *vel seminigra* *semitestacea*

Abdomen pilosellum, nigrum, marginibus segmentorum pallidis.

Pedes testacei.

Statura gracilis *T. nitiduli*. A. *T. pusillo* *colore* et *statura* paulo graciliore, a *T. ruficollis* *statura* multo graciliore differt.

Habitat

Habitat Brunnsuigae, sub foliis deciduis, locis
vmbrosis — *Dahl.*

T. transuersalis Knoch.

18. *T. pusillus* nitidus, niger; coleopteriis fuscis;
basi antennarum, thoracis lateribus, pedibusque
pallidioribus.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput nigrum. *Antennis*, longitudine ca-
pitis thoracisque, fuscis; articulis 2 primis rufis.
Palpis anticis fuscis, basi pallidioribus.

Thorax longitudine duplo fere latior, api-
cem versus angustior; niger; lateribus, impri-
mis basin versus, diaphano-subtestaceis.

Coleoptra quadrata, fusca, margine laterali
paulo obscuriore; vel (in varietate huius spe-
ciei minore, quam Dom. *Sturm* mecum com-
municauit; long: 1 l.) nigricantia, apice sub-
diaphano-testacea.

Abdomen coleoptris duplo longius, apicem
versus angustatum, pilosellum, nigrum.

Pedes piceo-testacei, capitibus femorum
obscurioribus.

Statura huius Tachyperi paulo crassior est
quam in *T. nitidulo* et *transuersali*, paulo
autem gracilior quam in reliquis cospeciebus.
Praeterea etiam elytrorum punctura subtilis-
sima minus distincta et colore a *T. nitidulo*
differt.

Habitat

Habitat Brunnsuigae, lectus in muscis ad quercuum truncos — *Dahl.*

T. pusillus — Knoch.

19. *T. capillaricornis* antennis gracilibus, filiformibus, ciliatis; nitidus, nigro-fuscus, labio et pedibus pallidioribus.

Statura crassiuscula.

Long. 1 lin.

Caput nitidissimum, thorace triplo minus, nigro-fuscum, labio testaceo; antennis, capitis thoracisque longitudine, gracilibus, articulis duobus primis crassioribus clauatis, reliquis elongato-ouatis aequalibus, setis duabus vel tribus lateralibus, in ultimo articulo etiam apicalibus, in articulo primo et secundo longioribus, vestitis.

Thorax longitudine latior, nigro-fuscus, punctis 2 ante marginem lateralem, quorum alterum in angulo apicis alterum in angulo baseos positum est, punctisque 2 dorsalibus ante marginem apicalem, impressus.

Coleoptra quadrata, leuia, punctis attamen 4 vel 5 obsoletissimis, in seriem longitudinem disci dispositis, impressa.

Abdomen coleoptris duplo longius, nigro-fuscum, ano pallidiore.

Pedes picei.

Habitat

Habitat Brunsuigae, haud frequens — Dom.
Dahl eum mecum communicauit.

T. capillaricornis — *Knoch.*

20. *T. nitidulus* M. p. 126. nitidus, rufescens;
 oculis, abdomineque fuscis; pedibus testaceis.

Long. $1\frac{1}{5}$ lin.

Coleoptra subtilissime puncta, plerumque
 planiuscula, interdum vero etiam subcon-
 vexiuscula.

Statura paulo minore et graciliore quam
T. pusillus.

In collectione *Bosciana*, Parisiis, vidi huius
Tachypori varietatem pallide testaceam, ocu-
 lis nigris, longitudine 1 lin. sub nomine *Oxy-
 porus testaceus* *Fabr.* quem in M. p. 142. ad
T. corticinum citavi.

Specimina intermedia, inter *T. nitidulum* et *pu-
 sellum*, ratione magnitudinis, staturae et co-
 loris, medium inter illos tenent.

Long. 1 — $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput nigrum; palpis et antennis testaceo-
 vel fusco-rufescentibus.

Thorax fuscus seu rufescens, marginibus
 lateralibus autem semper pallidioribus.

Coleoptra quadrata, rufa, vel rufo-fusca,
 margine laterali obscuriore.

Abdomen nigrum, marginibus segmentorum
 pallidioribus.

Varie-

Varietates minores pallidiores sunt et *T. nitidulus* propiores; maiores autem obscuriores et *T. pusillo* propiores.

Oxyporus Hypnorum Fbr. El. p. 607. n. 22.

Tachyp. nitidulus M. p. 126.

Habitat in quisquiliis, tempore verno.

21. *T. limbatus* niger, nitidus; pedibus pallidioribus; thoracis marginibus omnibus, elytrorum margine laterali et apicali flauis.

Long. $1\frac{2}{3}$ lin.

Caput nigrum; antennarum articulo primo testaceo.

Thorax marginibus omnibus, apicali autem obsoletissime, lateralibus distinctissime, flauis.

Coleoptra limbo laterali et apicali flauo, margine attamen lateralii summo ipso nigro.

Pedes fusci; capitibus femorum obscurioribus.

Habitat Parisis — e collectione *Latreilleana*, ubi specimen tantummodo unicum exstabat.

Habitu, partiumque forma ac proportione, nec non corpore subtilissime et confertissime obsoleto puncto *T. futurali* (M. p. 144.) affinis; differt autem palpis acuminatis.

FAMILIA III.

Hi *Tachypori*, olim *Tachini* *familiae I.* thorace transuerlo, palpis filiformibus etc. a familia

milia praecedente, cuis characteres distinctius conferendi sunt, satis differunt. A *Tachinus*, statura latiore, thorace transuerso, hand punctis maioribus dorsalibus impresso, elytris laevibus, distinguuntur.

22. *T. futuralis* M. p. 144.

Hic *Tachyporus* habitat etiam Parisiis; vidi eum in collectionibus Latreilleana et Bosciana, ubi *Oxyporo futurali*, in Panzeri Fauna exhibito, similis est.

23. *T. marginalis* M. p. 192.

24. *T. collaris* M. 143.

25. *T. immaturus* M. 142.

Sub nomine *Oxyporus brunneus* Fabr. quem ego ad hunc *Tachyporum* allegavi, in collectione Bosciana *T. marginatum* vidi.

26. *T. corticinus* M. p. 141.

27. *T. marginellus* M. 145. nitidus, niger; antennarum basi, thoracis margine laterali, coleoptrorum margine laterali et apicali, pedibusque testaceis.

Long. $1\frac{2}{3}$ lin.

Caput nigrum; palpis et antennis fuscacentibus; his, capitis thoracisque longitudine, basi rufo-testaceis.

Thorax niger, margine laterali testaceo; margine quoque baseos summo pallidiore.

Cole-

Coleoptra latitudine longiora, nigra; margine apicali et striga laterali, ab humero vsque ad marginem apicalem, cum quo confluit, deducta, testaceis.

Abdomen nigrum.

Pedes piceo testacei.

Confer species 2 sequentes.

28. *T. fumetarius* M. p. 141. nitidus, niger; humero et margine apicali coleoptrorum, pedibusque rufo-testaceis.

Long. 2 — $2\frac{1}{4}$ lin.

Caput nigrum; antennis et palpis nigro-fuscis.

Thorax longitudine multo latior, niger, summis marginibus lateralibus plerunque obsolete fuscescentibus.

Coleoptra latitudine paulo longiora, nigra; macula humerali et margine apicali distincte rufo-testaceis.

Abdomen nigrum.

Pedes rufo-fusci; femoribus posticis obscurioribus.

Statura *T. marginelli* (n. 26.), differt autem thoracis lateribus paulo rotundioribus et colore.

Habitat Brunsuigae, sub gramine in pratis, tempore aestiuo — *Dahl*.

Variat rarius elytrorum humero et margine apicali obsoletissime rufescentibus.

T. ca-

T. castaneus M. 140. varietas est *T. fimetarii*, coleoptris fuscescentibus, humero attamen et apice semper paulo pallidioribus.

T. folidus M. p. 141. varietas huius Tachyponi esse videtur.

29. *T. laticollis* M. p. 141. nitidus niger; coleoptris fuscis; pedibus et antennarum basi pallidioribus.

Long. $1\frac{3}{4}$ l.

Caput nigrum; palpis fuscis. *Antennis*, *capitis* thoracisque longitudine, fuscescentibus; articulis & primis pallidioribus.

Thorax longitudine duplo latior, niger; marginibus lateralibus obsolete pallidioribus.

Coleoptra quadrata, nigro-fusca, humeris et apice pallidiora.

Abdomen nigrum, segmentorum marginibus fuscis.

Pedes rufo-fusci.

Hic Tachyporus latitudine a cospeciebus minoribus huius familiae differt.

Species intermedia inter *T. laticolle* et *fimetarium* est *T. niger* nitidus; pedibus et coleoptris nigro-fuscis; humero apiceque elytrorum subpallidioribus; tarsis pallidioribus; thorace lato *T. laticollis*; coleoptris autem latitudine longioribus *T. fimetarii*.

Huius

Huius speciei intermediae individua quae-dam prehendebantur in fruticibus prope Brunsuigam — *Dahl*.

T. niger, nitidus, thoracis et coleoptrorum marginibus lateralibus, nec non coleoptrorum margine apicali, pedibusque testaceis.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput nigrum. Antennis obscuro-fuscis, articulo primo interdum paulo pallidiore.

Thorax niger, marginibus lateralibus testaceis, qui color autem distinctior est quam in *T. fumetario*, minus autem distinctus quam in *T. marginello*.

Coleoptera nigra seu nigro-fusca; striga la-terali, ab apice humerorum versus marginem testaceum apicalem, quem tamen haud attingit, deducta.

Abdomen nigrum.

Pedes rufo-testacei, femoribus posticis paulo obscurioribus.

E descriptione huins Tachypori adparet, eum medium tenere inter *T. fumetarium* et *marginellum*; at utroque est minor.

30. *T. pullus* M. p. 140.

Hunc Tachyporum Sturm mecum communi-cauit sub nomine *Oxyporus rufipes* Fabr. et Panzeri, cum quo etiam congruere videtur.

Ox.

Ox. rufipes Fabr. Ent. S. O. n. 21.

— —. Panzer Fn. G. H. 27. t. 20.

31. *T. memnonius* M. p. 192.

32. *T. signatus* M. p. 139.

Caput nigrum, *palpis et antennis fuscis*;
articulo harum primo rufo-testaceo.

*Coleoptra nigra seu nigro-fusca, margini-
bus summis laterum et apicis pallidioribus.*

Pedes fusci seu rufo-testacei.

33. *T. bicolor* nitidus niger; macula thoracis
lateralis rufa; elytris rufis, marginibus nigris.

Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Habitu partiumque forma ac proportione
T. rufipedis (n. 55).

Caput nigrum; *palpis et antennis fusces-
centibus, harum articulo primo pallidiore.*

Thorax niger, macula marginali rufa vel
margine laterali basin versus latissime rufo.

Coleoptra rectangula, ochraceo-rufa, mar-
gine suturali apicali et lateralii nigro.

Abdomen nigrum, ano pallidiore.

Pedes rufo-fusci vel fusci, femoribus ob-
scurioribus.

E collectione Brongniartiana et Latreilleana.

34. *T. fimbriatus* M. p. 191.

35. *T. rufipes* M. p. 137. niger, nitidus; cole-
optris pedibusque fuscescentibus seu castaneis.

Long. 2 — $\frac{2}{3}$ lin.

Caput nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, palpisque fuscis seu fuscescentibus; articulo primo antennarum interdum reliquis obscuriore, interdum pallidiore, apice attamen semper fusco.

Thorax niger, summis marginibus laterilibus basin versus subfuscouscentibus; transversus, nec vero longitudine duplo latior, sed angustior quam in *T. humerali* (n. 56.).

Coleoptra latitudine paulo longiora; elytris vel castaneis seu fuscouscentibus, vel disco obscuriore.

Abdomen nigrum; segmentorum marginibus interdum fuscis.

Pedes rufi, seu castanei, seu fuscii.

Varietates, coleoptris obscuris, forsan e mixtione cum *T. signato* (n. 32.) ortum ducunt.

Oxyporus rufipes Pz. ad *Tach. pullum* (n. 30.) citatus est.

De Geer Mem. St. n. 11. haud *T. rufipedem* sed *T. humeralen* descripsisse videtur.

T. rufipes? niger, nitidus; pedibus, elytris, thoracis margine laterali, antennis et ore rufescentibus.

Longitudo et *habitus* *T. rufipedis*; statura autem paulo angustiore, ab domine apicem versus

versus angustato, incisione segmenti penultimi etc. differt.

Caput nigrum; palpis atque antennis rufescentibus; his articulo primo obscuriore; mandibulis testaceis.

Thorax niger, margine laterali paululum rufescente.

Coleoptra rectangula; elytris rufis, disco obscuriore.

Abdomen apicem versus angustatum; segmento penultimo infra profunde inciso.

Specimen unicum huius *Tachypori*, qui varietas *T. rufipedis* esse videtur, exstat in collectione *Hellwigio - Hoffmannseggiana*.

36. *T. humeralis* M. p. 136. nitidus, niger; antennis, elytris, pedibus, et thoracis marginibus rufis.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Caput nigrum. Antennis, capitis thoracisque longitudine, rufo-fuscis; articulo primo pallidiore. Palpis rufescensibus seu fuscis.

Thorax niger, longitudine duplo latior, lateribus rotundatis, apice paulo angustior; marginibus, imprimis lateralibus, rufis seu rufo-testaceis.

Scutellum et coleoptra castanea.

Abdomen nigrum, marginibus segmentorum rufo-fuscis.

Pedes castanei.

A speciebus confinibus hic *Tachyporus*, thorace latiore et thoracis marginibus rufis vel rufo-testaceis, distinguitur.

Var. coleoptris obscurioribus forsan e copula cum *T. signato* oritur.

Species intermediae interdum occurrunt, quae, ratione proportionis et coloris, medium tenent inter *Tach. humeralem* et *T. rufipedem*.

Var. T. humeralis nigra; palpis, antennarum basi, thoracis marginibus omnibus, elytris pedibus et segmentorum marginibus castaneo-rufis; long. 3 linearum — in collectione *Bosciana* sub nomine *Oxyporus marginatus* *Fbr.* existabat. — Confer. *T. marginatus* *M.* p. 127. et huius Monographiae n. 23. *T. immaturus*.

De Geer Mem. St. n. 11.

37. *T. batychrus* *M.* p. 191.

38. *T. pallipes nitidus*, niger; basi antennarum, thoracis margine laterali, macula elytrorum humerali, pedibusque testaceis seu testaceo-rufis.

Long. 3 lin.

Caput nigrum; palpis et antennis fuscis, his articulo primo testaceo.

Thorax

Thorax margine laterali, saepius autem obsolete, pallido.

Coleoptra quadrata, subtilissime puncta; elytrorum macula humerali distinctiore vel obsoletiore, interdum basi tota vel testacea vel rufescente.

Abdomen segmento penultimo vel sinuato vel integro.

E collectione *Latreilleana*.

39. *T. bipustulatus* M. p. 135.

Caput huius Tachyperi haud thorace plus triplo longius est, sed plus triplo breuius. — Lapsum illum scriptorium loco citato emendes quaeso.

40. *T. subterraneus* M. p. 135.

GENVS II.

T A C H I N V S.

Hoc genus complectitur familiam primam *Tachypororum* et familiam secundam *Tachinorum*. Hae familiae, quas anno 1802 proposui, species continent Micropterorum non nisi palpis acuminatis et filiformibus differentes, omnibus autem reliquis characteribus genericis, *statura* graciliore, *capite* ouato vel subouato, *thorace* haud transuerso, sed suborbiculato, apicem versus angustiore, congruentes. Longe plurimis speciebus *elytra* sunt laeuia, bi- vel tricrenato-striata; striis plerumque distinctis, rarius in puncta magis minusue obsoleta euangelentibus. — Paucis *elytra* punctis crebris impressa sunt, vti Staphylinis familiae primae; et cum hae species palpos etiam habent filiformes, hoc genus cum Staphylinis iungere videntur. Sunt attamen semper characteres, quibus hi Tachini a Staphylinis distingui possunt: *Antennarum articulus ultimus* Tachinis nunquam lunato-seu parabolice truncatus est, vti Staphylinis familiae primae, sed apice acutus. *Thorax* quidem thoraci illorum Staphylinorum similis est, basi attamen semper latior et truncatus, haud rotundatus, apicem versus

angus-

angustior quam in Staphylinis; caret etiam series punctorum, nec nisi punctis 2 vel 4 dorsalibus, rarius 2 vel 3 lateralibus impressus est, quae autem nunquam in series disposita sunt. — A *Tachyporis* hoc genus *corpore* graciliore; *thorace* haud transuerso, sed suborbiculato, punctis quibusdam maioribus impresso; nec non *sculptura* seu *punctura* *elytrorum* bene distingui potest.

Familia I. complectitur *Tachinos* *palpis acuminatis*;

Familia II. *Tachinos* *palpis filiformibus*.

FAMILIA I.

Continet *Tachyporus* fam. I. M. p. 125.

1. *T. dissimilis* M. p. 125. haud est *Oxyporus rufipes* Pz. (confer. *Tachyporus pullus* n. 30.)

T. nitidus niger; antennarum basi, pedibus, et coleoptrorum margine apicali pallidis; coleoptris punctis.

Long. 2 lin.

Caput ouatum, thorace duplo minus, nigrum; palpis antennisque fuscous; his, capitis thoracisque longitudine, filiformibus, articulo 1 et 2 pallidiore.

Thorax orbiculatus, apicem versus angustior; punctis 2 dorsalibus et 2 ante marginem apicis, angulos apicis versus (vt in plurimis huius

huius generis speciebus) impressus; niger seu nigro-rufus.

Coleoptra quadrata, nigra seu fusco-nigra, margine apicali testaceo; subtiliter et confirmis puncta, pilosella.

Abdomen coleoptris triplo longius, pilosellum, apicem versus angustatum, nigrum, segmentis ultimis margine subfuscescente.

Pedes testacei seu piceo-testacei.

Habitat etiam Norimbergae — *Sturm.*

2. *T. 4 punctulus* niger, nitidus; pedibus pallidioribus; coleoptris punctis.

Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Habitu, statu, partiumque forma proportione et punctura omnino *T. diffimilis* (n. 1.); capite attamen orbiculato et colore differt.

Habitat Brunsnigiae — *Dahl.*

3. *T. splendidus* nitidus, fuscus; coleoptris antennisque pallidioribus; thorace pedibusque testaceis.

Long. 2 lin.

Statura paulo gracilior T. melanocephalo (n. 7.)

Caput thorace triplo minus, latitudine longius, apicem versus angustatum; nigrum, apice sub-testaceum. *Antennis*, *capitis thoracisque* longitudine, fuscis; articulis 2 primis testaceis. *Palpis* testaceis.

Tho.

Thorax testaceus, punctis 2 dorsalibus ante marginem apicalem impressus.

Coleoptra obscuro - seu rufo - castanea, seu rufa; circa scutellum et margine laterali deflexo plerumque nigricantia, interdum vestigiis quibusdam linearum duarum longitudinalium impressa.

Abdomen pilosum, nigrum; marginibus segmentorum pallidis.

Pedes testacei; capitibus femorum obscuris.

T. splendidus — Knoch.

Varietatem minimam huius speciei, a maioribus individuis non nisi statura paulo graciliore, longitudine $1\frac{1}{4}$ linearum, et antennis paulo brevioribus et crassioribus se distinguenter, Dom. Prof. Knoch. pro specie peculiariter habet eique dedit nomen *T. 2 notatus*. Hanc vero differentiam specialem eo minus concedere possum, cum ambae varietates varietate sequente Norimbergensi iungantur.

Habitat Brunsuigae, locis arundinosis humidis, lectus primo vere — Dahl.

T. simillimi *T. splendido*, longitudine tantum $1\frac{1}{2}$ lin: coleoptris testaceo - rufis, circa scutellum et margine laterali deflexo nigricantibus, specimina duo Sturm mecum communicauit.

Haec varietas habitat Norimbergae.

4. *T. lepidus* nigrus niger (thorace elytrisque interdum obscuro-castaneis); pedibus, ore et antennam basi fusco-rufescentibus.

Long. 2 lin.

Statura *T. praecedentis*; colore autem punctura et capite magis orbiculato dissert.

Caput thorace triplo minus, suborbiculatum, nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis, basi rufescentibus; ore fusco-rufescente, palporum antecorum articulo penultimo clavato fuso.

Thorax nigricans, interdum obscuro-castaneus; punctis quibusdam, subtilibus, 3-5, lateralibus, ordine indeterminato positis, duabusque dorsalibus, ante marginem apicalem, impressus.

Elytra nigra, vel nigro-aut rufo-castanea, circa scutellum obscuriora; seriebus duabus punctorum longitudinalibus, altera disci 6-9 puncta, altera marginali obsoletiore, impressa.

Abdomen coleoptris plus triplo longius, pilosellum, nigrum, marginibus segmentorum subpallescentibus.

Pedes vel piceo-testacei, femorum capitibus fuscis; vel rufo fusi, femoribus nigro-fuscis.

Habitat Norimbergae — *Sturm*; et Brunsui-gae, lectus sub gramine ad fossas in pratis — *Dahl.*

T. le-

T. lepidus — Knoch.

5. *T. punctus*, nitidus rufus; capite ab domine, pectore, margineque elytrorum laterali nigris.

Long. 2 lin.

Caput nigrum, palpis rufis. *Antennis* fuscis; articulis 2 primis rufis, ultimo orbiculato acuto

Elytra striis punc torum tribus, una scilicet marginali, duabus discoideis, obsoletis impressa; rufa, disco et margine laterali nigricantibus.

Abdomen nigrum, ano pallido.

Pedes testacei, femoribus et femorum capitibus obscurioribus.

E collectione Latreilleana.

T. alter, huic simillimus, thorace autem nigro, punctis elytrorum obsoletioribus et parci oribus, statura paulo minore, exstat etiam in collectione Latreilleana.

FAMILIA II.

6. *T. striatus* M. p. 146.

Thorax punctis duobus ad marginem apicalem impressus.

7. *T. melanocephalus* M. p. 144.

Thorax interdum punctis 2 ad marginem apicalem impressus.

Var. I. 3, elytris, basi testaceis, apice nigris; long. 2 lin.

8. *T.*

8. *T. nanus*, nitidus, nigricans; coleoptris fuscescentibus, pedibus antennisque piceo-testaceis.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput ouatum, apicem versus subangustius; fuscum. Ore antennisque testaceis; his capite longioribus, extrorsum crassioribus.

Thorax nigro-fuscus, punctis 2 dorsalibus impressus.

Coleoptra quadrata, obsolete 4 crenato-striata, nigro-fusca, humeris et angulo exteriore apicis subpallidioribus.

Abdomen nigrum, marginibus segmentorum rufescens.

Habitat?

9. *T. bicolor* rufus; antennis extrorsum obscurioribus; pectore, abdome elytrorumque angulo exteriore apicali nigris.

Long. 5 lin.

Habitu, partiumque forma et proportione *T. melanocephali* maximi; statura autem maiore et colore obscuriore.

Caput suborbiculatum, ore producto, rufum; oculis nigris. Antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis; articulis 2 primis rufo-testaceis.

Elytra linea una disci crenata impressa, rufa; angulo apicis exteriore toto, ab humeris fere usque ad suturae apicem, nigro.

Pedes

Pedes rufo-testacei.

E collectione *Hellwigio-Hoffmannseggiana*.

Habitat in Borussia — *Hellwig*.

10. *T. tristis*, nitidus, niger; antennis pedibusque rufis.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput paruum, suborbiculatum, nigrum, palpis antennisque rufis.

Thorax niger, apice subobscuro-rubo micans.

Elytra nigra, summo apicis et suturae margine rufo; striata, striis disci parallelis, interna obsoletiore, externa puncta seu crenata.

Habitat in Borussia — *Hellwig*.

E collectione *Hellwigio-Hoffmannseggiana*.

11. *T. axillaris*, nitidus niger; femoribus anterioribus et antennarum basi pallidioribus; elytrorum linea longitudinali testacea.

Long. 5 lin.

Statura et partium forma atque proportione *T. striati*; colore autem, magnitudine, nec non defectu lineae punctorum disci elytrorum differt.

Caput nigrum; antennarum articulo primo, articuli vltimi apice, labioque rufescentibus.

Coleoptra subquadrata, lineis elytrorum deficientibus, relicta solummodo impressione laeui ad elytrorum basin.

Abdo-

Abdomen nigrum, segmentorum summo apicis margine subrufescente.

Pedes nigro-fusci; capitibus femorum femoribusque anticus rufescentibus.

Habitat in America septentr.

T. axillaris — Knoch.

12. *T. niger* M. p. 193.

13. *T. lunulatus* M. p. 147.

Thorace punctis duobus apicis marginalibus impresso.

14. *T. atricapillus* M. p. 143.

Thorace punctis 2 marginalibus apicis impresso.

Staph. atricapillus Oliv. Ent. St. n. 40. tab. IV. f. 39.

Varietatem vidi huius Tachini exiguum, long. 2 lin. elytris fuscouscentibus, macula humerali obliqua albicante.

15. *T. cinctus* M. p. 193.

16. *T. analis* M. p. 148.

*Thorax punctis 2 dorsalibus, ante marginem apicalem, vt in *T. splendido* (n. 3.) impressus.*

Elytra striis tribus punctorum, interdum obsoletis, impressa.

Abdominis segmentorum margines nunquam

fuscescunt; sed segmentum penultimum to-

tum

tum et antepenultimi pars dimidia marginalis rufescunt.

Haec species variat magnitudine et antennarum articulorum vltimorum colore et figura.
Var. 1 maxima; long. $4\frac{2}{3}$ lin. Antennis fuscis; tribus vltimis articulis paulo pallidioribus; vltimo reliquis paulo longiore, obtuso ouato; duobus primis testaceis.

Var. 2 minima; long. vix 3 lin. Antennis fuscis; articulis quatuor primis et vltimo, reliquis triplo longiore, testaceis.

Var. 3 media; long. $3\frac{1}{2}$ lin. Antennis fuscis; articulis 3 primis et 2 vltimis testaceis, vltimo reliquis duplo longiore.

Habitat Brunsuigae — Omnes hae varietates lectae sunt, tempore aestiuo, in sylvis, sub foliis deciduis — *Dahl*.

17. *T. merdarius* M. p. 149.

Varietatem huius speciei, pectore nigerrimo vidi in collectione *Bosciana*.

18. *T. cernuus*, nitidus niger; pedibus, ore, elytris, segmentorumque marginibus rufescens.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Statura nec non partium figura et proportione omnino *T. analis* (n. 16.) varietati minori affinis; haud vero segmentis penultimis rufis, sed omnium segmentorum marginibus fuscescentibus differt.

*Caput nigrum, ore rufo. Antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis, articulis 3 primis rufis; forma et proportione articulorum ut in *Tachini analis* varietate prima.*

Thorax niger seu nigro-castaneus; punctis 4 dorsalibus, quorum 2 margini apicali propiora, 2 autem medium versus posita sunt, impressus.

Elytra castanea, circa scutellum obscuriora, seriebus tribus punctorum, interdum obsoletissimis, impressa.

Abdomen coleoptris plus triplo longius, pilosellum, nigrum; segmentorum marginibus rufo-fuscescentibus.

T. cernuus — Knoch.

Habitat Brunswigae — Lectus, tempore aestivo, sub muscis, in sylvis — Dahl.

19. *T. formosus*, rufus; capite atque abdome, excepto ano, nigris; elytris punctis.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Statura nec non partium forma ac proportione omnino Tachinorum praecedentium; satis autem differt et colore et imprimis elytrorum punctura.

Caput nigrum; ore rufo. Antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus, fuscis, articulis 2 primis pallidioribus.

Thorax

Thorax rufo-fuscus; punctis 4 dorsalibus, 2 scilicet apicalibus, ad marginem, 2 autem medium versus, praeterea interdum uno alteroue ad marginem lateralem, impressus.

Scutellum rufo-fuscum.

Coleoptra rufo-fusca; punctis crebris, licet haud confertissimis, nec in series dispositis, impressa; pilis tenuissimis, haud confertis, oculo bene armato distinguendis vestita.

Abdomen, vt in *T. anali* (n. 16.) pilosum, nigrum, segmentis 2 vltimis totis, antepenultimo dimidio rufis.

Pedes rufi.

T. formofus — Knoch.

Lectus cum *T. praecedente* — Dahl.

20. *T. inclinans*, niger, nitidus; antennis, palpis, thorace, elytris punctis, pedibus, segmentorumque marginibus rufescensibus.

Long. 3½ — 4 lin.

Statura, nec non partium forma ac proportione, elytrorumque punctura *T. praecedente*; differt autem magnitudine, et anno haud rufo, sed segmentorum marginibus rufescensibus.

Caput nigrum, orbiculatum; antennis filiformibus, capitis thoracisque longitudine, palpisque rufo-fuscis; mandibulis vel nigris vel rufis.

Thorax coleoptris breuior; punctis 4 dor-
salibus, 2 scilicet ante marginem apicalem,
2 medium versus positis, et praeterea saepius
tribus obsoletioribus lateralibus marginalibus,
impressus, rufus.

Coleoptra rufo-castanea, crebrius puncta
quam in *T. praecedente*, et pilis distinctiori-
bus atque crebrioribus rufo-grisescenscentibus
velvita.

Abdomen pilosum, nigrum, segmentorum
marginibus rufo-fuscescentibus.

Pedes rufi. Quibusdam huius speciei indi-
viduis tarsi antici breues et dilatati sunt, et
articulus primus tarorum mediorum dilatatus;
quibusdam tarsi antici multo minus dilatati
et tarsi posteriores omnes simplices.

T. inclinans — *Knoch.*

Habitat Brunsuigae — Lectus, mense Maii,
in sylvis, sub foliis deciduis — *Dahl.*

Haec species et *T. formosus* (n. 19.) confi-
nia designant inter Staphylinos et Tachinos —
Confer quae de hac consinitate p. 22. monui.

GENVS III.

S T A P H Y L I N V S.

Hoc genus, quod natura a reliquis cogenerebus satis distinxit, habitu communi specierum nunquam sane cum vlo alio genere Micropterorum confundetur. Habitus quidem totus communis omnibus speciebus idem est, vix autem character distinctius eruetur sufficiens ad hoc genus ab omnibus reliquis distinguendum. Characteres, qui in Micropterorum systemate, anno 1802 publicato, Staphylinos designant, hic non adhibere possum, nam *St. Ulmi*, qui illic nouum genus condit, hoc systemate naturali ad Staphylinos redactus est. Nihilominus saltem duos characteres distinctios inuestigai, qui, vel iunctim vel singulatim, soli Staphylinorum generi proprii sunt: *articulum nempe ultimum antennarum parabolice lunatum*, et *series punctorum thoracis*, quibus, in familia secunda, *thorax elongatus accedit nunquam punctis confertissimis inordinatis impressus*. Sunt vero Staphylini, quibus characteres, a striis punctorum thoracis et a forma ultimi antennarum articuli desumtos iunctos vidimus, e. g. Staphylini longe plurimi familiae primae; sunt alii, uno alteroue tantummodo praediti; e. g. articulo ultimo an-

tennarum lunato, nec seriebus punctorum thoracis, omnes Staphylini familiarum III, IV et V; seriebus autem punctorum thoracis, nec articulo ultimo antennarum lunato Staphylini familiae II. Praeterea in nullo alio Micropteronum genere antennae sunt *ferratae*, quibus *St. dilatatus* a reliquis cospeciebus se distinguit; nec palpi quatuor *securidacei* (*Oxyporis scilicet* palpi solummodo posteriores *securidacei* sunt) yti plurimis speciminibus *St. Ulmi*.

Sunt quidam Staphylini e familia secunda (*St. fulminans*, *alternans*, *palmula*) quibus nec articulus ultimus antennarum lunatus, nec thorax seriebus punctorum (quamquam punctis paucis) impressus est. Nunquam autem haesitabimus, an hos Staphylinos caeteris, quos fam. II. complectitur, associemus, an non; habitu enim naturali, nec non forma atque proportione partium plurium essentialium, omnino cum illis congruunt: thorax elongatus laevis iam sufficit, quo species allegatae a *Lathrobiis* dignoscantur, cum quibus, ob statu ram proceriorem filiformen, forsan confunderentur, si quaedam confusio locum habere possit. *St. pyropterus* caret seriebus dorsalibus punctorum thoracis (quarum vestigia, punctis duobus, ad apicem thoracis sitis, remanent) et puncta serierum lateralium in arcum confluunt; caeterum autem de hac specie

specie idem valet, quod modo de aliis quibusdam huius familiae Staphylinis dixi.

De similitudine inter Staphylinos et quae-dam alia Micropterorum genera haec monenda sunt: Nemo sane Staphylinum cum alio quoquis Microptero confundet; attamen genera indicare me oportet, quibus hoc genus ad fine esse vide-tur — *Lathrobia* a Staphylinis fam. II. corpore depresso, thorace confuse puncto, pedibus va-lidioribus breuioribus, palpis acuminatis (qui solummodo in *L. latipede* filiformes sunt) dif-ferunt. — Ad *Aleocharas* quasdam fam. III. (e. g. ad *Al. collarem*) quidam Staphylini (e. g. *St. elegans* et *thoracicus*) non nisi colore propius accedunt. — *Tachini* forma et proportione tho-racis cum Staphylinis fam. I. quibusdam simi-litudinem aliquam habent, qua, intuitu primo leui, eo facilius decipi possumus, cum color niger et statura maior, in hoc genere rariores, accedant, e. g. in *T. nigro*. Iam difficilius est *T. inclinantem*, *formosum* et *cernuum*, characte-ribus essentialibus, nec ratione habita coloris, a Staphylinis huius familiae distinguere. Cole-optra eorum nempe puncta et pilosella sunt, vt Staphylinis, nec striis crenatis, vti plurimis Ta-chinis impressa, sed forma thoracis, deficienti-bus punctorum seriebus, articulo vltimo anten-narum haud parabolice lunato satis differunt.

(Confer

(Confer genus Tachinorum). Sunt autem quidam Staphylini (*St. impressus*, et *capucinus*), quibus coleoptra haud puncta sunt, sed crenato-siriata vel punctis paucis impressa, vti Tachinis, cum quibus autem, ob formam vltimi antenarum articuli, thoracis, nec non serierum punctorum thoracis nunquam confundi possunt. —

Quo facilius ordo in hoc genere perspici queat, species Staphylinorum in quinque familias distribui.

FAMILIA I.

Comprehendit illas huius generis species, quae aliquam cum genere praecedente adsimilitatem produnt; omnes ergo Staphylinos familiae quondam tertiae. M. p. 15. — Charakteribus autem illic datis haec addo:

Antennae St. dilatati serratae sunt, articulo vltimo ouato; haud parabolice obtuso, vti longe plurimis huius familiae speciebus, imprimis autem omnibus maioribus esse solet.

Palpi St. Ulmi plerumque securidacei sunt.

Coleoptra longe plurimis huius familiae Staphylinis aenescentia seu viridana sunt, quorum in reliquis huius generis Staphylinis nullum exemplum exstat.

Thorax seriebus punctorum discoidalibus impressus esse solet; perpaucis speciebus discus thoracis his seriebus caret.

1. *St. impressus* M. p. 35.

Caput orbiculatum, thorace paulo vel duplo minus, nigrum, nitidum, leve; in angulis baseos punctum, punctis quatuor distinctioribus. Antennis et palpis fuscis.

Thorax orbiculatus, lateribus fere aequē decliuus ac in *St. nitido* (n. 5); punctura etiam *St. nitidi*, seriebus nempe dorsalibus tripunctis, lateralibus obsoletis (rarissime distincte 4 punctis, quod non nisi in unico individuo, a Dom. *Sturm* mecum communicato, vidi); coleoptris paulo breuior; niger.

Coleoptra latitudine vix paulo longiora; depilia, marginibus tantum subciliatis; nigro-fusca, margine suturaque rufis. *Elytris* seriebus 4 longitudinalibus punctorum circiter 7 — 9 impressis; serie prima ad suturam sita; secunda et tertia disci; quarta, ante marginem, vbi elytra deflectuntur, punctis autem obsoletioribus; inter has series interdum puncta quaedam vaga disseminata sunt; pars deflexa elytrorum ipsa subtiliter et confertim puncta est.

Abdomen coleoptris plus duplo longius, pilosellum, nigrum, aeneo-sericans, marginibus segmentorum rufescentibus.

Pedes fusci, tarolis anticis dilatatis.

Habitat Norimbergae — *Sturm*; Brunsui-gae — *Dahl*.

Varie-

Varietas huius *Staphylini* est var. 6. *St. nitidi* M. p. 52.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, leue, punctis quibusdam distinctioribus in angulis baseos impressum; antennis fuscescientibus, basi rufescente.

Thorax vnius indiuiduorum duorum meae collectionis niger, punto marginali distincto; punto vnico lateral, ante marginem apicalem sito; seriebus dorsalibus tripunctis. Alterius indiuidui thorax fusco-niger est; punto marginali distincto; punctis 2 lateralibus minutis, serierum dorsalium punto primo minore; secundo et tertio confluentibus ita ut impressionem irregularē forment.

Coleoptra quadrata, depilia; margine tantummodo inferiore subciliato. *Elytra* leuia, serie punctorum 5 vel 6 disci longitudinali, quae autem vix oculo armato se offert, punctis nempe obsoletissimis, impressa; castanea, disco obscuriore.

Abdomen vt in *St. impresso*, nigrum autem, marginibus segmentorum rufescientibus.

Pedes rufi.

2. *St. Capucinus*, nitidus, niger; pedibus rufescientibus; elytrorum disco vase puncto; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 lin.

A St. praecedente, colore et magnitudine, a reliquis autem Staphylinis elytrorum punctura differt.

Caput orbiculatum, thorace minus, leue; punctis 4 interocularibus, 2 occipitalibus impressum; nigrum, palpis et antennis fuscescentibus, his capite paulo longioribus.

Thorax, vt in *St. nitido* (n. 5.) 3, 2, 1 punctus.

Coleoptra quadrata, thorace paulo maiora, nuda vel vix pilosella; margine laterali multipuncta; disco punctis paucioribus impressa.

Abdomen pilosum, nigrum, subaeneo-varians, summis segmentorum marginibus fuscescentibus; segmento penultimo subtus inciso.

Pedes fusti, tarsis anticis subdilatatis.

Habitat in America septentr.

St. capucinus — Knoch.

3. *St. xantholoma* niger, nitidus; elytris opacis, margine laterali testaceo; thorace subquadrato, seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 lin.

Caput orbiculatum, thoracis magnitudine, punctis perpaucis maioribus impressum, nigrum; oculis paruis; palpis antennisque fuscescentibus, his capitatis et thoracis longitudine, articulo ultimo obtusiusculo.

Thorax subquadratus, coleoptris duplo fere minor; puncto marginali et punctis ferierum dorsa-

dorsalium tribus distinctis; serie laterali deficiente.

Coleoptra latitudine paulo longiora, opaca, subtilissime puncta, vix depilia, margine apicali fimbriata; nigra, margine laterali testaceo.

Abdomen nigrum; lineis duabus dorsalibus longitudinalibus subobsoletis, nec non ventre griseo-sericantibus.

Pedes fuscescentes.

Habitat Rostochii — Karsten, qui eum sub nomine *St. lateralis* cum Hellwigio communicauit.

St. xantholoma — Hellwig.

4. *St. lateralis* M. p. 55.

Varietas coleoptrorum margine laterali obsolete rufo habitat Parisiis — Latreille.

Varietas altera; Long. $4\frac{1}{2}$ lin. *Caput* nigrum; palpis et antennarum fuscarum articulo primo rufis — *Thorax* seriebus dorsalibus 3 punctis, puncto marginali uno. — *Abdomen* nigrum, ano pallescente. — *Pedes* obscurō-fusci, tarsis pallidioribus. — Habitat Parisiis — Bosc.

5. *St. nitidus* M. p. 31.

Microptera, quae, loco citato, sub hac specie, qua varietates recensui, colore et magnitudine satis differunt, vt discrimin accuratius sane requirant. Forsan remotissimae varie-

varietates sunt species peculiares, quae, copula inter se iunctae, varietates intermedias generunt. Varietates ideo praecipuas hic accuratius recensere et describere mihi propositum est. Disquisitionibus et observationibus reiteratis et multiplicatis, lapsu temporis diiudicari poterit, an hae varietates remittiores species sint genuinae, an nihil aliud quam varietates vnius eiusdemque speciei.

Varietas tota nigra.

Long. 4 lin.

Caput orbiculatum seu subovatum, latitudine paulum longius; thorace minus. Mandibulis magis minusue validis. Antennis nigricantibus seu fuscouscentibus.

Pedes fuscouscentes; femoribus interdum obscurioribus.

Huc pertinent varietates 1 et 2 M. p. 52.

Differentia magnitudinis capitis eiusque formae, et fortitudinis mandibularum, nullo modo adhiberi potest ad nouam speciem condendam. Haec enim differentia in multis aliis coleopterorum et ipsorum micropterorum speciebus obseruatur, et forsitan etiam differentiae sexuali respondeat.

Varietas nigra, elytris castaneis.

Long. 5 — 6 lin.

Caput

Caput orbiculatum, maius minusue, semper autem thorace minus.

Huc pertinet varietas 12 M. p. 32.

Omnes vero reliquae varictates, quarum, pagina citata, mentio facta est, exceptis varietatibus 6, 8, 13, de quibus infra quedam adhuc monebo, vel e copula harum duarum (quae pro speciebus peculiaribus statui possunt) ortae sunt, characteribus patris et matris mixtis; vel sunt indiuidua modo e pupa prorupta, nondum colore perfecto imbuta, quod in omnibus reliquis insectis, modo e pupa enatis, obleruari potest. Differentia magnitudinis antem effecta esse potest causis aliis externis, quibus larua magnitudinem perfectam nasci haud potuit.

Dixi in descriptione *St. nitidi* M. p. 31., thoracem plerumque puncto tantum uno alteroue maiore, rarius seriebus dorsalibus tripunctis impressum esse; quod autem secus se habet: Series enim tripunctae dorsale nunquam desunt, quamuis puncta saepe adeo subtilia sint, vt vix oculo armato detegi possint. Positio horum punctorum haec est: Primum ante marginem anteriorem, tertium in medio thoracis (apici attamen paulo proprius quam basi), secundum inter primum et tertium, interuallis aequalibus ab utroque. Rarius tertium

tertium illud, in medio thoracis positum, interuallo maiore a duobus primis distat et multo distinctius illis est. Hanc positionem autem non nisi in individuo var. 12. unico, quod posideo, obseruaui.

Varietas 6 M. p. 32., ad *St. impressum* relata est (n. 1).

Varietas 8 M. p. 32. propria species esse videatur, de qua infra, sub nomine *St. articillus* (n. 19.).

Varietas 13 M. p. 32. peculiaris quoque species, *St. tenellus* (n. 18.) est.

Varietas noua *St. nitidi* est nigra; antennis fuscis, basi rufis; palpis, pedibus, segmentorumque marginibus rufis. — Habitat Norimbergae — *Sturm*.

Haud raro in collectionibus hanc vel illam *St. nitidi* varietatem sub nomine *St. fulgidus* reperi, e. g. in collectione *Bosciana* *St. nitidum* nigrum; antennis, pedibus, elytris, ano, segmentorumque marginibns rufis; caeteris autem *St. nitido* similem; nec non alium *Staphylinum*, a *D. Sturm* sub nomine *St. fulgidus* mecum communicatum, quem pro varietate 12 *St. nitidi* agnoui.

Geoffroy (Hist. St. n. 11.) *Staphylinum* descripsit, quem M. p. 53. ad *St. nitidum* allegauit. *Fourcroy* (Ent. Par. St. n. 11.) eum

St.

St. fulvopterus nominavit. Grauiter autem haereo, an sit verus *St. nitidus*. Longitudo ei tribuitur tantum 3 linearum; descriptio autem valde breuis est: "Niger, nitens; pedibus antennis coleoptrisque testaceis (couleur maron); elytris punctatis praecipue a specie precedente (*St. fuluipede* et *ambiguo*) differt. Venter nigro-fuscus." — An forsan *St. corruscus*?

6. *St. molochinus*, niger, nitidus, abdomine obscurō-aenescente; antennis palpis tarsis elytrisque castaneis; thorace seriebus dorsalibus 3-punctis.

Long. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ lin.

A. *St. nitido* satis differt thorace haud dilatato, elytris breuioribus et multo gracilius punctis, abdomine vario-aenescente.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, punctis interocularibus 2 vel 3, et 3 pone oculos distinctis impressum, nigrum; antennis filiformibus, capite paulo longioribus, palpisque rufescensibus.

Thorax magnitudine coleoptrorum, orbiculatus; seriebus dorsalibus semper 3 punctis, (punctis vt in *St. nitido* et reliquis, quorum thorax seriebus dorsalibus 5 punctus est, positis); punctis marginalibus et lateralibus vel duobus vel solummodo vnico.

Cole-

Coleoptra quadrata, obscuro-castanea, subtilissime puncta, et pilis tenuissimis vestita.

Abdomen coleoptris quadruplo longius, nigrum, coloribus variis subaenescens.

Pedes vel nigro-fusci, tarsis rufescentibus; vel rufo-fusci, tarsis pallidioribus.

Habitat Brunswigae — *Dahl.*

St. molochinus — *Knoch.*

7. *St. Ulmi* M. p. 199. *Astrapaeus Ulmi.*

St. ulmineus Fabr. El. St. n. 28.

Astrapaeus Ulmi Panzer. Fn. G. H. 38. t. 4.

8. *St. laticollis* M. p. 173.

9. *St. moestus* nitidus, niger; palpis antennisque obscuro-fuscis; pedibus rufo-fuscis; capite ouato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long. 3 — 4 lin.

Caput ouatum, thorace duplo fere angustius; antennis capite duplo fere longioribus.

Thorax coleoptris paulo angustior, seriebus 5, 3, 2 punctis. Interdum punctorum dorsarium vnum alterumue subtilius est, ita vt facile oculos fugere possit; interdum etiam vnum alterumue supernumerarium est; vnde euenit, vt series dorsales vel e 4 vel e 6 punctis compositae videri possint.

Coleoptra quadrata, subpilosella, interdum subaenescens.

Pedes

Pedes fuscis, tarsis gracilibus.

Habitat in America septentrionali — *Knoch.*

St. moestus — *Knoch.*

10. *St. fuliginosus* M. p. 34.

11. *St. tristis* M. p. 34. nitidus, niger; seriebus dorsalibus tripunctis; capite, oculis magnis, et inter oculos serie transuersali 5 vel 6 punctorum impresso.

Long. 4 — 5 lin.

Caput thorace minus, latitudine paulo longius, nigerrimum, nitidissimum, leue; punctis 2 vel 3 distinctioribus in angulis baseos, nec non 5 vel 6 inter oculos positis impressum. Haec puncta, inter oculos posita, seriem formant transuersalem, ita ut haec series, in medio frontis, interuallo paulo maiore interrumpatur; rarius horum punctorum duo perassimia sunt vel confluunt in punctum unicum, ita ut series e punctis quinque constet. Caeterum autem haec punctorum series characterem praebet, quo haec species bene a speciebus confinibus distingui potest, quod in speciminibus quinque, quae possideo, probatum inueni. — Oculi sunt magni; antennae, capite paulo longiores, graciliores quam in *St. nitido* (n. 5.), vel omnino nigrae, vel basi aut omnino rufae sunt; palpi vel rufescentes vel nigricantes.

Thorax

Thorax orbiculatus, vix paulo angustior quam in *St. nitido*, nigerrimus, nitidissimus, coleoptrorum magnitudine; punctura vt in *St. nitido*.

Coleoptra quadrata, nitidula, subtiliter et confertim puncta; pilis breuissimis, interdum ipso armato oculo vix conspicuis, tecta.

Abdomen, coleoptris plus triplo longius, subtilissime punctum, nitidulum, nigrum; coloribus aeneis magis minusue micans; segmentis ultimis vel integris vel ventre sinuatis, penultimo autem semper multo profundius quam antepenultimo.

Pedes nigri; tarsis fuscis, anticis dilatatis.

Habitat Brunswigae — Captus, tempore vernali, ad fossas, sub lapidibus — Dahl. — Habitat etiam Parisiis, vbi in collectione *Bosciana* varietatem huius Staphylini antennis totis ochraceo-rufis vidi.

St. tristis Fabr. Ent. Syst. St. n. 21., niger, thorace obscuro-aeneo, elytris pubescentibus obscurioribus. — Habitat in Dania; Mus. Dom. de Schestedt — Paulo maior St. polito. Antennarum articulus primus apice ferrugineus. Caput leue, atrum. Thorax leuis, nigro-aeneus nitidulus. Elytra pubescentia obscuriora. Corpus nigrum.

12. *St. ruficornis*, nitidus, niger; abdomine aeneo-vario; palpis, antennis, pedibusque rufis; capite ovato, oculis magnis.

Long. 4 lin.

Statura graciliore, capite parvo, thorace haud dilatato etc. a St. praecedente differt; statura maiore, abdomine breuiore aeneo etc. a *Staph. attenuato* (n. 31).

Caput ovatum, thorace breuius et multo angustius, nigrum; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufis; oculis magnis oblongis.

Thorax coleoptrorum magnitudine, seriesbus dorsalibus tripunctis, puncto marginali uno; punctis subtilibus.

Coleoptra nitidula, quadrata, fuscescens, subpilosella, confertissime subtilissimeque puncta.

Abdomen, ut in St. praecedente, coloribus aeneis micans; rarius opacum nigrum, segmentorum marginibus ventre rufescens.

Habitat Parisis — Latreille.

13. *St. scitus* niger, nitidus; pedibus, antennis, elytrisque rufis; his angulo apicis exteriore nigro; thorace seriesbus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 — $5\frac{1}{4}$ lin.

Habitu omnino *St. nitidi* (n. 5.) minoris; statura autem graciliore.

Caput

Caput suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus, nigrum, nitidum, in angulis baseos punctis paucis impressum; oculis paruis; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufo-testaceis.

Thorax niger, coleoptrorum fere magnitudo, orbiculatus, nec vero eadem latitudine ac in *St. nitido*, angulis apicis deflexis; puncto marginali uno, unoque laterali minuto, seriebus dorsalibus 3 punctis.

Scutellum nigrum.

Coleoptra quadrata, nitida, pilis pertenuibus, haud confertissimis, vestita; subtiliter, nec vero confertissime, puncta; rufa, angulis apicis nigris.

Abdomen coleoptris plus triplo longius, pilosellum, nigrum, segmentorum marginibus rufescentibus.

Pedes rufo-testacei, tarsis interdum obscurioribus.

Habitat Brunsuigae — ad salicem captus hyemans — Dahl.

14. *St. corruscus* M. p. 33.

15. *St. coenosus* niger, nitidus, coleoptris castaneo-rufis; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis; capite orbiculato.

Long. 5 — 6 lin.

Statura, nec non partium forma proportione et punctura *St. aeneo* simillimus, a quo coleopteris rufis et subtilius punctis differt.

Caput quadratum, angulis obtusis, thorace paulo latius; punctis crassis confertis in angulis baseos, et inter oculos paruos punctis 4 maioribus, nec non quibusdam minoribus vagis, impressum; antennis filiformibus, capite paulo longioribus.

Thorax coleoptris paulo minor, apicem versus vix paulo angustior, punctis 1, 2, 4 maioribus, praeterea autem nonnullis minoribus praesertim in angulis apicis, impressus.

*Coleoptra quadrata, subtilius puncta quam in *St. aeneo* (n. 78.); pilis tenuibus, testaceo-grisecentibus vestita.*

Scutellum nigrum.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, pilis tenuissimis grisecentibus vestitum.

Pedes nigri, tarsis omnibus gracilibus fuscouscentibus.

Habitat Norimbergae — Sturm.

St. coenosi varietas? *St. nigro-fuscus, elytris piceis; capite orbiculato; thorace seriebus dorsibus 4 punctis.*

Long. 5 lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nitidum, basi punctis paucis impressum; nigro-

gro - fuscum; antennis capite longioribus;
clypeo et labro testaceis.

Thorax nigricans, obscuro - rufomicans;
4, 3, 1 punctus.

Coleoptra quadrata, puncta, picea, pilis
tenuissimis vestita.

Abdomen nigro - fuscum, segmentorum mar-
ginibus ventre pallidioribus.

Pedes fusci, tarsis anticis subdilatatis.

Huius *Staphylini* specimen unicum e col-
lectione Hellwigio-Hoffmannseggiana descripsi.
Habitat in Borussia — Kugelann.

16. *St. palliatus* nitidus, niger; elytris, pedibus,
antennarumque basi testaceo - rufis.

Long. 2 lin.

Caput suborbiculatum, thorace paulo mi-
nus, nigrum; articulo primo antennarum rufo.

Thorax coleoptris paulo minor, seriebus
dorsalibus 4 - 5 punctis; lateralibus 3-, mar-
ginalibus 2 punctis.

Coleoptra quadrata, subpilosella, testa-
ceo - rufa.

Pedes testaceo - rufi, capitibus femorum ni-
gerimis.

Habitat in America septentrionali — Knoch.

17. *St. peregrinus*, nitidus, nigricans; antennis,
palpis, elytris, pedibus, thoracis lateribus, et
segmentorum marginibus rufescensibus.

Long.

Long. 3 lin.

Habitu et thoracis forma *St. nitido* (n. 5.) affinis; capite autem ouato et colore satis differt.

Caput ouatum, thoracis longitudine, sed eo angustius, nitidum, punctis perpaucis majoribus impressum, nigrum; antennis (quarum articulus ultimus deest) capite paulo longioribus, palpisque rufis.

Thorax punctis quibusdam impressus, niger, lateribus rufescens.

Coleoptra quadrata, subpilosa, piceo-rufescens.

Abdomen, segmentorum marginibus rufis, supra nigricans, infra fuscum.

Pedes testaceo-rufi, tarsis anticis dilatatis.

Habitat in Carolina — *Bosc.*

18. *St. tenellus* — *St. nitidi* var. 13. M. p. 32. nigro-fuscus; abdome pedibusque pallidioribus; elytris testaceis; thorace seriebus dorsibus 4 punctis.

Long. 5½ lin.

Statura graciliore, colore et thoracis punctura satis a *St. nitido* (n. 5.) distinctus est — Specimen autem tantummodo unicum in mea collectione exstat.

Caput suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace minus, nigrum, nitidissimum;

num; in angulis baseos punctum, punctis 3 distinctioribus; antennis fuscouscentibus.

Thorax orbiculatus, latitudine fere eadem ac in *St. nitido*; nigro-fuscus, marginibus pallidioribus; puncto marginali uno; serie laterali 3 puncta; seriebus dorsalibus 4 punctis, punctis autem subconfluentibus. Praeterea punctum marginale in angulo baseos, ante humeros coleoptrorum, impressum est, distinctius quam in reliquis huius familiae *Staphylinis*.

Scutellum nigro-fuscum.

Coleoptra quadrata, dilute testacea, nitida, subtiliter puncta, pilis tenuissimis vestita.

Abdomen coleoptris triplo longius, pilosellum, fuscum, subtiliter punctum.

Pedes fusi; tarvis anterioribus pallidioribus, anticis brevibus.

19. *St. atricillus* — *St. nitidi* var. 3. M. p. 32. — fuscus; capite nigro; pedibus testaceis; series dorsalibus thoracis tripunctis.

Long. 4 lin.

Statura paulo graciliore et colore a *St. nitidi* varietatibus differt.

Caput suborbiculatum, latitudine paululum longius, nigrum, nitidissimum, punctis 4 in angulis baseos distinctioribus impressum; antennis palpisque rufescentibus.

Thorax

Thorax orbiculatus, angustior paulo quam in *St. nitido*, vix coleoptris paulo minor; nitidus, rufo-fuscus; punctura vt in *St. nitido*.

Scutellum rufo-fuscum.

Coleoptra quadrata, rufo-fusca, nitida; punctura et pilis vt in *St. nitido*.

Abdomen coleoptris triplo longius, subtilissime punctum, subpilosellum, nitidum, rufo-fuscum, marginibus segmentorum pallidiorebus.

Pedes rufo-testacei.

20. *St. maurorufus*, nigro-fuscus; capite atro, oculis magnis; pedibus et antennarum basi testaceis; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 lin.

Habitu *St. nitidi* (n. 5.).

Caput orbiculatum, thorace duplo minus, nigrum, nitidum; puncto uno maiore pone oculos, in angulo baseos, et puncto obsoleto, seu impressione leui, frontali. Oculis magnis. Antennis, capite longioribus, testaceo-fuscis, griseo-pilosellis, basi pallidiore nuda. Palpis testaceis.

Thorax, coleoptrorum fere magnitudine, orbiculatus, angulis apicis deflexis; fuscus seu nigro-fuscus, margine laterali pallidiore; punctis 1, 2, 3, vt in *St. nitido*, impressus.

Cole-

Coleoptra quadrata, subopaca, confertim puncta, pilis tenuibus et flavo grisecentibus vestita; vel fusco-nigricantia, marginibus rufo-fuscis; vel fusca, marginibus et sutura rufescensibus.

Abdomen coleoptris plus triplo longius, opacum, nigro-fuscum vel fuscum, pilosellum.

Pedes rufo-testacei vel testacei.

Habitat Brunswigae — captus sub cortice salicium, tempore vernali — Dahl.

St. mauro-rufus — Knoch.

21. *St. praecox* M. p. 172.

22. *St. brunneus* M. p. 172.

23. *St. pygmaeus*, nitidus, niger; palpis, antennis, elytris, pedibusque rufescensibus; thorace haud dilatato, seriebus dorsalibus 3 punctis.

Long. 2 lin.

Caput suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace minus; punctis 2 vel 3 distinctioribus in angulis baseos, punctoque unico ad marginem interiorem oculorum, impressum; nigrum; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufis.

Thorax suborbiculatus, apicem versus paulo angustatus, coleoptris minor; niger, nitidus; punctis 1, 2, 3, et praeterea punctis 2 maioriibus,

ribus, quorum singulum inter punctum ultimum serierum dorsarium et baseos angulum, illi attamen proprius, positum est, impressus.

Coleoptra subquadrata, nitida, latitudine vix paulo longiora, puncta, subpilosella, castanea.

Abdomen coleoptris plus duplo longius, nigrum, nitidum, subpilosellum; marginibus segmentorum rufescens.

Pedes testaceo-rufi.

Huius speciei individuum solummodo unicum possideo.

24. *St. discoideus* M. p. 38.

Long $2\frac{1}{2}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace minus; nitidum, nigrum; punctis quibusdam in angulis baseos, quatuorque inter oculos, impressum. *Antennae*, capite longioribus, palpisque fuscis; illis basi rufis.

Thorax, forma et proportione ut in *St. fusco* (n. 26.), 1, 3, 5 punctus; punctis autem distinctissimis; rufescens vel nigro-rufus.

Coleoptra quadrata, puncta, punctis crassioribus quam in *St. fusco*, subtiliter pilosella, vel nigricantia aut nigro-rufescens vel picecentia, marginibus plerumque pallidioribus.

Abdomen coleoptris triplo fere longius, nitidulum, pilosellum; vel dorso fuscum, ven-

tre rufescens; vel nigrum, segmentorum marginibus ventralibus rufescentibus; vel totum nigrum.

Pedes rufescentes seu rufo-testacei.

Habitat in Germania et in Gallia.

Hunc Staphylinum in collectione *Bosciana* sub nomine *St. flauescens* Fabricii vidi; et nihil obstat, quin huc referatur, Fabricius enim ipse insecta collectionis Boscianae examinavit et denominauit.

St. flauescens Fbr. El. St. n. 41.

St. flauescens Linn. Fn. Suec. n. 350. huc non pertinere videtur, nam "similis est *St. subterraneo*" (*Tachyporo subterraneo*) — Confer *T. humeralis* M. p. 157.

25. *St. sericans* M. p. 171. variat colore sericeo thoracis euanescente, coleoptris subpilosellis.

26. *St. fuscus* M. p. 29.

Long. 3 lin.

Caput orbiculatum, thorace vix minus, nitidum, nigrum; in angulis baseos punctum, et serie punctorum 5, interuallis aequalibus distantium, medio autem obsoletiore, inter oculos impressum. *Antennis*, capite paulo longioribus, palpisque rufo-fuscescentibus.

Thorax subquadratus, apicem versus paululum angustior; punctis 1, 3, 4 minutis impressus; coleoptris paulo minor; nigro-rufus.

Cole-

Coleoptra quadrata, nitida, confertissime et subtiliter puncta, pilis grisecentibus tenuibus vestita, fusco-picescentia.

Abdomen nigrum, nitidum, pilosellum; marginibus segmentorum ventralibus, et segmenti vltimi et penultiimi marginibus quoque dorsalibus rufescentibus.

Pedes rufi.

27. *St. testaceus* fusco-niger, nitidus; antennis pedibusque rufescentibus; elytris picescentibus; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long 2 — $2\frac{1}{4}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace vix paulo minus, nitidum, nigrum, punctis paucis impressum; oculis paruis; antennis rufis, capite longioribus; palpis fuscis.

Thorax subquadratus, coleoptris paulo minor, nitidus, fusco-niger; 1, 3, 5 punctus.

Coleoptra quadrata, pilosella, subpicescentia.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, dorso subgriseo-sericante; marginibus segmentorum ventralibus rufescentibus.

Pedes rufo-picei, tarfis anticis subdilatatis.

Habitat Brunsuigae — Knoch — et Paris. — Latreille.

St. testaceus Payk. St. XX.

28. *St. ventralis* M. p. 174.

29. *St. terminatus* M. p. 30.

30. *St. subuliformis* M. p. 29. et *St. fragilis* M. p. 30., ex obseruatione Dom. Prof. Knoch varietates sunt vnius eiusdemque speciei. —

Thorax seriebus dorsalibus bipunctis impressus est.

31. *St. attenuatus* M. p. 27. nigricans seu fuscescens, nitidus; pedibus testaceis; oculis magnis; seriebus dorsalibus thoracis tripunctis.

Long. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace minus, nigrum, nitidissimum; punctis 2 in angulis baseos distinctioribus, et puncto uno ad marginem oculorum interiore, impressum; antennis, capite longioribus, vel omnino testaceo-rufis, vel obscuro-rufis basi pallidiore; palpis rufis.

Thorax orbiculatus, magnitudine fere coleoptrorum, nitidissimus, vel niger, vel fuscus lateribus rufescentibus; plerumque 1, 2, 3 punctus.

Coleoptra exacte quadrata, subopaca, nigricantia vel fuscescens, pilis tenuissimis rarioribus vestita; subtilissime puncta, et quidem subtilius quam in plurimis reliquis Staphylinis.

Abdomen coleoptris plus triplo longius, pilosellum, subnitidum, nigricans seu fuscescens.

Pedes testacei.

Longi-

Longitudo abdominis haud semper eadem est. Omnia eo dependent, an animalculum moriens abdomen contraxerit, nec ne. Cae-terum autem hic *Staphylinus* semper abdo-mine longiore gaudere videtur quam reliqui huius familiae *Staphylini*.

Color et magnitudo huius *Staphylini* variant.
Varietas 1. nigra; antennis, elytris, thorace-que fulcescentibus, hoc margine laterali rufes-cente.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Thorax puncto uno marginali, unoque la-terali distinctis; interdum vero etiam seriebus lateralibus tripunctis; punctis duobus subti-lissimis, tertio intermedio autem distincto imprellus.

Var. 2. fusco-castanea; thoracis margine, an-tennarum articulo primo, palpisque pallidio-ribus; pedibus testaceis; capite nigro.

Long. $2\frac{2}{3}$ lin.

Caput interdum puncto maiore interoculari obsoleto impressum.

Thorax puncto uno marginali lateralibus-que tribus distinctis.

Abdomen fuscum, colore cupreo-rutilante aenescens.

Var. 3. *Caput* nigrum; antennis fuscis, arti-culo primo testaceo; palpis testaceis.

Thorax

Thorax fusco-castaneus, margine laterali rufo unipuncto, lateribus tripunctis, punctis his lateralibus plerumque distinctis, interdum autem obsoletioribus ut in varietate prima.

Coleoptra fusco-seu rufo-castanea.

Abdomen nigro-viridi-aeneum, marginibus segmentorum rufis.

Pedes rufo-testacei.

Long. $5\frac{1}{2}$ lin.

Hanc varietatem tertiam Dom. *Dahl* mecum communicauit sub nomine *St. limbatus*. *Magnitudine* nimirum et colore satis a var. 1. differt; sit ergo species propria. Var. 2. autem, species spuria, forsitan e copula *St. attenuati* et *St. limbati*, inter quos medium tenet, orta est.

Habitu partiumque forma ac proportione omnes autem congruunt.

Habitat Brunswigae — *Dahl*.

32. *St. bimaculatus* M. p. 38.

33. *St. bipustulatus* M. p. 37. niger, nitidus; elytrorum macula apicem versus sanguinea.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 4 lin.

Sutura nigra et capitibus femorum obscuris a *Staph. sanguinolento* (n. 34.); macula elytrorum angulum apicis interiorem versus distincta nec variabili, femorumque capitibus obscuris a *St. opaco* (n. 35.) differt.

Omnis

Omnes M. p. 37. descriptae varietates, ter-tia excepta, quae verus *S. bipustulatus* est, ad *St. opacum* referuntur.

Ex obseruatione Dom. Prof. Knoch hic *St. bipustulatus* et *St. sanguinolentus* ad vnam eandemque speciem referendi sunt, nec nisi sexu differunt.

34. *St. sanguinolentus* M. p. 36.

Pedes capitibus femorum anticis flauo-testaceis; tarvis anticis interdum dilatatis.

Habitat in Germania et Gallia.

St. contaminatus M. p. 174. mera *St. sanguinolenti* varietas, aut species intermedia inter hunc et *St. opacum* est; forsan e copula amborum ortus.

35. *St. opacus* M. p. 26., niger, nitidus; coleoptris sanguineo notatis, sutura autem semper nigra; capitibus femorum anticis (plerumque) testaceis; seriebus dorsalibus thoracis 5 punctis.

Distingui potest a *St. sanguinolento* (n. 34.) capite ouato, multo minore, sutura nunquam sanguinea; a *St. bipustulato* (n. 33.) macula apicis elytrorum distincta deficiente, et capitibus femorum anticis plerumque testaceis.

Long. 2 — $3\frac{1}{2}$ lin.

Caput ouatum, thorace duplo minus.

Thorax

Thorax coleoptris minor, seriebus dorsali-
bus 5 punctis.

Elytra magis minusue pilis grisecentibus
vestita; sanguineo-notata, et quidem:

1. puncto humerali et striga discoidali san-
guineis confluentibus. — *Payk. St. varians*
var. β . in Mon. St. n. 35.

2. puncto humerali sanguineo.

3. striga disci sanguinea.

4. striga humerali sanguinea.

5. striga laterali sanguinea.

Pedes nigri vel nigro-fusci; capitibus fe-
morum anticis plerumque planatis, testaceis.

Varietates occurunt intermediae, seriebus
thoracis dorsalibus 4 punctis, statura parua

$\frac{2}{3}$ lin., elytris nigricantibus vel griseo-sub-
sericantibus. Haec specimina forsitan e copula
huius *Staphylini* cum aliis minoribus orta sunt.

Species intermedia inter *St. opacum* et *St. atra-
tum* est *St. obscurus* M. p. 174., qui passim in
Germania occurrit.

Long. 3 lin.

Caput latitudine vix paulo longius, tho-
race paulo vel duplo minus; punctis quibus-
dam in angulis baseos, et 4 interocularibus
distinctis impressum; antennis, capitis thora-
cisque longitudine, palpisque obscuro-fuscis.

Thorax coleoptris minor, 1, 3, 5 punctus.

Coleoptra quadrata, nigra vel subfuscescens-tia, subtiliter puncta, subpilosella.

Abdomen coleoptris triplo longius.

Pedes fusti; capitibus femorum anticis interdum pallidioribus.

36. *St. immundus*, nitidus, niger; basi antennarum, palpis, et pedibus testaceo-rufis; capite suborbiculato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long. 3 lin.

Caput suborbiculatum, thorace minus. Antennis, capite longioribus, fuscescens-tibus; articulo primo rufescente. Palpis rufescens-tibus.

Thorax colore fugacissimo griseo subsericans, seriebus 5, 3, 2 punctis.

Coleoptra quadrata, puncta, nigra, pilis tenuissimis griseis tecta, margine laterali pallido.

Abdomen subpilosellum, nigrum, marginibus segmentorum ventralibus rufis.

Pedes testaceo-rufi.

Habitat Parisis — *Bosc*, *Desmarest*.

Staphylinum simillimum, capite vix paulo minore quam thorax, punto quinto serierum dorsalium paulo remotore et distinctiore Domi. *Sturm* mecum communicauit.

37. *St. celer*, niger, nitidus; antennis fuscis; pedibus rufo-testaceis; segmentorum marginibus

nibus ventre rufis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subouato.

Long. 3 lin.

Caput subouatum, thorace paulo angustius, nigrum; palpis antennisque fuscis, his capite duplo longioribus.

Thorax coleoptris paululum minor, nigricans, 5, 3, 1 punctus, punctis distinctis.

Coleoptra subdepilia, piceo-nigra.

Pedes tarsis tenuibus.

Habitat Parisiis — *Latreille.*

38. *St. Anthrax* M. p. 176.

39. *St. ochropus* M. p. 59.

40. *St. rufipes* M. p. 171.

41. *St. ebeninus* M. p. 170.

42. *St. carbonarius* M. p. 23.

43. *St. fumarius* St. nitidus niger, pedibus rufis; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 6 punctis.

Long. 3 — 4 lin.

Caput suborbiculatum, thorace duplo minus, nitidum, nigrum; punctis 4 in angulis baseos distinctioribus, et 4 interocularibus impressum. Antennis, capite plus duplo longioribus, palpisque fuscescentibus.

Thorax orbiculatus, apicem versus paulo angustior, coleoptris minor; niger, nitidus; 2, 3, 6 punctus.

Coleoptra quadrata, minus nitida quam caput et thorax, subaenescentia, pilis tenuissimis griseis vestita; puncta, punctis subtilioribus quam in *St. polito*.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, nitidulum, pilosellum.

Pedes testaceo-rufi; *capitibus femorum nigricantibus*.

Habitat Brunsuigae; raro captus sub gramine ad ripas — *Dahl*.

Dom. Prof. *Knoch* mecum communicavit hanc notitiam: “*St. carbonarius* in collectione Hellwigiana (idem individuum, quod M. p. 25. descriptum est) cum *St. fumarii* speciminibus, quae Dom. *Dahl* legit, forma partium, punctura elytrorum, et colore pilorum, quibus totum corpus tectum est, congruit; thorax est 1, 3, 4 punctus. Individui autem a Dom. *Dahl* lectis, thorax est 1, 3, 6 punctus; maiora sunt et latiora quam *St. carbonarius* in collectione Hellwigiana, pedibus pallidioribus; ergo speciei sunt peculiaris.”

44. *St. nigrita*, nitidus, niger; thorace colore fugacissimo griseo sericante, seriebus dorsaliibus sexpunctis.

Long. $5\frac{1}{3}$ lin.

Caput suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus; punctis paucis

paucis distinctioribus in angulis baseos, et 4 interocularibus impressum; nigrum; antennis, capite triplo fere longioribus, palpisque fuscouscentibus.

Thorax omnino St. micantis (n. 69.) orbiculatus, apicem versus sensim angustior, coleoptris duplo fere minor; 2, 3, 6 punctus; niger, colore fugacissimo griseo-fulvo sericans.

Coleoptra quadrata, latitudine vix paulo longiora, nitidula, nigra, subpilosella, confermitatim et subtiliter puncta, minus attamen subtiliter quam in *St. micante*.

Abdomen coleoptris triplo longius; nigrum nitidum, subpilosellum.

Pedes nigri, tarsis fuscis.

Huius speciei individuum modo unicum in collectione mea possideo, et nusquam alibi haec species mihi occurrit. De vitae eius genere plane sum nescius. — Forsan varietas *St. fumarii* aut species spuria.

45. *St. Virgo* M. p. 169.
46. *St. umbratilis* M. p. 170.
47. *St. umbrinus* M. p. 169.
48. *St. paruicornis* M. p. 23.
49. *St. rigidicornis* M. p. 23.
50. *St. breuicornis* M. p. 22.
51. *St. nitidulus* M. p. 27.

52. *St. microcephalus*, nitidus, niger; pedibus rufis; capite suborbiculato; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

Long. 3 lin.

Caput latitudine paulo longius, thorace minus; nigrum; antennis, capitis longitudo, et palpis fuscis.

Thorax coleoptris paulo minor; 2, 3, 4 punctus.

Coleoptra quadrata, fuscescenti-nigricantia, subsericantia.

Abdomen nigrum, griseo-sericans; segmentorum marginibus ventralibus summis rufis.

Pedes rufi; capitibus femorum obscuris.

Habitat Parisiis — *Bronniart.*

53. *St. scintillans* nitidus, niger, subaenescens; capite parvo, oculis magnis; thoracis seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 2½ lin.

Caput thorace duplo fere minus, latitudine paulo longius, nigro-aeneum, nitidissimum; punctis 4 inter oculos, unoque distincto maiore in angulis baseos, impressum. Oculis magnis. Antennis, capite paulo longioribus, palpisque fuscis.

Thorax coleoptris paulo minor, suborbiculatus, apicem versus vix paulo angustatus, nigro-aeneus nitidissimus; 1, 2, 3 punctus.

Cole-

Coleoptra quadrata, puncta, subpilosella, nitida, nigricantia; marginibus lateralibus summis subrufescentibus.

Abdomen coleoptris triplo fere longius, nigrum, subpilosellum.

Pedes validi, fusci, tarfis anticis dilatatis.

Huius speciei vnicum modo individuum in mea collectione exstat.

54. *St. boops* M. p. 21.

Varietas long. 2 lin. thoracis punctis subtilioribus, coleoptris subnigro-aenescentibus. — Habitat Parisiis — *Latreille, Bosc.*

55. *St. cephalotes* M. p. 22.

Thorax subquadratus, angulis obtusis.

Coleoptra subdepilia.

Habitat Parisiis — *Latreille,*

56. *St. marginatus* M. p. 24.

Habitat etiam Parisiis.

57. *St. thoracicus* M. p. 170.

58. *St. ruficollis*, niger, nitidus, thorace rufo.

Long. 3 lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nitidum, punctis perpaucis impressum, nigrum; antennis, capite longioribus, fuscis.

Thorax suborbiculatus, longitudine paulo latior, rufus, nitidissimus, coleoptris paulo minor; punctis duobus dorsalibus vnoque marginali impressus.

Scutellum rufum.

Coleoptra quadrata, crassius puncta, nitida,
pilis perpaucis rigidioribus vestita.

Abdomen nigrum, nitidum; ano rufescente;
segmentorum marginibus setis rarioribus lon-
gis erectis fimbriatis.

Pedes nigricantes; tarsis femorumque capi-
tibus rufescentibus.

Habitat?

E collectione *Bronniartiana*.

59. *St. tenuis* M. p. 39.

60. *St. blandus* nitidus, rufus; capite pectore,
coleoptris, anoque nigris.

Long. 3 lin.

Caput orbiculatum, thoracis magnitudine,
nigrum; palpis antennisque fuscis, his capite
paulo longioribus.

Thorax, testaceo-rufus, coleoptris paulo
angustior, latitudine paulo longior; punctis,
vno latere 5, 5, 2, altero 4, 3, 2, 1, ex-
ceptis adhuc quibusdam aliis vagis, impressus.

Coleoptra quadrata depilia nigra.

*Abdomen segmentis tribus primis rufis,
reliquis nigris.*

Pedes rufo-testacei.

Habitat in America septentrionali — Knoch.

61. *S. formosus* nitidus, rufus; capite, thorace,
anoque nigris.

Long.

Long. 3 lin.

Habitu *Staphylinorum* fam. I. thorace au-
tem quadrato.

Caput quadratum, angulis obtusis, thoracis
magnitudine, punctis perpaucis distinctis im-
pressum, nigrum; antennis, capite longiori-
bus, fuscis; ore rufescente.

Thorax quadratus, coleoptris breuior et
paulo angustior, niger, punctis 5, 5, 2 dis-
tinctis impressus.

Coleoptra latitudine paulo longiora, subpi-
losella, puncta, rufa.

Abdomen rufum, segmentis duobus vlti-
mis nigerrimis; pectore rufo.

Pedes testacei, tarsis tenuibus.

Habitat in Carolina — *Bosc.*

62. *St. binotatus* niger, nitidus; elytrorum an-
gulo apicis exteriore rufo; capite thoraceque
multipunctis.

Habitu *St. rufipennis* e fam. II., statura au-
tem graciliore, colore, nec non antennis gra-
ciliорibus differt.

Caput orbiculatum, thorace vix paulo mi-
nus; punctis, praecipue basi et lateribus, im-
pressum; antennis extrosum vix crassioribus,
capitis et thoracis longitudine.

Thorax

Thorax coleoptris paululum angustior; suborbiculatus; punctus, subpuncto-striatus, medio autem leuissimus.

Coleoptra latitudine paulo longiora, puncto-subcicatricosa, pilis tenuibus sparsis griseis vestita.

Pedes nigro-fuscescentes; tarsis anticis dilatatis.

Habitat in Borussia — *Hellwig.*

63. *St. dubius* nitidus, niger; pedibus coleoptrisque rufis, his basi nigris; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

Long. $2\frac{3}{4}$ lin.

Caput suborbiculatum, thorace paulo minus, nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, articulo primo rufescente.

Coleoptra latitudine paulo longiora, subpunctentia, rufa, margine humerali nigro.

Pedes piceo-testacei; femoribus posticis, capitibusque femorum obscuris.

Habitat? Parisiis?

E collectionibus *Bosciana* et *Latreilleana*.

64. *St. lepidus* M. p. 31.

65. *S. flauopterus* nitidus niger; pedibus elytrisque testaceis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite ouato.

Long. $3\frac{1}{4}$ lin.

Habitu,

Habitu, partiumque forma ac proportione St. sequentis; abdomine autem crassiore et numero punctorum thoracis differt.

Caput et *thorax* vix subgriseo-sericant. Palpi rufi. Antennae rufescentes, articulo primo pallidiore.

Habitat Parisiis — *Brongniart*.

St. fuluopterus Fourcr. Ent. Par. St. 10.

Geoffr. Hist. St. n. 10.

Olivier Ent. St. n. 56. t. IV. f. 40?

66. *S. fuluipes* M. p. 24.

St. fuluopterus Ol. Ent. St. n. 56. t. IV. f. 40?

— — — *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 10.

var. A.

Geoffr. Hist. St. n. 10. var.

St. fuluipes Panzer F. G. H. 27. t. 9., monente *Sturmio* ipso, huc quidem referendus est, sed perperam exhibitus.

67. *St. vernalis*, nitidus, niger; palpis pedibus et antennarum basi rufis; thorace ouato, seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long. 3 lin.

A. *S. micante* (n. 69.) thorace angustiore et paulo longiore; defectu coloris sericantis thoracis; pilis elytrorum et abdominalis rarioribus; segmentorum marginibus haud rufescientibus; capitibus femorum, cum reliquis pedum partibus, testaceo rufis; distinguitur.

Caput

Caput ouatum, thorace minus, punctis perpaucis impressum; nigrum; palpis testaceo-rufis; antennis, capite longioribus, fuscescen-tibus, articulo primo rufo.

Thorax subouatus, latitudine paulo longior, coleoptris paulo angustior, sed eorum longi-tudine; subtiliter 5, 3, 2 punctus; rarissime ferierum dorsarium una 6 — altera 5 puncta.

Coleoptra subpilosella, paulo distinctius puncta, quam in *St. micante*, subquadrata, latitudine vix paulo longiora.

Pedes rufo-testacei; tibiis, tarassisque paulo obscurioribus.

Habitat, tempore vernali, sub lapidibus, in suffocatis — Göttingae — tempore aestiuo sub foliis deciduis ad sepes, Brunswigae — Dahl.

68. *St. albipes* M. p. 23.

69. *St. micans* M. p. 25.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 l.

Caput subouatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus; in angulis baseos punctum, punctis quibusdam distinctioribus; serie transuersali inter oculos 4 puncta. An-tennis, capite duplo longioribus, fuscis, basi rufescentibus; palpis rufo-fuscis.

Thorax orbiculatus, coleoptris minor, ni-ger, colore fugacissimo flauescente sericans; 1, 3, 6 punctus.

Cole-

Coleoptra subquadrata, latitudine paulo longiora, nigricantia, pilis subtilissimis densis flavo-grisescente-sericantibus vestita; subtilissime puncta, ita ut punctura vix oculis armatis se prodat.

Abdomen coleoptris triplo fere longius, nigrum; sed pilis grisecentibus, ut *elytra*, vestitum; segmentorum marginibus ventralibus rufescentibus.

Pedes rufo-teltacei; capitibus femorum fuscis. Species *spuriae*, seu varietates exstant intermediae inter hunc *Staphylinum* et quosdam alios, eg. *St. variantem* (n. 75.) et *lucidum* quae infra descriptae sunt.

Varietates, colore fugaci thoracis obsoletissimo et coleoptris minus pilosellis, habitant Nürnbergae — *Sturm.* —

Varietates etiam occurunt seriebus thoracis dorsalibus 5 punctis; punctis 2 vltimis interdum interuallo distincto a 3 primis remotis. —

Hae varietates forsan e copula cum *St. vernali* (n. 67.) ortae sunt.

70. *St. agilis*, niger, nitidus; apice elytrorum subfuscamente; thorace, coleoptris distincte angustiore, seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long. 2 — 2½ lin.

Caput onatum, thorace duplo fere minus, nitidissimum, punctis quibusdam in angulis baseos

baseos et 4 interocularibus distinctis impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque concoloribus.

Thorax suborbiculatus, apicem versus angustior; coleoptris minor, et quidem magis quam in speciebus affinibus; conuexior etiam esse videtur; nitidissimus; 1, 3, 5 punctus.

Coleoptra quadrata, nitida; confertissime et distinctissime puncta, pilis grisecentibus tenuibus vestita; nigricantia, apice fuscescente.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, pilosellum.

Pedes nigro-fusci.

Habitat?

E mea collectione, quae duo huius speciei individua possidet.

71. *St. nitens* M. p. 26.

Hic *Staphylinus*, cuius individuum modo unicum possideo, speciei praecedenti valde affinis, forsan eius varietas est. — Forma capitis et thoracis, nec non eorum proportio, eadem est ac in illo; punctura differt, series dorsalibus thoracis 4 punctis; coleoptra sunt nigricantia, apice concolore; antennae et pedes paulo pallidiores, fusci.

Varietas capitis thoracisque colore fugacissimo grisecente forsan e copula cum *St. micante* (n. 69.) ortum dicit.

St.

St. nitens etiam cum speciminibus minoribus varietatis intermediae inter *St. variantem* et *micantem* (de qua vide n. 73.) copula fertili se miscere videtur; salteni mihi sunt duo microptera, quae inter illos Staphylinos medium tenent: *Caput* eis maius est *St. variantis*, antennis et palpis fuscouscentibus. — *Thorax*, capite paulo maior, ratione formae medium tenet inter thoraces *St. variantis* et *agilis*; angustior est quam in illo, paulo latior quam in hoc; 1, 3, 5 punctus. — *Coleoptra* quadrata, thorace vix paulo maiora, confertim et distincte puncta; pilis tenuibus griseofuscouscentibus vestita; nitida, nigricantia, interdum subfuscouscentia. — *Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, pilosellum. — *Pedes* piceo-testacei.

Staphylinus alter, verisimile varietas minor *St. nitentis*, hic est:

Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Caput orbiculatum, latitudine vix paulo longius, thorace minus, nigrum, nitidum; punctura praecedentium; antennis, capite duplo longioribus, palpisque fusco-rufis.

Thorax orbiculatus, apicem versus paululum angustior, coleoptris paulo minor, niger, nitidus; 1, 3, 5 punctus.

Cole-

Coleoptra subquadrata, latitudine paulo longiora; nigra, nitida, puncta; pilis tenuibus, sed rarioribus quam in *St. nitente*, vestita.

Abdomen, coleoptris plus duplo longius, nigrum, subgriseo-pilosellum, marginibus segmentorum rufescentibus.

Pedes piceo-rufi.

72. *St. fimetarius* M. p. 175.

Haec species differt a speciebus affinibus, thorace subquadrato, cum latitudine paulo longior et lateribus haud rotundatus sit; capite thoracis magnitudine vel perparum minore; pedibus testaceis.

Caput punctis interocularibus 4, rarius 3, intermedio maiore, impressum.

Long. 2 — $2\frac{3}{4}$ lin.

Species intermedia inter *St. fimetarium* et *agilem*; *St. niger*, nitidus; coleoptris subaeneis; pedibus fuscescentibus; thoracis seriebus dorsibus 5 punctis.

Long. $2\frac{2}{3}$ lin.

Statura gracilis *St. agilis* (n. 70.); thorace autem minus conuexo, elytris aenescentibus.

Caput suborbiculatum, latitudine vix paulo longius, thorace duplo minus; punctis baseos quibusdam, et interocularibus quatuor, impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque nigro-fuscis.

Thorax

Thorax coleoptris minor, latitudine vix paulo longior; 1, 3, 5 punctus.

Coleoptra quadrata, subnigro-aenea; subtiliter puncta; pilis tenuissimis, nec confertissimis, grisecentibus vestita.

Abdomen coleoptris triplo longius.

Pedes piceo-fusci, tarvis autem pallidioribus.

Huius speciei intermediae individuum unicum, Norimbergae captum, Dom. *Sturm* mecum communicauit.

Species intermedia inter *St. simetarium* et *micantem*.

Long. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nigrum, nitidum, punctura Staphylinorum praecedentium; antennis palpisque nigro-fuscis.

Thorax subquadratus, vix apicem versus paulo angustatus, coleoptris paulo minor, niger, nitidus; 1, 3, 4 punctus.

Coleoptra subquadrata, latitudine vix paulo longiora, nitida, nigro-aenea, confertim puncta, pilis tenuibus vestita.

Abdomen elytris plus duplo longius, nigrum, nitidulum, pilosellum.

Pedes piceo-seu fusco-testacei, capitibus femorum obscurioribus.

Hic Staphylinus caput thoracem et colorrem aenescentem elytrorum a *St. simetario*

habet. Pili elytrorum rariores sunt quam in *St. micante*; crebriores quam in *St. finetario*; puncta elytrorum subtiliora quam in hoc, crassiora autem quam in illo. Color pedum medium tenet inter colorem fuscum et testaceum.

Varietates St. finetarii sunt etiam, *St. lucidus* (M. p. 21.) et *Staph. Fordidus* (M. p. 176).

73. *St. varians* M. p. 20. niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subouato.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Differit a *St. praecedente*, capite subouato minore, thorace rotundiore, seriebus dorsalibus 5 punctis etc.

Caput subouatum, latitudine perpaulum longius; thorace minus; punctis uno alterone in angulis baseos, nec non 4 inter oculos, per paria oculo singulo approximatis, distinctis impressum; antennis et oris partibus nigris.

Thorax suborbiculatus, coleoptris minor; 1, 3, 5 punctus.

Coleoptra quadrata, subtiliter nec confertissime puncta; pilis tenuissimis vellita, viridi-aenea.

Scutellum nigrum, punctum.

Abdomen coleoptris triplo longius, subtilissime punctum, subpilosellum.

Pedes

Pedes nigro-fusci.

Haec species cum quibusdam aliis se miscere videtur, quo species spuriae oriuntur: *Staphylinus intermedius* inter *St. variantem* et *finetarium*; niger, nitidus; pedibus piceo-testaceis; elytris viridi-aeneis; thorace seriesbus dorsalibus 5 punctis.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus; punctis quibusdam in angulis baseos et 4 interocularibus distinctis impressum. Antennis, capite duplo longioribus, palpisque fuscis; articulo illarum primo rufo.

Thorax coleoptris minor, subquadratus, lateribus subrotundatis; apicem versus vix paulo angustior; 1, 3, 5 punctus.

Coleoptera latitudine vix paulo longiora, subuiridiaenea, puncta, subpilosella.

Abdomen ut in specie praecedente.

Pedes fusco-testacei, femoribus posticis fuscis.

Habitat Norimbergae — *Sturm.*

Staphylinus intermedius inter *St. variantem* et *micantem* (n. 69.).

Long. 2 — 2 $\frac{1}{2}$ lin.

Caput omnino *St. variantis*, nisi quod antennae et palpi subfuscescant, et illae basi paulo pallidiores sint.

Thorax omnino vt in *St. variante.*

Coleoptra subquadrata, latitudine paulo longiora, confertim puncta, pilis tenuissimis grisecentibus tecta, nitida, nigro - et interdum viridi-aenea; ratione puncturae et coloris coleoptris *St. variantis*, ratione vestimenti autem illis *St. micantis* respondent, quamquam pili multo rariores sunt.

Abdomen vt in *St. micante*, nec vero marginibus segmentorum ventralibus rufescentibus.

Pedes piceo-testacei; capitibus femorum, interdum etiam femoribus ipsis, fuscis.

St. varians etiam cum *St. atrato* (n. 74.) copula se iungere videtur, de qua ad n. 74.

St. concinnus M. p. 21. species est intermedia inter *St. variantem* et *ebeninum* (n. 41.).

74. *St. atratus* M. p. 21, nitidissimus niger; elytris aenescentibus; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

Long. 5 — 5½ lin.

Statura crassior quam *St. varians* (n. 73.).

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nigro-aeneum; punctis 4 — 6 distinctioribus in angulis baseos, et 4 interocularibus, impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque nigris.

Thorax

Thorax orbiculatus, apicem versus paulum angustior, coleoptris paulo minor, nigro-aeneus, distincte 2, 3, 4 punctus.

Coleoptra quadrata, puncta, pilis tenuissimis velita, nigro-subuiridi-aenea.

Abdomen coleoptris triplo longius, subpilosellum.

Pedes nigri, tarsis fuscouscentibus.

Species intermediae inter hunc et Staph. precedentem longitudine et statura sunt intermedia, capite suborbiculato, minore quam in *St. atrato*, maiore quam in *St. variante*, seriebus dorsalibus thoracis vel 4 vel 5 punctis; elytris magis minusue viridi-aeneis.

Species intermediae inter *St. atratum* et *opacum* iam sub n. 55. descriptae sunt.

St. atratus et cius varietates intermediae occurunt passim in Germania et Gallia.

75. *St. punctus* M. p. 20.

76. *St. politus* M. p. 17.

St. politus Linn. Fn. Suec. n. 343. non solum ad *St. politum* verum sed etiam ad *St. atratum*, forsan etiam ad *St. cyanipennem* (n. 78.) referri potest; quod etiam de *St. polito* auctorum aliorum valet.

77. *St. decorus* M. p. 19. variat ab domine coloribus obscuro-metallicis aenescente, ut *St. tristis* (n. 11.) et *ruficornis* (n. 12.).

78. *St. cyanipennis* M. p. 168.

Patria varietatis huius Staphylini, capite maiore, quam e collectione *Knochiana* descripsi, America septentrionalis est.

Altera varietas, capite minore, reliquis characteribus autem cum illa prorsum congruens, habitat Parisiis et prope Fontainebleau, et est verus

St. cyanipennis Fabr. Ent. S. St. n. 29.

St. amoenus Ol. Ent. St. n. 32. t. IV. f. 36.

79. *St. metallicus* M. p. 168.

Varietas nigra nitidula; capite autem, thorace elytrisque nitidissimis obscuro - viridi - aeneis.

Staphylinus habitu et partium forma ac proportione, nec non statura et magnitudine omnino *St. metallici*, capite autem suborbiculato, elytris nigro - aeneis, huius varietas est. — Habitat Parisiis — *Latreille*.

80. *St. aeneus* M. p. 17.

Variat pedibus antennisque nigris et, quamvis rarissime et unico tantum individuo e collectione *Latreilleana*, rufo - fuscis.

Specimina quaedam sunt in eadem collectione, tarsis anticis gracilioribus, capite minore, punctis subtilioribus, quae medium tenent inter *St. aeneum* et *politum*, atque gradatim in hunc et in illum transeunt.

81. *St. laminatus* M. p. 16.

Species

Species intermedia inter *St. laminatum* et *aeneum*: *St. niger*, nitidus; capite thoraceque nigro-viridanis; elytris aeneis; thoracis seriebus dorsalibus sub 4 punctis.

Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

Colorem et glabritiem thoracis capitisque a *St. laminato* habet; colorem elytrorum a *St. aeneo*. Thorax neque impunctus est, vt in illo, neque seriebus dorsalibus distincte 4 punctis impressus, vt in hoc; sed serierum dorsalium vna e punctis tribus, altera e punctis quatuor, quorum vnum fere evanescit, composita est; series laterales bipunctae sunt, et margini punctum vnum est impressum.

Staphylinus alter *intermedius* inter *St. laminatum* et *aeneum*, long. $5\frac{1}{2}$ lin., colore quidem et deficientibus thoracis seriebus punctorum dorsalibus omnino cum *St. laminato* congruit; differt autem ab eodem, thoracis punto marginali uno et seriebus lateralibus tripunctis.

Has duas varietates ego ipse prope a Parisiis prehendi.

Varietates St. laminati, thorace punctis quibusdam vagis impresso, etiam Parisiis habitant.

Varietas, elytris subcoeruleo-aeneis, in Borussia obuenit — *Hellwig*.

82. *St. splendens* M. p. 16.

St.

St. huic similis, statura autem paulo graciliore; long. 5 lin. niger, nitidus, thorace leuissimo; habitat in Borussia — *Hellwig.*

Varietates etiam exstant intermediae inter *St. splendentem* et *laminatum.*

83. *St. vagepunctus* nitidus, nigricans, leuis, coleoptrorum disco vase puncto.

Long. 5 lin.

Habitu et partium forma atque proportione medium quodammodo tenet inter familiam I. et III.; deficientibus autem punctis crebris capitis thoracis elytrorumque, quae omnibus familiae III. *Staphylinis* propria sunt, potius eum ad fam. I. delego.

Caput orbiculatum, thoracis magnitudine, nitidum, leue, punctis tantum paucis in baseos angulis impressum; antennis capitis longitudine.

Thorax conexus, quadratus, angulis obtusis, coleoptris breuior et angustior, nitidus, leuis, punto uno laterali distincto impressus.

Coleoptra quadrata, nitida, depilia; excepto margine apicali, setis rigidis fimbriato; levia, margine laterali confertim punto, disco vase puncto; nigricantia, margine summo laterali rufescente.

Abdomen nigrum, ano fuscescente.

Pedes fuscescentes.

Habi-

Habitat? — e collectione *Brongniartiana*.

Varietas coleoptris fuscescentibus; margine laterali pallidiore; pedibus segmentorumque marginibus fuscis.

E collectione *Latreilleana*.

84. *St. cinctulus* M. p. 167.

85. *St. dilatatus*, antennis ferratis.

Long. 9 lin.

Habitu omnino Staphylinorum huius familiae, sed peculiari modo ab omnibus differt.

Caput orbiculatum, thorace minus, nigrum; antennis, longitudine capitis, ferratis; articulo ultimo ouato (haud obtuso), apice rufescente.

Thorax coleoptrorum magnitudine, dilatatus (vt thorax *St. nitidi* n. 5.); niger, marginibus lateralibus subelevatis, subuiridi-aenescentibus; 3, 3, 2 punctus; canalicula marginali deficiente vel, si mauis, in puncta subtilia decedente.

Elytra subtiliter puncta, nigra, subpilosella, punto humerali testaceo, margine suturali fuscescente.

Abdomen subpilosellum.

Pedes tarsis anticis dilatatis.

Habitat Parisiis et Dresdae.

St. dilatatus Fbr. E. S. St. n. 12.

— — Payk. Fn. Suec. St. n. 29.

* * *

86. *St. stenoides*, nitidus; oculis magnis profiliens.

Long. fere 6 lin.

Habitu ab omnibus Staphylinis mihi notis differt; cum autem thorax latitudine haud longior et seriebus punctorum dorsalibus impressus sit, eum, quasi appendicem, familiae I. adiungo.

Caput, forma tota capitinis *Stenorūm*, orbiculatum et, oculis magnis globosis, fere transversum, thorace latius; punctum, viridi-subcupreo-aeneum, subtus nigrum; clypeo, labro et primo antennarum articulo (reliqui articuli desunt) testaceis; mandibulis falcatis, longis, acutis, nigris; maxillis nigris, apice rufo-testaceis; palpis longis, gracilibus, filiformibus; articulis duobus ultimis, aequali longitudine et crassitie, haud clavatis; articulis omnibus nigris, summo apice rufo-testaceo.

Thorax conuexus, quadratus, basi rotundatus et paulo angustior quam apice, coleoptris angustior et breuior; nitidus, viridi-aeneus, in angulis apicis multipunctus, seriebus dorsalibus sexpunctis et praeterea punctis quibusdam vagis maioribus impressus.

Scutellum pallide viridi-sericans.

Cole-

Coleoptera quadrata; elytris planiusculis, punctis, viridi-cupreo-aenescentibus, macula magna disci pallida viridi-sericante.

Abdomen nigrum; pectore sub-flavo-sericante; segmentorum marginibus testaceis.

Pedes graciliores quam reliquis Staphylinis; capitibus femorum nigris; femoribus anteriores testaceis, margine superiore nigro, posticis testaceis, geniculis nigris; tibiis anteriores testaceis, margine superiore nigro, posticis testaceis, apice nigro; tarolis obscuris, anticis fossoriis.

Habitat Iauae — *Bosc.*

87. *St. fulgens*, nitidus, cyaneus.

Long. $7\frac{1}{2}$ lin.

Habitu peculiari. Species, quae mihi locum aptissimum inter familiam I. et II. obtinere videtur.

*Caput, collo angusto cum thorace cohaerens, ouatum, thoracis magnitudine; subtus laeuissimum nitidissimum; supra setis tenuibus vestitum, punctum, punctis confertis distinctissimis; oculis paruis orbiculatis; mandibulis validis, exsertis, in medio dentibus duobus armatis; articulis palporum validis breuibus. Antennae defunt (Antennae primo articulo longissimo cyaneo, vltimis breuibus nigris — *Fabr.* loco citato).*

Thorax

Thorax coleoptris angustior et paulo brevior, conexus, ouatus, apicem versus valde attenuatus, nitidus, punctis vagis subtilibus impressus, marginibus lateralibus basin versus subelevatis.

Coleoptra rectangula, nitida, puncta, punctis haud confertissimis; pilosella, pilis singulis e punto singulo nascentibus.

Habitat Cayennae — *Bosc.*

St. fulgens *Fabr.* E. S. St. n. 13.

St. violaceus *Olivier Ent.* St. n. 5. tab. I. f. 8.

FAMILIA II.

Comprehendit *Staphylinos* familiae IV. M. p. 40.

Habitu sunt graciliore; capite, thorace coleoptrisque, ratione proportionis, longioribus quam in familia I.; antennarum articulus ultimus semper ouato-acutus est, qui quidem etiam in nonnullis minoribus familiae praecedentis speciebus ouatus esse videtur, nunquam autem acuto-ouatus — Reliqua, quae hic adhuc monere possem, supra, vbi generaliter de *Staphylinis* locutus sum, iam dixi.

88. *St. denigrator* niger, nitidus, pedibus piceis, thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

Long. $2\frac{1}{4}$ lin.

Caput ouatum, thorace minus, lineolis et foueolis (quae in specie sequente describuntur)

tur) deficientibus, punctis subtilibus quibusdam pone oculos et 4 inter oculos impressum; antennis fuscis, capite paulo longioribus.

Thorax latitudine longior, subonatus, apicem versus paulo angustatus, coleoptris paulo angustior; 2, 4, 4 punctus.

Coleoptra quadrata, puncta, pilosella.

Abdomen coleoptris quadruplo longius.

Pedes picei, femoribus paulo pallidioribus.

Habitat Brunnuigae — *Dahl.*

St. denigrator — *Knoch.*

89. *St. splendidulus* M. p. 41.

Caput latitudine longius, apicem versus paululum angustius, thoracis magnitudine, lateribus punctum; foueolis duabus longitudinalibus ante antennas, praetereaque lineola, a margine inferiore oculorum (i. e. margo, qui os versus spectat) suboblique ascidente, impressum.

Thorax coleoptris paululum angustior et breuior, oblongus, vix basin versus paululum angustior.

Coleoptra rectangula.

Haec addenda sunt ad descriptionem huius *Staphylini* in M. p. 41.

A speciebus reliquis paruis huius familiae haec species, foueolis atque lineolis frontalibus,

ibus, a *St. linearis* (n. 94.) punctura thoracis differt et bene distinguenda est.

90. *St. nigritulus* M. p. 41.

Caput thorace paulo minus, subovatum, latitudine paulo longius; punctis paucis, in angulis baseos, vestigiisque obsoletissimis linearum et foueolarum frontalium (vide n. 89.), impressus; antennis capitis thoracisque longitudine.

Thorax subovatus, latitudine paulo longior, apicem et basin versus paululum angustior, colcoptris brevior et angustior; seriebus dorsalibus 5 et 6 punctis.

Elytra latitudine duplo longiora, puncta, subpilosella.

Differt a *St. praecedente* et *linearis* fronte leui; a *St. procerulo* (n. 92.) punctura thoracis et capite minore; a *St. parvulo* (n. 91.) colore, magnitudine, thoracisque forma.

St. aterrimus M. p. 41. a *St. nigritulo* non nisi capite paulo maiore, magnitudine nempe thoracis; colore antennarum pedum et palporum paulo obscuriore, differt; quapropter hunc *St. aterrimum* cum illo reiungo.

Varietatem huius *Staphylini* fuscam; basi antennarum, palpis, ano, pedibusque pallidioribus; capite atro; Dom. *Sturm* mecum communicavit.

91. *St. paruulus* M. p. 42.

Praeter colore in, magnitudine etiam maiore, longitudine scilicet 2 lin., et forma thoracis, apicem versus haud angustioris, a *St. precedente* differt; reliquis autem characteribus cum eo congruit.

Specimina etiam sunt *intermedia*, quae, characteribus distinctiis, medium tenent inter *St. paruulum* et *nigritulum*.

Staphylinus alter, coleoptris totis nigris, reliquis partibus autem *St. paruulo* prorsum similis, varietas eius esse videtur. — Captus est Norimbergae — *Sturm*.

Verum *Staph. paruulum* Dom. *Sturm* mecum communicauit sub nomine *St. bicolor* *Fabr. Ent. S. St. n. 47.*; et forsitan eadem species est.

92. *St. procerulus* niger, nitidus, pedibus elytrisque picescentibus; thorace multipuncto.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput subquadratum, augulis obtusis, thorace vix paulo latius sed eius longitudine; multipunctum, medio leuissimum, vestigiis obsoletis linearum et foueolarum frontis; antennis, capite duplo longioribus, palpisque fuscis.

Thorax subquadratus, latitudine paulo longior; coleoptris paulo angustior et breuior; late-

lateribus multipunctus, punctis vero haud confertis.

Elytra latitudine duplo longiora, subpilosella, puncta; fuscescentia, apicem versus sensim pallidiora.

Abdomen nigrum, segmentorum & vltimorum marginibus piceo-fuscescentibus.

Pedes piceo-testacei.

Habitat Brunsuigae.

Diffrerit a *St. splendidulo* (n. 87.) et *lineari* (n. 94.) fronte leui; a reliquis paruis cospeciebus affinibus capite maiore et punctura thoracis.

93. *St. nanus* niger, nitidus; palpis, antennarum basi, pedibus et ano rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subouato.

Longitudo et *statura Staph. paruuli* (n. 91.) capite autem minore.

Caput subouatum, thorace paulo minus; antennis fuscis, basi rufis.

Thorax latitudine paulo longius, subrectangulus.

Coleoptra latitudine paululum longiora, depilia, obscuro picescentia.

Abdomen nigrum; marginibus segmentorum, praecipue vltimorum, rufescenscentibus.

Pedes rufescentes, capitibus femorum obscurioribus.

E collectione *Hellwigiana*.

94. *St. linearis* M. p. 43.

95. *St. ochraceus* M. p. 45. nitidus; thorace lateribus multipuncto, seriebus dorsalibus 12—16 punctis.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Hic *Staphylinus* a *St. elongato* (n. 93.) differt statura graciliore et proceriore, nec non punctura crebriore et multo subtiliore.

Caput elongatum, apicem versus sensim angustum, subtilissime punctum, nec vero confertissime.

Thorax coleoptris paulo minor, basin versus vix paulo angustior; lateribus punctis subtilissimis multis inordinatis impressus, quorum attamen nonnulla interdum iam in arcum distinctum litui disposita apparent.

Coleoptra rectangula, puncta, pilis rarioribus et perbreuibus vestita.

Abdomen coleoptris triplo vel quadruplo longius; quo contracto statura crassior esse videtur.

Color variat:

1. niger; antennis, palpis, coleoptris pedibusque fuscis;

2. niger; antennis, palpis pedibusque rufescensibus;

3. abdomine et thorace fuscis; capite atro; coleoptris picescentibus; pedibus palpis antennarumque basi rufescentibus.

Staph. linearis Fbr. El. St. n. 51.

St. longiceps M. 177. huius speciei varietas est, nam inter specimina plura, quae Parisiis vidi, quaedam in hunc Staphylinum, seu *St. ochraceum* thorace numerosissime puncto, quaedam in *St. ochraccum* punctis thoracis paucioribus transibant.

De speciminibus intermediis inter *St. ochraceum* et *elongatum* vide n. 98.

96. *St. punctulatus* M. p. 177.

97. *St. emmesus* M. p. 176.

98. *St. elongatus* M. p. 45. nitidus, ater; elytris puncto-siriatis; thorace seriebus dorsalibus 5-7, lateralibus 6-8 punctis, lituiformibus.

Long. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{3}$ lin.

Statura crassiore, neo non punctura rariore sed crassiore a *St. ochraceo* satis differt.

Caput forma et proportione omnino ut in *St. elegante* (n. 104.); punctis autem crassioribus, distincte paululum in longitudinem extensis, impressum.

Thorax coleoptris paulo minor, oblongus, haud basin versus angustatus; seriebus dorsalibus 5 — 7 punctis, lateralibus apice incurvis lituiformibus, 6 — 8 punctis; praeterea,

in

in angulis apicis, series punctorum 5 — 6 subtilliorum, subarcuata, seriei dorsali adnexa, quodammodo cum hac lituuni maiorem, minus autem curuatuin, format.

Coleoptra rectangula, puncto-striata; striis 12.

Abdomen coleoptris triplo longius.

St. punctulatus Payk. Fn. Suec. St. n. 17.

— — — *Fabr.* Ent. S. St. n. 45.

De omnibus varietatibus *St. elongati*, quarum (M. p. 45.) mentionem feci, sola varietas 5 verus est *St. elongatus*, et reliquis frequentior occurrit.

Specimina intermedia inter hunc et *St. ochraceum* colore sunt pallidiore, statura et punctura intermedia, punctis pluribus et subtillioribus quam in *St. elongato*, paucioribus et crassioribus quam in *St. ochraceo*. — Huc pertinent var. 1 — 4 in M. p. 45. Haec specimina intermedia Dom. Prof. Knoch *St. ochraceus* nominauit; verum autem *St. ochraceum* meum *St. batychrus*.

Staphylinus quidam, cuius indiuiduum unicum e Gallia retuli, *St. elongato*, forma, proportione et punctura tam capitis quam thoracis et elytrorum omnino similis est; longitudine autem tantummodo $1\frac{2}{3}$ lin. niger, nitidus; elytris nigro-piceis, in angulo apicis ex-

terno subpallidioribus; antennis fusco-rufis;
pedibus rufo-testaceis.

99. *St. gluber* M. p. 46. niger, nitidus; elytris
rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus 8
punctis.

Caput forma et proportione vt in specie pree-
cedente, nigerrimum, nitidissimum, punctis
perpaucis vagis, multo rarioribus quam in *St.*
elongato et *St. elegante* (n. 104.) impressum.

Thorax forma et proportione vt in *St.* pree-
cedente, nigerrimus, nitidissimus, 3, 5, 8
punctus; serie marginali et laterali se appro-
pinquantibus apice.

Coleoptra rectangula, nitidissima, pilis per-
paucis et perbreuibus vestita; rufo-testacea;
lateribus subpuncto-striata, punctis autem
fere obsoletis.

Abdomen nigrum, nitidum, coleoptris plus
triplo longius.

Pedes fusti.

Variat hic *Staphylinus* punctura.

1) Serierum thoracis dorsalium punctis hic
vel illic confluentibus; seriebus lateralibus
euanescentibus; elytris punctis.

2) Thoracis seriebus dorsalibus 9—10 pun-
ctis; lateralibus et marginalibus saepe inter-
ruptis, distincte attamen in lituum coniun-
ctis; elytris vix punctis quibusdam impressis.

100. *St. glabratus* M. p. 178.

101. *St. latus niger, nitidus, coleoptris pedibusque rufis; capite quadrato.*

Long. 3 lin.

Caput quadratum, maius quam in speciebus praecedentibus, thoracis circiter magnitudine, nigerrimum, nitidissimum; punctum, nec vero confertissime, punctis lateralibus in series obsoletas subdispositis. Antennis palpisque rufo-fuscescentibus.

Thorax coleoptris paulo minor, basin versus subangustatus, ita vero, ut, superne visus, medio paulo impressus appareat; nigerrimus nitidissimus; 5, 5, 7 punctus, punctis autem minutis subobsoletis, serie attamen laterali cum serie marginali in lituum subconiuncta.

Coleoptra nitida, rectangula, subpilosella, distincte puncta, testacea.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigerrimum, nitidum.

Pedes rufi.

Huius speciei individuum unicum tantummodo in mea collectione exstat.

102. *St. relucens nitidissimus, nigerrimus; antennae tarsisque fuscis; elytris pallido-castaneis; thorace seriebus dorsalibus 6 — 9 punctis.*

Long. 5 lin.

Habitu

Habitu partiumque forma et proportione *St. glabri* (n. 99); punctis autem paucioribus capitis et elytrorum, pedibus obscurioribus, et magnitudine differt.

Caput nigrum; labro et palpis rufis; antennis fuscis opacis, articulis 3 primis nitidis.

Thoracis serierum dorsalium vna interdum 6-altera 9-puncta; seriebus lateralibus 5-6 punctis; seriebus marginalibus valde variantibus.

Coleoptra puneta, punctis in series subdispositis.

Pedes nigri vel obscuro-fusci, tarsis pallidioribus.

Habitat Parisis — *Bosc.*

103. *St. pyropterus* nitidissimus, niger; coleoptris rufis; thorace seriebus dorsalibus desicientibus, lateralibus crenato-striatis.

Long. 4 lin.

Habitu specierum praecedentium.

Caput subquadratum, latitudine paulo longius; punctum, punctis crassis, confluentibus, in series subdispositis; nigerrimum; palpis rufescentibus; antennis, longitudine capitis, fuscescentibus, opacis, articulis tribus primis, quorum primus longus est, nigris nitidis.

Thorax basin versus angustior; serie laterali crenato-sulcata, arcuata, distincta; serierum dorsalium vestigia solummodo, puncta scili-

scilicet duo confluentia distincta, ad apicem thoracis impressa sunt.

Elytra rufo-testacea, leuia; bipuncto-striata, punctis subtilibus.

Pedes tarsis anticis tenuibus.

Habitat Parisiis — Bosc. Latreille.

104. *St. elegans* M. p. 46. nitidus; thorace basin versus sensim angustato, seriebus dorsalibus et lateralibus multipunctis; coleoptris punctis pedibusque testaceis.

Caput subtiliter nec vero confertissime punctum, medio leuissimum; foueolis et lineis (sub n. 87. descriptis) distinctissimis impressum.

Thorax nitidissimus; seriebus dorsalibus 8 — 12, lateralibus 8 — 10 punctis, praetereaque punctis pluribus inter seriem lateralem et marginem, interdum etiam quibusdam inter seriem dorsalem et lateralem disseminatis, impressus. Haec puncta omnia, crassitie aeqnali, illis in capite similia sunt.

Coleoptra subquadrata, nitida, pilosella, puncta, nec vero puncto-striata.

Abdomen coleoptris quadruplo longius, subtilissime punctum, pilosellum.

Color huius speciei in elytris et pedibus semper rufo-testaceus est, in reliquis partibus autem variat:

1) Capite nigerrimo, antennis palpisque fuscis; thoracis apice rufo, basi nigricante; abdомine nigricante, segmentorum marginibus ventralibus rufis.

St. tricolor Payk. Mon. St. n. 15.

2) Capite et thorace obscuro-rufo-fuscescentibus; abdominis dorso fusco, ventre rufo-testaceo.

St. affinis Payk. Mon. St. n. 16. v. 2. et 3.

3) Capite fusco, basi rufescente; thorace rufo; abdominis dorso fusco, ventre rufescente.

In quibusdam huius speciei individnis, quorum thorax nempe punctis paucioribus impressus est, series laterales iam sublituiformes evadunt.

Sub nomine *St. elegans* Oliv. in collectione *Bosciana Paederum castaneum* vidi; quapropter adhuc dubito, an *Staph. elegans* Oliv. ad hanc speciem referri possit.

Habitat Parisis et Brunsuigae, ubi Dom. Dahl plura huius speciei individua legit.

105. *St. rufipennis* M. p. 40.

106. *St. fulvipennis* niger, nitidus; palpis, antennis, elytris, pedibusque rufis; capite thorace multipectinatis.

Longitudo et habitus St. elegantis (n. 104.), capite autem minore etc. differt.

Caput

Caput ouatum, thorace breuius, eius autem latitudine, nigrum, multipunctum; antennis, capite longioribus, palpisque rufis.

Thorax multipunctus.

Coleoptra puncta, apice subpuncto-striata; testaceo-rufa, basi subobscuriora.

Pedes rufo-testacei.

Habitat in Borussia — Hellwig.

107. *St. fulminans* M. p. 47., nitidus, thoracis punctorum seriebus dorsalibus deficientibus.

Long. $3\frac{1}{3}$ — 5 lin.

Caput ouatum, thoracis magnitudine; in angulis baseos punctis numerosis paruis, serie interoculari punctorum 4 valde exilium, et punctis 2 maioribus inter seriem illam et clypeum, impressum.

Thorax rectangulus, magnitudine coleoptorum, punctis 2 minoribus angulos apicis versus, unoque maiore versus angulos baseos, impressus.

Coleoptra rectangula, pilis tenuibus rario-ribus vestita, punctis numerosis, nec vero confertissimis, impressa.

Color variat:

1) Fuscus; antennis, palpis, thorace, coleoptris, ventre et pedibus rufescentibus.

2) Ni-

2) Niger; antennis, palpis, thoracis et coleoptrorum lateribus, marginibus segmentorum ventralibus, pedibusque rufescentibus.

3) Niger; abdomine obscuro-fusco, ano rufo; limbo coleoptrorum, pedibus, antennis et palpis rufis.

4) Niger; antennis, palpis, punto in angulo apicali thoracis; elytris, pedibusque rufis.

5) Niger; ore, antennis, pedibus et coleoptris testaceis; summis angulis baseos capitis, segmentorumque marginibus, vel ventre toto, fusco-testaceis.

Varietates 1, 2 et 4 habitant Brunsuigae — Dahl.

Varietas 3 est *St. ustulatus* M. p. 46.

Varietas 5 habitat Norimbergae — *Sturm*.

St. fulgidus Payk. Mon. St. n. 14. var. β .

Paederus fuluipennis Fabr. Ent. Syst. P. n. 4.

— — — — — *Panzer* Fn. Germ. H. 27.

t. 25? confer M. p. 44.

108. *St. fulgidus* M. p. 43.

St. fulgidus Fbr. Ent. S. St. n. 25. species alia esse videtur; statura enim et magnitudine cum *St. polito* comparatur. Forsan varietas est *St. nitidi* aut *coenosi*.

Schaeffer Inf. Ratisb. Vol. I. t. 59. f. 12. confer *Panzer* ad *Schaefferum*.

Habitat etiam Parisiis — *Latreille*.

109. *St. alternans* M. p. 48.

110. *St. palmula* M. p. 49.

111. *St. melanocephalus* nitidus; thorace punctorum seriebus dorsalibus nullis.

Long. 2 — $2\frac{2}{3}$ lin.

Caput suboblongum, thorace paulo breuius; punctis 2 magnis ante clypeum, 4 minoribus inter oculos impressum; nigerrimum, nitidum; oculis paruis; antennis capite longioribus; palpis subacuminatis, articulo ultimo graciliori quam penultimus, quo transitus e hac Staphylinorum familia ad Lathrobia ostendi videtur.

Thorax oblongus, coleoptrorum magnitudine, nitidus; seriebus marginalibus 3 punctis; punctis 3 etiam lateralibus, quorum 2, ad apicem sita, a tertio, basi multo propiore quam apici, longe remota sunt;

Coleoptra nitida, distincte puncta, pilis tenuissimis rarioribus vestita.

Abdomen coleoptris triplo longius.

Pedes testacei.

Color variat:

1) *Caput* nigrum, antennis palpisque rufis. *Thorax* rufus, disco paulo obscuriore. *Coleoptra* fusca, sutura rufa. *Abdomen* nigricans, pectore et marginibus segmentorum ventralibus rufis.

2) Corpus fuscum. Caput atrum. Antennae, palpi et thorax fusco-rufi. Venter et pectus testacei.

3) Nigricans. Caput atrum; antennis pallidisque rufescentibus. Thorax et venter rufo-fusci. Elytra piceo-fusca. Pectus testaceum.

Omnis hae varietates habitant promiscue sub gramine in pratis et ad fossarum ripas; Brunswigae — *Dahl.*

St. melanocephalus — *Knoch.*

Primo intuitu hunc Staphylinum pro varietate *St. alternantis* habueram, ob thoracis puncturam, quae in hoc eadem est ac in illo; sed capite minore nec quadrato et elytris distincte punctis satis ab illo differt. — Cum *St. fulminante* (n. 107.) autem, tam forma et proportione quam punctura partium, adeo congruit, vt, ratione non habita coloris pervariabilis, non nisi paruitate ab eo discrepet.

* * *

112. *St. planatus* planus, subopacus, niger; pedibus antennisque rufescentibus; coleoptris apice dilucido-testaceis.

Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Caput quadratum, angulis obtusis, planum, subtiliter punctum; thoracis latitudine, opacum, nigrum; antennis, capite longioribus, extror-

extrorsum subcrassioribus, fuscescentibus, basi rufis; palpis rufis.

Thorax suborbiculatus, vix latitudine paulo longior, et basin versus subangustatus, coleoptris paululum minor, subtiliter punctus, niger, disco depresso.

Coleoptra rectangula, thorace paulo longiora, nitidula, subtiliter puncta, basi nigra, apice dilucido testacea.

Pedes rufi.

Habitat in Borussia — *Hellwig.*

FAMILIA III.

Comprehendit plurimas species familiae II. Staphylinorum M. p. 3., exceptis nempe illis, quarum corpus vel sammetino-nebulosum vel villosum est.

Staphylini huius familiae, quae, cum familia sequente et familia quinta, maxima huius generis microptera continet, thorace quadrato, confertim et confuse puncto, a fam. I. differunt, cuius species thoracem habent vel leuissimum, i. e. sine vlla impressione, vel punctis solummodo perpaucis, plerunque in series distributis, impressum. Praeterea Staphylini huius familiae statura sunt magis linearis, nitore minus splendido, quam illi familiae primae. — Cum Staphylinis familiae secundae haud confundi possunt,

sunt, licet paucis thorax latitudine paulo longior sit (e. g. *St. castanoptero*); nitore, punctura, antennarumque articuli vltimi forma semper distinguuntur.

113. *St. tricolor*. M. p. 7.

In collectione *Bosciana* duos vidi *Staphylinos*, *St. tricolori* similes, quorum unus statuta tantum graciliore long. 6 lin. coleoptris subrectangulis, segmentorum penultimo et antepenultimo haud fimbriatis; alter autem pedibus fere nigris, tarsis et antennis fuscis, elytris subcyanescentibus, se distinguebat; ambobus autem caput quidem thorace paulo minus, nec vero multo minus erat.

St. erythriopus Payk. Fn. Succ. St. n. 7. huius speciei varietas est "capite thorace elytrisque nigro-virescentibus, pedibus rufis." Paykull ipse dicit. "Individuum unicum, huic similium, e Gallia mihi missum, vidi elytris obscure coeruleis praeditum." In Gallia autem haec species frequentius occurrere videtur.

St. haemorrhoidalis Olivier Ent. St. n. 7. tab. II. f. 20., et

— — — *Fabr. Eleuth.* St. n. 33.
huic valde similis esse videtur, sed patria eius Cayenna est.

114. *St. cyaneus* M. p. 6.

115. *St. violaceus* M. p. 162.

116. *St. macrocephalus* M. p. 160.

117. *St. olens* M. p. 4.

118. *St. tenuentofus* M. p. 161.

119. *St. similis* M. p. 5.

De synonymia huius micropteri multa mihi dubia erta sunt.

St. similis Payk. est *St. morio* (n. 121.) quia “capite et thorace politis” describitur.

St. similis Olivier eodem iure ad *St. morionem* relegatur.

Geoffroy dicit quidem de suo *St. simili*, n. 3., articulum ultimum antennarum subglobosum, nec, ut in speciebus praecedentibus (*St. olens* et *cyaneus*) lunulatum esse; fallacia autem optica deceptus est, altera enim positione, antennarum nempe latere angustiore (nam antennae omnium horum micropterorum compressusculae sunt) oculum versus directo, articulus ultimus ouatus esse videtur; altera vero, latere nempe latiore antennarum oculum versus directo, articulus ultimus lunatus se ostendit. Certo autem Geoffroy *Staphyl. similem* verum descriptis, dicit enim, inter alia, “elytris thorace brevioribus; capite thorace et elytris punctatis; longitudine 6 linearum.”

Staphylinum Schaefferi Inf. Ratisb. Vol. I. t. 39. f. 12. Dom. Panzer pro *St. simili* habet.

Staph.

Staph. similis verus autem statura est maiore, thorace latiore; credo ergo, Dom. Schaeffer, tabula et figura citata, *St. morionem* exhibuisse.

In omnibus collectionibus Entomologorum Parisiensium *St. morionem* sub nomine *St. similis*, nunquam autem verum *St. similem*, vidi. — Hic ergo vbique multo rarer esse videtur quam ille, qui apud nos quidem rarer occurrit.

120. *St. ater* M. p. 161.

Species, huic Staphylino, qui Dom. Prof. Knoch ex America septentrionali missus est, simillima, nec vlo charactere ab eo differens, habitat etiam Parisiis — *Latreille* — et Norimbergae — *Sturm*.

121. *St. morio* M. p. 6.

Confer quae sub n. 116. monui.

122. *St. baltimorensis* M. p. 163.

123. *St. fuscatus* M. p. 164 et

St. crassicollis M. p. 7. in vnam speciem redigendi sunt.

124. *St. brunnipes* niger, opacus; capite thoraceque nitidis; antennis fuscis, basi et apice rufis; pedibus rufis.

Long. 5 lin.

Statura partiumque forma et proportione omnino *St. aeneocephali* (n. 126.); thorace forsan paulo conuexiore.

Caput orbiculatum, thorace minus, sed eius latitudine, nitidum, aeneum, punctum, linea media longitudinali leui obsoleta; palpis antennarumque articulis 2 vltimis et primo rufis.

Thorax quadratus, angulis obtusis; aeneus, nitidus, punctus, linea media longitudinali leui obsoleta.

Coleoptra et *abdomen* opaca, nigra, tenuissime sericantia; illa thorace breuiora, sed eius latitudine, subtransuersa, punctis crebrioribus et subtilioribus impressa quam thorax.

Pedes rufi; capitibus femorum nigris.

Habitat Parisiis.

St. brunnipes Fabr. Ent. S. St. n. 23.

— — Olivier Ent. St. n. 11. tab. 1. f. 7.

125. *St. pedator* M. p. 163.

126. *St. aeneocephalus* M. p. 8.

St. chalcocephalus Fbr. Eleuth. St. n. 17.

St. cupreus Rossi Fn. Etr. I. p. 243. St. 612.

tab. 7. f. 13.

— — Olivier St. n. 16. tab. 2. f. 16. varietas est quinta M. p. 8. Vidi hanc speciem in ipsa collectione Olivieriana.

127. *St. cinnamopterus* M. p. 164.

128. *St. zonatus* M. p. 162.

129. *St. latebricola* aeneo-nigricans; elytris pedibusque rufis.

Long. 4 — $5\frac{3}{4}$ lin.

Habitu, longitudine, atque partium forma et proportione omnino St. sequentis; colore autem satis differt.

Caput nigricans, sub-cupreo-nitidum, pilis confertis subtilibus testaceo-flauescens sericans; linea longitudinali media obsoleta leui; clypeo testaceo; palpis vel rufis vel nigricantibus.

Thorax, colore et vestimento capitis, linea media longitudinali, leuissima, nitidissima, ante scutellum latiore.

Coleoptra rufa, pilis breuibus pallidioribus vestita.

Scutellum nigro-sammetinum.

Abdomen nigrum, basi segmentorum plerumque pilis breuissimis flavo-griseo-sericantibus vestitum, qui interdum cum interuallis nudis alternant et seriem triplicem macularum sericantium dorsarium abdominis formant. Pectore nigro, pilis tenuibus flavo-griseis vestito.

Pedes capitibus femorum cum femoribus magis minusue nigricantibus, apice rufescens; tibiis rufis; tarsis plerumque paulo obscurioribus.

Habitat Brunsuigae, lectus saepius in sylvis, in aceruis formicarum rufarum — *Dahl.* —

Occur-

Occurrit etiam in Borussia, vnde Dom. Kugelann hanc speciem Dom. Prof. Hellwigio misit.

130. *St. stercorarius* M. p. 11.

Variat antennis vel rufis, vel fuscis basi interdum pallidiore; maculis segmentorum sericeis vel distinctis vel obsoletis, vel prorsum euanescentibus.

Habitat Parisiis, Brunsuigae, Göttingae.

131. *St. lutarius niger*; abdomine sericeo-maculato; capite et thorace aeneis; palpis, antennis, elytris, tibiis, tarassisque testaceo-rufis.

Habitu partiumque forma proportione et punctura St. praecedentis; statura autem maiore (qua etiam a St. latebricola n. 129. differt), capite thoraceque orichalceo-nitidis, subflauo-sericantibus; femoribus et antennarum articulo primo obscurioribus.

Long. 7 — 8 lin.

Corpus subpilosellum.

Caput thorace minus, apicem versus paulo angustius, aeneum; mandibulis nigris; palpis rufis; antennis, capit is longitudine, rufescenscentibus, articulo primo nigricante.

Abdomen nigrum; dorso maculis duabus segmentorum singulorum, ventre marginibus segmentorum pectoreque flauo-sericantibus.

H . 2

Pedes

Pedes nigri; capitibus femorum et femoribus flavo-sericantibus, geniculis rufescentibus; tarsis tibiisque testaceo-rufis.

Habitat? e collectione *Latreilleana*.

132. *St. castanopterus* M. p. 10.

St. erythropterus De Geer Mem. St. 8.

— — — *Fourcr. Ent. Par. St. 9.*

Geoffr. Hist. St. 9.

133. *St. erythropterus* M. p. 10.

Variat fronte, pectore et abdomine magis minusue flavo-sericantibus.

St. erythropterus De Geer, *Fourcr.*, et *Geoffr.* St. n. 10. ad speciem praecedentem redactus est.

134. *St. fodiens* niger, subopacus; thorace elytrorumque basi obscuro-castaneis; tibiis, tarsis et elytrorum apice rufo-testaceis.

Habitu Staph. sequentis.

Long. 6 lin.

Caput orbiculatum, thorace breuius, nigrum; palpis subrufescentibus; antennis fuscis, articulis primis nigris summo apice rufescentibus.

Thorax latitudine paulo longior, subtiliter punctus, linea media longitudinali obsoleta.

Scutellum nigrum.

Coleoptra quadrata.

Abdo-

Abdomen nigrum, dorso subsericante; puncto segmentorum singulorum fulvo-sericante.

Habitat in Carolina — *Bosc.*

135. *St. foſſator* M. p. 164.

136. *St. foſſor* M. p. 10. opacus, niger; capite et thorace subcupreο; elytris tibiis et tarsis subfuluo-sericantibus.

Caput suborbiculatum, thoracis magnitudine, tomento tenui subcupreο-sericante tectum. Oculis paruis. Antennis, capite vix paulo longioribus, orisque partibus nigris.

Thorax latitudine paulo longior, coleoptris paulo angustior, subcupreο-sericans; linea longitudinali obsoleta.

Scutellum nigro-fanumetinum.

Coleoptra latitudine paulo longiora, tomento tenui cupreο- et fuluo-sericante confertim tecta.

Abdomen coleoptris plus duplo longius, nigrum, pilosellum; segmentorum singulorum puncto dorsali fuluo-sericante.

Pedes nigri, tarsis tibiisque fuluo-pilosellis; tarsis anticis fossoriis.

Haec species europaea *St. fodienti* (n. 154.) ex America septentrionali adeo similis est, ut fere inuita me hanc ab illo sciungam.

* * *

137. *St. cinerascens* M. p. 49.

De-

Descriptio huius Staphylini, cui, M. p. 49. locum ultimum in ultima (nunc secunda) Staphylinorum familia adsignaueram, ab individuo unico, iamiam laeso, et chartae ad-glutinato, collectionis *Knochianae*, desumpta, nunc, individualiter pluribus huius speciei lectis, accuratior dari potest.

Praemonendum est, hunc Staphylinum huic familiae tertiae adnumerandum esse. Licet enim paruitas eius a hac familia eum remouere videatur, attamen omnibus illis characteribus gaudet, qui familiam tertiam a reliquis familiis distinguunt. Forma antennarum, capitis et thoracis, nec non horum punctura omnino eaedem sunt ac in reliquis huius familiae Staphylinis. Quo clarius autem hoc appareat, descriptionem eius hic addo accuratiorem:

Long. 2 lin.

Caput quadratum, magnitudine thoracis, nitidulum, confertimi punctum, nigrum; oculis paruis; antennis, capite longioribus, fuscis, basi pallidioribus; palpis rufo-fuscis.

Thorax quadratus, angulis obtusis, coleoptris minor, nitidulus, punctus, medio leuis, punctis numerosis sed haud confertissimis; niger.

Cole-

Coleoptra latitudine paulo longiora, opaca, nigra, pilis tenuissimis grisecentibus vestita; oculo ipso armato plane sine puncta esse videntur.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, opacum, subpilosellum.

Pedes fusco-picei.

Habitat Brunniigae, lectus tempore verno, sub gramine, ad ripas — *Dahl.*

FAMILIA IV.

Staphylini huius familiae vel corpore toto vel plurimis eius partibus villis mollieribus aut tomento nebuloso vestiti sunt. Thorax in specie semper hoc vestimento indutus esse solet, vel, vestimento detrito, punctis subtilissimis et confertissimis impressus apparet, quo haec familia semper a familiae sequentis speciebus differt, quibus thorax est leuissimus, punctis seu impressionibus paucis maioribus interquin notatus. Villi autem seu tomentum indole sunt longe diuersa a pilis illis, quibus elytra omnium fere *Staphylinorum* magis minusue tecta esse solent.

Praeter plures *Staphylinos* e familia II. M. p. 3., haec familia comprehendit etiani *St. hirtum* e familia I. M. p. 159.

158. *St. vericolor* obscurus, tomentosus; flavescenti- vel viridescenti- nebulosus; apicibus elytrorum subcyanescentibus.

Long.

Long. $7\frac{1}{2}$ — $8\frac{1}{2}$ lin.

Habitu St. sequenti magis affinis est, quam vlli alii huius generis microptero; differt autem satis ab illo.

Caput orbiculatum, long. 2 lin., longitudine paululum latius, thorace maius, coleoptris minus; nigrum, subtus nigerrimum nitidissimum nudum, supra pilis densis exquisitauosericantibus, paucisque singulis longioribus nigris, vestitum. Oculis reniformibus, pallidis, maiusculis. Antennis, capite paulo longioribus, apicem versus paulo crassioribus; colore variabili: vel rufescens, articulis 6 ultimis obscurioribus et griseo-serican- tibus; vel nigris, basi articuli primi rufescente. Labro, margine anteriore pallidiore, in media apice rufo, testaceo-ciliato. Reliquis instrumentis cibariis nigris.

Thorax quadratus, basin versus angustatus, angulis anticis acutis, coleoptris triplo minor; linea longitudinali obsoleta, ante scutellum distinctiore, eleuata, nitida; niger, maculis sammetinis, viridi-flavis vel obscuro-oliuaceis, nebulosus.

Scutellum viridi-flavo - vel obscuro-oliuaceo-sammetinum.

Coleoptra quadrata, maculis sammetinis vi- ridi - flavis vel obscuro - oliuaceis nebulosa; hume-

humeris rufotestaceis; apice subcyanescenti-nitido.

Abdomen coleoptris duplo longius, illis autem angustius; nigrum, subtus argenteo-sericeum, supra hirtulum, punctis 2 ante coleoptra testaceo-sammetinis; segmento penultimo pilis tenuibus exiguis virescenti-sericantibus dense vestito; segmento ultimo, seu ano, testaceo. Pectore nigro, pilis tenuissimis argenteo-sericantibus vestito.

Pedes subpiloselli; femoribus anterioribus subargenteo-sericantibus; anticis nigris, apice macula testacea magis minusue distincta; posterioribus testaceis, annulo medio nigro; capitibus femorum omnibus nigris; tibiis et tarvis vel nigris vel testaceis.

Habitat in Para, prouincia Brasiliae, in sylvis humidis; captus in fructibus putrescentibus — Sieber.

St. versicolor — in collectione Hellwigio — Hoffmannseggiana.

139. *St. nebulosus* M. p. 13.

De Geer Mem. St. n. 1.

Geoffr. Hist. St. n. 6.

St. tessellatus Fourcr. Ent. Par. St. n. 6.

140. *St. cingulatus* M. p. 166.

141. *St. chloropterus* M. p. 166.

Fbr. Eleuth. St. n. 5.

142. *St. murinus* M. p. 14.

Linn. Fn. Suec. n. 840.

143. *St. femoratus* obscuro-nebulosus; ano femoribusque anterioribus testaceo-ochraceis, his macula nigra notatis.

Long. 6 — 6½ lin.

Habitu inter *St. pubescens* (n. 144.) et *murinum* (n. 142) medium tenet; species autem distincta est capite haud orbiculato sed subtriquetro, vel latitudine paulo longiore, apicem versus angustato etc.

Corpus subaeneum ut *St. murino*.

Caput thorace minus, subtriquetrum, punctum; linea media longitudinali leui obsoleta; clypeo testaceo; mandibulis nigris; palporum articulis nigris, apice rufis; antennis capite paulo longioribus fuscis, articulis 2 primis rufis.

Thorax capitidis colore atque punctura; linea media leui longitudinali; angulis anticis obtusioribus quam in *St. murino*, paulo acutioribus quam in *St. pubescente*.

Coleoptra subgriseo-nebulosa, subquadrata.

Abdomen pilosellum, nigrum; dorso subrufo-varium; ventre subsericans, subaeneonitens, segmento ultimo ochraceo; pectore subsericante.

Pedes nigrantes; femoribus ochraceis, lateribus, imprimis femorum posticorum, nigris.

Habi-

Habitat in Carolina — *Bosc.*

St. femoratus Fabr. Eleuth. St. n. 24.

144. *St. pubescens* M. p. 12.

St. pubescens Paykulli, Olivier, nec non
St. chrysocephalus Fourcroyi et Geoffroyi St. 3.,
 qnos sub *Staph. pubescente* M. p. 13. allegauit,
 haud ad hanc speciem sed ad aliam affinem,
 quae *St. chrysocephalus* (n. 146.) nominata est,
 pertinent.

145. *St. maculosus* M. p. 165.

Variat 1) Capite thoraceque vnicoloribus, re-
 gione circa oculos rufescente — e collectione
Knochiana. — 2) Capite aenescente, lineis 2
 longitudinalibus et regione circa oculos ru-
 fescens; thorace aenescente, lineis 2 lon-
 gitudinalibus interruptis, margine apicis et
 baseos, nec non punctis 2 marginis lateralis
 rufescens magis minusue obsoletis. —
 Habitat in Carolina — *Bosc.*

Staphylinum vidi, omnibus characteribus, nec
 non patria, cum *St. maculoso* congruentem,
 longitudine autem modo 6 linearum; pedibus
 testaceis, capitibus femorum et macula fe-
 morum baseos nigris; lineis capitis et thora-
 cis rufis latioribus nec interruptis. — E col-
 lectione *Bosciana*.

St. viduatus Fabr. Eleuth. St. n. 7.

146. *St. chrysocephalus*, nigro fuscoque nebulosus; abdomine argenteo-sericante; capite femorumque annulo ochraceis.

Long. 6 lin.

Habitu partimque forma et proportione omnino *St. pubescens* (n. 144.); semper autem ab eo differt.

Caput ochraceum, subflavo-sericans, punctis 2 frontalibus oculisque nigris, mandibulis apice nigris; antennis fuscis, articulis 4 primis ochraceis; (punctis maioribus et linea media nitida, quae sunt *St. pubescenti*, nullis).

Thorax opaco-niger, obsoleto rufo-punctatus, linea abbreviata longitudinali nitida ad basin.

Coleoptra, abdomen, pectus et scutellum ut in *St. pubescente*.

Pedes nitidi, nigri; annulo femorum ochraceo.

Habitat in Gallia.

St. chrysocephalus Fourcr. Ent. Par. St. n. 3.

St. pubescens Payk. Mon. St. n. 9.

— — Payk. Fn. Suec. St. n. 13.

— — Olivier Ent. St. n. 15. t. II. f. 15.

Geoffr. Hist. St. n. 8.

147. *St. Chrysif* capite, thorace, scutello et elytris holofericeis; aureo-cupreus; capite flavo; thorace anterius, scutello, segmentorumque basi nigris.

Long.

Long. 10 lin.

Habitu St. praecedentis; thorace autem rotundiore, angulis anticis deflexis ut in *Staphylinis* plurimis familiae I.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, subitus rufescens, supra pilis flauo-holo-sericeis vestitum; inter antennas nudum, pallide viridi-aenescens, subpunctum; clypeo testaceo; labro et maxillis rufo-fuscis; mandibulis palpis et antennis fuscis; his capite paulo longioribus, articulo primo paulo pallidiore; oculis perparuis.

Thorax orbiculatus, angulis anticis deflexis, coleoptris paulo minor, holo-sericeus; parte anteriore violaceo-niger, posteriore aureo-cupreus.

Scutellum violaceo-nigrum, holo-sericeum.

Coleoptra quadrata, holo-sericea, aureo-cuprea.

Abdomen nigro-aeneum; marginibus segmentorum rufis; pectore subflauo-fericante.

Pedes rufi; tibiis tarisque fuscescentibus.

Habitat in Bahia, Brasiliae prouincia —

Gomes.

St. *chrysis* — in collectione Hoffmanns-eggiana.

148. St. *hirtus* M. p. 159.

St. *hirtus* Fourc. Ent. Par. St. n. 6.

— — Geoffr. Hist. St. n. 6.

FAMILIA V.

Comprehendit Staphylinos familiae I. M. p. 2., excepto *St. hirto*. — Forma thoracis, eiusque superficies nuda, nitida, punctis paucis inordinatis impressa, praecipue species huius familiae a reliquis Staphylinis distinguunt.

149. *St. villosus* M. p. 160.

150. *St. maxillosus* M. p. 2.

Variat 1) Elytrorum fascia continua, abdominis dorso et ventre albo-sericantibus. 2) Elytrorum fascia interrupta, abdominis dorso et ventre albidis. 3) Elytris totis nigris, abdominis dorso subcinereo-maculato, ventre sericante.

Varietatem totam nigram nondum vidi.

151. *St. oculatus* niger, nitidulus; capite infra et in angulis baseos supra rufo.

Long. $7\frac{1}{2}$ lin.

Partium forma et proportione St. praecedentis.

Caput thoracis magnitudine, longitudine paulo latius; nigrum, infra et in angulis baseos rufum; clypeo testaceo; antennis, capitibus longitudine, validis, extrorsum crassioribus.

Coleoptra quadrata, subopaca, coriacea.

Abdomen opacum pilosellum.

Habitat in Noua Seelandia. — E collectione *Hellwigiana*.

St.

St. oculatus Fabr. Ent. S. St. n. 10.

— — Olivier Ent. St. n. 3. t. II. f. 19.

St. erythrocephalus niger, nitidus; capite rufo,
macula frontali nigra — certo varietas *St.
oculati* est.

Long. 7 — 8½ lin.

Partium forma et proportione omnino *St.
oculati*.

Caput speciminiibus quibusdam thorace paulo
maiis, quibusdam thorace paulo minus; ru-
fum; ore, antennis (quarum articuli 7 vltimi
desunt) et macula quadrata inter oculos nigris.

Habitat in Noua Hollandia. — E collectione
Bosciana.

St. erythrocephalus Fabr. Ent. S. St. n. 17.

— — Olivier Ent. St. n. 9.
t. II. f. 9.

GENVS IV.

L A T H R O B I V M.

Lathrobia, habitu planiusculo filiformi, capite thoraceque punctis, hoc rectangulo, a reliquis Coleopteris Micropterus iam distingui possunt. *Staphylini* fam. II., quibus, primo intuitu, similiora esse videntur, habitu sunt paulo convexiore, thorace haud confuse sed vel omnino non vel parcus et striatim puncto, pedibus longioribus et gracilioribus, palpis filiformibus, qui optimum praebent characterem distinctiunum. *Palpi* acuminati sunt, excepto *L. latipede* (Pinophilus M. p. 201.), cui filiformes, ut *Staphylinis*. — De similitudine Lathrobiorum cum quibusdam *Paederis* vide ea, quae de *Paederis* dicam.

Haec sunt quae de Lathrobiis, respectu generum aliorum monere me oportuit; haud enim vereor, quemque *Lathrobia* cum ullo alio genere confundere posse, licet characteres huic generi proprii peculiares non extant. Character totus naturalis, seu complexus characterum, qui omnibus huius generis speciebus communes sunt, sufficient ad praebendam genericam distinctionem. Habitus hic certus naturalis omnia *Lathrobia* iungit. Qui autem sistema artificiale, partibus oris aut pedum innixum, conde-

conderet, *Lathrobium latipes* a reliquis cospeciebus naturalibus secernere coactus foret; palpi enim, omnibus *Lathrobiis* acuminati, huic soli filiformes sunt; vnguis autem, omnibus *Coleoptris Microptera* apici articuli quarti tarsorum adhaerens, in illa specie basi huius articuli adhaeret.

Hoc genus in *quatuor familias* dispisci potest, quarum prima et secunda singula singulam quidem tantummodo speciem continet, speciem autem, quae tam statura quam characteribus quibusdam peculiaribus a reliquis cospeciebus huius generis semper differt.

FAMILIA I.

Olim *Pinophilus*; genus XIV. M. p. 201.; de quo confer quae iam dixi loco citato.

1. *L. latipes*. — M. p. 202.

FAMILIA II.

De hac familia vide descriptionem unius, quam continet, speciei.

2. *L. depresso* M. p. 182.

Variat etiam femoribus posticis rufis. — E collectione *Bosciana*.

FAMILIA III.

Comprehendit paucas species, antennis quasi infractis notatas: Articulus nempe primus an-

tennarum, qui reliquis multo longior est, cum reliqua antennarum parte angulum format recto paululum maiorem.

3. *L. fracticorne* M. p. 54.

Antennae interdum rufescunt.

4. *L. pallipes* M. p. 179.

Antennae vel rufescunt vel fuscescunt.

FAMILIA IV.

Omnes reliquias huius generis species complectitur, quae, palpis acuminatis, a fam. I., corpore conuexiore a fam. II., antennarum articulo primo breuiore, a fam. III. differunt.

5. *L. fuscum*, fuscum; antennis palpisque pallidioribus; pedibus rufis.

Long. 4 lin.

Habitu *L. brunnipedis* (n. 6.); punctura autem subtiliore quam in plurimiis reliquis co-speciebus.

Caput suborbiculatum, nitidum, castaneofuscum; magnitudine thoracis; antennis, capite longioribus, palpisque rufescentibus seu fuscescentibus.

Thorax subquadratus, latitudine vix paulo longior, angulis obtusis, magnitudine coleoptrorum.

Coleoptra latitudine vix paulo longiora.

Pedes tarsis anticis dilatatis. ▪

Habi-

Habitat Parisiis — *Brongniart* — et Brunsuigae — *Dahl*.

6. *L. brunnipes* M. p. 56.

7. *L. pilosum* M. p. 56.

Caput orbiculatum, thorace duplo fere minus, nitidum, punctum, nigrum, antennis palpisque fuscis.

Thorax quadratus, coleoptris duplo minor, punctus, nitidus, niger.

Coleoptra latitudine longiora, nigra, minus nitida quam thorax et caput; puncta, punctis subtilissimis et confertissimis; pilis tenuissimis breuissimis griseo-vestita.

Abdomen coleoptris triplo fere longius, nigrum, nitidulum, pilis griseo-vestita subsericans.

Pedes nigro-fusci, tarsis pallidioribus.

Staph. quadratus. Payk. St. n. 21.?

8. *L. gracile* M. p. 182.

Habitat etiam Brunsuigae, tempore aestiuo, sub gramine, in pratis — *Dahl*.

9. *L. longiusculum* M. p. 181.

10. *L. politum* M. p. 180.

11. *L. multipunctum* M. p. 52.

Haec species, thorace elytrisque punctostriatis, Lathrobiis duobus praecedentibus valde affinis est; inde descriptione eget accuratiore.

Long. $2\frac{1}{2}$ — 3 lin.

Color huius speciei variat. *Descriptio* eius in M. p. ⁵² ~~52~~. a varietate rufescente desumpta est et, quoad formam atque proportionem partium, ad huius speciei varietates satis bene quadrat. Quaedam attamen monenda sunt.

Thorax vix basin versus subangustatus, sed rectangulus est. Puncta eius lateralia in series interdum subdisposita esse videntur circiter septem.

Coleoptra thorace vix paululum latiora sunt, puncta; punctis disci in series 10 dispositis, lateralibus inordinatis.

Abdomen coleoptris triplo longius.

Color variat:

1) Niger; pedibus testaceo-rufis; coleoptris obscuro-caeruleis; antennis palpisque rufo-fuscescentibus.

2) Capite et abdome fuscescentibus; thorace rufescente; coleoptris piceis; pedibus testaceis.

Punctura huins speciei multo crassior est quam in cospeciebus.

12. *L. elongatum* M. p. 55. nigrum nitidulum; coleoptris confuse-punctis, apice sanguineo-rufis; pedibus rufo-testaceis.

13. *L. lineare* M. p. 54. nigricans; pedibus rufis; antennis elytrisque fuscis; his puncto-striatis.

Hoc *Lathrobium* in mea collectione haud exstat. Diagnosin eius, qua a *Lathrobie* praecedente

cedente differt, Dom. Professori *Knoch* deboeo, qui mecum adhuc quasdam adnotationes de differentia eorum communicauit, his verbis: “*L. lineare* haud essentialiter statura graciliore a *L. elongato* differt, quanquam hoc rarissime statura aequa gracili ac illud occurrit; sed potius punctura crassiore thoracis et elytrorum, his praeterea punto-striatis, in *L. elongato* autem inordinatim punctis; palpi etiam *L. linearis* apice crassiores sunt quam in illa specie.”

Lathrobia mihi sunt multa, quae, adhibitis his distinctionibus, pro mera *L. elongata* habeo. Statura variant graciliore et crassiore, nec non colore:

- 1) *L. nigrum*; pedibus rufis; palpis, antennis, anoque fuscis; coleoptris etiam fere omnino nigris, apicem versus subnigro-castaneis.
- 2) *L. coleoptris* castaneis, basi nigris; caetera ut in varietate 1. — Haec varietas omnium est frequentissima.
- 3) Coleoptris totis nigro-castaneis; caetera ut in varietatibus praecedentibus.
- 4) *L. nigrum*; antennis palpisque rufo-fuscis; thorace fusco-piceo; elytris pedibusque testaceis.

Hic color obscurior seu pallidior ab aetate magis minusue prouecta horum insectorum dependere videtur.

Punctura harum varietatum mox paulo crassior mox paulo subtilior est, sine discriminine staturae gracilioris crassiorisue. Immo individuum mihi est varietatis 2, reliquis paulo gracilius, cuius puncta elytrorum, oculis bene armatis et intentis examinata, iamjam in series se disponere videntur; seriebus autem obsoletissimis, nec cum sutura exakte parallelis sed suboblique a basi elytrorum apicem eorum versus deductis, ita ut spatium inter apicem harum serierum et suturam angustius sit quam inter basin earum et suturam. Haec punctorum dispositio transitum forsan demonstrat a *L. elongato* ad *L. lineare*.

Staphylinus elongatus Linn. Syst. nat. ed. XII.
Staph. n. 14.

14. *L. terminatum* M. p. 55.

Variat colore pedum antennarum et palporum obscuriore vel pallidiore; pustulis in angulis coleoptrorum rufescentibus vel distinctis vel obsoletis.

15. *L. longulum* M. p. 55., capite gaudet subquadrato, angulis obtusis; coleoptris obsoletissime punctis; longitudine $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Lathrobium quoddam, a Dom. Dahl sub nomine *L. filiforme Knochii* mecum communicatum, illi peraffine est: Nigrum, nitidum, pedibus

pedibus antennisque fuscis; coleoptris obsoletissime punctis; longitudine $2\frac{2}{3}$ lin.

Statura nec non partium forma et proportione omnino *L. elongati* varietatibus gracilioribus simillimum est, exceptis attamen coleoptris, quae vix oculo armato puncturam obsoletissimam, interdum etiam vestigia obsoleta striarum ostendunt. — Praeter statutam paulo maiorem et crassiorem, nec non colorem pedum et antennarum, nullis characteribus a *L. longulo* differt.

L. filiforme et *longulum* habitant Brunsui-gae iisdem locis, in gramine nempe et sub foliis deciduis ad ripas — *Dahl.*

16. *L. badium* M. p. 53.

17. *L. bicolor* M. p. 179.

18. *L. castaneum* M. p. 52. e collectione *Knochiana*, vbi haec species sola exstabat, se subduxit.

GENVS V.

P A E D E R V S.

Hoc genus in tres familias dispesci potest: *Familia I.* complectitur Paederos Lathrobiis adfiniores, nisi statura breuiore conuexiore, pedibus gracilioribus, thorace crassiore et breuiore discreparent. — *Familia II.* Paederos partibus corporis minus arcte inter se iunctis; capite et thorace crassioribus atque globosis, opacis, confertissime punctis. — *Familia III.* Paederos habitu proceriore teretiusculo, thorace plus minusue globoso, nitidissimo, punctis perpaucis vagis impresso, coleoptris cicatricose-punctis. Haec familia *Aleocharis* quibusdam fam. I., II. et III. adfinis est, quibus etiam caput et thorax plus minusue globosi et laxius inter se atque cum trunco reliquo coniuncti habitum dant peculiarem. Praeterea mores et quibusdam vel ipse color eidem sunt; Degunt sub gramine, in locis humidioribus apricis, et e. g. *P. riparium* cum *Al. collari*, *limbata*, *canaliculata* et *fulcata* saepius promiscue locis indicatis legi. Cum colorem spectamus, hoc etiam obseruamus aliquam congruentiam: Thorax, pedes et abdominis basis Paedetis multis fam. III. et multis *Aleocharis* pallidiores sunt, capite elytrisanoque obscu-

obscuris; immo *P. riparius* et *A. collaris* colore nihil fere differunt. Omnes autem similitudines, quas memoravi, inessentiales sunt, et natura Paederos fam. III. et Aleocharas characteribus multo stabilioribus segregauit. Staturam istam teretiusculam, imprimis abdominalis, Paederorum, quos citaui, in Aleocharis haud vidi-
mus; antennae, Paederis filiformes, Aleocharis omnibus hic allegatis extrorsum crassiores sunt;
coleoptra Paederis sunt crasse et cicatricose-pun-
cta, Aleocharis subtiliter; thorax Paederis est laeuis, punctis paucis vagis impressus, Aleocharis vel omnino laeuis vel sulculis aut fouea
aut punto maiore ante scutellum impressus.—
Palpi anteriores plurimorum huius generis Micropterorum triarticulati esse videntur; in Paederis autem familiae III. tuberculum, apici articuli tertii impositum, quasi articuli quarti vestigium esse videtur; articulum verum quartum subuliformem, alias semper in articulum tertium crassum retractum, non nisi semel, in uno *P. orbiculati* individuo collectionis *Latreilleanae* exsertum vidi, quod eo singularius est,
cum hic articulus in omnibus reliquis fere innumerabilibus micropteris, quibus palpi acuminati sunt, quotquot eorum examinaui, exser-
tus esset.

FAMILIA I.

1. *P. ochraceus* M. p. 59.

2. *P. rubricollis* rufo-fuscescens, nitidulus; capite obscuro; thorace subquadrato pedibusque rufis.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Habitu partiumque forma atque proportione omnino *P. sequentis*; punctura autem subtiliore, capite minore, antennis longioribus et gracilioribus, nec non colore, differt.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nigro-fuscum; antennis filiformibus, capite thoraceque paulo longioribus.

Thorax rufus, coleoptris breuior.

Coleoptra et *abdomen* rufo-fuscescentia, subgrisecenti-sericantia.

Pedes rufo-testacei.

P. rubricollis — Knoch.

P. testaceus Olivier Ent. Paed. n. 3. tab. I. f. 6. vel ad hanc vel ad praecedentem speciem conferri potest.

3. *P. bicolor* M. p. 59.

In collectione *Bosciana* hic *Paederus Staph.* *affinis* Payk. nominatus erat.

P. melanocephalus Fabr. Ent. Syst. Paed. n. 10.

P. melanocephalus Panz. Fn. Inf. Germ. H. XXXVI. tab. 22. forsan eadem species est, coleoptris obscurioribus.

Dom.

Dom. Sturm varietatem huius Paederi mecum communicavit nitidam, nigram; antennis, thorace et coleoptrorum summo margine apicali rufis, palpis pedibusque testaceis.

4. *P. castaneus* M. p. 60.

Hunc Paederum in collectione *Bosciana* sub nomine *Staph. elegans* Olivier (Ent. St. n. 20. tab. V. f. 50.) vidi.

5. *P. corticinus* M. p. 184.

Dom. Dahl cepit Brunsuigae Paederum, qui *P. corticino* affinis esse videtur, teste autem Dom. Prof. Knoch ab illo differt. Descriptionem eius hic addo:

Long. 2 lin.

Caput thorace paulo longius et latius, subtilissime confertissimeque punctum, fuscum; antennis, capite paulo longioribus, rufo-testaceis; palpis rufo-testaceis, subacuminatis, articulo quarto oculo bene armato difficilime conspicuo; mandibulis rufo-testaceis.

Thorax quadratus, basin versus paululum angustior; subtilissime confertissimeque punctus, linea media longitudinali leuissima; coleoptris minor, piceo-rufus.

Coleoptra rectangula; elytris latitudine duplo longioribus; subtilissime puncta, circa scutellum fusco-testacea.

Scutellum fusco-testaceum.

Abdo-

Abdomen coleoptris plus duplo longius, marginatum, piceo-testaceum, apice subpallidiore.

Pedes testacei.

6. *P. vestitus* leuis, niger, nitidus; coleoptris subfuscouscentibus; antennarum et palporum basi, pedibusque testaceis.

Long. 2 lin.

Caput orbiculatum, nigrum, thorace minus; palpis anterioribus testaceis, articulo ultimo obscuro; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, fuscis, basi testaceis.

Thorax suborbiculatus, duplo fere coleoptris minor; interdum linea dorsali longitudinali, saepius autem obsoleta, impressus.

Coleoptra quadrata, nigricantia seu fuscouscentia.

Pedes testacei.

Habitat Rostochii — Karsten.

Hunc Paederum Dom. Karsten cum Dom. Prof. Hellwig communicauit, sub nomine *Staphylinus vestitus*; habitus autem totus et forma palporum verum genus designant.

FAMILIA II.

7. *P. fragilis* niger, subnitidus; thorace, antennis, pedibusque rufis; elytrorum margine apicali testaceo.

Long. 3 lin.

Habitu

Habitu, partiumque forma ac proportione omnino Paederi sequentis, thorace paulo angustiore.

Caput nigrum, antennis et palpis rufescientibus.

Thorax nitidulus, canalicula longitudinali subobsoleta impressus.

Abdomen subsericans.

Habitat Parisis — *Bosc.*

In collectione *Bosciana* hic *Paederus* exstabat sub nomine *P. melanocephalus* Fabr. (conf. *P. bicolor* n. 5.) a quo tamen sane differt, neque enim minutus est neque filiformis.

8. *P. orbiculatus* M. p. 63.

9. *P. angustatus* M. p. 63.

Thorax subquadratus, angulis obtusis, apicem versus angustior.

Sunt autem huins speciei duae varietates (vel, iudice *Knochii*, duae species distinctae), quarum vna, et quidem minor, thorace est paulo breuiore, punctura paulo crassiore et elytris paulo magis nitentibus, quam varietas maior, cui Dom. Prof. *Knoch* nomen dedit *P. procerus*. Cum vero hae differentiae mihi nondum sufficere videantur ad nouam speciem condendam, saltem expectare mihi licet, dum plura huins *Paed. proceri*, haud frequenter occurrit, individua lecta sint,

an characteres illi semper eum a *P. angustato* distinguant. —

Habitant Brunswigae — *Dahl.*

P. angustatus (?) nitidus, fusco-niger; palpis, antennis atque pedibus ochraceis.

Habitu nec non partium forma et proportione *P. angustati*; an eius varietas iunior?

Thorax obscurō-fuscus.

Elytra nigro-fusca, apice rufescens.

- Habitat in Borussia — *Kugellan.*

E collectione *Hellwigiana.*

Staph. gracilis Payk. Mon. St. n. XXVIII. iudice *Paykullo* ipso mera *P. angustati* varietas est: *Payk.* Faun. Suec. p. 431. n. 7. ♂.

FAMILIA III.

10. *P. littorarius* rufus; antennarum medio fusco; capite et ano nigris; elytris coeruleis.

Long. $2\frac{1}{3}$ lin.

Habitu, partiumque forma proportione et punctura *Paederi riparii*; magnitudine attamen et coleoptris paulo brevioribus differt.

Caput nigrum; palpis totis rufis; antennis fuscis, articulis tribus primis et duobus ultimis rufis.

Pedes rufi, geniculis vix paulo obscurioribus.

Habitat in America septentrionali — *Knoch.*

P. littorarius — *Knoch.*

11. *P. riparius* M. p. 62.

12. *P. littoralis* M. p. 61. in Gallia multo est frequentior quam *P. riparius*, qui immo rarus esse videtur, cum mihi in collectionibus Entomologorum Parisiensium semel modo occurrit. — Attamen fere credo, ambos in unam eandemque speciem redigendos esse, cum mihi individua sint, quae, characteribus distinctiis, a capite et thorace magis minusue globosis desuntis, medium inter anibas species tenent. Scimus autem de multis aliis Micropteris, hanc capitis et thoracis formam et proportionem variabilem esse, quod etiam de *P. ruficollis* valet, cuius individua thorace magis minusue globoso variant.

13. *P. ruficollis* M. p. 185.

Confer quae modo ad *P. littoralem* monui.

Habitat etiam in Gallia.

Geoffr. Hist. Staph. n. 23.

Staph. thoraciculus Fourcr. Ent. Par. St. n. 23.

GENVS VI.

ALEOCHARA.

Genus, quod multa complectitur Microptera, habitu naturali toto, et partibus etiam singulis satis diuersa, ita, vt familiae sex, in quas distribuuntur, forsan plura genera condere possint:

Familia I. comprehendit Aleocharas, quibus partes trunci paulo quidem arctius cohaerent, quam plurimis familiae sequentis, laxius autem quam cospeciebus plurimis familiarum reliquarum. — *Capite exerto*, thoracis magnitudine, fronte plerumque plana; *thorace* latitudine paulo longiore, coleoptris paululum minore, disco deplanato, interdum subcanaliculato, a caeteris Aleocharis praecipue distinctae sunt.

Familia II. comprehendit Aleocharas paruillas, habitu peculiari a reliquis diuersas; *capite* et *thorace* laxe inter se et cum reliquo trunco cohaerentibus; *capite* globoso, nunquam minore quam thorax, saepius autem maiore; *thorace* globoso, basin versus, rarius apice, angustiore, coleoptris minore; sulculis seu sulco vnico vel saltem puncto magno ante scutellum impresso. Sulculae distinctae breues ad basin *coleoptrorum* non nisi in hac familia deprehenduntur et vna cum glabritie *coleoptrorum* et thorace cordato seu

seu obcordato coleoptris minore, optimi eius characteres sunt. — *Al. picea* et *nigra*, quibus quidem coleoptra sunt subtilissime puncta, nec basi sulculis impressa, ob formam autem et proportionem thoracis meliore iure huic familiae quam sequenti inferuntur, et limitem quasi designant, quo (per *Al. aethiopem analem* etc. e familia tertia) haec familia tertiae adpropinquatur; differentia etiam magnitudinis thoracis et coleoptrorum minor est in his duabus speciebus, quam in reliquis familiae II.

Familia III. continet, praeter totam familiam secundam M. p. 77., plures etiam species e familia prima M. p. 67., scilicet *Al. analem*, *aethiopem*, *prolixam*, *collarem*, *cinctam*, *lucidam*, *limbatam*, nec non genus IV. M. p. 65. Cum vero unicum unicae huius generis speciei individuum tempore hyberno et minus sereno examinarem, palpis anterioribus triarticulatis et mandibulis dentatis instructum esse mihi videbatur. Examen autem reiteratum et die sereno institutum me docuit, huic insecto omnino palpos et mandibulas esse ut reliquis Aleocharis. Licet ergo structura peculiari antennarum ab omnibus cospeciebus differat, attamen haud haereo, an hoc genus *Calliceri* tollam et Aleocharis familiae III., quibus, tam habitu toto externo, quam partium singularium forma, antennis solis

exceptis, finillimum est, adsociem; nomen hactenus genericum speciei manebit. — *Partes trunci* micropterorum huius familiae arctius cohaerent, quam in familiis praecedentibus, minus autem arcte quam in familia sequente. *Caput* thorace quidem minus est, haud vero adeo quam in familia sequente. *Thorax* plus minusue orbiculatus, paulo interdum in latitudinem extensus, coleoptrorum circiter magnitudine, speciebus longe plurimis minus est conuexus, quam in familiis praecedentibus et sequente, interdum autem adeo conuexus, ut thoraci globoso specierum e familia prima proprius accedat, forma autem orbiculata, nec cordata vel obcordata, semper ab illo diuersus. *Punctura* capitis et thoracis in regula vel omnino deest, vel adeo est subtilis, ut vix oculis armatis sese offerat. *Al. nigricollis* autem et *Al. fulgida* ab hac regula excipiendae sunt; caput nempe et thorax illius scabriculi sunt, i. e. punctis crassioribus impressi, huius vero punctis sparsis distinctis impressi. *Coleoptra* specierum huius familiae quadrata esse solent.

Familiae IV. Aleocharae, statura coacta et crassa, trunci partibus arctissime innicem innectis, Iatiusculis, a speciebus praecedentibus differunt. Haec statura coacta crassa singulis etiam trunci partibus formam efficit peculiarem, imprimis respe-

respectu proportionis longitudinis partium ad latitudinem earum: *Caput* paruum, orbiculatum, sub *thorace* multo maiore, conuexo, transverso, apicem versus plerumque angustiore, absconditur. *Coleoptra* transuersa sunt, elytris saepius subquadratis. — Haec familia, speciminiibus quibusdam minus coactis et, quod inde sequitur, thorace coleoptrisque minus latis minusque conuexis, cum familia III. iungitur, e. g. per *Al. ruficornem*, *laeuem* etc. — Ut omnibus reliquarum familiarum Aleocharis, ita etiam speciebus huius familiae longe plurimis, *labrum* transuersum et *palpi* breues acuminati, articulo penultimo clauato, sunt. Quibusdam autem huius familiae Aleocharis, scilicet *Al. excusae*, *minutae* et *palpali* *labrum* productum subquadrato-orbiculatum et *palpi*, quorum articulus ultimus vix visibilis est et oculo bene armato qua seta perexigua et tenuis sese ostendit, longi et graciliores sunt.

Familia V. species solummodo duas comprehendit perexiguas, habitu autem et forma atque proportione partium singularum ab omnibus ceteris Aleocharis satis distinctas, ut in propriam familiam coniungi possint. *Corpus* est depresso-sculptum. *Caput*, antennis extrorsum valde incrassatis, thorace est minus. *Thorax* transversus conuexiusculus. *Coleoptra* leuia, transuersa,

thorace latiora et duplo fere longiora sunt. Ex his characteribus coniunctis cuique apparebit, hanc familiam aequem naturalem ac necessariam esse.

Familia VI. etiam duas tantum species complexitur, quae omnibus characteribus cum *Aleocharis* familiae III. congruerentur, nisi thorax et corpus totum eis depresso essent.

FAMILIA I.

1. *A. canaliculata* M. p. 68.

Thorax interdum vix ovatus est, latitudine paulo longior.

2. *A. linearis* M. p. 69. subnitidula, nigricans, antennarum basi pedibusque testaceis; fronte thoraceque planiusculis.

Capite et thorace minus depresso, colore subnitidulo etc. ab Al. sequente differt.

Huius speciei indiuidua tria possideo, quorum vnum statura paulo latius est, canalicula thoracis obsoletiore; altera duo, quorum vnum Dom. *Sturm* mecum communicauit, statura paulo angustiore sunt, thoracis canalicula distincta.

In descriptione huius speciei M. p. 69. dixi anum ei esse rufescentem, sed indiuiduo latiori, quod possideo, abdominis pars dimidia deest, indiuiduis autem gracilioribus anus est concolor cum abdome.

Al.

Al. linearis var.? nigra, nitidula; pedibus, elytris, palpis, antennarumque basi rufis; capite thoraceque planiusculis.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput thorace duplo minus, fronte impressa, nigrum; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, nigro-fuscis, articulo primo rufo; palpis rufis.

Thorax coleoptris paulo minor, quadratus angulis obtusis, disco planiusculo subcanaliculato, nigro-fuscus.

Coleoptera quadrata, testaceo-rufa, basin versus sensim obscuriora, tandemque et circa scutellum fuscescentia.

Abdomen coleoptris quadruplo longius, nigrum.

Habitat Norimbergae — Dom. *Sturm* unicum huius varietatis (?) specimen, quod possedeo, mecum coniuncticauit.

3. *Al. dimidiata* opaca nigra; basi antennarum, palpis, pedibus, coleoptrorumque dimidia parte testaceis; fronte thoraceque deplanatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Statura linearis, partium forma et proportione, fronte et thorace planiusculis, cum *Al. linearis* (n. 2.) conferri potest.

Caput thoracis fere magnitudine, fronte depressa; opacum, nigrum; antennis, capite duplo

duplo longioribus, fuscis, articulis 4 primis rufo-testaceis; palpis rufo-testaceis.

Thorax subquadratus, angulis obtusis, basin versus vix paulo angustior, coleoptris paulo minor; disco deplanato obsolete canaliculato; opacus, niger.

Coleoptra leuia, quadrata; dimidiato basi nigra, apice testacea.

Abdomen coleoptris quadruplo longius, nigrum, nitidulum, sublineare, apicem versus paululum incrassatum.

Pedes testaceo-rufi.

Habitat Parisis — *Bosc.* — Rostochii — *Karsten* — Brunsuigae, ad ripas piscinarum — *Dahl*.

Haec species in collectione *Bosciana* sub nomine *Staph. angustatus* Payk. existabat, et verus *Paed. angustatus* ad *Paed. orbiculatum* relatus erat — Dom. *Karsten* hanc *Aleocharam* sub nomine *Staph. dimidiatus* misit Dom. Prof. *Hellwigio*.

FAMILIA II.

4. *A. impressa* M. p. 72.
5. *A. riicularis* M. p. 73.
6. *A. sulcata* M. p. 73., thorace cordato, fouea media longitudinali impresso; coleoptris quadratis; fusca, subsericea, pedibus testaceis.

Confer

Confer notam ad n. 8.

Habitat, primo vere, sub gramine.

7. *A. fulcatula*, thorace cordato, fouea media longitudinali impresso; coleoptris quadratis; nigro-fusca, nitida, pedibus antennarumque basi testaceis.

Haec species praecedenti adeo similis est, ut eam pro mera eius varietate habere mallem. Differt statura paulo graciliore, nitore sericeo deficiente, colore paulo obscuriore, capite paulo minore. Dom. Prof. Knoch scripsit mihi autem, se, multis huius speciei indiuiduis, nullam varietatem nullumque transitum in *Al. fulcatam* obseruasse.

Habitat Brunnsuigae, ad ripas fossarum in pratis, sub gramine — *Dahl.*

A. fulcatula — *Knoch.*

8. *A. obscura* M. p. 74. thorace cordato, subfoveolato; coleoptris transuersis; nigro-fusca, subsericans, antennis elytris pedibusque rufescentibus.

Haec species et duae praecedentes, a quibus haec imprimis coleoptris transuersis differt, attamen obseruationes adhuc accuriores et in pluribus indiuiduis, temporibus et locis diuersis captis, requirunt, quo de differentia aut identitate specifica earum diiudicari

cari possit, cum affinitatem nimiam inter se prodant.

Hanc *Al. obscuram* in collectione *Bosciana* sub nomine *St. crassicornis* Fabr. reperi.

9. *Al. fracticornis* thorace suborbiculato, foueolato; coleoptris quadratis; nigro-fusca, nitida, pedibus pallidioribus.

Statura paulo minore, thoracis forma, et colore obscuriore a speciebus tribus praecedentibus differt.

Caput thoracis magnitudine, nigricans, sulca transuersali inter antennas impressum; antennis capite duplo longioribus.

Thorax suborbiculatus, basin versus paululum angustior, fouea media longitudinali, quae antem apice interdum obsoleta est, impressus; nigricans.

Coleoptra quadrata, fusca.

Abdomen nigrum.

Pedes piceo-fuscescentes.

Habitat Brunswigae, in pratis ad ripas fossarum — *Dahl.*

10. *A. picea* M. p. 75.

11. *A. nigra* M. p. 75.

12. *A. corticalis* M. 76. et *Al. tenuis* M. p. 84. varietates sunt vnius eiusdemque speciei. — Conf. *Illigers Magazin* B. I. p. 480.

FAMILIA III.

13. *At. analis* M. p. 76.

Thorax longitudine vix paulo latior est.

A. exilis — *Knoch*. Sub hoc nomine Dom. *Dahl* *Aleocharam* mecum communicauit, quam pro mera huius speciei varietate habeo. Dom. Prof. *Knoch* ipse autem mecum haud consentit, et scripsit mihi: “*Aleochara exilis* minor est quam *Al. analis*, et gaudet antennis crassioribus, quapropter ego hanc speciem haud cum illa confundendam esse censeo.”

Habitat *Brunnsuigae*, sub foliis deciduis, in sylvis — *Dahl*.

14. *A. Aethiops* M. p. 77.

Var.? habitu toto et forma atque proportione partium *Al. Aethiopis* — *Long.* $1\frac{1}{3}$ lin. — *Antennae* cum reliquo corpore concolores. —

Thorax canalicula longitudinali subobsoleta impressus. — *Pedes* femoribus cum reliquo corpore concoloribus, tarsis tibiisque testaceis. — Habitat *Parisiis* in simo — *Desmarest*.

15. *A. inquinula* M. p. 78.

16. *A. pusilla* M. p. 78.

17. *A. Callicera* M. p. 65. Gen. *Callicerus*. — Conf. quae supra in generalitatibus generis *Aleochara* dixi. (p. 145.)

18. *A. elongatula* M. p. 79.

A. oblonga Kn. quam Dom. Dahl mecum communicauit, nihil aliud esse videtur, quam varietas huius speciei. Magnitudine, partiumque forma proportione et punctura omnino cum illa conuenit; colore tantummodo paulo obscuriore differt. Est enim nigra, antennis nigro-fuscis, elytris fuscis, palpis pedibusque testaceis; segmentorum marginibus ventre vix paulo pallidioribus.

Addo hic verba Dom. Prof. Knoch. “*Al. oblonga* haud eadem species est cum *Al. elongatula*, thorax enim basi, ante scutellum, punto oblongo, quod in *Al. oblonga* orbiculatum est, impressus est, et color huius speciei variabilis est, quod in *Al. elongatula* haud obseruaui.”

Habitat Brunsuigae sub cortice fagorum demortuarum — *Dahl*.

19. *A. reptans*, nitida, nigra; palpis, antennis, elytris, pedibus, quoque rufescens.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Statura gracili, partium forma proportione et punctura *Al. praecedentis*, a qua, antennis paulo brevioribus et crassioribus, thorace per-paululum conuexiore, magnitudine paulo minore, nitore splendidiore, differt. An eius varietas? Ab *Al. anali* (n. 13.) et *circellari* (n. 22.) praecipue thoracis punto antescutellari

lari impresso deficiente, coleoptris quadratis, nec non magnitudine maiore, differt; nam illis punctum thoracis antescutellare distinctum est et coleoptra longitudine paulo latiora sunt.

Caput atrum; antennis, vix capitis thoracisque longitudine, et ore rufescens.

Thorax nigro-fuscus.

Coleoptra quadrata, puncta, fusco-castanea, lateribus paulo obscuriora.

Abdomen lineare, coleoptris triplo longius, nigro-fuscum; segmento penultimo margine, ultimoque toto rufis.

Pedes rufo-testacei.

Habitat Brunsuigae in salicibus demorientibus — *Dahl.*

20. *A. teres* M. p. 79.

21. *A. longiuscula* M. p. 30.

22. *A. circellaris* nitida, rufo-fusca; elytris pedibusque pallidioribus; abdomine nigro, ano testaceo.

Long. 1 lin.

Statura graciliore quam *A. sequens*.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, obscuro rufo-fuscum; antennis, capite duplo longioribus, fuscis, basi pallidioribus; ore rufo-testaceo.

Thorax

*Thorax rufescens, orbiculatus, coleoptro-
rum magnitudine.*

*Coleoptra subquadrata, longitudine perpa-
rum latiora, subtilissime puncta; picea vel
fusco-picescentia.*

*Abdomen coleoptris quadruplo longius, ni-
gro-fuscum, ano testaceo.*

Pedes testacei.

Habitat Brunsuigae, ad salices — Dahl.

23. *A. Boleti* M. p. 80.

Huius speciei varietates permultae in M. p. 81. descriptae sunt. Iam olim Dom. Prof. Knoch suspicabatur, has varietates in plures species redigi posse. Cum attamen illae varietates sensim vna in alteram transirent, eas promeris varietatibus habere me oportebat. Nunc autem credo, duas saltem species peculiares e varietatibus *Al. Boleti* constitui posse, cuius affinitas autem, exstantibus multis varietatibus intermediis, verisimile e copula illarum ortis, manifesta est. — Harum autem specierum vna *Al. Boleti*, altera *Al. fungi* nuncupatur. Ambae victitant in fungis, ambae frequentissime occurunt.

Al. Boleti, thorace suborbiculato, coleoptris quadratis; nitidula nigra; basi antennarum, palpis, pedibus, coleoptrisque pallidis, his autem

autem circa scutellum et in angulis apicis nigricantibus.

Long. 1 — 2 lin.

Caput nigrum; *antennis* fuscis, *basi rufis*; *palpis* rufis.

Thorax longitudine vix paulo latior.

Coleoptra testacea seu piceo-testacea, circa scutellum et in angulis apicis nigricantibus.

Pedes testacei.

Ad hanc speciem pertinent Var. I. 1. b. et 2.

Staph. socialis Payk. Mon. Staph. n. XLIII. huic speciei adnumerandus est, nam in collectione *Bosciana* hanc Aleocharam, a Dom. Paykull ipso e Suecia sub nomine *St. socialis* missam ipse vidi.

24. *A. Fungi* (Knoch) thorace coleoptrisque transuersis; nigra, nitidula; coleoptris nigro-fuscis; antennis palpis pedibusque pallidioribus.

Long. $1\frac{1}{5}$ lin.

Statura est crassiore quam *Al. Boleti*.

Antennae fuscae; *palpi* et *pedes* testacei seu fusi.

Huc numerandae sunt *Al. Boleti* Var. II. 1. a.

b — 2. a. b. e — 3.

Variabilitatem harum duarum specierum iam Linneus obseruasse videtur, magnitudinem enim *Staphylini* *Boleti* in Fauna Suecica n. 859. magnitudini pulicis aequiparauit; in Systematis

matis Naturaे editione duodecimа autem dicit idem Linneus, *Staphylinum Boleti* pulice dimidio minorem esse.

Varietates intermediae inter *Al. Boleti* et *Al. Fungi* thorace coleoptrisque transuersis, elytris pallidioribus, in illam et in hanc transeunt. — His varietatibus adnumerandae sunt *Al. Boleti* Var. I, 3, 4 — II, 1, c, d, — 2, c, d.

Varietates quoque intermediae inter *Al. Fungi* vel *Al. Boleti* varietates minores et *Al. nigritulam* haud raro obueniunt. Aliaque Microptera, et quidem minima, quae in M. p. 81. ad varietates *Al. Boleti* retuli, forsan e copula varietatum minimarum huius speciei vel *Al. nigritulae* (n. 54.) cum minimis huius familiae speciebus orta sunt.

25. *A. dichroa* M. p. 186.

26. *A. erythroptera*, nigra, nitida; pedibus, elytris, antennarumque basi rufis.

Long. 2 lin.

Affinis *Al. Boleti* (n. 25.); statura autem paulo maiore, thorace transuerso, pedibus paulo crassioribus et colore differt; capite thorace et coleoptris subtiliter quidem, paulo tamen distinctius quam in *Aleochara Boleti*, punctis.

Caput antennis, capitis thoracisque longitudo, fuscis, articulis 5 primis rufis; palpis rufis.

Cole-

Coleoptra subquadrata, longitudine vix paulo latiora, rufa, pilis tenuissimis vestita.

Abdomen nigrum, ano subrufescente.

Habitat Norimbergae — *Sturm*.

Oxyporus erythropterus Panzer Fn. G. H. 27. tab. 21, teste *Sturm*, qui mecum hanc *Aleocharam* communicauit, hoc referendus est.

27. *A. obscurella*, nitidula, nigra, griseo-sericans; antennis pedibusque fuscescentibus, illis breuibus validis.

Long. fere 2 lin.

Caput orbiculatum, vix thorace paulo minus, nigrum, pilis perpancis griseis subsericans; antennis, capite vix paulo longioribus, crassiusculis, fuscescentibus.

Thorax coleoptris vix paulo minor, longitudine vix paulo latior, antice obtusus, lateribus et basi rotundatus, niger, pilis confertioribus griseis sericans.

Coleoptra quadrata, nigra, pilis confertis griseis sericantia.

Abdomen nigrum, ventre toto et segmentorum marginibus dorsalibus pilis griseis vestitum.

Habitat Rostochii — *Karsten*.

Descripta est e collectione *Hellwigiana*.

28. *A. sericans* nitida, nigra; capite thoraceque subflavo-sericantibus, elytris antennisque fuscescentibus; pedibus piceo-rufescentibus.

Long.

Long. 2 lin.

Caput thorace duplo minus, orbiculatum, nigrum, pilis tenuissimis flauicantibus sericans; palpis antennisque rufo-fuscescentibus, his capitatis thoracisque longitudine.

Thorax suborbiculatus, niger, coleoptris minor, flauicanti-sericans.

Coleoptra quadrata, puncta, piceo-fuscescentia.

Abdomen nigrum, ano pallido.

Pedes piceo-testacei.

Habitat Blankenburgi — Knoch.

E collectione Knochiana.

29. *A. terminalis* nitida, nigra; antennis, palpis, pedibus et ano rufis; elytris fuscescentibus.

Long. 1½ lin.

Statura teretiuscula.

Caput thorace paulo minus; antennis, capite longioribus, crassiusculis.

Thorax nitidus, interdum subgrisescens, longitudine paulo latior, conuexus.

Coleoptra subtransuersa, nigricantia, subtilater puncta, minus nitida quam thorax, ad futuram fuscescentia.

Abdomen nigrum, vltimis duobus segmentis fuscis.

Vnicum huius speciei indiuiduum, quod examinaui, exstat in collectione *Sturmiana*.

30. *A. cinnamomea* M. 83.

31. *A. marginalis nigra*, nitida; antennis et thoracis marginibus lateralibus fuscescentibus; pedibus rufo-testaceis; elytris rufis, angulo apicis exteriore nigro.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Statura Al. praecedentis.

Caput paruum nigrum; ore rufo; antennis pallide fuscis, basi rufis.

Thorax niger, transuersus, lateribus rotundatis, margine laterali obsolete fuscescente.

Coleoptra confertim atque distincte puncta.

E collectione *Latreilleana*.

32. *A. flauipes*, nigra, nitida; elytris subopacis fuscescentibus; palpis, pedibus antennarumque basi testaceis.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput subglobosum, thorace duplo minus, nitidissimum, nigrum; antennis capite thoraceque vix breuioribus, fuscescentibus, articulis 3 primis rufis; palpis rufis.

Thorax nitidus, subtilissime punctus, transversus, apicem versus paulo angustatus.

Coleoptra opaca, subtilissime puncta, nigro-rufescentia, circa scutellum nigra.

Abdomen nigrum, nitidum; segmentorum marginibus anoque pallescentibus.

Pedes testacei.

Habitat Parisiis, in boletis.

E collectione Desmarestiana.

33. *A. aterrima* M. p. 85.

34. *A. nigritula* M. p. 85. — *De varietatibus intermediis huius speciei et Al. Boleti et fungi vide notam ad n. 24.*

35. *A. atra, nigra, subopaca; antennis pedibusque nigrofuscis; thorace quadrato, subcanaliculato.*

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Corpus nigrum, subopacum, subtilissime et confertissime punctum.

Caput thorace paulo minus; antennis gracilibus filiformibus, corporis dimidii longitudine, obscuro-fuscis; palpis fuscis.

Thorax quadratus, angulis obtusis; coleoptris minor; canalicula media longitudinali, saepe autem obsoleta, impressus.

Coleoptra quadrata.

Abdomen coleoptris triplo longius.

Pedes graciles, nigro-fusci, tarsis fuscis, femorum trochanteribus rufo-testaceis.

*Habitat Brunsnigae, in muscis, corticem salicum vestientibus, tempore verno — *Dahl.**

A. atra — Knoch.

36. *A. nigricollis* M. p. 84., habitat Brunswigae,
sub arundine putrescente, in paludosis — *Dahl.*
37. *A. fulgida*, nitida, rufa; capite thorace
pectoreque nigerrimis; thorace punctis im-
presso sparsis distinctioribus.

Long. $2\frac{1}{3}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus,
nitidissimum, nigerrimum, punctis aliquot
sparsis impressum; antennis, capitis thoracis-
que longitudine, palpisque rufis.

Thorax suborbiculatus, longitudine paulo
latrior, paulo angustior coleoptris; nigerrimus,
nitidissimus; punctis sparsis distinctis minori-
bus, unoque magno ante scutellum, impressus.

Colcoptra nitida, testaceo-rufa; punctis cras-
sioribus, haud confertissimis, impressa.

Abdomen rufum, ano fusco.

Pedes testacei.

Corpus totum pilosellum.

Habitat Parisiis.

E collectione *Bosciana*.

38. *A. alternans* M. p. 85.
39. *A. pygmaea* M. p. 86.
40. *A. obfuscata* M. p. 87.
41. *A. opaca* M. p. 89. — Varietatem 1. huius
speciei prehendi, primo vere, quamquam haud
frequens, in muscis ad arborum radices.
42. *A. umbrata* M. p. 90.

43. *A. collaris* M. p. 72. — Haec species nunc aptissime in duas species peculiares secernitur; quarum una *A. collaris*, altera *Aleochara pulchra* nuncupatur.

A. collaris nigra, nitida; thorace pedibusque rufo-testaceis; abdome rufum, ano nigro.

Long. 2 lin.

Caput nigrum, nitidissimum; palpis fuscis, apice pallidioribus; antennis fuscis, articulo primo et tribus ultimis rufis.

Thorax rufo-testaceus, nitidissimus; punctis subtilissimis sparsis, punctoque uno maiore satis distincto ante scutellum, impressus.

Coleoptra tota nigra, nitida, punctata, pilosella.

Abdomen rufum, nitidum; segmentis 2 ultimis nigris.

Pedes testacei.

Legi hanc speciem, tempore verno, in locis apricis, sub gramine.

Staph. collaris Payk. Mon. St. n. 56. — Faun. Suec. St. n. 43.

Staph. collaris Olivier Ent. St. n. 54. pl. II f. 13.

Hanc Aleocharam vidi in collectione *Bosciana* sub nomine *Staph. atricapillus* Fb.

44. *Al. pulchra* nitida, rufa; capite, elytrorum apice, abdominisque segmento antepenultimo vel duobus antepenultimis, nigris.

Long.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Haec species a praecedente non solum colore, sed etiam magnitudine minore, punctura subtiliore, antennis minus hirtis, punto thoracis antescutellari obsoletiore subsemilunari, differt.

Caput nigro-fuscum; ore testaceo; antennis fuscis, articulo primo et ultimo rufo-testaceis.

Thorax rufo-testaceus, punctus, puncto maiore antescutellari obsoletiore, subsemilunari ita ut eius conuexitas scutellum versus directa sit.

Elytra nigricantia; margine laterali et apicali, nec non macula quadrata humerali vel basi tota rufis.

Abdomen rufum, apice nigrum, segmento attamen ultimo rufo.

Pedes testacei.

Huius *Aleocharae* indiuiduum modo unicum ipse prehendi, et quidem in boleto; inter multa autem Microptera collectionis *Sturmiana* tria etiam huius speciei indiuidua erant, nullum autem *Aleocharae collaris*.

45. *A. prolixa* M. p. 71.

Var. minor.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput

Caput nitidum, nigrum, thorace paulo minus; antennis rufo-fuscis, basi rufo-testacea; ore rufo-testaceo.

Thorax orbiculatus, paulo minor coleoptris, nitidus, fuscus, marginibus pallidioribus.

Colcoptra quadrata, subtiliter puncta, nitida, rufa, circa scutellum et in apicis angulis nigra.

Abdomen rufo-fuscum, ano pallidiore.

Pedes rufo-testacei.

Habitat Brunsvigae — *Dahl.*

46. *A. cincta* rufa; capite, pectore, elytrorum macula, abdominisque segmentis penultimis nigricantibus.

Long. 2 lin.

Habitu Al. sequentis; statura autem paulo minore et graciliore, antennis paulo breuioribus, thorace minus orbiculato, colore pallidiore.

Corpus confertim punctum.

Caput nigrum; antennis fuscis, articulis 2 primis et ultimo rufescentibus; palpis rufescentibus.

Thorax suborbiculatus, angulis baseos paulo acutioribus quam in Al. sequente.

Elytra rufa, macula versus apicem transversali nigra.

Al. cincta — *Knoch.*

E collectione Knochiana.

47. *A. lucida* M. p. 70.

48. *A. limbata* M. p. 69. — Haec species colore et magnitudine variat; thorace autem subtransverso, subcanaliculato, interdum impressionibus sex obsoletis, quas hic accuratius describam, notato, a speciebus affinibus distingui potest; illae *impressions thoracis* sunt: linea media longitudinalis; puncta duo ad marginem apicalem, singulo inter lineam illam et angulum apicalem sita; punctum ante scutellum; et, in singulo baseos angulo, foueola arcuata. Omnes autem hae *impressions* valde obsoletae sunt, exceptis foueolis in angulis baseos, quae reliquis paulo distinctiores sunt.

Varietatem huius speciei, magnitudine egregia, long. 3 lin. *Aleocharae humerali* (n. 50.) statura, partium forma et colore valde affinem, Dom. *Dahl* prehendit sub foliis deciduis in montosis circa Brunsuigam, et mecum communicauit.

Varietatem alteram Dom. *Dahl* cum varietate praecedente iisdem locis legit. Haec ab illa differt non nisi magnitudine paulo minore et colore paulo obscuriore. — *Long.* $2\frac{1}{2}$ l. — *Caput* nigrum; antennis fuscis, basi rufescentibus; palpis rufo-fuscis. — *Coleoptra* nigra, subgriseo-fericantia macula humerali parua,
inter-

interdum subobsoleta, testacea. — *Abdomen*, (quod in varietate praecedente rufescens est, segmentis 4 intermediis nigricantibus) nigrum, subgriseo-sericans, marginibus segmentorum priorum rufescens. — *Pedes rufo-fusci*.

49. *A. funesta* nitida, nigra; palpis, antennis pedibusque fuscis.

Long. 2 — 2½ lin.

A varietatibus duobus praecedentibus *Al. limbatae*, haec species non solum colore sed etiam thorace conuexiore paulo minore et deficientibus impressionibus maioribus eius differt.

Caput thorace duplo minus, nigrum; antennis, longitudine fere dimidii corporis, fuscis, basi rufescens; palpis rufo-fuscis.

Thorax longitudine paulo latior, conuexior quam in *Al. praecedente* et sequente; subtilissime punctus, paulo minor coleoptris.

Coleoptra quadrata, subtilissime puncta, nigra, subgrisescens.

Abdomen nigrum, ventre ⁶ sugriseo-sericans, interdum fuscescens.

Habitat Brunsuigae, ad saepes, sub foliis deciduis, tempore vernali — *Dahl.*

Varietas intermedia inter *Al. limbata* et *Al. funestam*, nigra, nitida, antennis et pedibus fuscis; thorace punto antescutellari impresso.

Long. 2½ lin.

Habitu,

Habitu, nec non forma proportione et punctura partium, speciebus & praecedentibus similis; thorax autem latior et planior est quam in *Aleochar. funesta*, angustior autem et conuexior quam in *Al. limbata*; leuis, excepto punto ante scutellum, interdum obsoletiore, et vestigio obsoleto lineae longitudinalis.

Huius varietatis intermediae possideo duo individua, quae Dom. *Dahl* mecum communicauit.

50. *A. humeralis* M. p. 90. — An varietas maior *Al. limbatae* (n. 48.)?

FAMILIA IV.

51. *A. ruficornis* M. p. 91. variat etiam antennis fuscis, articulo primo rufo.

52. *A. leuis* M. p. 95.

53. *A. brevipennis* nitida, nigra; elytris subopacis, subrufescensibus: palpis pedibus rufescensibus.

Longitudine, statura et partium proportione *Al. sequentis*; *corpore autem haud ferrante, elytris crassius punctis etc. differt.*

Coleoptera elytris quadratis.

Pedes rufescentes, femoribus et femorum capitibus obscuris.

Habitat in Borussia — Hellwig.

54. *A. lugens* M. p. 95.

55. *A. moesta* M. p. 96. nigra, nitida; pedibus antennisque pallidioribus.

Long. $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{3}$ lin.

Statura medium tenet inter *A. praecedens* et *Al. fumata* (n. 64.); coleoptris crassius punctis ab vtraque differt.

Corpus nitidum, pilosellum, nec vero sericeum; punctum, punctis distinctis, nec vero confertissimis.

Caput antennis vel fuscis, vel ochraceis, vel articulis tantum 2 primis rufescens.

Coleoptra fusca vel picescentia.

Pedes fusti, tibiis tarsisque interdum rufescens.

Habitat etiam Parisiis — *Desmarest*.

56. *A. fuscipes* M. p. 92. — Haec species, si reuera *St. fuscipes* Payk. est, quod utique credo, etiam cum *St. fuscipede* Fabr. coniungi debet; auctor enim Monographiae Staphylinorum Sueciae fatetur pag. 55., se a Prof. Fabricio litteris certiore factum esse de identitate huius speciei cum *St. fuscipede*.

57. *A. lata* M. p. 186.

58. *A. bimaculata* M. p. 187.

59. *A. triflisis* nigra, nitida; pedibus fuscescens; elytris macula apicali sanguinolenta.

Long. $2\frac{1}{4}$ lin.

Haec

Haec Aleochara ab omnibus, cum quibus conferri possit, thorace minus conuexo, latitudine longitudinem duplo fere excedente, minus orbiculato, apicem versus angustiore, etc. differt.

Coleoptra puncta, elytris macula, angulum interiorem apicis versus, sanguinolenta.

Habitat Parisiis, semel modo capta.

60. *A. carniuora*, opaca, nigra; thorace nitido; antennarum articulo primo rufo.

Statura, magnitudine, nec non partium forma ac proportione Aleocharae sequentis maioris; statura autem paulo latiore, colore, antennisque differt.

Antennae graciliores quam assinibus Aleocharis huius familiae, capite thoraceque paulo longioribus, obscurō-fuscis, articulo primo rufescente.

Elytra subquadrata, subtilissime puncto-rugulosa.

Habitat in Borussia — *Hellwig.*

E collectione *Hellwigiana*.

61. *A. bipunctata* M. p. 95.

62. *A. lanuginosa* M. p. 94.

Var. intermediae inter hanc et sequentem speciem, elytrorum macula apicali testacea, rarius occurunt, Parisiis, in stercore bouino.

63. *A. nitida* M. p. 97. — Variat interdum thorace punctis duobus, magis minusue distinctis, ante scutellum impresso; elytrorum macula rarius suturam attingente. — Habitat Parisiis, in stercore bouino.

Staph. bipunctatus Olivier Ent. St. n. 43.
tab. V. f. 44.

Staph. bipustulatus Linn. Faun Suec. (1761.)
n. 847.

64. *A. fumata* M. p. 96. — Varietas huius speciei, elytris rufo-castaneis, marginibus baseos laterum et interdum etiam suturae nigricantibus, exstat in collectione *Sturmiana*, Norimbergae.

65. *A. pulla* M. p. 96.

66. *A. excusa*, ore producto, palpis longis; nigra, nitidula; elytris opacis; tarsis fuscis.

Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Haec species, statura quidem corporis, forma et proportione thoracis coleoptrorumque, Aleochararum plurimarum huius familiae; sed forma et proportione partium oris a conspeciebus huius familiae longe differt.

Caput orbiculatum, thorace quadruplo minus, leue, nitidum. *Antennae* filiformibus, capite thoraceque longioribus, nigro-fuscis. *Clypeo* semicirculari producto, nigro-fusco, minus nitido quam caput. *Labro* producto
inte-

integro, longitudine paulo latiore, duplo angustiore quam clypens, apicem versus angustiore, testaceo, margine subciliato, subnitido. Palpis anticis, longitudine dupli capitis, longioribus quam in cospeciebus; articulo secundo et tertio clauato-elongatis; quarto autem adeo breui et subtili ut vix oculo armato se ostendat. Maxillis testaceo-piceis. Labio exente in lacinias duas porrectas filiformes; palpis duobus gracilibus, longitudine laciniarum, his et illis testaceis.

Thorax nitidus, conuexus, longitudine duplo latior, apicem versus angustior.

Coleoptra transuersa, elytris fere quadratis, margine apicali sinuato, opaca, coriacea, subtilissime et confertissime puncta.

Abdomen coleoptris triplo longius, subopacum.

Pedes opaci, nigri, tarsis fuscescentibus.

Habitat Brunsluigae. Dom. *Dahl* indiuidua eius septem in prato, ad radices salicis, tempore hyberno, legit.

A. excusa — *Knoch.*

Illiger hanc speciem *Tachyporus praemorsus* nuncupabat. *Karsten* genus huius micropteri *Gymnusa*, speciem *sinuata* nominauit.

67. *A. dubia*, ore producto, palpis longis; nigro-fusca, subnitidula, tenuissime griseo-se-
ricans;

ricans; pedibus segmentorumque marginibus pallidioribus.

Long. 1 — $1\frac{1}{3}$ lin.

Caput perparuum, obscurum; antennis filiformibus, capitis thoracisque longitudine, fuscis; labro producto testaceo; palpis anticis longioribus fuscis, triarticulatis, (articulo quarto, aliis Aleocharis tenuissimo, deficiente), pollicis gracilibus testaceis.

Thorax longitudine duplo fere latior, apicem versus angustatus gibbulus.

Coleoptra elytris latitudine paulo longioribus, subquadratis.

Abdomen apicem versus angustatum, pilosellum (vt in Tachyporis), obscurum, marginibus segmentorum ultimorum subpallidioribus.

Pedes testacei, femoribus basi fuscescentibus.

Habitat Brunswigae — *Dahl.*

Al. dubia — *Knoch.*

68. *A. minuta*, ore producto, palpis longioribus; subopaca, griseo-fusca, tarsis testaceis.

Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{4}{5}$ lin.

Ab *Al. praecedente*, thorace minus gibbulo, nitore pauciore, colore et magnitudine differt.

Caput obscuro-griseo-fuscum; antennis, extrosum paulo crassioribus; capitis thoracisque longitudine, fuscis; labro producto testaceo;

ceo; palpis anterioribus longioribus, 3 articulatis, fuscis.

Thorax transuersus, coleoptrorum magnitudine, apicem versus minus angustatus quam in specie praecedente.

Coleoptra elytris quadratis.

Abdomen nigro-fuscum, minus pilosum quam in specie praecedente.

Pedes fusi, tarsis geniculisque testaceis.

69. *A. morion* M. p. 97.

Varietas subopaca, tarsis tibiisque fuscescentibus, habitat Parisiis — Desmarest.

Varietas capite thorace et coleoptris subgriseofuscescentibus, habitat Norimbergae — Sturm.

70. *A. pumilio* M. p. 93.

71. *A. pusillima* nitida, nigra; coleoptris fuscescentibus; antennis pedibusque rufescentibus.

Long. $\frac{1}{3}$ lin.

Statura partiumque forma et proportione omnino Al. praecedentis; sed differt magnitudine fere duplo minore, nitore splendidiore, coleoptris leuibus impunctis (quae illi, oculo armato examinata, puncta sunt), margine apicis integro.

*Caput antennis apicem versus valde incrassatis, ut in *Al. pumilione*, fuscis, basi testaceis; palpis testaceis.*

Abdomen ano pallescente.

Habi-

Habitat Brunsuigae, tempore vernali, ad ripas — *Dahl.*

FAMILIA V.

72. *A. nana* M. p. 98.
73. *A. polita* M. p. 99.

FAMILIA VI.

74. *A. depressa* M. p. 100.

Varietatem fuscam; thoracis coleoptrorumque lateribus paulo pallidioribus; abdominis segmento primo rufescente; pedibus testaceis; capite atro, antennarum fuscarum articulis 3 primis palpisque rufo-testaceis; long. 1 $\frac{2}{3}$ lin. — Dom. *Dahl.* Brunsuigae cepit, et mecum sub nomine *Al. commoda* Kn. communicauit.

*Varietas altera, coleoptris nigro-fuscis, in collectione Bosciana mihi sub nomine *Staph. tenuis* Fabr. occurrit. — Eandem varietatem autem, abdome rufescente, segmentis duobus mediis fuscis, Dom. *Dahl* mecum sub nomine *Al. fulua* Kn. communicauit. His *Al. fuluis* Kn. thorax minus depresso est, quam reliquis, quo haec familia cum familia tertia nectitur. Dom. *Dahl* legit hanc var. Brunsuigae, tempore aestiuo, in locis arundinaceis.*

75. *A. graminicola* depressiuscula, nigra, nitida; antennis, palpis, pedibusque fuscescentibus.

Long.

Long. $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Statura depressa nec non forma ac proportione partium *Al. depressae* (n. 74.) adeo est affinis, vt, nisi differentia coloris adhuc obstatet, nullo modo haesitarem, hanc speciem pro varietate *Al. depressae* declarare. — Quaedam indiuidua, corpore minus depresso et magis conuexo, transitum in familiam III., cuius speciebus confinia sunt reliqnis characteribus, euidentissime demonstrant.

Habitat Brunsuigae, lecta in syluis, ad culmos graminum — *Dahl.*

A. graminicola — *Knoch.*

76. *A. deplanata* M. p. 100. nigra, nitida; coleoptris piceo-fuscis; palpis pedibusque testaceis.

Caput antennis fuscis, capite paulo longioribus, articulo primo clauato, secundo minore, tertio et quarto minimis, sequentibus multo crassioribus.

Thorax longitudine duplo fere latior, coleoptris multo breuior, sed eorum latitudine; canaliculis longitudinalibus parallelis tribus obsoletis impressus, media integra, lateralibus abbreviatis, a basi thoracis vsque ad eius medium ductis.

Coleoptra quadrata, sutura profunda.

GENVS VII.

LOMECHVS A.

Microptera quae ad hoc genus censemur, quibusdam characteribus cum *Aleocharis* cognata sunt; toto attamen charactere externo, praecipue in forma thoracis expresso, ab eis differunt. *Thorax* nempe marginatus est, marginibus latis eleuatis vel ascendentibus; disco conuexiusculo, sulco longitudinali medio, interdum obsoletiore, canaliculato. *Abdomen* crassius est, quam in vlla *Aleochararum* specie.

Characteres, omnibus huius generis speciebus communes, sunt

Corpus crassum, marginatum.

Caput thorace circiter triplo minus; fronte planiuscula, saepius rugulosa. *Palpis* acuminatis. *Antennis* articulo primo crasso, cylindrico, rarius clauato; secundo breui, clavato; tertio paulo longiore clauato; sequentibus pateraeformibus: ultimo ouato, acuto.

Thorax transuersus; marginibus lateralibus eleuatis; disco conuexiusculo canaliculato; angulis baseos acutis.

Coleoptra transuersa; elytris subquadratis; angulo apicis exteriore acuto.

Abdo-

Abdomen crassum, marginatum, apice plerumque subresupinatum; segmento penultimo plerumque appendiculis lateralibus aucto.

Pedes graciles, cursorii, nudi.

1. *L. strumosa* M. p. 91. — *Aleochara strumosa*.

Caput antennis extrorsum gracilioribus.

Delendum est in M. p. 92. Synonymum *Staph. emarginatus* Payk. quod ad speciem sequentem refertur.

2. *L. emarginata*: antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus; nitidula, fusca, coleoptris pallidioribus.

Long. $1\frac{2}{3}$ — 2 lin.

Statura minore et antennis extrorsum haud gracilioribus a *L. strumosa* differt; thorace paulo longiore, apicem versus paulo angustiore, a *L. paradoxa*; multisque aliis characteribus a *L. dentata*.

Caput, fronte rugulosa, nigro-fuscum; antennis, capitis thoracis elytrorumque longitudine, filiformibus, rufo-fuscescentibus, subsericantibus, articulo ultimo elongato nitido; ore rufescente.

Thorax, coleoptris paulo minor, longitudine paulo latior; subtilissime et confertissime punctus, obsolete canaliculatus; angulis apicis obtusis, baseos productis acutis; fuscus, marginibus lateralibus eleuatis pallidioribus.

Coleoptra transuersa, elytris quadratis; rufo-castanea, subsericantia, angulis apicis subacutis.

Abdomen crassum, coleoptris triplo longius, fuscum, segmentorum marginibus pallidioribus; segmento penultimo laminis duabus lateralibns, paruis, triangularibus, margine ciliatis, exsertis, aucto; ventre pilosello, pilis distinctis, nec vero confertissimis.

Pedes obscuro-rufi, nitidi.

Habitat Brunsuigae, vnde Dom. *Dahl* eam mecum communicauit, et in Suecia, vnde Dom. *de Gyllenhall* specimina huius speciei plura Domino *Sturm* misit, qui eam mecum communicanit.

Staph. emarginatus *Fabr.* *Ent. Syst. St. n. 46.*

— — — *Payk. Mon. Staph. n. 56.* —

Faun. Suec. Staph. n. 44.

3. *L. paradoxa*, antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus; rufo-fusca, coleoptris pallidioribus, capite fusco.

Long. fere 2 lin.

Allinis speciei praecedenti, differt autem antennis et articulo earum ultimo paulo brevioribus; thorace latiore et breviore, nulloque modo puncto, nec apicem versus angustato, sed angulis apicis solunimodo rotundato-obtusis. Reliqua omnia, praeter colorem

rem paulo pallidiorem, cum descriptione *L. emarginatae* quadrant.

Habitat Parisis, vnde eam retuli, sub lapidibus, teste Olivier.

Staph. emarginatus Olivier Ent. St. n. 44. tab. II. f. 12.

4. *L. dentata* antennis extrorsum crassioribus, capitis thoracisque longitudine; nigra, thoracis lateribus et elytris brunneis, his angulo apicis exteriore acutissimo.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Haec *Lomechusa* a cospeciebus satis differt, imprimis thorace latiore, lateribus rotundiore, marginibus minus eleuatis, punctura crassiore; angulo apicis exteriore elytrorum acutiore dentiformi; abdominis segmento penultimo simplici.

Caput nigrum, opacum, subtilissime punctum; fronte planiuscula, haud rugulosa; antennis, capitis thoracisque longitudine, extrorsum crassioribus, validis, fuscis, articulo primo clauato rufo; mandibulis rufis.

Thorax longitudine duplo latior, coleoptris vix paulo minor, apice angustior; punctus; niger, lateribus nigro-brunneis; canaliculatus; marginibus subelevatis; angulis baseos acutis.

Coleoptra transuersa; elytris quadratis, obscuro-castaneis, punctis; margine apicali, angulum

gulum exteriorem versus, emarginato, ita vt
angulus exterior ipse in dentem acutum ex-
currat.

Abdomen nigrum, nitidum, ano pallescente.

Pedes fuscescentes.

Habitat prope Kaiserslautern, vnde Dom.
Professori Hellwig missa est — et in Suecia,
vnde Dom. de Gyllenhall hanc speciem, sub
nomine *Staph. strumosus* Payk., Domino
Sturm misit, qui eam mecum communicauit.

Staph. strumosus Payk. Faun. Suec. Staph.
n. 45.

GENVS VIII.

OXYTELVS.

Genus, corpore depresso-sculo (rarius tere-tiusculo), antennis extrosum crassioribus, thorace sulcato, abdome latiusculo obtuso marginato, palpis acuminatis (excepto attamen *Ox. latipede*, cui palpi filiformes sunt), bene distinctum. Pedes fossorii; tibiis, praecipue anticis, validis, latioribus quam in vlo alio cogenere, spinoso-ciliatis, huic generi proprii sunt: Speciebus quidem minoribus (e. g. *O. temui*, *pedicello*, *fuliginoso*) tibiae minus validae sunt, quo *Aleocharis* adpropinquuntur; tibiis attamen, caeteris paribus, semper validioribus quam in *Aleocharis*, et thorace semper sulcato vel foveolato (sulcis interdum obsoletioribus), distingui possunt. — Genus aliud, cum quo quaedam Oxytelorum species, e. g. *O. carinatus*, *piccus* etc., primo intuitu, aliquam similitudinem habere videntur, sunt *Omalia*, et quidem illa eorum, quibus thorax sulcatus est; sed forma thoracis et eius sulcorum, coleoptra longa, abdomen latius, sunt characteres sufficietes, quibus haec *Omalia*, ipsiusunque *Om. rugosum*, quod habitu Oxytelis magis simile est, quam vlla alia huius generis species, ab Oxytelis differunt, nulla tibiarum

biarum graciliorum et palporum semper filiformium habita ratione. — Genus nouum exoticum, *Piestus* scilicet, corpore depresso, abdome obtusiusculo, thorace sulcato, coleoptris quadratis, tibiis breuibus validis spinoso-ciliatis, cum hoc genere iungendum foret, nisi antennae palpique filiformes, nec non vitae genus atque victus et habitatio disuaderent.

Oxyteli commode in tres familias distribui possunt: *Familia I.* comprehendit species thorace rugoso-sulcato, sulcis vel profundis et distinctis vel obsoletioribus. — *Familia II.* Oxytelos complectitur thorace subleui nitido, sulco medio longitudinali inciso. — *Familia III.* Oxytelos statura paulo graciliore et teretiore quam in familis praecedentibus; thorace puncto, medio vel laeui vel sulco longitudinali angusto inciso. Haec familia, iam habitu toto a reliquis Oxytelis diversa, speciem quoque continet, quae, palpis filiformibus, nec acuminatis vti in reliquis Oxytelis; thorace puncto, medio leui, nec sulcato; elytris punctis, interdum subpunctostriatis, saltem in systemate strenue artificiali nonum genus conderet. Cum autem hic *O. latipes* statura sit *O. tricornis*, et tibiis latis, vti reliqui Oxyteli maiores, hanc speciem cum reliquis huius familiae speciebus coniungere malui, quam eam in peculiare genus redigere.

FAMILIA I.

Corpus planiusculum lineare.

Caput thoracis circiter magnitudine vel paucio minus; punctum vel cicatricosum; plerumque lineis duabus longitudinalibus, obsoletis, interdum omnino fere evanescientibus, impressum. Oculis profilientibus. Palpis acuminatis. Antennis articulo 1 longiore subclauato; 2 breui clauato; 3 paruo; sequentibus pateraeformibus, crescentibus; ultimo suborbiculato, latitudine paulo longiore, apice acuto.

Thorax transuersus, coleoptris minor, punctus vel cicatricosus, sulcis longitudinalibus, latioribus, nec vero profundis, impressus.

Coleoptra plerumque subquadrata, puncta vel cicatricosa; linea prope suturam, alteraque ab humeris versus medium elytri descendente plerumque impressa.

Abdomen lineare, marginatum.

Pedes femoribus compressiusculis nudis; tibiis compressis, latiusculis, margine exteriore (in speciebus maioribus) spinoso-ciliato, ante apicem praemorso.

1. *O. fuliginosus* M. p. 102.

2. *O. pedicellus* M. p. 102.

3. *O. depresso* M. p. 103. Huc autem non referendi sunt *Staphylinus depresso* Olivieri, cui thorax

thorax est canaliculatus, canalicula subobsoleta, elytra quadrata; nec *Staph. depresso* Payk. Mon. St. n. 49. et Faun. Suec. St. n. 58, cui thorax sulco unico, minime profundo, impressus est. Hic *Staph. depresso* Olivieri et Payk. habitat in succo betulae excisae, et probabiliter ad genus *Omalium* pertinet.

Verum *Ox. depresso*, vna cum specie sequente, in collectione *Bosciana* vidi sub nomine *Staph. minutus* Olivieri. Huius autem descriptio et delineatio in *Olivieri Ent. St.* n. 56., tab. VI. f. 53., nullo modo ad hos *Oxytelos* quadrat, optime autem ad *Omalium striatum*.

Thorax subtransuersus, subtilissime et confertillime punctus, coleoptris minor, angulis apicis obtusiusculis, sulcis planiusculis.

Color niger opacus, statura parua, punctura conferta, subtilis, vix oculo armato conspicua, fulci thoracis planiores etc. hanc speciem satis a cospeciebus distinguunt.

4. *O. nitidulus* M. p. 107.

Capite variat maiore et minore. — *Coleoptera* quibusdam latitudine paulo longiora, quibusdam longitudine paulo latiora esse videntur.

Distinguitur a specie sequente statura multo minore.

Confer

Confer quae de *O. nitidulo* sub specie praecedente monui.

5. *O. carinatus* M. p. 106.

Varietatum huius Oxyteli, loco citato descriptarum, plures a D. Prof. Knoch pro speciebus peculiaribus habentur, quarum nomina specialia, cum diagnosibus et descriptionibus, hic addam:

- a) *O. carinatus*, thorace transuerso, crasse puncto, coleoptris paulo minore; angulis apicis subacutis; sulco medio apice lato, basin versus sensim desinente; fulcis duobus adiacentibus basi latioribus, apicem versus angustatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ lin.

Color variat: Plerumque niger est; antennis pedibusque fuscis; interdum antennarum articulo primo pedibusque rufis; elytris etiam rufo-fuscescentibus; rarius elytris rufo-testaceis, basi nigricantibus, thorace rufescente (huc pertinet *O. pulcher* M. p. 107.)

- b) *O. sculpturatus*, thorace transuerso, cicatriculose puncto, coleoptris paulo minore; angulis apicis subacutis; sulco medio apice latiore, basin versus angustato; fulcis duobus adiacentibus basi vix paulo latioribus.

Long. $1\frac{1}{3}$ — 2 lin.

Color niger; pedibus rufescentibus; elytris interdum fuscescentibus.

Thorax

Thorax confertim cicatriculosus, cicatriculis longitudinalibus.

Varietatem O. sculpturati Dom. Sturm mecum communicauit, longitudine vix 1 lin. excedente, subnitidulam, punctura subtilissima.

c) *O. inustus*, fulcis, atque punctis thoracis ut in praecedente; mandibulis autem validis.

Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Ab *Oxytelis* praecedentibus imprimis differt capite laeui, hand cicatriculose puncto, mandibulis validioribus, thorace conuexiore, fulcis minus profundis.

Caput thoracis magnitudine, laeuinsulum, nigrum; antennis nigro-fuscis, capite longioribus; mandibulis validis rufis.

Thorax coleoptris vix paulo minor, convexiusculus, basin rotundatam versus subangustatus.

Coleoptra quadrata, cicatriculofo-puncta, nigro-fuscescentia.

Pedes testacei, femoribus obscurioribus.

Huius *Oxyteli* specimen modo unicum existat in collectione *Knochiana*.

d) *O. insignitus*, thorace transuerso, cicatriculofo, coleoptris paulo minore; angulis apicis acutis; fulcis dorsalibus vbique eiusdem latitudinis, medio forsan in medio paulo angustiore quam basi et apice.

Long.

Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Caput magnum, thoracis magnitudine, subtiliter cicatriculosum, nigrum; antennis fuscis, basi rufescente; mandibulis et palpis rufo-testaceis, longioribus quam in reliquis *Oxytelis*.

Thorax niger.

Coleoptera picescentia, cicatriculosa.

Pedes testacei.

Huius etiam *Oxyteli*, qui in America septentrionali habitat, specimen modo vnicum in collectione *Knochiana* vidi.

e) *O. infecatus*, thorace subtransuerso, cicatriculoso, coleoptrorum magnitudine; angulis apicis subacutis; fulcis et cicatriculis ut in *O. sculpturato*, a quo autem differt colore, statura graciliore, thorace angustiore, coleoptris quadratis, quae illi transuersa sunt.

Long. 2 lin.

Color niger, palpis pedibus elytrisque pallidis.

Nondum diiudicare audeo, an *Oxyteli*, sub hoc numero descripti, re vera species sint genuinae; an species sint quidam intermediae seu spuriae, e copula specierum duarum genuinarum ortae; an merae varietates. Observationibus egemus accuratioribus et pluribus, quo dubia nostra dissipentur. Plurimi horum *Oxytelorum* rarissime occurunt; *O. carina-*

carinatus et *sculpturatus* frequentissime. Characteres praecipui, quibus *O. carinatus* ab *O. sculpturato* distingui potest, de thorace, puncto illius, cicatriculoso alterius, nec non de sulco medio, apicem versus prorsum definente illius, angustato solummodo alterius, defumti sunt. Hi characteres, si omnibus individuis satis distincti essent, sufficerent ad distinguendam vtramque speciem; sed hic haeret aqua; Sulcus angustatus, cum paulo magis adhuc angustatur, tandem definit; punctum, si paulo comprimitur, cicatriculae simile sit, haec autem, si paulo contrahitur, puncto. Et re vera mihi sunt specimina, quibus iam initium huius commutationis appareat, quamquam nondum omnino transiunt. — Thoracis forma dependet a magnitudine capitis: Capite magno, thorax necessario apice latior esse debet, ad illud recipiendum. Hac vero dilatatione partis anterioris thoracis angulos eius anteriores acutiores sieri oportet. Inde in una eademque specie, cuius individua capite variant maiore et minore, thoracis anguli anteriores acutiores et obtusiores esse possunt, quod praecipue in *O. piceo* obseruauit.

6. *O. piceus* M. p. 105. — thorace transuerso, puncto, coleoptris minore angulis apicis subobtu-

obtusis; sulcis dorsalibus ubique eiusdem latitudinis.

Long. $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

Color niger; ore, antennarum basi, pedibus et elytris testaceis, his interdum piceo-testaceis.

Ne ratione quidem habita coloris, qui at-tamen huic speciei constantior esse videtur, *O. piceus* ab *O. carinato* forma sulcorum, im-primis sulci medii, ab *O. sculpturato*, *imusto* et *infuscato*, non solum forma sulcorum, sed etiam punctura thoracis, ab *O. insignito* pro-portione partium et punctura thoracis dis-tingui potest.

Huic Oxytelo aliis affinis est, quam D. Prof. *Knoch* *O. sculptus* nuncupauit. Differt thorace lateribus subrotundatis, basin versus paulo angustiore, coleoptris breuiore et paulo an-gustiore, fusco seu rufo; coleoptris quadra-tis, rufescentibus seu piceo-testaceis; abdo-mine fusco vel piceo-rufo. Habitat in Ger-mania et in America septentrionali.

7. *O. caelatus* M. p. 103.

Varietas huius speciei occurrit nigra, thorace antennisque fuscis, pedibus ore elytrisque testaceis.

Thorax huius Oxyteli haud quadrifoueo-latus nominari potest, foueae enim laterales obsoletissimae esse solent, et, cum minus ob-soletae

soletae sunt, attamen sub specie impressionum leuum tantummodo se praebent.

Quaedam de hoc Oxytelo et de varietatibus intermediis sub specie sequente adhuc monebo.

8. *O. corticinus* niger, nitidulus; antennis pedibusque fuscis; thorace suborbiculato, opaco, foueis duabus subobsoletis.

Long. 1 lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, opacum, nigrum; ore antennisque fuscescen-tibus, his capite duplo longioribus.

Thorax suborbiculatus, vix longitudine paulo latior, basin versus sensim subangustatus, coleoptris paulo minor; foueis duabus disci subparallelis longitudinalibus, nec basin nec apicem thoracis attingentibus, basi au-tem paulo distinctioribus, impressus; niger, subopacus.

Coleoptra quadrata, puncta, nigro-fusca, nitidula, interdum subgriseo-sericantia.

Abdomen elongatum, elytris quadruplo lon-gius, nigrum, nitidulum, subgriseo-sericans.

Pedes fusci, apicibus tibiarum tarfisque pallidioribus.

Hic *Oxytelus* differt a specie praecedente, statura minore et graciliore; punctura sub-tiliore, punctis thoracis laterum, quae illi distin-

distincta sunt, deficientibus; foveis thoracis haud arcuatis sed fere parallelis rectis; colore obscuriore elytrorum et pedum.

Habitat in Borussia et in Germania passim. Quaedam specimina prehendi vere primo, in locis apricis, sub lapidibus.

Sunt nonnulla Oxytelorum specimina, quae medium tenere videntur inter *O. caelatum* et *corticinum*.

a) *O. thorace bifoveolato*; nigricans, nitidulus; elytris fusco-piceis; basi antennarum, palpis et pedibus testaceis.

Statura minore et graciliore quam *O. caelatus*, paulo tamen maiore et crassiore quam *O. corticinus*.

Thorax foveis haud quidem arcuatis, apice attamen paululum distantibus, et distinctioribus quam in *O. corticino*.

Punctura thoracis elytrorumque subtilis est ut in *O. corticino*.

Coleoptera latitudine paulo longiora.

Hic *Oxytelus*, unicus in mea collectione, idem est, cuius iam mentionem feci M. p. 104. sub var. 4. *O. caelati*.

b) *O. thorace punto antecollari et foveis duabus impresso*; niger, nitidulus, antennis pedibusque pallidioribus.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

N

Statura

Statura intermedia inter Ox. caelatum et corticinum.

Caput nigrum, palpis et antennarum basi testaceo-rufis.

Thorax foueis duabus longitudinalibus, vix paululum arcuatis, apice attamen magis distantibus, punctoque distincto (qui interdum etiam in *O. caelato* obsoletissime adeli) supra apices fouearum, nec non impressione laterali distincta impressus.

Coleoptra latitudine paulo longiora; linea longitudinali humerali distinctiore quam in *O. corticino* impressa.

Punctura thoracis et elytrorum subtilis est.

Pedes rufi, femoribus interdum obscurioribus.

Huius Oxyteli specimina duo Dom. Sturm benevolenter mecum communicauit. — Forsan species est peculiaris, cum, thoracis punto antecollari et impressione laterali distinctis, non tam medium tenet inter *O. caelatum* et *corticinum*, quam ab utroque differt.

FAMILIA II.

Corpus planiusculum lineare.

Caput thoracis magnitudine vel paulo minus, impressione inter antennas excauatum; palpis et antennis vt in familia prima.

Thorax

Thorax transuersus, apice truncatus, lateribus et basi rotundatus; coleoptrorum magnitudine; punctis cicatriculosis magis minusue impressus; linea longitudinali medio canaliculatus.

Coleoptra quadrata, cicatricoso-puncta.

Abdomen marginatum, lineare.

Pedes vt in familia praecedente, tibiis anticus autem margine exteriore ante apicem excisso.

9. *O. morsitans* M. p. 103.

10. *O. cornutus* M. p. 109.

Haec species capite quidem bispino ab *O. morsitante* satis differt; quaeritur autem, an non haec cornua differentiam solummodo sexualem respiciant, quod vtique analogiae respondet, cum in multis aliis coleopterorum speciebus, praecipue *Geotrupum*, *Copridum* nec non in *O. tricorni* haec differentia sexualis indubitate sit. *O. cornutus* multo quidem rarior occurrit quam *O. morsitans*, nec eum vñquam prehendi, licet hic vulgatissimus sit; sed *Copridis Taurus* mas quoque multo rarer est quam femina, quae frequens in fimo habitat.

FAMILIA III.

Corpus teretiusculum, lineare.

N 2

Caput

Caput thorace paulo minus, puncto-cicatricosum; tuberculo inter antennas subelevato; palpis plerumque acuminatis (in *O. latipede* filiformibus); antennis, articulo primo longiore, subclauato, secundo breui clauato, tertio tenui, sequentibus crescentibus pateraeformibus, ultimo suborbiculato, latitudine paulo longiore, apice acuto.

Thorax conuexiusculus; subquadratus, angulis rotundatis; coleoptris minor; puncto-cicatricosus; linea media longitudinali plerumque canaliculatus.

Coleoptra conuexiuscula, quadrata, puncta seu puncto-cicatricosa.

Abdomen lineare, conuexiusculum, marginatum.

Pedes femoribus compressiusculis, nudis; tibiis compressis, latiusculis, margine exteriore spinoso-ciliato; tarsis gracilibus, articulis 4 transuersis, quinto elongato subclauato.

11. *O. tricornis* M. p. 109.

Oxytelos, loco citato sub hac specie conjunctos, Dom. Prof. *Knoch* in duas species peculiares seiungendos esse putat. Individuis scilicet maioribus, thorace scabro, punctis crassis subcicatriculosis; longitudine 5 linearum, nomen remanet *O. tricornis*. Minores autem, thorace conuexiore subtiliusque puncto;

cto; punctura quoque elytrorum subtiliore; longitudine $1\frac{1}{2}$ linearum; seu verum *Staph. armatum* Panz. Dom. Prof. Knoch pro specie peculiari declarat. Mihi autem sunt specimenina, quae, omnibus datis characteribus, medium tenent inter *O. tricornem* et *armatum*, et ambas species coniungunt. Omnibus est caput in medio frontis subtuberculatum; e singulis thoracis punctis pilis nascentur singuli breves tenues fului, qui, cum thorax ita inspicitur, ut basis eius faciem inspicientis versus directa sit, colorem efficiunt fulvo-sericantem; hic color sericeus in specie minore autem distinctior est, quam in specie maiore.

Dom. Dahl prehendit *O. armatum* tempore verno, sub foliis deciduis, in sylvis.

12. *O. pallipes* nitidulus, punctus, niger; ore pedibusque testaceis; thorace subunisulcato.

Long. 2 lin.

Habitu, statura, partiumque forma proportione et punctura omnino cum speciminibus intermediis inter *O. tricornem* et *armatum* congruit; colore autem semper differt.

Caput et *thorax* individuum omnium, quotquot eorum vidi, inermes erant.

Femora interdum fuscescunt.

Habi-

Habitat in Gallia et Germania. Dom. Dom. Desmarest, Sturm et Dahl hanc speciem mecum communicauerunt. Dom. Dahl legit specimina plura Brunsvigae, in gramine ad fossas.

Quamvis autem omnia quae vidi specimina ad unam eandemque speciem referenda sint, attamen quasdam obseruo differentias inter *O. pallipedem germanicum* et *O. pallipedem gallicum*: Illi thorax nempe paulo conuexior, punctura paulo subtilior est, punctis elytrorum adhuc quidem distinctis, thoracis autem subtilissimis; sulca thoracis quibusdam individuis obsoleta est, quibusdam omnino extincta, eiusque loco linea nitida obsoleta superest. Obseruo etiam in *O. pallipede gallico* puncta duo maiora in disco thoracis, quae germanico vel omnino defunt, vel, et quidem speciminibus illis, quibus sulca longitudinalis thoracis omnino deest, obsoleta sunt.

13. *O. latipes* palpis filiformibus, haud acuminate; thorace postice truncato.

Long. $2\frac{1}{3}$ lin.

Corpus nitidum, fere cylindricum.

Caput suborbiculatum, thoracis magnitudine, nigrum, punctum, ad basin leuius. Oculis paruis lateralibus. *Labio* palpisque rufis. *Antennis* capite longioribus, pilosellis, rufis; articulo primo clauato longiore; secundo

undo paulo tenuiore et breuiore; 4 sequentibus minimis, campanulatis, crescentibus; 7 — 10 maioribus campanulatis; ultimo suborbiculato.

Thorax obscuro-fuscus; latitudine et longitudine coleoptrorum; conuexus, basin versus sensim paulo attenuatus; punctus, punctis dorsalibus in series duas dispositis, ora laterali apicem versus angustata.

Scutellum paruum, triquetrum, obscuro-fuscum.

Coleoptra subquadrata, obscuro-fusca; puncta, punctis interdum in series subdispositis.

Abdomen nigrum, subpunctatum, subpilosellum, crassum, cylindricum, segmento quinto reliquis longiore.

Pedes fossorii, rufi. Capitibus femorum aequalibus. Femoribus compressis. Tibiis fossoriis dilatatis, compressis; margine infero recto vel subconcauo, exteriore conuexo, ciliis rigidis fimbriato. Tarsis gracilibus.

Habitat in America septentrionali. Exstat in collectione Knochiana.

Cum hoc insectum palpis instructum sit filiformibus, antennis extrorsum crassioribus, thorace immarginato basi truncato, Tachinis adnumerandum foret, si solos characteres artificiales, M. p. 134. datos, respiceremus.

Habi-

Habitu autem toto et, exceptis vltimis palporum articulis, partibus etiam singulis cum Oxytelis huins familiae plane congruit. Certo systematis naturalis nullam haberemus rationem, cum hoc micropteron Tachinis adiungeremus. Oxytelis autem, sicut huc usque determinati erant, ob characteres per sistema artificiale constitutos, haud adsociari potest. Eodem ergo iure, quo Altrapaei genus olim a Staphylinis disiungebatur, quibus attamen simillimum est, hoc etiam insectum genus nouum, ab Oxytelis separatum, conderet, nisi regula systematis naturalis, i. e. character totus externus seu habitus totus, disuaderet.

GENVS IX.

EVAESTHETVS.

Micropteron, e quo cel. *Knoch* nouum genus, sub nomine *Euaesthetus*, condidit, debemus Dom. *Dahl*, infectorum felici et indefesso indagatore, qui hoc insectum primo Brunsvigae legit. Hoc genus, ratione statura et thoracis sulcati, aliquam prodit affinitatem cum *Oxytelis*; accuratius autem et oculo bene armato examinatum, plures praebet characteres, quibus satis ab illis differt, imprimis fabrica peculiari *palporum* et *antennarum*.

Statura paulo crassior est et conuexior quam *Oxytelis*.

Caput thorace paulo minus, punctis scabrum. *Antennis* capite paulo longioribus, extrorsum crassioribus; articulo primo clavato, secundo perbreui, tertio longiore et validiore quam secundus, 4-8 minutis subtransuersis, 9 et 10 multo crassioribus transuersis, ultimo omnium crassissimo, ouato, apice acuminato. *Clypeo* lato integro. *Mandibulis* falcatis. *Palpis* anterioribus capit is longitudine, triarticulatis; articulo primo clavato; secundo multo breuiore et angustiore quam primus; tertio ouato, reliquis crassiore, subacuminato.

(Hoc

(Hoc acumen vix oculis optime armatis distinguere potui et dubius adhuc haereo, an acumen illud articulus sit peculiaris an non). Oculis profilientibus lateralibus ad basin capitis.

Thorax latitudine longitudinis, basin versus angustatus; coleoptrorum longitudine, sed duplo fere angustior; punctus; bifoueolatus, foueis disci oblongo-ouatis, apicem versus angustioribus.

Coleoptra transuersa, elytris fere quadratis; puncta, circa scutellum impressa.

Abdomen crassiusculum, marginatum.

Pedes tibiis haud spinosis; articulis tarso-rum paruis.

1. *E. scaber* fuscus, nitidus; capite rufo, antennis palpis et mandibulis pallidioribus; pedibus fusco-rufis.

Long. $\frac{2}{3}$ lin.

Caput rufum; antennis rufo-testaceis, articulo ultimo fusco; mandibulis et palpis testaceis.

Abdomen elytris triplo fere longius, nigro-fuscum.

Habitat Brunsuigae — *Dahl.*

Euaesthetus scaber — *Knoch.*

GENVS X.

OMALIVM.

Hoc genus, habitu depresso-sculo, coleoptris thorace longioribus, saepius abdominis maximum partem tegentibus, thorace transuerso, dignoscitur. — Comparationem huins generis cum *Oxytelis* vide supra, vbi de *Oxytelis* differui. — Praeter coleoptra longa et habitacionem species huins generis pauca tantum communia cum *Anthophagis* habent. Palpi quidem et pedes insectis vtriusque generis similes sunt, habitus vero totus dissimilis: *Anthophagis* nempe sunt coleoptra thorace multo latiora; hic subquadratus, basin versus angustior; antennae filiformes. — Sicut vero in familia prima Tachypororum transitus se ostendit in aliud Coleoptrorum genus, quod non Micropteris adnumeratum est, sic etiam in hoc genere: Quaedam species *Omaliorum* e familia secunda, e. g. *O. pallidum* et *ophthalmicum*, cum genere *Kateretes* (Herbstii) affines esse videntur, ratione habita habitus totius externi, imprimis thoracis transuersi et coleoptrorum longitudinis; sed Kateretibus sunt antennarum articuli tres ultimi reliquis multo crassiores, thorax immarginatus, et tarsi quadriarticulati (haud triar-

triarticulati, vti in *Herbstii Systematis Coleopterorum* Tom. IV. pag. 11. tab. I. dictum et delineatum est. Omaliis autem antennae quidem extrorsum crassiores sunt, sed articuli 4 ad 11 sensim crescunt; thorax lateribus est marginatus; tarsi quinquearticulati, vt omnibus coleopteris micropteris.

Omalia, secundum longitudinem elytrorum, cum thoracis longitudine collata, in duas familias segregantur; *Fam. I.* Coleoptris thorace paulo longioribus. *Fam. II.* Coleoptris thorace duplo et plus duplo longioribus.

FAMILIA I.

1. *O. planum* M. p. 112.

Descriptioni, loco citato datae, quaedam addenda sunt:

Color variat: 1) niger; coleoptris fuscentibus; ore, basi antennarum, pedibusque pallidioribus. 2) fuscus; thorace elytrisque picescentibus; ore, basi antennarum, pedibusque testaceis.

Long. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{5}$ lin.

Caput foueolis longitudinalibus duabus inter antennas impressum.

Thorax transversus, longitudine fere duplo latior, basin versus paulo angustior, trifoveolatus, foueis discoidalibus longitudinalibus

bus, quarum laterales breues sunt, nec apicem nec basin thoracis attingunt, intermedia autem recta integra est, basin et apicem thoracis attingens, apice attamen plerumque magis dilatata. Hae foueolae autem interdum subobsoletae sunt.

Coleoptra thorace duplo fere longiora sunt.

2. *O. depresso* M. p. 113.

Varietas huius speciei obscurō-fusca, ore, antennis, pedibusque rufescentibus, habitat Norimbergae — *Sturm*.

3. *O. pusillum* nitidulum, nigrum; thorace bifoueolato coleoptrisque fuscis; ore, antennis et pedibus testaceis.

Long. vix 1 lin.

Caput suborbiculatum, thorace minus, nigrum; ore et antennis testaceis, his, capite thoraceque paulo brevioribus, apice fuscescentibus.

Thorax vt in *O. planum*; bifoueolatus, foveolis distinctis oualibus ante scutellum.

Coleoptra fusca, subtilissime puncta.

Abdomen nigricans; ano pallidiore.

Habitat Brunswigae, raro, semel tantummodo captum.

Varietas exstat *intermedia* inter *O. planum* et *pusillum*, thoracis foveolis tribus, *intermedia* autem obsoletiore.

4. *O. pygmaeum* nitidum, rufum, conuexiusculum, capite plerumque obscuriore; coleoptris punctis.

Long. 1 lin.

Habitu nec non forma et proportione partium *Omalii brunnei*, a quo, magnitudine minore, coleoptris haud striatis, thorace haud canaliculato, differt. Ab *O. crenato* magnitudine minore et coleoptris haud crenato-striatis se distinguit.

O. brunneum var. 3. M. p. 114.

Dom. *Gyllenhal* hoc *Omalium* cum Dom. *Sturm* communicauit sub nomine *Staphylinus pygmaeus Paykull.*

5. *O. brunneum* M. p. 113., nitidum, rufum; oculis, plerumque toto capite, apice elytrorum et ano nigris; thorace bifoueolato; coleoptris puncto-striatis.

Long. 1½ lin.

Ab *Ob. crenato* praecipue thorace foueolato differt. Differentia harum duarum specierum, quam olim etiam de antennarum articulo ultimo desumsi, nimis subtilis est; Antennae *O. crenati* paulo longiores et graciliores sunt quam *O. brunnei*; inde sequitur, articulos etiam earum paulo graciliores et longiores esse debere, quod vero non nisi comparatione antennarum distingui potest.

Staph.

Staph. melanocephalus Ol. Ent. St. n. 55.
tab. IV. f. 32.?

Omalium vidi e collectione *Sturmiana*, statura nec non partium forma atque proportione *O. brunnei*, longitudine 2 lin; thorace subfoueolato; elytris autem, quod bene notandum, haud puncto-striatis, sed, vt in *O. pygmaeo*, punctis subtilibus impressis.

6. *O. crenatum* M. p. 114..

Quaedam de hac specie iam sub n. 4 et 5 monui.

Cel. Fabricius ad *Staphylin. crenatum* in Ent. Syst. St. n. 26. et in Syst. Eleuth. St. n. 34. allegauit Payk. Fn Suec. III. 403. n. 47. et Payk. Monogr. Curcul. App. 146. n. 45. E descriptione Fabriciana huius micropteri et e citatis patet, vt credo, Frabricum descripsisse verum *Om. crenatum*. Nescio autem cur Dom. Fabricius in Ent. Syst. hoc insectum cum *Staph. striatulo* comparauit, cui statu-ram et magnitudinem *Staph. fulgidi* tribuit.

7. *O. rufum* M. p. 115.

8. *O. castaneum* nitidum, obscuro-castaneum; antennis, pedibus, elytrisque paulo pallidioribus; thorace orbiculato.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lin.

Habitu Om. praecedentium; statura autem graciliore, thorace orbiculato etc. differt.

Caput

Caput nigricans, antennis palpisque rufis.

Thorax orbiculatus, punctus, lateribus marginatus, coleoptris breuior et vix angustior.

Coleoptra puncto-vel crenato-striata.

Habitat Norimbergae — Sturm.

9. *O. brachypterum* M. p. 114.

10. *O. curfor* nitidum, nigrum; elytris pedibusque picescentibus.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, leue, nitidum, nigrum; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, fuscis.

Thorax conuexiusculus, suborbiculatus, coleoptris paulo minor, nitidus, leuis, niger.

Coleoptra subtransuersa, nitida, leuia, fusco-picea.

Pedes ochracei.

Habitat in Borussia — Hellwig.

11. *O. rugosum* M. p. 115.

*Staph. rugosus Fabr. Ent. Syst. St. n. 54. — Syst. Eleuth. St. n. 66. — E citato, quod Fabricius ad hanc speciem allegauit, scilicet Olivier Staph. n. 42. tab. V. f 43, appareat, illum St. rugosum Fbr. nihil aliud esse quam *O. rugosum*. Cel. Paykull Staph. rugosum Fbr. perperam ad var. β . Staph. picei n. XII., quae verus *Oxytelus carinatus* est, allegat.*

FAMILIA II.

12. *O. riuulare* M. p. 116.

Caput foueolis quatuor impressum, duabus scilicet inter oculos, duabus ad basin; ore rinfo.

Coleoptra interdum omnino fere nigra sunt.

Dom. Prof. *Knoch.* plures adhuc condidit Omaliorum species, de quibus autem dubius sum, an non forsan varietates vnius eiusdemque speciei sint:

a) *O. caefum* nigrum; antennis elytrisque pallidioribus; palpis pedibusque rufescentibus; thoracis foueis duabus dorsalibus profundis ouatis.

Long. 1 — $1\frac{1}{3}$ lin.

Statura et partium forma ac proportione *O. riuularis*; sculptura autem et punctura multo crassiore et distinctiore, nec non forma fouearum thoracis diuersum.

Thorax rugosus; foueis duabus dorsalibus, longitudinalibus, apicem thoracis haud attingentibus, profundis, interuallo multo angustiore quam in *O. riuulari*; puncto supra illas foueas impresso.

Coleoptra plicis longitudinalibus duabus prope futuram.

b) *O. incisum* ab *O. riuulari* non nisi magnitudine minore differre videtur. Sunt quidem specimina, thoracis margine pallidiore distin-

cta (eaque semper inter minora reperiuntur); hic autem character nondum mihi sufficit ad speciem statuendam ab *O. riuulari* diuersam. *Abdomen nigricans* est vel nigro-fuscum, interdum margine et ventre pallidioribus.

c) *O. Oxyacanthalae* differt ab *O. riuulari* non nisi longitudine tantummodo 1 lin. et articulo primo antennarum nigro.

Omnia haec Omalia characteribus essentia-libns, i. e. forma atque proportione partium satis inter se congruunt, nec nisi magnitudine et colore, qui iure inter characteres minus essentiales numerantur, atque sculptura et punctura magis minusue distinctis et profundis differunt. Quod ad foueas thoracis, hae in quibusdam speciminibus, quae sine vlo du-bio ad *O. riuulare* pertinent, fere adeo dis-tinctae et profundae sunt ac in *O. caeso*.

13. *O. Viburni* M. p. 117.

14. *O. florale* M. p. 118.

Stenus floralis Fabr. El. II. n. 6.

Geoffr. Hist. St. n. 15.

Staph. rufipes Fourcr. Ent. St. n. 15.

Geoffroy citat quidem *Staph. rufipedem* Linn., quem ad *Tachyborum rufipedem* retuli, sed thorax marginatus, margine laterali eleuato distincto, iam ostendit, hanc speciem haud ad genus *Tachybororum* referri posse.

15. *O. laeve nigrum*, nitidum; palpis, antennarum basi, thoracis marginibus lateralibus et inferiore, elytris, pedibusque rufo-picecentibus.

Long. $1\frac{2}{3}$ lin.

Habitu *O. riularis*, statura autem latiore, thorace haud sulcato etc. differt.

Caput nigrum, palpis et antennarum articulis duobus primis rufescens.

Thorax minus conexus quam in speciebus confinibus, transuersus, lateribus rotundatis, apicem versus paulo angustior; subtiliter punctus; niger, marginibus lateralibus et baseos rufescens.

Elytra apice oblique truncata; subtiliter puncta, vix obsolete striata; latiora quam in speciebus affinibus; rufo picea.

Anus et *pedes* rufo-picei.

Habitat in Borussia — *Hellwig.*

16. *O. fuscum* nitidum, crasse punctum, fuscum, antennis pedibusque pallidioribus.

Long. 2 lin.

Caput thorace triplo minus, punctum, sine lineis impressis, nigro-fuscum; antennis extorsum paulo crassioribus, subfiliformibus, capite thoraceque paulo longioribus, rufescens.

Thorax longitudine latior, coleoptrorum fere latitudine, conuexus, punctus, nigro-fuscus; marginibus subelevatis pallidioribus; impressione glabra, haud puncta, ante scutellum notatus.

Coleoptra thorace duplo longiora, conuexa, puncta, nigro-fusca.

Abdomen coleoptris haud duplo longius, nigrum, nudum, haud punctum; ano acuto rufescente.

Pedes rufescentes, femoribus obscurioribus.

Vnicum huius Omalii individuum meae collectionis debeo benevolentiae Dom. Sturm, qui hanc speciem *Norimbergae* cepit.

17. *O. nigrum* nitidum, nigerrimum; basi antennarum pedibusque rufis.

Statura, magnitudine, latitudine, partiumque forma ac proportione *O. riularis* (n. 12); thorace autem haud foueolato, et coleoptris paulo brevioribus differt. — Ab. *O. florali* (n. 14) praeter colorem, coleoptris etiam brevioribus, quae illi thorace triplo fere longiora sunt, differt.

Long. $1\frac{2}{3}$ lin.

Caput thorace duplo minus; antennis, capitis fere et thoracis longitudine, fuscis, articulis 4 primis rufescensibus; palpis rufis, articulo ultimo anteriorum subfuscante.

Thorax

Thorax conexus, coleoptrorum fere latitudine, illis autem duplo breuior, punctus, impressionibus duabus disci obsoletis.

Coleoptra latitudine paulo longiora, subcrenato-striata, striis obsoletis.

Abdomen coleoptris duplo longius.

Duo huius speciei indiuidua Dom. *Sturm* debo.

18. *O. quadrum* fuscescens, abdomine nigro, thorace quadrato, antennis subfiliformibus.

Long. 2 lin.

Caput nigrum; antennis, capitis et thoracis longitudine, subfiliformibus, fuscis, articulis longitudine decrescentibus, primo rufescente; palpis rufescentibus.

Thorax longitudine latitudinis; nigro-fuscus, marginibus pallidis.

Coleoptra obscuro-fusca, marginibus laterum et apicis pallidis.

Abdomen latum, acuminatum.

Pedes testaceo-rufi, capitibus femorum obscurioribus.

E collectione *Knochiana*.

Staphylinus borealis Payk. Faun. Suec. St. n. 57.?

19. *O. tectum* nigrum, nitidulum; elytris et summis marginibus thoracis fuscis; thorace subcanaliculato.

Habitu

Habitu omnium huius familiae Omaliorum,
statura autem latiore.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput nigrum, antennarum articulo primo
palpisque rufescentibus.

Thorax longitudine duplo latior, canalicula
media longitudinali obsoleta et puncto
distincto marginum lateralium impressus; ni-
ger, marginibus summis laterum et baseos rufis.

Coleoptra thorace paulo latiora, subtilissime
et confertissime puncta, rufo-fusca.

Abdomen a coleoptris omnino fere tectum,
nigrum; ano fusco.

Pedes rufo-testacei.

Habitat in Suecia, vnde Dom. cel. Paykull
vnicum illud individuum, de quo haec de-
scriptio desumpta est, collectioni Boscianae Pa-
risii communicauit.

Individuum alterum, quod Dom. Gyllenhal
ad Dom. Sturm misit, hic vero mecum com-
municauit, cum illo quidem conuenit, differt
autem longitudine vix lineam vnicam super-
ante; thoracis canalicula obsoletissima, pun-
ctis autem tribus distinctis ante marginem
lateralem, margine basis haud rufo.

Staph. tectus Payk. Mon. St. n.

— — Olivier Ent. St. n. 52. t. III.
f. 21.

20. *O. Ranunculi* M. p. 118.

21. *O. macropterum nigricans*, nitidum; antennis palpisque fuscis; pedibus rufo-testaceis.

Long. $\frac{2}{3}$ lin.

Habitus crassiusculus.

Caput nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, extrorsum valde incrassatis, articulis & primis validioribus, rufescens, tertio gracili, 4 — 7 crescentibus, 8 — 10 pateraeformibus crescentibus, ultimo globoso.

Thorax subtilissime punctus, longitudine duplo latior.

Coleoptra puncta, abdominis maximam partem tegentia.

E collectione Knochiana.

22. *O. ouatum* nitidum, nigrum; pedibus, palpis et antennarum articulo primo pallidis; thorace leui.

Statura reliquis Omaliis breuiore et latiore, ouata; lateribus coleoptrorum subrotundatis.

Long. fere 1 lin.

Caput thorace plus duplo minus; punctis duobus inter antennas et duobus inter oculos, saepius obsoletioribus, impressum; palpis testaceis; antennis, vix capitis thoracisque longitudine, fuscis, articulo primo crassiore, rufo-fusco, nitido, reliquis articulis, ut in omnibus huius familiae speciebus, pilosellis.

Thorax

Thorax longitudine duplo latior, coleoptris angustior et triplo breuior, leuis.

Coleoptera subtiliter et confertissime puncta; in medio latitudine longitudinis, apicem et basin versus paulo angustiora; angulis elytrorum apicis rotundatis.

Abdomen coleoptris haud duplo longius.

Pedes piceo-testacei.

Dermestes brachypterus Panz. Faun. Germ. IV. tab. 10; icon accuratissimum.

Kateretes brachypterus Herbst. Nat. d. K. V. n. 2. tab. XLV. f. 2.

Dermestes brachypterus Fabr. Ent. Sylt. Derm. n. 46. — Sylt. Eleuth. Derm. n. 45.

23. *O. striatum* M. p. 119.

Ad hanc speciem credo referendum esse *Staph. minutum* Olivier Ent. St. n. 56. tab. VI. f. 53; licet autem, in collectione cel. Boscii, sub nomine *St. minutus* Olivieri alia viderim infecta, scilicet *Oxytelum depresso* et *Ox. nitidum*, attamen descriptio et delineatio *Staph. minutum* in Entomologia Olivieriana nullo modo ad hos Oxytelos quadrat, melius vero ad *Omalium striatum*.

24. *O. ophthalmicum* nitidum, testaceum; oculis et abdome (interdum solo ano) nigris.

Long. $\frac{2}{3}$ lin.

Magni

Magnitudine minore et colore pallidiore ab Omalis sequentibus differt. Statura nec non partium forma atque proportio eadem sunt ac in praecedentibus.

Caput linea transuersali inter antennas, et punctis duobus inter oculos, interdum obsoletioribus, impressum; testaceum; oculis nigris; apice antennarum fuscescente.

Thorax testaceus, puncto antescutellari et linea longitudinali subobsoletis impressus.

Coleoptra paulo pallidiora quam caput et thorax.

Abdomen vel totum nigrum, pectore rufo-testaceo; vel testaceum, apice fusco.

Pedes testacei.

Staph. ophthalmicus Payk. Faun. Suec. St. n. 54.

Dom. Sturm, cui hanc speciem misit Dom. Gyllenhal, benevolenter eam mecum communicavit.

25. *O. pallidum*, nitidum, rufum, elytris testaceis, oculis nigris, thorace subleui.

Long. 1 — $1\frac{1}{4}$ lin.

Habitu Omaliorum sequentium.

Caput inter antennas linea transuersali obsoleta seu punctis duobus, plerumque etiam inter oculos punctis duobus impressum; rufum,

fum, oculis nigris, palpis et antennarum basi testaceis.

Thorax rufus, marginis lateralis basi pallidiore; puncto ante scutellum, nec non linea longitudinali subobsoleta impressus.

Coleoptra testacea.

Abdomen et *pedes* rufo-testacei.

Habitat haud raro in floribus.

§6. *O. testaceum* nitidum rufum, elytris testaceis; abdomine oculisque nigris; thorace leui.

Long. vix. 1 lin.

Statura breuiore quam Om. sequens, a quo etiam thorace conuexiore, haud foueolato, differt.

Caput thorace duplo minus, punctis 2 interocularibus, interdum obsoletis, impressum; rufo-testaceum, oculis nigris; antennis, capitis thoracisque longitudine, testaceis, articulis 4 vltimis fuscescentibus.

Thorax vt in Om. sequente, sed conuexior, absque foueolis, linea interdum media longitudinali obsoleta impressus; rufo-testaceus, nec medio obscurus.

Coleoptra testacea, latitudine longiora.

Abdomen, vt in specie sequente, nigrum, ano pallidiore; pectore vel nigricante vel rufescente.

Pedes rufo-testacei.

Habi-

Habitat in floribus.

Dermestes femicoleoptratus Panz. Faun. Germ. H. XXIV. tab. 6.

27. *O. abdominale* nitidum, rufum, elytris testaceis, ab domine oculisque nigris; thorace bifoueolato.

Long. 1 — $1\frac{1}{2}$ lin.

Caput thorace duplo minus, linea transversali inter antennas impressum; rufo-testaceum, oculis et mandibulis fuscis; antennis capitis thoracisque longitudine, subfuscotestaceis, pilosellis, articulo primo nitido pallidiore.

Thorax longitudine duplo fere latior, coleoptris angustior et plus duplo breuior; foveis 2 discoidalibus, nec apicem nec basin attingentibus, subarcuatis, conuexitate latus versus spectante, impressus; rufo-testaceus, disco fuscescente.

Coleoptra latitudine duplo longiora, testacea.

Abdomen latum, breue, coleoptris haud duplo longius, ano acuto; nigrum, pectore rufescente.

Pedes testacei.

Habitat in floribus.

GENVS XI.

ANTHOPHAGVS.

Anthophagi, thorace subquadrato, convexiusculo, basin versus angustiore, coleoptris longis, thorace latioribus, habitu sunt peculiari et a genere praecedente satis distincti. Antennae etiam filiformes bonum praebent characterem distinctium. — Cel. Latreille in suo *Précis des genres des Infectes*, opere, quod nondum videram, cum Monographiam Micropterorum ederem, et serius, in sua *Histoire naturelle générale, et particulière des Crustacés et des Infectes*, *Anthophagos* etiam a reliquis micropteris, sub nomine generali *Lesteva* sciunxit.

1. *A. alpinus* M. p. 188. niger; thorace fusco, marginibus pallidioribus; ore, antennis, coleoptris, pedibusque testaceis.

Statura magnitudine, partiumque forma proportione et punctura *A. caraboidi* adeo similis est ut vix dubitassem, quin eum statim pro eius varietate haberem, nisi *A. caraboides* insectum apud nos perulgare esset, ille autem nunquam mihi occurrisset.

Staph. alpinus Olivier Ent. St. n. 45. tab. VI. f. 55.

Payk.

Payk. Faun. Suec. St. n. 27.

Fabr. Ent. Syst. St. n. 53. — *Sylt.* Eleuth. St. n. 43.

2. *A. caraboides* M. p. 120.

Staph. caraboides Olivier Ent. St. n. 26. tab. II. f. 17.

Staph. fuluus De Geer Mem. St. n. 12.

3. *A. testaceus* M. p. 121.

In collectione *Bosciana* varietatem vidi huius Anthophagi rufam, capite anoque nigris.

4. *A. intermedius* nigricans, nitidulus; antennis, palpis pedibus obscuro-rufis.

Longitudine, habitu et partium punctura atque proportione omnino Anthoph. praecedentis; exceptis attamen antennis et palpis paulo crassioribus et brevioribus.

Habitat Brunsuigae — Hellwig.

Teste Illigeri hic *Anthophagus* est *Carabus abbreviatus* Panz.

5. *A. armiger* M. p. 122.

6. *A. dichrus* M. p. 138.

7. *A. obscurus* M. p. 122.

In collectione *Bosciana* vidi, sub nomine *Staph. bicolor* Fabr. varietatem huius speciei, thoracis margine basali summo pallidiore.

Ad ea, quae loco citato de *Staph. tecto* Payk. dixi confer *Omalium tectum*.

8. *A.*

8. *A. plagiatus* M. p. 189. et 123.

Long. 2 — $2\frac{1}{2}$ lin.

Thorax et *coleoptra* pilis vestita sunt tenuibus, flauo-grisescensibus.

Habitat in Suecia, vnde Dom. *Gyllenhal* hunc *Anthophagum* Dom. *Sturm* communicauit, cui collectio mea eum debet.

GENVS XII.

P I E S T V S.

Species noua atque elegans, quae vnica hoc genus condit, forma antennarum et palporum, nec non vitæ ratione, cum *Anthopagis* quidem congruit, charactere autenī toto externo et partium plurium singularum formia atque proportione satis ab omnibus micropteris differt.

Corpus depresso, lineare.

Caput triangulare, thorace triplo minus, punctum; oculis globosiusculis; clypeo obtuso; mandibulis falcatis; antennis filiformibus, dimidio corpore longioribus, pilosellis, articulo primo clauato reliquis crassiore, 2 et 3 clauatis, 4 — 11 cylindricis; palpis filiformibus.

Thorax longitudine paulo latior, coleoptris vix angustior sed paulo breuior, punctus, angulis basis truncatis, sulco medio longitudinali integro (vt in *Oxytelo morsitante*), et altero abbreviato in utroque basis angulo.

Coleoptra longitudine paulo latiora, fulcis 12 profundis rectis longitudinalibus parallelis integris impressa.

Abdomen obtusiusculum, subtilissime punctum.

Pedes

Pedes breues, validi, tibiis ferrato-ciliatis.

1. *P. sulcatus* fuscus, nitidus; palpis antennis et pedibus pallidioribus.

Long. 2 lin.

Caput subtilissime punctum, ruga parua longitudinali inter antennas, fuscum; clypeo palpis et antennis pallidioribus; his pilosellis, praecipue in latere interiore primi articuli, vbi pili in penicillum rigidiusculum compacti esse solent.

Thorax subtilissime punctus.

Pedes rufescentes.

E collectione *Conitis de Hoffmannsegg.*

Habitat in Brasilia, vbi Dom. Sieber, itinerator peritus et de historia naturali bene meritus, indiuidua plura huius speciei legit in quadam Musae specie.

GENVS XIII.

S T E N V S.

Steni cum nullo alio genere comparandi et aequae singulares sunt ac *Oxypori*. Corpus crassum, teretiusculum, depile, cicatricosum seu punctis crassis impressum, obscurum; caput magnum, oculis prossilientibus, palpis gracilibus longis; thorax teres, medio latior, coleoptris angustior; abdomen subcylindricum durum, ano acuto; pedes graciles cursorii; et multa alia characteres huius generis sunt. — *Caput* plurimis speciebus rugosum est, margine scilicet circa oculos magnos et fronte ipsa, ad modum iugi longitudinalis, eleuatis. Quibusdam hoc iugum satis est distinctum, aliis obsoletum.

1. *St. Iuno* M. p. 154.

Habitat, primo vere, in apricis, in quisquiliis, sub tegmine graminis et sub lapidibus.

2. *St. biguttatus* M. p. 154.

St. bipustulatus Ljungh p. 63. n. 4. meliore iure ad hanc speciem allegari potest quam *St. biguttatus* Ljungh, de quo haud affirmare possum, num sit varietas huius *Steni*, num propria species.

Stenum vidi in collectione *Latreilleana* Parisiis, qui, longitudine lin. 2., colore omnino *St. Juno*, habitu autem gracili *St. biguttati* erat.

Alterum vidi *Stenum* in collectione *Hellwigiana* Brunswigae nigrum, tarsis fuscescentibus, gutta elytrorum rufa; longitudine *St. biguttati*, statura autem latiore et crassiore; pedibus nigris, tarsis et summo tibiarum apice fuscescentibus; elytrorum gutta disci rufa, maiore et obsoletiore quam in *St. biguttato* communi.

Geoffroy Hist. St. n. 24.

Staph. biguttatus Fourcr. Ent. St. n. 24. — In his duobus operibus sub vnam eandemque speciem amplectuntur omnes Steni, quorum magnitudo duas lineas excedit. *Geoffroy* unus ex illis est, qui Stenos macula elytrorum fulua pro maribus reliquorum Stenorum habent, quibus haec macula deest; quod autem minime valet.

3. *St. cordatus* M. p. 198.

4. *St. boops* iugo frontali distincto; totus niger.

Long. $2\frac{1}{4}$ — $1\frac{2}{3}$ lin.

Color corporis niger, vix paululum subcinerascens.

Caput, iugo frontali distincto, nigrum, pilis paucissimis cinerascentibus, vix oculo

armato

armato conspicuis, vestitum, palpis rufo-testaceis; antennis, capite thoraceque breuioribus, fuscis, articulo primo obscuriore.

Thorax longior quam in speciebus plurimis sequentibus, longitudine elytrorum, ante apicem latior, basin versus angustatus, linea longitudinali distincta impressus.

Habitat in arena humida ad ripas.

St. Jungh p. 60. n. 1.

Var. 1. *St. niger*; palpis pedibusque, exceptis geniculis, quae nigra sunt, testaceis. — Hanc varietatem Dom. *Sturm* mecum communicauit.

Var. 2. *St. niger*; pedibus nigro-fuscis, femoribus basi testaceis; palpis fuscis, anterioribus basi testaceis.

Hae varietates, statura magnitudine partiumque forma proportione punctura et sculptura cum vero *St. boope* congruentes, forsitan etiam e copula huius Steni cum sequente ortae sunt.

5. *St. oculatus* M. p. 155. cinerascens, palpis testaceis; antennis rufo-testaceis, articulo primo nitido nigerrimo; pedibus testaceis, geniculis nigris.

Caput cinerascens, clypeo cinereo-pilosello, oculis cinereo-fuscis, palpis pallide-testaceis; antennis, capitis thoracisque longitudine, testaceis, articulo primo nigro.

Thorax coleoptris paulo breuior.

Varietas antennis obscuro - fuscis, articulo primo nigerrimo nitido, habitat Parisis — *Desmarest.*

Varietas altera, cui Dom. Prof. *Knoch* olim nomen *St. geniculatus* tribuerat, statura paulo graciliore, thorace paulo longiore (longitudine scilicet latitudinem paululum excedente, cum *St. oculato* communi thorax longitudine latitudinis sit) punctura paulo subtiliore, longitudine $2\frac{3}{4}$ linearum, a *St. oculato* communi differens, ad species intermedias inter hunc et praecedentem Stenum pertinere videtur.

Varietatem tertiam, cuius specimina plura Dom. *Dahl* Brunsuigae legit, Dom. Prof. *Knoch* olim pro specie peculiari, sub nomine *St. spectator* habuit et mecum communicauit his characteribus distinctiuis: “*St. spectator* haud *St. oculati* varietas est, nam semper ab hoc differt latitudine insigniore, tuberculo frontali orbiculato (cum *Steno oculato* linea longitudinalis elenata frontalis sit), coleoptris thorace longioribus, habitatione.” Ego autem, collatione specierum ambarum, hos characteres distinctiuos nimis subtiles putabam ad sciungendum illos Stenos in duas species peculiares. Haec varietas autem, statura quidem minore, attamen punctis aequa crassis

im-

impressa est ac *St. oculatus* maior. Serius etiam Prof. cel. Knoch differentiam specialem inter *St. oculatum* et *spectatorem* sustulit.

Hanc speciem saepius cum specie sequente socialeni locis humidis cepi.

St. similis Ljungh St. p. 65. n. 5.

6. *St. cicindeloides* M. p. 155.

St. similis var. β. Ljungh p. 66.

7. *St. clauicornis* M. p. 156. cinereo-niger; antennis palpisque testaceis, basi apiceque nigricantibus; thorace suborbiculato.

Caput iugo frontali subobsoleto; antennis testaceis seu rufescensibus, apicem versus fuscousibus, articulo primo nigro.

St. buphthalmus Ljungh St. p. 67. n. 7.

8. *St. binotatus* cinereo-niger; antennis palpisque ferrugineis, basi apiceque nigricantibus; thorace elongato.

Dissert a specie praecedente, thorace longiore, colore obscuriore palporum et antenarum, punctura subtiliore, et thorace foueolato. — Attamen mihi sunt individua, quae, characterum distinctiorum ratione, medium tenent inter ambas species, et forsitan copula earum spuria ortum ducunt.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lin.

Caput iugo frontali obsoleto.

Thorax

Thorax elongatus, medio (sed apici paulo proprius) latior; dorso, paulo infra medium, foveis & irregularibus impressus.

Habitat Brunsvigae — *Knoch.*

St. binotatus Ljungh St. p. 66. n. 6.

9. *St. buphthalmus* M. p. 156. totus cinereo-niger; iugo frontali et canalicula thoracis obsoletis.

Thorax latitudine paulo longior, medio latior.

Punctura crassa, cicatriculosa.

Hanc speciem copiose primo vere, cum pluribus huius generis speciebus, nunquam autem cum *St. biguttato*, in arenosis humidioribus sub gramine legi.

Variat *statura* paulo crassiore vel paulo graciliore.

Varietatem alteram, punctura paulo subtiliore, colore paulo magis cinereo, Dom. Prof. *Knoch* pro specie peculiari habet et ei nomen *St. canaliculatus* dedit.

10. *St. morio* totus cinereo-niger; canalicula thoracis deficiente.

Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

Haec species differt a *St. buphthalmo* non nisi statura paulo minore, antennis paulo longioribus, et deficiente canalicula thoracis.

Habitat Brunsvigae — *Dahl.*

St.

St. morio — Knoch.

Varietatem huius Steni, thorace et coleoptris per paululum breuioribus, Dom. Prof. *Knoch* pro specie peculiari, sub nomine *St. latifrons*, habet. — Dom *Dahl* plures huius varieta-
tis Stenos in sylua legit prope Brunsuigam.

11. *St. opticus niger*; iugo frontali et canalicula thoracis deficientibus.

Dissert a *St. praecedente*, statura paulo mi-
nore, colore nigriore, thorace et coleoptris
paulo breuioribus, iugo frontali deficiente.

Long. $1\frac{1}{5}$ lin.

Color niger, (haud cinereo-niger, vti plu-
rimis huius generis speciebus).

Punctura ratione paruitatis corporis multo
crassior est quam reliquis conspeciebus.

Caput fronte plana, vix vestigio obsoleto
iugi ad basin capitum.

Thorax latitudine paulo longior, interdum
linea longitudinali obsoleta impressus.

Captus Brunsuigae hibernans sub muscis
ad arborum cortices — *Dahl*.

St. opticus — Knoch.

12. *St. Argus* subcinereo-niger, antennis palpis
pedibusque fuscis; thorace medio latiore;
iugo frontali distincto.

Hic *Stenus* distinguitur a *St. optico* pun-
ctura crassiore et iugo frontali distincto, (dis-
tinctiore

tinctiore quam in omnibus speciebus affinibus); a Steno sequente thoracis forma et statuta maiore.

Long. $1\frac{1}{2}$ lin.

Color haud exacte cinereo-niger est, vti v. c. in *St. fuscipede*, *clauicorni* etc. sed nitidior.

Punctura est distinctior, licet haud crassior, quam in quibusdam specierum minorum, cum quibus haec confundi posset.

Caput iugo frontali distincto.

Thorax latitudine paulo longior, medio latissimus.

Habitat sub muscis — *Dahl.*

St. Argus — *Knoch.*

13. *St. fuscipes* M. p. 157. cinereo-niger; antennis palpis pedibusque fuscescentibus; iugo frontali distincto; thorace ante apicem latiore.

Long. $1\frac{1}{4}$ lin.

Caput iugo frontali distincto, sed minus distincto quam in *St. Argus* et *circulari*.

Thorax latitudine longior, ante apicem, haud exacte in medio, latior, basin versus angustatus.

Pedes fusci; femoribus subrufo-fuscis, geniculis obscuris.

St. fuscipes et *St. Argus*, characteribus et descriptionibus his a me datis, inuicem et a reliquis cospeciebus bene quidem distingui possunt;

possunt; quaeritur autem, num omnes huius generis species receptae re vera species sint genuinae? nec forsitan una alteraue nihil aliud sit quam varietas aut species spuria intermedia? *St. fuscipes* et *St. Argus* medium tenebre videtur inter *St. opticum* et *St. pallipedem* sequentem; et eis, quae supra, ad Genus *Staphylinorum*, de copula dixi, adhibitis, ortus *St. fuscipedis* et *St. Argus* e copula harum duarum specierum, possibilitati saltem haud repugnare videtur. — Cominendo Entomologis obseruationes diligentibus de copula spuria insectorum, quo hypothesis mea experientiis vel probari vel refutari possit.

14. *St. pallipes* M. p. 157.

Stenum mecum communicauit Dom. *Sturm* huic speciei peraffinem, distinctum autem corpore paululum crassiore, i. e. capite paulo latiore, thorace paulo globosiore, coleoptris paulo latioribus; punctura subcrassiore; thorace impressionibus quatuor, armato oculo distinctis, in quadratum dispositis aequilaterale, impresso.

Hic *Stenus*, cuius specimen vnicum Dom. *Sturm* debo, forsitan peculiaris speciei est.

15. *St. circularis* M. p. 157. cinereo-niger; thorace breui; minutus.

Long. $\frac{4}{5}$ lin.

Caput

Caput iugo fontali distinctissimo; antennis et palpis fuscescentibus; mandibulis testaceis.

Thorax latitudine vix paulo longior, medio latissimus, apicem et basin versus angustatus.

Pedes nigri, senioribus basi subfusciscentibus.

St. rotundatus Ljungb St. p. 67. n. 8.

GENVS XIV.

O X Y P O R V S.

Habitus totus seu character totus externus et forma partium quarumdam hoc genus optime distinguunt, ita ut nunquam cum vlo alio genere confundi possit.

1. *O. maior* niger, nitidus; tarsis et elytrorum maculis duabus magnis longitudinalibus testaceis.

Long. 5 lin.

Caput permagnum, thorace fere duplo maius, nigrum. Antennis fuscis, articulo primo basi nigro.

Thorax transuersus, basin versus angustior.

Elytra nigra; macula humerali vsque ad medium elytri producta, alteraque suturae propiore, longitudine fere totius elytri, testaceis; striis duabus punctorum et praeterea punctis quibusdani vagis disci impressa.

Pedes nigri, tarsis rufescentibus, tibiis anticis subflaucenti-sericantibus.

Habi-

Habitat in America septentrionali — *Knoch.*
E collectione *Knochiana*.

2. *O. rufus* M. p. 151.
Payk. Mon. St. n. X.
3. *O. lateralis* M. p. 195.
4. *O. caelatus* M. p. 197.
5. *O. maxillosus* M. p. 152.
6. *O. vittatus* M. p. 195.
7. *O. femoralis* M. p. 196.
8. *O. cinctus* M. p. 196.

* * *

Vetustissimum quod vnquam vidi micropteron, reliquum mortuum sed bene conseruatum e temporibus antiquitatis priscae, *Oxyporus* est electro inclusus fossilis, e collectione rerum naturalium cel. *Blumenbachii*. Persuasus autem, descriptionem huius Oxypori omnibus naturae inuestigatoribus optatam fore *), venia vtor possessoris huis Oxypori vnici, illamque descriptionem hic addo;

Long. 7 lin.

Caput

*) Utinam *Blumenbachius* multorum quae possidet electro inclusorum insectorum descriptionem et comparationem cum insectis hodiernis affinibus ederet. Ingenium viri celeberrimi et de historia naturali iam diu egregie meriti perpensam fane hypothesis de ortu et formatione electri nobis inde impertire posset.

*Caput quadratum, angulis obtusis, thorace maius — Antennis capitis longitudine, pilosellis; articulo primo longiore; articulis 7 sequentibus dimidia illius longitudine; vltimis haud rite dignoscendis sed, vti videtur, materie heterogena obductis, qua speciem clavae praebent (antennae alterius pars dimidia deficit). — Oculi haud dignoscendi sunt. — Clypeus exacte vt in *Oxyporis* hodiernis formatus, transuersus, margine anteriore paululum emarginato. — Instrumenta cibaria maximam partem destructa sunt, ita vt forma eorum haud exacte dignosci possit.*

Thorax transuersus, exacte vt in nostris *Oxyporis* formatus; margine anteriore recto, posteriore rotundato; capitis latitudine sed dimidia eius longitudine.

Scutellum haud dignoscendum.

Coleoptra paululum e situ naturali remota, thoracis magnitudine; elytris quadratis.

Abdomen coleoptris triplo longius, e segmentis 8 constat.

Pedes, numero forma longitudine et proportione partium, omnino respondent pedibus *Oxypororum* nostrorum; numerus autem articulorum in tarsis haud perspicue videri potest.

Color pallide flauus est. Color naturalis verisimile omnino euauit.

I N D E X
G E N E R V M E T S P E C I E R V M
H V I V S M O N O G R A P H I A E.

Aleochara G. VI. p. 144.

14	<i>Aethiops</i>	p. 153	56	<i>fusipes</i>	p. 170
38	<i>alternans</i>	163	75	<i>graminicola</i>	176
13	<i>analis</i>	153	50	<i>humeralis</i>	169
33	<i>aterrima</i>	162	4	<i>impressa</i>	150
35	<i>atra</i>	—	15	<i>inquinula</i>	193
58	<i>bimaculata</i>	170	62	<i>lanuginosa</i>	171
61	<i>bipunctata</i>	171	57	<i>lata</i>	170
23	<i>Boleti</i>	156	52	<i>leuis</i>	169
53	<i>brevipennis</i>	169	48	<i>limbata</i>	167
17	<i>callicera</i>	153	2	<i>linearis</i>	148
1	<i>canaliculata</i>	148	21	<i>longiuscula</i>	155
60	<i>carniuora</i>	171	47	<i>lucida</i>	167
46	<i>cincta</i>	166	54	<i>lugens</i>	169
30	<i>cinnamomea</i>	161	31	<i>marginalis</i>	161
22	<i>circellaris</i>	155	68	<i>minuta</i>	174
43	<i>collaris</i>	164	55	<i>moesta</i>	170
12	<i>corticalis</i>	152	69	<i>morion</i>	175
76	<i>deplanata</i>	177	72	<i>nana</i>	176
74	<i>depressa</i>	176	11	<i>nigra</i>	152
3	<i>dimidiata</i>	149	36	<i>nigricollis</i>	163
25	<i>dichroa</i>	158	34	<i>nigritula</i>	162
67	<i>dubia</i>	173	63	<i>nitida</i>	172
18	<i>elongatula</i>	153	40	<i>obfuscata</i>	163
26	<i>erythroptera</i>	158	8	<i>obscura</i>	151
66	<i>excusa</i>	172	27	<i>obscurella</i>	159
32	<i>flavipes</i>	161	41	<i>opaca</i>	163
9	<i>fracticornis</i>	152	10	<i>picea</i>	152
37	<i>fulgida</i>	163	73	<i>politata</i>	176
64	<i>fumata</i>	172	45	<i>prolixa</i>	165
49	<i>funesta</i>	168	44	<i>pulchra</i>	164
24	<i>Fungi</i>	157	65	<i>pulla</i>	172
		56			70

70 pumilio	p. 175	28 sericans	p. 159
16 pusilla	153	6 sulcata	150
71 pusillima	175	7 sulcatula	151
39 pygmaea	163	20 teres	155
19 reptans	154	29 terminalis	160
5 riicularis	150	59 tristis	170
51 ruficornis	169	42 vimbrata	163

Anthophagus G. XI. p. 220

1 alpinus	p. 220	4 intermedius	p. 221
5 armiger	221	7 obscurus	—
2 caraboides	—	8 plagiatus	222
6 dichrus	—	3 testaceus	221

Euaesthetus G. IX. p. 201

1 scaber	p. 202		
----------	--------	--	--

Lathrobium G. IV. p. 128

16 badium	p. 135	1 latipes	p. 129
17 bicolor	—	13 lineare	132
6 brunnipes	131	9 longiusculum	131
18 castaneum	135	15 longulum	134
2 depresso	129	11 multipunctum	131
12 elongatum	132	4 pallipes	130
3 fracticorne	130	7 pilosum	131
5 fuscum	—	10 politum	—
8 gracile	131	14 terminatum	134

Lomechusa G. VII. p. 178

4 dentata	p. 181	3 paradoxa	p. 180
2 emarginata	179	1 strumosa	179

Omalium G. X. p. 203

27 abdominale	p. 219	16 fuscum	p. 211
9 brachypterum	208	15 laeve	—
5 brunneum	206	21 macropterum	215
8 castaneum	207	17 nigrum	212
6 crenatum	—	24 ophthalmicum	216
10 cursor	208	22 omatum	215
2 depresso	205	25 pallidum	217
14 florale	210	1 planum	204
	16		3

3 pusillum	p. 205	11 rugosum	p. 208
4 pygmaeum	206	23 striatum	216
18 quadrum	213	19 tectum	213
20 Ranunculi	215	26 testaceum	218
12 rinulare	209	13 Viburni	210
7 rufum	207		

Oxyporus G. XIV. p. 234

9 Blumenbachii	p. 235	1 maior	p. 234
4 caelatus	—	5 maxillosus	235
8 cinctus	—	2 rufus	—
7 femoralis	—	6 vittatus	—
3 lateralis	—		

Oxytelus G. VIII. p. 183

7 caelatus	p. 191	9 morfitans	p. 195
5 carinatus	187	4 nitidulus	186
10 cornutus	195	12 pallipes	197
8 corticinus	192	2 pedicellus	185
3 depressus	185	6 picens	190
1 fuliginosus	—	11 tricornis	196
13 latipes	198		

Paederus G. V. p. 136

9 angustatus	141	8 orbiculatus	141
3 bicolor	138	1 ochraceus	138
4 castaneus	139	11 riparius	143
5 corticinus	—	2 rubricollis	138
7 fragilis	140	13 ruficollis	143
12 littoralis	143	6 vestitus	140
10 litorarius	142		

Piestus G. XII. p. 223

1 sulcatus	p. 224
------------	--------

Staphylinus G. III. p. 35

126 aeneocephalus	p. 213	38 Anthrax	67
80 aeneus	86	120 ater	112
70 agilis	77	74 atratus	84
68 albipes	76	19 atricillus	55
109 alternans	107	20 attenuatus	61
	38		122

122	baltimorensis	112	108	fulgidus	106
32	blimaculatus	63	10	fuliginosus	48
62	binotatus	73	107	fulminans	105
33	bipustulatus	63	106	fulvipennis	104
60	blandus	72	66	fulvipes	75
54	boops	71	43	fumarius	67
50	breuicornis	69	123	fuscatus	112
22	brunneus	57	26	fuscus	59
124	brunoipes	112	99	glaber	100
2	Capucinus	40	100	glabratuS	101
42	carbonarius	67	148	hirtus	125
132	castanopterus	116	36	immundus	66
37	celer	66	1	impressus	39
53	cephalotes	71	81	laminatus	86
141	chloropterus	121	129	latebricola	113
147	Chrysis	124	4	lateralis	42
146	chrysoccephalus	—	8	laticollis	47
84	cinctulus	89	101	lentus	101
137	cinerascens	117	64	lepidus	74
140	cingulatus	121	94	linearis	97
127	cinnamopterus	113	131	lutarius	115
15	coenosus	51	116	macrocephalus	111
14	corruscus	—	145	maculosus	123
114	cyaneus	110	56	marginatus	71
78	cyanipennis	86	20	maurorufus	56
77	decorus	85	150	maxillosus	126
88	denigrator	92	111	melanocephalus	107
85	dilatatus	89	79	metallicus	86
24	discoideus	58	69	micans	76
63	dubius	74	52	microcephalus	70
41	ebeninus	67	9	moestus	47
104	elegans	103	6	molochinus	46
98	elongatus	98	121	morio	112
97	emmesus	—	142	murinus	122
133	erythropterus	116	93	nanus	96
143	femoratus	122	139	nebulosus	121
72	fimetarius	80	44	nigrita	68
65	flavopterus	74	90	nigritulus	94
134	fodiens	116	71	nitens	78
61	formosus	72	51	nitidulus	69
135	fossator	117	5	nitidus	42
136	fosfor	—	95	ochraceus	97
187	fulgens	91	39	ochropus	67
		108			151

151 oculatus	p. 126	119 similis	p. 115
117 olens	111	82 splendens	87
35 opacus	64	89 splendidulus	93
16 palliatus	53	86 stenoides	90
110 palmula	107	130 stercoreius	115
48 paruicornis	69	30 subuliformis	61
91 paluulus	95	18 tenellus	54
125 pedator	113	59 tenuis	72
17 peregrinus	53	29 terminatus	61
112 planatus	108	27 testaceus	60
76 politus	85	57 thoracicus	71
21 praecox	57	118 tomentosus	111
92 procerulus	95	113 tricolor	110
144 pubescens	123	11 tristis	48
96 punctulatus	98	7 Vlmi	47
75 punctus	85	46 vmbatilis	69
23 pygmaeus	57	47 vmbrinus	—
103 pyropterus	102	83 vagipunctus	88
102 relucens	101	73 varians	82
49 rigidicornis	69	28 ventralis	60
58 ruficollis	71	67 vernalis	75
12 ruficornis	50	138 versicolor	119
105 rufipennis	104	149 villosus	126
40 rufipes	67	45 Virgo	69
34 sanguinolentus	64	115 violaceus	110
53 scintillans	70	3 xantholoma	41
13 scitus	50	128 zonatus	113
25 sericans	59		

Stenus G. XIII. p. 225

12 Argus	p. 231	3 cordatus	p. 226
2 biguttatus	225	13 fuscipes	232
8 binotatus	229	1 luno	225
4 boops	226	10 morio	230
9 buphtalmus	230	5 oculatus	227
6 cicindeloides	229	11 opticus	231
15 circularis	233	14 pallipes	233
7 clauicornis	229		

Tachinus G. II. p. 22

16 analis	p. 30	11 axillaris	p. 29
14 atricapillus	—	9 bicolor	28
	II	Q	18

18 cernuns	p. 31	17 merdarius	p. 31
15 cinctus	30	8 nanus	28
1 dissimilis	23	12 niger	30
19 formosus	32	5 punctus	27
20 inclinans	33	2 quadripunctulus	24
4 lepidus	26	3 splendidus	24
13 lunulatus	30	6 striatus	27
7 melanocephalus	27	10 tristis	29

Tachyporus G. I. p. 1

15 abdominalis	p. 7	29 laticollis	p. 15
10 analis	6	21 limbatus	12
37 batychrus	20	23 marginalis	13
33 bicolor	17	13 marginatus	7
6 bimaculatus	5	27 marginellus	13
5 binotatus	—	31 memnonius	17
4 bipunctatus	—	20 nitidulus	11
39 bipunctulatus	21	33 pallipes	20
19 cappillaricornis	10	2 pedicularius	4
7 cellaris	5	8 pubescens	5
12 chrysomelinus	7	30 pullus	16
24 collaris	13	18 pusillus	9
26 corticinus	—	16 ruficollis	7
9 crassus	6	35 rufipes	17
34 fimbriatus	17	11 saginatus	6
28 fimetarius	14	32 signatus	17
1 granulum	3	40 subterraneus	21
36 humeralis	19	22 suturalis	13
25 immaturus	13	17 transversalis	8
14 lateralis	7	3 truncatellus	5

INDEX SYNONYMORVM.

Not. Verbum abbreviatum *auct.* significat, omnes vel plurimos autores, sub nomine indicato, speciem descripsisse vel eius mentionem fecisse; *M.* significat Monographiam meam Micropterorum de anno 1802.; *MM.* hanc recentiorem; numerus paginam.

*

*

Aleochara.

- Boleti* M. varietates *MM.* 152
strumosa M. *MM.* 179
tenuis M. *MM.* 152

Astrapaeus M. Panz. *MM.* 47.

Callicerus M. *MM.* 153.

Carabus.

- abbreviatus* Fabr. *M.* 121

Omalium.

- brunneum* M. v. 3. *MM.* 206
striatum M. *MM.* 186

Oxyporus.

- abdominalis* Fabr. *M.* 127
analis Fabr. Panz. *M.* 130
bicolor Rossi *M.* 149
bimaculatus Fabr. *M.* 131
bipustulatus Fabr. Panz. *M.* 136
brunneus Fbr. *M.* 142, 143, *MM.* 13
cellaris Fbr. *M.* 131
chrysomelinus Fbr. Panz. *M.* 129
erythropterus Panz. *MM.* 159
humeralis Schneid. *M.* 136
lunulatus Fabr. Panz. *M.* 148
marginatus Fbr. Panz. *M.* 127. *MM.* 20
marginellus Fabr. *M.* 137. 143
— — — Panz. *M.* 136. 143
maxillosus Fabr. Panz. *M.* 152
melanocephalus Fabr. *M.* 145
merdarius Fbr. *M.* 146

- minutus* Fabr. *M.* 126
pygmaeus Fabr. Panz. *M.* 145. 129
rufipes Fabr. Panz. *M.* 125. 139. *MM.* 16. 17. 23
rufus auct. *M.* 151
subterraneus Fabr. *M.* 135
suturalis Panz. *M.* 144
testaceus Fabr. *M.* 142
trimaculatus Fabr. *M.* 145

Oxytelus.

- pulcher* M. *MM.* 187

Paederus.

- angustatus* auct. *M.* 64. *MM.* 150
bicolor Oliv. *M.* 60
biguttatus Oliv. *M.* 155
brunnipes Fabr. *M.* 57
castaneus M. *MM.* 104
dimidiatus Panz. *M.* 40
elongatus Fabr. Panz. Payk. *M.* 56
filiformis Fabr. Payk. *M.* 54. 55. 57
fracticornis Payk. *M.* 54
fulgidus Panz. Fabr. *M.* 48
fulvipennis Fabr. *MM.* 106. Panz. *M.* 44
impressus Rossi *M.* 69
melanocephalus Fabr. Panz. *MM.* 138. 141
orbiculatus auct. *M.* 63. *MM.* 150
proboscideus Oliv. *M.* 156
riparius auct. *M.* 62
ruficollis auct. *M.* 185
testaceus Oliv. *M.* 44. *MM.* 138
tricolor Fabr. *M.* 46

Pinophilus M. *MM.* 129.

Silpha.

- minuta* Fabr. *M.* 119

Staphylinus.

- aeneocephalus* Payk. *M.* 9
aeneus De Geer, Rossi *M.* 17
— Fourcr. *M.* 18
affinis Payk. *M.* 44. *MM.* 104. 138
alpinus Fabr. Oliv. Payk. *M.* 188. 189
amoenus Oliv. *MM.* 86

analisis

- analis auct. *M.* 149
 angustatus auct. *M.* 64. Payk. *MM.* 150
 armatus Panz. *M.* 110
 aterrimus *M.* *MM.* 94
 atricapillus auct. *M.* 148. *MM.* 164
 balteatus Fabr. Faun. Gr. *M.* 3
 bicolor Fabr. *MM.* 95
 biguttatus auct. *M.* 155. *MM.* 226
 bimaculatus Schrank *M.* 149
 bipunctatus Oliv. *M.* 94. *MM.* 172
 bipustulatus Fabr. Panz. *M.* 37
 — — Rossi *M.* 38. 136
 — — Linn. *MM.* 172
 — — var. *M.* *MM.* 64
 blattinus Schrank. *M.* 128
 bombylius De Geer *M.* 160
 Boleti auct. *M.* 83
 brunneus Fabr. Payk. *M.* 114
 brunnipes Fabr. Oliv. *MM.* 113
 buphthalmus Rossi Schrank *M.* 156
 canaliculatus auct. *M.* 69
 caraboides Payk. *M.* 121
 — — Fabr. Linn. *M.* 122
 carinatus Panz. *M.* 107
 cellaris Payk. *M.* 131
 chalcocephalus Fabr. *MM.* 113
 chloropterus Creutz. Panz. *M.* 167
 chryscephalus Fourcr. Oliv. *M.* 13. *MM.* 123. 124
 chrysomelinus auct. *M.* 129. Rossi *M.* 127. 128. 130
 cicindeloides Schall *M.* 155
 cinctus Payk. *M.* 35
 clavicornis Panz. Rossi, Scopoli *M.* 156
 — — Fabr. *M.* 157
 coerulescens Fourcr. *M.* 7
 collaris Payk. Oliv. *M.* 72. *MM.* 164
 concinnus *M.* *MM.* 84
 contaminatus *M.* *MM.* 64
 crassicollis *M.* *MM.* 112
 crassicornis Fabr. *MM.* 152
 crenatus Fabr. Payk. *M.* 114
 cruentus Oliv. *M.* 25
 cupreus Oliv. Rossi *M.* 9. *MM.* 113
 cyaneus auct. *M.* 6

cyani-

- cyanipennis* auct. *M.* 168. *MM.* 85. 86
depressus Oliv. Payk. *M.* 103. *MM.* 185
dilatatus Fabr. Payk. *MM.* 89
dispar Payk. *M.* 127. 128. 129. 130. 146
elegans Oliv. *M.* 46. *MM.* 104. 139
elongatus Fourcr. *M.* 45. Payk. Schrank *M.* 56. Linn.
MM. 134
emarginatus Fabr. Payk. Oliv. *M.* 92. *MM.* 180. 181
erythrocephalus Fabr. Oliv. *MM.* 127
erythropterus auct. *M.* 10. 11. *MM.* 116
erythropus Payk. *MM.* 110
fasciatus Fuefsl. *M.* 3
femoratus Fabr. *MM.* 123
flavescens Fabr. Linn. *M.* 70. 137. *MM.* 59
flauopterus Fourcr. Oliv. *MM.* 75
floralis auct. *M.* 118.
fosfor auct. *M.* 10.
fragilis M. *MM.* 61
fulgens Fabr. *MM.* 92
fulgidus Oliv. *M.* 48 } *MM.* 45
— Fabr. Payk. *MM.* 106 } *MM.* 45
fuluipes Fabr. Panz. *M.* 25. 44. *MM.* 75
fuluopterus Fourcr. *M.* 33. *MM.* 46
fuscipes auct. *M.* 93. Sturm *M.* 139. Panz. *M.* 141.
MM. 170
glaberrimus Payk. *M.* 54
globulifer Fourcr. *M.* 5
gracilis Payk. *MM.* 142
gregarius Scopoli *M.* 62
haemorrhoidalis Fbr. Oliv. *MM.* 110
hirtus auct. *M.* 160. *MM.* 125
impressus Panz. *M.* 35. Oliv. *M.* 73
laminatus auct. *M.* 17
limbatus Payk. *M.* 70
linearis Oliv. *M.* 44. Fabr. *MM.* 98
littorens Linn. Payk. *M.* 145. 146
longiceps M. *MM.* 98
lucidus M. *MM.* 82
lunulatus Linn. Payk. *M.* 148
major niger De Geer *M.* 4
marginalis Schrank. *M.* 136
marginatus auct. *M.* 24. Fourcr. *M.* 138
maxillosus auct. *M.* 3

melano-

- melanocephalus Payk. *M.* 145., 146. Oliv. *MM.* 207
 melanurus Schrank *M.* 99
 merdarius Oliv. *M.* 149
 minor niger De Geer *M.* 5
 minutus Oliv. *MM.* 186
 Morio *M.* *MM.* 111
 morsitans Payk. *M.* 109
 murinus auct. *M.* 15
 manus Payk. *M.* 99
 nebulosus auct. *M.* 14. Fourcr. *M.* 3
 nigricollis Payk. *M.* 85
 nigrofulvus Fourcr. *M.* 151
 nitens Schrank *M.* 5
 nitidulus Fabr. Oliv. *M.* 126
 nitidus auct. *M.* 33. Panz. *M.* 46
 — var. 6, 8, 13 *MM.* 40, 54, 55
 obscurus Payk. *M.* 123.
 obtusus Fbr. Schrank, Rossi *M.* 130
 oculatus Fbr. Oliv. *MM.* 127. Götze *M.* 155
 olens auct. *M.* 4
 ophthalmicus Scopoli *M.* 7
 orbiculatus Payk. *M.* 63
 pallidipennis Panz. *M.* 109
 piceus auct. *M.* 106. Schrank *M.* 103
 picipennis Payk. *M.* 33
 plagiatus Fabr. Payk. *M.* 123. 189
 planus Payk. *M.* 112
 politus auct. *M.* 18. Linn. *M.* 20. Panz. *M.* 21
 pubescens auct. *M.* 13. Payk. *M.* 131., *MM.* 123., 124
 punctato-striatus Payk. *M.* 147
 punctatus Fourcr. *M.* 57
 punctulatus Fabr. Payk. *MM.* 99
 quadratus Payk. *M.* 57. *MM.* 131
 riparius auct. *M.* 62
 rimularis auct. *M.* 117
 ruficollis Payk. *M.* 185
 rufipes auct. *M.* 138. Payk. *M.* 137. 143
 rufus auct. *M.* 151
 rugosus Fbr. *MM.* 208. Oliv. *M.* 116. Schrank *M.* 106
 saxatilis Rossi *M.* 33
 similis auct. *M.* 5. *MM.* 111. 112
 socialis Payk. Oliv. *M.* 83. *MM.* 157.
 sordidus *M.* *MM.* 82.

spini-

- spinipes Pontopp. *M.* 138
 splendens auct. *M.* 16
 stercorarius Oliv. *M.* 12
 striatus Oliv. *M.* 147
 strumosus Fabr. Payk. *M.* 92. *MM.* 182
 subterraneus auct. *M.* 135
 sulcatus Oliv. Payk. *M.* 74. Fourcr. *M.* 107
 tectus Payk. *M.* 123
 tenuis Fabr. *M.* 40
 tessellatus Fourcr. *MM.* 121
 testaceus Payk. *MM.* 60
 thoracicus Fourcr. *MM.* 143
 tricolor Payk. *M.* 46. *MM.* 104
 tricornis Payk. Oliv. *M.* 110
 trilobus Oliv. *M.* 109
 trimaculatus Payk. *M.* 145
 tristis Fabr. *M.* 34. *MM.* 49
 Ulmi Rossi, Oliv. *M.* 200
 ulmineus Fabr. *MM.* 47
 varians auct. *M.* 20. Payk. *M.* 37
 viduatus Fabr. *MM.* 123
 violaceus Oliv. *MM.* 92

Stenus.

- binotatus Ljungh *MM.* 230
 bipustulatus Ljungh *MM.* 225
 buplhalmus Ljungh *MM.* 229
 Juno Payk. *M.* 154, 155. Ljungh *MM.* 227
 rotundatus Ljungh *MM.* 234
 similis Ljungh *MM.* 229

Tachinus.

- Fam. I. M. *MM.* 1
 Fam. II. M. *MM.* 22
 castaneus M. *MM.* 15
 Fordidus M. *MM.* 15

Tachyporus.

- Fam. I. M. *MM.* 22
 Fam. II. M. *MM.* 1
 marginatus M. *MM.* 13

3-53517 (1)

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00259711 0

nhent QL577.G77

Monographia coleopterorum micropteronum,